

WZROST I KWITNIENIE DZIESIĘCIU ODMIAN RÓŻ Z GRUPY OKRYWOWYCH

Growth and flowering of ten groundcover roses cultivars

Dariusz PIETRAKOWSKI

*Zakład Dendrologii i Szkółkarstwa, Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego,
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego,
Poznań Baranowo, ul. Szamotulska 28, 62-081 Przeźmierowo*

STRESZCZENIE

Róże są pięknymi krzewami uprawianymi od najdawniejszych czasów. W latach siedemdziesiątych wydzielono z nich grupę odmian o niewielkich wymaganiach, a przede wszystkim o długotrwałym kwitnieniu. W pracy opisano dziesięć nowych odmian wybranych z kolekcji, mało jeszcze znanych, ale zasługujących na szerokie rozpowszechnienie. Są to odmiany o różnych barwach kwiatów: 'Kent', 'Weisse Immensee' (białych), 'Elfrid', 'Mirato', 'Tommelise' (różowych), 'Fairy Dance', 'Rote Max Graf', 'Viking' (czerwonych) i 'Bingo Meidiland', 'Cherry Meidiland' (dwubarwnych).

WSTĘP

Kolekcja róż okrywowych w Zakładzie Dendrologii i Szkółkarstwa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu założona została wiosną 2000 roku i dalej jest powiększana. Zgromadzono ponad 35 taksonów należących do różnych grup pokrojowych (Jerzy i in. 1992). Róże okrywowe należą do najmłodszej grupy róż, rozpowszechnionej od lat siedemdziesiątych. Szybko się one rozkrzewiają i intensywnie rozrastają, skutecznie okrywając powierzchnię gleby. Tworzą kwitnące różnokolorowe dywany. Według Jerzego i in. (1992) mogą one mieć różne zastosowanie w zależności od intensywności wzrostu i pokroju krzewów. Odmiany nisko rosnące o pędach płożących bardzo często mogą zastępować trawniki. Można je również sadzić na niewyrównanych i wzniesionych terenach zieleni. Z krzewów

o pokroju wzniesionym tworzy się niskie, kwitnące żywopłoty lub szpalery.

Najważniejszym walorem róż okrywowych jest długi okres kwitnienia. Rozpoczyna się on w pierwszej dekadzie czerwca, a kolejne kwiaty rozwijają się sukcesywnie aż do pierwszych ujemnych temperatur zimowych. Kwiaty róż okrywowych cechują się ogromną skalą barw.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dziesięciu nowych odmian wybranych z kolekcji, mało jeszcze znanych, ale zasługujących na szerokie rozpowszechnienie.

MATERIAŁ I METODY

W latach 2000–2001 przeprowadzono obserwacje dziesięciu odmian róż z grupy okrywowych rosnących na wyselekcjonowanej podkładce *Rosa canina* L. Wzrost krzewów oraz pokrój badano na dwudziestu roślinach z każdej odmiany. Mierzono średnicę kwiatów (cm) i ich liczbę w kwiatostanie. Określano również okres ich kwitnienia. Oznaczano barwę pąków i rozwiniętych kwiatów za pomocą katalogu barw (RHS 1966). Obserwacje dotyczące kwiatostanów wykonywano na trzydziestu pędach. W wynikach podano ich średnią. Dokumentację fotograficzną wykonano w celu ukazania cech pojedynczych kwiatów.

WYNIKI

Opisy odmian

1. 'Bingo Meidiland' (fot. 1)

synonim: 'Meipotal', 'Carefree Delight', 'Potalia', 'Bingo Meilandecor'

Meilland, Francja 1994
(‘Eyepaint’ x ‘Nirvana’)

Pokrój luźny, pędy wzniesione pod kątem 45° od powierzchni gleby, 60–70 x 70–80 cm, liście ciemnozielone. Kwiaty pojedyncze, o średnicy 6–7 cm zebrane średnio po 13 (5–26) w groniaste kwiatostany, w pąku malinowoczerwone (RHS-CC; 47B), płatki dwubarwne, na zewnątrz amarantoworóżowe (RHS-CC; 55B/C), białe (RHS-CC; 155B) w środku. Kwitnie od czerwca do jesieni. Zapach delikatny (www.helpmefind.com).

2. ‘Cherry Meidiland’ (fot. 2)

synonim: ‘Meirumour’, ‘Cherry Meillandecor’
Meilland, Francja 1995

[‘Meipoque’ x (‘Regensberg’ x ‘Fair Play’)]

Krzew o pędach wyprostowanych, sztywnych, z dużymi, mocnymi kolcami, 70–80 x 70–80 cm, liście ciemnozielone. Kwiaty pojedyncze, o średnicy 5–6 cm, zebrane średnio po 11 (1–17) w okazałe kwiatostany, w pąku ciemnokarminowe (RHS-CC; 53A), płatki dwubarwne, karminowe (RHS-CC; 53B) z białozółtawym (RHS-CC; 155A) oczkiem, brzegi płatków pofalowane. Kwitnie obficie od początku czerwca do jesieni. Kwiaty słabo pachnące.

3. ‘Elfrid’ (fot. 3)

synonim: ‘Beautiful Carpet’, ‘Kormuse’, ‘Wiltshire’

Kordes, Niemcy 1993

Siewka odmiany ‘Weisse Immensee’ (Harkness 1996)

Krzew szerokokorozłożysty, z pędami przewieszającymi się pod ciężarem kwiatostanów, 50–60 x 80–90 cm. Kwiaty pełne o średnicy 7 cm zebrane średnio po 23 (7–32) w kwiatostanie, płatków około 40 o brzegach pofalowanych, w pąku malinowosinawe (RHS-CC; 51D), rozwinięte wiśniowoamarantowe (RHS-CC; 61D). Kwitnie bardzo obficie od pierwszej dekady czerwca do późnej jesieni. Zapach delikatny.

4. ‘Fairy Dance’ (fot. 4)

synonim: ‘Red Fairy’, ‘Rote fairy’, ‘Moredfar’, ‘The Red Fairy’

Ralph S. Moore, Stany Zjednoczone 1995

Siewka ‘Simon Robinson’

Krzew rozłożysty, niezbyt gęsty, 40–50 x 60–70 cm. Kwiaty w pąku ciemnokarminowe



Fot. 1. Odmiana ‘Bingo Meidiland’
Fig. 1. Variety ‘Bingo Meidiland’



Fot. 2. Odmiana ‘Cherry Meidiland’
Fig. 2. Variety ‘Cherry Meidiland’



Fot. 3. Odmiana 'Elfrid'
Fig. 3. Variety 'Elfrid'



Fot. 5. Odmiana 'Kent'
Fig. 5. Variety 'Kent'



Fot. 4. Odmiana 'Fairy Dance'
Fig. 4. Variety 'Fairy Dance'

(RHS-CC; 53A), rozwinięte karminowe (RHS-CC; 53C/D), drobne o średnicy 3–4 cm z około 30 płatkami zebrane średnio po 59 (17–239) na wydłużonych kwiatostronach. Kwitnie obficie od pierwszej dekady czerwca do trzeciej dekady października. Zapach delikatny lub brak.

5. 'Kent' (fot. 5)

synonim: 'Poulcon', 'White Cover', 'Pyrenees', 'Sparkler'

Poulsen, Dania 1988

Pochodzenie genetyczne nieznane.

Krzew szerokokorzysty, niezbyt gęsty, 50–60 x 70–80 cm. Kwiaty pełne o średnicy 7–8 cm po kilkanaście (do 15) na wierzchołkach pędów, w paku białozłotawe (RHS-CC; 155A), rozwinięte białe (RHS-CC; 155B). Kwitnie od pierwszej dekady czerwca do jesieni. Zapach słaby.

6. 'Mirato'

synonim: 'Tanotax', 'Chatsworth', 'Tanotari'

Tantau, Niemcy 1990

Pochodzenie genetyczne nieznane.

Krzew gęsty, rozłożysty z długimi, łukowato wygiętymi pędami, 50–60 x 70–80 cm. Kwiaty półpełne o średnicy 6–7 cm, zebrane średnio po 17 (7–23) w kwiatostronach, płatki intensywnie różowe (RHS-CC; 67D). Kwitnie bardzo obficie od czerwca do przymrozków. Zapach dość intensywny, słodki.

7. 'Rote Max Graf' (fot. 6)

synonim: 'Red Max Graf', 'Kormax'

Kordes, Niemcy 1980

(*R. rugosa* x *R. wichuraiana*) x nieznany (Cairns 1993)



Fot. 6. Odmiana 'Rote Max Graf'
Fig. 6. Variety 'Rote Max Graf'



Fot. 7. Odmiana 'Tommelise'
Fig. 7. Variety 'Tommelise'

Krzew prawie płożący, z długimi, łukowato wygiętymi pędami, 30–40 x 150–200 cm. Kwiaty pojedyncze o średnicy 7–8 cm, ułożone na pędzie pojedynczo lub po kilka, w paku ciemnokarminowe (RHS-CC; 53A), rozwinięte purpurowoczerwone (RHS-CC; 46A/B), płatki aksamitne, kwitnie w czerwcu, powtarza kwitnienie w sierpniu i wrześniu. Zapach niezbyt intensywny.

8. 'Tommelise' (fot. 7)

synonim: 'Kortenaar', 'Hertfordshire'

Kordes, Niemcy 1991

Pochodzenie genetyczne nieznane (Olds 1998)

Krzew zwarty, rozłożysty, wzrost powolny, 20–30 x 50–60 cm. Kwiaty pojedyncze, niewielkie do 4 cm średnicy, zebrane średnio po 39 (19–74) w niewielkie wydłużone kwiatostany, w paku amarantoworóżowe (RHS-CC; 55C), rozwinięte amarantowe (RHS-CC; 57A), jaśniejące ku środkowi (RHS-CC; 57B/C). Brzeg płatków charakterystycznie odgięty w dół. Kwitnie od czerwca do jesieni. Zapach słaby.

9. 'Weisse Immensee' (fot. 8)

synonim: 'Korweirim', 'Korwerim', 'Lac Blanc', 'Patridge', 'White Immensee'

Kordes, Niemcy 1983

'The Fairy' x siewka *R. wichuraiana* (Beales 1997)

Krzew o pędach długich, wiotkich, płożących, 15–20 x 150–200 cm, liście do 8 cm, listki około 2 cm, ciemnozielone błyszczące i długo pozostające na pędach (w 2001 roku do grudnia). Kwiaty pojedyncze o średnicy 3 cm, ułożone na pędach średnio po 11 (1–37) w baldachogronach, w pąkach bladioróżowe (RHS-CC; 52C), w pełni rozwinięte białe (RHS-CC; 155B). Kwitnie obficie w czerwcu, powtarza kwitnienie w sierpniu i wrześniu. Jest ono słabsze. Zapach intensywny.

10. 'Viking' (fot. 9)

synonim: 'Tanydor', 'Rody'

Tantau, Niemcy 1995

Pochodzenie genetyczne nieznane.

Krzew szerokokorozłożysty z łukowato wygiętymi pędami, 50–60 x 70–80 cm. Kwiatów średnio po 9 (1–18) w kwiatostanach, w paku amarantoworóżowe (RHS-CC; 55B), rozwinięte amarantoworóżowe (RHS-CC; 55D), półpełne. Kwitnie od czerwca do jesieni. Zapach delikatny.

Wymienione odmiany można rozmnażać przy pomocy sadzonek pędowych. Są one odporne na choroby i szkodniki. W latach obserwacji nie zauważono uszkodzeń mrozowych na roślinach.



Fot. 8. Odmiana 'Weisse Immensee'

Fig. 8. Variety 'Weisse Immensee'



Fot. 9. Odmiana 'Viking'

Fig. 9. Variety 'Viking'

SUMMARY

Roses are beautiful shrubs cultivated from oldest times. In seventieth it was selected new group, which characterize long, abundant blooming and not large requirements. They are groundcover roses. They characterize short height and using on flowerbeds.

In Division of Dendrology and Nursery Production of Agricultural University named August Cieszkowski in Poznan collected over 35 roses taxas from different systematical groups. Present work shows ten new varieties choosen from collection, not known yet, but deserving on wide dissemination. These cultivars have white flowers ('Kent', 'Weisse Immensee'), pink ('Elfrid', 'Mirato', 'Tommelise'), red ('Fairy Dance', 'Rote Max Graf', 'Viking') or two-coloured ('Bingo Meidiland', 'Cherry Meidiland').

LITERATURA

- Beales P.** 1997, Classic roses: an illustrated encyclopedia and grower's manual of old roses, shrub roses & climbers. Henry Holt & Co.
- Cairns T.** 1993, Modern Roses 10. American Rose Society.
- Harkness P.** 1996, Roses to enjoy. Royal National Rose Society.
- Olds M.** 1998, Botanica's Roses. Grange Books.
- Jerzy M., Żyła S., Czekalski M.** 1992, Róże. PWRiL. Warszawa: 53-55.
- The Royal Horticultural Society.** 1966, R.H.S. Colour Chart. London.

www.helpmefind.com/sites/rrr/rc44.html