

*cinum* (Pers.) Fr., *Russula aeruginea* Lindbl., *R. albonigra* (Krz.) Fr., *R. alutacea* (Pers.) Fr., *R. cyanoxantha* Fr., *R. emetica* Fr., *R. laurocerasi* Melzer, *R. nigricans* (Bull.) Fr., *R. ochroleuca* (Pers.) Fr., *Schizophyllum commune* Fr., *Stropharia aeruginosa* Curt., *Tricholoma rutilans* (Fr. ex Schaff.) Quel., *T. sulphureum* Bull., *Trogia crispa* Fr.

Spośród rzadszych gatunków, które znaleziono w okolicach Wetliny wymienić można: *Amantia virosa* Fr., *Boletus calopus* Fr., *Cantharellus umbonatus* Gm. *Cordyceps militaris* (L.) Link. *Dryodon coralloides* (Scop.) Quel., *Elaphomyces granulatus* Fr., *Helvella lacunosa* Afzelius, *Leotia gelatinosa* Hill., *Lepiota acutesquamosa* Weinm., *Macropodia macropus* (Pers.) Rehm., *Mycena aurantiomarginata* Fr., *Pluteus leoninus* (Schaeff.) Fr., *Polyporus benzoinus* Fr., *Poria nigrescens* Bres., *Strobilomyces strobilaceus* Scop.

Szczegółowe opracowanie zebranych materiałów przez poszczególnych uczestników wycieczki przewidziane jest na rok 1959.

## KOMUNIKATY

### Sprostowanie

W spisie członków zwyczajnych P. T. B. (Wiadomości Botaniczne, tom II, zeszyt 2, str. 93) pominięto przy nazwisku dr B. Halicza jego stopień doktora.

