

Nazwa	Długość okresu		Pora kwitnienia
	od ukazania się pączka do jego rozwinięcia się	kwitnienia	
<i>Miltonia clowesii</i> Ldl. Brazylia	przeważnie 30 dni	od 16 do 30 dni; najczęściej 20 dni	I, XII
<i>Oncidium divaricatum</i> Ldl. Brazylia	około 50 dni	przeszło 30 dni *	VII, VIII
<i>Oncidium ornithorhynchum</i> H. B. et Kth. Meksyk	77	około 25 dni *	IX, X
<i>Paphiopedilum insigne</i> Pfitz. Himalaje	40 dni	przeciętnie 50 dni	I
<i>Sobralia sessilis</i> Ldl. Gujana	przeważnie 14 dni	1 doba	I, II, III, XII
<i>Stanhopea oculata</i> Ldl. Meksyk	do 10 dni	od 7 do 14 dni	VII, X
<i>Stanhopea tigrina</i> Batem. Meksyk	około 14 dni	około 7 dni	VII, VIII, IX

Uwaga: * — dane dotyczą kwiatostanu.

OD REDAKCJI

Ukazał się w druku pod redakcją J. Augustynowicza i J. Teleżyńskiej obszerny (190 stron), bogato ilustrowany

PRZEWODNIK PO OGRODZIE BOTANICZNYM UNIWERSY-
TETU WROCŁAWSKIEGO

Wrocław, 1960 r.

