Zapiski florystyczne z południowo-wschodniego krańca kotliny Sandomierskiej. (Notices floristiques).

Podał

MARJAN NOWIŃSKI.

Pragnę donieść florystom polskim o stwierdzonych przezemnie nowych stanowiskach niektórych ciekawych roślin, odkładając na później dokładniejsze ich omówienie.

Lycopodium inundatum L. Wilkowyja koło Giedlarowej, borek sosnowy na torfowisku wysokiem.

Asplenium viride Huds. Przeworsk, na piaszczystej podstawie figury przy cmentarzu miejskim. Stanowisko to nie stoi prawdopodobnie w żadnym związku ze stanowiskami z Ojcowa, Bolesławia i Olkusza, ani z karpaczkami. Roślina ta jest tu najwidoczniej zawleczona, może z materiałem kamiennym na figurę.

Ulmus scabra Mill. var. *heterophylla* Maxim. Grodzisko dolne, borek sosnowy. Stanowisko to z pośród dotychczas znanych jest najdalej wysunięte na zachód (Flora Polska. T. II, str. 56).

Rumex maritimus L. Tryńcza. Roślina ruderalna występująca zwłaszcza obficie na brzegach stawów folwarcznych.

Euphorbia stricta L. Gorzyce, zarośla nad starem Wiśloczyskiem.

Euphorbia procera M. B. (*E. villosa* W. K.). Gorzyce, Jagiełka, Gniewczyzna. Bór sosnowy, las dębowo-sosnowy podmokły, podmokłe łąki podleśne i śródleśne.

Euphorbia falcata L. Ubieszyn, pola gliniaste, między zbożem.

Chenopodium Botrys L. Gorzyce, roślina ruderalna.

Kochia arenaria Roth. Ubieszyn, pole piaszczyste nad Sanem.

Salsola Kali L. Ubieszyn, wikliny nad Sanem.

Cucubalus baccifer L. Gorzyce, las wilgotny, zarośla nad starem Wiśloczyskiem. Leżachów, wikliny nad Sanem.

Dianthus Armeria L. Gorzyce, Wólka Niedźwiedzka, Sarzyna. Zręby leśne, brzegi lasów.

Dianthus superbus L. Gorzyce, Jagiełła, bór sosnowy. Rozbórz, Ujezna, Jagiełła, Chodaczów, Grodzisko, łąki mokre.

Silene dichotoma Ehrh. Tryńcza, pola uprawne, zwłaszcza wśród koniczyn.

Silene gallica L. Leżajsk, Chodaczów, Grodzisko, pola uprawne, między zbożem.

Actaea Cimicifuga L. Jagiełła, las dębowy. Sarzyna, las mieszanym.

Anemone patens L. Gorzyce, suche zręby leśne.

Thalictrum flavum L. Chałupki Gorliczyńskie, Rozbórz, Ujezna, moczary.

Papaver Argemone L. Wólka Małkowa, pola piaszczyste, brzegi Wisłoka.

Barbarea stricta Andr. Tryńcza, moczary, brzegi Wisłoka, zarośla nadrzeczne.

Arabis arenosa Scop. Leżajsk, Wólka Niedźwiedzka, przydroża.

Arabis Halleri L. Leżajsk, Dębno, Głogowiec, Ubieszyn, Gorzyce, Leżachów, brzegi Sanu.

Bunias orientalis L. Dębno, Gorzyce, Leżachów, Manasterz, brzegi Sanu, przydroża.

Cardamine Impatiens L. Brzoza Królewska, las bukowo-jodłowy.

Dentaria bulbifera L. Brzoza Stadnicka, Wólka Niedźwiecka, las bukowo-jodłowy i grabowy.

Dentaria glandulosa W. K. Brzoza Stadnicka, Wólka Niedźwiedzka, Brzoza Królewska, Sarzyna, Zmysłówka, Budy Łańcuckie, lasy mieszane. Wilkowyja, Biedaczów, las podmokły, olszyny.

Reseda lutea L. Leżajsk, przydroża.

Hypericum humifusum L. Gorzyce, wilgotne miejsca na zrębach leśnych, brzegi lasów, pola śródleśne.

Hypericum montanum L. Gorzyce, bór sosnowy, suche zręby leśne.

Hypericum hirsutum L. Gorzyce, olszyny nad starem Wisłoczyskiem.

Viola persicifolia Schkuhr var. *elatior* Fries. Chodaczów, Grodzisko, olszyny na moczarach.

Sedum boloniense Loisl. Gorzyce, suchy zrąb leśny.

Parnassia palustris L. Ruda, Staremiasto, Wierzawice, Dębno, Grodzisko, Chodaczów, Jagiełła, Gniewczyzna, Rozbórz, Ujezna, Chałupki Gorliczyńskie, łąki mokre.

Alchemilla arvensis L. Chodaczów, Tryńcza, pola na glinach, między zbożem.

Lathyrus silvestris L. var. *plathyphyllus* Retz. Manasterz-Kostków, zarośla przydrożne.

Lathyrus paluster L. Chałupki Gorliczyńskie, Rozbórz, Ujezna, Jagiełła, moczary.

Trifolium fragiferum L. Tryńcza, Wólka Małkowa, Chodaczów, wybrzeża Wisłoka.

Vicia lutea L. Chodaczów, zalewiskowe łąki nadrzeczne.

Vicia pannonica Jacq. var. *purpurascens* Koch. Chodaczów, tor kolejowy.

Thymelaea Passerina L. Tryńcza, pola nadrzeczne.

Daphne Cneorum L. Leżajsk, las „klasztorny“. Gorzyce, zręby leśne, bór sosnowy. Podane tu nowe znaleziska tej ciekawej rośliny, zwanej w tej okolicy przez lud „szmerem“, są najdalej na południowy zachód wysuniętymi stanowiskami i pozwalają zaokrąglić jej dotychczasowy zasięg.

Circaea lutetiana L. Brzoza Stadnicka, Wydrze, Wólka Niedźwiecka, lasy bukowo-jodłowe i grabowe.

Circaea alpina L. Brzoza Stadnicka, Wydrze, Wólka Niedźwiecka, Brzoza Królewska, Wilkowyja, Zmysłówka, Budy Łańcuckie, Biedaczów, lasy bukowo-jodłowe, lasy szpilkowe podmokłe, olszyny.

Astrantia major L. Gorzyce, Jagiełła, bór sosnowy i las dębowo-sosnowy.

Chaerophyllum bulbosum L. Staremiasto, Dębno, Leżachów, zarośla nad Sanem.

Laserpitium prutenicum L. Leżachów, lassek na glinach opodal Sanu.

Pirola uniflora L. Tryńcza, Sarzyna, bór sosnowy.

Cerinth minor L. Leżachów, miedza polna na glinach nad Sanem.

Myosotis hispida Schldl. Leżachów, lassek opodal Sanu na glinach.

Antirrhinum Orontium L. Leżachów, Tryńcza, pola na glinach, między zbożem.

Gratiola officinalis L. Tryńcza, Chodaczów, Głogowiec, brzegi Wisłoka. Dębno, Leżachów, Ubieszyn, Wierzawice, brzegi Sanu.

Pedicularis Sceptum carolinum L. Chałupki Gorliczyńskie, Rozbórz, moczar „Trojany“.

Scrophularia Scopoli Hoppe. Grodzisko dolne, brzeg wąwozu w glinach. Gorzyce, olszyny nad starem Wisłoczyskiem.

Verbascum Blattaria L. Gorzyce, wikliny nad starem Wisłoczyskiem. Pelkinie, przydroże.

Veronica longifolia L. Chodaczów, Grodzisko, moczary.

Veronica montana L. Biedaczów, brzeg potoku leśnego.

Brunella alba Pallas. Chodaczów, łąki zalewiskowe nad starem Wisłoczyskiem.

Brunella grandiflora Jacq. Tamże.

Plantago arenaria W. K. Tryńcza, Chodaczów, Giedlarowa, Leżajsk, piaszczyska, bory sosnowe.

Galium Schultesii Vest. Gorzyce, Leżajsk, Jelna, Wólka Niedźwiedzka, Sarzyna, Zmysłówka, lasy dębowo-sosnowe, grabowe i bukowo-jodłowe.

Arnoseris pusilla Gaertn. Wilkowyja, piaszczyste pola podleśne.

Aster salicifolius Scholler. Chodaczów, wikliny nad starem Wisłoczyskiem.

Carduus canus L. Rozbórz, Ujezna, Chałupki Gorliczyńskie. Moczar „Trojany“.

Leontodon hirtus L. Tamże.

Matricaria discoidea D. C. Wólka Małkowa, Tryńcza, tor kolejowy, przydroża.

Senecio Fuchsii Gmel. Tryńcza, Gorzyce, bór sosnowy.

Senecio paludosus L. Rozbórz, Ujezna, moczar „Trojany“.

Picris crepoides Saut. Tryńcza, Manasterz-Kostków, zarośla przydrożne.

Aposeris foetida Less. Leżajsk, Jelna, Sarzyna, Brzoza Królewska, Brzoza Stadnicka, Wólka Niedźwiedzka, Zmysłówka, Budy Łańcuckie, lasy mieszane.

Veratrum album L. Jagiełła, Rozbórz, Chałupki Gorliczyńskie, moczar „Trojany“. Wierzawice, moczary.

Juncus tenuis L. Tryńcza, ogród.

Juncus atratus Krock. Chodaczów, Grodzisko, Gniewczyna, Jagiełła, Rozbórz, moczary.

Iris sibirica L. Chodaczów, Grodzisko, moczary.

Carex pilosa Scop. Brzoza Stadnicka, las grabowy.

Carex pseudocyperus L. Biedaczów, olszyna podmokła nad śródleśnym potokiem.

Scirpus maritimus L. Ubieszyn, mokra łąka. Wólka Małkowa, Gorzyce, stare Wisłoczysko, Staremiasto, brzeg Sanu.

Scirpus radicans Schkuhr. Gorzyce, Wólka Małkowa, stare Wisłoczysko.

Rhynchospora alba Vill. Wilkowyja, borek sosnowy na torfowisku.

Elymus arenarius L. Tryńcza, Gorzyce, Leżajsk, Maleniska, Giedlarowa, Ruda, Sarzyna, bory sosnowe, piaszczyska, stare diuny.

Koeleria grandis Bess. Gorzyce, zrąb leśny.

Oryza clandestina A. Br. Gorzyce, stare Wiśloczysko.

Cephalanthera rubra Rich. Gorzyce, Leżajsk, Jelna, Sarzyna, bor sosnowy, las grabowy i jodłowo-sosnowy.

Orchis palustris Jacq. Dębno, moczary.

Wymienione w spisie powyższym miejscowości leżą w powiatach: Przeworsk: Tryńcza, Wólka Małkowa, Chałupki Gorliczyńskie, Głogowiec, Gniewczyna, Gorzyce, Jagiełła, Rozbórz, Ujezna, Ubieszyn.

Jarosław: Leżachów, Manasterz-Kostków, Pełkinie.

Łańcut: Biedaczów, Brzoza Królewska, Brzoza Stadnicka, Budy Łańcuckie, Chodaczów, Dębno, Giedlarowa, Grodzisko, Jelna, Leżajsk, Maleniska, Ruda, Sarzyna, Staremiasto, Wierzawice, Wilkowyja, Wola Zarczycka, Wólka Niedźwiedzka, Wydrze, Zmysłówka.

Résumé.

L'auteur énumère une série des stations des plantes plus ou moins rares dans les districts de Przeworsk, Jarosław et Łańcut.

(Wpłynęło do redakcji 3 grudnia 1923).