Badania bio-cytologiczne nad *Didymium difforme*. Część pierwsza.

(Étude bio-cytologique du *Didymium difforme*. —

Première partie).

(Tablice XII—XVIII).

Napisał

F. X. SKUPIEŃSKI.

Wstęp.

Pierwsze, kilkoletnie moje badania bio-cytologiczne nad Śluzowcami obejmowały dwa tylko gatunki, mianowicie *Didymium nigripes* Fr. i *Dictyostelium mucoroides* Bref. Zapoczątkowałem je w 1914 r. w pracowni profesora L. Matruchot w Paryżu, a konkretne wyniki tych badań zreasumowałem w szeregu publikacji, ogłoszonych pomiędzy rokiem 1916 a 1920.

Dwa wyżej wymienione gatunki dają się hodować z nadzwyczajną łatwością w środowisku sztucznym, przechodząc normalnie przez wszystkie fazy rozwoju do ciał owocowych włącznie. Zbyt skromny to był materiał, by na podstawie jego można było wyprowadzić daleko idące i uogólniające wnioski dla biologii wszystkich Śluzowców. To też pragnąłem krąg moich badań rozszerzyć i w tym celu próbowałem wyzyskać dla tych ostatnich cały szereg innych gatunków. Usiłowania moje spełzały zazwyczaj na niczem z powodu trudności hodowlanych. Nie pomagało dobieranie różnych pożywek, nie pomagało stosowanie różnych czynników, czy to fizycznych, czy chemicznych, bezskutecznem okazało się również dodawanie różnych gatunków bakterij, nawet tych, które po wydzieleniu z zarodni opornych gatunków dały się hodować oddzielnie na pożywkach sztucznych. Ten ostatni szczegół pozwolił mi wysnuć wniosek przeciwny koncepcji Pinoy¹⁾ jakoby bakterje były wyjątkowym czynnikiem, powodującym

¹⁾ Pinoy, E. Nécessité de la présence d'une Bactérie pour obtenir la culture des Myxomycètes. — Bull. de la Soc. Myc. de France XVIII 3 (1902).

kielkowanie zarodników i dalszy rozwój Śluzowca. Zarodniki niektórych gatunków, jak *Fuligo septica*, *Arcyria ferruginea*, *Amaurochaete fuliginosa*, *Ceratiomyxa fruticulosa* i cały szereg innych, kielkują w sztucznym środowisku. U pierwszych trzech gatunków myksameby po wyjściu z błonki zarodnikowej tworzą cysty, które w dość krótkim czasie zostają zniszczone przez bakterje. Rozwój *Ceratiomyxa* natomiast posuwa się dalej: z uwolnionej masy plazmatycznej, posiadającej cztery jądra, tworzą się najpierw cztery pływki, z których każda ulega bipartycji. Nowopowstałe pływki tworzą po pewnym czasie grupy złożone z ośmiu jednostek, połączonych przeciwległymi do biczyska końcami. Na tem stadium kończy się rozwój *Ceratiomyxa* w środowisku sztucznym. Nie udało mi się nigdy zaobserwować z tem ostatniem ani plazmodjum, ani tworzących się zarodni. Zatrzymanie się więc cyklu rozwojowego u jakiegoś gatunku Śluzowca należy przypisać brakowi pewnych czynników, które prawdopodobnie występują w podłożu naturalnem. Okazuje się więc, że pomimo obecności bakterji właściwej temu gatunkowi, która w pożywce rozwija się doskonale i która powinna, według Pinoy, odegrać decydującą rolę, rozwój nie dobiega do końca.

Należy wobec tego do badań laboratoryjnych nad Śluzowcami dobierać takie gatunki, które dałyby się łatwo hodować w środowisku sztucznym, począwszy od kielkowania, skończywszy na tworzeniu się normalnych zarodni. Taki wyjątkowy gatunek znalazłem przypadkowo w marcu 1921 r. Jest nim *Didymium difforme* Duby. Wyrósł on na wilgotnem sianie, trzymanem w krystalizatorze w Zakładzie Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego, i był punktem wyjścia do badań, których częściowe wyniki przedstawiam w niniejszej pracy.

Gatunek ten, występujący zazwyczaj na zgniłych liściach, słomie lub sianie, jest bardzo pospolitym i łatwym do wyhodowania: wystarczy umieścić trochę siana w krystalizatorze i zalać wodą kranową, by po pewnym czasie (mniej więcej po 2—3 tygodniach) otrzymać liczne dojrzałe ciała owocowe. Te ostatnie występują pod postacią zarodni siedzących lub nieregularnych plazmodjokarpjów. Ta łatwość otrzymywania, w krótkim stosunkowo czasie, świeżego i obfitego materiału ułatwia w wielkim stopniu badania tego gatunku.

Dla prowadzenia gruntownych badań jest rzeczą konieczną otrzymanie czystych kultur wyżej wymienionego gatunku. Jako podłoża dla kultur tych używam 2% agaru na wyciągu z siana lub marchwi, kawałków marchwi, ziemniaka, źdźbeł siana lub słomy, wprowadzonych do probówek lub kolbek Erlenmayera i dobrze wysterylizowanych. W tym celu należy użyć probówek znacznej długości

(30 cm) i o średnicy przynajmniej 2 cm, gdyż chodzi oto, by powierzchnia skośnie rozmieszczonej pożywki, po której będzie pełzało plazmodjum, była jaknajwiększa: im większa jest ta ostatnia, tem większy otrzymujemy plon. Poza tem większy zasób tlenu i łatwy jego dostęp odzewnątrz posiada kapitalne znaczenie w rozwoju *Didymium difforme*.

Ryc. 20. Ciała owocowe *Didymium difforme*. Od 1—8 — różnokształtne zarodnie ($\times 10$); 9 — plazmodjokarpjum ($\times 3$).

Fructifications du *Didymium difforme*. De 1 à 8 — différentes formes de sporanges ($\times 10$); 9 — un plasmodiocarpe ($\times 3$).

Plazmodjum tego gatunku w środowisku naturalnem posiada barwę szarą, niekiedy żółtawą i występuje stale pod postacią bardzo subtelnej silnie rozgałęzionej siateczki (Tabl. XIII, fig. 1 i XIV, fig. 1). Na agarze na wyciągu siana plazmodjum w kulturze czystej posiada stale barwę szarą, zaś na marchwi barwę kremową; widocznem więc jest, że barwa w wielu przypadkach zależną jest od składu chemicznego podłoża. Według niektórych autorów (Matruchot, Molliard) barwa plazmodjum jest w ścisłej zależności od barwików, wydzielonych przez bakterje, z którymi dany gatunek Śluzowca współżyje.

Kwestja ta jednak nie jest dokładnie zbadana. W każdym bądź razie barwik wydzielony przez bakterje zdaje się nie brać według mych doświadczeń udziału w zabarwieniu plazmodjum; przyczyny tego ostatniego należy szukać gdzieindziej. Kiedy mianowicie wprowadzimy do normalnie rozwijającej się kultury Śluzowca jakąś bakterję, wydzielającą barwik inny niż ten, który wydziela bakteria związana z tym organizmem, np. *Bacterium prodigiosum* Ehr., wydzielający barwik czerwony, plazmodjum nie nabiera absotutnie barwy czerwonej. Doświadczenia robione z innymi gatunkami bakteryj dają również wyniki negatywne.

Wynikałoby więc z tego, że barwik jest wytworem własnym plazmy plazmodjum danego gatunku. Ponadto barwa ta może się zmienić wielokrotnie w trakcie ontogenezy danego gatunku lub wystąpić dopiero pod koniec tej ostatniej, np. barwa fioletowa sporangjów *Polysphondylium violaceum* w obecności bakteryj nie wydzielających żadnego barwika. Plazmodjum *Didymium diffforme* posiada, jak już powiedziałem wyżej, barwę szarą lub kremową. Fragmenty plazmodjum, które przekształcają się bezpośrednio w sporangja, otrzymują najpierw barwę blado-różową, ta przechodzi stopniowo w barwę ciemno-różową, później w brązową i wreszcie w barwę ciemną. Wyrażnem się wydaje, że taka szybka zmiana barwy tego samego osobnika nie stoi w związku z działalnością bakteryj, lecz zależną jest od niewyjaśnionych dotychczas reakcyj, zachodzących w samej plazmie dojrzewającego osobnika.

Według Brandza (3) przyspieszone parowanie plazmodjów licznych Śluzowców, pod wpływem silnych promieni słonecznych, może wywołać głęboką zmianę barwy peridjum i włóśni. Jeden i ten sam gatunek może otrzymać różne zabarwienie zależnie od tego, czy przechodzi cykl rozwojowy na świetle czy też w miejscu zaciemnionem.

Plazmodjum *Didymium diffforme* przekształca się w ciała owocowe ujęte, jak już powiedziałem wyżej, w formę sporangjów, siedzących, okrągłych lub wydłużonych i poduszczkowatych, albo też plazmodjokarpjów.

Muszę w tej chwili zaznaczyć, że występowanie owych różnic w ciałach owocowych jest w ścisłym związku z jakością podłoża, jak również i otaczającego środowiska.

Didymium diffforme hodowany na pożywkach ubogich w związki odżywcze, jak np. agar z domieszką słabego wyciągu z siana lub nawet agar czysty, daje wyłącznie tylko małe (od 0.5 do 1 mm średnicy) okrągłe i poduszczkowate sporangja; hodowany zaś na agarze z domieszką soku marchwiowego (50 gr. marchwi na litr

pożywki), lub skrobi kartoflanej (50 gr. na litr pożywki) daje prawie wyłącznie silnie rozwinięte plazmodjokarpja (Tabl. XII, fig. 1 i 2).

Taka lub inna forma ciała owocowego zależną jest również od stanu fizycznego podłoża.

Gdy dojrzałe zarodniki *Didymium difforme* przeniesiemy do naczynia szklanego (krystalizatora), zawierającego wyciąg z siana lub marchwi i umieścimy w temperaturze 18° C, to po trzydziestu sześciu mniej więcej godzinach, powierzchnia tego ostatniego pokryje się kożuszkiem, utworzonym z bakteryj. Po kilkunastu dniach można zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko: na powierzchni owego kożuszka pojawiają się okrągłe, poduszczkowate zarodnie, zaś na ścianach naczynia tuż w kontakcie z pożywką powstaną wyłącznie tylko plazmodjokarpja. W wielu kulturach możemy obserwować formy przejściowe od zarodni okrągłych, poduszczkowatych, powstałych na powierzchni pożywki, do silnie spłaszczonych i rozgałęzionych plazmodjokarpjów, powstałych na ściankach naczynia. Mianowicie na granicy pożywki i ścianki naczynia powstają długie, dosięgające nieraz kilku centymetrów, sporangja, różniące się jednak od właściwych plazmodjokarpjów swą formą walcową. W starych kulturach, gdzie pożywka jest już zupełnie wyschnięta, można z całą dokładnością oznaczyć jej pierwotne granice, opierając się na układzie owych rozciągniętych zarodni. (Tabl. XII, fig. 3).

Plazmodjum *Didymium difforme*, gdy chodzi o kultury na podłożu naturalnem (zgniłe siano lub słoma w dużym szklanym krystalizatorze) nigdy nie wypełza, a przynajmniej w bardzo nieznacznym stopniu, na ścianki naczynia, w odróżnieniu od innych z nim współżyjących gatunków Śluzowców jak np. *Didymium nigripes* lub *Didym. squamulosum*. *Didymium difforme* wybiera dla owocowania najwilgotniejsze części tego samego podłoża, na którym zapoczątkował swój rozwój. *Didymium nigripes* owocuje na najwyższych częściach, sterzczących ponad powierzchnią płynu gniących źdźbeł słomy lub siana, natomiast *Didymium squamulosum* opuszcza całkowicie teren podłoża i wypełza wysoko na ściankę krystalizatora, by tam wyowocować. Możemy w pewnym momencie obserwować jego piękne plazmodja, posuwające się w szybkim dość tempie ku krawędzi krystalizatora i złatwością fotografować wszystkie jego fazy. Fakty te stanowią bardzo ważny przyczynek do ekologii Śluzowców, której poświęcam nieco więcej miejsca w mej pracy, dotyczącej Śluzowców ziem polskich (20).

Bez względu na formę ciała owocowego, błona jego jest podwójna: zewnętrzna szara, pokryta jest zwartymi kryształkami węglanu

wapnia, tworzącymi twardą skorupkę, wewnętrzna natomiast jest bezbarwna lub nieco fioletowa. Spodnia część błony jest silnie zgrubiała i elastyczna. Od niej odchodzą nitki włóśni, słabo rozgałęzione, grube w nasadzie (6–10 μ) i znacznie cieńsze i bezbarwne w zakończeniach (2–3 μ).

Ryc. 21. *Didymium difforme*. Włósnia (1–3), zarodniki (6), oraz kryształy węglanu wapnia (4–5) z zarodni powstałej w warunkach naturalnych. 4 — skorupa wapienna górnej części peridium, 5 — luźno rozmieszczone kryształy na spodniej części peridium ($\times 780$).

Didymium difforme. Capillitium (1–3), spores (6), cristaux de Carbonate de Ca (4–5) d'un sporange provenant du milieu naturel ($\times 780$).

Zarodniki sporangjów lub plazmodjokarpjów, pochodzących ze środowiska naturalnego, są kuliste, posiadają barwę brunatno-fioletową, pokryte są równomiernie rozmieszczonymi kolcami i mierzą od 12 do 14,4 μ średnicy. Każdy zarodnik zaopatrzony jest w bardzo charakterystyczne, czepeczkowatej formy wzniesienie, które odgraniczone jest od reszty błony przezroczystą, wąziutką smugą. Stanowi

ono rodzaj okienka, które podczas kiełkowania, kiedy zarodnik silnie napęcznieje, zostaje rozerwane, i przez które myksameba lub myksameby wydostają się na zewnątrz.

Przekonałem się, że *Didymium difforme*, hodowany od dłuższego czasu na pożywkach sztucznych, traci zupełnie, po dwunastu mniej więcej generacjach, zdolność do dalszego rozwoju. Zarodniki przestają całkowicie kiełkować i niczem ich do tego nie można zmusić, jakkolwiek towarzyszące im bakterje rozwijają się zupełnie dobrze. Inne dwa gatunki, *Didymium nigripes* i *Dyctyostelium mucoroides*, które hoduję w warunkach sztucznych od 1914 roku, dają mi dotychczas zadowalniające wyniki. Pierwsze czyste kultury *Didymium difforme* założyłem w 1921 roku i już w roku 1926 dalsze przeszczepianie stało się bezowocnem. To też, by móc w dalszym ciągu pracować nad tym gatunkiem, musiałem nanowo założyć czyste kultury z zarodni powstałych w środowisku naturalnem (na bu-
twiejącem sianie).

Pod wpływem różnych czynników fizyko-chemicznych, stosowanych w kulturach czystych, możemy wywołać dość znaczne zmiany związane z formą i wielkością zarodni i samych zarodników. Na agarze czystym, pozbawionym jakiegokolwiek domieszki, całkowity rozwój Śluzowca odbywa się zupełnie normalnie, co do czasu i ostatecznych wyników. Plazmodja w tym wypadku są daleko mniejsze i bledsze, niż w środowisku naturalnem. Wszystkie bez wyjątku zarodnie, w liczbie dość skromnej, posiadają formę okrągłą i poduszczkowatą; włośnia posiada strukturę delikatniejszą i zarodniki są znacznie mniejsze, bo osiągają zaledwie 11 μ średnicy, ale zato posiadają znacznie grubsze błony, niż zarodniki osobników, pochodzących ze środowiska naturalnego (14.4 μ).

Na agarze z 20⁰/₀₀ wywarem siana *Didymium difforme* zachowuje się bardzo ciekawie: O ile na samem sianie zarodnie są obfite i posiadają kształty nieregularne, to na tej pożywce są one nieliczne, bardzo małe i prawie wszystkie posiadają formę okrągłą. *Didymium nigripes* natomiast rozwija się na tej pożywce doskonale, zato *Dictyostelium mucoroides* daje bardzo nikłe rezultaty.

Jeśli rozsiejemy zarodniki wzięte z normalnych zarodni na agarze z dużą domieszką wyciągu marchwiowego (200 gr na litr pożywki) to nowo powstałe ciała owocowe będą nosiły w przeważnej części charakter silnie rozgałęzionych plazmodjokarpjów. Zarodniki tych ostatnich odznaczają się nadzwyczajną różnorodnością form. Najmniejsze będą zupełnie kuliste, inne nieco większe eliptyczne, inne wreszcie i to największe, pozbawione będą jakichkolwiek określonych

kształtów. Uderzy nas w danym wypadku skala wielkości zarodników. Obok maleńkich, mierzących zaledwie 7 μ zarodników, będą leżały wielkie bezkształtne zarodniki, mierzące do 25 μ . W tym wypadku błonki zarodników są bledsze, przezroczyste, daleko cieńsze od normalnych i, co najciekawsze, pozbawione są tych specjalnych kapturkowatych wzniesień, ułatwiających wydobywanie się masy plazmatycznej w momencie kiełkowania. Błony zarodników są w tym wypadku tak cienkie, że utrwalacze i barwniki z łatwością je przenikają i mogą wybarwić jądro, plazmę, oraz figurujące w niej organoidy. Barwa, obecność kolczastych utworów, rozmieszczonych na całej powierzchni zarodnika, dowodzą, że mamy tu do czynienia z błoną normalną zarodników.

Bezpośrednio na marchwi nie zdołałem otrzymać ciał owocowych żadnego z wyżej wymienionych gatunków, z wyjątkiem *Dictyostelium mucoroides*. Na tem podłożu silnie rozwinięte plazmodja *Didymium difforme* nie przekształcają się w normalne zarodnie, lecz tworzą tylko w dolnej części pożywki, tuż w sąsiedztwie z płynem, liczne skleroty. Jedna taka sklerota, przeniesiona na pożywkę uboższą w związki odżywcze np. na agar na 2⁰/₀ wyciągu siana, lub nawet na słabszym wyciągu marchwi (5⁰/₀), wydaje w krótkim stosunkowo czasie, dość bujne plazmodjum, które po kilku zaledwie dniach owocuje, dając dużą liczbę zarodni normalnych. Wychodząc z założenia, że na agarze na słabym wyciągu marchwi *Didymium difforme* (jak zresztą i *Didymium nigripes*) owocuje, postanowiłem, wzmacniając pożywkę przez dodawanie do agaru coraz to więcej skoncentrowanego wyciągu z marchwi, dojść stopniowo do czystej marchwi. Z kultury np. A, wyhodowanej na agarze z 5⁰/₀ wywarem marchwi, przenosiłem zarodniki do probówek, zawierających agar z silniejszym już wywarem marchwi (10⁰/₀). Na tem podłożu powstaje plazmodjum i odbywa się normalne owocowanie. W ten sposób powstała kultura B. W podobny sposób otrzymałem kultury C, D i t. d. na pożywkach, których koncentracja wywaru marchwiowego jest stopniowo zwiększana. Wreszcie przeszedłem do agaru na czystym soku marchwiowym i do samej tylko marchwi. Zarodniki, pochodzące ze stopniowo przeszczepianych zarodni na pożywki w coraz to silniejszej koncentracji soku marchwiowego, zwłaszcza z agaru na czystym soku marchwiowym, dają całkowity cykl rozwojowy, aż do ciał owocowych włącznie. Te ostatnie różnią się jednak mocno od tych, które powstały w warunkach naturalnych lub na agarze na wyciągu z siana lub nawet na agarze na słabym wyciągu marchwi. Posiadają one formę zlanych i bardzo silnie rozgałęzionych plazmodjokarpjów,

tak, że przypominają poniekąd formy owocowe *Didymium complanatum* (Rost.). Brak jest absolutny sporangiów okrągłych, poduszczkowatych (Tabl. XII, fig. 1).

Jak widzimy, *Didymium difforme* może się stopniowo przystosować do odmiennych warunków bytowania i utrwalić się w tych ostatnich, ale w mocno zmienionej postaci. Zarodniki takich ciał owocowych, przeniesione na świeże kawałki sterylizowanej marchwi, dają również formy owocowe podobne do form macierzystych. Najciekawszem jest to, że zarodniki, pochodzące od tych plazmodjokarpjalnych form owocowych, rozsiane na pożywkach agarowych z wyciągiem siana nie dają nijakich rezultatów.

Podobne zjawiska skonstatowałem i w rozwoju *Didymium nigripes*. Gatunek ten hodowany na pożywkach bogatszych w związki odżywcze, np. na agarze z wyciągiem marchwi daje bardzo obfite ciała owocowe, jednak różnej wielkości i różnej formy, i które mocno różnią się od ciał owocowych, powstałych na pożywce z wyciągiem siana lub na podłożu naturalnem (zgniłe siano, drzewo, liście). Sporangja są przysadziste, na b. krótkich trzonkach i mocno zbliżają się do form plazmodjokarpjalnych. Prócz tego daje się stwierdzić słaby rozwój powłoki wapiennej, a często nawet, przy użyciu mocnego ekstraktu marchwiowego, zupełny jej brak. W danym wypadku błony ciał owocowych łatwo pękają, bez udziału jakiegoś czynnika zewnętrznego uwalniają ciemno-brunatną masę zarodników, która rozplywa się ipo podłożu.

Na ziemniaku *Didymium difforme* (podobnie jak *Did. nigripes*) daje również tylko skleroty.

Na agarze z wyciągiem nawozu końskiego *Didymium difforme* daje bardzo dobre rezultaty: powstają bardzo liczne zarodnie, które w odróżnieniu od zarodni pochodzących z innych pożywek, są zupełnie okrągłe i ponadto silniej wypukłe. Brak jest zupełny form nieregularnych. *Didymium nigripes* rośnie bardzo słabo na tej pożywce, a *Dictyostelium mucoroides* zupełnie się nie rozwija.

Poznanie istoty tych zjawisk jest koniecznem dla zrozumienia całego szeregu faktów, spotykanych w środowisku naturalnem, w którym właśnie szukamy Śluzowców. Powszechnie jest wiadomem, że liczne gatunki tych organizmów mogą wykazywać często dość daleko posunięte różnice, pod względem formy, wielkości, struktury włóśni, wielkości zarodników i t. d. Często więc badacze tych organizmów (systematycy) biorą przedstawicieli jednego i tego samego gatunku, znajdujących w różnych środowiskach, za odmienne gatunki, a przynajmniej za różne odmiany tego samego gatunku.

To też korzystną, a nawet konieczną jest rzeczą poznanie biologicznych właściwości tych organizmów, wpływu różnych czynników na rozwój ich dla badań systematycznych. Jestem przekonany, że po uprzednim stosowaniu metody badań bio-cytologicznych do systematyki Śluzowców, szereg wątpliwych gatunków, a przede wszystkim odmian, musi zniknąć bezpowrotnie z tej ostatniej; z drugiej zaś strony liczne Śluzowce uważane dotychczas za odmiany tylko, będą wprowadzone do ogólnego systemu, jako niezależne gatunki.

Rola bakteryj.

Ważną rolę w rozwoju Śluzowca zdają się odgrywać bakterje. Pierwszym autorem, który w tej sprawie wypowiedział się zupełnie wyraźnie był Pinoy. Pozatem inni autorowie jak Nadson, Olive, Potts, Vaillemín również wypowiadali się w tej materji. Według Pinoy¹⁾ bakterje stanowią konieczny czynnik już od samego początku cyklu rozwojowego danego gatunku Śluzowca, bo przy procesie kiełkowania. Bez bakterji to ostatnie nie może mieć miejsca w żadnym wypadku. Autor na poparcie swego twierdzenia podaje kilka doświadczeń, które z punktu widzenia teoretycznego mogłyby być zaakceptowane, a które z punktu widzenia ścisłego eksperymentu są nie do przyjęcia. Mianowicie, Pinoy stara się przede wszystkim oddzielić zarodniki Śluzowca od bakterji, która z tym ostatnim współżyje i to mu się udaje dziwnie łatwo. Poza stosowaniem narkotyków jak eter, chloroform, stosuje on metodę nagrzewania. Do rurek szklanych, zawierających płyn odżywczy, przenosi zarodniki *Dictyostelium mucoroides* wraz z bakterjami *Bacterium fluorescens* Fl. i tego rodzaju kultury umieszcza w cieplarni, posiadającej dość wysoką temperaturę. Bakterja przy 35° C nie rozwija się, a przy 56° C jest zabita w ciągu 2 minut. W ten sposób uwolnione od bakterji zarodniki Śluzowca, przeniesione do pożywki właściwej nie kiełkują zupełnie, ale wykiełkują niezwłocznie po dodaniu im żywej bakterji.

Powtórzyłem bardzo skrupulatnie podane przez Pinoy doświadczenia z tym samym gatunkiem i doszedłem do wręcz przeciwnych wyników. Przekonałem się na wstępie, że bakterje, towarzyszące Śluzowcowi, są wyraźnie odporniejsze na wysokie temperatury, niż zarodniki tego ostatniego. W pracy mojej z roku 1920²⁾ podaję

¹⁾ Pinoy. Nécessité de la présence d'une Bactérie pour obtenir la culture des Myxomycètes. — Bull. Soc. Myc. de France, XVIII (1902).

²⁾ Skupieński, Fr. X. Recherches sur le cycle évolutif de certains Myxomycètes — Thèse. Paris (1920).

wyniki doświadczeń dla dwu gatunków Śluzowców, *Didymium nigripes* i *Dictyostelium mucoroides*. Dla pierwszego gatunku temperatura 50° C jest już w ciągu 1 godziny zabójczą dla zarodników, nie jest jednak zabójczą dla bakterji. Podobne doświadczenia przerobione z *Didymium difforme* dały mi identyczne rezultaty, jakkolwiek ten gatunek znosi wogóle łatwiej wysokie temperatury, niż dwa wyżej omawiane. Doszedłem do wniosku, że w doświadczeniach Pinoy musiał tkwić jakiś błąd, że mianowicie w bakterjach, których on dodawał do oczyszczonych przez ogrzanie zarodników, musiały się znajdować zarodniki tego samego gatunku Śluzowca; te właśnie przemycone zarodniki zdrowe i całe wykiełkowały, a Pinoy prawdopodobnie myślał, że wykiełkowały mu uprzednio wygrzewane (oczyszczone) zarodniki pod wpływem dodanych świeżych bakterji.

By ściśle określić stosunek Śluzowca do bakterji i rolę istotną jaką ta ostanía odgrywa w cyklu rozwojowym pierwszego, należy te dwa organizmy oddzielić zupełnie jeden od drugiego, a właściwiej mówiąc, uwolnić w jakikolwiek sposób Śluzowca od bakterji: należy otrzymać czyste jego kultury. Kiedy to zostanie z całą pewnością uskutecznione, wtedy można będzie mówić o istotnej roli bakterji w cyklu rozwojowym Śluzowców; że rola ta jest niepoślednią to widać już choćby z częściowych rezultatów, które otrzymałem w wyniku moich długoletnich badań nad temi organizmami. Nie dając się zasugerjować niepewnymi wynikami doświadczeń Pinoy, odróżniałem dwie kwestje:

a) Kwestję czynnego udziału bakterji w samym procesie kiełkowania.

b) Rolę bakterji w dalszych stadjach rozwoju Śluzowca, jako czynnika odżywczego.

Tacy badacze Śluzowców, jak Lister, Olive, Vuillemin twierdzą, że bakterje odgrywają jedynie rolę odżywczą. Pinoy natomiast stara się udowodnić, że bakterja jest nieodzownym czynnikiem, warunkującym proces kiełkowania zarodników danego Śluzowca. Nie mówi on jednak w jaki sposób owa bakterja przyczynia się do tego procesu. Czyż miałaby ona wytwarzać jakąś substancję, pobudzającą plazmę zarodnika do kiełkowania? Czy też rola jej sprowadzałaby się do bezpośredniego działania (chemicznego lub mechanicznego) na błonkę zarodnika i przez osłabienie lub nawet rozluźnienie takowej ułatwiałoby proces kiełkowania? O tem Pinoy nie mówi ani słowa. Wieloletnie moje badania, prowadzone w tym kierunku, utrwaliły mnie dostatecznie w przeświadczeniu, że bakterje nie są konieczne dla procesu kiełkowania; takowe jest wywołane zjawiskiem

pęcznienia. Odgrywają one natomiast bardzo ważną rolę w dalszych stadiach rozwoju.

By się przekonać o istotnej roli bakteryj w rozwoju Śluzowca uważałem za konieczne otrzymanie czystych jego kultur w ścisłym tego słowa znaczeniu. W doświadczeniach mających właśnie na celu odseparowanie kompletne Śluzowca od bakterji i otrzymanie pierwszego w czystej formie, muszą być przedsięwzięte nadzwyczajne środki ostrożności. Niszcząc bowiem bakterje należy pamiętać by nie zniszczyć zarodników Śluzowca. I dla tego doświadczenia Pinoy nie przemawiają mi absolutnie do przekonania. Stosowanie wysokich temperatur musi być wykluczone, narkotyków również, gdyż przy tego rodzaju doświadczeniach, są przedewszystkiem narażone zarodniki Śluzowca, a nie bakterje. Wydzielanie pojedynczych zarodników i wprowadzanie takowych do czystych pożywek prowadzi również do niczego i przy tego rodzaju operacjach bakterje mogą łatwo, nawet z pojedynczymi zarodnikami Śluzowca, przedostać się do pożywki. Każdy bowiem zarodnik może być wehikułem licznych bakteryj, które przyłączone są do jego kolców, albo mogą się mieścić w wakuolach w stanie zupełnie normalnym. Po wykiełkowaniu zarodnika bakterje mogą być bardzo łatwo wyrzucone na zewnątrz, do pożywki i w tej normalnie się rozwijać. Po długich i żmudnych badaniach, doszedłem do przekonania, że można jedynie osiągnąć jakiś pozytywny rezultat, na drodze stosowania pożywek t. zw. odnawianych (*vaccinés*).

Ze starej, jeden rok, naprzykład, mającej kultury czystej ¹⁾ i jeszcze wilgotnej *Didymium difforme* na agarze przenieśliem aseptycznie wszystkie zarodnie do wysterylizowanej próbówki. Poczem uwolnione od zarodni podłoże zalałem odpowiednią ilością wody i wstawiłem do aparatu Kocha. Po kilkudziesięciu minutach agar rozpuścił się, wszystkie zaś bakterje zostały dzięki sterylizacji zabite i opadły na dno naczynia. Po odfiltrowaniu, rozlałem go do kilku próbówek i kilkakrotnie przesterylizowałem. Do tak przygotowanych (odnowionych) pożywek wprowadziłem zarodniki, wzięte z tych zarodni, które przedtem wprowadziłem do wysterylizowanej próbówki. Do innych naczyń, zawierających również agar, ale świeży, na wyciągu z marchwi i ziemniaka, wprowadziłem również zarodniki wzięte z tych samych zarodni, a to w celu otrzymania kultur porównawczych. Pierwsze jak i drugie były trzymane w jednakowych warunkach, co do światła

¹⁾ Używam tu terminu „czysta“ dla kultury, która nie została zanieczyszczona pleśniakami.

i temperatury ¹⁾). Po kilkunastu godzinach daje się już zauważyć znaczne różnice w zachowaniu dwu tych seryj kultur: w kulturach na pożywkach świeżych płyn zebrany na dzień próbek jest wyraźnie zmaćony, co dowodzi intensywnego rozwoju bakterji, współżyjącej ze Śluzowcem. W kulturach natomiast powtórzonych t. j. na starym agarze przegotowanym płyn zebrany na dzień naczynia jest zupełnie przeźroczysty — co dowodzi bardzo słabego rozwoju bakterji. Próbkę płynów, wziętych z tych dwu serji kultur w dwanaście godzin po rozsianiu, badane pod mikroskopem, potwierdzają dobitnie obserwację makroskopową: na tem samym terytorjum odpowiadającym mniej więcej 25 μ kwadratowym płyn pierwszy wykazuje zwartą masę bakterji, wtedy kiedy płyn drugi wykazuje zupełną ich nieobecność. Jeśli chodzi o zarodniki Śluzowca to te kiełkują jednocześnie w dwu tych środowiskach, co mogłem stwierdzić zakładając kultury nasz kiełkach według zwykłej mojej metody. Kiełkowanie to odbywa się już w kilka godzin po wysianiu w temperaturze 18° C; kiełkuje jednakowy procent zarodników i z jednakową intensywnością w obydwu płynach. Brak zupełny bakterji nie wpływa absolutnie na normalny przebieg kiełkowania; da się on odczuć dopiero w późniejszych stadjach rozwoju. Na pożywkach świeżych plazmodja powstają już szóstego dnia po rozsianiu na całej powierzchni skośnie położonego agaru, rosną one szybko i wreszcie szóstego — siódmego dnia zlewają się w jedno duże, o żółtawem zabarwieniu plazmodjum. Owocowanie następuje w czternaście do szesnastu dni po rozsianiu zarodników. Inaczej rzecz się ma z kulturami odnowionymi. Plazmodja nikłe i przeźroczyste powstają w dziesięć do dwunastu dni po rozsianiu zarodników. Nie zlewają się one prawie wcale w jedno duże plazmodjum. Poszczególne plazmodja rosną słabo i po trzech tygodniach takiej wegetacji przekształcają się w mizerne, okrągłe i poduszeczkowate ciała owocowe. Widzimy więc, że bakterja zdaje się odgrywać bardzo ważną rolę w rozwoju Śluzowca, nie jako czynnik stymulujący proces kiełkowania, ale jako pożywka.

Metoda stosowania kultur odnowionych, jakkolwiek wyjaśnia nam już bardzo wiele nie doprowadza jednakże do pewnych i decydujących wyników. Rozwój bakterji jest w tych kulturach jedynie tylko silnie zahamowany. A chodzi przecież o to, by bakterje były zupełnie usunięte od współudziału w rozwoju Śluzowca.

Cel ten zdołałem osiągnąć całkowicie drogą następujących doświadczeń.

¹⁾ Temperatura pokojowa, której średnia wynosiła mniej więcej 18° C.

Do trzydziestu probówek jednakowej długości i o jednakowej średnicy (30 cm $\times$ 2 cm), zawierających pożywkę agarową na rosole z marchwi i kartofla (10%) rozsiałem zarodniki *Didymium diffforme* wzięte ze sporangjów starej kultury, liczącej blisko cztery lata. Kultury te trzymane były w temperaturze pokojowej, której średnia wynosiła mniejwięcej 18° C. Próbkę płynu, zebranego na dnie probówek, badane pod mikroskopem, co dwanaście godzin po rozsianiu zarodników, wykazują stale zupełną nieobecność bakterji, natomiast w 70% kultur zarodniki Śluzowca zaczynają po 12 już godzinach kiełkować. Płyn osadzony na dnie wszystkich probówek będzie przezroczysty, kiedy taki sam płyn po wprowadzeniu do pożywki zarodników ze świeżo powstałych zarodni, jest całkowicie zmaćcony i posiada zabarwienie mleczne. Widzimy więc, że zarodniki nie potrzebują absolutnie współudziału bakterji dla procesu kiełkowania, to ostatnie polega przeważająco na zjawiskach pęcznienia. Po czteroletniem trwaniu w stanie zupełnie suchym, bakterje tracą swą żywotność; toteż nie mogą one w jakolwiek sposób wywierać bezpośredniego, ani nawet pośredniego wpływu na kiełkujące zarodniki Śluzowca. Zupełny zanik bakteryj odbija się ujemnie na dalszych stadjach rozwojowych samego Śluzowca. Stwierdzam, że o ile współudział bakterji w procesie kiełkowania zarodników Śluzowca nie jest konieczny, to koniecznym on jest w dalszych stadjach rozwojowych. By o tem dokładnie się przekonać, do pięćdziesięciu probówek, zawierających agar na 10% wyciągu z marchwi i kartofla, wprowadziłem zarodniki z wyżej już wspomnianych zarodni wysuszonych, posiadających cztery lata. Wszystkie kultury trzymane były w jednakowych warunkach, co do światła i temperatury (średnia, pokojowa wynosiła 18° C). Po kilkunastu dniach od daty rozsiania, zaczynają się ukazywać, na całej powierzchni pożywki, plazmodja różnej wielkości i różnych kształtów, a tak są nikłe i przezroczyste, że łatwo uchodzą uwagi nieprawego oka. Dzieje się to pomimo, jak widzieliśmy wyżej, zupełnego braku bakteryj: że ten właśnie brak bakteryj, a nie inne jakieś czynniki, wpływa ujemnie na dalsze stadj rozwoju Śluzowca, wykazuje szereg następujących doświadczeń. Wyżej wspomniane kultury po ukazaniu się pierwszych plazmodjów podzielone zostały na sześć grup.

Kultury pierwszej grupy zostały bez zmiany, jako porównawcze.

Do każdej kultury drugiej grupy zostały wprowadzone żywe bakterje, te mianowicie, które w środowisku naturalnem występują wspólnie ze Śluzowcem (zbliżony do gatunku *B. vulgaris*). Bakterje te zostały przedtem wydzielone i hodowane na takiej samej pożywce

na jakiej hodowanym był Śluzowiec (agar na 10⁰/o wyciągu z marchwi i kartofla).

Do każdej kultury trzeciej grupy wprowadziłem *Bact. prodigiosum*.

Do każdej kultury czwartej grupy wprowadziłem Sarcynę żółtą — *Sarcina lutea*.

Do każdej kultury piątej grupy wprowadziłem drożdże z gatunku *Torula glutinis* Prings. et Bil. (*Saccharomyces glutinis* Cohn).

Do kultur szóstej grupy wprowadziłem zarodniki *Aspergillus glaucus*.

Po kilku zaledwie dniach mogłem obserwować nadzwyczaj wyraźne i bardzo ciekawe zmiany jakim uległy kultury poszczególnych grup. Kultury grupy drugiej, to jest te, do których wprowadziłem bakterję współżyjącą w warunkach naturalnych ze Śluzowcem, wykazują wszystkie, po trzech już dniach, gwałtowne ożywienie się poszczególnych plazmodjów. Te ostatnie w szybkim tempie zbliżają się ku kolonii bakterji, która została umieszczona na środku pożywki agarowej i otaczają ją zwartym pierścieniem. Po trzech następnych dniach nie widać zupełnie maleńkich plazmodjów, te ostatnie po odkarmieniu się, łączą się w jedno duże i silnie rozgałęzione plazmodjum, które pełza po całej powierzchni pożywki.

Plazmodja te w krótkim czasie, bo po mniej więcej 13 dniach od dodania bakterji przekształcają się w bardzo liczne i różnokształtne ciała owocowe. Mamy tu cały szereg form przejściowych: począwszy od zupełnie okrągłych i o normalnej budowie sporangjów, aż do rozgałęzionych plazmodjokarpjów. Inne zupełnie wyniki otrzymałem w kulturach trzeciej grupy, do których wprowadziłem *Bact. prodigiosum*. Tu również nikłe przedtem plazmodja zbiegają się do kolonii bakterji, lecz nie tak wyraźnie jak w wypadku poprzednim; powstanie jednego dużego plazmodjum odbywa się daleko później i jest ono, pomimo dobrze rozwijających się bakterji, mizerne, słabo rozgałęzione, a proces owocowania odbywa się daleko później, niż w kulturach poprzednio omawianych, bo dopiero w trzy tygodnie po dodaniu bakterji. Wszystkie bez wyjątku ciała owocowe, rozrzucone po całej powierzchni pożywki są bardzo drobne i posiadają formę okrągłą, wtedy gdy ciała owocowe poprzedniej grupy kultur są, jak widzieliśmy, różnokształtne. Pod względem struktury wewnętrznej występują tu bardzo głębokie i niezmiernie ciekawe zmiany, przedewszystkiem w budowie zarodników i włośni. Mamy tu całą gamę zarodników tak pod względem wielkości, jak i pod względem form. Najmniejsze zarodniki, odpowiadające wielkością i formą zarodnikom osobników ze środowiska naturalnego, mierzą od 13 do 14 mikronów i są zupełnie kuliste. Większość natomiast zarodników

posiada formy niekształtne: maczugowate, węzowate, mocno pokarbowane lub poskręcane. Wielkość ich waha się od 18 do 60 mikronów. Występują tu również i zarodniki zrośnięte: po dwa trzy, a niekiedy i po cztery i po pięć. Pod tym względem mamy tu cały szereg przejść od form zaledwie częściowo przewężonych, aż do form zupełnie rozczłonkowanych, spojonych tylko błonami.

Ryc. 22. *Didymium difforme* hodowany w połączeniu z *Bact. prodigiosum* 1—4 fragmenty włóśni, w nitkach której powstały kryształy węgl. wapnia; 5—7 zarodniki kuliste; 8—11 potwory, wewnątrz których widać zanikanie protoplazmy i powstawanie kryształów węglanu wapnia; 12—14 kryształy węglanu wapnia, wchodzące w skład peridjum ($\times 780$).

Didymium difforme cultivé avec *Bact. prodigiosum*. 1—4 fragments de capillitium, présentant des cristaux de Carb. de Ca; 5—7 spores sphériques; 8—11 monstruosités dans lesquelles on voit la dégénérescence du protoplasme et l'apparition de cristaux de Carb. de Ca; 12—14 cristaux de Carb. de Ca, de la paroi du sporange ($\times 780$).

Bardzo ważnym szczegółem jest nieobecność ani u zarodników normalnie ukształtowanych ani u form zmienionych wieczek o półksiężycowatej formie, tak charakterystycznych dla zarodników z za-

rodni powstałych w środowisku naturalnem. Poza tem wszystkie bez wyjątku zarodniki są zupełnie gładkie, wtedy, gdy zarodniki ze środowiska naturalnego pokryte są dokoła wyraźnymi kolcami.

Pod względem budowy włóśni, zachodzą tu również poważne zmiany, pozwalające na wyprowadzenie daleko idących wniosków, co do jej genezy. Gdy porównujemy poszczególne elementy włóśni z poprzerastaniami elementami zarodnikowemi, to łatwo możemy doszukać się wiele wspólnych cech, możemy ustawić w jeden szereg wszystkie stadja przejściowe od zarodnika normalnego, aż do kompletnie ukonstytuowanej włóśni. Co mnie właśnie uderzyło, to obecność dość znacznych węzłów we włóśni, a w węzłach tych obecność kryształów węglanu wapnia. Te ostatnie mogą występować również i na całej długości nitki włóśni, zwłaszcza w podstawowej jej części. Ta ostatnia jest znacznej grubości, silnie obłoniona, przypominając mocno węzowato wyrosnięte zarodniki. Wiemy przecież, że włóśnia normalnie utworzonej zarodni *Didymium difforme* nie zawiera śladu węglanu wapnia ani w formie krystalicznej, ani w formie bezpostaciowej.

Uderzającym jest również fakt tworzenia się kryształów lub kulek węglanu wapnia w potwornych zarodnikach. Można z łatwością zaobserwować stopień powstawania tych kryształów w zależności od stopnia modyfikacji zarodnika. Mniejsze potwory wykazują wszelkie cechy zarodników normalnych, można jednak widzieć w nich kryształki lub kuleczki węglanu wapnia. W miarę tego, jak od tych ostatnich przechodzimy do potworów w całym tego słowa znaczeniu, widzimy u jednych częściowy zanik plazmy i obecność licznych dużych kryształów węglanu wapnia, u innych zupełny zanik plazmy, a obecność samych tylko kryształów, na podobieństwo tego cośmy mieli w nitkach włóśni.

Powyższe fakty wyraźnie mówią o wpływie bezpośrednim bakterji *B. prodigiosum* nie tylko na sposób zachowania się plazmodjum w okresie wegetacji, ale również na strukturę samego ciała owocowego. Te szczegóły stanowią bardzo poważny przyczynek do ekologii *Didymium difforme* w szczególności, jak i wogóle wszystkich innych Śluzowców.

Wstrzymuję się na razie od wypowiedzenia mej opinji, co do istotnego charakteru tak głębokich zmian w strukturze zarodni. Ograniczę się na razie do stwierdzenia faktu, że pewne czynniki biologiczne mogą spowodować zmiany teratologiczne w ustroju danego organizmu. Twierdzić, że owe monstrualne formy zarodników to nic innego, jak niedokształcone sznury włóśni, byłoby na razie

może zbyt ryzykownem. Dalsze badania prowadzone w tym kierunku, mogą rzucić więcej światła na dane zagadnienie i doprowadzić nas do bardzo ciekawych wyników.

Kultury, do których wprowadziłem Sarcynę żółtą (*S. lutea*), dają inne zupełnie rezultaty, niż kultury wraz z *Bacterium prodigiosum*.

Po wprowadzeniu większej ilości tej bakterji, zgarniętej z kultury czystej i po umieszczeniu jej w samym środku podłoża kultury (agar), marne i wegetujące dotychczas plazmodja schodzą się do tej ostatniej w dość szybkim tempie. Po dwu już dniach można z łatwością obserwować pod lupą, a nawet i gołym okiem, jak kolonja bakterji otoczona jest zwartym pierścieniem pojedynczych plazmodjów, która łączy się stopniowo w jedno duże, silnie rozgałęzione i zabarwione na żółto plazmodjum. Plazmodjum owo w tajemniczy dotychczas sposób rozpuszcza dokoła kolonji bakterji agar, wnika i zużywa go na dość znaczną głębokość tak, że kolonja ta zapada się stopniowo w bezkształtną jamę i tam jest doszczętnie zniszczona. Po spożyciu wszystkich bakterji — po których w następstwie niema najmniejszego śladu (makroskopowo) — plazmodjum przechodzi na inne miejsce podłoża agarowego i, jeżeli napotka podobną kolonję, załatwia się z nią w identyczny sposób. Podobną operację można powtórzyć kilkakrotnie, z jednakowym zawsze skutkiem. Zaopatrzone w ten sposób plazmodjum rośnie znakomicie i po pewnym czasie owocuje. Stwierdziłem, że owocowanie odbywa się po należytem odkarmieniu plazmodjum. W kulturach, które otrzymały mniejszą ilość bakterji, proces owocowania nie odbywa się wcale, albo przynajmniej jest mocno opóźniony, pomimo wyraźnego wzrostu plazmodjum.

Ciała owocowe różnią się wyraźnie od tych, które powstały w kulturach wraz z *B. prodigiosum* tak pod względem form zewnętrznych, jak również i budowy wewnętrznej. Tam mieliśmy ciała owocowe wszystkie bez wyjątku okrągłe, poduszczkowate, tu zaś są one różnokształtne począwszy od sporangjów okrągłych i poduszczkowatych, aż do nieregularnych plazmodjokarpjów, na podobieństwo tego, co jest w kulturach w środowisku naturalnem.

Włósnia dość silnie rozwinięta, utworzona jest z nitek o nierównej powierzchni, które u podstawy są grube (15 μ) i o zabarwieniu brązowawem; szczytowe części tych ostatnich są cieniutkie (4—5 μ), bezbarwne i rozgałęzione. Nitki włóśni nie wykazują w danym wypadku śladu kryształów węglanu wapnia.

Zarodniki są różnej wielkości (od 12 μ do 18 μ) jednak prawie wszystkie kuliste i obdarzone bardzo słabymi brodaweczkami. Tak jak i w wypadku poprzednim, pozbawione są one zupełnie półksię-

życowych wieczek, jakie widzimy i u zarodników powstałych w zarodniach w środowisku naturalnym. Posiadają błonki bardzo cieniutkie o zabarwieniu jasnobrunatnem.

Pewien odsetek zarodników wykazuje częściową zmianę kształtów: widzimy tu formy zazwyczaj wydłużone, a zrzadka formy zrośnięte z dwu, trzech lub czterech osobników.

Bardzo charakterystyczną jest budowa skorupy wapiennej. O ile w kulturach wraz z *B. prodigiosum* widać wyraźnie poszczególne kryształki, wchodzące w skład skorupy i tak charakterystyczne dla rodzaju *Didymium*, to w obecnym wypadku skorupa ta jest zupełnie różna. Poszczególne elementy wchodzące w jej skład, są pozbawione zdecydowanych form krystalicznych, mamy tu bryłki kuleczkowate, poligonalne lub bezkształtne, a nawet formy zupełnie rozgałęzione lub przecinkowate.

W kulturach, do których wprowadzone zostały drożdże (*Torula glutinis*), całkowity rozwój Śluzowca odbywa się najslabiej i trwa najdłużej.

Plazmodja powstają w dzień dopiero dni po wprowadzeniu kolonii drożdży i są słabiej rozwinięte, niż w kulturach poprzednich. Są one blade, słabo rozgałęzione, rozstrzelone po całej powierzchni pożywki, i nie łączą się w jedno duże plazmodjum.

Owocowanie rozpoczyna się po 25—40 dniach, po wprowadzeniu drożdży i może trwać do

trzech tygodni. Ciała owocowe są nieliczne i wszystkie bez wyjątku okrągłe i mocno spłaszczone. Powstają one przeważnie na samej pożywce i wyjątkowo tylko tworzą się na ścianie naczynia.

Zarodniki wykazują bardzo silne zróżnicowanie, najmniejsze mierzą

Ryc. 23. Fragment włośni (1); zarodniki (2 i 3), oraz kryształki węglanu wapnia *Didymium difforme*, hodowanego wraz z sarcyną (*Sarcina lutea*) ($\times 780$).

Fragment de capillitium (1); spores (2 et 3), cristaux de Carb. de Ca du *Didymium difforme*, cultivé avec *Sarcine* jaune (*Sarcina lutea*) ($\times 780$).

10 μ , a największe 35 μ . Pomędzy temi ostatniemi spotykamy jedynie tylko formy zniekształcone, których jednak nie można zaliczyć do kategorii potworności i procent których jest stosunkowo niski. Widzimy tu formy wydłużone, nieco wklęsłe, przypominające ziarna fasoli, eliptyczne, oraz złożone z dwu lub trzech jednostek zazwyczaj niejednakowej wielkości. Co zasługuje na szczególniejszą uwagę, to

zanik u tych zmienionych form zarodnikowych protoplazmy, a powstanie na jej miejscu kryształów lub ziaren węglań wapnia. Można obserwować stopniowy zanik protoplazmy i tworzenie się owych koncentracji wapiennych.

Zasługuje tu również na uwagę fakt występowania u całego szeregu zarodników półksiężycowatych wieczek, które znamionują zarodniki ze środowiska naturalnego, a których dało się zaobserwować zupełny brak u zarodników z kultur wraz z *Sarcyną* lub *B. prodigiosum*.

Włóśnia utworzona jest z silnie rozwiniętych i różnej długości nitek. Podstawowa część każdej nitki jest znacznej grubości i zabarwiona jest na brązowo, podobnie jak zarodniki. W połowie mniej więcej swej długości, zwęża się ona dość gwałtownie, przechodząc w cieką i bezbarwną rurkę, która mocno się rozgałęzia na końcach. Bardzo często w tej właśnie szczytowej części nitki, występują węzłki, w których mieści się po jednej lub po dwie kuleczki węglań wapnia.

Powłoka wapienna utworzona jest z bardzo maleńkich i bardzo mocno zwartych igiełkowatych kryształików węglań wapnia, które u podstawy ciała owocowego przechodzą w duże kryształy o formie

Ryc. 24. *Didymium difforme*, hodowany w połączeniu z *Torula glutinis* (Prings. et Bil). 1—2 Fragmenty włóśni, z których jeden zawiera kryształy węglań wapnia; 3—4 różne formy zarodników; 5 — zarodniki, w których protoplazma zanikła i potworzyły się kryształy lub kuleczki węglań wapnia; 6 — kryształy węglań wapnia peridium ($\times 780$).

Didymium difforme, cultivé avec *Torula glutinis*. 1—2 Fragments du capillitium dont un de ces fragments contient des cristaux de Carb. de Ca; 3—4 différentes formes de spores; 5 spores dont le protoplasme a disparu et a été remplacé par des cristaux ou granules de Carb. de Ca; 6 — cristaux de Carb. de Ca du peridium ($\times 780$).

heksagonalnej lub w konkrekcje, nie posiadające ściśle określonych form krystalicznych (Ryc. 24),

Kultury, do których został wprowadzony *Aspergillus* dają nie mniej ciekawe rezultaty. Zarodniki tego grzyba, umieszczone na pożywce bardzo szybko kiełkują i po kilku dniach tworzy się zwarta grzybnia, która dość w szybkim tempie zajmuje całą powierzchnię pożywki agarowej, nie przeszkadzając zupełnie rozwojowi Śluzowca. Plazmodja tego ostatniego początkowo słabo zarysowane, po krótkim okresie wspólnego bytowania z grzybem, wzmagają się i opanowują całkowicie tego ostatniego. Plazmodjum, powstałe ze zlania się poszczególnych drobnych plazmodjów, rozpościera się na całej szerokości pożywki, porośniętej trzępkami grzyba, i, jak fala niszcząca, zmiata z niej wszystkie wystające na powierzchni trzępki i zarodniki tego ostatniego. Po kilku już dniach takiego marszu, plazmodjum silnie rozwinęte i dobrze odżywione, owocuje. Proces owocowania odbywa się częściowo na powierzchni pożywki, na szczątkach grzyba, częściowo na ścianie naczynia. Ciała owocowe, w jednym jak i w drugim wypadku są do siebie podobne tak pod względem formy zewnętrznej, jak też i pod względem budowy wewnętrznej. Rozróżniamy tu zupełnie okrągłe i poduszeczkowate sporangja, a obok nich różnokształtne i silnie rozwinęte formy plazmodjokarpalne. Pod względem wyglądu zewnętrznego ciała owocowe powstałe w tych warunkach prawie wcale nie różnią się od tych, które powstają w środowisku naturalnem, np. na butwiejącem sianie.

Pod względem budowy wewnętrznej mamy tu znowu kilka niezmiernie ciekawych szczegółów, które wyraźnie przemawiają za ważnością wpływu czynników ubocznych na ustrój ciał owocowych Śluzowca.

Uderza nas przedewszystkiem budowa włóśni. Nitki jej długości do 150 mikronów, są zupełnie niezależne jedna od drugiej tak jak u osobników ze środowiska naturalnego. Każda nitka składa się z dwu jakby członów: w dolnej swej części jest bardzo gruba i błona tej części posiada zabarwienie brązowe, na podobieństwo błony zarodników. Część ta przechodzi ku górze, (począwszy od połowy długości) dość gwałtownie, w cienką, przezroczystą, bezbarwną nitkę, która ulega w większości wypadków dość silnemu rozgałęzieniu. Każda z nitek wyładowana jest przeważnie w grupszej swej części, bardzo licznymi bryłkami węglanu wapnia, z których niektóre przybierają postać krystaliczną. W licznych nitkach zamiast poszczególnych bryłek lub kryształików, występuje jedna jedyna bryła, wypełniająca

całkowicie wewnątrz dolnej ich połowy. Rzadziej można zaobserwować obecność tego rodzaju konkrecyj i w górnych, zwężonych częściach nitek włóśni.

Zarodniki są różnej wielkości i różnej formy. Przeważają mniejsze (11—14 mikronów) i zupełnie kuliste zarodniki, brak jest natomiast zupełny potworów. Występuje tu jedynie znikomym procentem wielkich zarodników, posiadających formy fasolowate, eliptyczne lub nawet

stożkowate. Wszystkie zarodniki z wyjątkiem tych ostatnich, obdarzone są wieczkami, które występują z reguły u zarodników powstałych w warunkach naturalnych. Wszystkie bez wyjątku zarodniki pokryte są słabo rozwiniętymi kolcami.

Gdy wprowadziłem zarodniki z wyżej opisanych zarodni na świeżą pożywkę o takim samym składzie jak dla kultur poprzednich, przenosząc rzecz oczywista, i resztki pozostałych strzępek grzyba, ten ostatni nie rozwinął się zupełnie, natomiast *Śluzowiec* przeszedł normalnie przez wszystkie stadia rozwojowe, aż do normalnie ukształtowanych zarodni włącznie. Różnią się one dość znacznie pod względem form zewnętrznych, jak również i pod względem struktury wewnętrznej od tych, które powstały na pożywce porośniętej grzybem. Zarodnie te są mniejsze, regularniejsze i brak tu jest form plazmodjokarpialnych. Zarodniki różnią się również mocno od poprzednich: są one prawie wszystkie jednakowej wielkości i po-

Ryc. 25. *Didymium difforme*, hodowany w połączeniu z *Aspergillus glaucus*. 1—2 fragmenty włóśni zawierające silnie rozwinięte kryształy węglanu wapnia; 3 — zarodniki ($\times 780$).

Didymium difforme cultivé avec *Aspergillus glaucus*. 1—2 fragments de capillitium contenant des cristaux de Carb. de Ca fortement développés; 3 — Spores. ($\times 780$).

siadają silniej rozwinięte kolce. Nitki włóśni nie wykazują takich silnych zgrubień w dolnych ich częściach i zawierają daleko mniej konkrecyj węglanu wapnia.

Daje się jednym słowem zaobserwować powrót w nowych warunkach t. j. przy nieobecności zniszczonego kompletnie grzyba, do form normalnych t. j. takich, które występują na pożywce zupełnie czystej.

Poznanie tych faktów ma, powtarzam¹⁾, bardzo duże znaczenie dla badań systematyczno-ekologicznych nad Śluzowcami. Ustalenie jakiejś formy gatunkowej musi być oparte na ścisłych badaniach natury biologicznej. Nieuwzględnianie tych ostatnich przez mykologów-systematyków wywołuje liczne rozdziewki i nieporozumienia w ustalaniu gatunków i odmian.

Naprzykład w najnowszym swem wydaniu Monografji Śluzowców²⁾ G. Lister podaje nową odmianę dla gatunku *Didymium difforme*, mianowicie *var. rapandum* G. Lister. Przytaczam tu całkowicie tekst diagnozy podanej przez autorkę (str. 110): „Plasmodiocarps broads or sinuous, or forming a flat perforated plate. Capillitium as in the typical form, but with tubular or funnel-shaped ingrowths connecting the roof with the floor of the sporangium often present. Spores 14 to 15 μ “.

Często w kulturach moich otrzymuję tego rodzaju plazmodjokarpy o nieregularnych konturach, spłaszczone i niekiedy silnie rozgałęzione. Często w tych samych kulturach otrzymują ciała owocowe (plazmodjokarpy) o włośni mocno zmienionej o lejkowatych właśnie zakończeniach. Często również owe ciała owocowe zawierają zarodniki mocno różniące się od zarodników typowych tak pod względem wielkości, jak formy i całkowitej struktury.

Ale z badań moich wynika, że te głębokie zmiany w całkowitej strukturze ciała owocowego są wywołane czynnikami ubocznymi: zmianą pożywki lub zmianą temperatury. Stwierdziłem, że zmiany te są przejściowe, że jeżeli zarodniki tak zmienionych form zostaną ponownie rozsiane na pożywce, której skład będzie odpowiadał składowi środowiska naturalnego, lub kiedy kultury zostaną umieszczone w temperaturze normalnej, to powstaną ciała owocowe o zupełnie normalnej budowie t. j. odpowiadające typowym sporangjom *Didymium difforme*.

Nie można wobec tego wyprowadzić z powyższych faktów zbyt daleko idących wniosków i uważać zmienione postacie ciał owocowych za nową odmianę danego gatunku.

¹⁾ Skupieński, F. X. Contribution à l'étude des Myxomycètes en Pologne. Bull. de la Soc. Mycol. de France 1926.

²⁾ Lister, A. Monograph of the Mycetozoa, third edition revised by Gulielma Lister, London (1925).

Jasne jest, że p. Lister miała do czynienia — jak to wyraźnie widać z jej diagnozy — z ciałami owocowymi *Didymium difforme*, mocno zmienionymi pod wpływem chwilo we go działania jakiegoś ubocznego czynnika i na tak kruchej podstawie stworzyła nową odmianę.

Mógłbym wyliczyć więcej podobnych faktów, lecz ramy niniejszej pracy na to mi nie pozwalają.

Oddawna już w trakcie moich badań, stwierdziłem, że plazmodja *Didymium difforme*, pozostawiają ślady, jakby lekkie odciski w podłożu agarowym, na którym przechodziły cykl rozwojowy. Ślady te są dość głębokie i zupełnie widoczne gołym okiem. Daje się to zwłaszcza dokładnie zaobserwować wtedy, gdy zakładamy kulturę z zarodników pochodzących ze starych, od kilku lat przechowanych zarodni, w których bakterje, współżyjące ze Śluzowcem, całkowicie zamarły. W świeżo założonych kulturach, bakterje, jak już wspomniałem wyżej, nie wykazują żadnej żywotności i powierzchnia pożywki agarowej jest od nich zupełnie wolna (połyskująca), a woda zebrana na dnie pożywki jest całkowicie przezroczysta.

Powstające plazmodja w takich właśnie kulturach wypełniają na powierzchnię pożywki agarowej i wtedy można z całą dokładnością obserwować ich ruchy i wyżłabianie wyżej wspomnianych śladów. W kulturach normalnych, t. j. gdy rozwojowi Śluzowca towarzyszą normalnie rozwijające się bakterje, kiedy mianowicie cała powierzchnia pożywki jest całkowicie niemi pokryta, wyżłobień tych dobrze nie widać.

Z wyżej opisanych doświadczeń wynika, że w kulturach, w których niema należytego rozwoju bakteryj, Śluzowiec nie jest w możności przejść całkowitego cyklu rozwojowego do owocowania włącznie. Plazmodja jego błędzą, żywią się wprawdzie rozpuszczonem podłożem, lecz z powodu braku bakteryj — nie osiągają ostatecznego ich stopnia rozwoju. Stan taki może trwać tygodnie, miesiące nawet, a wiemy, że w warunkach normalnych cykl rozwojowy *Didymium difforme* trwa od 10 dni do 3-ch tygodni.

Wynikałoby z tego, że bakterja jest tym właśnie czynnikiem, bez którego Śluzowiec nie jest w możności przejść normalnego cyklu rozwojowego.

Zagadnienie roli bakteryj w cyklu rozwojowym tych organizmów było już, jak to zaznaczyłem na początku tej pracy, kilkakrotnie podnoszone przez szereg badaczy. Najgruntowniej potraktował ją, jak już zaznaczyłem wyżej, Pinoy.

O stosunku moim do stanowiska Pinoy, wypowiedziałem się

w jednej z poprzednich moich prac¹⁾, jak również i na początku niniejszej pracy i wyprowadziłem wniosek, że sam akt kiełkowania zarodników jest niezależny zupełnie od bakterji; te ostatnie odgrywają wprawdzie bardzo ważną rolę w rozwoju Śluzowca, ale jedynie jako pożywka. Że tak jest istotnie, dowodzą wyżej omawiane doświadczenia, polegające na wprowadzeniu do kultur, pozbawionych aktywnych bakterji, innych jakichś organizmów, jak drożdży, pleśniowców lub innych gatunków bakterji niż te, które współżyją w warunkach normalnych z *Didymium difforme*. Kultura np., która od szeregu miesięcy nie wykazuje żadnego prawie rozwoju, po wprowadzeniu do niej drożdży lub pleśniowca daje bardzo dobre rezultaty: nikłe i bardzo słabe plazmodja rosną szybko, zlewają się większe plazmodja i wreszcie owocują.

Wynikałoby z tych doświadczeń, że bakterje niekoniecznie są potrzebne dla rozwoju Śluzowca i mogą być całkiem zastąpione przez inne organizmy.

Stwierdziłem również w trakcie tych doświadczeń rzecz ważną, mianowicie, że plazmodja w obecności czy to bakterji, czy pleśniowców, rozpuszczają podłoże agarowe w większym stopniu niż wtedy, gdy żyją same na podobnej pożywce. Owo rozpuszczanie i pożeranie podłoża nie odbywa się w jednakowym stopniu ze wszystkimi wyżej wymienionymi mikroorganizmami. Np. z *Bacterium prodigiosum* i drożdżami jest ono bardzo słabe, prawie niewidoczne, ale daje się jednocześnie stwierdzić, że w tych kulturach ciała owocowe są słabo rozwinięte i wykazują, jak widzieliśmy wyżej, liczne i głębokie zmiany pod względem struktury wewnętrznej.

W celu należytego zilustrowania tego ciekawego zjawiska należy w odpowiedni sposób rozmieścić na powierzchni pożywki agarowej, wyżej wzmiankowane mikro-organizmy. Kolonję np. Sarcyny, wprowadzoną z czystej kultury na kartoflu, umieszczałem w części górnej pożywki agarowej zdala od wody zebranej na dnie naczynia, unikając w ten sposób rozprowadzenia bakterji po całej jej powierzchni. W kilkanaście godzin potem, liczne maleńkie plazmodja zbierały się dokoła kolonji zwartym pierścieniem i rozpoczęły ją zjadać. Zauważyłem, że akcja plazmodjum nie sprowadzała się jedynie do niszczenia kolonji bakterji, ale wyraziła się jednocześnie w tworzeniu w samym podłożu brzozy otaczającej tę ostatnią. Owa brzoza tworząca zamknięte koło, powiększała swą średnicę, jak również rosła i wgłęb.

¹⁾ Skupieński, F. X. Sur le cycle évolutif de certains Myxomycètes. — Paris, 1920.

Po kilku dniach powstała głęboka kotlina, sięgająca wyraźnie aż do samej ścianki naczynia, w środku której sterczał jeszcze słupek agar z resztkami kolonii bakterij na jego szczycie. Ale i ten ostatni po kilku jeszcze dniach został kompletnie zniesiony (Tabl. XIV, fig. 1).

Jednem słowem, po pierwotnej kolonii *Sarcyny* nie pozostaje śladu; na jej miejscu występuje jedynie tylko głęboki otwór. Średnica tego ostatniego jest daleko większa od średnicy pierwotnej kolonii bakteryjnej.

Plazmodjum nie opuszcza swego żerowiska ani na chwilę dopóty, dopóki wszystko nie zostanie zniszczone. O ile kolonja bakterij

Ryc. 26. Schematy, przedstawiające stopniowe rozpuszczanie pożywki agarowej przez plazmodja *Didymium difforme* dokoła kolonii bakteryjnej (*Sarcina lutea*). a — pożywka agarowa; b — kolonja bakterij.

Croquis représentant la liquéfaction progressive de la gélose par les plasmodes du *Didymium difforme*, autour d'une colonie bactérienne (*Sarcina lutea*). a — gélose; b — colonie bactérienne.

była dość wielka, to po jej zniszczeniu plazmodjum może w głębi wytworzonej przez siebie kotliny owocować. O ile nie, to wypelza na powierzchnię agaru i jakkolwiek już odżywione i silniej rozwinięte, nie jest jeszcze w możliwości owocować. Jeżeli dopiero napotka świeżą kolonję bakterij, to po całkowitem, a czasem tylko częściowem jej zniszczeniu zdolne jest do wyowocowania. Widać z tego wyraźnie, że dojrzewanie plazmodjum i jego zdolność do owocowania jest w ścisłym związku z jakością i ilością pożywki, jakiej mu dostarczamy.

To samo zjawisko, w nieco odmiennej formie mogłem zaobserwować, wprowadzając do kultur kolonję bakterji zbliżonej do *B. vulgaris* (tę, która w normalnych warunkach współżyje z *Didymium difforme*). Po przeszczepieniu tej bakterji, kolonja jej w odróżnieniu od kolonii *Sarcyny*, powiększa się dość prędko i siłą ciężkości spływa ku dołowi pożywki. Plazmodja słabo wegetującego Śluzowca

zbiegają się ku niej w bardzo szybkim tempie i okalają ją zwartym pierścieniem. Dzieje się to, co działo się w kulturze z *Sarcyną*: powstaje dokoła kolonii rowek, wyłobiony w agarze przez plazmodjum, od-

powiadający formie kolonji. Stwierdziłem tu ponownie¹⁾, że w kontakcie z plazmodjami kolonja tej bakterji powiększa się bardzo szybko tak, że po kilkunastu godzinach spływa ona dość szerokim strumieniem ku dołowi, jak to już nieco wyżej zaznaczyłem, a czego niema w kulturze porównawczej, zawierającej samą tylko bakterję. W miarę tego, jak strumień kolonji bakteryjnej płynie na dół, plazmodjum rozciąga się wzdłuż jego boków i tworzy rowki, które się wydłużają równomiernie w miarę posuwania się strumienia (Tabl. XIV, fig. 4). Nadając kolonjom bakteryjnym dowolne formy, możemy otrzymywać odpowiadające im formy wgłębień, których ślady zostaną zachowane nawet po wyschnięciu pożywki, a które z łatwością można fotografować. Niema więc tutaj całkowitego zniszczenia kolonji bakteryjnej przez rozwijające się plazmodjum i tworzenia się w pożywce głębokich otworów, jak to widzieliśmy w kulturach z Sarcyną.

Kiedy do kultury zostaje wprowadzony kropidlak i wytworzy na pożywce regularną kępkę, plazmodjum tworzy dokoła niej najpierw rowek, który się stopniowo pogłębia. W miarę pogłębienia się rowka kępka się zmniejsza i wkońcu zupełnie znika. Wkońcu na jej pierwotnem miejscu występuje jedynie głęboki, regularny otwór sięgający do ścianki naczynia. Z grzyba nie pozostaje śladu i strzępki rozgałęziające się w pożywce i jego część powietrzna, wraz z zarodnikami, zostają całkowicie zjedzone przez plazmodjum. Przypomina to zupełnie, cośmy już widzieli wyżej w kulturach wraz z Sarcyną (Tabl. XIV, fig. 2 i 3).

Często się zdarza, że kultury czyste Śluzowców, *Didymium difforme*, czy *Didymium nigripes* zostają zanieczyszczone przez cały szereg gatunków grzybów pleśniowych jak np. wyżej już wzmiankowany *Aspergillus*, *Stysanus*, *Sterigmatocystis*, *Penicilium* i t. d. Zazwyczaj plazmodja występują wtedy do czynnej walki z intruzami i całkowicie je niszczą. Pomimo, że w pierwszej fazie rozwoju Śluzowca może się znajdować w kulturze i dobrze rozwijać jakiś pleśniak, nie przeszkadza to uważać taką kulturę, w końcowych jej fazach rozwoju, za czystą. Kultury, które zostały założone na świeżej pożywce z zarodników, pochodzący z zarodni wytworzony w takim właśnie środowisku, nie wykazują najmniejszego śladu pleśniowca. Dowodzi to, że takowy został doszczętnie zniszczony przez plazmodjum danego Śluzowca.

Fakty te dają się obserwować na szerszą skalę w środowisku

¹⁾ Poraz pierwszy w „Recherches sur le cycle évolutif de certains Myxomycètes“, 1920.

naturalnem. Wiemy, że większość Śluzowców rozwija się na rozkładających się pniach różnych gatunków drzew, na martwych liściach, na słomie, sianie i t. d. Kiedy na którymś z tych podłoży odbywa się cykl rozwojowy jakiegokolwiek gatunku Śluzowca i kiedy zwłaszcza ten jest w stadium plazmodjum, całe terytorjum, po którym to ostatnie pełza, jest zupełnie wolne od jakichkolwiek pleśniowców, a nawet strzępków wyższych form grzybów.

Podłoże takie może długi czas pozostać w stanie zupełnie czystym, po utworzeniu się nawet zarodni Śluzowca, wtedy, gdy tereny sąsiednie nieobjęte przez plazmodjum, wykazują liczne i różnorodne formy pleśniowców. Kultury sztuczne, założone z zarodników, pochodzących z takich zarodni — przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności — są również zupełnie czyste.

Z powyższych obserwacji wynika, że Śluzowiec nie jest w możności przeżyć swego cyklu rozwojowego bez współudziału innego jakiegoś organizmu żywego. Jest jednak jasnem, że tym czynnikiem nie musi być koniecznie bakterja, jak tego chciał Pinoy i inni, ale mogą być i inne organizmy, jak np. Pleśniowce lub Drożdże.

Opierając się na długoletnich moich obserwacjach, doszedłem jednak do przekonania, że najważniejszym i najlepiej odpowiadającym wymaganiom Śluzowca czynnikiem jest bakterja. Jest to organizm, że się tak wyrażę, elastyczniejszy i łatwiej dostępny Śluzowcowi, niż inne mikroorganizmy. Dzięki szybszemu rozmnażaniu się, bakterja jest w stanie lepiej zaspokoić potrzeby tego ostatniego. Śluzowiec robi sobie pewnego rodzaju zapasy z bakterji, które są ukryte w jego ciele owocowem, nawet w wakuolach zarodników i które w ten sposób stanowią pewną i nigdy niezawodną pomoc dla jego rozwoju. Z tego stanu rzeczy korzysta również i bakterja. Będąc dobrze zabezpieczoną wewnątrz ciała owocowego, może ona przetrwać nieprzyjazne warunki, mając zapewniony dalszy swój byt. A gdy się weźmie pod uwagę jeszcze i tę ważną okoliczność, że w obecności Śluzowca bakterja daleko lepiej się rozwija, niż hodowana oddzielnie¹⁾, można z całym spokojem stwierdzić, że pomiędzy temi dwoma organizmami w warunkach naturalnych, istnieje związek symbiotyczny.

Następujące doświadczenie, powtarzane kilkakrotnie, utrwaliło mnie w mem przeświadczeniu.

Do jednej próbówki, zawierającej agar z wywarem marchwi i ziemniaka, zasiałem zarodniki trzech gatunków Śluzowców, hodo-

¹⁾ Skupieński, F. X. l. c., oraz „Z biologii Śluzowców“. — Kosmos, 1922.

wanych od dłuższego czasu w laboratorium, mianowicie *Didymium nigripes*, *Didymium difforme* oraz *Dictyostelium mucoroides*. Na pożywce tej, umieszczonej w temperaturze 15° C najpierw owocowały *Dictyostelium mucoroides* i *Didymium nigripes*, a na ostatku dopiero *Didymium difforme*. Kiedy już zarodnie były zupełnie dojrzałe, rozdzieliłem trzy te gatunki, wprowadzając aseptycznie potrosze zarodników do oddzielnych probówek, zawierających taką samą pożywkę. Kiedy bakterje znajdujące się w przeniesionych zarodniach, rozwinęły się dostatecznie, poddałem je badaniu i przekonałem się, że każdy gatunek Śluzowca posiada swój odrębny gatunek bakterji, t. j. że w zarodni *Dictyostelium mucoroides* znajdował się tylko *Bacillus fluorescens*, w zarodni *Didymium nigripes* — *Bacillus luteus*; w zarodni zaś *Didymium difforme* — *Bacillus vulgaris*. Są to te dawne gatunki, które występowały początkowo, przed rozsianiem do wspólnej probówki, z temi samemi gatunkami Śluzowców. Z tego doświadczenia wynika, że pomimo znalezienia się w jednej pożywce, nastąpiła jednakże ich segregacja i połączenie się z odpowiedniami gatunkami Śluzowców. Dowodzi to, że w trakcie długiego okresu filogenetycznego, nastąpiło ściśle związanie się pewnych gatunków Śluzowców z pewnemi gatunkami bakterji. Dzięki właśnie takiemu połączeniu się tych dwu organizmów, napotyamy na nieprzewidywane wprost trudności, kiedy chodzi o ich rozdział, a właściwiej mówiąc, o otrzymanie Śluzowców w czystym zupełnie stanie, t. j. wolnych od bakterji.

Bardzo ważnym szczegółem w szeregu wyżej poruszonych faktów jest rozpuszczanie podłoża agarowego przez Śluzowca, w trakcie jego ontogenezy. Dzięki temu, że udało mi się wreszcie otrzymać kultury, w których bakterje nie wykazują żadnej żywotności, mogłem nieco lepiej sprawę tę wyjaśnić. W takich właśnie kulturach rozwój *Didymium difforme* kończy się na powstaniu drobnych plazmodjów, które pełzając po podłożu, rozpuszczają je, w małym jednak stopniu. Plazmodja takie nie są w stanie własnemi środkami pobrać z podłoża tych czynników odżywczych, któreby im umożliwiły kompletny rozwój, aż do owocowania włącznie. Dopiero po wprowadzeniu, jak widzieliśmy wyżej, do tak słabo wegetującej kultury jakiegoś organizmu żywego, plazmodja wchodzą w nową fazę rozwoju. Działalność ich zaznacza się przedewszystkiem w silnem rozpuszczeniu agaru, tuż w najbliższem sąsiedztwie z wprowadzonym mikroorganizmem. Z jednemi wyżej wzmiankowanemi organizmami owo rozpuszczanie jest słabsze, z innemi silniejsze. Bardzo silnie odbywa się ono w kontakcie z pleśniowcami, słabiej z bakterjami, a najslabiej z drożdżami.

Wiadomem jest z drugiej strony, że te same organizmy, hodowane oddzielnie w czystych kulturach, na identycznym podłożu, absolutnie takowego nie rozpuszczają.

Wylania się z powyższego wniosek, że organizmy te wytwarzają pewne substancje, które przyspieszają działalność enzymów plazmodjów, w procesie hydrolizowania podłoża.

By sprawę tę lepiej wyjaśnić, wprowadziłem do słabo wegetujących sześciomiesięcznych kultur zamiast np. kolonii bakterii żywej, przesączu z kultury na rosale marchwiowym tej ostatniej. Po kilkunastu dniach mogłem stwierdzić, że działalność nikłych dotychczas plazmodjów wzmogła się tak dalece, że w podłożu pojawiły się głębsze i szersze brózdy, mocno różniące się od dotychczasowych płytkich wgłębień, a i same plazmodja powiększyły się znacznie. Dowodzi to, że w przesączu znajdują się potrzebne czynniki, wydzielone przez żywe bakterie, które wzmagają działalność enzymów plazmodjalnych, dotychczas słabo aktywnych. Przekonałem się jednakże, że wpływ tych czynników jest krótkotrwały. Plazmodja, jakkolwiek mocno zasilone, niezdolne są do przebycia dalszych etapów rozwojowych i nie owocują.

Do takich samych sześciomiesięcznych i słabo wegetujących kultur, wprowadziłem: a) do jednych kolonie zabitych przez sterylizację bakterii, b) do drugich skrobi, wziętej aseptycznie z wnętrza surowej bulwy ziemniaczanej. W pierwszym przypadku plazmodja zbliżyły się do bakterii, i stopniowo zjadały je, jednakże nie zniszczyły całej kolonii. Nie stwierdziłem również tworzenia się brózdy, przez rozpuszczenie podłoża, na granicy kolonii bakteryjnej. W drugim wypadku plazmodja również podeszły pod samą bryłkę skrobi, złożoną na podłożu i otoczyły ją zwartym pierścieniem. Po kilkunastu dniach mogłem stwierdzić zmniejszenie się bryłki i zaostrenie się jej granic. Nie trudno było sprawdzić, że plazmodja żywiły się skrobią¹⁾. Nie stwierdziłem również i tutaj tworzenia się w agarze brózdy na pograniczu bryłki. Po kilkunastu dniach takiego bytowania, plazmodja wyraźnie powiększone opuściły zupełnie teren bryłki skrobiowej, rozpełzły się po całej powierzchni pożywki agarowej, nie osiągnąwszy zdolności do przebycia dalszych stadiów rozwoju i owocowania.

Jasne jest wobec powyższych danych, że do normalnego rozwoju *Śluzowca* potrzebnym jest współdziałanie ubocznego czynnika, którym musi jednakże być koniecznie jakiś mikroorganizm żywy.

¹⁾ Heitzmanówna, W. Z życia pływek i myksameb *Makulca makówki*. Kosmos XLVII (1922).

Dotychczasowe poglądy na rolę bakterij w rozwoju Śluzowców wydają mi się błędnymi. Według tych ostatnich, a zwłaszcza według poglądów Pinoy, bakterje stanowią bezpośredni pokarm dla Śluzowca. Śluzowiec pasożytyje niejako na kolonjach bakterji. Pogląd ten, odpowiadający pogładowi o t. zw. „zwierzęcem“ odżywianiu się Śluzowców, wydaje się być, wobec stwierdzonych przeze mnie faktów, zupełnie fałszywym. Już samo doświadczenie, polegające na dodaniu do kultur zabitych bakterij, jest jasnym tego dowodem. Wynika z tego, że gros substancji odżywczych, których Śluzowiec potrzebuje w trakcie swej ontogenezy, pochodzi z rozkładu podłoża przez liczne mikroorganizmy, a zwłaszcza przez bakterje. Te ostatnie stanowią więc ważny i konieczny czynnik w życiu Śluzowców, ale czynnik działający nie bezpośrednio, a pośrednio. To, że myksameby, pływki i plazmodja chwytają w „zwierzęcy“ sposób bakterje, niczego nie dowodzi, gdyż w ten sam sposób mogą one chwycić i drobne cząstki nieorganiczne, przetrzymywać je jakiś czas w swych wakuolach, a następnie je wydaląć. Zjawisko to zostało po raz pierwszy stwierdzone przez Pfeffera w 1890 r. w pracy jego nad rozwojem *Chondrioderma difforme*. Rost (*Didymium difforme* Duby).

W pracy mojej, dotyczącej badań nad Śluzowcami w Polsce (20), powiedziałem na stronicy 148, co następuje; „Nous considérons que la possibilité du développement d'une espèce quelconque de Myxomycète dépend étroitement non seulement du caractère du substratum, mais aussi de son degré de décomposition, cette dernière étant assurée par les diverses bactéries qui accompagnent toujours toutes les formes de Myxomycètes. Si de nombreuses espèces de Myxomycètes ne se laissent pas cultiver dans les conditions artificielles, malgré la présence des bactéries appropriées dans le milieu de culture, c'est parce qu'il manque dans le substratum, sur lequel nous les cultivons, de substances dites „actives“ propres à chaque espèce et apparaissant progressivement dans les substratum naturels“.

Istotnie, w warunkach naturalnych, rozwój poszczególnych gatunków Śluzowców, jest w ścisłej zależności od jakości podłoża, jak również od stopnia jego rozkładu. Nic też dziwnego, że nie wszystkie gatunki Śluzowców dają się hodować w warunkach sztucznych, pomimo obecności współżyjących z nimi bakterij. Dowodzi to, że same tylko bakterje nie wystarczają do rozwoju Śluzowców, jako bezpośrednia pożywka — i że te ostatnie czerpią drogą osmotyczną różne związki z uprzednio przygotowanego podłoża.

Wpływ temperatury.

Temperatura i jej zmiany wywierają wyraźny wpływ na rozwój *Didymium difforme*.

Badając wpływ różnych temperatur, przekonałem się, że gatunek ten jest mniej czułym na jej zmiany, niż *Didymium nigripes*.

W celu dokładnego zbadania wpływu różnych temperatur, zakładałem kultury na agarze z wywarem siana, jako na środowisku najbardziej odpowiadającemu środowisku naturalnemu, oraz na agarze na wywarze z marchwi i ziemniaka. Punktem wyjścia każdej grupy kultur były zarodniki brane z jednego i tego samego ciała owocowego.

Kultury pierwszej kategorii (agar na wywarze z siana) podzieliłem na dziesięć serji, w celu umieszczenia każdej w innej temperaturze.

Pierwszą serję, składającą się z 10 kultur, umieściłem w temperaturze -10°C na dwanaście godzin. W tych warunkach nie mogło być oczywiście mowy o jakimkolwiek rozwoju, ze względu na natychmiastowe zamarznięcie pożywki. Ale późniejsze rezultaty tego doświadczenia okazały się bardzo ciekawymi. Mianowicie, po przeniesieniu tak wymrożonych kultur do temperatury pokojowej (średnia $+18^{\circ}\text{C}$), zarodniki zaczęły kiełkować, we wszystkich kulturach, bardzo szybko i procent kiełkujących zarodników był daleko wyższy, niż w kulturach porównawczych niewymrażanych. Plazmodja w tych kulturach powstały szybciej i obficie, niż w kulturach porównawczych. Również i tworzenie się ciał owocowych było daleko wcześniejsze i bez porównania bogatsze, niż w kulturach niewymrażanych. Te ostatnie tak pod względem form zewnętrznych, jak i budowy wewnętrznej zupełnie były podobne do form powstających w środowisku naturalnym.

Wystawiłem również na działanie takiej samej temperatury i na taki sam okres czasu, kultury, w których zapoczątkowany został już rozwój Śluzowca. Po umieszczeniu tych kultur w temperaturze pokojowej, nie było dalszego rozwoju. Stwierdziłem, że pod wpływem mrozu, myksameby i pływki zostały zabite.

Oceniając doniosłość tego zjawiska, postanowiłem poddać wymrażaniu zarodniki tych gatunków Śluzowców, które w środowisku sztucznym, pomimo obecności bakterij, nie chcą zupełnie kiełkować. Już tylko dwunastogodzinne wymrażanie przy temperaturze -10°C wystarczyło do wywołania procesu kiełkowania.

Widać z tych doświadczeń, że w zarodnikach licznych Śluzowców powstają, pod wpływem mrozu, pewne nieznane dotychczas czynniki, które ułatwiają a nawet przyspieszają proces kiełkowania i których wpływ daje się obserwować nawet w trakcie dalszych

stadiów w rozwoju. Mróz więc wydaje się być tym ważnym czynnikiem obok wielu innych, bez którego rozwój licznych gatunków Śluzowców, w środowisku naturalnym, nie może się odbyć. Nic też dziwnego, że większość gatunków występuje przeważnie w strefach umiarkowanych lub chłodnych t. j. gdzie temperatura zimowa spada poniżej zera.

Drugą serję, składającą się również z 10 kultur umieszczałem w temperaturze 0° C. Nie było, rzecz oczywista, żadnego rozwoju.

Trzecią serję dziesięciu kultur trzymałem w temperaturze od $+2^{\circ}$ do $+3^{\circ}$ C. W tym wypadku nie stwierdziłem zupełnie kiełkowania zarodników. W takiej samej temperaturze zarodniki *Didymium nigripes* zaczynają już dość dobrze kiełkować.

Czwartą serję dziesięciu kultur trzymałem w temperaturze od $+4^{\circ}$ do $+8^{\circ}$ C. W tych warunkach mogłem już stwierdzić, pewien, słaby zresztą, procent zarodników kiełkujących. Powstające myksameby nie dzielą się jednak, przetwarzają się w cysty i na tem cały rozwój się kończy.

Stwierdziłem pozatem, że minimalną temperaturą, przy której zarodniki zaczynają kiełkować jest temperatura $+6^{\circ}$ C. Natomiast *Didymium nigripes* już w temperaturze od $+2^{\circ}$ do $+4^{\circ}$ C rozwija się dobrze. Powstają piękne plazmodja, które po kilku dniach przekształcają się w liczne o silnej budowie zarodnie, jednakże czas trwania cyklu rozwojowego w tych warunkach jest bardzo długi.

Piąta serja dziesięciu kultur została umieszczona w temperaturze od $+8^{\circ}$ do $+12^{\circ}$ C. W tych warunkach kiełkuje dość duży procent zarodników, stopniowo i bardzo powoli. Po mniej więcej dwu tygodniach powstają plazmodja, lecz są one dość nikłe i niezdolne do przekształcenia się w normalne ciała owocowe. Jeśli chodzi o *Didymium nigripes* to gatunek ten, w tych temperaturach, rozwija się najlepiej.

Szósta serja kultur trzymana była w temperaturze od $+12^{\circ}$ do $+15^{\circ}$ C. Tu rozwój odbywa się normalnie, lecz bardzo powoli, tak, że całkowity cykl rozwojowy trwa do czterech tygodni. W rezultacie powstają normalnie zbudowane sporangja i daje się stwierdzić zupełny prawie brak form plazmodjokarpjalnych.

Siódma serja kultur trzymana była w temperaturze pomiędzy $+18^{\circ}$ a $+20^{\circ}$ C. Rozwój był normalny, lecz trwał daleko krócej, niż w poprzedniej serji kultur, bo do siedemnastu dni. Ciała owocowe zupełnie takie same, jak w serji poprzedniej.

W ósmej serji kultur, trzymanyh w temperaturze od $+24^{\circ}$ do $+25^{\circ}$ C, rozwój był normalny; a całkowity cykl rozwojowy trwał

zaledwie dziesięć dni, powstały silne plazmodja, które w krótkim czasie wytworzyły ciała owocowe. Te ostatnie różniły się jednak od ciał owocowych poprzednich serii kultur; wystąpiły tu obok normalnych zarodni silnie rozplaszczone i rozgałęzione plazmodjokarpja. Zaobserwowałem również i silne zmiany w strukturze wewnętrznej zarodni, zwłaszcza w budowie i formie zarodników. Z pomiędzy tych ostatnich jedne były mniejsze i kuliste o średnicy 12—14 μ , inne większe i pozbawione form kulistych; powstały tu również i bezkształtne, a nawet rozgałęzione potwory. Błony wszystkich tych form zarodnikowych są bardzo cienkie, to też można widzieć po przez nie strukturę plazmy, oraz jądro. Takie zarodniki kiełkują daleko łatwiej i szybciej, niż zarodniki powstałe w zarodniach innych wyżej omawianych kultur.

Dziewiąta seria kultur umieszczona była w temperaturze stałej $+30^{\circ}\text{C}$. W tym wypadku zarodniki wykiełkowały bardzo szybko; powstały plazmodja, lecz były one bardzo słabo rozwinięte i zamiast ciał owocowych wytworzyły skleroty; te ostatnie przeniesione na świeże pożywki, umieszczone w temperaturze niższej ($18\text{--}20^{\circ}\text{C}$) wydały nowe plazmodja, które w bardzo szybkim tempie przekształciły się w normalne ciała owocowe.

Dziesiątą serię kultur umieściłem w temperaturze $+35^{\circ}\text{C}$. Wykiełkował niewielki procent zarodników, lecz myksemy, zaraz po uwolnieniu się z błon zarodnikowych, zaokrągliły się i potworzyły cysty. Połowę tych kultur umieściłem w temperaturze niższej ($18\text{--}20^{\circ}\text{C}$); po kilku dniach powstały plazmodja, a po kilku jeszcze normalne ciała owocowe. Druga połowa kultur pozostała w pierwotnej temperaturze ($+35^{\circ}\text{C}$). Stwierdziłem, że cysty w tych warunkach po dłuższym czasie zamierają i stają się łupem bakteryj.

Przekonałem się pozatem na jednej jeszcze serii kultur, że maksymalną temperaturą, poza którą niema absolutnie kiełkowania jest temperatura $+41^{\circ}\text{C}$.

Na podstawie powyższych doświadczeń mogłem ustalić dla *Didymium difforme* trzy kardynalne temperatury, przy jednako-
wym składzie chemicznym pożywki dla wszystkich kultur. Minimalną temperaturą, przy której zarodniki mogą kiełkować, jest temperatura $+6^{\circ}\text{C}$. Optimalną temperaturą, przy której całkowity cykl rozwojowy jest nie tylko najkrótszy, ale również budowa ciał owocowych jest normalna, jest temperatura od $+18^{\circ}\text{C}$ do $+20^{\circ}\text{C}$. Maksymalną temperaturą jest temperatura $+41^{\circ}\text{C}$. Tak było przy doświadczeniach, prowadzonych na pożywkach z wywarem siana.

Identyczną serię doświadczeń przeprowadziłem na pożywce agarowej z 50⁰/₀₀ wywarem marchwi czerwonej i ziemniaka.

Stwierdziłem, że na tej pożywce rozwój *Didymium difforme* jest lepszy, a co najważniejsze, że może się odbyć zupełnie normalnie przy daleko niższych temperaturach. Chodziło mi przede wszystkim o oznaczenie temperatury optymalnej, która wynosi tu od +14⁰ do +15⁰ C.

Przekraczając temperaturę optymalną dla kultur na jednej i tej samej pożywce, stwierdziłem, że zamiast ciał owocowych normalnych, (poduszczkowatych), o normalnej strukturze wewnętrznej, tworzą się plasmodjokarpia o zarodnikach anormalnych (potworach). Wynika z tego, że podniesiona temperatura może stanowić czynnik teratologiczny. Identyczne zjawiska zaobserwowałem i dla *Didymium nigripes*, gatunek ten w normalnych warunkach różni się bardzo od *Didymium difforme*, przede wszystkim tem, że jego zarodnie posiadają dość długie trzonki. Otóż optymalną temperaturą dla rozwoju jest temp. od +8⁰ do +10⁰ C. W temperaturze zaś +18⁰ do +20⁰ C. następują bardzo poważne zmiany w formie zewnętrznej, jakoteż i w strukturze wewnętrznej. Mianowicie sporangja tracą trzonki i bezpośrednio spoczywają na podłożu, przybierając postać plazmodjokarpjów. Zarodniki odznaczają się różnorodnością form i są różnej wielkości (od 5 do 20 μ). Spotykają się między nimi liczne potwory, jak u *Didymium difforme*. Jednem słowem daje się stwierdzić jakby przejście, pod wpływem wygórowanej temperatury od formy *Didymium nigripes* do formy *Didymium difforme*.

Wpływ światła na rozwój *Didymium difforme*.

Światło stanowi bardzo silny czynnik drażniący, a nawet zabójczy w stosunku do myksameb, pływek i plazmodjów, nie ma natomiast nijakiego wpływu na tworzące się już ciała owocowe. Te ostatnie, kiedy są wystawione na działanie bezpośrednie promieni słonecznych, dojrzewają zupełnie normalnie. Nie udało mi się stwierdzić żadnych zmian morfo-anatomicznych.

Natomiast myksameby, pływki i plazmodja uciekają od silnego światła, a trzymane w nim dłuższy czas zamierają. By się przekonać o jakości wpływu światła na te elementy, umieszczałem mikrokultury na mikroskopie, wybierałem największe skupienia myksameb lub pływek w stanie spoczynku i wtedy, przy pomocy lusterka, przysyłałem ku nim silną smugę światła słonecznego. Po kilku zaledwie minutach takiego naświetlania myksameby zaczęły szybko uciekać z pola wi-

dzenia, a pływki dotychczas w stanie spoczynku, nabrały ruchów śrubowatych i też szybko usunęły się z tego ostatniego. Umieszczałem następnie w ten sam sposób inne mikrokultury, zawierające plazmodja. Wybierałem największe i najsilniej rozgałęzione plazmodjum i zostawiałem je w tak skondensowanym świetle na kilkanaście minut. To ostatnie starało się oczywiście ująć z pola widzenia, wtedy przesuwalem mikrokulturę tak, by całe plazmodjum nanowo znalazło się w świetle. Po kwadransie ruchy rytmiczne plazmy, które na początku naświetlania były przyspieszone, zwolniły swe tempo i stopniowo zupełnie ustały. Jednocześnie rozgałęzione plazmodjum powoli się kurczyło, boczne jego i siateczkowate rozgałęzienia zanikły i przelały się do głównego pnia. W końcu powstała jednolita masa plazmodjalna, która stopniowo się kurczyła i wreszcie przybrała formę kulistą, pozbawioną ruchów. Kiedy przerwałem dopływ światła, zmieniając pozycję lusterka, mogłem po 25 minutach zauważyć powolny powrót do normalnego stanu; dotychczasowa kulista forma przeszła w formę nieregularną, zaczęły się tworzyć coraz to dłuższe wypustki i jednocześnie pojawiły się rytmiczne ruchy plazmy. Powoli, plazmodjum powróciło do normalnego stanu. Kiedy jednakże skulone plazmodjum pozostawiłem na dłuższy okres czasu w intensywnym świetle, to stwierdziłem, że takowe po czterech godzinach zupełnie zamarło, przybierając charakterystyczne żółtawe zabarwienie.

Zjawiska te mogą być potwierdzone na makrokulturach, gdzie silnie rozwinięte plazmodja widzialne są gołym okiem. Wiadomem jest że plazmodjum pod koniec swego okresu wegetacyjnego przechodzi przez trzy fazy: a) faza skupienia się całego jego ciała; b) faza fragmentacji skupionej masy plazmatycznej, oraz c) faza ostateczna, kiedy fragmenty plazmatyczne przekształcają się w ciała owocowe (sporangja).

Trzy te formy ciała plazmatycznego są w niejednakowym stopniu czułe na działanie silnego światła słonecznego.

Plazmodja w trakcie ich najintensywniejszego rozwoju, kiedy są wystawione na silne światło słoneczne, czas jakiś się jeszcze poruszają, starając się zejść na brzeg pożywki, by następnie wcisnąć się pomiędzy tę ostatnią a ścianę naczynia i w ten sposób uniknąć bezpośredniego wpływu światła. Po dłuższym jednak przebywaniu w intensywnym świetle każde plazmodjum kurczy się i przechodzi w sklerotę, z której może ostatecznie na nowo powstać, w warunkach normalnych, nowe plazmodjum.

Najczulszem na działanie silnego światła jest plazmodjum w fazie jego skupienia się. Kultury w takiej fazie wystawiałem na silne światło słoneczne. Przekonałem się, że już po godzinnem tylko naświetlaniu,

skupione masy plazmatyczne zostały kompletnie utrwalone; po przeniesieniu w zacienione miejsce nie uległy one zwykłej fragmentacji, ani też nie wydały z siebie świeżych plazmodjów. Te zaś kultury, które były przedtem owinięte czarnym papierem, nie wykazały żadnej zmiany i normalnie dokończyły swego rozwoju.

Kiedy plazmodjum skupione wejdzie w fazę fragmentacji, traci ono wrażliwość na światło. Wystawiałem kultury, zawierające fragmenty plazmatyczne — zadatki przyszłych ciał owocowych — na silne światło słoneczne. Przekonałem się, że w tych warunkach potworzyły się po kilku godzinach stałego naświetlania, normalnie zbudowane ciała owocowe.

Podobne zjawiska obserwowałem w warunkach naturalnych. Niektóre gatunki śluzowców owocują bardzo dobrze na silnym świetle słonecznym, jak np. *Fuligo septica* ¹⁾, *Lycogala epidendrum*, *Lycogala flavo-fusum* i inne.

Zauważyłem z drugiej strony, że przez krótkoterminowe i wielokrotne naświetlanie plazmodjum, będącego w pełni rozwoju można w znacznym stopniu przyspieszyć jego owocowanie.

W celu spreeczowania faktów związanych z tem zjawiskiem doбираłem kultury możliwie jednakowe i tego samego szczepu. Jest ważnem bardzo, żeby wiek kultur oraz wielkość i forma plazmodjów, które chcemy naświetlać, były możliwie jednakowe.

Wybrawszy trzy kultury o najwięcej zbliżonych do siebie plazmodjach, dwa z nich naświetlałem, trzecie trzymałem w zupełnej ciemności.

Naświetlałem zapomocą lampy elektrycznej o sile 75 watów z odległości 35 centymetrów. Każde naświetlanie trwało 2 minuty. Jedno plazmodjum naświetliłem jeden raz tylko i następnie umieściłem w ciemnem miejscu, drugie naświetlałem kilkakrotnie w dwugodzinnych odstępach. W trakcie każdego naświetlania plazmodjum było fotografowane, co umożliwiło mi otrzymanie serii obrazów ilustrujących stopniowe zmiany tego ostatniego. Przymocowany do kultury termometr wykazał podniesienie się każdorazowo temperatury zaledwie o 0.3° C, co chyba nie wpłynęło na normalny przebieg doświadczenia.

Pierwsze naświetlanie nie wywołuje wielkiego efektu. Po niem plazmodjum w ciągu dwóch godzin nie wykazuje głębszych zmian. Dopiero na drugie naświetlanie plazmodjum reaguje daleko silniej, zmieniając gruntownie swój pierwotny kształt. Trzecie i czwarte na-

¹⁾ Fazy powstawania tego gatunku na świetle słonecznym opisałem w pracy p. t. „Contribution à l'étude des Myxomycètes en Pologne“. Bull. de la Soc. Myc. de France 1926.

światłania wywołują jeszcze głębsze zmiany, po piątym zaś naświetlaniu następuje szybka fragmentacja rozdzielonych mas plazmodjalnych i proces owocowania. (Tabl. XV fig. 1, 2, 3, 4, 5 i 6). To ostatnie, jak widzimy, nastąpiło już po dziesięciu godzinach od momentu pierwszego naświetlenia.

Kultura porównawcza, którą naświetliłem jeden tylko raz w ciągu 2 minut, a następnie ukryłem w ciemnym miejscu, nie wykazała takiego szybkiego tempa w przekształcaniu się plazmodjum, jak kultura częściej naświetlana. To samo stwierdziłem i dla kultury, która wcale nie była naświetlana. W obu tych kulturach rozwój i zmiany morfologiczne plazmodjów odbywały się bardzo powoli, a proces owocowania odbył się prawie jednocześnie w dwu tych kulturach w osiemnaście dopiero godzin od umieszczenia w ciemności.

Jest wyraźnem, że pierwsza dawka światła nie wywołała nijakiego widocznego efektu, dopiero następne naświetlania mogły być wywołać te wyraźne zmiany, które zaszły w kulturze kilkakrotnie naświetlonej.

Widać z powyższych doświadczeń, że o ile stałe intensywne naświetlanie może zahamować rozwój danej kultury i spowodować nawet zabicie poszczególnych elementów rozwojowych, to słabe dawki światła w większych odstępach stanowią dodatni bodziec w rozwoju tych ostatnich.

Podobne zjawiska przyspieszenia cyklu rozwojowego pod wpływem sztucznego naświetlania obserwowane były przez licznych obserwatorów na szeregu innych obiektów. Wspomnę tu tylko o najświeższej pracy J. S. Karling'a (12) nad badaniem wpływu światła i temperatury na wzrost i rozwój *Chara fragilis*.

Autor ten stwierdził, że kilkogodzinne naświetlanie sztuczne dodane do normalnego naświetlania dziennego wystarczy do wywołania powstania rodni i plemni w okresie zimowym, gdy w naturalnych warunkach elementy te u *Chara fragilis* powstają tylko w okresie letnim, od czerwca do września. Wystarczy ciągle naświetlanie przy pomocy 10-cio świecowej lampy, by spowodować powstanie rodni i plemni w ciągu 4-ch dni.

Doświadczenia jego są tembardziej przekonujące, że wywoływał on powstanie rodni i plemni przez naświetlanie *Chary* w temperaturze $+2^{\circ}\text{C}$., kiedy temperatura optymalna dla rozwoju tego gatunku w warunkach normalnych wynosi od 18 do 25°C .

Muszę zaznaczyć, że analiza ciał owocowych, naświetlanych plazmodjów, nie wykazała żadnego absolutnie odchylenia od form powstających w warunkach normalnych.

Cykl rozwojowy.

Zanim przystąpię do opisanego cyklu rozwojowego u *Didymium difforme*, pragnę najpierw dać w grubszych zarysach zestawienie poglądów szeregu botaników na sprawę rozwoju Śluzowców wogóle. Na tle historycznych tych danych, wyniki moich długoletnich badań nabiorą większej wyrazistości i pozwolą czytelnikowi łatwiej się zorientować w całokształcie tego doniosłego zagadnienia.

Początek istotnych badań nad Śluzowcami sięga końca XVIII wieku. Pierwszym badaczem, który wyróżnił Śluzowce z pomiędzy innych grup świata roślinnego i który w 1797 r. wskazał na różnice tych organizmów i grzybów, był Schrader. Wiadomości jego dotyczące istoty rozwoju Śluzowców są ze względu na brak dostatecznych pomocy technicznych, bardzo skromne.

Po Schraderze najwybitniejsze miejsce do połowy XIX wieku, w dziedzinie badań nad Śluzowcami, z pomiędzy licznych botaników, zajmuje Fries. Badania jego, jak i jego współczesnych, dotyczą jedynie strony morfologicznej i systematycznej tych organizmów. W okresie tym nie ukazała się żadna praca poświęcona cyklowi rozwojowemu Śluzowców.

Dopiero w drugiej połowie XIX w. de Bary w gruntownej swej pracy (2) opisał całkowity rozwój kilku gatunków Śluzowców. Prace jego należy uważać w tej dziedzinie za podstawowe.

Według tego autora zarodnik umieszczony w kropli wody pęcznienie i wtedy w protoplazmie powstają zazwyczaj duże wakuole. Późem całe ciało plazmatyczne wyswabia się z błony zarodnikowej, i jest początkowo kuliste i nieruchome. Po niejakiem czasie wydłuża się ono, na jednym z końców tworzy biczyk i w ten sposób powstaje pływka (zoospora). Tylna część pływki jest ziarnista i obdarzona wakuolami; szczytowa zaś (tam gdzie mieści się jądro i występuje biczyk) jest pozbawiona zupełnie ziarnistości.

Pływki wykonywują ruchy czołgające i rotacyjne. Mnożą się one przez podział. Przed każdym podziałem pływka przechodzi w stan spoczynku, biczyk zanika, a ciało jej zaokrągla się. Każda część pochodna staje się po pewnym okresie spoczynkowym normalną pływką.

De Bary obserwował już wtedy u *Didymium libertianum* (obecnie *Didymium difforme*, D u b y) i *Didymium praecox* (obecnie *Didymium squamulosum*, Fries) pierwszy podział ciała plazmatycznego w samym zarodniku, z którego wychodzą bezpośrednio podczas kiełkowania dwie pływki. Po kilku podziałach, pływki zatracają biczyki i stają się myksamebami. Myksameby łączą się po kilka lub kilkanaście, zlewają

się z sobą i tworzą jedno wspólne ciało, które de Bary nazwał początkowo sarkodą¹⁾.

Sarkoda może się dzielić na mniejsze sarkody i odwrotnie, małe sarkody mogą się zlewać między sobą w większe sarkody. Sarkoda może rosnąć, rozgałęziać się, nie zlewając się z innymi sarkodami lub myksamebami.

Gdy zbliża się moment owocowania ciało plazmatyczne (sarkody) pozbywa się swego barwnika i ziarenek, CaCO_3 . Z części plazmy powstaje włósnia, z części zaś zarodniki.

De Bary stwierdził pozatem bardzo ważną rzecz, mianowicie że Śluzowiec może w trakcie swego rozwoju przejść przez trzy formy spoczynkowe = a) mikrocysty, b) cysty i c) skleroty. Tworzenie się tych form wywołane jest zmianami otaczającego środowiska. Mikrocysty są to pływki w stanie spoczynkowym zaś cysty i skleroty są to plazmodja w stanie spoczynkowym. De Bary stwierdził, że skleroty *Licea pannorum* mogą zachować swą żywotność w ciągu kilku lat. Są i takie gatunki, których skleroty mogą przetrwać w miejscu suchem, dwadzieścia lat.

W cztery lata po ogłoszeniu pierwszej pracy de Bary'ego ukazały się dwie prace Cienkowskiego (4); „Zur Entwicklungsgeschichte der Myxomyceten“ i „Das Plasmodium“, w których autor bardzo gruntownie ujmuje cały szereg zagadnień związanych z rozwojem Śluzowców. On to wprowadził termin „plazmodjum“ na miejsce „sarkody“ de Bary'ego, który się po dziś dzień utrzymał. W grubszych jednakże liniach obserwacje jego są powtórzeniem tego co poraz pierwszy zaobserwował i opisał de Bary.

W roku 1875 została ogłoszona po polsku przez Józefa Rostafińskiego wielka praca monograficzna pod nazwą „Śluzowce“ (Mycetozoa), która miała być wedle słów samego autora, dopełnieniem pracy de Bary'ego ogłoszonej w roku 1864, pod tytułem „Die Mycetozoen“. Uwzględnia ona jedynie stronę morfologiczną i systematyczną Śluzowców.

Pierwszym badaczem, który zajął się kwestją jąder u Śluzowców był E. Strasburger. Wybitny ten botanik wykazał w 1884 r. po raz pierwszy na dojrzewających zarodniach *Trichia fallax*, że jądra ich dzielą się karjokinetycznie. Potwierdzili to później Jahn i Krenzlinówna na dojrzewających sporangjach innych gatunków Śluzowców.

¹⁾ Później de Bary odrzucił nazwę „Sarcoda“ i przyjął nazwę Cienkowskiego „Plasmodium“.

Prace Artura Listera i jego córki panny Gulielmy Lister'ówny stanowią początek nowej ery w historii badań nad Śluzowcami. Ukoronowaniem licznych prac tych autorów — była gruntownie opracowana monografia, której niedawno ukazało się już trzecie wydanie. W monografii tej pokażne miejsce zajmuje dział dotyczący biologii Śluzowców, zwłaszcza ich rozwoju.

Według Listera kiełkowanie zarodników Śluzowców jest zjawiskiem osmotycznym. Powstają pływki, których biczyk jest w ściślejszej łączności z jądrem. Bakterje, które są obecne w środowisku odżywczym, są chwywane przez pływki, myksameby i plazmodja i trawione w wakuolach. Podział pływek odbywa się zazwyczaj w pięć godzin po wykiełkowaniu. Przed każdym podziałem ciało pływki zaokrągla się, biczyk zanika zupełnie. Jądro dzieli się karjokinetycznie. Lister zaobserwował fazy podziału karjokinetycznego i obecność wrzeciona achromatynowego.

Według Listera myksameby pochodzą zawsze od pływek; dzielą się one również karjokinetycznie, a następnie zlewają się po kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt między sobą, tworząc w ten sposób plazmodjum. Dzięki temu zlanie się, myksameby zatracają swą indywidualność, lecz jądra ich takową zachowują. Zlewania się tych ostatnich Lister nie stwierdził. „Whatever reason“, pisze Lister, „may be from general considerations to regard this fusion of individuals as akin to conjugation, no fusion of nuclei, which appears to be an essential part of that process, has yet been observed“.

Plazmodja mogą tworzyć skleroty przez zwykłe wystawienie ich na suche powietrze. Lecz często przyczyna tworzenia tych ostatnich jest dla Listera niewytłumaczalna. Skleroty mogą długo zachować ich żywotność i po trzech nawet latach dać zupełnie normalne plazmodja ¹⁾.

Żaden z powyższych badaczy, jak widzieliśmy, nie poruszył wyraźnie sprawy płciowego rozwoju Śluzowców. Ogólnem zdaniem biologów XIX wieku organizmy te miały rozmnażać się wyłącznie drogą bezpłciową. Brak odpowiedniej techniki mikroskopowej nie

¹⁾ Na wymienienie zasługują również nazwiska: Van Tieghem'a, Brefeld'a, Nadson'a, Potts'a, Olive'a, Vuillemin'a, których prace odnoszą się szczególnie do grupy *Acrasieae*, a więc nie wchodzą bezpośrednio w krąg niniejszych badań. Tak samo nazwiska Woronin'a, Nawaszin'a, Prowazek'a, Osborn'a, Maire'a, Tison'a, Terby, związane z pracami nad *Plasmodiophora Brassicae* Nor. organizmem zbliżonym do Śluzowców i uważanym nawet przez niektórych badaczy za jako takiego (Reichenow, Maublanc).

pozwalał przez długi czas na wykrycie charakteru płciowego reprodukcji Śluzowców.

Pierwszym, który w r. 1908 poruszył ważne to zagadnienie, był Pinoy. W pracy p. t.: „Sur l'existence d'un dimorphisme sexuel chez un myxomycète, *Didymium nigripes* (17), podaje on wyniki swych spostrzeżeń, opartych jedynie na doświadczeniach makroskopowych; nie wchodził on zupełnie w istotę zagadnień cytologicznych. Pinoy rozsiewał zarodniki *Didymium nigripes* na pożywkach agarowych i umieszczał tego rodzaju kultury w cieplarni o temperaturze 20° — 22° C. Potworzyły się w krótkie szare plazmodja, a po kilkunastu (10—20) dniach powstawały ciała owocowe. Niektóre kultury wykazały obecność żółtych lub pomarańczowych plazmodjów, inne plazmodjów ciemno-fioletowych. Jak jedne tak i drugie nie przekształciły się w ciała owocowe, a utworzyły jedynie skleroty. Fragmenty tych sklerot mogą dać na świeżej pożywce nanowo plazmodja, z których jedne będą żółte lub pomarańczowe inne ciemno-fioletowe.

Pinoy umieszczał makroskopowo różne plazmodja na wspólnej pożywce i stwierdził, że plazmodja żyły każde oddzielnie i nie owocowały.

Łączenie się różnych płciowo elementów odbywa się według autora w innych stadiach rozwoju, jak to wykazały następujące doświadczenia. Do każdej z dwu probówek, zawierających płynną pożywkę, zostały przez niego wprowadzone części sklerot; do jednej części skleroty plazmodjum fioletowego, do drugiej części skleroty plazmodjum żółtego. Kiedy w obu kulturach potworzyły się myksameby, Pinoy wprowadził zapomocą pipetki część płynu z każdej kultury do jednej wspólnej probówki, zawierającej taką samą pożywkę, jak poprzednie probówki. Okazało się, że po kilku dniach w nowej tej kulturze, w której zostały pomieszane myksameby różnego pochodzenia, powstało szare plazmodjum, które w krótkim czasie przekształciło się w ciała owocowe. Pinoy wyprowadził z powyżej opisanych doświadczeń wnioski, że sporangja *Didymium nigripes* posiadają każde dwojakiego rodzaju zarodniki, jedne (+), drugie (—). Jeżeli kultura została założona z samych tylko zarodników (+), lub samych tylko zarodników (—), powstają różne plazmodja, lecz niema owocowania. Połączenie dwu plazmodjów (+) i (—) jest konieczne do powstania ciał owocowych. Największą wartość w badaniach Pinoy, posiada jego koncepcja, dotycząca płciowego rozwoju Śluzowców, doświadczenia jednakże, któremi on koncepcję tę chce uzasadnić, nie wytrzymują najmniejszej krytyki.

Pinoy zasugerjowany zjawiskami występującymi w trakcie rozwoju przedstawicieli Mucoraceae chciał w nich znaleźć wytłuma-

czenie dla swej koncepcji, dotyczącej rozwoju Śluzowców. Wypowiada on istotnie w wyżej zacytowanej pracy następujące zdanie: „Nous avons déjà constaté qu'alors que certaines cultures donnaient des fructifications, d'autres, quoique exactement dans les mêmes conditions, ne donnaient jamais que des sclérotés et nous avons émis l'hypothèse qu'il y avait là sans doute quelque chose d'analogue à ce que Blakeslee avait observé pour les Mucorinnées et qu'il fallait une fusion de deux plasmodes différents pour que la fructification pût se produire“.

Na tem miejscu nadmienię tylko, że w trakcie długoletnich moich badań nad rozwojem tego samego gatunku podobnych zjawisk nie zaobserwowałem. Nie zauważyłem nigdy różnorodnych plazmodjów w jednej i tej samej kulturze. Wszystkie plazmodja są stale jednokowe i we wszystkich wypadkach owocują.

Zdarza się, że pod wpływem pewnych czynników jak np. wysokiej temperatury można zahamować rozwój tego Śluzowca i wywołać tworzenie się sklerotów zamiast zwykłych sporangjów. Nic przeto dziwnego, że w kulturach Pinoy zachodziły pewne anormalne zjawiska, gdyż trzymał on je w temperaturze od 20°—22° C. A zostało przeze mnie stwierdzonem, że takie temperatury są dla tego gatunku zbyt wysokie, albowiem optymalną temperaturą dla jego rozwoju jest temperatura od 8°—10° C. Stwierdziłem ponadto, że pomiędzy zarodnikami *Didymium nigripes* niema zarodników (+) i (—) i że każdy zarodnik jest potencjalnie dwupłciowym t. j. z jednego zarodnika można otrzymać całkowity cykl rozwojowy do owocowania włącznie.

W dwa lata po ogłoszeniu pracy Pinoy, Torrend w swej monografii Śluzowców (27), ogłoszonej w 1909 r. sprecyzował w sposób bardzo jasny, zagadnienie płciowości u tych ostatnich. Przytoczę tu kilka najistotniejszych ustępów z rzeczonego dzieła, zwłaszcza, że jest ono zupełnie wyczerpane.

„La multiplication achevée, chaque myxamibe retire son cil vibratile et reprend sa forme et ses mouvements amiboïdes d'auparavant, S'il se fait que deux d'entre eux arrivent à la proximité de 40 μ environ ils s'attirent mutuellement et se fusionnent; a cette masse commune d'autres s'ajoutent successivement et forment comme un centre où viennent fatalement converger les autres. Il arrive parfois que certains résistent à cette attraction de la masse commune, alors ils se contractent en microcystes et ce n'est qu'en cet état qu'ils sont attirés et digérés dans les vacuoles“.

Nieco dalej Torrend w formie jeszcze wyraźniejszej wypowiada swój pogląd na zajmującą nas sprawę: „on n'est pas encore bien fixe sur les causes de cet enkystement, car on l'a vu se former malgré

la présence de toutes les conditions d'humidité et d'aliment. Serait-il dû au manque d'élément fécondateur qui devrait lui permettre d'arriver à la sporulation? Il se pourrait, mais les phénomènes de fécondation sont encore si obscurs chez les Myxomycètes! Leur sporulation se fait-elle après autogamie, caryogamie ou chromidio-gamie?

Z tych doświadczeń Torrenda wynika, że jest on pierwszym badaczem, który nakreślił najważniejszy plan badań nad rozwojem płciowym u Śluzowców.

Autorem wszakże, który najśmielej wypowiedział się w tej sprawie, i który najgłębiej poruszył problemat płciowości Śluzowców, był E. Jahn. Prowadził on swe badania nad rozwojem kilku gatunków: *Ceratiomyxa*, *Badhamia utricularis*, *Didymium difforme*, *Didymium nigripes*, *Stemonitis fusca*, *Physarum didermoides* i innych i zreasumował je w pracy p. t. „Der Sexualakt“ ogłoszonej w r. 1911 (10).

Przekonał się najpierw, że w pewnym momencie w tworzących się sporangjach wszystkie prawie jądra dzielą się. Z podziałem tym, który Jahn uważa za redukcyjny związane jest powstanie zarodników. Każdy wobec tego zarodnik jest jednostką haploidalną. Skoro zaś istnieje podział redukcyjny, to zdaniem Jahn'a można wyraźnie mówić o płciowości u Śluzowców.

Na początku swych badań (1907) Jahn był zdania, że haploidalne zarodniki kielkując, wydają haploidalne pływki, a potem takie myksameby. Te ostatnie po kilkakrotnym podziale łączą się po kilka, tworząc wspólne plazmodjum, z haploidalnymi jądrami. Pod koniec okresu wegetacyjnego, na krótko przed owocowaniem jądra, te łączą się parami (karyogamja). Pewien wszakże odsetek jąder nie łączy się i ulega zwyrodnieniu. Na krótko przed owocowaniem, połączone jądra (a więc diploidalne) znów się dzielą i wydają w ten sposób haploidalne jądra przyszłych zarodników.

Pogłębiając to zagadnienie na *Badhamia utricularis* (1911), krórego plazmodja są bardzo łatwe do hodowania, Jahn odrzucił tylko co wyłuszczoną koncepcję, stwierdzając co następuje: „Die erste verhältnismässig späte Stadien enthaltende Serie, die ich so gewann, entsprach durchaus meinen Hoffnungen. Im Plasma der Sporangienanlagen fanden sich wiederum stellenweis kopulierende Kerne. Dann aber bekam ich zusammenhängende Reihen, die bis auf den vegetativen Zustand zurückgingen, und das Ergebnis war, dass keine Spur einer allgemeinen Karyogamie zu finden war: die vegetativen Kerne glichen ganz denen in jungen Sporangien. Ja, was mir schon bei *Ceratiomyxa* aufgefallen war, die kopulierenden Kerne lagen niemals in normalen,

sondern immer im degenerierenden Plasma, und der Verdacht bestand dass die Kopulation nur eine Folge der Degeneration sei.“

Dziwnem się wydaje, że Jahn uważa zlewianie się jąder plazmodjum za akt zwyrodnienia, twierdząc jednocześnie, że w końcowym stadium owocowania następuje redukcyjny podział i powstanie jąder haploidalnych, z których każde stanie się jądrem przyszłego zarodnika.

Jeżeli wobec tego zlewianie się jąder w dojrzewającym plazmodjum, jest oznaką ich zwyrodnienia, to jakiego charakteru są te jądra, które ulegną później redukcyjnemu podziałowi.

Daleko wyraźniej wypowiada się Jahn w przedostatnim fragmencie (1911) wyżej zacytowanej swej pracy, opisując cykl rozwojowy u *Physarum didermoides*. Sprawa miałaby się przedstawiać w następujący sposób. Zarodniki tego gatunku kiełkując bardzo łatwo, wydają pływki, które już po pierwszym swym podziale przechodzą w myksameby. Każda myksameba dzieli się jeszcze trzy lub czterokrotnie. Potem powstają bardzo liczne maleńkie plazmodja.

Każde plazmodjum jest wynikiem połączenia się i zlania zarówno plazmy jakoteż i jąder dwu myksameb haploidalnych: jądro przeto jego jest diploidalnem i w trakcie dalszego rozwoju młodego plazmodjum dzieli się karyokinetycznie. Jahn odróżnia młode jednojądrowe plazmodja od zwykłych myksameb haploidalnych według wielkości i struktury masy plazmatycznej dwu tych istot. Młode plazmodja są silnie zwakuolizowane i wakuole te zachowują się podczas ich podziału, zwykłe natomiast ameby są daleko słabiej zwakuolizowane, a podczas podziału pozbawione są wakuol zupełnie. Dwa lub kilka młodych jednojądrowych plazmodjów mogą się połączyć i zlać w jedno większe plazmodjum. Pozatem Jahn twierdził, że haploidalne ameby *Physarum didermoides* wykazują w trakcie podziału po 8 chromosomów; gdy jądra młodych plazmodjów mają ich mniej więcej liczbę podwójną.

W tym samym czasie co i praca Jahna, (1907) ukazało się w 1907 r. gruntowne Studium Heleny Krenzlin p. t.: „Zur Entwicklungsgeschichte der Sporangien bei den Trichien und Arcyrien“ (13). Autorka, na dostarczonym jej przez Jahna materiale, na drodze badań cytologicznych, starała się wyjaśnić przedewszystkiem ostateczne fazy w rozwoju zarodni u kilku przedstawicieli rodziny *Trichiaceae* i *Arcyriaceae*.

Plazma młodych sporangjów według wymienionej autorki wykazuje wyraźne zróżnicowanie. Plazma zewnętrznej części tworzących się zarodni jest zbita (*dichtes*), zaś cała plazma głębinowa jest zwakuolizowana.

Jądra dzielą się karyokinetycznie z uwzględnieniem stadij synapsis i wyraźnej diakinezy. Karyokineza przed powstaniem zarodników jest heterotypowa, zaś podział pływek wygląda na podział redukcyjny.

Sprężynki powstają z centrosomów, które wyłaniają się z wielobiegunowej figury podziałowej.

Nie wchodząc w ocenę wyników badań autorki, pragnę stwierdzić jedynie, że takowe rzucają wiele światła na najciemniejszą stronę zagadnienia rozwoju Śluzowców, mianowicie na tworzenie się zarodników, oraz włośni, której powstanie z nieco odmiennego punktu widzenia oświecili w 1914 r. Harper i Dodge.

Jeszcze jednym zagadnieniem, które interesowało badaczy, zajmujących się Śluzowcami, był aparat bazalny pływek. Sprawą tą zajął się bliżej H. Plenge w 1899 r., o pracy którego wspominam nieco dalej (str. 306).

W ogłoszonej przeze mnie pracy w 1920 r. (19), po paru wstępnych notatkach, opisałem cykl rozwojowy dwu gatunków *Didymium nigripes* oraz *Dictyostelium mucoroides*.

Przypomnę tu w kilku słowach wyniki moich badań, dotyczących jedynie *Didymium nigripes*, jako należącego do tego samego rodzaju co i *Didymium difforme*.

Pływki w krótkim czasie po wyjściu z zarodników dzielą się podłużnie. Podział ten zaczyna się od jądra i biczyska i kończy się na tylniej t. j. grubszej części pływki. Podział taki powtarza się kilkakrotnie, poczem pływki przechodzą w myksameby. Myksameby dzielą się w dalszym ciągu. Jak pierwsze tak i drugie dzielą się karyokinetycznie.

Poczem myksameby łączą się parami. Ze zlania się dwu myksameb płciowo różnych, powstaje zygota, która jest początkiem plazmodjum.

By dokładniej wyjaśnić istotę zjawisk zachodzących w pierwszym zwłaszcza okresie rozwoju *Didymium nigripes*, zakładałem kultury jednozarodnikowe.

W kulturach tych tworzą się pływki, myksameby i wreszcie zygoty z połączenia się dwu myksameb płciowo zróżnicowanych. Przez otrzymanie zygot w kulturach monospermalnych dowiodłem, że wszystkie zarodniki u tego gatunku są jednakowe, czyli potencjonalnie dwupłciowe, a nie zróżnicowane płciowo, jak tego chciał Pinoy.

Przez wydzielanie pojedynczych pływek i myksameb i hodowanie takowych oddzielnie dowiodłem, że rozdział płciowo zróżnicowanych elementów i tworzenie się w ten sposób gamet (+) i (−) odbywa

się nie przy pierwszym podziale pływki, a dopiero podczas jej dalszych podziałów.

Z badań tych wynika, że *Didymium nigripes* jest gatunkiem homotalicznym w sensie Blakeslee'go, gdyż z jednego zarodnika można otrzymać dwa rodzaje myksameb — gamet, zygotę plazmodjum oraz proces owocowania. Na tem zamykam krótki zarys historyczny dotychczasowych poglądów na rozwój Śluzowców i przechodzę do opisu rezultatów otrzymanych przeze mnie w latach ostatnich.

Do badań nad rozwojem *Didymium difforme* zastosowałem podwójną metodę: makroskopową (in vitro) i mikroskopową. Zastosowanie dwu tych metod łącznie jest niezbędnem dla należytego wyjaśnienia główniejszych etapów w cyklu rozwojowym Śluzowców.

Dla badań makroskopowych używałem pożywek agarowych według przepisów podanych w części pierwszej niniejszej pracy. Dla badań zaś mikroskopowych zakładałem mikrokultury z zastosowaniem zwykłych szkiełek przedmiotowych oraz szkiełek przykrywkowych. Te ostatnie muszą mieć bardzo mały rozmiar (5 mm²) ze względu na łatwiejsze przewietrzanie pożywki. Szkiełko przykrywkowe oparte jest na czterech kuleczkach z wysterylizowanego wosku.

Jako pożywki dla mikrokultur używałem wysterylizowanych wyciągów z siana, z marchwi lub płynu zebranego na dnie próbówki, zawierającej jedną z wyżej wspomnianych pożywek agarowych. Dla badań przyżyciowych pierwszych stadiów rozwoju należy używać pożywek takich, w których pływki i myksameby czułyby się dobrze, ale w których rozwój bakterji byłby minimalny. Do tego celu nadaje się lekki (10⁰/₀₀) wywar z siana. W tej pożywce bakterje rozmnażają się słabo, wobec tego nie maskują one, lub przynajmniej w małym stopniu, pływek lub myksameb, które obserwujemy pod mikroskopem.

Ostatnio zastosowałem do tego rodzaju mikrokultur specjalne pożywki, którą otrzymałem z przegotowania starego podłoża agarowego na wywarze marchwiowym, na którym odbył się już raz całkowity cykl rozwojowy *Didymium difforme*. W tej pożywce bakterje rozwijają się, rzecz naturalna, bardzo słabo ze względu na obecność w niej produktów wydaliniowych po bakterjach, które się rozwijały na tejże pożywce wspólnie ze Śluzowcem. Rozwój Śluzowca w takiej pożywce jest również słabszy ilościowo, ale zupełnie normalny, mniejsza liczba pływek, myksameb i plazmodjów, jak również zupełny prawie brak bakterji ułatwia w wielkim stopniu obserwację stopniowego ich rozwoju za życia.

Gdy użytą zostanie pożywka bogata w związki odżywcze, wtedy rozwój bakterij i Śluzowca jest wprawdzie bardzo silny, lecz obserwacja poszczególnych stadiów tego ostatniego jest wprost niemożliwa.

Mikrokultury trzymane stale były w wilgotnej atmosferze w szalkach Petrie'go lub w zakrytych krystalizatorach w temperaturze 16—18° C. W tych warunkach pożywka mikrokultur nie wysycha i koncentracja jej pozostaje cały czas niezmienna.

Kultury tego rodzaju dają bardzo dobre wyniki, cykl rozwojowy odbywa się w nich całkowicie aż do owocowania włącznie. To ostatnie dochodzi do skutku, oczywiście nazewnątrz pożywki, na powierzchni szkiełka przedmiotowego lub przykrywkowego.

Ponieważ wszystkie stadja rozwojowe^e odbywają się tuż przy brzegu szkiełka przykrywkowego t. j. w strefie pożywki najbogatszej w tlen, można przeto z nadzwyczajną łatwością utrwalić takie mikrokultury nie naruszając absolutnie ich harmonij.

Jako utrwalaczy używałem odczynnika Bouin'a zmodyfikowanego, Flemminga normalnego, Bendy, 2^o/_o kwasu osmowego, Zenker'a oraz Regaud. Normalny Bouin dobrze utrwała jądro, lecz komórki zbyt silnie kurczą się i deformują pod wpływem jego działania, a struktura plazmy ulega bardzo silnej pertrubacji, w związku z jej popękaniem.

Zmodyfikowany Bouin, w skład którego wprowadzam: 10 części kwasu pikrynowego nasyconego, 2 części formaliny 40^o/_o, 1 część kwasu octowego, oraz wody dystylowanej w proporcji 1:1, dał mi bardzo dobre rezultaty, zarówno w stosunku do plazmy jak i do jądra. Nie zmienia bowiem ogólnych konturów komórki, jak również i jej struktury wewnętrznej.

Flemming normalny oraz Benda dobrze zachowują ogólną strukturę komórek, gorzej natomiast utrwalają jądra.

Doskonałym utrwalaczem okazał 1^o/_o kwas osmowy. Pływki, myksameby i plazmodja nie ulegają prawie żadnym zmianom pod jego wpływem; pierwotna struktura poszczególnych tych istot jest znakomicie zachowana i można ją badać nie uciekając się do techniki barwienia. Przekonałem się, że stosowanie odpowiednich barwników, czy to na jądro, czy na plazmę nie daje po tym utrwalaczu dobrych wyników. Obrazy są zazwyczaj mętne.

Dobrym okazał się i Zenker, zwłaszcza na jądro. Po tym utrwalaczu (obok Bendy) otrzymałem bardzo piękne figury karjokinetyczne w pływkach oraz myksamebach. Najgorszym utrwalaczem okazał się Regaud. Powodował on kurczenie się, skręcanie, a nawet pęknięcie pływek oraz myksameb.

Ponieważ pływki w późniejszych stadiach, myksameby oraz plazmodja przyklejają się całkowicie do szkiełka przedmiotowego lub przykrywkowego, utrwalam je bezpośrednio przez zapuszczenie utrwalacza pod to ostatnie, wyprowadzając jednocześnie pożywkę przy pomocy kawałka bibuły, z przeciwległej strony. W ten sposób mogłem obserwować pod mikroskopem zachowanie się komórek w momencie przenikania utrwalacza, oraz zmiany jakie zachodzą w ich wnętrzu.

Utrwalone preparaty barwiłem przeważnie: hematoksyliną żelazową i zielenią jasną (Lichtgrün), hematoksyliną żelazową i eozyną, safraniną i zielenią jasną, oraz fuksyną kwaśną w połączeniu z błękitem toluidynowym i aurantią.

Najlepsze wyniki na wybarwienie jąder dawała mi hematoksyлина żelazowa po utrwaleniu zmodyfikowanym płynem Boun'a. Dla barwienia plazmy i ewentualnie istniejących w niej organoidów, używałem również hematoksyliny żelazowej po utrwaleniu Flemmingiem, jak również stosowałem metodę potrójnego barwienia fuksyną kwaśną, błękitem toluidynowym i aurantia, po uprzednim utrwaleniu odczynnikiem Benda.

W pracy niniejszej cała moja uwaga była zwrócona przede wszystkim na jądro, jego strukturę i jego zachowanie się w trakcie poszczególnych stadiów cyklu rozwojowego.

Całego szeregu zagadnień, związanych ze strukturą plazmy poszczególnych jednostek rozwojowych, jak np. sprawy chondriosomów, utworów ziarnistych, powstawania i struktury wakuol, zasadniczo w pracy tej nie chcę poruszać, a jako zagadnieniom zbyt specjalnym pragnę poświęcić, nieco później, pracę specjalną, opartą na szerszym materiale dowodowym.

Zarodniki *Didymium difforme*, umieszczone w kropli płynu odżywczego, przykrytej szkiełkiem przykrywkowym, według wyżej podanej techniki, zaczynają po kilkunastu godzinach (od 12—15 godz.) kiełkować. Zanim to jednak nastąpi, każdy zarodnik po kilku już godzinach przebywania w pożywce ulega dość znacznej zmianie: jego kontury zaokrąglają się, błona z ciemno brązowej przechodzi w jasno brązową i staje się więcej delikatna i przezroczysta tak, że widać przez nią bardzo wyraźnie jądro i wakuole. Błona taka jest łatwo przepuszczalna dla utrwalaczy i barwników. Plazma i jądro zarodnika zabarwiają się zupełnie normalnie np. pierwsza zielenią jasną, drugie zaś hematoksyliną żelazową. W zabarwionych w ten sposób zarodnikach mogłem często obserwować podział karjokinetyczny jądra (Tabl. V, fig. 3); chromosomy były wtedy bardzo wyraźne, gorzej widać włókna

wrzeciona achromatynowego. Istotnie, treść większości zarodników — co jest zasadą u *Didymium difforme* — dzieli się na dwie równe części i podział ten jest karjokinetyczny. Z takich zarodników podczas kiełkowania wydobywają się zamiast jednej, dwie niezależne od siebie masy plazmatyczne, obdarzone każda jądrem.

Jeżeli zarodniki są równomiernie rozmieszczone na całym terenie mikrokultury, można wtedy zaobserwować bardzo charakterystyczne zjawisko. Mianowicie: kiełkowanie zarodników nie odbywa się jednocześnie na całej przestrzeni tej ostatniej, najpierw i najszybciej kiełkują zarodniki, znajdujące się w strefie zewnętrznej, oznaczonej na podanym schemacie literą *a*, wolniej kiełkują zarodniki położone w strefie *b*, najpóźniej kiełkują te z nich, które spoczywają w strefie wewnętrznej (*c*), a te które znajdują się w samym środku kultury

Ryc. 27, Schemat mikrokultury, w której oznaczone są trzy strefy zależnie o szybkości i liczby kiełkujących zarodników.

Croquis d'une microculture représentant trois zones de germination des spores. Celles-ci germent les plus facilement en (a) et le plus difficilement en (c).

nie kiełkują zupełnie. To też im mniejsze jest szkiełko przykrywkowe, tem większy procent zarodników wykiełkuje i odwrotnie.

Jeżeli świeżo założoną mikrokulturę zalać szczelnie ze wszystkich stron parafiną, wtedy bardzo nieznaczny odsetek zarodników będzie mógł wykiełkować. Wynika z tego, że proces kiełkowania zarodników jest w ścisłej zależności od obecności tlenu. Dalsze zwłaszcza stadja rozwojowe przy utrudnionym dostępie tego ostatniego są zupełnie uniemożliwione. Muszę jednak zaznaczyć, że pewien procent zarodników pomimo znajdowania się w dogodnych warunkach nie kiełkuje nigdy. Obecność takich zarodników stwierdziłem we wszystkich ciachach owocowych nie tylko *Didymium difforme*, ale i u wszystkich innych gatunków, z którymi miałem do czynienia. Te nie kiełkujące zarodniki staną się niezawodnym łupem przyszłych plazmodjów. Trudno jest określić przyczynę, dla której one nie kiełkują; ta ostatnia musi tkwić w strukturze wewnętrznej, prawdopodobnie w samej proto-

plazmie, gdyż zewnętrznie nie różnią się one absolutnie od zarodników normalnie kiełkujących.

Sam akt kiełkowania rozpoczyna się od stopniowego pęknięcia, w kilku kierunkach, błony zarodnikowej. To pęknięcie zaczyna się od kapturka, który zawczasu staje się coraz cieńszym. Obserwując pod mikroskopem stopniowe stadia kiełkowania widzimy doskonale zarysowujący się nieregularny otwór, przez który wydobywają się masy plazmatyczne, powodujące dalsze rozsadzenie błony zarodnikowej.

Sam okres kiełkowania, a właściwiej mówiąc, wyswabadzania się mas plazmatycznych z błony zarodnikowej trwa, w normalnych warunkach, od chwili utworzenia się otworu od 2 do 3 godzin. Masy plazmatyczne w tym momencie nie wykazują absolutnie ameboidalnych ruchów i po wyswobodzeniu się z błony zarodnikowej posiadają postać kulistą i są zupełnie przez pewien czas nieruchome. Wewnątrz każdej widać jądro i jedną lub dwie wodniczki. Następnie każdy taki, nowopowstały osobnik wytwarza wić, której wzrost stopniowy można łatwo obserwować. Ta ostatnia rośnie od podstawy i robi wrażenie wyłaniania się z głębi masy plazmatycznej. Jednocześnie całe ciało komórki wydłuża się, jeden z biegunów jest rozszerzony i przeważnie zlekka rozczłonkowany, przeciwległy zaś biegun zaopatrzony w wić jest silnie zaostroszony. W ten sposób powstaje pływka, która mierzy wraz z wicią około 40 mikronów. Sama komórka bez biczyka mierzy około 25 mikronów.

Plazma pływki posiada niejednakową strukturę: tylna jej część (szersza) jest mocno ziarnista i zwakuolizowana. Wakuole rozmieszczone są przeważnie na samym brzegu grubszej części pływki. Obwodowa część plazmy jest szklista (hyaloplazma) i pozbawiona zupełnie ziarnistości. Przednia natomiast część pływki jest daleko mniej ziarnista. W niej to stale występuje jądro. Przekonałem się, że jeżeli tworzące się pływki umieścić w silnym świetle, to powstające wici momentalnie się kurczą i zupełnie znikają, i wszystko powraca do pierwotnego stanu¹⁾.

Bardzo ważnym szczegółem w budowie pływki jest stosunek jądra do biczyka. Jak wykazały już badania Jahn'a (9) pomiędzy

¹⁾ Według Lister'a „This is at first a somewhat tentative process, and the flagellum is frequently withdrawn; but within a quarter of an hour it acquires its full length of about 15 μ , and by its lashing strokes the swarm-cell swims off with a dancing movement“. (14) Obserwacja Lister'a jest zupełnie trafna, tylko tłumaczenie tego zjawiska jest mylne, gdyż zanikanie powstającego biczyka jest jak już powiedziałem wyżej powodowane przez światło, idące od lusterka mikroskopu. Toteż obserwacja tego stadium powinna się odbywać przy mocno zmniejszonej diafragmie.

jądrem i biczykiem, istnieje bezpośrednia łączność. Według Jahn'a (9) na biegunie wrzeczona achromatynowego występuje silnie barwiące się hematoksyliną ciało, które jest niczem innym, jak centrosomem. Otóż centrosom ten stanowi podstawę przyszłej wici. Ta ostatnia powstaje bardzo wcześnie, bo w trakcie już podziału jądra. Jahn przeprowadził swe badania na *Stemonitis flaccida*, *Reticularia lycoperdon* i *Amaurochaete fuliginosa* i stwierdził pozatem, że u dobrze ukształtowanych pływów jądro połączone jest z bazalnym ciałkiem wici (z centrosomem) dzwonkową częścią łączną, którą już dawniej widział u Śluzowców Plenge. Dzwonkowaty ten łącznik nie barwi się hematoksyliną i nie stwierdził on w nim nitki łączącej wici z jądrem. Stwierdził tylko obecność delikatnych podłużnie biegnących prążków.

Jahn dochodzi wreszcie do wniosku, że „aparat łączący“ pomiędzy jądrem a rzęsą jest resztą (może powiększoną) wrzeczona achromatynowego, a ciemniej barwiące się ziarno u podstawy rzęsy jest identyczne z centrosomem tegoż wrzeczona.

Wydaje mi się, że pogląd Jahn'a na charakter centrosomalny ciała bazalnego biczyka jest niezupełnie słuszny, gdyż u *Didymium difforme* stwierdziłem z całą pewnością brak tych organoidów. Jeżeli natomiast chodzi o bezpośrednią zależność wici od jądra, to Jahn ma do pewnego stopnia rację.

Gdy się dokładnie bada za życia, jako też i po utrwaleniu strukturę i ewolucję pływki, to nabiera się pewności o tej właśnie ściślej łączności pomiędzy jądrem a wicią. Można śmiało powiedzieć, że całkowicie wykształcona pływka obdarzona jest zamkniętym w sobie aparatem jądrowo-wiciowym.

Skoro zarodniki kielkują, to jądro energidyt otoczone jest delikatną warstewką zupełnie przeźroczystej i równomiernie rozmieszczonej hyaloplazmy, którą można z łatwością obserwować zarówno za życia, jak i po utrwaleniu. Grubość tej warstwy może być różna: u niektórych osobników jest ona bardzo delikatna i ledwo dostrzegalna, u innych natomiast jest bardzo silnie rozwinięta i całość robi wtedy wrażenie wakuoli napełnionej przeźroczystą i bezzbarwną substancją, w której pogrążone jest jądro. Toteż u niektórych badaczy francuskich spotykamy się z terminem niewłaściwym wakuoli jądrowej (*vacuole nucléaire*). Tego samego terminu użył zresztą i Jahn.

Skoro istota, o której wyżej była mowa, przekształca się w pływkę, wtedy jądro wraz z hyaloplazmatyczną otoczką przechodzi na jeden z biegunów wydłużającej się masy plazmatycznej. Jednocześnie otoczka

ta wyciąga się w kierunku zwężającej się mocno części tej ostatniej i jakby starała się w nią wcisnąć. Na mocno zaawansowanych osobnikach można widzieć wyraźnie wsuwanie się stożkowato wydłużonej hyaloplazmatycznej otoczki w sam szczyt pływki i wreszcie lekkie wychylenie się tej ostatniej nazewnątrż. Wysuwający się nazewnątrż czubek hyaloplazmatycznego stożka wzdyma się nieco, tworząc pęcherzyk, od którego odchodzi wić (Tabl. XVI, fig. 8).

Wewnątrz pęcherzykowatego tego zakończenia znajduje się ziarnisty utwór, silnie załamujący światło. Barwi się on hematoksyliną żelazową na czarno, lub fuksyną kwaśną na czerwono. Można go wykryć również bardzo dobrze przy pomocy alkoholowego roztworu jodu: barwi się on wtedy na ciemno-brązowo.

Czem jest owe ciało, zamknięte w pęcherzykowatej przestrzeni? Czy należy je traktować jako zwykłe pojedyncze ciało bazalne, czy też jako blefaroblaste? Jaki jest jego początek, jego rola w aparacie jądro-wiciowym, wreszcie jaki jest jego stosunek do jądra i wici? Oto pytania, na które trudno mi jest narazie dać wyczerpującą odpowiedź.

Na wstępie muszę zaznaczyć wyraźnie, że ciało to nie jest centrosomalnego pochodzenia, ani też samym centrosomem, gdyż nie stwierdziłem nigdy podobnych organoidów ani u *Didymium difforme*, ani u *Didymium nigripes*, podczas podziałów karyokinetycznych pływek i myksameb. To, co autorowie prac nad Śluzowcami przyjmują za centrosomy, nie jest niczem innem, według mnie, jak zwykłym skupieniem barwnika, uwięzionego w łączących się nitkach szczytowych części wrzeciona achromatycznego. Obecność lub nieobecność tych artefaktów, o niewyraźnych zarysach, zależna jest od lepszego lub gorszego zróżnicowania preparatu. Istotnie otrzymałem tego rodzaju preparaty, na których jedne figury karyokinetyczne opatrzone są temi pseudocentrosami, inne zupełnie ich są pozbawione; na innych wreszcie występuje jeden tylko taki pseudocentrosom, na jednym szczycie wrzeciona achromatynowego. Gdyby naprawdę występowały tu centrosomy, miałyby one pewną stałą formę i widziałbym je stale we wszystkich podziałowych figurach jądra.

Pogląd mój na pochodzenie owego organoidu popiera Jeanne Terby (26) w pracy swej nad *Plasmodiophora brassicae* Wor. Jest ona zdania, że organoid ten nie jest centrosomalnego pochodzenia. Organoidy, które występują podczas kinez sporogonalnych i zdradzają zupełnie charakter centrosomów, nie mają z nimi nic wspólnego. Terby wyraźnie zaznacza: „Du fait que nous n'avons jamais, dans cette prophase de première cinèse sporogonique trouvé les deux

granules apparaissent indépendamment l'un de l'autre, chacun en l'un des points qui devienra l'un des pôles du futur fuseau“.

I dalej autorka mówi: „Le granule de *Plasmodiophora* ne répond donc pas, d'après cette description à la definition d'un centrosome: élément qui se divise en deux pour former les contres d'irradiations des fibres du fuseau“.

Każda komórka przeznaczona na zarodnik otrzymuje jedno takie ciało, które w następstwie stanie się podstawą wici przyszłej zoospory. Jest to według autorki blefaroblast.

Według mnie nie jest utwór ten typowcm blefaroblastem, albowiem, zgodnie z poglądami Grassé blefaroblast jest organoidem złożonym.

Zresztą ta sprawa jest dosyć ciemna, co widać z oświadczenia Janickiego w jego pracy nad wiciowcami pasożytniczymi (11): „Derart weist schon die obige kurze Übersicht darauf hin, dass ein einheitlicher Begriff des Blepharoblasten erst auf Grund von vergleichenden eingehenden Studien ausgearbeitet werden muss und dass allgemeinere Schlussfolgerungen vorderhand mit Reserve aufzunehmen sind“ (str. 685). Ograniczając się narazie do powyższych uwag, zaznaczę jeszcze, że najwięcej danych, wziętych z literatury jak i z moich obserwacji, przemawiałoby za tem, że mamy tu do czynienia z ciałkiem bazalnym (corpusculum basale).

Niezależnie od tej kwestji wchodzi tu w grę inny ważny szczegół dotyczący struktury hyaloplazmatycznego aparatu na przestrzeni pomiędzy jądrem, a nasadą wici. Jahn twierdzi, że pomiędzy nasadą biczyka, a samym jądrem bieżną delikatne, mniej lub więcej widoczne prążki, które są niczem innem jak wzmocnionymi włóknami dawnego wrzeciona achromatynowego. Dowodziłoby to, że po podziale jądra wrzeciono achromatynowe dzieli się na dwie połowy i każda połowa, zachowująca pierwotną strukturę przechodzi wraz z jądrem do nowoutworzonej komórki. Następnie, kiedy ta ostatnia przekształca się w pływkę, jądro wraz z trwającą stale połową wrzeciona przenosi się na zwężony biegun tej ostatniej.

Z tego co widziałem zdaje się wynikać, że twierdzenie Jahn'a oparte jett na bardzo kruchych przesłankach. Bo jakżesz można sobie wyobrazić, wychodząc z ogólnych zasad podziału karyokinetycznego jądra, by wrzeciono zostało podzielone na dwie części i każda z nich przetrwała aż do czasu przekształcania się myksameby w pływkę?

Przeczą wszakże jego poglądom następujące fakty. Każde jądro, czy to meksameby, czy pływki, czy wreszcie plazmodjum, składa się z dwu części: a) z części achromatynowej, bardzo słabo barwiącej

się barwnikami chromatynowymi i b) z części chromatynowej (karyosomu), która silnie się wybarwia i zajmuje zazwyczaj sam środek jądra. Przy pomocy stosowanych przeze mnie środków technicznych, mogłem stwierdzić siateczkową budowę części achromatynowej jądra. Całe jądro, jak już wyżej zazaczyłem, otoczone jest hyaloplazmatyczną warstwą, którą łatwo jest odróżnić od tej części jądra, która otacza karyosom. Warstwa ta jest bardzo elastyczna, rozciągliwa, toteż może ona przyjmować różne postacie w różnych fazach rozwojowych danego osobnika. I tak w stadium myksameby jest ona zupełnie dopasowana do formy jądra, w stadium pływki przyjmuje formę wyciągniętego worka (dzwonka), na dnie którego spoczywa jądro, a od szczytowej stożkowatej jego części, wciskającej się w ostrze pływki, odchodzi więc i wreszcie w trakcie podziału jądra warstwa hyaloplazmatyczna rozciąga się stanowiąc teren, w obrębie którego zachodzą wszystkie fazy podziałowe. Widzimy, że jądro jako takie w żadnym wypadku nie opuszcza hyaloplazmatycznego terenu i ściśle z nim jest związany. Jeżeli do tego dodam, że 1^o wrzeczono achromatynowe podczas podziału jądra, czy to meksameby, czy pływki, tworzy się wyraźnie z achromatynowej sieci, że 2^o pochodne komórki otrzymują każda część hyaloplazmatycznej powłoki, że 3^o pochodne jądra wykazują identyczną strukturę ze spoczynkowym jądrem macierzystym, to wyda się teraz jasnym, dlaczego mój pogląd na sprawę zależności wici od jądra koliduje z poglądem Jahn'a.

Niteczki, które biegną od jądra ku nasadzie wici, a które Jahn niewłaściwie wziął za wzmocnione włókna dawnego wrzeczona achromatynowego, są wytworem hyaloplazmatycznej otoczki jądra. Przekonałem się, że najlepszym i najprostszym sposobem na ujawnienie struktury całego aparatu jądrowo-wiciowego jest zwykły alkoholowy roztwór jodyny. Pod działaniem tego odczynnika można stwierdzić odrębność wspomnianego wyżej aparatu od reszty ciała komórkowego i odróżnić w nim wszystkie szczegóły, a szczególnie niteczki łączące pęcherzykowatą nasadę wici z jądrem. Przy należytem nastawieniu światła można stwierdzić bezpośrednią łączność pomiędzy temi niteczkami, a częścią achromatynową jądra. Zwłaszcza po utrwaleniu odczynnikiem Bandy i zabarwieniu fuksyną kwaśną, błękitem tolnidynowym, aurantią — można uwydatnić na samym brzegu achromatynowej części jądra, istnienie drobniotkich ziarenek, z których każde stanowi nasadę poszczególnych niteczek (Tabl. XVI, fig. 7 i 8).

Cały przebieg tworzenia się pływki jest bardzo krótki i odbywa się na jednym i tem samym miejscu. Dopiero po zupełnem jej ufor-

mowaniu się; pływka zaczyna się poruszać. Ruchy te są początkowo pełzające, poczem pływka odrywa się od podłoża i rozpoczyna ruchy śrubowe. Jak w pierwszym tak i w drugim wypadku pływka porusza się wicią naprzód.

Jeżeli pływkę w stadium ruchu czołgającego umieścimy w silnym świetle, to momentalnie odrywa się ona od podłoża i nabiera gwałtownego ruchu śrubowego. Dłuższe działanie światła powoduje osłabienie ruchu, opadnięcie pływki na podłoże, jej stopniowe zaokrąglanie się i zanik wici. Pływka w ten sposób przechodzi w stadium mikrocysty. Po usunięciu wpływu światła, cysta znów przeistacza się po krótkim czasie w pływkę.

Wiadomem jest, że pływki wszystkich badanych Śluzowców dzielą się i liczba tych podziałów może być różna u różnych gatunków Śluzowców. Jakkolwiek niektórzy badacze tych organizmów starali się podać ściśle liczby tych podziałów jako charakterystyczne dla poszczególnych gatunków, to jednak zdaje mi się, że wartość tych obliczeń jest wątpliwa. Stwierdziłem bowiem, że liczba podziałów jednej i tej samej pływki zależną jest od ilości pożywki: im ta ostatnia jest obfitsza tem liczniejsze są podziały i odwrotnie. A mogą przecież wejść w grę i inne czynniki, jak natężenie światła, temperatura, koncentracja pożywki, łatwiejszy lub trudniejszy dostęp tlenu.

Ostatecznie szczegół ten nie ma znaczenia dla poznania główniejszych etapów cyklu rozwojowego Śluzowca.

Biorąc pod uwagę sam akt podziału pływki, przekonałem się, że u *Didymium difforme* polega on na tem, iż pływka przed samym podziałem przechodzi w stan spoczynkowy, wciąga biczek, zaokrągla się i staje się nieruchomą bryłką, zachowującą kilka wakuol. Poczem jądro dzieli się karjokinetycznie na dwa pochodne jądra, następstwem czego jest podział całego ciała plazmatycznego na dwie prawie równe części. Każda z tych części po kilkunastu minutach spoczynku przekształca się, w wyżej opisany sposób, w pływkę. Ponieważ podziały pływek, a w następstwie i myksameb, odbywają się tylko w ciemności i każdy podział trwa bardzo krótko, bo zaledwie kilkanaście minut, przeto aby uchwycić stadja podziałowe tych istot, we wspomnianym wyżej okresie należy przedsięwziąć wiele ostrożności oraz utrzymywać mikrokultury co krótki odstęp czasu. Przedtem należy trzymać te ostatnie przez dłuższy czas w ciemnym miejscu, lub też utrzymywać w nocy.

Wszystkie pływki po kilku podziałach zamieniają się stopniowo w myksameby. Po kilku dniach od momentu rozsiania zarodników, można stwierdzić zupełny zanik pływek i obecność samych tylko my-

ksameb. Ta metamorfoza odbywa się bardzo powoli. Najpierw pływka osiada na podłożu mikrokultury i wykonywa ruchy czołgające, zachowując dłuższy czas swą dwubiegunowość. W tem właśnie stadium można najlepiej obserwować za życia strukturę pływek, które wówczas najlepiej się utrwalają i barwią.

Pływka posuwając się wicią naprzód, przeciwległą częścią ciała pobiera bardzo aktywnie w znany już powszechnie sposób stałe cząstki pożywki lub znajdujące się w niej różne mikroorganizmy, a przede wszystkim bakterje. Poczem powoli zatracą ona swą pierwotną regularną i dwubiegunową postać i przybiera, poczynając od bieguna przeciwległego wici, nieregularną formę pełzaka. Aparat jądrowo-wiciowy zachowuje przez cały czas pierwotną swą postać. I wreszcie powstaje zwykła myksameba, obdarzona wicią. Jeżeli myksameba całkowicie przylega do podłoża, to wic jest zupełnie wolna; w tem jednak stadium nie odgrywa ona roli decydującej o ruchach organizmu jak to się dzieje u bipolarnej pływki, gdyż myksameba może poruszać się w dowolnym kierunku wlokąc wic za sobą.

Ze zmianą kształtu myksameby zmienia się stale pozycja aparatu jądrowo-wiciowego, lecz pierwotna stożkowata jego forma zostaje długi czas jeszcze zachowana. W końcu wic zostaje wciągnięta do wnętrza myksameby. Po tym fakcie aparat jądrowo-wiciowy z obwodowej części ciała myksameby przesuwa się nieco wгłąb i jego ostra część (nasada wici) traci dotychczasowy kontakt z powierzchnią ciała organizmu (Ryc. 28, fig. 7). Na utrwalonych i zabarwionych myksamebach można obserwować jego pozycję środkomórkową i prócz tego można stwierdzić w nim obecność wyraźnych niteczek, biegnących od jego ostrza ku jądom. Powoli wszystko to zanika i dotychczasowy stożkowaty aparat jądrowo-wiciowy staje się zwykłą hyaloplazmatyczną otoczką, równomiernie rozmieszczoną dokoła jądra. W tem leży najgłówniejszy argument, przemawiający przeciwko wrzecionowatemu pochodzeniu aparatu jądrowo-wiciowego.

W trakcie mych obserwacji nad ewolucją pływek zdołałem podpatrzeć kilka ciekawych momentów. Zauważyłem, że często w niektórych mikrokulturach, w których okres pływek już się skończył, na nowo pojawiają się liczne pływki. Przekonałem się, że ponowne pojawianie się pływek zachodzi w tych tylko mikrokulturach, do których dodawałem wody w celu uzupełnienia częściowo wyparowanej pożywki. Poza tem, przez zupełne usuwanie pierwotnej pożywki i zastępowanie jej świeżą wywoływałem powstawanie bardzo licznych pływek. Powstają one oczywiście ze zwykłych myksameb, które już przeszły przedtem przez stadium pływek. Nowopowstałe pływki niczem

się nie różnią ani pod względem budowy, ani pod względem wykonywanych ruchów od pierwotnych, zato okres ich istnienia jest znacznie krótszy. Przez częste odnawianie pożywki mogłem dowolnie na szeregu mikrokultur przedłużać okres stadjum pływek, a tem samem opóźniać znacznie stadjum myksameb i plazmodjów.

By się przekonać jak długo stadjum pływki może trwać w stale odnawianej pożywce, przenosiłem pojedyncze pływki — co względnie łatwo mi się udawało przy pomocy cieniutkiej pipetki — do świeżych pożywek, z tych ostatnich do następnych i tak dalej. Przez to stopniowe przeszczepianie mogłem utrzymać stadjum pływki w ciągu prawie dwu miesięcy robiąc przeszczepianie co trzy dni. Wkońcu pływki przestają się dzielić, a te które się podzieliły zamieniają się w cysty.

Ryc. 28. Schematy uwidaczniające fazy przejściowe od pływki (1) do myksameby (8).

Croquis représentant les stades successifs du passage d'une zoospore (1) à une myxamibe (8).

Stwierdziłem również, że stadjum pływki może być zupełnie pominięte, bez uszczerbku dla normalnego rozwoju Śluzowca. Dzieje się to wtedy, jeżeli zamiast pożywki zupełnie płynnej użyć do mikrokultur pożywki stałej, mianowicie agaru na wywarze z marchwi i kartofla według wyżej już podanej proporcji (patrz str. 256). Kroplę gorącej pożywki agarowej umieszczałem na szkiełku przedmiotowym i kiedy takowa zastygła, wprowadzałem do niej zarodniki Śluzowca i przykrywałem następnie szkiełkiem przykrywkowym. Zarodniki wykielkowały, ale zamiast pływek powstały bezpośrednio myksameby, a następnie plazmodja. Prócz tego rozsiewałem zarodniki *Didymium difforme* na pożywce agarowej umieszczonej w probówkach w ten sposób, że część zarodników umieszczałem wpłynie zebrany na dnie probówki, część zaś na górnej części pożywki zdala od płynu. W tych warunkach:

1° W płynie powstały zupełnie normalne pływki, a następnie dopiero myksameby i plazmodja.

2^o Na górnej części pożywki agarowej powstały tylko myksameby i plazmodja.

3^o Plazmodja w płynnej części pożywki (dolnej) powstały o kilka dni później niż na części stałej (górnej). To opóźnienie w powstaniu plazmodjów tłumaczy się oczywiście tem, że jednym z ogniw cyklu rozwojowego jest właśnie stadjum pływki, które zostało pominięte w cyklu rozwojowym na pożywce stałej.

Didymium difforme przeto zachowuje się tak, jak i niektóre inne organizmy świata roślinnego, choćby na przykład *Protococcus viridis*, który jak wiadomo rozmnaża się przez podział komórki macierzystej na cztery komórki pochodne (zarodniki), wydające po uwolnieniu się z błony macierzystej niezależne organizmy. Osiągnięcie jednakże ostatecznej fazy może się odbyć w dwojaki sposób: jeżeli oswobodzone zarodniki dostaną się do wody to powstają z nich nagie pływki, obdarzone, każda dwiema wiciami, jeżeli natomiast cykl rozwojowy odbywa się na stałym wilgotnym tylko środowisku, to zarodniki przekształcają się bezpośrednio w normalne dojrzałe osobniki, z pominięciem stadjum pływek.

Z powyższych uwag wynika, że stadjum pływki uzależnione jest od stanu fizycznego środowiska, w którym odbywa się cykl rozwojowy Śluzowca i nie jest ono koniecznym dla normalnego jego rozwoju.

Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo charakterystyczne i nie opisane dotychczas zjawisko przechodzenia u *Didymium difforme* wszystkich pływek przez stadjum mikrocyst. Mianowicie pływki, będące rezultatem wielokrotnego podziału pływki macierzystej, zamiast przejść bezpośrednio w myksameby, jak to się dzieje np. u *Didymium nigripes*, przeistaczają się w mikrocysty. Powstanie tych ostatnich nie bywa wywoływane jakimiś czynnikami zewnętrznymi, lecz stanowi jedno z koniecznych ogniw cyklu rozwojowego tego gatunku.

Stadjum mikrocysty trwa zazwyczaj koło 12 godzin. Jest to okres, podczas którego całe prawie życie aktywne mikrokultury ustaje. Wszędzie widać tylko nieruchome mikrocysty, z których każda posiada wyraźną i znacznej grubości błonę przeźroczystą, poprzez którą prześwituje bardzo wyraźnie jądro oraz wakuole. Liczba tych ostatnich waha się od 1 do 3. Mikrocysty dają się z nadzwyczajną łatwością utrwaląć i barwić: jądro barwi się zupełnie jak u pływki lub myksameb normalnych i wykazuje identyczną strukturę, wakuole natomiast nie zawierają wówczas żadnych obcych ciał, np. bakterji. (Tabl. XVII, fig. 14 i 15).

Po tym okresie spoczynkowym z mikrocyst powstają już nie pływki a myksameby. Jest to jakby proces ponownego kiełkowania.

Po wyjściu masy plazmatycznej błona cysty zachowuje długi czas swą formę kulistą zupełnie regularną, aż wreszcie po kilku dniach zostaje zniszczona przez bakterje występujące w pożywce.

Często się zdarza, że treść cysty (plazma i jądro) dzieli się na krótko przed wyswobodzeniem się z błony, na dwie części. Zachodzi tu podobne zjawisko jakie możemy obserwować i w zarodnikach gotowych do kiełkowania. Podział ten jest również karjokinetyczny i poszczególne jego fazy można z łatwością dokładnie obserwować po utrwaleniu materiału Flemmingiem, lub Bouin'em i zabarwieniu hematoksyliną żelazową. Myksameby po wyjściu z cyst żywo się poruszają, pobierając bardzo energicznie bakterję, znajdującą się w środowisku. O aktywności odżywiania się mówią bardzo liczne i różnej wielkości wakuole, wypełnione licznymi nieraz bakterjami, które powoli zostają trawione. Stopniową destrukcję bakterji, wewnątrz wakuol z łatwością można śledzić za życia, stosując metodę barwienia czerwienią neutralną. Żywe jeszcze bakterje nie barwią się zupełnie, martwe zaś barwią się na ciemno-czerwono i są one wtedy bardzo dobrze widoczne na pomarańczowo zabarwionem tle wakuol. Dobre również wyniki daje utrwalenie zapomocą Flemminga lub Bouin'a i barwienie hematoksyliną żelazową. Otrzymuje się wtedy całą gamę począwszy od całych nienaruszonych jeszcze bakterji, aż do ich szczątków włącznie.

Zdaniem Pinoy proces trawienia u Acrasiatów polega na wytwarzaniu przez myksameby enzymu, który on nazwał „acrasidiastase“; enzym ten rozpuszcza żelatynę i zbliża się do trypsyny, działając, jak ta ostatnia, w środowisku alkalicznem, neutralnem lub bardzo lekko kwaśnem. Ona to jest czynnikiem dominującym w wakuolach trawiących, rozpuszczającym pobrane bakterje. Krukenberg (1878) stwierdził natomiast, w plazmodjach *Fuligo septica*, obecność pepsyny.

Nie należy mieszać tych specjalnie trawiących wakuol z wakuolami pulsującymi, któremi obdarzone są myksameby, pływki, czy też plazmodja. Najlepiej jest obserwować je przyżyciowo na myksamebach. Mogłem stwierdzić, że każda myksameba posiada jedną taką pulsującą wakuolę. Występuje ona zawsze na samym obwodzie ciała komórkowego i zachowuje stały rytm w powstawaniu i znikaniu. Czas trwania takiej wakuoli przy temperaturze 16° C, od momentu całkowitego jej utworzenia się wynosi do 10 sekund. Późem następuje gwałtowny jej zanik (wypróżnienie się); w kilka sekund potem powstaje nowa wakuola. Początkowo ma ona postać bardzo małego pęcherzyka, który powiększa się bardzo szybko do roz-

miarów poprzedniej wakuoli. Ze względu na ruchy ciała myksameby, wakuola pulsująca nie ma stałego miejsca występowania, jak się to dzieje u licznych pierwotniaków, lecz powstaje w różnych punktach nadbrzeżnej strefy komórki.

Prócz dwu wymienionych kategorii wakuol t. j. trawiących i pulsacyjnych występuje u myksameb *Didymium* jeszcze trzecia kategoria wakuol. Są to wakuole stałe, w których nagromadzony jest sok komórkowy. Ta kategoria wakuol występuje w najwcześniejszych stadiach rozwojowych, a nawet w zarodnikach. W tych ostatnich liczba ich waha się od jednej do trzech. Po wykiełkowaniu w nieruchomych i bezwładnych jeszcze osobnikach, widać wyraźnie owe wakuole, pozbawione jakichkolwiek obcych ciał stałych. Wakuole te trwają poprzez wszystkie stadia rozwojowe, nie zanikają zupełnie podczas podziału poszczególnych komórek i zachowane zostają w stadiach spoczynkowych tych ostatnich t. j. w stadiach cyst.

Liczba ich może się powiększać, mniejsze mogą się zlewać w większe, a sok w nich zawarty barwi się silnie czerwienią neutralną; już to samo różni je od wakuol trawiących i przemawia za kwasowością ich środowiska. Po utrwaleniu Flemmingiem lub Benda i zabarwieniu hematoksyliną w wakuolach tych wyraźnie powstają kuleczkowate utwory regularnie rozmieszczone i często całkowicie wypełniające całą ich przestrzeń. Określenie istoty tych utworów, jak i wogóle ewolucja i struktura poszczególnych trzech kategorii wakuol wymaga długich i subtelnych badań porównawczych, opartych na obszerniejszych materiałach dowodowych. Toteż powrócę do nich w niedalekiej przyszłości.

Jądra myksameb posiadają taką samą strukturę jak i jądra pływek: silnie rozwinięta część achromatynowa o dosyć wyraźnej strukturze siateczkowatej, zawiera w samym środku kulisty karyozom, który robi wrażenie amorfnej i mocno zwartej kropli silnie załamującej światło, barwiącej się silnie hematoksyliną na czarno.

Aby otrzymać wszystkie ważniejsze stadia podziału jądra w pływkach, myksamebach i plazmodjach, zakładałem większe serje mikrokultur w jednakowych zupełnie warunkach co do jakości pożywki, temperatury, światła oraz wielkości szkiełka przykrywkowego. We wszystkich wypadkach zarodniki użyte do rozsiania brane były z jednej i tej samej zarodni. W sześć godzin po założeniu mikrokultur, rozpocząłem utrwalanie tychże. Utrwalałem co sześć godzin po cztery mikrokultury jednocześnie, każdą innym utrwalaczem; a mianowicie: zmodyfikowanym odczynnikiem Bouina (patrz wyżej), Flemmingiem zwykłym, Flemmingiem mocnym bezoctowym (Benda) oraz Zenkerem.

Najlepsze wyniki dają, jeśli chodzi o utrwalenie poszczególnych faz podziałowych jądra, zmodyfikowany odczynnik Bouin'a oraz Benda. Barwiłem jedne preparaty hematoksyliną żelazowa i zielenią jasną, inne, po utrwaleniu Benda, fuksyną kwaśną, aurantia i błękitem toluidynowym. Potrójne to barwienie dawało mi doskonałe wyniki, gdyż dzięki jemu mogłem najlepiej uwidocznić strukturę achromatynowej sieci jądra, jak również określić w pływkach stosunek do niego niteczkowatych utworów aparatu wiciowo-jądrowego. Podział każdej myksameby poprzedzony jest całkowitym podziałem jądra.

W profazie chromatyna przyjmuje najpierw nieregularną kłaczkowatą postać, a następnie tworzy gruby i regularny sznur, przechodzący przez sam środek achromatynowej sieci (Tabl. XVII, fig. 1—4).

Następnie sznur ten dzieli się na dwie równe części, z których każda zajmuje jeden z biegunów jądra. Dwa te fragmenty chromatynowe, stanowią dwa chromozomy (Tabl. XVII, fig. 5).

W nieco późniejszym stadium część achromatynowa przyjmuje formę prostokątną przy jednoczesnym zaniku zewnętrznej błony jądra. Poza tem wyraźnie widać powstanie bardzo delikatnych niteczek, biegnących promienisto z dwu kątów prostokąta. W tej fazie dwa pierwotne chromozomy dzielą się na cztery i każdy nowopowstały chromosom sadowi się w jednym z kątów prostokąta, a właściwiej mówiąc zaczątkowego wrzeciona achromatynowego (Tabl. XVII, fig. 6 i 7). Jestto końcowa faza stadium profazy. Muszę zaznaczyć, że wszystkie te zjawiska trwają bardzo krótko i stąd są niezmiernie trudne do uchwycenia, wymagają przeto wiele materiału i czasu.

W następnym stadium — metafazie, wrzeciono achromatynowe wydłuża się znacznie, zajmując mniej więcej $\frac{3}{4}$ średnicy komórki. Jego włókna stają się bardzo wyraźne i gęsto ułożone jedne obok drugich. Chromozomy mocno zgrubiałe i krótkie (o formie serdelkowatej) układają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona i są zupełnie wolne. (Tabl. XVII, fig. 8 i 9). To stadium trwa względnie długo, może najdłużej od innych stadiów podziału karyokinetycznego; toteż spotykamy je najczęściej we wszystkich prawie preparatach.

W ostrych szczytach wrzeciona można niekiedy dostrzec obecność drobnego ziarnistego utworu, który, jak już powiedziałem nieco wyżej, należy zaliczyć do kategorii artefaktów.

Nieco później w anafazie, wrzeciono achromatynowe wyciąga się jeszcze więcej, włókna jego układają się równolegle jedne obok drugich, chromozomy zaś wędrują po dwa ku biegunom tego ostatniego (Tabl. XVII, fig. 10—12). Bieguny wrzeciona achromatynowego,

pomimo jego wyciągania się zachowują jeszcze przez pewien przeciąg czasu formę stożkową, lecz stopniowo, w miarę przesuwania się chromosomów, zanikają zupełnie (Tabl. XVII, fig. 10—12).

Jednocześnie cała komórka zwięza się w płaszczyźnie dawnej płytki równikowej. Owo przewężanie się jest coraz silniejsze i idzie w parze z przewężeniem i rozerwaniem się wrzeciona na dwie połowy. Każda z tych ostatnich kurczy się i zupełnie zanika. Chromozomy komórek pochodnych zachowują przez dłuższy czas swą odrębność zanim wytworzą nowe jądra. (Tabl. XVII, fig. 13). Nie udało mi się uchwycić przejściowych stadiów pomiędzy późną anafazą, a początkiem telofazy. Nie mam mianowicie pewności, co do sposobu podziału wrzeciona na dwie pochodne części i co do ich losu w trakcie telofazy.

We wszystkich stadiach podziałowych jądra bardzo dobrze wyróżnia się hyaloplazmatyczny teren oraz zmiany jego form w zależności od poszczególnych faz karyokinezy.

Śledząc rozwój myksameb, zdołałem zaobserwować ciekawe zjawisko fragmentacji poszczególnych osobników. Mianowicie, skoro myksameby, rozwijające się w pożywce bogatej w rozpuszczalne związki organiczne (węglowodany), umieścimy w pożywce ubogiej w te związki, a więc w środowisku o niższej koncentracji, wtedy tworzy się dokoła komórki myksamebalnej, szereg kulistych utworów co przypomina pączkującą komórkę drożdży. Utwory te pozbawione jąder po krótkim czasie odrywają się od ciała macierzystego i po kilkunastominutowym odpoczynku zaczynają się poruszać, wykonywując ruchy pełzakowate. Wewnątrz każdego z nich tworzy się od jednej do kilku wakuol. Pod względem form zewnętrznych przypominają one zwykłe myksameby. Jedną więc myksameba normalna może być rozbita na cztery lub pięć części, z których jedna tylko posiada jądro, inne zaś są bezjądrowe. Owe bezjądrowe części mogą żyć dość długi czas, bo do czterech dni. W czasie tego okresu poruszają się one, jak już powiedziałem, na podobieństwo zwykłych myksameb i mogą nawet chwycić bakterie i częściowo je trawić.

Wkońcu te bezjądrowe myksameby przestają się poruszać, zaokrąglają i zamierają, stając się pastwą bakteryj.

Fragment zaś obdarzony jądrem żyje normalnie, i w szybkim tempie osiąga pierwotną swą wielkość.

Spostrzeżenie dawniejszych autorów, (G r u b e r 1886), jak również i B e c k e r'a (1926), (7) potwierdzają fakty stwierdzone przeze mnie poraz pierwszy u Śluzowców. Muszę tu jednak podkreślić różnice w samej metodzie fragmentacji komórek. Wszyscy autorzy stosowali metodę mechanicznej dyssekcji, w moich natomiast preperatach za-

chodziła autofragmentacja komórek pełzaków pod wpływem zmiany koncentracji środowiska odżywczego.

Normalnie rozwijające się myksameby po kilkakrotnych podziałach wstępują w najważniejszą fazę rozwoju. Na wszystkich brzegach mikrokultury można gdzieś zauważyć mniej więcej w czwartym dniu po rozsianiu zarodników, łączenie się pojedynczych myksameb w pary po trzy, po cztery, lub po kilkanaście naraz. W krótkim czasie potem zespolone myksameby zlewają się z sobą we wspólne masy plazmatyczne, dając w ten sposób początek plazmodjum.

Z łatwością można obserwować w pewnym momencie wielkie ciała plazmatyczne, przypominające napozór myksameby, obdarzone dwoma, trzema, czterema lub wieloma jądrami. Nowe te istoty są mocno zwakuolizowane. Początkowo są one nieruchome, lecz po krótkim stosunkowo spoczynku zaczynają się poruszać. Równolegle zaś z poruszaniem się całego ciała plazmatycznego w jego wnętrzu powstają rytmiczne ruchy plazmy, znane od dawna u wszystkich Słuzowców. Jest to młode plazmodjum. Początkowe każde takie młode plazmodium *Didymium difforme* jest prawie kuliste i stopniowo przechodzi w formę rozgałęzioną. Żywi się ono bardzo energicznie chwytaniami i wprowadzaniem do wnętrza swego ciała bakteriami, zapóźnionami w rozwoju myksamebami, a nawet zarodnikami, które nie zdołały wykiełkować. Ciało plazmodjum wówczas szybko rośnie, liczba jego rozgałęzień powiększa się i te ostatnie łączą się z sobą w bardzo zwięzłą i misternie powiązaną siateczkę. Mikroskopijne do pewnego czasu plazmodjum, dzięki szybkiemu wzrostowi, staje się widocznym dla gołego oka.

Powiększanie objętości ciała plazmodjalnego może się odbywać w trojaki sposób: przez własny jego wzrost, przez dołączanie się do niego i zlewanie nowych myksameb, przez łączenie się i zlewanie z innymi plazmodjami, znajdującymi się w tej samej mikrokulturze.

W starszych mikrokulturach wszystkie bez wyjątku drobne plazmodja łączą się w jedno duże wspólne plazmodjum; prócz niego widać tylko liczne bakterje, oraz zaokrąglone myksameby, które z niewyjaśnionych przyczyn nie wzięły udziału w tworzeniu plazmodjum. One to właśnie stanowią teraz główny żer dla plazmodjów.

Jeżeli jednak kilka owych napozór niezdolnych do dalszego rozwoju zaokrąglonych myksameb przenieść do świeżej pożywki, o takim samym składzie jak i poprzednia, to stwierdzić można bardzo charakterystyczne zjawisko. Myksameby dotychczas nieruchome i za-

okrągłone (nie mikrocysty) zaczynają się poruszać, dążąc ku brzegom mikrokultury. Niektóre z nich przekształcają się nawet bezpośrednio w pływki. Jak pierwsze tak i drugie dzielą się szybko i w końcu na krawędziach mikrokultury gromadzą się bardzo liczne myksameby, a wkrótce potem pojawiają się między nimi mniejsze lub większe plazmodja. Mikrokultura ta niczem się nie różni od poprzedniej macierzystej mikrokultury i daje w późniejszym stadium te same wyniki co i ta ostatnie, t. j. jedno duże plazmodjum oraz liczne nieruchome i zaokrąglone myksameby, które mogą służyć ponownie jako punkt wyjścia dla nowej mikrokultury i t. d.

Można jednym słowem zakładać szeregi kultur, nieuciekając się do zarodników, a do zatrzymanych w swym rozwoju myksameb.

Zapoznanie się z temi faktami pozwala mi dopiero teraz na wyjaśnienie pewnego bardzo ważnego zagadnienia, poruszonego przez Jahn'a (10) i przeze mnie samego (19), a dotyczące właśnie roli tych wytraconych, że tak powiem, z cyklu rozwojowego myksameb. Jahn mianowicie stwierdził dla *Physarum didermoides*, że owe myksameby stanowią osobniki, które nie znalazły partnerów w okresie kopulacji. Podobne stanowisko zająłem i ja w pracy nad cyklem rozwojowym u *Didymium nigripes*.

Powyższe moje doświadczenia dowodzą wyraźnie, że Jahn i ja byliśmy w błędzie. Ameby te nie dlatego przestały się poruszać, nie dlatego nie wzięły udziału w tworzeniu plazmodjów, że nie znalazły partnerów w okresie kopulacji; bo gdyby tak istotnie było to nawet po przeniesieniu ich do świeżej pożywki nie powinniśmy otrzymać żadnego rezultatu. Należy przypuścić, że główną przyczyną tego zjawiska jest głęboka zmiana charakteru chemicznego środowiska, która w ujemny sposób wpływa na zachowanie się myksameb.

Dokładna analiza cyklu rozwojowego *Didymium difforme* doprowadziła mnie do przeświadczenia iż wiąże się on z aktem płciowym.

Dla należytego wyjaśnienia rzeczonego procesu rozpocząłem badania od zakładania kultur jednozarodnikowych. W tym celu do trzydziestu probówek, zawierających agar na wywarze z marchwi i kartofla, według wyżej już opisanego przepisu, wprowadziłem z zachowaniem wszelkich ostrożności, po jednym zarodniku. Wszystkie zarodniki do tego celu użyte pochodziły z jednego i tego samego ciała owocowego. Jednocześnie z temi jednozarodnikowymi kulturami, założyłem kultury porównawcze wielozarodnikowe na identycznej pożywce. Wszystkie kultury trzymałem w jednakowej temperaturze, w ciemności. Po kilku dniach w kulturach wielozarodnikowych pojawiły się normalne plazmodja, które w następstwie wyowocowały.

W kulturach jednozarodnikowych plazmodja nie powstały. Szczegółowa analiza mikroskopowa pozwoliła mi jednakże stwierdzić, że w każdej z tych ostatnich powstały liczne pływki i myksameby. Zrozumiałem, że mam do czynienia z jednopłciowymi elementami, pochodzącymi od płciowo zróżnicowanych zarodników. By to sprawdzić, łączyłem z wszelkimi możliwymi ostrożnościami myksameby, ewentualnie pływki dwu kultur w jednej probówce, zawierającej świeżą pożywką agarową. Tego rodzaju połączeń zrobiłem kilkanaście według następującego wzoru: Piętnaście mikrokultur oznaczyłem numerami od 1 do 15. Myksameby (ew. pływki) kultury Nr 1 łączyłem stopniowo z myksamebami (ew. pływkami) kultur Nr 2, 3, 4, i t. d. aż do Nr 15. Przekonałem się, że nie wszystkie połączenia dały mi wynik pozytywny, gdyż tylko sześć z nich dało plazmodja. Mianowicie połączenia Nr 1 z 3, 7, 8, 10, 13 i 14 dały wynik pozytywny, t. j., że po kilku dniach na powierzchni pożywki agarowej pojawiły się liczne plazmodja. Połączenia natomiast Nr 1 z 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12 i 15 nie dały podobnych wyników.

Rozsegregowawszy w ten sposób cały materiał na dwie grupy mogłem dowolnie robić połączenia i z góry określić, które z nich dadzą wynik pozytywny, a które negatywny. Np. połączenia numerów 2 z 4 oraz 3 z 7 były bez wyniku, natomiast 2 z 3 i 4 z 7 dały wynik pozytywny. Dowodzi to, że w jednej grupie kultur znajdują się elementy, pochodzące od zarodników jednej płci np. (+) w drugich (—).

Z powyższego wynika, że w dojrzałych ciałach owocowych *Didymium difforme* występują obok siebie zarodniki już płciowo zróżnicowane, z haploidalną liczbą chromosomów. Ponieważ zaś Jahn stwierdził, że ostatni podział jąder owocującego plazmodjum jest podziałem redukcyjnym, przeto należałoby przypuszczać, że u tego gatunku zróżnicowanie płciowe odbywa się jednocześnie z ostatnim podziałem redukcyjnym. Wręcz inaczej się sprawa przedstawia u *Didymium nigripes*. W pracy mojej, ogłoszonej o 1920 r. (19) wykazałem, że kultury monospermalne *Didymium nigripes* dają wyniki pozytywne, a więc, że każdy zarodnik jest potencjalnie dwupłciowy ($\mp$). Rozdział płci następuje dopiero w trakcie jednego z podziałów pływki. Wykazałem również, że plazmodja powstają z zygot, będących rezultatem połączenia się dwu myksameb (+) i (—). Ówczesne przeto badania moje potwierdziły w zupełności wyniki obserwacji opisanych w swoim czasie przez Jahn'a (1911) nad *Physarum didermoides*.

Główne fazy rozwoju *Didymium difforme* różnią się zasadniczo, jak to widać z opisanych przeze mnie wyżej faktów, od tych jakie zostały opisane dla innych gatunków Śluzowców.

W rozwoju tego gatunku niema reguły, co do liczby łączących się haploidalnych i płciowo różnych myksameb. Mogą się one łączyć po dwie, ale w większości wypadków łączy się naraz po więcej takich myksameb.

Kluczem w ocenie zasadniczych zjawisk, dotyczących zachowania się jąder po akcie kopulacyjnym, jest ustalona przeze mnie, poraz pierwszy dla tego gatunku, jedнопłciowość zarodników, oraz liczba chromosomów w haploidalnych osobnikach.

W świeżo utworzonym plazmodjum jądra nie łączą się i nie zlewają się z sobą, zachowując dłuższy czas haploidalny swój charakter. Ciało plazmodjalne przez ten czas rośnie bardzo szybko, dzięki energicznemu odżywianiu się. To też w tym okresie można obserwować na terenie mikrokultury bardzo liczne młode plazmodja, obdarzone jak już wspomniałem wyżej, różną liczbą jąder: jedne posiadają po dwa, inne po trzy, inne jeszcze po cztery, po pięć i t. d. aż do osobników kilkunastojądrowych. Można z całą dokładnością obliczyć liczbę jąder w każdym żywym plazmodjum i to ma doniosłe znaczenie dla stwierdzenia dalszych faktów. W celu utrzymania ścisłej kontroli nad jądrami, robiłem próby wydzielania z mikrokultur pojedynczych plazmodjów i przenoszenia ich do nowego środowiska, co mi się, jakkolwiek z wielkim trudem, w zupełności udawało. Otrzymawszy takie pojedyncze plazmodja miałem tę pewność, że się nie pomyłę w ocenie zjawisk, zachodzących stopniowo w ich organizmie.

W 8 do 10 godzin po utworzeniu się plazmodjum, jądra dzielą się karyokinetycznie. Podział ten nie obejmuje wszystkich jąder naraz. Jedno np. jądro dwu- lub kilkunastojądrowego plazmodjum może się dzielić wtedy, kiedy drugie znajduje się w stadium zupełnego spoczynku (Tabl. XVIII, fig. 6 i 7). Po kilkunastu godzinach liczba jąder danego plazmodjum powiększa się znacznie. Ze są to jądra haploidalne, a nie diploidalne dowodzi fakt, że tu, jak i w haploidalnych myksamebach czy pływkach, powstają podczas karyokinezy po 2 chromosomy.

Stwierdzenie tego faktu posiada według mnie kapitalne znaczenie dla poznania historii rozwoju *Didymium difforme*.

Okres zwiększania liczby jąder jest względnie długi bo może trwać od 3 do 4 dni. W tym czasie plazmodjum osiąga potężnych rozmiarów; liczba jąder wzrasta wielokrotnie tak, że trudno ich się jest wtedy doliczyć.

Lecz wkrótce potem następuje moment przełomowy; liczba jąder się zmniejsza znacznie, co można z łatwością stwierdzić na żywych

osobnikach. Utrwalone i zabarwione w tym okresie plazmodja wyjaśniają nam całkowicie tajemnicę zmniejszania się liczby jąder. Widać wyraźnie jak te ostatnie układają się parami, jak się łączą i jak się zlewają z sobą. Jest to istotny akt płciowy. W jednym i tem samem plazmodjum można dojrzeć całą gamę poszczególnych faz karyogamji od układających się w pary jąder, aż do zupełnego się ich zlania (Tabl. XVIII, fig. 8). Jahn podobne zjawiska obserwował już na plazmodjach *Ceratiomyxa*, *Badhamia utricularis*, ale inaczej zupełnie je tłumaczył. Węgług niego, jak już wiemy, kopulujące jądra plazmodjum to jądra degenerujące. Na poparcie swego twierdzenia powołał się nawet na pracę Strasburgera (1880) nad *Corydalis cava*, w której jest mowa o zlewaniu rozpadających się jąder w bielmie. Powołał się również na pracę Hansa Winklera o zlewaniu się jąder w komórkach wyścielających pylników.

Jasne jest, że Jahn będąc zasugerowany faktami, podanymi przez tych badaczy, mylnie tłumaczył najistotniejszą część cyklu rozwojowego badanych przez siebie Śluzowców. Skoro jądra kopulujące należałoby uważać za jądra ulegające zwyrodnieniu, to jakiego pochodzenia są w takim razie te jądra, które później wejdą w skład komórek zarodnikowych?

Nie przeczę absolutnie, że w trakcie ontogenezy poszczególnych gatunków Śluzowców mogą się zdarzać wypadki degeneracji jąder. Tej ostatniej ulegają zapewne te jądra haploidalne plasmodjum, które nie znalazły partnerów dla kopulacji; ulegają bezwątpienia degeneracji te jądra diploidalne owocującego plazmodjum, które znalazły się wypadkowo poza strefą, w której wytworzą się zarodniki np. w powstających trzonkach sporangjów. Takie wyradzające się jądra bardzo łatwo jest odróżnić od zwykłych normalnych jąder. Wystarczy część owocującego plazmodjum umieścić w roztworze czerwieni neutralnej by stwierdzić, że degenerujące jądra mocno się barwią na czerwono, wtedy gdy normalne jądra nie barwią się zupełnie.

Cykl rozwojowy *Didymium difforme*, jak widać z powyższego, różni się mocno od cyklu rozwojowego *Physarum didermoides* zbadanego przez Jahn'a, oraz od cyklu rozwojowego *Didymium nigripes* zbadanego przeze mnie.

Jahn wprawdzie nie mówi nic o charakterze płciowym zarodników *Physarum didermoides*, mówi tylko, że powstające z tych ostatnich pływki są haploidalne. Opierając się na negatywnych wynikach jego doświadczeń z jednozarodnikowemi kulturami (10) można wywnioskować, że zarodniki *Physarum didermoides* są płciowo zróżnicowane, jak to ma miejsce u *Didymium difforme*.

Schematy przeto, uwypuklające istotne różnice w cyklu rozwojowym wspomnianych tu gatunków będą się przedstawiały w sposób poniżej podany.

Uważam również za wskazane podać na zakończenie schemat rozwoju *Didymium nigripes* tak, jak go rozumiał i opisał Pinoy w swej pracy z 1908 roku. Da to czytelnikowi obraz całości poglądów na to tak wielce skomplikowane zagadnienie.

Poglądy Pinoy należy oczywiście uważać za nierealne i mające historyczne tylko znaczenie.

Streszczenie.

1^o *Didymium difforme* (Duby) jest gatunkiem bardzo pospolitym, występującym w środowisku naturalnym na rozkładającym się

Ryc. 29. Schemat cyklu rozwojowego *Physarum didermoides* (Rost.), zbudowany według pracy Jahn'a z 1911 r.

Schéma représentant le cycle évolutif du *Physarum didermoides* (Rost.), construit d'après le travail de Jahn (1911).

sianie, liściach drzew, słomie i t. p. Daje się on łatwo hodować na podłożu sztucznym (2% roztwór agaru na 5% wywarze z marchwi i ziemniaka lub na 5% wywarze z siana), dzięki czemu można otrzymywać czyste jego kultury mieszane¹⁾, co w wielkim stopniu ułatwia badania bio-cytologiczne tego gatunku.

2^o Plazmodjum *Didymium difforme* tworzy subtelną i silnie rozgałęzioną siateczkę i posiada zabarwienie szare lub żółtawe, a często

1) Pod nazwą czystych kultur mieszanych należy rozumieć takie kultury, w których Słuzowiec występuje w połączeniu z bakterją, z wyłączeniem innych jakichś organizmów, jak np. pleśniowców.

kremowe. Barwy te niezależne są od barwików wydzielanych przez bakterje i są wytworem własnym plasmodjum.

3^o Ciała owocowe są to siedzące, okrągłe lub wydłużone i poduszczkowate sporangja lub też spłaszczone i silnie rozgałęzione plazmodjokarpja. Różnica w budowie ciał owocowych zależna jest od jakości podłoża, jak również od otaczających warunków.

4^o Gatunek ten cechuje w odróżnieniu od innych badanych przeze mnie gatunków bardzo wyraźny hydrotropizm dodatni.

5^o W ciałach owocowych wszystkich badanych dotychczas Śluzowców występują bakterje. *Didymium diffforme* związany jest z bakterją zbliżoną do *Bacillus vulgaris*, z którym żyje w symbiozie (asocjacja

Ryc. 30. Schemat cyklu rozwojowego *Didymium nigripes* (Fr.) według mej pracy z 1920 r.

Schéma représentant le cycle évolutif du *Didymium nigripes* (Fr.) d'après mon travail publié en 1920.

synergiczna). Bez współdziału bakteryj Śluzowiec rozwija się słabo i cykl jego nie dobiega do końca. Sam jednakże akt kiełkowania zarodników odbywa się zupełnie dobrze bez współdziału bakteryj i jest on wynikiem akcji pęczenia.

6^o W celu należytego określenia stosunku Śluzowca do bakteryj i odwrotnie należy dwa te organizmy rozseparować. O ile łatwą rzeczą jest oddzielić bakterje od Śluzowca i hodować ją oddzielnie, to niezmiernie trudno jest uwolnić Śluzowca od tej ostatniej. Najlepiej cel ten daje się osiągnąć przez zakładanie kultur na pożywce normalnej z zarodników wydzielonych ze starych, kilka lat liczących zarodni. W tych ostatnich bakterje zamierają, zarodniki natomiast

Śluzowca zachowują nadal ich żywotność i po rozsianiu kiełkują. Powstają nawet plazmodja, lecz nigdy nie są w stanie wyowocować. Jeżeli do kultur takich wprowadzić świeże bakterje, plazmodja wzmagają się, rosną i owocują.

7^o Jeżeli zamiast bakteryj wprowadzić drożdże, np. *Torula glutinis* lub jakiś gatunek pleśniowca, np. *Aspergillus glaucus*, lub też inne gatunki bakteryj, jak np. *Sarcina lutea*, *Bacterium prodigiosum*, plazmodja nabierają energii, powiększają się i wreszcie owocują.

8^o Pod wpływem tych organizmów wszakże w budowie zewnętrznej, jak również i w strukturze wewnętrznej ciał owocowych Śluzowca następują bardzo głębokie zmiany teratologiczne.

Ryc. 31. Schemat cyklu rozwojowego *Didymium diffforme* według niniejszej pracy.
Schéma du cycle évolutif du *Didymium diffforme* d'après le présent travail.

9^o Plazmodja w kulturach zupełnie czystych niezdolne są do rozpuszczania pożywki agarowej, przynajmniej rozpuszczają takową bardzo słabo. Dopiero wspólnie z innymi organizmami żywymi (jak np. te, o których wyżej mowa) rozpuszczanie agaru jest bardzo silne. Plazmodja żywią się bardzo energicznie produktami tej hydrolizy.

10^o Wpływ temperatury na rozwój *Didymium diffforme* zależy od jakości pożywki. Na agarze z wywarem siana temperatura optymalna wynosi $+18$ do $+20^{\circ}\text{C}$. Jest ona daleko niższa na pożywce z wywarem marchwi i kartofla, bo wynosi tylko $+13$ do $+15^{\circ}\text{C}$. Maksymalną temperaturą dla *Didymium diffforme*, (w której zaledwie odbywa się kiełkowanie zarodników) jest temperatura $+41^{\circ}\text{C}$. Minimalna temperatura wynosi $+6^{\circ}\text{C}$.

11^o Światło wpływa ujemnie, a nawet zabójczo na pływki, myksameby i plazmodja, niema natomiast żadnego wpływu na tworzące się już ciała owocowe. Krótkie jednak, np. dwuminutowe naświetlania robione w dłuższych odstępach czasu, wywołują dodatni efekt o tyle, że przyspieszają proces owocowania plazmodjum.

12^o Zarodniki *Didymium difforme* są haploidalne i płciowo zróżnicowane. Kultury jednazarodnikowe nie dają tu żadnego rezultatu.

13^o Pływki i myksameby *Didymium difforme* są haploidalne i posiadają po dwa chromozomy.

Ryc. 32. Schemat cyklu rozwojowego *Didymium nigripes* (Fr.), zbudowany według pracy Pinoy z roku 1908.

Schéma du cycle évolutif du *Didymium nigripes* (Fr.), construit d'après le travail de Pinoy, publié en 1908.

14^o Pływki, myksameby i plazmodja posiadają trzy rodzaje wakuol: a) wakuole trawienne, b) wakuole pulsacyjne, oraz c) wakuole stałe, niewyodróżniające się.

15^o U *Didymium difforme*, wszystkie myksameby przechodzą normalnie przez stadium mikrocyst.

16^o Plazmodjum tworzy się z połączenia i zlania dwu lub więcej haploidalnych i płciowo różnych myksameb.

17^o Do utworzonego już plazmodjum mogą się dołączać jeszcze świeże, haploidalne myksameby i z nim się zlewać. Poza tem dwa lub więcej plazmodjów mogą się zlać w jedno większe plazmodjum.

18^o Zaraz po utworzeniu się plazmodjum jądra zachowują nadal haploidalny charakter i jako takie dzielą się kilkakrotnie.

19^o Na krótki czas przed owocowaniem haploidalne jądra układają się parami i zlewają się z sobą, w wyniku czego powstają jądra diploidalne. W tem stadium więc rozgrywa się akt płciowy. Jądra, które nie zdołały kopulować, degenerują.

Na zakończenie pragnę wyrazić moje serdeczne podziękowanie Panom Profesorom Zygmuntowi Wóycickiemu i Kazimierzowi Bassalikowi za cenne rady i pomoc w toku mych badań.

Z Zakładu Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Résumé.

Didymium difforme (Duby) est un Myxomycète très commun et cosmopolite. Il pousse habituellement, dans le milieu naturel, sur les feuilles mortes, sur la paille ou sur le foin en décomposition. Il se laisse très facilement cultiver dans les milieux artificiels, ce qui présente un avantage inappréciable.

Le meilleur substratum artificiel est la gélose avec décoction de carotte rouge et de pomme de terre à 20%.

Le cycle évolutif de *Didymium difforme* dure, dans les conditions normales, environ 14—16 jours.

Le plasmode est constitué de très fins filaments ramifiés qui forment ensemble un filet à mailles très serrées. Sa couleur est jaunâtre ou grisâtre et parfois crème. La substance colorante n'est pas élaborée, comme l'ont démontré mes expériences, par les Bactéries, mais par le protoplasme lui-même et ses changements dépendraient de la nature du substratum, sur lequel vit le Myxomycète.

Les fruits de cette espèce apparaissent sous formes de sporanges sessiles, tantôt globuleux, tantôt légèrement aplatis, sphériques ou fortement ramifiés.

Parfois au lieu de sporanges il se forme des plasmodiocarpes. La différence dans la forme et la constitution des fruits dépend de la composition chimique du substratum, ainsi que de différents facteurs physiques (température, lumière).

Didymium difforme est marqué par un hydrotropisme positif très prononcé.

Cette espèce vit en association symbiotique avec une Bactérie rapprochée de *Bacillus vulgaris*. Sans cette dernière son développement est très faible et n'arrive pas jusqu'au bout. Mais le phénomène de la germination se passe indépendamment des Bactéries et il faut le considérer comme un fait résultant d'une action osmotique.

Pour bien préciser le rôle de la Bactérie dans le développement du Myxomycète il est nécessaire de les séparer, c-à-d. obtenir ce dernier à l'état complètement pur. Mais s'il est facile de séparer les Bactéries et de les cultiver à part, il est extrêmement difficile, voire impossible, de libérer les spores du Myxomycète de ces dernières.

La meilleure méthode permettant d'aboutir à un sérieux résultat, est la suivante.

M'étant rendu compte que dans les vieilles cultures, âgées de 4 ans et complètement desséchées, les Bactéries perdent entièrement leur vitalité, j'ai ensemencé à plusieurs reprises les spores provenant de ces vieux sporanges sur la gélose à décoction de carotte et de pomme de terre. Au bout de 12 heures les spores du Myxomycète ont germé, sans qu'il y ait eu trace de Bactéries vivantes. Les plasmodes se forment au bout de plusieurs jours, mais l'eau de condensation de la culture reste toujours limpide et la surface de la gélose est brillante, ce qui prouve qu'il n'y a aucun développement de Bactéries.

Les plasmodes dans ces conditions sont très faibles et ne fructifient jamais. Ils se promènent à la surface de la gélose et y laissent des traces suffisamment visibles à l'oeil nu. Cet état de choses peut durer plusieurs mois, sans qu'il y ait la fructification. Mais si on ajoute à ces cultures de la Bactérie fraîche, les plasmodes grandissent très vite, se fusionnent en un seul plasmode qui va bientôt fructifier.

Si au lieu de la Bactérie associée avec *Didymium difforme* (*B. vulgaris*) on ajoute un autre microorganisme quelconque p. ex. *Aspergillus glaucus*, *Torula glutinis*, *Sarcina lutea* ou enfin *Bacterium prodigiosum*, les plasmodes, nains jusqu'à présent, prennent de la vigueur, se nourrissent abondamment et fructifient au bout de quelques jours.

Mais en association avec ces organismes les fructifications subissent des changements très profonds, tant au point de vue morphologique qu'au point de vue de la structure interne. (Voir les dessins dans le texte polonais).

Les plasmodes, quand ils sont en état de pureté complète, liquéfient très faiblement la gélose, mais quand on leur associe un des organismes mentionnés ci-dessus, ils acquièrent un très fort pouvoir dissolvant. Les produits de cette dissolution sont absorbés par eux. (Voir la planche XIV).

Quand, au lieu d'un organisme vivant (Bactérie quelconque, Moisissure ou Levure), on ajoute aux plasmodes à jeûn un organisme préalablement tué (ex. *B. vulgaris*), ces derniers prennent visiblement

de la vigueur, mais n'acquièrent pas de pouvoir dissolvant et ne fructifient pas. Cela prouve qu'un Myxomycète peut se développer uniquement en association avec un autre être vivant.

Dans les conditions naturelles c'est toujours une Bactérie qui joue le rôle prépondérant et qui rentre en relation étroite avec le Myxomycète. Ce dernier se fait une sorte de réserve bactérienne, au moment de la fructification, qui entrera en jeu plus tard, dès le commencement du nouveau cycle évolutif. Ces phénomènes et le fait que les Bactéries sont plus riches en association avec les Myxomycètes, prouve l'existence de la symbiose entre ces êtres et les Bactéries.

La température exerce, elle aussi, une influence très marquée sur l'évolution du *Didymium difforme*. C'est une espèce qui supporte plus facilement les hautes températures que p. ex. *Didymium nigripes*. Le comportement de ce Myxomycète dans les différentes températures dépend étroitement de la composition du substratum. Sur la gélose à l'infusion de foin la température optima est de $+18$ à $+20^{\circ}$ C. Celle-ci est sensiblement plus basse sur la gélose au bouillon de carotte et de pomme de terre, car elle atteint seulement $+13$ à $+15^{\circ}$ C.

La lumière exerce une action puissante sur le développement du Myxomycète en question. Mais si elle est un agent excitateur et même mortel des zoospores, des myxamibes et des plasmodes, elle n'exerce aucune action sur les stades avancés des fructifications.

Mais si on soumet un plasmode bien épanoui à l'action des rayons lumineux, venant d'une source bien définie, pendant 2 minutes seulement et si on répète cette courte illumination toutes les deux heures, la fructification du plasmode en question est sûrement accélérée. (Planche XV).

Didymium difforme possède des zoospores et des myxamibes de deux sortes (+) et (—), provenant des deux sortes de spores sexuellement différenciées.

Les cultures monospermes m'ont permis de résoudre complètement le problème de la sexualité chez le *Didymium difforme*. Les tubes à essai, contenant de l'agar à l'infusion de carotte rouge, ont reçu chacun une seule spore, transportée avec toutes précautions à l'aide d'une fine pipette et placés à une température stable de 15° C. A côté de ces cultures monospermes ont été placées de nombreuses cultures polyspermes.

Au bout de quelques jours, dans tous les tubes contenant plusieurs spores, ont apparu de beaux plasmodes, tandis que les tubes ne contenant qu'une seule spore n'en présentaient aucune trace.

Un rapide examen microscopique m'a pourtant permis de constater que, dans l'eau de condensation de ces derniers, il y avait de nombreuses zoospores et myxamibes.

J'en ai conclu que ces éléments sont unisexués. Une simple opération confirma ma supposition. En introduisant dans un nouveau tube contenant de l'agar à infusion de carotte, à l'aide d'une fine pipette, des myxamibes et des zoospores provenant de deux cultures monospermes différentes, j'ai obtenu des plasmodes qui ont fructifié.

Cette seule expérience nous démontre que les spores de *Didymium difforme* sont unisexuées.

Didymium difforme est donc une espèce hétérothallique, puisqu'il faut deux sortes de spores pour obtenir les deux sortes de myxamibes-gamètes et la fructification.

Peu de temps après la germination, le corps protoplasmique devient une zoospore; mais très souvent il subit sa première division caryocinétique dans la spore même, et au moment de la germination de l'enveloppe sporale sortent deux myxamibes au lieu d'une seule.

Après un certain temps les zoospores se divisent chacune en deux parties.

Cette première division de chaque zoospore est suivie d'une seconde division des zoospores filles. Le nombre de ces divisions successives est variable de quatre à cinq.

A un moment donné, chaque zoospore perd son cil vibratile, s'arrondit, s'entoure d'une fine membrane et devient ainsi un kyste. Ce phénomène d'enkystement durant environ 12 heures est un fait constant dans le *Didymium difforme* et n'est pas provoqué par des facteurs physico-chimiques. Ce phénomène n'a jamais été observé par moi au cours du développement des autres Myxomycètes. S'il y a des cas d'enkystement, ce dernier est provoqué par les facteurs externes.

Au bout de quelques heures de chaque kyste sort une myxamibe qui, en se dirigeant vers la périphérie de la préparation, continue à se diviser, ce qui assure la multiplication de l'espèce. Finalement toutes les myxamibes arrivent au bord de la lamelle et, entremêlées de Bactéries, forment une traînée compacte.

Pour étudier cytologiquement tous les stades du développement de l'espèce en question, je monte plusieurs séries de microcultures sur les verres porte-objets. Celles-ci sont progressivement fixées par les mélanges de Benda, de Flemming, de Bouin ou de Zenker, toutes les 6 heures à partir de l'ensemencement des spores jusqu'aux stades avancés de plasmodes et colorées ensuite par l'hématoxyline ferrique

ou la fuchsine acide — bleu de toluidine — aurantia. Je mets ainsi en évidence les principaux stades de la division caryocinétique des noyaux.

A la prophase, la chromatine prend tout d'abord l'aspect floconneux irrégulier et forme ensuite un gros cordon régulier occupant la partie médiane de la substance achromatique (Pl. XVII, fig. 1—4).

Ce cordon se divise ensuite en deux tronçons égaux dont chacun occupera l'un des pôles de ladite substance achromatique. Il faut considérer ces deux fragments chromatiques comme deux chromosomes (Pl. XVII, fig. 5). A ce moment-là la membrane du noyau se résorbe et la substance achromatique prend ensuite la forme rectangulaire; celle-ci étant jusqu'à présent homogène, montre maintenant de très fines striations, venant des deux coins du rectangle. Dans chacun des quatre coins de ce dernier se placent les quatre chromosomes qui proviennent de la division de deux chromosomes du stade précédent (Pl. XVII, fig. 6 et 7). Nous sommes à la fin de la prophase.

Au stade de la métaphase le fuseau achromatique, formé de très fins filaments parfaitement distincts, occupe juste le milieu de la cellule. Les chromosomes gros et courts occupent la région équatoriale du fuseau et sont tous complètement séparés les uns des autres. Ce stade dure relativement longtemps et c'est pour cette raison que nous le rencontrons plus souvent que les autres stades de la division caryocinétique (Pl. XVII, fig. 8 et 9).

Ensuite le fuseau achromatique s'étire, ses filaments se rangent parallèlement les uns à côté des autres et les chromosomes se dirigent par paire vers les pôles de ce dernier (Pl. XVII, fig. 10). Nous sommes en pleine anaphase. Les pôles du fuseau (malgré l'étirement de ce dernier) gardent pendant un certain temps leur forme conique, mais à mesure que les chromosomes avancent, les terminaisons coniques disparaissent (Pl. XVII, fig. 11 et 12).

Ensuite le corps de la cellule se rétrécit au niveau de l'ancienne plaque équatoriale, les filaments du fuseau disparaissent et chaque paire de chromosomes se porte à la périphérie même de chaque future cellule-fille. Les chromosomes à ce stade changent d'aspect; ils deviennent plus longs et ont les bouts émoussés. Le sort du fuseau et la façon dont il se résorbe nous échappent complètement pour le moment (Pl. VI, fig. 13).

J'ai pu souvent constater dans les deux sommets ou dans un seul du fuseau achromatique la présence d'un petit corpuscule qui

prend la coloration de la chromatine. Ces corpuscules n'apparaissent pas régulièrement dans toutes les divisions caryocinétiques de la même microculture, c'est ce qui m'autorise à admettre qu'ils n'ont rien de commun avec les centrosomes proprement dit.

Chez l'espèce en question le plasmode peut être constitué non seulement par la fusion de deux myxamibes (+) et (—), mais par un plus grand nombre de celles-ci. Donc le nouvel élément, appelé communément zygote, peut être bi, tri, quadri ou même plurinucléé (Pl. XVIII, fig. 3—7). Il est entendu qu'une zygote binucléée peut aboutir à un plasmode capable de fructifier aussi bien que les zygotes plurinucléées.

Les noyaux de ces éléments nouvellement formés ne se fusionnent pas immédiatement après la fusion des myxamibes, ils restent libres et se divisent après un certain temps de repos par le procédé caryocinétique. Que ces noyaux ne soient pas des noyaux diploïdes, mais haploïdes, le nombre de chromosomes pendant leur division nous l'indique très bien: il est de deux (Pl. XVIII, fig. 6 et 7).

Aux plasmodes bien différenciés peuvent se joindre d'autres myxamibes-gamètes, rencontrées sur leurs parcours; par conséquent, l'accroissement d'un plasmode peut s'opérer de deux façons: par sa croissance personnelle et par l'adjonction et la fusion d'autres myxamibes-gamètes. Plusieurs plasmodes peuvent se fusionner et former ainsi un grand plasmode.

A part cela, les myxamibes, attardées dans leur développement et étant en état d'enkystement, deviennent la proie des plasmodes. Il arrive, au bout de quelques jours, un moment capital d'évolution d'un plasmode: les noyaux haploïdes, qui subissaient jusqu'à présent les divisions successives, entrent en copulation (Pl. XVIII, fig. 8).

On peut facilement voir sur les préparations fixées et colorées tous les stades de cette copulation, depuis le rapprochement des noyaux jusqu'à leur complète fusion. Bon nombre de noyaux restent libres: ce sont des noyaux qui ne trouvent pas de partenaires pour la copulation et qui vont par la suite dégénérer.

Institut de Botanique Générale de l'Université de Varsovie.

Bibliografja.

1. Becker, Elery R. The rôle of the nucleus in the cell functions of Amoebae. — Biological Bulletin of the Marine Biological Laboratory, Woods Hale, Mass. Vol. L. Nr. 5, 1927.

2. de Bary, H. A. Die Mycetozoen: ein Beitrag zur Kenntniss der niedersten Organismen, Leipzig 1864.

3. Brandza, M. Sur la polychromie des Myxomycètes vivant en plein soleil. — C. R. Ac. Sc. Paris, t. 182, 1926.
4. Cienkowski, L. Zur Entwicklungsgeschichte der Myxomyceten. Das Plasmodium. — Pringsheim, Jahrb. f. wiss. Bot. III t. str. 325 i str. 400, 1863.
5. Doflein, F. Lehrbuch der Protozoenkunde. Neubearbeitet von Prof. Dr E. Reichenow, Jena, 1927.
6. Gilbert, Frank A. On the occurrence of biflagellate swarm cells in certain Myxomycetes. — Mycologia, Vol. XIX, Nr. 5, 1927.
7. Grassé, Pierre P. Contribution à l'étude des Flagellés parasites. — Archives de Zoologie expérimentale et générale, Tome 65, 1926.
8. Heitzmanówna, W. Z życia plywek i myksameb Makulca makówki (*Didymium nigripes*), Fr. — Kosmos T. XLVII, 1922.
9. Jahn, E. Myxomycetenstudien. III. Kernteilung und Geisselbildung bei den Schwärmern von *Stemonitis flaccida* Lister. — Berichte der Deutsch. Bot. Gesellsch. XXII, 1904.
10. Jahn, E. Myxomycetenstudien. VIII. Der Sexualakt. — BDBG. XXIX, 1911.
11. Janicki, C. Untersuchungen an parasitischen Flagellaten. II Teil. Die Gattungen *Devescovina*, *Parajoenia*, *Stephanonympha*, *Calonympha*. — Über den Parasasalapparat, — Über Kernkonstitution und Kernteilung. — Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. CXII, Heft 4, 1915.
12. Karling, John S. A preliminary account of the influence of light and temperature on growth and reproduction in *Chara fragilis*. — Bulletin of the Torrey Botanical Club Vol. 51, Nr. 12, December 1924.
13. Kränzlin, H. Zur Entwicklungsgeschichte der Sporangien bei den Trichien- und Arcyrien — Archiv für Protistenkunde Bd. 9, Heft 1, 1907.
14. Lister, A, A monograph of the Mycetozoa. Third edition, revised by Guilielma Lister, 1925.
15. Pinoy, E. Nécessité de la présence d'une Bactérie pour obtenir la culture des Myxomycètes. — Bull. Soc. Mycol. de France t. XVIII, 3-e fasc. 1902.
16. Pinoy, E. Rôle des Bactéries dans le développement de certains Myxomycètes. — Ann. Inst. Pasteur. Paris T. XXI p. 686.
17. Pinoy E. Sur l'existence d'un dimorphisme sexuel chez un Myxomycète *Didymium nigripes*. — C. R. Soc. Biol. Paris LXIV, p. 630, 1908.
18. Plenge, H, Über die Verbindung zwischen Geissel und Kern u. s. w. — Verhandl. nat. med. Ver. Heidelberg T. VI, 1899.
19. Skupieński, F. X. Recherches sur le cycle évolutif de certains Myxomycètes. Paris, 1920 (Thèse).
20. Skupieński, F. X. Contribution à l'étude des Myxomycètes en Pologne. — Bull. de la Soc. Mycol. de France. Tome XLII, 1-er fasc. Paris 1926.
21. Skupieński F. X. Sur le cycle évolutif chez une espèce de Myxomycète endosporé, *Didymium difforme* (Duby). — C. R. Ac. Sc. Paris 1926.
22. Skupieński, F. X. Sur le cycle évolutif chez une espèce Myxomycète endosporé, *Didymium difforme* (Duby) — Étude cytologique. C. R. Ac. Sc, Paris 1927.
23. Skupieński, F. X. Z biologii Śluzowców. — Kosmos XLVII, 1922.
24. Strangeways, T. S. P. and R. G. Canti, The living cell in vitro as shown by darkground illumination and the changes induced in such cells by fixing reagents. — Quart. Journal of Microscop. Science Nr. 281, Vol. 71, part 1, 1927. Oxford University Press.
25. Terby Jeanne, Les divisions sporogoniques du *Plasmodiophora Bras-*

sicae Wor. — Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe de Sciences. Novembre 1924.

26. Terby Jeanne. L'origine du blépharoplaste chez le Plasmodiophora Brassicae Wor. — Bulletin de la Soc. Royale de Botanique de Belgique. T. LVI, fasc. 1, 1923.

27. Torrend C. Flore des Myxomycètes, St. Fiel (Portugal) 1909.

28. Vouk, Valentin, Über den Generationswechsel bei Myxomyceten. — Österreichische Botanische Zeitschrift, Jahrg. 1911, Nr. 4.

Objaśnienie tablic — Explication des planches.

Tablica XII.

Ciała owocowe *Didymium difforme* powstałe w środowisku sztucznym (agar na wywarze z marchwi i ziemniaka). — Fructifications du *Didymium difforme* sur milieu artificiel (gélöse à la décoction de carotte et de pomme de terre).

Fig. 1 — Plazmodjokarpjum — Un plasmodiocarpe.

Fig. 2 — Zarodnie — Sporangies.

Fig. 3 — Stara kultura, w której pożywka agarowa (a) wyschła zupełnie i odstaje od ścianki naczynia; szereg zarodni (b—b) oznacza pierwotną granicę świeżej pożywki. — Vieille culture dans laquelle la gélöse est complètement desséchée (a). La trainée de sporanges (b—b) marque le niveau primitif de la gélöse fraîche.

Ciała owocowe wszystkich kultur potworzyły się na ściankach naczyń, w najbliższym sąsiedztwie z pożywką. — Toutes les fructifications ont pris naissance sur les parois des tubes, dans le plus proche voisinage du substratum.

Obrazy odpowiadają wielkości naturalnej. — Figures grandeur naturelle.

Tablica XIII.

Trzy fazy owocującego plazmodjum *Didymium difforme*. — Trois phases successives d'un plasmode en fructification.

Fig. 1 — Plazmodjum w pełnym rozwoju. — Plasmode en plein développement.

Fig. 2 — Górna połowa plazmodjum wytworzyła sześć różnokształtnych i różnej wielkości zarodni, dolna zaś (położona bliżej płynu!) jest w pełnym jeszcze rozwoju. — La partie supérieure du plasmode s'est transformée en six sporanges et la moitié inférieure (située plus près du liquide!) est en plein développement.

Fig. 3 — Dolna połowa plazmodjum zaczyna zamieniać się na ciała owocowe. — La partie inférieure du plasmode commence à fructifier.

Poszczególne fazy fotografowane były co $7\frac{1}{2}$ godziny. Kultury trzymane były cały czas w zupełnej ciemności. — Ces trois photographies ont été prises à 7 h. et demi d'intervalle et les cultures ont été gardées dans l'obscurité complète.

Obrazy odpowiadają wielkości naturalnej. — Figures grandeur naturelle.

Tablica XIV.

Zjawiska rozpuszczania pożywki agarowej przez plazmodja *Didymium difforme*. — Phénomènes de la dissolution de la gélöse par les plasmodies du *Didymium difforme*.

Fig. 1. — Głęboki otwór (a), utworzony przez plazmodja w obecności sarcyny (*Sarcina lutea*). — Trouée produite dans la gélöse (a) par les plasmodies en présence de la sarcine (*Sarcina lutea*).

Fig. 2 i Fig. 3 — Wgłębienia wywołane przez plazmodja w obecności Pleśni *Aspergillus glaucus* (a—a). — Dépressions faites par le plasmodes en présence d'une moisissure, *Aspergillus glaucus*. (a—a).

Fig. 4 — Wgłębienie (rowek) utworzone przez plazmodjum w obecności Bakterji współżyjącej z *Didymium difforme* (*Bacillus vulgaris*). Rowek ten powstawał stopniowo w miarę spływania kolonii bakteryjnej ku dołowi pożywki (a—a—a). — Dépressions circulaire produite par le plasmode en présence de la Bactérie associée à *Didymium difforme* (*Bacillus vulgaris*). Cette dépression s'allonge à mesure que la colonie bactérienne s'écoule vers le fond de la culture (a—a—a).

Obrazy odpowiadają wielkości naturalnej — Figures grandeur naturelle.

Tablica XV.

Wpływ światła na rozwój *Didymium difforme*. Sześć faz jednego i tego samego plazmodjum do owocowania włącznie. Naświetlanie każdej fazy trwało 2 minuty (w ciągu których wykonywane były zdjęcia) i robione było co 2 godziny. — Influence de la lumière sur le développement du *Didymium difforme*. Six stades d'un même plasmode, la fructification incluse. Irradiation de 2 minutes pour chaque stade (juste le temps de tirer une photographie) avec intervalle de 2 heures entre chaque exposition.

Obrazy odpowiadają wielkości naturalnej. — Figures grandeur naturelle.

Tablica XVI.

Cykl rozwojowy *Didymium difforme*. — Cycle évolutif du *Didymium difforme*.

Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 — Zarodniki. — Spores.

Fig. 1, 2 — Zarodniki jednojądrowe. — Spores à noyau unique.

Fig. 3 — Podział karjokinetyczny jądra. — Division caryocinétique du noyau.

Fig. 4 — Zarodniki o dwu jądrach. — Spores à deux noyaux.

Fig. 5, 6 — Zarodniki, z których każdy zawiera po dwie niezależne energidy. — Spores contenant chacune deux masses plasmatiques indépendantes.

Fig. 7, 8 — Pływki. — Zoospores.

Fig. 9 — Forma przejściowa od pływki do myksameby. — Forme de passage d'une zoospore à une mixamibe.

Fig. 10, 11 — Myksameby. — Myxamibes.

Wszystkie figury w powiększeniu 3.400 razy. — Figures grossies 3.400 fois.

Tablica XVII.

Cykl rozwojowy *Didymium difforme* (ciąg dalszy). — Cycle évolutif du *Didymium difforme* (Suite).

Fig. 1—13 — Stadja podziałowe pływki (ew. myksameby). — Stades successifs de la division d'une zoospore (ev. d'une myxamibe).

Fig. 1—7 — Profaza. — Prophase.

Fig. 8, 9 — Metafazy. — Métaphase.

Fig. 10—12 — Anafaza. — Anaphase.

Fig. 13 — Telofaza. — Télaphase.

Fig. 14 — Mikrocysta. — Microcyste.

Fig. 15 — Wyswabadzanie się myksameby z błony cystowej. — Libération d'une myxamibe de la membrane d'un microcyste.

Wszystkie figury w powiększeniu 3.400 razy. — Figures grossies 3.400 fois.

Tablica XVIII.

Cykl rozwojowy *Didymium difforme* (ciąg dalszy). — Cycle évolutif du *Didymium difforme* (Suite).

Fig. 1 — Łączenie się trzech myksameb haploidalnych i płciowo zróżnicowanych w celu utworzenia plazmodjum. — Réunion de trois myxamibes haploïdes et unisexuelles pour former un plasmode.

Fig. 2 — Łączenie się dwu myksameb haploidalnych i płciowo zróżnicowanych w celu utworzenia plazmodjum. — Réunion de deux myxamibes haploïdes et unisexuelles pour former un plasmode.

Fig. 3 — Młode plazmodjum o trzech jądrach haploidalnych. — Jeune plasmode à trois noyaux haploïdes.

Fig. 4 — Młode plazmodjum o 2 jądrach haploidalnych. — Jeune plasmode à deux noyaux haploïdes.

Fig. 5 — Młode plazmodjum o sześciu jądrach haploidalnych, do którego dołącza się świeża myksameba haploidalna. — Jeune plasmode à six noyaux haploïdes et auquel s'unit une nouvelle myxamibe haploïde.

Fig. 6 — Młode plazmodjum o dwu jądrach haploidalnych, z którego jedno est w trakcie podziału. — Jeune plasmode à deux noyaux haploïdes dont un subit la division.

Fig. 7 — Młode plazmodjum o trzech jądrach haploidalnych, z których jedno jest w trakcie podziału (anafaza). — Jeune plasmode à trois noyaux haploïdes dont un subit la division (anaphase).

Fig. 8 — Fragment starszego plazmodjum, w którym widać łączące się parami i zlewające się jądra haploidalne (kopulacja). W tem plazmodjum jak i w poprzednich występują liczne wakuole, w których trawione są bakterje lub cysty. — Fragment d'un plasmode plus âgé, dans lequel on voit les noyaux haploïdes s'accoupler et se fusionner. A part cela, on voit dans tous les plasmodies des vacuoles dans lesquelles sont digérées les bactéries ou les cystes.

Wszystkie figury w powiększeniu 3.400 razy. — Figures grossies 3.400 fois.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

1

2

3

4

5

7

9

8

10

11

6

12

13

14

15