

Nowe stanowiska dwóch rzadkich roślin w Tatrach.

(Neue Fundorte zweier seltener Tatrapflanzen).

napisał

BOGUMIŁ PAWŁOWSKI.

(wpłynęło 20.IX 1933).

W lecie r. 1932 udało mi się wykryć nowe stanowiska dwóch roślin, należących do największych rzadkości we florze Tatr: *turzycy skalnej* i *jaskrą karłowatego*.

Turzyca skalna (*Carex rupestris* Bell.) znana była dotąd tylko ze stoków Gałucha w dolinie Wielickiej, skąd podali ją S a g o r s k i i S c h n e i d e r (Flora der Centralkarpathen, II, 506, 1891) na podstawie okazów S c h e r f e l a. Później, o ile mi wiadomo, nikt jej tam nie zbierał. Obecnie znalazłem ją na szczycie J a t e k P r z e d n i c h w Tatrach Bielskich na wysok. ok. 2011 m w zespole turzycy mocnej (*Firmetum*). Rośnie tam, zupełnie podobnie jak na Smotreciu w grupie Czarnohory, na nader ograniczonej przestrzeni zaledwo kilku metrów kwadratowych, robiąc przez to wrażenie typowego „reliktu“.

Jest rzeczą interesującą, że szereg szczytów Tatr Bielskich posiada swoje „specjalności“ florystyczne w poszczególnych rzadkich gatunkach rodziny turzycowatych: Płaczliwa Skała posiada *Elyna myosuroides* i *Carex atrofusca*, Jatki Zadnie — *Kobresia bipartita*, Jatki Przednie — *Carex rupestris*. Ta ostatnia powiększa listę wspólnych Tatrom i Alpom szwajcarskim gatunków zespołu *Firmetum*.

Jaskier karłowaty (*Ranunculus pygmaeus* Whlb.) podany był dotąd z Bystrego Przechodu i ze ściany Pośredniej Grani w dolinie Zimnej Wody (Sagorski i Schneider l. c. str. 40). Obecnie przybywa trzecie stanowisko: G a r ł u c h od strony doliny Wielickiej, ok. 2270 m, o kilka kroków od ścieżki turystycznej. Rośnie tu w warunkach podobnych, jak na Bystrym Przechodzie: w szczelinach skał granitowych w zespole *Arabis neglecta*-*Saxifraga carpatica*, dla którego zdaje się być rośliną charakterystyczną. W dniu 28 sierpnia, gdy go znalazłem, owocki tego jaskra były już zupełnie dojrzałe.

ZUSAMMENFASSUNG.

Carex rupestris Bell. wurde vom Verfasser am Gipfel der J a t k i P r z e d n i e (=Vordere Leiten) in der Bielaer Tatra entdeckt, wo sie im *Firmetum* in ca. 2011 m ü. M. wächst. Zweiter Fundort in der Tatra!

Ranunculus pygmaeus Whlb. wächst am Osthang des G a r ł u c h (=Gerlsdorfer Spitze) bei ca 2270 m in Felsritzen in der *Arabis neglecta* - *Saxifraga carpatica* — Assoziation. Es ist dies sein dritter Fundort in der Tatra.

Z Instytutu Botanicznego U. J. w Krakowie, we wrześniu 1932.
