ANTONI KOZŁOWSKI

(wpłynęło 18.7.34).

WYŁAWIANIE KOLONJI BAKTERJI ZIEMNYCH Z FILMU ŻELATYNOWEGO.

(Fishing colonies of soil bacteria from the gelatine
film culture).

Niektóre bakterje gleby tworzą na pożywkach stałych tak drobne kolonie, że trudno je dostrzec gołym okiem; można jednak wyłowić je łatwo przy pomocy mikroskopu z kultury na filmie żelatynowym sporządzonym w sposób następujący: w próbówki sterylizowane wlewa się pipetką około 2 cm³ stopionej żelatyny i sterylizuje się je trzy razy przez 15 minut w bieżącej parze wodnej. Zastyglą żelatynę roztopia się w letniej wodzie i zaszczepia się kroplą odpowiednio rozcieńczonego roztworu gleby; poczem zawartość próbówki miesza się ruchem wirowym a następnie pokręca się próbówkę ukośnie ułożoną pod zimnym prądem wody tak, by żelatyna pokryła około $\frac{2}{3}$ długości ściany próbówki; żelatyna zestali się ostatecznie w próbkach ułożonych pod zwilżonemi ręcznikami na płaszczyźnie pochylej.

Niektóre bakterje ziemne tworzą kolonie w temperaturze pokojowej już w ciągu 24 godzin, inne zaś dopiero po upływie kilku dni. Dodanie do żelatyny odpowiednich składników odżywczych oraz regulowanie koncentracji jonów wodorowych ułatwia przewagę w rozwoju pewnych gatunków drobnoustrojów nad innymi. Żelatyna oczyszczona świeżem białkiem jaj przyspiesza rozwój bakterji.

Film sporządzony w sposób powyższy nadaje się także do ilościowego oznaczenia drobnoustrojów w glebie.

W celu zapobieżenia topnieniu żelatyny pod wpływem ciepła lampy elektrycznej podczas wyławiania kolonji, używa się chłodnicy sporządzonej w sposób następujący: rurkę gumową, około 2 cm. średnicy, napełnioną zimną wodą, zamkniętą zatyczkami gumowymi, zgiętą w U i tak utwierdzoną dwoma paskami gumowymi, przymocowuje się do stolika mikroskopu dwoma większymi pierścieniami gumowymi. Między ramiona chłodnicy wsuwa się probówkę zawierającą kulturę bakterji.

Przeszczepianie kolonji przeprowadza się w sposób następujący: pokręcając probówkę wybiera się pod mikroskopem pewną kolonję na filmie żelatynowym; poczem zdejmuje się zatyczkę watową i sterylizuje się koniec probówki słabym płomieniem palnika. Drucik platynowy, o końcu lekko zgiętym, wsuwa się w probówkę tak daleko, by cień końca drucika dał się zauważyć w optycznem polu mikroskopu tuż pod obraną kolonją; po dotknięciu kolonji wysuwa się drucik ostrożnie, by nie dotknąć ściany probówki, zatrzymując koniec drucika w pobliżu wylotu probówki. Wówczas lewa ręka sięga po probówkę z czystą pożywką i zbliża ją ku prawej ręce, która zdejmuje zatyczkę watową dwoma mniejszemi palcami i równocześnie wysuwa drucik z probówki, by zaszczerpić kolonję w treść probówki zbliżanej do płomienia palnika. Poczem wybiera się dalsze kolonje. Probówka na stoliku mikroskopowym pozostaje otwarta przez cały czas, bez niebezpieczeństwa zanieczyszczenia kultury.

Film żelatynowy, wyżej opisany, przedstawia modyfikację „kultur toczonych” Esmarcha (Ztschr. f. Hyg. 1886, I, 293).