JAN MUSZYŃSKI

Zakład Farmakognozji U. S. B. w Wilnie

(wpłynęło 19.VII.1934).

ALKALOIDY EUROPEJSKICH GATUNKÓW *LYCOPODIUM*.

(Alkaloide der europäischen *Lycopodium*-Arten.)

Swoistych zasad roślinnych, zwanych alkaloidami znamy dotychczas około 560. Jednak dokładnej budowy chemicznej większości wymienianych w literaturze alkaloidów nie znamy. Alkaloidy o dokładnie poznanej budowie są drugo- lub trzeciorzędowymi zasadami azotowymi, występującymi dość często wśród roślin Dwuliściennych (np. u Ranunculaceae, Berberidaceae, Papaveraceae, Solanaceae, Rubiaceae), rzadziej wśród Jednoliściennych (prawie wyłącznie u Liliaceae-Melanthioideae), rzadko u Nagonasiennych (Gnetaceae i Taxus) oraz bardzo rzadko u Sporophyta (niektóre grzyby). Alkaloidy Dwuliściennych są prawie wyłącznie pochodniami azotowych związków heterocyklicznych, jak pyrrol, pyrydyna, chinolina, indol oraz izochinolina, gdy znane alkaloidy Jednoliściennych, Nagonasiennych i Zarodnikowców mają charakter fenylo-alkyl-aminów. Olbrzymia większość alkaloidów odznacza się wybitnem działaniem fizjologicznem, dzięki czemu są one groźnemi truciznami, szczególnie dla kręgowców.

Obszerna gromada paprotników uchodziła dotychczas, zwłaszcza w pracach botaniczno-systematycznych, za bezalkaloidową. W literaturze chemicznej istnieją dotychczas jedynie cztery prace, dotyczące dwu alkaloidów — *Lycopodyny*

i *Pillijaniny* wykrytych w *Lycopodium complanatum* L. i południowo-amerykańskim gatunku *L. Saururus* Lam. Lycopodyna została opisana jeden jedyny raz przez K. B ö d e k e r a (1) w roku 1881, przyczem nie poruszono w tej pracy fizjologicznego działania alkaloidu. O innych środkowo-europejskich gatunkach *Lycopodium* w zakresie ich działania fizjologicznego i składu chemicznego wiemy bardzo niewiele. Otóż na podstawie rozpoczętych przeze mnie przed kilku miesiącami i prowadzonych obecnie badań chemicznych i fizjologicznych stwierdzam bezwzględnie, że wszystkie spotykane na ziemiach polskich gatunki rodzaju *Lycopodium* zawierają alkaloidy o wybitnem działaniu fizjologicznem, a więc wszystkie nasze widłaki są roślinami trującymi.

Rodzaj *Lycopodium* liczy około 180 gatunków, występujących we wszystkich częściach świata. Najwięcej gatunków liczy południowa i środkowa Ameryka, najmniej Afryka. W Polsce, podobnie jak w całej Europie środkowej, spotykamy tylko 6 gatunków: *L. alpinum* L., *L. annotinum* L., *L. clavatum* L., *L. complanatum* L., *L. inundatum* L., i *L. Selago* L. Niektóre z tych gatunków (np. *clavatum*, *complanatum* i *Selago*) są prawie kosmopolityczne.

Monograf rodziny widłaków E. Pritzel (5) dzieli rodzaj *Lycopodium* na dwa podrodzaje i szereg sekcij (por. str. 279).

W Europie posiadamy tylko przedstawicieli sekcij: *Selago*, *Inundata* i *Clavata*. Gatunkiem o najszerszym zasięgu rozpowszechnienia jest *Lycopodium Selago*. E. Pritzel (5) przytacza następujące odmiany oraz gatunki uważane za odmiany *L. Selago*:

var. adpressum Desv. — Grenlandja	<i>L. chinense</i> Christ. — Japonja, Chiny
„ laxum Desv. — Europa	<i>L. Haleakale</i> Brack. — Wyspy Sandwich
„ patens Desv. — Amer półn.	<i>L. erubescens</i> Breck. — „ „
„ saururoides Lowe — Madeira	<i>L. saururoides</i> Bory & Durval — Wyspy Ascension.

Wielkie podobieństwo zewnętrzne do *L. Selago*, szeroki zasięg rozpowszechnienia, oraz podobne warunki bytowania posiada *Lycopodium Saururus* Lam. pospolite w górzystych miejscowościach Ameryki południowej. W Argentynie zwane jest „Pillijan“ albo „Coda di Quirquincho“ i używane bywa jako lek gwałtownie czyszczący, a nawet jako środek poronny.

Roślina ta była badana poraz pierwszy przez Ch. Capdeville (2) i Adriana (3), Adrian otrzymał z ziela *L. saururus*

Subgenus	Seccio	Subseccio	Species
Urostachia (brak wyraźnych kłosek, zarodnie w kątach liści wierzeh.)	Selago	Enselago — A (łodygi wzniesione)	L. Selago, L. saururus, L. compactum, L. attenuatum, L. polycladum
		Enselago — B, (łodygi zwisające)	L. verticillatum, L. linifolium, L. taxifolium
	„	Subselago	L. strictum, L. echinatum, L. squarrosum
	Phlegmaria (przejście do kłoska)	—	L. phlegmaria, L. pinifolium, L. phyllanthoides
Rhopalostachia (z wyraźnymi kłoskami)	Inundata	—	L. inundatum, L. alopecuroides, L. cruciatum
	Cernua	—	L. cernuum, L. densum, L. volubile
	Clavata	—	L. clavatum, L. annotinum, L. complanatum, L. alpinum

bezkształtny, brunatny silnie zasadowy, trudno rozpuszczalny w eterze i łatwo w chloroformie alkaloid, który nazwał „pillijanina“ (1886 r.) Następnie bardziej szczegółowe badania chemiczne nad tą rośliną przeprowadzili w Buenos-Aires w r. 1892 P. Arata i F. Ganzeneri (4). Otrzymali oni tenże alkaloid pillijaninę w postaci żółtobrunatnej, bezkształtnej masy, dającej odczyny alkaloidowe ze wszystkimi najważniejszymi odczynnikami na alkaloidy i o wybitnem działaniu trującym. Autorowie ci stwierdzili, że zasadowa pillijanina posiada zapach koniinowy, że bardzo trudno daje krystalizujące sole, że jest zasadą dwuazotową o wzorze sumarycznym $C_{15}H_{24}N_2O$, że przy destylacji w strumieniu wodoru daje ciało podobne bardzo do nikotyny; badania fizjologiczne tych autorów wykazały, że pillijanina, wpuszczona do oka wywołuje zwężenie źrenicy i że 0,1 do 0,2 gr. tego alkaloidu zabija psy, wywołując u nich porażenie serca. W roku 1931 Juan A. Dominguez (6) ogłosił pracę o *L. saururus* w której przytoczył te same szczegóły co Acata i Canzeneri.

Naogół przeto nauka zna dotychczas tylko dwa wypadki występowania alkaloidów u widłaków.

W Wileńszczyźnie, podobnie jak w Lotwie, Litwie, Estonji, Finlandji oraz Skandynawji ludność używa odwarów ziela *L. clavatum* i *L. Selago* jako środka przeciw t. z. kołtunowi (Plica polonica dawnych autorów) i przeciwko wyrzutom skórny. Odwary te stosuje się zewnętrznie, ale zdarza się, że pacjent przez nieporozumienie wypija taki odwar. Następuje wtedy zatrucie. W różnych dziełach opisujących rośliny lecznicze znajdujemy wzmianki (Dragendorff (7), Millspaugh (8), Kosteletzky (9), Gerard-Wyżycki (10), Annenkov, Rołłow (11), B. Jundziłł (12), że *L. Selago* posiada własności mocno drastyczne i trujące.

Wypadek zatrucia się młodej kobiety po wypiciu odwaru z 3 gr. ziela *L. Selago* zdarzył się w Wilnie w październiku 1933 r. W parę godzin po zażyciu tego środka wystąpiły silne objawy zatrucia: osłabienie serca i oddechu, dyskoordynacja ruchów, zwężenie źrenic, wymioty. Pacjentka została przewieziona do szpitala Sawicz, gdzie po przemyciu żołądka i zastosowaniu kamfory i kofeiny udało się ją uratować i po upływie doby pacjentka wyzdrowiała. Dr. Dzikiewiczówna która nadesłała mi znalezione u pacjentki ziele do zbadania, zakomunikowała mi jednocześnie, że to już drugi wypadek

w jej praktyce zatrucia się tą rośliną. Podobno pacjentka zażyła odwar tego ziele w celu pozbycia się jakiejś wysypki na twarzy. Przesłane do zbadania ziele okazało się *L. Selago*, sprzedawanem przez wileńskie znachorki pod nazwą „wrońca”. Jest rzeczą charakterystyczną, że kupując następnie to ziele od wileńskich znachorek otrzymywałem zawsze informację, że jest ono bardzo trujące i że garść tego ziele wystarczyłaby do zatrucia kilku osób. Należy go przeto używać tylko zewnętrznie. Przy badaniach swych stwierdziłem przede wszystkim, że odwar odpowiadający 0,2 gr. ziele już w ciągu 10 — 20 minut poraża myszy i żaby. Kompletny bezwład zwierząt przypomina w zupełności działanie kuraryny. Myszy giną dość szybko wskutek porażenia oddechu, żaby zaś, które oddychają również przez skórę, mogą nieraz leżeć bezwładne w ciągu 24 do 40 godzin, poczem poprawiają się i czują się dobrze. Przy życiu utrzymują się tylko żaby wyjątkowo silne, albowiem większość ginie po upływie 48 godzin. Czasem u takich pozornie już martwych żab można było jeszcze po upływie 48 godzin dostrzec przy otwarciu klatki piersiowej bardzo słabe i zwolnione ruchy serca.

Następnie przerobiłem analogiczne doświadczenia z innymi gatunkami *Lycopodium* spotykanymi na terenie Wileńszczyzny, mianowicie *L. annotinum*, *L. clavatum*, *L. complanatum* i *L. inundatum*. Okazało się, że wszystkie te gatunki posiadają analogiczne działanie trujące i zabijają żaby i myszy przy objawach porażenia kurarycznego (całkowity bezwład). Różnice były nie jakościowe lecz tylko ilościowe. Mianowicie do wywołania tego samego efektu trzeba było używać większych dawek od 0,5 do 1 gr. ziele.

Po tych wstępnych próbach fizjologicznych przystąpiono do badań chemicznych i stwierdzenia, czy wspomniane 5 gatunków europejskich widłaków zawierają alkaloidy. W każdym wypadku posługiwano się różnymi opisanymi w literaturze metodami używanymi do wydzielania alkaloidu z rośliny. Bez względu na metodę zawsze otrzymywano ciała dające wszystkie charakterystyczne odczyny alkaloidów, które przy wstrzyknięciu żabom i myszom dawały takie same objawy zatrucia jak wyciągi z ziele. Najczęściej posługiwałem się metodą następującą: Sproszkowane lub zmiażdżone (jeśli było świeże) ziele wytrawiano 50% alkoholem zakwaszonym zlekką (0,1%) kwasem octowym. Z otrzymanego wyciągu odpędzano alko-

hol, wyciąg sączono, alkalizowano węglanem potasu lub wodorotlenkiem sodu i wyklócano chloroformem, który zabierał z wodnego roztworu alkaloidy. Wyciągi chloroformowe zabarwione są zawsze mniej lub więcej na kolor żółty. Po odpędzeniu chloroformu pozostawał surowy alkaloid w postaci żółtobrunatnej, bezkształtnej masy o wybitnie gorzkim smaku. Celem oczyszczenia otrzymanego alkaloidu rozpuszczano go w rozcieńczonym kwasie solnym (unikając nadmiaru kwasu), roztwór odbarwiano o ile możliwości węglem zwierzęcym, odsączano. Klarowny lecz zawsze jednak zabarwiony na żółto roztwór wodny chlorowodoru alkaloidu ponownie alkalizowano węglanem potasu i wytrącony alkaloid wyklócano chloroformem. Po odpędzeniu chloroformu z takich wyciągów otrzymywano alkaloid w postaci bardziej czystej. Pomimo jednak kilkakrotnego powtarzania takiego oczyszczającego zabiegu dotychczas nie udało mi się otrzymać żadnego z tych alkaloidów w postaci krystalicznej i bezbarwnej, albowiem alkaloidy te ulegają zdaje się utlenieniu i ciemnieniu na powietrzu, podobnie jak widzimy to przy nikotynie lub koniinie. Zawartość tych alkaloidów u różnych widlaków ulega dużym wahaniom. Dotychczas nie posiadam jeszcze ścisłych oznaczeń ilościowych, albowiem nie miałem materiału zebranego w tym samym czasie i przechowywanego w znanych mi warunkach. Naogół jednak mogłem stwierdzić, że gatunkami najbogatszymi w alkaloidy jest *L. Selago* i *L. annotinum*. Z suchego ziela tych gatunków otrzymywałem 0,6 do 0,9% alkaloidu, gdy z innych otrzymywałem zaledwie 0,1—0,3% alkaloidów. Jest rzeczą ciekawą, że poszczególne gatunki *Lycopodium* różnią się między sobą znacznie zawartością soli mineralnych. Celem oznaczenia popiołów badane przeze mnie próbki ziela widlaków prażono w tyglu porcelanowym aż do stałej wagi. Otrzymany popiół wytrawiano gorącym 10% kwasem solnym celem oddzielenia związków rozpuszczalnych od nierozpuszczalnych w kwasie solnym (przeważnie krzemionki). Przemyty nierozpuszczalny osad i odparowany roztwór soli chlorowych suszono do stałej wagi i ważono. Wyniki były następujące: (por. tabelkę na str. 283).

Naturalnie widlaki pochodzące z innych miejscowości i zebrane w innym czasie mogą wykazać pewne różnice ilościowe, ale z dotychczasowych badań wynika, że gatunki najuboższe w sole mineralne okazały się najbogatszymi w alka-

gatunek	popiół %	składniki popiołu oblicz. w % do popiołu	
		nierozpuszczalne w HCl (krzemionka)	sole rozpuszczalne w postaci chlorowodorków
Lyc. annotinum	1,83	9,14	114,96
Lyc. Selago	2,91	39,80	87,70
Lyc. clavatum	4,05	8,61	99,61
Lyc. complanatum	5,37	18,29	111,78

loidy. Na podstawie dotychczasowych wstępnych badań nie mogę orzec, czy we wszystkich pięciu badanych przeze mnie gatunkach *Lycopodium* znajdują się identyczne alkaloidy. Dopóki to nie zostanie wyjaśnione daję tymczasem tym alkaloidom specjalne nazwy, któremi się już będę w dalszym ciągu posługiwał, mianowicie:

Lyc. annotinum — annotyna,
 „ *clavatum* — clavatyna,
 „ *complanatum* — complanatyna (= Lykopodyna Bödekera),
 „ *inundatum* — inundyna,
 „ *Selago* — selagina.

Już dziś mogę powiedzieć, że selagina różni się wybitnie od pozostałych czterech alkaloidów. Mianowicie selagina posiada wybitny zapach mysz (przypominający surową koniinę), gdy pozostałe alkaloidy są bezwonne. Jedna kropla 1% roztworu chlorowodorku selaginy wpuszczona do oka wywołuje w ciągu 20—30 minut wybitne zwężenie źrenicy u człowieka, gdy inne alkaloidy w takich rozcieńczeniach nie wywołują tego efektu. Opierając się na opisach wspomnianej już pracy Arata & Canzoneri wypowiadałam przypuszczenie, że otrzymana przeze mnie z *L. Selago* selagina jest identyczna albo przynajmniej bardzo podobna do pillijaniny, otrzymanej przez tych autorów z *L. saururus*. Czy pozostałe otrzymane przeze mnie alkaloidy są identyczne lub przynajmniej blisko spokrewnione z lykopodyną otrzymaną przez C. Bödekera z *L. complanatum*, dziś jeszcze twierdzić nie mogę, albowiem badania są w toku. Wspólną cechą wszystkich otrzymanych przeze mnie alkaloidów widłakowych jest wybitne działanie typu kurarycznego na myszy i żaby, przyczem śmiertelna dawka dla tych zwierząt wynosi 0,005 — 0,01 gr. Wszystkie te

alkaloidy posiadają dość gorzki smak, ale znacznie słabszy niż np. chinina. Roztwory (1%) soli tych alkaloidów nie posiadają miejscowego działania drażniącego zarówno przy wpuśczeniu do oka, jak i zastrzyknięciu pod skórę. Wszystkie te alkaloidy tworzą łatwo rozpuszczalne w wodzie i alkoholu i nierozpuszczalne w eterze i chloroformie sole z kwasami organicznymi i nieorganicznymi, ale dotychczas nie udało mi się otrzymać tych soli w stanie czystym i krystalicznym, co pozwoliłoby oznaczyć ich punkt topliwości i ciężar cząsteczkowy. Wprawdzie przy ostrożnem nasycaniu gazowym chlorowodem eterowego roztworu alkaloidu wydzielają się po pewnym czasie igielkowate kryształy chlorowodoru alkaloidu, ale po zlanu eteru kryształy się rozplývają, żółkną i po wysuszeniu pozostają w postaci bezkształtnej, żółtawej masy. Wspólną cechą wszystkich alkaloidów widłakowych jest również tworzenie charakterystycznych osadów z pewnemi odczynnikami, jak to wskazuje poniższa tablica (por. str. 285).

Swoistych odczynów barwnych dla tych alkaloidów dotychczas nie znaleziono. Jedynie selaginę można odrazu odróżnić od pozostałych alkaloidów, albowiem bezwonne sole selaginy przy zalkalizowaniu wydzielają odrazu charakterystyczny mysi zapach. Wszystkie wspomniane alkaloidy widłaków przy prażeniu w probówce z pyłem cynkowym wydzielają pyrydynę, co wskazywałoby na obecność w ich cząsteczce heterocyklicznego pierścienia azotowego.

W ciągu bieżącego lata będą zebrane większe ilości spotykanych w Polsce widłaków, ażeby można było otrzymać większe ilości alkaloidów i oznaczyć dokładnie ich własności fizyczne, chemiczne i fizjologiczne.

Ze spotykanych w Europie widłaków nie został dotychczas zbadany gatunek *Lyc. alpinum* L., albowiem otrzymany przeze mnie pod tą nazwą materiał z Tatr okazał się zwykłym *Lyc. complanatum* L. Z powodu iż we wszystkich pięciu zbadanych dotychczas europejskich gatunkach widłaków występują alkaloidy, należy się spodziewać, że i *Lyc. alpinum* okaże się rośliną alkaloidową.

Reasumując wszystko wyżej powiedziane, możemy już dziś stwierdzić, że w różnych gatunkach rodzaju *Lycopodium* występują typowe alkaloidy o silnem działaniu fizjologicznem, co jest zjawiskiem dość rzadkiem w gromadzie Pteridophyta i na co dotychczas nie zwrócono należytej uwagi.

Charakterystyczne odczyny osadowe alkaloidów z europejskich gat. *Lycopodium*.

Odczynnik	Anno- tyna	Clava- tyna	Compla- tyna	Inunda- tyna	Selagina
(rozcieńczenie alkaloidów 1 : 10000)					
Woda bromowa	zmętn.	osad	osad	osad	osad
Płyn Lugola	osad	osad	osad	osad	osad
Odcz. Dragendorfa	osad	osad	osad	osad	osad
Odcz. Meyera	osad	osad	osad	osad	osad
Kwas fosforomolibde- nowy	zmętn.	zmętn.	zmętn.	zmętn.	zmętn.
Kwas krzemowolfra- mowy	zmętn.	zmętn.	zmętn.	zmętn.	zmętn.
Tannina	opaleśc.	opaleśc.	opaleśc.	opaleśc.	opaleśc.
(rozcieńczenie alkaloidów 1 : 1000)					
Chlorek złota	osad	osad	osad	osad	osad
Kwas pikrynowy	zmętn.	zmętn.	zmętn.	zmętn.	zmętn.
(rozcieńczenie alkaloidów 1 : 200)					
Węglan potasu	osad	osad	osad	osad	osad
Wodorotlenek sodu	osad	osad	osad	osad	osad
Amoniak	osad	osad	osad	osad	osad
Chlorek rtęciowy	osad	osad	osad	osad	osad
Żelaziejanek potasu	opaleśc.	opaleśc.	opaleśc.	opaleśc.	osad
Dwuchromian potasu	zmętn.	opaleśc.	opaleśc.	opaleśc.	osad

LITERATURA:

- 1) K. Bödeker, — Lycopodin, das erste Alkaloid der Gefässkryptogamen, J. Liebig's Annalen der Chemie, B. 208, p. 363, 1881 r.
- 2) Ch. Capdeville, — Etudes botaniques, chimiques et physiologiques sur Pillijan (*Lycopodium Saururus*), Dissertation, Paris, 1886.
- 3) Adrian, — Nouveaux Remèdes, p. 272 i 387 — 411, 1886 r. Jahrbuch der Pharmazie, p. 60, 1886 r.
- 4) P. N. Arata e F. Canzoneri, — Contributo allo studio del „Pillijan” (*Lycopodium Saururus* Lam.) Gazzetta chim. italiana, Vol. XXII, p. 146 — 150, 1892.

- 5) E. Pritzel, — Engler & Prantl — Die natürlichen Pflanzenfamilien, T. I., Abt. IV p. 563 — 606, 1902 r.
 - 6) Juan A. Dominguez, — Lycopodium Saururus Lam. vulge Pillijan, — Revista Centro Estudiantes Farmacia Biochimica, 20, p. 534 — 547, 1931 r.
 - 7) C. Dragendorf, — Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker und Zeiten, p. 61, 1898 r.
 - 8) Ch. F. Millspaugh, — American Medicinal Plants, Vol. II, p. 180—182, 1887 r.
 - 9) V. F. Kosteletzky, — Medicinisch — pharmaceutische Flora, T. I, p. 44, 1831 r.
 - 10) J. Gerald-Wyżyci, — Zielnik ekonomiczno - techniczny, T. II, p. 290, 1845 r.
 - 11) A. Rollow, — Diko rastuszczycja rastienja Kawkaza, p. 303, 1908 r.
 - 12) B. S. Jundzill, — Opisanie roślin w prowincji W. X. L. rosnących, p. 519, 1791 r.
-