Studia klimatologiczne

Études climatologiques

XXVII—XXX

par

Dezydery Szymkiewicz

(Wpłynęło do redakcji 14 października 1938 — Reçu le 14 octobre 1938)

(Z 8 rycinami w tekście — Avec 8 figures dans le texte)

XXVII. L'humidité du climat de l'Angleterre et de l'Irlande

Les îles Britanniques sont intéressantes au point de vue climatologique par leur climat océanique le plus accusé en Europe. Le caractère très saillant de ce climat est son humidité, très importante pour la vie végétale. J'ai essayé de la définir par la hauteur des précipitations, l'indice d'évaporation et le quotient hygrométrique. Comme dans mes précédentes études sur ce sujet, je prends la période 1895—1904 (voyez la partie VI).

Je calcule les maxima mensuels moyens de l'indice d'évaporation au moyen de la formule que j'ai déduite des travaux de Stefan dans la partie V de ces études:

$$i = (p' - p) \frac{273 + t}{273} \frac{760}{P - p'}$$

Dans cette formule P est la pression barométrique moyenne en mm de mercure, t — la température maximum moyenne, p — la tension de vapeur (en mm) pour la période de la journée quand la température est la plus élevée et p' — la tension de vapeur saturée à la température t . Faute de la tension de vapeur correspondant à la température maximum, j'ai pris la valeur moyenne des observations de 9 et 21 h. Étant donné que la tension de vapeur varie peu au cours de la journée, ce procédé n'entraîne pas d'erreurs trop grandes.

Fig. 1 (Carte 1). Angleterre et Irlande. Les maxima moyens de l'indice d'évaporation pour le mois le plus sec.

Fig. 2 (Carte 2). Angleterre et Irlande. Quotient hygrométrique.

TABLE I

Irlande et Angleterre (1895—1904). *H* — altitude en *m*, *r* — précipitations en *mm*, *i* — maxima moyens de l'indice d'évaporation, *Q* — quotient hygrométrique

	Latitude <i>N</i>	Longitude	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>	<i>VII</i>	<i>VIII</i>	<i>IX</i>	<i>X</i>	<i>XI</i>	<i>XII</i>	Σ	<i>Q</i>
Armagh	54° 21'	6° 39' W	60	<i>r</i> 66.1	54.5	63.1	56.2	61.2	65.5	79.2	98.4	74.5	67.5	71.1	77.2	834.5	16.4
				<i>i</i> 1.9	2.2	3.1	4.4	5.3	6.8	6.8	6.4	5.6	3.1	2.5	2.8	50.9	
Cahirciveen (Valencia)	51° 56'	10° 15' W	9	<i>r</i> 139.5	127.7	113.2	107.7	65.7	92.8	80.4	138.2	124.1	138.3	139.3	139.6	1446.1	37.4
				<i>i</i> 1.9	1.9	2.4	3.1	4.4	5.1	5.1	4.6	3.1	2.9	2.3	1.9	38.7	
Dublin (Phoenix Park)	53° 22'	6° 21' W	47	<i>r</i> 67.1	48.0	57.5	40.3	45.3	55.8	80.3	91.7	60.0	63.1	78.2	61.5	748.8	13.9
				<i>i</i> 2.4	2.5	3.3	4.4	5.5	6.9	7.1	6.6	5.8	3.9	3.1	2.4	53.9	
Markree Castle	54° 11'	8° 27' W	37	<i>r</i> 81.4	76.2	94.8	75.4	71.0	92.6	71.2	111.0	86.9	91.3	99.3	125.6	1076.7	21.8
				<i>i</i> 2.0	2.3	3.2	4.2	5.5	6.1	6.1	6.1	5.3	3.7	2.6	2.2	49.3	
Parsonstown (Birr Castle)	53° 06'	7° 55' W	53	<i>r</i> 72.4	53.5	72.5	59.2	49.3	58.2	75.1	110.7	66.0	69.4	92.4	83.1	861.8	17.3
				<i>i</i> 1.9	2.3	3.0	4.1	5.6	6.7	6.6	6.3	5.3	3.5	2.5	1.9	49.7	
Aberdeen	57° 10'	2° 06' W	14	<i>r</i> 62.7	50.0	61.4	59.4	57.0	45.2	73.0	72.5	57.0	75.5	62.1	91.4	767.2	17.8
				<i>i</i> 2.2	2.2	2.7	3.1	3.9	4.9	5.8	5.4	4.6	3.4	2.7	2.2	43.1	
Aysgarth	54° 18'	1° 58' W	197	<i>r</i> 94.6	70.7	91.7	58.9	54.5	55.6	81.9	82.7	68.6	112.8	90.3	117.9	980.2	18.3
				<i>i</i> 1.8	2.0	2.8	4.1	5.2	7.1	11.1	6.8	5.4	3.2	2.3	1.7	53.5	
Ben Nevis	56° 48'	5° 00' W	1343	<i>r</i> 518.7	346.0	456.0	340.3	218.3	200.6	279.2	321.7	371.8	398.2	411.5	587.5	4449.8	261.7
				<i>i</i> 0.8	0.9	1.0	1.1	1.8	3.2	2.0	1.8	1.5	1.0	1.2	0.7	17.0	

Braemar	57°00'	3°24'W	339	<i>r</i>	74.1	55.2	77.2	64.4	55.6	55.9	58.9	88.0	67.5	92.3	77.3	105.7	872.1	18.0
				<i>i</i>	1.7	1.9	2.5	3.6	6.5	6.7	6.8	6.1	5.1	3.4	2.4	1.8	48.5	
Cheadle	52°58'	1°57'W	197	<i>r</i>	68.2	53.0	60.1	55.0	48.0	55.3	61.2	92.8	68.8	73.9	63.5	81.2	781.0	15.3
				<i>i</i>	1.6	2.0	3.0	4.4	5.6	7.2	8.1	6.5	5.8	3.5	2.2	1.2	51.1	
Cheltenham	51°54'	2°03'W	56	<i>r</i>	53.7	52.6	47.2	43.5	50.0	46.3	51.3	70.3	47.2	65.2	52.4	66.7	646.1	9.8
				<i>i</i>	2.0	2.4	3.7	5.1	7.1	8.9	10.9	9.2	7.3	4.1	2.7	2.2	65.6	
Cronkbourne	54°10'	4°29'W	42	<i>r</i>	90.7	81.8	76.8	66.4	58.9	65.1	75.0	108.4	95.4	128.5	111.0	128.4	1086.4	27.0
				<i>i</i>	1.7	1.8	2.3	3.2	4.5	5.4	5.3	5.0	4.0	3.0	2.2	1.8	40.2	
Deerness	58°56'	2°45'W	52	<i>r</i>	82.5	69.0	68.6	63.9	46.8	49.1	64.5	70.6	87.1	104.7	87.0	116.3	910.1	31.2
				<i>i</i>	1.7	1.6	1.8	2.3	3.0	3.1	3.5	3.2	2.8	2.4	2.0	1.8	29.2	
Dunrobin Castle	57°59'	3°56'W	4	<i>r</i>	72.3	56.3	66.9	66.3	54.6	53.3	77.9	65.0	68.3	81.3	69.9	91.4	823.5	19.1
				<i>i</i>	2.2	2.3	2.9	4.4	4.1	4.5	4.6	5.3	4.7	3.5	2.6	2.1	43.2	
Falmouth	50°09'	5°04'W	51	<i>r</i>	117.7	85.8	81.2	70.7	48.8	53.8	51.8	73.0	76.8	111.4	99.9	182.0	1052.9	22.5
				<i>i</i>	2.2	2.4	2.9	3.6	4.7	5.4	6.6	5.7	4.7	3.5	2.8	2.3	46.8	
Fort William	56°49'	5°07'W	9	<i>r</i>	221.4	163.4	190.2	139.7	90.9	98.4	114.6	167.6	200.1	206.8	175.8	296.5	2065.4	41.5
				<i>i</i>	2.2	2.4	3.5	3.7	5.8	6.7	6.2	5.8	5.1	3.5	2.7	2.2	49.8	
Geldeston	52°28'	1°31'E	11	<i>r</i>	41.6	32.3	45.2	38.4	44.2	46.2	51.9	59.6	46.2	55.4	47.6	54.8	563.4	9.7
				<i>i</i>	2.0	2.3	2.7	4.6	5.5	7.5	9.3	8.3	6.8	4.3	2.8	2.0	58.1	
Glasgow	55°53'	4°18'W	55	<i>r</i>	88.3	62.0	69.5	57.6	57.4	77.1	79.2	105.5	86.8	95.4	86.6	114.8	980.2	20.9
				<i>i</i>	1.7	1.9	2.5	3.9	5.8	6.7	6.4	6.0	4.8	3.1	2.2	1.8	46.8	

	Latitude <i>N</i>	Longitude	<i>H</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ	<i>Q</i>
Glencarron	57° 30'	5° 14' W	149	<i>r</i> 239·4 <i>i</i> 2·0	140·7 2·2	212·1 2·4	178·3 3·8	108·3 5·3	104·7 6·2	141·2 5·7	190·5 5·6	210·7 5·3	235·6 3·3	221·9 2·6	273·2 2·0	2256·5 46·4	48·6
Hillington	52° 48'	0° 33' E	27	<i>r</i> 54·9 <i>i</i> 1·8	43·5 2·3	55·1 2·7	41·9 4·5	53·3 5·8	48·6 8·5	58·9 10·4	80·6 9·2	60·4 7·4	76·2 4·2	53·5 2·4	69·1 1·8	696·0 61·0	11·4
Kew	51° 28'	0° 19' W	5	<i>r</i> 40·0 <i>i</i> 2·0	40·9 2·4	44·9 3·3	33·7 5·0	40·0 6·7	57·3 6·9	47·8 11·4	58·6 9·5	52·2 7·1	59·3 3·9	47·3 2·7	54·7 2·0	576·7 62·9	9·2
Llandudno	53° 21'	3° 50' W	27	<i>r</i> 69·8 <i>i</i> 2·4	54·9 2·5	61·0 2·9	50·5 4·0	47·2 5·1	45·7 6·6	52·1 7·1	85·8 7·0	61·0 6·0	96·8 3·9	73·2 3·2	78·1 2·5	776·1 53·2	14·6
Poltalloch	56° 08'	5° 30' W	40	<i>r</i> 109·1 <i>i</i> 2·0	79·8 2·5	95·7 2·6	78·2 4·3	60·5 6·2	70·8 7·0	93·2 6·6	125·6 6·5	127·8 5·5	125·6 4·1	132·9 2·7	152·0 2·1	1251·2 52·1	24·0
Southampton	50° 55'	1° 24' W	24	<i>r</i> 64·9 <i>i</i> 2·0	61·6 2·5	59·0 3·7	50·8 5·2	52·0 7·2	53·1 7·8	46·1 11·2	72·5 9·3	59·9 7·8	89·5 4·6	62·2 2·9	90·1 2·1	761·7 66·3	11·5
Tealby	53° 24'	0° 16' W	77	<i>r</i> 48·3 <i>i</i> 1·5	38·2 2·0	49·6 2·9	50·1 4·1	47·5 4·4	48·2 6·6	56·2 8·0	86·8 7·0	58·8 5·8	83·2 3·4	48·2 2·1	63·4 1·6	678·5 49·4	13·7
York	53° 57'	1° 05' W	16	<i>r</i> 43·4 <i>i</i> 2·1	38·6 2·2	41·6 3·3	40·5 4·8	48·7 6·2	48·4 8·3	50·5 9·3	62·3 8·1	43·2 6·6	71·4 3·9	52·8 2·4	56·8 2·0	598·2 59·2	10·1

Le quotient hygrométrique est calculé en divisant la somme annuelle des précipitations par la somme des maxima mensuels de l'indice d'évaporation. On peut aussi calculer cette fonction pour chaque mois séparément, mais l'utilité des valeurs pareilles est douteuse.

Les résultats sont réunis dans la table I et représentés partiellement dans les cartes 1 et 2. Dans la carte 1, sont marquées les valeurs des maxima moyens mensuels de l'indice d'évaporation pour le mois le plus sec dans les stations situées à l'altitude moindre de 1000 m. La carte 2 donne la distribution du quotient hygrométrique pour les mêmes stations.

On voit que l'humidité du climat dans le terrain considéré est élevée, surtout dans l'Irlande occidentale et le Nord de l'Écosse, sans parler de la station alpine de Ben Nevis. La faible évaporation explique entre autres choses le fait intéressant que *Dryas octopetala* descend en Irlande occidentale au bord de l'océan (à la baie de Galway, voyez Johnson 1910).

XXVIII. L'humidité du climat de la Sibérie et du Turkestan

La Sibérie et le Turkestan sont très intéressants à cause des grands contrastes qu'on y rencontre, entre autres choses au point de vue de l'humidité du climat. J'ai réuni, dans la table II, les valeurs des précipitations, de l'indice d'évaporation et du quotient hygrométrique pour la période 1895—1904. Malheureusement, dans pas mal de stations les observations accusent des lacunes et pour certaines d'entre elles j'ai dû me contenter d'une période plus courte: ainsi pour Krasnoïarsk manquent les années 1897 et 1898, pour Nikolaevsk sur Amour 1900, pour Okhotsk et Pékin il n'y a que les années 1895—1899, pour Przevalsk manquent les années 1897—9, dans Rousskoe Oustie les observations couvrent la période 1896—1903, à Verkhoïansk manque 1899. Les stations Ourga et Pékin ont été prises, à titre de comparaison, quoiqu'elles se trouvent au-delà du terrain considéré.

Comme le réseau russe d'avant la guerre n'observait pas les maxima de la température, j'ai été obligé de calculer pour l'indice d'évaporation les valeurs de 13 h au lieu des maxima. Ces valeurs (voyez la partie VI de ces études) sont plus petites que les maxima dans la proportion de 1:1.25 pour les contrées situées plus au Nord et dans la proportion de 1:1.20 pour les contrées plus méridionales. Les valeurs du quotient hygrométrique sont, par suite, trop grandes dans la même proportion.

TABLE II

Sibérie et Turkestan (1895—1904). H — altitude en m , r — précipitations en mm , i — indice d'évaporation pour 13 h , Q — quotient hygrométrique

	Latitude N	Longi- tude E	H	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ	Q
Akmolinsk	51° 12'	71° 23'	350	r	15.7	13.5	9.2	18.3	24.3	48.9	34.8	33.8	27.8	30.3	20.7	19.1	296.4
				i	0.1	0.1	0.3	2.3	9.9	13.7	17.0	13.3	7.7	3.5	0.5	0.1	68.5
Askhabad	37° 57'	58° 23'	225	r	24.9	23.3	50.4	34.7	24.9	12.8	4.8	1.2	2.0	12.5	26.8	20.9	239.2
				i	2.0	4.5	5.9	12.6	22.7	34.5	39.8	38.9	26.5	14.7	5.7	3.3	211.1
Barnaoul	53° 20'	83° 47'	170	r	44.7	20.9	21.4	28.9	39.9	53.1	59.3	56.0	44.9	45.8	43.7	35.1	493.7
				i	0.1	0.1	0.7	2.7	8.1	11.7	13.3	10.8	7.3	2.6	0.5	0.1	58.0
Belagatchskoe Zimovie	50° 40'	80° 25'	328	r	9.4	5.4	6.1	15.2	24.0	39.3	44.9	40.7	17.0	29.0	26.1	10.4	267.5
				i	0.1	0.3	0.9	3.2	10.4	14.3	15.8	13.9	9.8	3.8	1.1	0.1	73.7
Borovyia Ozera	51° 45'	80° 20'	190	r	13.4	5.5	8.1	20.4	27.2	33.0	59.4	43.3	29.8	33.0	20.3	12.4	305.8
				i	0.1	0.1	0.7	3.2	9.4	13.9	14.2	12.5	8.2	2.6	1.0	0.2	66.1
Eniseisk	58° 27'	92° 06'	94	r	23.7	12.7	11.3	21.4	29.9	51.4	63.4	79.1	38.7	42.9	36.0	25.5	436.0
				i	0.1	0.1	1.0	2.6	5.3	8.6	9.6	6.1	2.9	0.8	0.3	0.1	37.5
Iakoutsik	62° 01'	129° 43'	100	r	5.9	4.7	1.9	8.8	11.4	25.3	29.0	34.7	24.5	11.1	9.6	7.2	174.1
				i	0.1	0.1	0.1	1.2	4.6	9.0	11.1	8.0	3.6	0.2	0.1	0.1	38.2
Irkoutsik	52° 16'	104° 19'	478	r	10.6	8.6	7.4	14.6	31.7	54.1	74.6	75.6	38.2	23.2	17.6	19.2	375.4
				i	0.1	0.4	1.3	4.1	7.6	12.9	12.1	9.5	6.4	2.9	0.7	0.1	58.1

Kainsk	55° 27'	78° 20'	120	<i>r</i>	21.0	13.9	10.6	14.2	28.4	50.8	75.2	57.8	37.4	26.6	23.6	19.0	378.5	8.4
				<i>i</i>	0.1	0.1	0.4	1.6	6.7	9.3	11.4	7.9	5.5	2.0	0.1	0.1	45.2	
Kansk	56° 12'	95° 39'	217	<i>r</i>	9.0	6.1	4.4	14.9	26.0	44.4	68.4	56.0	32.8	22.9	10.6	13.0	308.5	6.0
				<i>i</i>	0.1	0.2	0.9	2.6	6.5	11.5	11.6	9.1	6.0	1.8	0.6	0.1	51.0	
Kazalinsk	45° 46'	62° 07'	80	<i>r</i>	10.7	12.3	15.9	15.6	10.2	5.8	6.8	7.7	9.5	8.2	12.0	14.0	128.7	1.0
				<i>i</i>	0.2	0.6	1.2	6.5	16.6	23.8	27.2	23.9	14.4	6.6	1.4	0.2	122.6	
Kirensk	57° 47'	108° 07'	376	<i>r</i>	21.0	12.4	12.1	13.0	22.1	41.8	45.7	53.4	41.5	28.5	24.7	24.2	340.4	6.9
				<i>i</i>	0.1	0.1	1.0	2.9	6.5	11.1	12.1	9.6	4.5	1.5	0.1	0.1	49.6	
Krasnoïarsk	56° 01'	92° 49'	168	<i>r</i>	7.9	7.7	9.2	16.3	33.0	41.4	62.0	63.1	26.3	24.5	11.6	13.0	316.0	6.2
				<i>i</i>	0.1	0.2	0.8	2.9	6.8	9.4	11.0	8.4	8.4	2.1	1.0	0.1	51.2	
Markovo sur Anadyr	64° 45'	170° 50'	20	<i>r</i>	6.2	5.3	6.2	4.1	7.8	23.8	22.8	47.8	32.0	12.5	12.6	7.5	188.6	8.3
				<i>i</i>	0.1	0.1	0.1	0.1	1.6	5.0	8.0	4.5	2.5	0.5	0.2	0.1	22.8	
Narynskoe	41° 26'	76° 02'	2033	<i>r</i>	8.3	6.9	19.2	25.1	60.4	54.7	38.5	23.3	14.4	16.3	8.2	11.1	286.4	2.8
				<i>i</i>	0.6	1.1	3.8	7.2	11.7	14.4	17.8	19.1	15.6	8.0	3.4	1.1	103.8	
Nertchinski Zawod	51° 19'	119° 37'	622	<i>r</i>	2.2	2.4	2.9	17.5	43.5	36.6	112.9	114.9	29.4	10.9	6.4	2.8	382.4	6.6
				<i>i</i>	0.1	0.2	0.9	4.1	7.6	12.6	12.7	8.5	7.4	3.1	0.7	0.1	58.0	
Nikolaevsk sur Amour	53° 08'	140° 45'	32	<i>r</i>	15.1	10.4	9.9	20.6	33.9	29.4	51.1	87.7	58.7	65.4	18.0	23.4	423.6	18.2
				<i>i</i>	0.1	0.1	0.3	1.1	1.9	3.2	4.7	4.6	4.5	2.1	0.6	0.1	23.3	
Obdorsk	66° 31'	66° 35'	37	<i>r</i>	7.8	8.8	5.9	6.3	18.0	42.1	48.3	58.1	38.3	18.6	11.0	12.4	275.6	18.9
				<i>i</i>	0.1	0.1	0.1	0.2	0.9	2.6	5.0	3.4	1.7	0.3	0.1	0.1	14.6	

	Latitude <i>N</i>	Longi- tude <i>E</i>	<i>H</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ	<i>Q</i>
Okhotsk	59° 21'	143° 17'	6	<i>r</i> 2·7	4·4	4·3	18·9	17·3	60·3	47·7	54·4	66·3	39·7	3·8	4·4	324·2	18·8
				<i>i</i> 0·1	0·4	0·7	0·9	1·6	1·1	2·6	3·4	3·9	2·1	0·3	0·1	17·2	
Omsk	54° 58'	73° 23'	101	<i>r</i> 19·1	9·6	6·7	10·0	26·9	50·0	60·3	39·1	32·7	24·1	20·2	23·5	322·2	6·5
				<i>i</i> 0·1	0·1	0·4	1·8	7·7	10·0	11·8	9·7	6·0	2·0	0·1	0·1	49·8	
Ourga	47° 55'	106° 50'	1325	<i>r</i> 2·1	0·9	2·3	5·4	13·6	31·6	68·8	60·1	19·8	4·6	7·2	4·8	221·2	3·2
				<i>i</i> 0·1	0·3	1·5	5·1	7·7	13·6	13·4	12·5	8·6	3·8	1·4	0·1	68·1	
Pamirski Post	38° 11'	74° 02'	3640	<i>r</i> 3·1	2·7	1·8	3·1	7·8	17·2	7·5	5·1	4·2	2·2	2·3	2·7	59·7	0·5
				<i>i</i> 1·1	1·5	4·4	6·9	11·1	13·8	18·3	19·1	13·4	6·4	4·0	1·5	101·5	
Pékin	39° 57'	116° 28'	38	<i>r</i> 4·6	6·3	17·5	35·3	14·5	59·8	237·3	90·2	35·4	16·5	7·6	2·2	527·2	4·5
				<i>i</i> 3·0	3·1	4·2	10·1	16·3	19·3	14·3	14·5	13·7	9·9	5·4	3·2	117·0	
Przevalsk	42° 30'	78° 26'	1805	<i>r</i> 15·7	9·4	27·5	38·5	37·8	63·0	68·0	59·6	56·9	44·9	21·6	15·9	458·8	4·6
				<i>i</i> 2·2	2·7	4·6	7·3	11·7	14·2	15·2	16·2	13·6	6·2	4·1	2·4	100·4	
Rousskoe Oustie	71° 01'	149° 26'	6	<i>r</i> 4·6	7·3	7·8	3·3	9·1	25·6	31·1	29·9	17·3	7·6	9·3	6·5	159·4	17·9
				<i>i</i> 0·1	0·1	0·1	0·2	0·3	1·6	3·5	1·7	0·6	0·5	0·1	0·1	8·9	
Rykovskoe	50° 47'	142° 55'	125	<i>r</i> 19·7	13·2	24·0	37·3	36·1	44·9	63·0	85·7	78·6	96·2	44·3	39·4	582·4	13·8
				<i>i</i> 0·3	0·4	1·1	2·6	4·7	7·1	8·7	7·3	6·4	2·4	0·8	0·4	42·2	
Samarkand	39° 39'	66° 57'	720	<i>r</i> 36·9	22·0	57·6	62·8	45·3	9·2	6·5	2·0	2·5	26·2	37·2	27·6	335·8	2·0
				<i>i</i> 2·4	4·1	4·9	9·6	17·4	26·9	31·0	28·2	24·5	11·7	5·5	3·7	169·9	

Sourgout	61° 17'	73° 20'	52	<i>r</i>	15.0	10.4	9.3	7.6	23.9	68.8	75.2	79.3	59.0	26.9	22.2	15.2	412.8	14.8
				<i>i</i>	0.1	0.1	0.4	1.2	3.3	5.5	8.0	5.5	2.9	0.7	0.1	0.1	27.9	
Tachkent	41° 20'	69° 18'	515	<i>r</i>	52.3	29.8	59.3	59.7	35.6	18.4	6.4	1.4	3.4	32.5	52.3	43.6	394.7	2.3
				<i>i</i>	2.0	3.7	5.4	9.9	17.9	26.5	33.3	29.8	20.8	11.3	4.9	3.1	168.6	
Tehita	52° 01'	113° 30'	686	<i>r</i>	2.3	2.5	2.3	7.7	26.5	49.5	88.9	86.2	30.2	12.4	4.5	4.9	317.9	
				<i>i</i>	0.1	0.4	1.2	5.1	8.8	17.2	15.6	10.2	8.3	3.1	0.6	0.1	70.7	4.5
Tioumen	57° 10'	65° 32'	90	<i>r</i>	19.4	21.2	11.6	15.9	35.2	47.2	61.4	40.5	37.0	29.2	29.6	25.1	373.3	8.3
				<i>i</i>	0.1	0.2	0.9	3.0	6.9	9.3	10.5	8.2	4.4	1.9	0.3	0.1	45.8	
Tomsk	56° 30'	84° 58'	135	<i>r</i>	35.4	24.3	20.3	27.5	36.8	61.5	61.3	77.7	49.5	43.8	46.8	38.2	523.1	12.3
				<i>i</i>	0.1	0.1	1.0	2.5	6.2	9.0	10.2	7.2	4.6	1.5	0.1	0.1	42.6	
Troitskosavsk	50° 22'	106° 27'	782	<i>r</i>	2.9	1.4	2.9	7.3	26.7	31.4	71.0	61.5	32.2	10.4	4.0	3.7	255.4	3.5
				<i>i</i>	0.2	0.4	1.4	5.0	9.0	15.8	15.6	12.4	7.2	3.7	1.2	0.2	72.1	
Verkhofiansk	67° 34'	133° 51'	107	<i>r</i>	4.0	4.7	3.7	5.3	7.7	28.0	33.0	26.3	18.7	9.1	7.5	3.7	151.7	4.6
				<i>i</i>	0.1	0.1	0.3	1.1	3.8	8.0	9.5	6.6	3.0	0.2	0.1	0.1	32.9	
Vernyi	43° 16'	76° 52'	782	<i>r</i>	31.9	25.7	62.6	104.0	101.8	75.1	45.1	33.9	32.6	50.6	55.7	30.2	649.2	6.2
				<i>i</i>	0.6	1.2	2.2	6.6	11.6	14.3	19.7	20.6	14.9	7.2	5.1	1.2	105.2	
Vladivostok-Port	43° 07'	131° 54'	30	<i>r</i>	8.5	9.8	13.3	24.3	61.3	77.5	90.9	157.6	116.3	44.1	13.0	11.1	627.7	16.1
				<i>i</i>	0.7	0.9	2.0	3.6	4.2	3.3	4.0	5.5	6.4	4.8	2.6	1.0	39.0

Fig. 3 (Carte 3). Sibérie et Turkestan. Les valeurs de l'indice d'évaporation de 13 h pour le mois le plus sec. Le trait fort indique la limite des forêts.

Pour ce qui est de l'indice d'évaporation, ce facteur climatologique augmente fortement à mesure que l'on va plus au Sud. On le voit nettement dans la carte 3, dans laquelle sont marquées les valeurs pour le mois le plus sec de l'année, dans les stations situées à l'altitude moindre de 1000 *m*. Intéressante est en outre l'intensité assez considérable de l'évaporation dans les stations élevées, telles que Przevalsk (1805 *m*), Narynskoe (2033 *m*) et Pamirski Post (3640 *m*). Le climat alpin est ici sec, contrairement à ce qu'on observe dans l'Europe centrale. La température assez élevée en est la cause.

Dans la carte 4 sont marquées les valeurs du quotient hygrométrique pour les stations à l'altitude moindre de 1000 *m*. On voit qu'en Sibérie occidentale la limite des forêts correspond à la valeur 6 à l'instar de la Russie d'Europe (voyez la partie VI de ces études). Dans la Sibérie orientale, au contraire, la forêt croît aussi dans les terrains plus secs. La cause de ce phénomène étrange est sans doute la présence des couches constamment gelées dans le sol. Ces couches imperméables retiennent les eaux des précipitations dans les parties peu profondes du sol. Les arbres sont, par suite, mieux pourvus d'eau (voyez la partie XXVI de ces études).

Je doit ajouter encore que la limite des forêts dans les cartes 3 et 4 est approximative, car faute des données plus exactes, j'ai dû me contenter d'une petite carte de Tanfiliew, publiée par Kouznetzow (1912).

XXIX. Les monographies climatologiques

Dans la partie XXVI de ces études, j'ai donné les monographies climatologiques de Cracovie et Iakoutsk, dans lesquelles j'ai réuni toutes les données intéressant l'écologie végétale. Je vais continuer ces représentations, en choisissant les stations importantes pour la phytogéographie.

Je commence par l'hémisphère Sud, en prenant d'abord la Géorgie du Sud et les îles Falkland, pour lesquelles on a un intéressant travail de Brooks (1920).

Brooks a publié pour la Géorgie du Sud les observations, effectuées à Grytviken (tab. III). Malheureusement, pour les vents, si forts dans ces parages, il n'y a dans cette publication que des indications sommaires.

J'ai calculé la température moyenne d'après les observations de 8, 14 et 20 h au moyen de la formule:

$$\frac{t_8 + t_{14} + 2t_{20}}{4}$$

Pour calculer l'indice d'évaporation, j'ai utilisé la tension de vapeur pour 14 h. La vitesse des réactions chimiques a été déterminée, comme dans la partie XXVI, d'après la loi de van't Hoff, au moyen de la formule:

$$2.5^{\frac{t}{10}}$$

où t est la température moyenne. La vitesse des réactions à 0° est prise pour l'unité.

Fig. 5. Iles Falkland. *Crataegus* sp. cultivé à l'abri d'un mur.
D'après Skottsberg.

Je considère comme la saison de végétation la période de l'année pendant laquelle la température minimum est au-dessus de zéro. Pour déterminer le commencement et la fin de cette période je me

TABLE
Grytviken (Géorgie du Sud)

	I	II	III	IV
Température moyenne	5·94	6·07	5·28	2·95
Vitesse des réactions	1·72	1·74	1·62	1·31
Température max. moyenne	9·7	10·4	9·3	6·3
Temp. min. moy.	2·2	2·3	+1·69	—0·46
Temp. min. absol. moy.	—1·0	—1·0	—2·0	—5·1
Pression barométrique (700+...) . .	45·7	46·8	47·9	46·6
Tension de vapeur à 14 h. (mm) . .	5·7	5·9	5·3	4·6
Indice d'évaporation	3·5	3·8	3·8	2·7
Nébulosité à 8 h	7·6	7·3	7·2	7·2
Nébul. à 14 h	7·5	6·9	6·9	7·1
Nébul. à 22 h.	7·5	7·0	6·5	6·0
Somme des précipitations (mm) . .	72·7	126·7	133·2	139·0
Précipit. journ. max. moy.	20·1	35·6	42·2	36·7
Jours des précipitations	15·8	16·2	16·9	18·9
Jours de neige	3·8	4·0	6·4	8·6

TABLE
Cape Pembroke (Falkland Isl.)

	I	II	III	IV
Température moyenne	9·55	9·32	8·63	6·49
Vitesse des réactions	2·40	2·35	2·21	1·81
Température max. moyenne	12·7	12·5	11·6	9·1
Temp. min. moy.	7·0	6·7	5·9	3·8
Temp. min. absol. moy.	3·2	3·6	+2·1	—1·0
Pression barométrique (700+...)	47·9	48·5	50·6	49·1
Tension de vapeur moy. de 12 et 16 h. .	7·3	7·3	7·1	6·2
Indice d'évaporation max. moy.	4·0	3·9	3·3	2·6
Nébulosité diurne	7·1	7·1	7·1	7·3
Néb. nocturne	7·2	6·9	6·7	6·6
Vitesse du vent moy. en degrés de Beaufort	4·35	4·58	4·60	4·60
Vitesse du vent moy. en m/sec	8·8	9·3	9·4	9·4
Jours des précipitations	21·5	20·8	18·6	20·7
Jours de neige	0·3	0·3	0·6	3·6
Somme des précipitations à Port Stanley (mm) (1904—1914)	72·8	61·4	55·5	60·8

III

54°14' S, 36°33' W, 3 m (1906—1915)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.18	—1.58	— 2.10	— 1.48	+0.66	1.88	3.16	4.15
1.12	0.87	0.83	0.87	1.06	1.19	1.34	1.46
4.1	0.8	0.8	1.6	4.2	5.5	6.6	7.8
—1.9	—4.6	— 5.3	— 5.0	—4.1	—1.9	—0.09	+0.48
—6.9	—9.8	—11.1	—11.5	—9.0	—6.9	—3.8	—2.4
45.6	48.6	48.0	49.6	51.0	49.6	44.4	48.0
4.0	3.2	3.0	3.5	4.0	4.1	4.4	4.8
2.2	1.7	2.0	1.6	2.3	2.8	3.1	3.3
7.3	6.8	6.5	6.8	6.6	7.0	7.4	7.2
7.3	6.8	6.7	6.8	6.6	6.8	7.4	7.4
6.2	6.0	5.7	6.0	5.5	6.3	7.6	7.5
162.9	109.9	130.4	126.2	87.2	73.6	111.7	94.0
38.2	34.9	32.7	38.6	32.1	26.0	35.0	25.0
20.3	14.6	16.7	16.1	14.3	13.4	17.7	15.3
12.1	10.7	13.1	13.6	10.3	9.2	10.4	7.2

IV

51°41' S, 57°42' W, 21 m (1905—15)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
4.61	3.09	2.60	3.03	4.13	5.45	6.57	7.94
1.53	1.33	1.27	1.32	1.46	1.65	1.83	2.07
6.6	5.0	4.5	5.0	6.8	8.4	9.9	11.0
2.1	0.6	0.4	0.7	1.7	2.9	3.9	5.4
—1.7	—3.7	—4.6	—2.6	—1.6	—0.1	+0.2	1.6
48.0	48.6	50.6	49.3	47.4	51.8	47.4	48.8
5.5	5.1	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.7
1.9	1.5	1.5	1.5	2.1	2.7	3.3	3.3
7.6	7.7	7.7	7.4	7.1	7.1	7.0	7.2
6.9	6.9	6.8	6.8	6.5	6.8	7.0	7.3
4.43	4.26	4.29	4.31	4.46	4.54	4.63	4.18
9.0	8.5	8.6	8.7	9.0	9.2	9.5	8.3
23.2	23.9	21.1	22.4	17.5	18.0	21.6	20.8
6.5	10.0	11.0	8.3	5.1	2.8	4.1	1.6
63.6	52.9	53.2	51.8	27.9	42.7	53.6	70.8

servirai de la méthode exposée dans la partie XXVI de ces études. On obtient ainsi pour Grytviken la date de 20 novembre pour le commencement et de 4 avril pour la fin de la saison de végétation. Le climat est tellement rude que les minima absolus moyens

Fig. 6. Une plantations des pins et des peupliers à Hill Cove dans l'île occidentale des Falkland. — D'après Kew Bull. 1927.

de la température sont pour tous les mois au-dessous de zéro. L'humidité est forte: précipitations 1367·5 mm, quotient hygrométrique 41·6.

Pour les îles Falkland, très importantes sont les observations

exécutées 6 fois par jour au phare de Cape Pembroke, situé à l'extrémité Est des îles (table IV). La hauteur des précipitations n'étant pas notée, il faut les prendre à Port Stanley, situé à une petite distance du phare. Pour calculer l'indice d'évaporation, j'ai pris pour la tension de vapeur la valeur moyenne des observations de 12 et 16 h. Les vitesses du vent étaient notées en degrés de Beaufort. J'ai calculé les valeurs en *m/sec* pour la hauteur de 10 *m* d'après la table de Köppen que je reproduis ci-dessous (table V).

TABLE V

Degrés de Beaufort	Vitesse du vent en <i>m/sec</i> à 10 <i>m</i> au-dessus du sol
0	0.3
1	1.8
2	3.6
3	5.6
4	7.9
5	10.4
6	13.1
7	16.0
8	19.1
9	22.4
10	26.0
11	29.7
12	32.0

Ce qui est surtout intéressant dans le climat considéré, ce sont les vents. J'ai démontré dans la partie IV de ces études que les vents ayant à 10 *m* de hauteur une vitesse mensuelle moyenne de 6 *m/sec* ou davantage détruisent les arbres, lorsqu'ils agissent à la température inférieure à zéro. Or, la table IV enregistre en hiver les vitesses de plus de 8 *m/sec*. Il n'y a donc rien d'étonnant que ces îles sont dépourvues d'arbres. Une photographie de Skottsberg (1913) que je reproduis ici (fig. 5) montre clairement l'action

TABLE

Batavia 6° 11' S, 106° 50' E, 8 m (1866—1915,

	I	II	III	IV
Température moyenne	25·55	25·53	25·96	26·41
Vitesse des réactions	10·27	10·27	10·31	11·24
Température max. moy.	28·6	28·6	29·4	30·1
Temp. min. moy.	23·3	23·3	23·4	23·6
Pression barométrique (700+..., mm)	58·7	58·8	58·7	58·3
Humidité relative max. moy. (‰)	96·1	96·4	95·8	95·6
Humid. rel. min. moy (‰) . . .	71·5	72·0	68·9	67·1
Indice d'évaporation max. moy. .	9·7	9·5	11·4	12·7
Insolation (‰)	36·0	37·2	49·4	58·1
Vitesse du vent moy. (m/sec) . .	0·95	0·96	0·95	0·97
Vitesse du vent à 14 h	2·54	2·69	2·64	2·76
Somme des précipitations (mm) .	316·1	323·2	191·4	121·5
Jours des précipit.	22·0	21·3	18·1	14·1

funeste des vents sur la végétation arborescente. Cependant il y a dans les îles des endroits abrités et dans une localité pareille on a réussi à cultiver les pins et les peupliers (fig. 6). On voit donc que ce ne sont pas ici les conditions thermiques seules qui empêchent les arbres de croître (comparez aussi la partie XX de ces études).

Les phénomènes pareils ont été observés sur l'île de Nouveau Amsterdam, située plus au Nord (38° 43' S), par Schimper (voyez Schenck 1905, p. 211). Ce sagace observateur a noté ce qui suit:

Die grösseren und tieferen Einsenkungen hat sich der einzige Baum der Insel, *Phyllica nitida* Lam., erobert. Hier bildet er manchmal dichte Büsche, von denen nur die oberen Teile der kleinblättrigen, von halbreifen und reifen Früchten dicht bedeckten Kronen über das Niveau des umgebenden Bodens hinausragen, und in deren Schatten keine andere Pflanze gedeiht. Noch grössere Haine zeigen sich an geschützten Abhängen. Oft sieht man auch einen einzelnen Baum oder ein paar Bäume im Windschatten eines grösseren Felsblockes. Nur wenige Bäume sind den Wirkungen des Windes ohne Schutz preisgegeben und zeigen seine verheerenden Wirkungen in ihren reduzierten Dimensionen, in der Krümmung ihrer Stämme und Aeste nach Osten hin, in dem Vertrocknen sämtlicher Zweige an der Westseite der Krone.

VI

pour l'insolation 1889—1915, pour le vent 1876—1915)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
26·51	26·14	25·88	26·11	26·44	26·55	26·25	25·79
11·35	10·97	10·71	10·94	11·28	11·39	11·08	10·63
30·3	29·9	29·8	30·3	30·6	30·7	30·2	29·3
23·6	23·2	22·7	22·6	22·9	23·2	23·4	23·3
58·4	58·7	59·0	59·1	59·3	59·0	58·7	58·5
95·2	94·9	93·9	92·4	92·3	92·9	94·3	95·2
65·8	65·0	61·7	57·9	57·6	59·1	63·5	67·9
12·9	12·9	14·0	15·8	16·3	15·8	13·7	11·3
59·1	58·0	61·7	64·9	61·2	55·1	45·7	37·7
0·92	0·90	1·02	1·22	1·23	1·14	0·95	0·94
2·56	2·47	2·75	3·37	3·65	3·38	2·70	2·46
102·4	102·4	92·0	66·4	36·0	74·3	111·5	210·4
10·2	9·4	7·5	5·3	7·4	10·4	15·0	19·2

La saison de végétation à Cape Pembroke embrasse toute l'année. L'humidité est forte: précipitations (à Port Stanley) — 667·0 *mm*, quotient hygrométrique — 31·6.

Comme exemple du climat tropical, je prends Batavia (table VI), situé au bord de la mer. Les stations continentales ont une température plus élevée et, par suite, l'évaporation plus intense. Je reviendrai prochainement à ce sujet. L'anémomètre à l'Observatoire de Batavia se trouve à la hauteur de 17·5 *m*, probablement sur le toit d'un édifice. Pour calculer l'indice d'évaporation, j'ai admis que le minimum de l'humidité relative se produit simultanément avec le maximum de la température. L'humidité du climat est forte: précipitations — 1784·0 *mm*, quotient hygrométrique 11·4.

Comme exemples du climat océanique tempéré, je prends Cahirciveen (Valencia) à l'extrême Sud-Ouest de l'Irlande (table VII) et Deerness sur les îles Orkney, au Nord de l'Écosse (table VIII). La végétation dure dans ces stations toute l'année. Les vents sont très forts. Par suite, les îles Orkney sont dépourvues d'arbres. A Cahirciveen leur action est probablement plus faible, à cause des gelées

TABLE

Cahirciveen (Valencia) 51°56' N, 10°15' W, 9 m

	I	II	III	IV
Température moyenne	6·57	6·00	6·82	8·83
Vitesse des réactions	1·82	1·73	1·87	2·25
Température max. moyenne . . .	8·5	8·3	9·4	11·5
Temp. min. moy.	4·6	4·1	4·4	6·2
Temp. min. absol. moy.	—1·5	—1·2	—0·9	+1·6
Jours à temp. min. ≤ 0	2·6	3·2	1·5	0·3
Pression barométrique (700+..., mm)	59·8	57·8	57·4	58·8
Tension de vapeur moy. (mm) . .	6·5	6·3	6·5	7·2
Indice d'évaporation max. moy. .	1·9	1·9	2·4	3·1
Insolation (°/o)	18·7	25·8	31·1	34·8
Vitesse du vent à 7 h (m/sec) . .	7·6	6·3	5·1	4·5
Vent à 13 h	8·6	7·8	7·3	6·8
Vent à 21 h	7·5	7·9	6·0	4·8
Somme des précipitations (mm) .	139·5	127·7	113·2	107·7
Précipit. journ. max. moy. (mm) .	27·3	25·2	20·3	22·7
Jours des précipitations	22·1	18·7	21·9	21·1
Jours de neige	1·4	1·6	1·0	0·1

TABLE

Deerness 58°56' N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	4·01	3·23	4·02	5·64
Vitesse des réactions	1·44	1·34	1·45	1·68
Température max. moyenne . . .	5·7	5·0	6·0	8·1
Temp. min. moy.	1·9	1·1	1·8	3·3
Temp. min. absol. moy.	—2·7	—2·7	—2·1	—0·2
Jours à temp. min. ≤ 0	6·7	7·6	4·6	2·0
Pression barométrique (700+..., mm)	51·5	51·3	49·2	51·5
Tension de vapeur moy.	5·3	5·0	5·3	5·9
Indice d'évaporation max. moy. .	1·7	1·6	1·8	2·3
Insolation (°/o)	14·8	21·9	27·6	34·1
Vitesse du vent à 9 h (m/sec) . .	9·8	8·7	8·7	8·2
Vent à 21 h	9·0	9·0	8·0	7·2
Somme des précipitations (mm) .	82·5	69·0	68·6	63·9
Précipit. journ. max. moy. (mm) .	13·6	13·1	11·9	11·2
Jours des précipitations	20·0	16·7	19·2	15·7
Jours de neige	5·4	7·1	5·7	3·6

VII

(1895—1904, pour les vents 1922)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
11.39	14.14	15.31	15.04	13.69	10.49	8.56	7.50
2.84	3.64	4.07	3.97	3.51	2.61	2.19	1.99
14.6	17.2	18.4	17.9	15.4	12.9	10.7	9.4
7.9	11.1	12.7	12.3	11.2	8.2	6.4	5.5
3.1	6.9	8.6	8.6	5.2	2.6	0.3	—0.1
0	0	0	0	0	0.1	1.1	1.2
61.4	61.4	61.7	59.7	60.0	58.4	60.1	55.4
8.2	9.9	11.0	11.0	10.1	8.4	7.4	7.0
4.4	5.1	5.1	4.6	3.1	2.9	2.3	1.9
44.9	37.0	30.3	35.8	36.4	31.5	25.0	17.5
4.5	5.1	4.8	3.9	4.7	5.3	3.6	6.7
5.7	6.8	6.5	5.7	6.0	6.7	4.2	7.2
4.0	5.0	5.0	3.6	4.9	5.7	4.1	6.3
65.7	92.8	80.4	138.2	124.1	138.3	139.6	178.9
16.6	23.3	20.3	32.1	26.6	26.2	31.7	27.7
15.5	16.2	17.8	21.8	19.2	22.2	20.8	26.1
0	0	0	0	0	0.1	0.3	0.6

VIII

2°45' W, 52 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
7.78	10.12	11.78	11.91	10.01	8.23	6.64	4.92
2.04	2.53	2.94	2.98	2.74	2.13	1.84	1.57
10.4	12.7	14.4	14.3	13.1	10.2	8.4	6.6
5.2	7.8	9.5	9.7	8.7	5.8	4.4	2.8
+1.0	4.8	6.8	6.7	5.2	2.1	0.0	—0.8
0	0	0	0	0	0	2.2	2.2
56.4	56.5	55.1	53.0	53.7	51.3	52.8	47.7
6.7	8.1	9.0	9.2	8.7	7.0	6.4	5.6
3.0	3.1	3.5	3.2	2.8	2.4	2.0	1.8
34.7	24.7	25.3	28.0	28.9	28.6	16.2	11.9
7.3	6.2	5.9	5.5	6.3	7.4	8.7	9.6
6.0	5.1	4.1	4.1	5.8	7.1	8.4	9.1
46.8	49.1	64.5	70.6	87.1	104.7	87.0	116.3
12.6	11.2	20.8	16.6	15.8	19.5	13.8	17.1
11.3	11.3	12.8	15.1	18.5	19.9	16.6	20.8
1.6	0	0	0.1	0.2	0.9	2.6	3.3

TABLE
Teriberka 69° 10' N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	—7·85	—10·00	— 7·82	— 1·85
Vitesse des réactions	0·49	0·40	0·49	0·84
Température à 13 h.	— 7·8	— 9·6	— 6·7	— 2·0
Temp. min. moyenne	—11·1	—13·7	—11·4	— 5·6
Temp. min. abs. moy.	—21·7	—23·4	—20·6	—14·8
Jours à temp. ≤ 0	29·9	28·1	30·7	26·2
Pression barométrique (700+..., mm)	53·9	55·1	58·0	59·9
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	2·3	1·9	2·4	3·5
Indice d'évaporation à 13 h. . . .	0·1	0·1	0·2	0·4
Nébulosité à 7 h.	7·7	8·1	7·5	7·8
Nébul. à 13 h.	8·1	7·8	7·0	7·0
Nébul. à 21 h.	7·3	6·9	6·3	7·2
Vitesse du vent à 7 h (m/sec) . .	8·2	8·0	7·1	5·9
Vent à 13 h	8·0	7·3	7·1	5·6
Vent à 21 h	7·8	7·9	7·1	5·6
Somme des précipitations (mm) .	27·6	29·8	24·6	21·5
Précipit. journ. max. moy.	5·9	5·7	4·5	5·2
Jours des précipitations	17·0	17·9	16·2	14·2
Jours de neige	16·0	17·3	15·8	11·6

plus faibles et de durée moindre. L'anémomètre à cette station est placé sur le toit de l'observatoire à 14 m au-dessus du sol. A Deerness la force du vent est notée en degrés de Beaufort. J'ai calculé les vitesses en *m/sec* pour un niveau de 10 m. L'humidité du climat est très forte: à Cahirciveen les précipitations sont de 1446·1 mm et le quotient hygrométrique de 37·4, à Deerness respectivement 910·1 mm et 31·2.

Je donnerai ensuite une série des stations du réseau russe d'avant la guerre, en commençant par les régions arctiques d'Europe. Pour ces régions je prends la station de Teriberka, située sur la côte septentrionale de la péninsule de Kola (table IX). Les violents vents arctiques déterminent ici l'aspect de la végétation qui est dépourvue d'arbres, malgré une forte humidité du climat. En effet, le quotient hygrométrique, malgré les précipitations modérées (470·6 mm), est considérable (34·8), ce qui est l'effet de l'évaporation très faible. La valeur citée du quotient hygrométrique est cal-

IX

35°08' E, 5·3 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
+2·86	7·49	10·58	9·86	6·74	+0·85	— 3·68	— 7·24
1·30	1·99	2·64	2·47	1·85	1·08	0·71	0·52
+4·4	8·1	12·0	11·4	8·0	+1·4	— 3·6	— 7·3
—0·68	+3·27	7·1	6·6	+4·13	—1·67	— 6·9	—10·5
—6·3	—1·0	+3·1	+2·5	—0·2	—9·1	—16·9	—19·7
16·3	4·9	0	0	2·1	19·2	27·4	30·8
60·8	60·4	57·6	57·9	56·9	55·9	51·4	55·7
4·5	5·5	7·4	7·5	6·5	4·4	3·1	2·4
1·7	2·6	3·2	2·6	1·6	0·6	0·3	0·1
7·9	8·2	8·3	8·3	8·9	8·7	8·5	7·7
7·2	7·6	8·1	8·1	8·5	8·5	8·6	8·2
7·6	8·0	8·1	8·0	8·2	7·8	7·7	7·2
6·0	5·7	4·6	4·5	5·5	6·7	8·0	7·3
6·5	6·1	5·3	5·5	5·9	6·7	8·0	7·4
5·5	4·9	4·0	3·9	5·5	6·6	8·6	7·4
26·7	29·6	62·4	43·7	61·9	58·6	48·2	36·0
5·9	9·0	21·9	12·1	11·2	13·2	13·6	6·7
16·2	15·8	18·0	17·0	20·3	19·6	20·5	16·9
11·8	6·5	0·1	0	3·1	11·6	18·1	16·0

culée d'après les valeurs de l'indice d'évaporation pour 13 h au lieu des maxima. Par suite, comme je l'ai expliqué dans la partie XXVIII de ces études, la valeur considérée du quotient hygrométrique est de quelques 20—25 % trop élevée. Mais même après la réduction appropriée elle est encore considérable. Cette remarque concernant les valeurs de l'indice d'évaporation et du quotient hygrométrique s'applique naturellement à toutes les stations du réseau russe, discutées dans la suite.

L'anémomètre à Teriberka était placé à la hauteur de 11·4 m. J'ignore le mode de son emplacement.

Pour la région forestière de la Russie d'Europe je prends la station d'Elatma (table X). Cette petite ville (je prends de préférence les petites villes pour éviter le plus possible l'influence des conditions urbaines) est située dans l'aire de distribution de l'épicéa, près de sa limite méridionale. La saison de végétation commence ici le 18 avril et finit le 19 octobre. L'humidité du climat, caracté-

TABLE

Elatma 54°58'N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	—10·52	—10·20	— 5·41	+3·65
Vitesse des réactions	0·38	0·39	0·61	1·40
Température à 13 h.	— 8·2	— 7·8	— 1·9	+7·0
Temp. min. moyenne	—14·2	—14·5	—10·0	—0·76
Temp. min. abs. moy.	—28·2	—26·4	—21·1	—9·0
Jours à temp. min. ≤ 0	30·7	28·1	30·2	17·5
Pression barométrique (700+..., mm)	51·4	49·1	52·1	51·3
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	2·1	2·1	2·7	4·4
Indice d'évaporation à 13 h. . . .	0·2	0·3	1·2	3·2
Nébulosité à 7 h	6·8	6·3	6·2	5·7
Nébul. à 13 h	7·3	6·5	6·1	5·4
Nébul. à 21 h	5·8	5·0	4·9	4·4
Vitesse du vent à 7 h (m/sec) . .	3·3	3·4	3·2	2·9
Vent à 13 h	3·3	3·6	3·6	3·7
Vent à 21 h	3·2	3·4	2·9	2·3
Somme des précipitations (mm) .	38·0	37·8	30·0	35·7
Précipit. journ. max. moy. (mm) .	7·3	8·5	9·1	11·5
Jours des précipitations	12·7	12·2	10·3	9·7
Jours de neige	12·6	11·8	9·3	5·0

risée par le quotient hygrométrique de 10·3 (précipitations — 559·0 mm), est plus que suffisante pour la végétation forestière. Les vents sont modérés. L'anémomètre a été placé à la hauteur de 14·5 m, sans doute sur le toit d'un édifice. Je donne dans la partie XXX une analyse plus détaillée des mouvements de l'air dans cette localité.

Pour la région steppique de la Russie d'Europe je prends Lougansk (table XI). La saison de végétation commence ici le 4 avril et finit le 30 octobre. Le caractère steppique de la végétation est produit par l'humidité assez faible du climat (quotient hygrométrique de 4·8, précipitations de 458·7 mm) et les forts vents glacials. L'anémomètre se trouvait à la hauteur de 10·4 m. Dans la partie suivante, je reviendrai au problème des vents steppiques.

En allant encore plus au Sud, nous arrivons au Caucase. Dans la chaîne principale de ce pays, toutes les stations ont été situées

X

41°45' E, 140 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
13·18	17·64	19·61	17·46	10·38	4·50	— 3·19	—10·44
3·35	5·03	6·03	4·95	2·59	1·51	0·75	0·38
16·7	21·4	23·8	22·8	14·1	7·2	— 2·1	— 9·5
+7·40	10·4	13·3	11·8	5·9	+1·13	— 6·06	—13·6
—0·8	+4·4	7·8	+5·3	—0·2	—5·5	—16·8	—29·8
1·7	0	0	0·1	1·6	12·2	25·5	30·1
49·4	46·6	46·2	47·8	49·3	52·1	49·2	51·1
7·2	9·7	11·0	10·3	7·8	5·5	3·4	2·2
7·6	10·3	12·4	11·7	4·5	2·2	0·4	0·1
4·3	4·1	3·3	4·5	5·8	6·6	7·7	6·2
5·3	5·1	4·9	5·2	6·2	6·4	7·7	7·3
4·2	4·2	3·6	3·8	4·1	5·2	6·8	6·0
2·8	2·4	2·1	2·3	2·8	3·0	3·9	3·5
3·8	3·7	3·5	3·6	3·8	3·9	3·8	3·2
1·9	1·6	1·3	1·8	2·5	2·8	3·5	3·1
48·3	42·4	66·6	59·6	59·2	58·4	40·1	42·9
19·8	13·6	25·5	18·2	13·6	13·2	10·7	9·9
10·8	10·5	10·5	11·1	12·9	10·9	13·8	13·6
0·3	0·2	0	0	0·1	3·6	10·3	12·7

dans les cols. Ainsi s'explique la faible vitesse des vents notée dans ces stations, malgré leur haute altitude. Comme exemple je prends Goudaour, situé au versant Nord des montagnes, sur la route militaire de Grousie (table XII) à l'altitude de 2204 m. La saison de végétation commence ici le 3 mai et finit le 18 octobre. La hauteur de l'anémomètre était de 8·2 m. J'ignore son emplacement. Le climat est très humide (quotient hygrométrique de 30·1, précipitations de 1579·1 mm), mais il l'est moins que dans les Alpes à la même altitude à cause de la température plus élevée qui favorise l'évaporation.

A côté de la faiblesse des mouvements de l'air, intéressante est ici leur faible amplitude diurne. La même chose se produit au point le plus élevé de la route, à Krestovaia (2380 m) (table XIII). Au contraire, dans un point moins élevé sur le même versant Nord de la chaîne, à Kobi (1987 m), l'amplitude diurne des vents est

TABLE
Lougansk 48°35' N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	— 5·87	— 3·68	— 0·26	+ 8·57
Vitesse des réactions	0·58	0·71	0·98	2·19
Température à 13 h	— 4·0	— 1·5	+ 2·5	12·7
Temp. min. moyenne	— 9·7	— 7·5	— 4·02	+ 2·48
Temp. min. absol. moy.	—24·3	—20·5	—15·6	—4·7
Jours à temp. min. ≤ 0	27·3	23·9	23·0	8·7
Pression barométrique (700+..., mm)	62·5	60·1	60·5	59·4
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	2·9	3·2	4·1	4·9
Indice d'évaporation à 13 h . . .	0·4	0·8	1·4	6·4
Nébulosité à 7 h	8·0	7·5	7·6	5·7
Nébul. à 13 h	7·7	7·3	7·4	6·1
Nébul. à 21 h	7·5	6·9	6·4	4·5
Vitesse du vent à 7 h (m/sec) . .	3·8	4·2	3·6	3·6
Vent à 13 h	5·0	5·7	5·9	6·5
Vent à 21 h	4·3	4·9	4·0	3·1
Somme des précipitations (mm) .	21·8	35·2	27·3	40·4
Précipit. journ. max. moy. (mm) .	7·2	9·4	8·2	14·1
Jours des précipitations	12·0	13·6	10·5	9·4
Jours de neige	10·1	9·8	7·0	1·6

TABLE
Goudaour 42°28' N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	— 6·44	— 4·51	— 2·35	+ 1·98
Vitesse des réactions	0·55	0·66	0·81	1·20
Température à 13 h	— 1·9	+ 0·2	2·7	5·9
Temp. min. moyenne	—11·1	— 9·4	— 6·6	— 2·89
Temp. min. abs. moy.	—19·1	—16·2	—11·8	—10·1
Jours à temp. min. ≤ 0	31	27·9	29·6	23·2
Pression barométrique (500+..., mm)	81·7	81·5	81·3	83·4
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	2·1	2·6	2·7	4·1
Indice d'évaporation à 13 h . . .	2·3	2·6	3·9	3·9
Nébulosité à 7 h	5·4	6·4	6·8	7·5
Nébul. à 13 h	5·7	6·7	7·1	6·1
Nébul. à 21 h	4·7	5·7	6·1	6·4
Vitesse du vent à 7 h (m/sec) . .	2·5	2·9	2·5	1·9
Vent à 13 h	1·8	2·4	2·2	2·5
Vent à 21 h	2·6	2·8	2·3	2·3
Somme des précipitations (mm) .	62·7	88·9	113·5	149·3
Précipit. journ. max. moy.	20·5	22·2	35·1	31·2
Jours des précipitations	12·1	13·8	15·9	17·9
Jours de neige	12·0	13·8	15·5	16·1

XI

39° 20' E, 45 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
16.28	20.38	22.60	21.56	14.56	8.76	+0.69	— 3.90
4.44	6.47	7.93	7.21	3.80	2.23	1.07	0.70
21.1	24.9	27.7	27.9	20.8	13.9	+ 3.3	— 2.4
8.5	12.7	14.2	12.6	7.0	+2.95	— 3.07	— 7.4
+0.7	6.4	8.2	+5.8	—1.3	—5.8	—13.0	—20.3
0.8	0	0	0.1	2.1	8.0	21.0	25.8
57.5	55.5	55.0	56.6	60.2	62.2	60.2	62.0
7.7	10.3	10.6	9.5	7.5	6.4	4.1	3.2
12.1	14.8	19.6	21.1	11.8	5.7	1.7	0.6
4.5	3.8	3.0	2.6	3.6	5.9	7.6	8.3
5.8	5.9	5.0	3.7	4.3	5.3	7.5	8.0
3.7	4.2	3.2	2.3	2.5	4.3	6.7	7.6
3.1	2.9	2.5	2.3	2.6	2.5	3.5	3.8
5.9	5.3	5.0	5.5	6.1	5.9	5.0	5.1
2.1	1.8	1.6	1.6	2.1	2.8	3.8	4.3
57.0	63.2	47.5	39.7	27.8	34.9	26.7	37.2
20.1	20.7	22.8	17.8	11.1	13.4	8.7	14.3
11.4	13.5	9.7	6.3	6.4	7.8	11.0	11.8
0	0	0	0	0.2	0.6	4.8	8.3

XII

44° 28' E, 2204 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
6.39	10.48	13.32	13.37	9.11	5.27	— 1.73	— 4.12
1.80	2.61	3.39	3.40	2.30	1.62	0.85	0.68
9.5	13.5	16.5	16.9	13.1	9.3	2.2	0.2
+2.06	5.7	8.2	8.3	4.3	+0.65	— 5.80	— 8.1
—2.2	+1.8	2.8	3.7	—2.5	—4.3	—13.1	—22.0
7.0	0.1	0	0.2	2.7	10.7	28.2	30.8
85.0	85.9	86.5	87.3	87.8	87.8	84.6	83.0
5.7	7.4	9.2	9.5	7.3	5.4	3.1	2.6
4.4	5.8	6.9	6.9	5.5	4.6	3.0	2.6
7.2	6.2	6.2	6.2	5.2	5.5	6.0	6.0
8.2	7.9	7.0	6.8	6.4	6.4	6.1	6.2
7.2	6.9	6.3	6.2	5.9	5.2	5.4	5.4
1.9	1.4	1.1	1.4	1.4	1.8	2.6	2.4
2.8	2.6	1.9	2.0	2.5	2.6	2.8	1.7
2.1	1.9	1.3	1.3	1.8	1.8	2.6	2.3
211.5	202.1	146.7	139.2	112.3	114.2	127.3	111.4
38.7	47.1	34.2	39.0	36.3	34.9	35.9	32.6
23.6	21.9	18.8	15.2	13.5	13.2	14.5	12.6
7.2	0.1	0	0	1.8	5.1	14.1	12.6

TABLE
Vitesse du

	Heure	I	II	III	IV
Krestovaia 42° 30' N, 44° 27' E	7	2·3	1·7	1·4	1·8
2380 m (1898—1907)	13	1·9	1·3	1·2	1·1
Hauteur de l'anémomètre 8·7 m	21	2·1	1·4	1·0	1·7
Kobi 42° 34' N, 44° 31' E	7	1·5	2·1	1·4	1·7
1987 m (1895—1904)	13	4·2	5·3	5·2	5·0
Hauteur de l'anémomètre 9·0 m	21	2·4	2·6	2·0	1·8

forte. Il est intéressant de noter que la vitesse des vents le long de la route s'affaiblit avec l'altitude au lieu d'augmenter.

Passons ensuite dans la Transcaucasie. Nous y trouverons, sur une superficie assez restreinte, une grande variété des climats, produite par les grandes différences d'altitude. Nous avons dans ce terrain, au bord de la mer Noire, le climat presque subtropical de la Colchide, pour lequel on peut prendre Batoum (table XIV). La végétation dure ici toute l'année et les bambous peuvent être cultivés à l'air libre. Le climat est très humide (le quotient hygrométrique est de 54·1, les précipitations de 2762·2 mm), quoique l'évaporation soit considérable à cause de la température élevée. Les vents sont modérés. L'anémomètre était placé à la hauteur de 6·4 m (sur un poteau peut-être?).

Aux bords de la mer Caspienne, situés au-dessous du niveau de l'océan, dans leur partie méridionale, on trouve à Talych et plus au Sud dans les provinces Ghilan et Mazanderan de la Perse un climat chaud et humide, semblable à celui de la Colchide. Lenkoran (table XV) donne une idée de ce climat. La végétation dure toute l'année. Le quotient hygrométrique est de 19·7 et les précipitations de 1395·3 mm). Les vents sont modérés. L'anémomètre se trouvait à la hauteur de 10·3 m. J'ignore le mode de son emplacement.

XIII

vent en *m/sec*

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1·5	1·6	1·5	1·5	1·7	1·7	2·0	2·4
1·3	1·8	1·9	1·9	2·2	2·2	1·8	1·9
1·5	2·0	1·5	1·4	1·9	1·6	1·6	1·9
1·5	1·2	0·9	0·7	1·2	1·2	1·9	1·8
4·6	4·5	4·8	5·1	5·8	5·7	5·2	4·0
1·8	1·6	1·1	1·1	1·8	1·8	2·2	2·5

Dans la partie centrale de la Transcaucasie, le climat est plus froid et plus sec. L'Observatoire physique de Tiflis (table XVI) peut être pris pour exemple. La végétation ne dure pas ici toute l'année: elle commence le 21 février et finit le 6 décembre. L'évaporation est forte et le quotient hygrométrique est de 4·2 à peine, ce qui correspond à la végétation steppique. Les précipitations sont de 527·7 *mm*. Les vents sont modérés. La hauteur de l'anémomètre est de 19·6 *m*. Il est mis sans doute sur un édifice.

Le réseau russe s'étendait jusqu'aux hauts plateaux de l'Arménie. La station de Novo-Baiazet (1970 *m*) donne une idée du climat de ces plateaux (table XVII). La saison de végétation commence ici le 24 avril et finit le 15 octobre. Le climat est assez sec (quotient hygrométrique 5·5, précipitations 437·3 *mm*), plus sec que dans la chaîne principale du Caucase à la même altitude. Les vents sont modérés. La hauteur de l'anémomètre était de 8·2 *m*. J'ignore son emplacement.

Nous passons maintenant en Sibérie. Pour la région arctique on peut citer Rousskoe Oustie (table XVIII). La saison de végétation est ici très courte: elle commence le 13 juin et finit le 26 août. Pour une station arctique les vents sont relativement faibles. L'anémomètre était placé à la hauteur de 6·1 *m*, sans doute sur un poteau.

TABLE
Batoum 41°40'N

	I	II	III	IV
Température moyenne	6.44	7.44	7.90	11.36
Vitesse des réactions	1.80	1.98	2.06	2.83
Température à 13 h	8.1	8.9	9.5	13.1
Temp. min. moyenne	3.1	4.2	4.4	8.2
Temp. min. absol. moy.	—1.6	—0.9	—1.1	3.8
Jours à temp. min. ≤ 0	4.3	1.9	1.3	0
Pression barométrique (700+..., mm)	64.7	63.1	61.7	61.6
Tension de vapeur à 13 h	5.6	6.0	6.3	8.2
Indice d'évaporation à 13 h	2.6	2.7	2.7	3.3
Nébulosité à 7 h	6.3	7.2	7.0	6.7
Nébul. à 13 h	6.3	7.0	6.6	6.6
Nébul. à 21 h	5.3	6.0	5.6	6.3
Vent (m/sec) à 7 h	2.1	2.3	1.7	1.4
Vent à 13 h	2.5	3.0	2.4	2.9
Vent à 21 h	1.8	2.0	1.1	1.7
Somme des précipitations (mm) .	240.1	236.1	150.6	139.4
Précipit. journ. max. moy.	45.7	40.4	37.8	33.6
Jours de précipitations	15.0	15.2	14.9	14.6
Jours de neige	4.3	3.3	2.6	0

TABLE
Lenkoran-Ville 38°46'N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	3.17	5.77	7.52	12.39
Vitesse des réactions	1.34	1.70	1.99	3.11
Température à 13 h	5.5	8.2	9.9	15.3
Temp. min. moyenne	0.1	2.2	4.1	8.2
Temp. min. absol. moy.	—6.7	—3.2	—1.2	+3.6
Jours à temp. min. ≤ 0	15.4	6.4	2.6	0
Pression barométrique (700+..., mm)	69.3	67.5	65.3	65.1
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	5.2	6.3	7.3	9.7
Indice d'évaporation à 13 h	1.6	2.0	1.9	3.5
Nébulosité à 7 h	7.1	7.6	8.1	7.5
Nébul. à 13 h	6.7	7.3	7.8	7.0
Nébul. à 21 h	6.1	6.4	6.9	6.6
Vitesse des vents à 7 h (m/sec) .	1.3	1.7	1.5	1.6
Vent à 13 h	2.2	2.8	2.9	3.3
Vent à 21 h	1.4	2.4	2.4	2.9
Somme des précipitations (mm) .	114.6	74.1	121.0	71.2
Précipit. journ. max. moy.	34.5	29.5	31.4	27.5
Jours de précipitations	10.4	8.7	10.9	9.3
Jours de neige	4.6	2.3	2.3	0.2

XIV

41°38'E, 3·2 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
15·68	20·04	22·98	23·01	19·43	16·34	10·69	8·39
4·21	6·27	8·21	8·23	5·93	4·47	2·66	2·16
17·5	22·0	25·0	25·2	22·0	19·4	13·1	10·0
12·4	16·3	19·5	19·7	15·8	12·6	7·2	5·1
7·2	12·5	15·4	16·1	10·5	7·4	2·0	—1·9
0	0	0	0	0	0	0·2	2·7
60·4	59·4	58·0	58·6	61·9	63·2	64·9	64·4
11·3	14·3	17·6	17·7	15·0	12·8	7·9	6·5
4·0	6·1	7·0	7·1	5·3	4·5	3·6	2·8
6·0	5·2	5·5	5·8	4·9	4·8	6·1	6·6
5·9	5·1	5·3	5·5	5·0	4·6	6·0	6·5
5·7	5·4	6·0	6·0	5·5	4·2	5·3	5·4
1·1	1·1	0·7	0·5	0·8	0·8	1·8	1·4
2·4	2·8	2·3	2·3	1·9	1·9	2·5	2·0
0·9	0·8	0·5	0·5	0·8	0·9	1·1	1·5
110·4	218·7	172·5	261·3	303·4	256·6	380·0	293·1
44·5	73·2	54·0	71·6	100·7	67·1	80·2	59·6
13·6	12·2	12·7	14·2	12·1	11·3	15·8	15·4
0	0	0	0	0	0	0·1	1·9

XV

48°51'E, —20 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
18·65	23·38	25·67	25·90	21·26	16·51	9·76	6·37
5·52	8·52	10·51	10·73	7·01	4·54	2·45	1·79
21·7	27·1	29·7	30·0	24·6	19·8	12·1	8·3
13·5	17·2	19·9	20·2	16·8	12·4	6·5	3·3
8·5	13·2	15·7	16·2	11·7	7·1	0·0	—3·0
0	0	0	0	0	0	0·5	4·7
62·7	60·2	59·3	60·5	64·3	68·0	68·7	68·4
13·8	16·8	19·0	19·6	16·9	13·2	8·2	6·8
6·3	11·5	14·3	14·1	7·1	4·5	2·5	1·4
6·7	4·5	5·2	5·4	6·3	6·4	7·8	7·7
6·6	4·0	3·9	4·2	5·6	6·0	7·6	7·7
6·4	5·0	4·3	4·0	5·4	5·5	7·0	6·9
1·6	0·9	0·8	1·0	1·3	1·5	1·7	1·6
3·1	2·8	2·7	3·0	2·7	2·5	2·5	2·7
2·8	2·0	1·7	1·6	1·8	2·0	2·1	1·8
44·6	24·9	28·6	35·2	236·3	249·5	234·0	161·3
21·2	16·5	18·8	19·8	57·9	84·0	53·6	45·2
7·6	4·0	2·4	4·5	11·5	12·5	13·9	10·3
0	0	0	0	0	0	0·4	2·2

TABLE
Tiflis, Observatoire Physique

	I	II	III	IV
Température moyenne	0·64	3·79	6·57	11·82
Vitesse des réactions	1·06	1·42	1·83	2·95
Température à 13 h	3·9	7·6	10·6	15·6
Temp. min. moyenne	— 3·2	— 0·51	+ 2·00	6·8
Temp. min. absol. moy.	— 10·8	— 7·3	— 5·0	+ 1·5
Jours à temp. min. ≤ 0	24·8	14·9	8·8	0·1
Pression barométrique (700+..., mm)	30·1	28·5	27·1	27·0
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	3·4	3·8	4·3	5·9
Indice d'évaporation à 13 h . . .	2·9	4·3	5·8	8·3
Nébulosité à 7 h	6·3	6·7	7·4	7·0
Nébul. à 13 h	6·4	6·3	6·9	6·4
Nébul. à 21 h	5·0	5·6	5·9	5·3
Vitesse des vents à 7 h (m/sec) .	1·8	2·5	2·1	2·2
Vents à 13 h	3·7	4·3	4·2	4·4
Vents à 21 h	2·2	2·7	2·7	2·5
Somme des précipitations (mm) .	13·5	18·7	28·9	53·8
Précipit. max. journ. moy.	4·5	9·4	10·0	18·1
Jours des précipitations	6·2	6·1	9·0	12·5
Jours de neige	5·0	2·7	2·9	0·5

TABLE
Novo-Baiazet 40° 20' N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	— 7·96	— 4·46	— 1·74	+ 4·30
Vitesse des réactions	0·48	0·66	0·85	1·48
Température à 13 h	— 2·3	— 0·2	+ 2·2	7·9
Temp. min. moyenne	— 15·2	— 12·2	— 6·9	— 1·13
Temp. min. absol. moy.	— 24·7	— 19·5	— 17·1	— 9·6
Jours à temp. min. ≤ 0	31	28·0	29·5	18·9
Pression barométrique (600+..., mm)	02·0	01·7	00·8	02·5
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	2·5	3·1	3·4	4·3
Indice d'évaporation à 13 h . . .	1·6	1·8	2·6	4·9
Nébulosité à 7 h	6·0	6·7	6·4	6·1
Nébul. à 13 h	5·2	6·0	6·4	6·6
Nébul. à 21 h	4·1	4·4	4·6	5·1
Vitesse des vents à 7 h (m/sec) .	1·1	1·6	1·3	1·3
Vent à 13 h	1·6	3·0	2·4	3·2
Vent à 21 h	1·3	1·4	1·1	1·1
Somme des précipitations (mm) .	12·1	15·2	24·0	42·5
Précipit. max. journal. moy. . . .	6·7	8·7	9·4	11·1
Jours des précipitations	5·4	5·6	8·8	12·2
Jours de neige	5·4	5·5	7·9	6·2

XVI

41°43' N, 44°48' E, 409 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
16.85	20.93	24.42	24.19	19.05	13.54	6.32	2.98
4.68	6.81	9.36	9.18	5.73	3.46	1.70	1.31
20.8	25.1	28.8	28.9	23.8	18.1	10.1	6.3
11.7	15.3	18.5	18.5	13.7	9.0	+2.28	—0.89
6.3	11.3	13.3	14.1	7.5	+2.7	—4.4	—7.3
0	0	0	0	0	0.3	8.4	18.1
25.7	24.5	23.5	24.5	27.8	30.3	30.3	29.9
8.8	10.2	10.9	11.1	9.3	7.9	5.1	4.3
11.1	16.2	22.8	22.8	15.0	8.7	4.6	3.1
6.7	5.2	5.1	5.6	5.2	6.4	6.8	7.9
4.5	4.7	4.1	3.9	4.2	5.1	6.1	6.6
6.2	5.4	4.5	4.1	4.3	4.7	5.5	5.4
2.1	2.3	2.1	1.9	1.9	1.5	2.0	1.9
3.6	3.9	3.5	3.3	3.6	3.2	3.7	2.9
2.3	2.4	2.2	2.0	2.2	1.6	2.1	2.0
99.9	70.9	40.4	43.6	48.3	48.3	34.4	27.0
27.3	25.0	11.9	14.5	22.5	16.9	15.4	13.8
17.8	13.2	9.0	9.4	8.5	9.7	9.0	6.4
0	0	0	0	0	0	1.3	2.8

XVII

45°07' E, 1970 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
9.14	13.80	16.48	16.79	12.31	6.49	— 0.34	— 3.89
2.31	3.54	4.53	4.66	3.09	1.81	0.97	0.70
12.8	17.9	20.7	21.4	17.9	12.0	4.6	— 0.9
+2.93	6.3	9.1	9.1	4.37	+0.01	— 6.14	— 9.86
—2.5	+1.7	4.2	5.2	—1.6	—6.0	—16.8	—19.9
3.4	0.1	0	0	3.0	14.5	26.5	29.6
03.6	03.9	04.1	04.9	05.6	06.4	04.1	03.0
5.5	7.4	8.8	9.0	6.9	5.6	4.0	3.5
7.5	11.0	13.3	14.1	11.7	6.5	3.1	0.9
5.7	3.5	4.1	3.6	3.6	4.4	5.4	5.8
7.1	5.1	4.5	4.0	4.5	5.2	5.3	5.9
5.6	4.6	4.1	4.0	3.1	3.4	4.1	4.0
0.7	0.4	0.5	0.3	0.4	0.7	1.5	1.3
3.3	2.6	2.5	2.4	2.8	2.5	2.8	2.0
1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	1.5	1.3
75.5	52.7	37.1	42.3	44.3	49.7	27.1	14.8
18.3	14.2	15.5	14.2	23.2	20.3	10.9	6.6
16.8	11.0	6.6	6.6	5.1	7.0	6.4	5.5
1.6	0	0	0	0.4	2.0	4.5	5.3

TABLE
Rousskoie Oustie 71°01'N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	—37·60	—36·34	—31·00	—21·91
Vitesse des réactions	0·03	0·04	0·06	0·13
Température à 13 h	—37·3	—25·0	—29·2	—19·0
Temp. min. moyenne	—40·7	—39·8	—35·9	—28·0
Temp. min. absol. moy.	—49·8	—47·6	—45·0	—39·4
Jours à temp. min. ≤ 0	31	28	31	30
Pression barométrique (700+..., mm)	65·1	66·5	64·9	61·4
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	0·2	0·2	0·4	1·0
Indice d'évaporation moy. à 13 h	0·1	0·1	0·1	0·2
Nébulosité à 7 h	3·4	3·5	3·6	3·5
Nébul. à 13 h	3·2	3·5	3·2	2·8
Nébul. à 21 h	3·1	3·2	3·3	4·0
Vent (m/sec) à 7 h	3·9	3·6	4·0	4·3
Vent à 13 h	3·8	3·9	4·5	4·7
Vent à 21 h	4·2	4·3	4·5	4·3
Somme des précipitations (mm) .	4·6	7·3	7·8	3·3
Précipit. journ. max. moy.	1·8	2·5	2·5	1·2
Jours des précipitations	4·3	5·2	5·8	3·8
Jours de neige	4·3	5·2	5·8	3·8

En admettant qu'il se trouvait dans le terrain libre, j'ai calculé les vitesses du vent pour une hauteur de 10 m au moyen de la formule

$$V_{10} = V_{6.1} \left(\frac{10}{6.1} \right)^{\frac{1}{4.5}},$$

basée sur les recherches de Hellmann (voyez la partie XXII de ces études).

Le climat est humide (quotient hygrométrique de 17·9) malgré les faibles précipitations (159·4 mm), ce qui est l'effet d'une faible évaporation.

Pour caractériser le climat de la forêt sibérienne, la fameuse taïga, je prends Tomsk (table XIX). La végétation commence ici le 7 mai et finit le 2 octobre. Le climat est humide (précipitations — 523·1 mm, quotient hygrométrique — 12·3). Les vents sont modérés. L'anémomètre était placé à la hauteur de 10·5 m, sur un poteau.

XV111

149° 26' E, 6 m (1896—1903)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
— 6.40	4.77	10.84	5.62	—0.40	—13.02	—25.71	—33.40
0.56	1.55	2.70	1.67	0.96	0.30	0.09	0.05
— 4.4	+6.1	12.8	7.2	2.1	—12.1	—25.6	—33.3
—11.90	+0.75	5.6	+1.51	—2.64	—17.0	—30.0	—36.7
—24.6	—6.1	0.0	—2.6	—9.9	—30.2	—39.5	—44.5
31	13.4	1.0	9.5	23.6	31	30	31
59.9	54.6	53.9	56.0	57.7	58.0	59.8	62.7
2.9	5.6	7.8	6.0	4.7	1.1	0.5	0.3
0.3	1.6	3.5	1.7	0.6	0.5	0.1	0.1
6.9	7.8	6.8	8.4	8.9	8.0	6.1	4.3
6.4	7.5	6.9	7.5	8.8	7.4	6.3	4.8
6.7	7.8	7.3	6.4	8.5	7.1	6.3	4.5
4.7	5.9	6.1	5.9	5.3	4.4	4.1	4.4
4.8	5.9	6.4	6.4	5.6	4.4	4.1	4.7
4.1	5.6	4.9	5.1	4.9	4.7	4.8	5.2
9.1	25.6	31.1	29.9	17.3	7.6	9.3	6.5
2.2	8.8	10.1	7.9	5.2	2.3	2.3	2.4
10.0	13.7	12.7	12.9	12.7	9.6	9.4	6.0
10.0	5.0	1.7	4.1	9.3	9.6	9.4	6.0

Il se trouvait au-dessus des bâtiments environnants, mais au Nord un groupe d'arbres le surmontait (Rykatchew 1919, p. 58).

Pour les steppes de la Sibérie je prends la station de Belagatchskoe Zimovie (table XX). La végétation commence dans ces parages le 3 mai et finit le 1 octobre. Le climat est sec: le quotient hygrométrique est de 3.6, précipitations — de 267.5 mm. Les vents sont modérés. La hauteur de l'anémomètre a été changée plusieurs fois de 4.2 m à 7.8 m. Il était placé sur un poteau. En admettant qu'il se trouvait dans le terrain libre, j'ai calculé les vitesses pour le niveau de 10 m de la même manière qu'à Rousskoe Oustie. Ces vitesses sont probablement trop petites, car la localité servait à l'hivernage et était sans doute choisie dans un endroit abrité des vents.

Nous arrivons au Turkestan. Dans ce pays, je prendrai trois stations à l'altitude croissante: Tachkent (515 m), Narynskoe (2033 m) et Pamirski Post (3640 m).

TABLE
Tomsk 56°30' N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	—19·09	—15·93	—10·39	— 0·82
Vitesse des réactions	0·17	0·23	0·39	0·93
Température à 13 h	—17·1	—12·8	— 5·5	3·3
Temp. min. moyenne	—24·5	—21·5	—17·0	— 6·80
Temp. min. absol. moy.	—40·8	—36·7	—31·6	—19·5
Jours à temp. min. ≤ 0	31	28	30·7	25·6
Pression barométrique (700+..., mm)	57·3	58·0	58·0	53·9
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	1·2	1·4	1·9	3·4
Indice d'évaporation à 13 h . . .	0·1	0·1	1·0	2·5
Nébulosité à 7 h	7·9	8·0	6·8	7·0
Nébul. à 13 h	8·0	7·5	6·6	6·7
Nébul. à 21 h	7·8	6·8	5·6	5·9
Vitesse du vent (m/sec) à 7 h . .	3·2	3·3	2·6	2·5
Vent à 13 h	3·4	3·7	3·4	3·3
Vent à 21 h	2·5	2·6	1·9	1·6
Somme des précipitations (mm) .	35·4	24·3	20·3	27·5
Précipit. journ. max. moy.	6·4	5·5	5·0	7·8
Jours des précipitations	23·1	18·2	14·4	12·2
Jours de neige	22·6	17·9	14·4	10·3

TABLE
Belagatchskoe Zimovie

	I	II	III	IV
Température moyenne	—15·91	—14·81	—10·40	+ 1·22
Vitesse des réactions	0·23	0·26	0·39	1·12
Température à 13 h	—12·9	—10·2	— 5·3	+ 5·5
Température min. moyenne	—22·2	—21·6	—17·7	— 5·92
Temp. min. absol. moy.	—38·5	—36·1	—24·6	—17·7
Jours à temp. min. ≤ 0	31	28	30·4	24·1
Pression barométrique (700+..., mm)	44·6	43·2	41·8	38·6
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	1·4	1·6	2·0	3·8
Indice d'évaporation à 13 h	0·1	0·3	0·9	3·2
Nébulosité à 7 h	6·0	5·9	5·5	5·4
Nébul. à 13 h	5·6	5·2	4·8	5·6
Nébul. à 21 h	4·0	3·2	3·2	3·6
Vitesse du vent à 7 h (m/sec) . .	3·2	2·6	2·5	2·8
Vent à 13 h	3·4	3·5	4·4	3·8
Vent à 21 h	3·0	2·4	3·0	2·6
Somme des précipitations (mm) .	9·4	5·4	6·1	15·2
Précipit. journ. max. moy. (mm) .	2·5	2·1	2·4	6·9
Jours des précipitations	10·3	6·3	5·7	6·6
Jours de neige	10·2	5·7	4·9	3·7

XIX

84° 58' E, 135 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
+9.10	16.20	18.91	15.70	9.44	0.48	— 8.33	—17.22
2.30	4.41	5.66	4.21	2.37	1.04	0.47	0.21
12.9	20.1	23.2	20.0	13.9	3.1	— 6.8	—16.4
2.61	9.5	12.1	10.0	4.45	— 3.33	—12.6	—22.0
—7.9	1.9	5.2	2.6	—3.1	—16.8	—27.4	—39.5
9.9	0	0	0.1	5.0	20.4	29.0	31
50.2	46.3	45.0	46.4	50.9	54.4	54.0	57.9
5.4	9.6	12.3	11.1	7.6	4.2	2.5	1.3
6.2	9.0	10.2	7.2	4.6	1.5	0.1	0.1
7.4	7.6	6.2	7.4	7.6	8.7	9.0	8.1
7.9	8.4	7.8	8.4	8.2	8.3	8.8	8.3
7.5	7.4	6.6	7.1	6.7	8.1	8.3	8.1
2.4	2.2	1.6	1.9	2.1	2.5	3.4	3.2
3.2	2.8	2.4	2.6	3.1	3.4	3.7	3.3
1.8	1.4	1.1	1.2	1.5	2.1	2.8	2.5
36.8	61.5	61.3	77.7	49.5	43.8	46.8	38.2
10.0	16.6	19.6	18.6	14.5	9.3	9.6	6.9
13.7	14.8	12.9	17.1	14.1	17.6	22.0	23.2
4.5	0	0	0	1.7	12.6	21.1	22.7

XX

50° 40' N, 80° 25' E, 330 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
12.99	18.93	20.76	18.14	12.26	+ 2.69	— 5.48	—14.03
3.29	5.67	6.70	5.27	3.08	1.28	0.61	0.28
17.7	23.3	25.2	23.0	17.8	7.1	— 2.4	—11.4
+4.14	10.5	12.2	9.9	+4.26	— 3.42	—11.4	—19.2
—3.9	+2.2	6.0	+3.6	— 3.4	—13.0	—24.4	—38.4
7.4	3.7	0	0	3.6	22.6	29.2	31
34.6	30.6	28.5	30.7	35.5	39.9	41.1	42.3
6.0	9.2	10.6	9.1	6.6	4.0	2.7	1.6
10.4	14.3	15.8	13.9	9.8	3.8	1.1	0.1
4.4	4.7	4.2	4.1	4.6	5.8	6.6	6.3
5.3	5.8	5.1	5.3	4.9	6.0	6.4	6.0
4.2	5.4	4.2	3.6	3.3	4.5	5.2	4.8
3.2	2.8	2.6	2.1	2.0	2.3	3.0	3.0
5.3	4.4	4.0	4.0	4.0	4.7	4.1	3.4
2.6	2.0	1.8	1.6	1.8	2.9	3.2	3.1
24.0	39.3	44.9	40.7	17.0	29.0	26.1	10.4
8.1	15.0	14.8	11.5	5.8	10.2	11.2	3.1
7.6	9.5	9.6	8.5	7.4	10.1	11.0	10.4
0.7	0	0	0	0.3	4.4	9.7	10.2

TABLE
Tachkent Observatoire

	I	II	III	IV
Température moyenne	— 1·83	2·82	7·96	13·82
Vitesse des réactions	0·85	1·29	2·07	3·55
Température à 13 h	2·4	7·5	12·4	18·5
Temp. min. moyenne	— 6·9	— 2·02	+2·94	7·5
Temp. min. absol. moy.	—20·4	—13·9	—7·0	0·0
Jours à temp. min. ≤ 0	24·4	16·5	8·8	0·6
Pression barométrique (700+..., mm)	25·3	23·9	21·8	20·9
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	3·5	4·4	6·0	7·4
Indice d'évaporation à 13 h . . .	2·0	3·7	5·4	9·9
Nébulosité à 7 h	6·5	6·3	7·2	5·5
Nébul. à 13 h	6·1	5·6	6·7	5·7
Nébul. à 21 h	5·4	5·1	5·5	4·6
Vitesse du vent (m/sec) à 7 h . .	1·6	1·8	1·9	1·9
Vent à 13 h	2·1	2·2	2·5	2·4
Vent à 21 h	1·7	1·8	2·0	1·8
Somme des précipitations (mm) .	52·3	29·8	59·3	59·7
Précipit. journ. max. moy.	14·4	11·9	16·9	20·8
Jours des précipitations	10·3	7·3	12·7	9·6
Jours de neige	7·9	3·5	3·3	0·3

Tachkent (table XXI) caractérise les plaines désertiques du Turkestan avec leurs cultures du cotonnier dans les champs irrigués. Le climat est très chaud en été, assez rigoureux en hiver. La végétation commence le 27 février et finit le 3 décembre. La distribution des précipitations a un aspect „méditerranéen“ avec l'été sec et l'hiver humide. L'évaporation est très forte. Le quotient hygrométrique est de 2·3, les précipitations — de 394·7 mm. Les vents sont modérés. L'anémomètre se trouvait sur un échafaudage en bois à la hauteur de 9 m. Les vitesses notées sont trop petites, car l'anémomètre était d'un côté surmonté par la tour de l'observatoire astronomique. Il se trouvait en outre des arbres à une certaine distance (Rykatchew 1919, p. 55).

XXI

41° 20' N, 69° 18' E, 515 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
20.74	25.18	27.39	24.99	19.14	11.95	6.64	2.97
6.69	10.61	12.30	9.87	5.64	2.99	1.84	1.31
25.8	30.6	33.5	31.8	26.9	19.0	11.5	7.0
13.2	16.3	17.8	15.4	10.8	5.3	+1.83	— 1.13
6.6	10.0	12.5	9.8	4.1	—2.3	—6.5	—10.4
0	0	0	0	0	2.5	10.9	18.1
18.6	15.6	13.6	15.4	20.0	24.2	25.1	25.0
10.0	11.5	12.4	11.4	9.3	6.7	5.8	4.6
17.9	26.5	33.3	29.8	20.8	11.3	4.9	3.1
4.4	2.5	1.7	0.9	1.5	3.6	6.0	6.6
4.7	2.7	1.5	0.8	1.5	3.0	5.7	6.3
3.1	2.0	1.4	0.6	1.2	3.0	5.3	5.9
1.9	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7
2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0
1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.7
35.6	18.4	6.4	1.4	3.4	32.5	52.3	43.6
16.6	8.4	4.2	1.3	2.1	14.6	17.8	13.8
6.9	4.4	1.9	0.8	1.3	5.3	8.8	9.9
0	0	0	0	0	0.5	2.1	4.4

Le climat de Narynskoe (table XXII) est très sec. La végétation commence le 17 avril et finit le 5 octobre. Le quotient hygrométrique est de 2.8, les précipitations — de 103.8 mm. Les vents sont plutôt faibles. L'anémomètre se trouvait au niveau de 10 m. J'ignore son emplacement.

La station de Pamirski Post (table XXIII) est très intéressante par sa haute altitude. Les observations accusent malheureusement de grandes lacunes. La saison de végétation est courte: de 10 juin à 31 août. Le climat est extrêmement sec: le quotient hygrométrique est de 0.5 et les précipitations de 59.7 mm seulement. Les vents en moyenne sont faibles, mais très variables, comme on peut le voir dans la table XXIV, composée pour l'année 1897, pen-

TABLE
Narynskoe 41°26' N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	—17·35	—14·73	— 3·36	+4·57
Vitesse des réactions	0·20	0·27	0·37	1·52
Température à 13 h	—11·7	— 7·9	2·6	10·3
Temp. min. moyenne	—22·7	—20·0	— 8·1	—0·29
Temper. min. absol. moy.	—31·3	—28·4	—18·0	—7·1
Jours à temp. min. ≤ 0	31	28	28·9	14·0
Pression barométrique (600+..., mm)	— 0·9	— 1·4	— 3·2	—2·8
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	1·2	1·5	2·6	4·0
Indice d'évaporation à 13 h . . .	0·6	1·1	3·8	7·2
Nébulosité à 7 h	6·2	5·4	7·3	6·2
Nébul. à 13 h	5·8	4·6	6·9	6·4
Nébul. à 21 h	4·4	3·6	5·6	4·9
Vitesse du vent (m/sec) à 7 h . .	1·0	1·0	1·3	1·3
Vent à 13 h	1·4	1·9	1·7	2·6
Vent à 21 h	0·9	0·9	1·1	1·3
Somme des précipitations (mm) .	8·3	6·9	19·2	25·1
Précipit. journ. max. moy.	4·0	2·2	6·7	10·0
Jours des précipitations	8·2	5·6	10·7	11·9
Jours de neige	7·7	5·4	9·5	4·8

TABLE
Pamirski Post 38°11' N,

	I	II	III	IV
Température moyenne	—17·56	—15·84	— 6·22	+ 0·15
Vitesse des réactions	0·20	0·23	0·57	1·01
Température à 13 h	—10·5	— 8·9	+ 0·3	5·6
Temp. min. moyenne	—26·1	—25·5	—15·9	— 8·6
Temp. min. absol. moy.	—37·9	—34·2	—27·2	—17·5
Jours à temp. min. ≤ 0	31	28	31	29·7
Pression barométrique (400+..., mm)	88·3	88·7	90·2	91·2
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	1·1	1·2	2·0	2·4
Indice d'évaporation à 13 h . . .	1·1	1·5	4·4	6·9
Nébulosité à 7 h	5·4	4·3	5·9	5·1
Nébul. à 13 h	5·7	4·8	7·0	6·3
Nébul. à 21 h	3·7	3·4	4·5	4·0
Vitesse du vent à 7 h (m/sec) . .	1·3	1·3	1·0	1·0
Vent à 13 h	1·8	2·4	5·0	6·2
Vent à 21 h	1·7	1·8	2·6	3·5
Somme des précipitations (mm) .	3·1	2·7	1·8	3·1
Précipit. journ. max. moy. (mm) .	1·6	2·0	1·3	2·2
Jours des précipitations	2·5	2·0	1·7	1·4
Jours de neige	2·1	1·7	1·7	1·4

XXII

76°02' E, 2033 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
11·60	14·70	17·69	16·50	12·45	+3·99	— 4·01	—13·86
2·89	3·85	5·06	4·54	3·13	1·44	0·69	0·28
16·8	20·1	22·7	23·1	19·5	10·8	1·6	— 7·5
+5·20	7·4	9·2	8·3	+4·70	—2·07	— 8·8	—18·3
0·0	2·5	4·9	3·7	+1·1	—9·0	—17·0	—27·5
0·9	0·1	0	0	1·9	20·7	29·4	31
—2·3	—3·2	—4·1	—3·3	+0·3	+0·6	+ 0·8	+ 0·2
5·8	7·4	8·3	7·9	5·8	3·7	2·6	1·5
11·7	14·4	17·8	19·1	15·6	8·0	3·4	1·1
6·2	4·9	4·8	3·5	3·8	4·4	6·1	6·3
6·8	5·9	5·5	4·0	3·8	4·3	5·6	5·2
5·8	4·8	4·7	3·1	3·0	3·4	3·9	4·0
1·3	1·1	1·2	1·3	1·4	1·2	1·1	0·9
2·8	2·9	2·3	2·1	2·6	2·2	1·8	1·7
1·6	1·4	1·6	1·4	1·5	1·0	0·9	0·8
60·4	54·7	38·5	23·3	14·4	16·3	8·2	11·1
19·5	12·9	12·0	11·4	7·5	5·0	1·7	6·9
15·7	13·1	11·5	7·1	5·3	6·2	6·6	7·4
1·3	0·2	0	0	0·6	3·6	5·9	7·2

XXIII

74°02' E, 3640 m (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
6·82	10·52	13·83	13·59	8·05	— 0·01	— 7·66	—16·81
1·87	2·62	3·55	3·47	2·09	1·00	0·50	0·21
11·8	15·1	18·6	18·9	13·6	+ 6·6	— 0·4	— 9·0
—2·58	+0·54	4·0	+3·12	—2·80	—10·5	—17·2	—26·2
—10·0	—3·7	+0·1	—3·4	—9·9	—19·0	—26·8	—33·8
24·4	14·0	1·0	5·8	23·3	30·7	30	31
86·5	92·7	92·5	92·7	94·0	94·0	93·5	91·1
3·2	3·9	4·8	5·2	3·4	2·6	1·8	1·0
11·1	13·8	18·3	19·1	13·4	6·4	4·0	1·5
4·0	3·3	3·0	2·9	2·0	2·7	3·5	4·0
6·3	5·9	5·1	4·1	4·0	4·5	4·9	4·7
4·1	3·8	4·2	3·0	2·6	2·3	2·8	3·0
0·9	0·9	1·1	0·6	0·6	0·6	0·6	1·1
6·1	4·8	3·5	2·5	2·6	3·1	2·0	1·7
2·9	3·3	4·0	3·9	2·9	1·9	1·5	1·4
7·8	17·2	7·5	5·1	4·2	2·2	2·3	2·7
4·1	6·4	4·1	1·7	3·5	1·2	1·7	1·7
4·3	5·3	3·1	2·6	1·9	1·6	1·3	1·7
2·4	2·9	0·7	0·3	1·4	1·6	1·3	1·1

dant laquelle il y avait peu de lacunes dans les observations. L'anémomètre se trouvait à la hauteur de 6 m, sans doute mis sur un poteau. L'observateur préférait les nombres pairs.

TABLE XXIV

Pamirski Post. La fréquence des différentes vitesses du vent en 1897 (359 observations)

Vitesse: 0 m/sec	Fréquence: 136
1	2
2	51
3	7
4	43
5	5
6	30
7	4
8	23
9	0
10	8
12	37
14	2
16	11

TABLE

Ourga 47° 55' N, 106° 50' E

	I	II	III	IV
Température moyenne	—27·75	—19·17	—10·95	+ 1·10
Vitesse des réactions	0·11	0·17	0·36	1·11
Température à 13 h	—18·9	—13·3	— 4·9	6·3
Temp. min. moyenne	—31·5	—28·3	—21·2	— 7·4
Temp. min. absol. moy.	—38·6	—37·0	—31·4	—17·5
Jours à temp. min. ≤ 0	31	28	30·9	28·7
Pression barométrique (600+..., mm)	52·3	52·8	51·4	49·1
Tension de vapeur à 13 h (mm) .	0·8	1·1	1·7	3·0
Indice d'évaporation à 13 h . . .	0·1	0·3	1·5	5·1
Nébulosité à 7 h	2·6	2·8	3·3	4·6
Nébul. à 13 h	3·3	2·5	3·6	5·7
Nébul. à 21 h	1·3	1·1	2·0	3·1
Vitesse du vent à 7 h (m/sec) . .	3·2	2·8	2·7	2·9
Vent à 13 h	4·1	3·7	4·9	6·8
Vent à 21 h	1·8	1·9	1·6	1·9
Somme des précipitations (mm) .	2·1	0·9	2·3	5·4
Précipit. journ. max. moy.	0·9	0·7	1·5	2·4
Jours des précipitations	1·7	1·8	1·9	1·9
Jours de neige	1·1	1·7	1·9	1·4

La station Ourga (table XXV) peut caractériser le climat des steppes de la Mongolie. La saison de végétation dure ici de 24 mai au 20 septembre. Le climat est sec: le quotient hygrométrique est de 3·9, les précipitations de 221·2 *mm.* Les vents sont assez forts. L'anémomètre se trouvait à la hauteur de 9·5 *m.* J'ignore le mode de son emplacement. Les observations ont de nombreuses lacunes.

XXX. Les vents dans les steppes

Je me suis déjà occupé de l'action des vents sur la végétation (voyez les parties IV et XX de ces études). J'ai constaté que cette action peut être funeste, lorsque la température est au-dessous de zéro. Dans ces conditions, les pertes d'eau qui sont causées par la transpiration activée par les vents peuvent ne pas être recouvrées. Cette action des vents s'exerce surtout sur les arbres, car ils s'élèvent dans les couches plus hautes de l'air où la vitesse des vents est plus considérable. J'ai démontré que l'absence des arbres sur les rivages des mers froides et dans les hauteurs des mon-

XXV

1325 *m.* (1895—1904)

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
7·46	15·60	17·49	15·71	+8·92	— 0·46	—11·21	—21·20
1·98	4·18	4·97	4·22	2·26	0·96	0·36	0·14
11·9	20·4	22·0	20·4	14·4	5·3	— 5·4	—16·5
—2·27	+6·19	9·8	8·0	+1·80	— 8·21	—18·4	—27·7
—9·2	—1·0	+3·1	+1·4	—5·9	—22·4	—27·9	—36·7
22·3	1·3	0	0·3	12·0	29·7	30	31
48·2	47·9	47·1	48·9	52·2	52·5	52·7	53·2
4·2	7·5	9·6	8·3	5·4	3·5	1·7	1·0
7·7	13·6	13·4	12·5	8·6	3·8	1·4	0·1
4·6	4·9	5·3	4·6	3·8	3·3	3·6	3·5
5·7	5·7	6·5	5·8	4·4	4·6	4·1	3·6
3·8	4·5	4·4	3·9	2·7	2·3	1·8	1·7
3·9	2·9	2·6	2·9	2·8	2·4	2·6	2·8
6·2	4·6	4·1	4·2	4·2	4·2	4·1	3·3
2·7	2·1	1·8	1·6	1·9	1·7	2·9	1·6
13·6	31·6	68·8	60·1	19·8	4·6	7·2	4·8
6·3	13·0	21·9	21·5	11·7	3·5	3·9	3·9
4·5	6·4	10·0	9·3	2·9	1·4	2·6	1·4
1·6	0·1	0	0	0·4	1·0	2·4	1·2

tagnes est due à cette cause. J'ai émis en même temps l'hypothèse que l'absence des arbres dans les steppes est due également à l'action des vents glacials. Je reviens à cet ordre d'idées.

Les steppes se développent sur les terrains ayant un climat sec avec le quotient hygrométrique moindre de 5. Les précipitations sont, dans ce climat, insuffisantes pour fournir l'eau nécessaire à alimenter les masses compactes des arbres qui constituent la forêt. Elles auraient cependant suffi à pourvoir les arbres disséminés. Cet état de choses est réalisé dans les pays chauds, où sous l'action du climat ayant un quotient hygrométrique inférieur à 5 se développent les savannes. Dans les pays froids, au contraire, les arbres isolés n'apparaissent pas et la végétation prend l'aspect step-pique. Il est au moins très probable que les vents glacials produisent cet effet.

Les idées semblables ont été émises par Keller (1927) concernant les steppes russes et par Hauman (1926) pour les steppes de la Patagonie.

Keller s'exprime de la manière suivante sur les causes de l'absence des arbres dans les steppes (pp. 227—228):

1. Lack of moisture in conjunction with the fine grained steppe soil. The precipitation of the steppe climate is markedly lower than that of the forest climate, more of the water is lost to the soil through immediate evaporation as a result of the steppe winds, penetration to the deeper layers of the soil is hindered by the fine grained nature of the surface, and the water which does penetrate cannot be so completely utilised by the root systems.

2. The strong steppe winds also have of course a direct effect on transpiration. Wind is in general the greatest enemy of trees, and not only the dry south-east winds of summer (often accompanied by the so-called „dry fog“, Russian *mgla*) but probably also the winter winds have a great effect in preventing the spread of trees over the steppes just as they do over the northern tundra, since Gordyagin and Ivanow have shown that trees, even in the leafless state, may lose considerable quantities of water.

3. The presence of large quantities of easily soluble salts is harmful to certain of the forest vegetation. But a clear picture of these effects is only seen where the deciduous forest reaches the solonéts soils, and even here a doubt remains as to whether the peculiar physical character of the soil does not affect the trees unfavourably. On the edge of these soils the sufferings of the trees are clear enough. They are dwarfed, of irregular growth, and the top, or the whole tree, may perish: lichens settle in great numbers on the bark... But where forest borders on pure steppe (i. e. with chernozëm soil) such pathological phenomena are not to be found.

4. Competition with the steppe grasses is probably also a factor. If acorns or the fruits or seeds of other trees are strewed among the grasses of a typical *Stipa* steppe... the seedlings abort. But if the grasses were completely extirpated

without altering the soil itself the development of tree seedlings would probably take place.

Hauman s'exprime dans les termes plus catégoriques (p. 124) sur les steppes de la Patagonie:

Il faut enfin nous occuper d'un troisième facteur de capitale importance en Patagonie: le vent. Je n'ai pu obtenir de renseignements plus détaillés que ceux, tout à fait insuffisants, des publications officielles, mais j'ai la conviction que c'est à la violence des vents, combinée évidemment avec la sécheresse, qu'il faut attribuer le caractère si particulier de la végétation et que c'est ce facteur, tout autant que la diminution de température, qui détermine la différence dans l'aspect et la composition de la végétation patagonique et celle du Monte.

Les vents, qui balaient le sol, emportent non seulement de la terre et du sable, mais encore des graviers qui frappent quelquefois très désagréablement le visage du voyageur; cela rend impossible la vie des plantes à feuilles tendres, dès qu'elles s'élèvent le moins du monde au-dessus du sol. Les habitations humaines se tapissent dans les dépressions, et il est indispensable, si l'on veut, profitant des sources voisines, cultiver le moindre petit jardin autour de la maison, établir d'abord des abris de branchage (*Berberis*, *Verbena tridens*).

Lorsque se déchaîne brusquement une de ces tempêtes, les chevaux de selle — j'ai vu le fait — refusent de continuer à marcher contre le vent: ils se retournent, lui présentant la croupe, et attendent, immobiles, qu'un calme relatif renaisse. On m'assure même qu'il est arrivé plus d'une fois que le vent ait désarçonné un cavalier, et je transcris le passage suivant d'un travail de Morisson sur l'élevage dans le territoire de Sta Cruz: „Ce sont les vents de l'ouest et du sud-ouest qui, par leur grande violence, font de la Patagonie australe une région impropre à l'agriculture, sauf dans les vallées abritées; en effet, presque inmanquablement, et surtout au printemps et en été, ils commencent à souffler le matin pour ne se calmer que dans l'après-midi, et leur force qui est normalement de 35 à 40 km atteint très fréquemment 80 et même 90 km à l'heure. Le travail est rendu souvent très pénible dans les établissements de l'élevage, au point qu'il est indispensable de se protéger les yeux par de fortes lunettes ou, à leur défaut, par un sac (noué autour de la tête)“.

Les renseignements publiés par Davis confirment la direction dominante des vents et le fait, grave pour la végétation, que les saisons les plus venteuses sont le printemps et l'été; quant aux intensités, d'après les chiffres officiels, il n'y aurait pas de vents plus forts à Sta Cruz qu'à Buenos-Ayres, où il n'y en a guère plus qu'à Paris ou à Bruxelles: les vitesses moyennes varient entre 10 et 18 km, avec une moyenne de 15.3 km à Buenos-Ayres et seulement 14.1 à Sta Cruz: bel exemple de la fallacieuse inutilité de l'emploi exclusif de moyenne en climatologie.

La dernière remarque dans ce texte est très importante. En effet, l'action des vents n'est destructrice que quand ils sont forts. Il faut donc étudier séparément les vents de différentes vitesses. Mais il y a encore d'autres difficultés dans l'étude des vents. On a ici un facteur climatique extrêmement variable dans le temps et dans l'espace.

La force des vents varie d'année en année d'une manière parfois déconcertante. Récemment Travniček (1937) a attiré l'attention sur une périodicité de 30 ans environ qui s'accuse non seulement dans les vitesses moyennes, mais aussi dans la fréquence des tempêtes (fig. 7 et 8). Par conséquent, il n'est pas indifférent, quelle période d'observations est prise pour la base des études.

Fig. 7. Les nombres annuels des jours à vents violents dans trois stations de différente altitude. — D'après Travniček.

Ensuite la force des vents varie souvent fortement même à une petite distance, sous l'influence du relief du sol. Par exemple, la station Viatka École réelle notait des vents tellement forts, que Kiersnowski (1889, p. 17) supposait une erreur systématique dans les observations. Or, en 1897 on a établi encore une station près

TABLE
Viatka (58°36' N, 49°41' E).

Station	Altitude (m)	Hauteur de l'ané- momètre (m)	I	II	III	IV
École réelle . .	185	13.4	3.3	7.5	5.5	6.6
Ferme expéri- mentale . .	170	16.8	2.4	5.4	3.9	5.6

de la ville à la ferme expérimentale. Cette station a noté des vitesses du vent beaucoup plus petites, malgré le niveau plus élevé de l'anémomètre (table XXVI). La position de la ville sur la rive élevée d'un fleuve en est sans doute la cause.

Fig. 8. Variations de la vitesse moyenne annuelle des vents dans deux stations maritimes. — D'après Travniček.

Ce n'est pas encore tout. L'entourage immédiat de l'anémomètre, son emplacement sur le toit d'un édifice ou sur un poteau, l'avoisinage des bâtiments et des arbres — tout cela produit sur les mesures de la vitesse du vent des influences pratiquement impossibles à démêler.

XXVI

Vitesses du vent (*m/sec*) en 1897 à 13 h

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
5·6	9·2	5·6	7·7	6·0	8·3	8·5	5·6
4·5	6·9	5·1	5·6	5·3	5·9	6·0	3·9

TABLE

Kamennaia Step. Station No 4 dans la steppe, 51°03'

Période		I	II	III	IV
1899—1908	Température minim. moyenne	—13·3	—11·6	— 8·1	+1·2
	Tempér. min. absol. moy. . .	—27·7	—22·3	—19·5	—6·6
	Jours à temp. min. ≤ 0 . . .	30·2	27·7	28·4	12·9
	Vitesse du vent à 7 h (<i>m/sec</i>)	5·8	6·2	5·3	4·9
	Vent à 13 h	6·3	6·7	6·8	7·2
	Vent à 21 h	5·9	6·3	5·2	3·7
1900	Température minim. moyenne	—17·0	—16·8	— 8·9	—0·6
	Tempér. min. abs. moy. . .	—27·2	—26·1	—21·4	—6·1
	Jours à temp. min. ≤ 0 . .	31	28	31	19
	Vent à 7 h	11·8	8·6	6·0	6·3
	Vent à 13 h	12·1	9·0	8·0	8·3
	Vent à 21 h	12·8	9·0	6·1	4·4
1901—1910	Vent à 7 h	4·6	5·7	4·9	4·4
	Vent à 13 h	5·2	6·2	6·3	6·9
	Vent à 21 h	4·7	5·8	4·9	3·4

Par suite, une grande importance ont les stations établies dans les steppes russes, en rase campagne, par le service d'afforestation en 1899. Malheureusement une partie seulement de ces observations ont été publiées *in extenso*. Je prends les trois stations principales: Kamennaia Step, Derkoulskoe Verderie et Marioupolskoe Verderie. Je donne d'abord les valeurs moyennes, pour la période de 10 ans (1899—1908), concernant les gelées et les vents (tables XXVII—XXIX). Dans les mêmes tables j'ai réuni les données pour l'année 1900, particulièrement venteuse. Je donne séparément les informations sur la tempête qui a sévi le 19—24 février 1900 dans les terrains considérées (tables XXX—XXXII), comme exemple de ces fameuses tempêtes steppiques qui agissant à la température inférieure à zéro sont funestes aux arbres.

On voit que les vents steppiques sont forts. Cependant, leur

XXVII

40°42'E, 188 m. L'anémomètre à 10·7 m au-dessus du sol

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
7·4	12·2	13·8	12·2	6·6	+1·5	— 5·3	—11·3
—0·2	+4·8	7·9	+5·5	—0·9	—5·6	—15·8	—25·3
2·0	0	0	0	1·6	11·2	25·3	29·5
3·9	3·0	2·4	2·5	3·4	3·6	4·7	4·7
5·5	4·9	4·3	4·8	5·8	5·7	5·6	5·6
1·9	1·5	1·1	1·1	2·6	3·6	4·7	5·2
+5·9	9·9	13·1	12·4	5·1	+5·0	— 5·4	— 8·3
—2·3	+4·6	8·3	+0·2	—0·6	+0·5	—15·9	—29·7
4	0	0	0	1	0	28	31
3·8	2·5	2·1	1·3	4·5	4·1	2·1	4·9
5·6	4·6	4·4	3·2	6·8	6·8	2·6	6·2
1·8	1·1	0·9	0·7	3·1	5·0	2·4	5·2
3·9	3·0	2·6	2·6	3·1	3·3	5·1	4·5
5·5	4·8	4·5	4·9	5·5	5·4	6·1	5·3
2·0	1·5	1·1	1·2	2·4	3·2	5·2	4·8

vitesse moyenne dans les mois avec gelées est inférieure à 6 m/sec, ce qui constitue la limite extrême pour les arbres. Une exception présente Kamennaia Step, où les valeurs moyennes de la force des vents surpassent cette limite dans la période 1899—1908. Mais ceci est produit par l'année exceptionnelle de 1900. Lorsqu'on prend la période 1901—1910 (Rykatchew, p. 75), on a des valeurs moyennes inférieures à 6 m/sec (voyez la dernière partie de la table XXVII).

On voit donc que les valeurs moyennes ne sont pas décisives. Il en est autrement, lorsqu'on considère les vents violents. Les tempêtes de l'hiver et du printemps de 1900 pourraient seules détruire les arbres dans les steppes. En général les vents violents sont beaucoup plus fréquents dans les steppes que dans les terrains couverts des forêts. On le voit nettement dans la table XXXIII qui se rapporte aux mois de janvier à avril, les plus dangereux aux arbres.

TABLE

Derkoulskoe Verderie. Station No 1 dans la steppe, 49°03'N,

Période		I	II	III	IV
1899—1908	Température minim. moyenne	—11·3	— 8·8	— 5·3	+2·6
	Tempér. min. abs. moy. . .	—24·2	—19·9	—16·6	—4·7
	Jours à temp. min. ≤ 0 . .	29·8	26·7	27·1	8·4
	Vitesse du vent à 7 h (<i>m/sec</i>)	5·5	5·5	5·2	5·2
	Vent à 13 h	6·1	6·6	6·4	7·2
	Vent à 21 h	5·8	6·2	5·5	4·2
1900	Température minim. moyenne	—14·7	—11·9	— 6·6	+1·2
	Tempér. min. abs. moy. . .	—26·0	—19·1	—18·8	—2·4
	Jours à temp. min. ≤ 0 . .	31	28	31	14
	Vent à 7 h	7·9	6·4	6·0	4·4
	Vent à 13 h	8·3	7·5	7·0	6·7
	Vent à 21 h	8·3	7·3	5·5	4·1

TABLE

Marioupol'skoe Verderie. Station No 6 dans la steppe, 47°39'N

Période		I	II	III	IV
1899—1908	Température minim. moyenne	— 9·6	— 74·	— 4·1	+2·3
	Tempér. min. abs. moy. . .	—22·1	—18·2	—14·3	—4·5
	Jours à temp. min. ≤ 0 . .	29·4	27·2	26·4	8·4
	Vitesse du vent à 7 h (<i>m/sec</i>)	5·3	5·9	6·0	5·2
	Vent à 13 h	5·9	6·9	7·3	7·6
	Vent à 21 h	5·3	6·0	5·6	4·2
1900	Température minim. moyenne	—10·7	— 8·9	— 5·5	+1·5
	Temp. min. abs.	—20·5	—15·9	—17·9	—2·9
	Jours à temp. min. ≤ 0 . .	31	28	31	9
	Vent à 7 h	8·5	7·3	5·4	5·3
	Vent à 13 h	9·3	9·1	5·3	7·4
	Vent à 21 h	8·6	8·3	6·2	5·3

XXVIII

39°48'E, 152 m. L'anémomètre à 11·5 m au-dessus du sol

V	VI	VII	VIII	IX	X	XII	XI
9·4 +2·5 0·1	13·5 6·8 0	15·6 9·6 0	14·5 +7·9 0	8·3 —0·1 0·9	3·2 —3·6 7·8	— 3·7 —12·6 22·7	— 9·0 —21·2 28·8
3·9 5·7 2·9	3·1 5·0 2·5	2·7 4·3 1·9	2·8 4·9 2·1	3·6 5·6 3·2	3·6 5·4 3·9	4·7 5·6 4·7	4·8 5·8 5·2
8·7 +0·5 0	11·4 7·1 0	15·5 8·9 0	15·1 +4·5 0	6·0 —2·5 1	+5·5 0·0 1	— 4·5 —11·8 29	— 6·2 —16·6 29
3·5 5·4 3·1	3·3 4·6 2·3	2·8 4·6 1·9	3·2 5·0 2·0	3·4 5·9 2·4	4·0 5·8 4·0	3·8 4·0 3·7	5·2 5·6 6·1

XXIX

37°30'E, 280 m. L'anémomètre à 9·5 m au-dessus du sol

V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
8·9 +1·7 0·2	13·2 7·3 0	15·1 8·9 0	14·2 6·8 0	8·4 +0·4 0·7	+3·5 —3·3 7·7	— 3·5 —11·8 22·2	— 7·7 —19·2 27·1
4·4 5·5 2·8	3·3 4·7 2·3	2·9 4·7 2·1	3·0 4·8 2·4	3·9 5·8 3·3	3·9 6·1 4·3	4·7 5·6 5·0	5·3 5·9 5·5
8·7 +1·3 0	11·7 5·9 0	15·0 8·9 0	15·4 5·4 0	6·0 —0·8 1	+6·0 —0·3 2	—4·2 —9·7 25	— 4·8 —11·5 28
4·5 5·0 2·9	3·5 4·0 2·1	3·3 4·4 1·9	3·7 6·9 2·3	2·7 4·4 2·5	3·5 5·6 3·8	3·9 4·5 4·0	4·7 4·5 5·7

Dans cette table, Kamennaia Step est représentée pour la période 1899—1907, Derkouskoe Verderie pour 1899—1905 et Marioupskoe Verderie pour 1899—1908. J'y ai mis, à titre de comparaison, la station de Lougansk située dans la zone steppique (période 1897—1906) et trois stations de la zone forestière: Elatma (période 1896—1904), Vychni Volotchek ($57^{\circ} 35' N$, $34^{\circ} 34' E$, 167 m,

TABLE XXX
Kamennaia Step. Février 1900

Date	Température				Vent (<i>m/sec</i>)		
	Min.	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h
19	—26·1	—24·4	—17·9	—20·9	0	5	7
20	—22·6	—21·6	—15·4	—18·5	9	14	20
21	—24·9	—16·2	—12·9	—11·6	20	20	12
22	—16·2	—14·0	—12·2	—12·6	20	20	20
23	—22·9	—16·8	—12·8	—13·8	20	20	20
24	—16·9	—16·0	—10·0	—12·6	20	5	5

TABLE XXXI
Derkouskoe Verderie. Février 1900

Date	Température				Vent (<i>m/sec</i>)		
	Min.	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h
19	—16·1	—14·7	—11·5	—15·5	5	6	9
20	—19·1	—17·7	—10·7	—12·9	12	16	20
21	—13·8	—11·5	— 7·8	— 8·6	12	12	14
22	—11·7	— 9·0	— 8·4	—11·5	14	16	20
23	—14·6	—14·2	—10·5	— 9·6	20	16	14
24	—12·0	—10·9	— 8·0	— 9·4	8	12	3

TABLE XXXII
Marioupol'skoe Verderie. Février 1900

Date	Température				Vent (<i>m/sec</i>)		
	Min.	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h
19	—13·3	—11·1	—9·8	—13·2	9	12	17
20	—15·9	—15·0	—8·0	—9·7	17	26	26
21	—9·7	—8·6	—4·0	—3·2	18	18	18
22	—5·4	—5·1	—2·8	—3·5	18	26	17
23	—10·2	—9·5	—8·0	—8·0	17	26	26
24	—8·6	—7·4	—5·0	—6·2	17	8	7

période 1899—1908) et Cracovie (période 1899—1908). La hauteur de l'anémomètre était à Lougansk de 10·4, à Elatma de 14·5, à Vychni Volotchek de 15·5 et à Cracovie de 21·2 *m*. Dans l'Observatoire de Cracovie fonctionnait l'anémomètre enregistreur. Par suite, les mesures y étaient plus exactes que dans les autres stations qui étaient munies des anémomètres de Wild. En conséquence, la courbe des fréquences des vents est à Cracovie très régulière, tandis que dans la plupart des autres stations les observateurs donnaient la préférence à certaines valeurs, le plus souvent impaires.

Les données de la table XXXIII ne sont pas tout à fait comparables entre elles, car les quatre dernières stations se trouvent dans les villes. En outre il faut tenir compte du fait que dans certaines stations de la zone forestière les vents sont forts à cause des conditions locales. Comme nous l'avons vu plus haut, tel est le cas de Viatka. Il en est probablement de même à Pińsk (Bartnicki, 1930). Cependant en général dans la zone forestière les vents sont non seulement moins forts en moyenne, mais atteignent moins fréquemment des vitesses élevées.

Ce n'est pas encore tout. Ce qui est peut être beaucoup plus intéressant, c'est le parcours de la courbe des fréquences des différentes vitesses. Dans la zone forestière, la fréquence de vents forts diminue régulièrement avec l'augmentation de la vitesse. Dans les steppes, il en est autrement: la courbe des fréquences, après

TABLE

Fréquence des différentes vitesses du vent pendant

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kamennaia Step	66	116	5	168	11	189	5	148	5	132	5
Derkoulskoe Verderie	23	44	51	91	79	95	86	89	69	51	57
Marioupskoe Verderie	10	98	87	198	27	183	21	196	16	119	10
Lougansk	23	113	41	220	68	222	36	196	18	112	49
Elatma	215	63	125	137	154	125	96	74	50	23	11
Vychni Volotchek	41	113	255	240	279	41	101	30	57	27	10
Cracovie	120	175	180	204	185	121	101	55	40	15	2

avoir baissé, s'élève pour les vents les plus forts d'une manière plus ou moins considérable. On a l'impression que les vents les plus forts constituent dans les steppes un phénomène indépendant, surajouté au régime général des vents.

En fin des comptes, on voit qu'il est au moins très probable que les forts vents glacials, combinés avec la sécheresse, déterminent l'absence des arbres dans les steppes.

En finissant ce travail, je remercie sincèrement Mr le Prof. T. Banachiewicz de l'amabilité avec laquelle il a bien voulu mettre à ma disposition les matériaux climatologiques de la bibliothèque de l'Observatoire de Cracovie.

Laboratoire de Botanique de la Faculté Agricole et Forestière de l'École Polytechnique de Lwów (Pologne).

XXXIII

les mois de janvier à avril à 13 h (à Cracovie à 14 h)

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	Total
0	118	0	25	0	45	9	0	0	34				1081
0	61	0	25	0	12	3	2	0	2				840
0	86	30	6	8	9	32	39	3	13	1	1	4	1197
0	1	80	1	16	0	1	1	0	1				1199
6	0	2	0	0	1								1082
4	2	1	1										1202
2	1	0	1										1202

Littérature

- Anonymous 1927, The Falkland Islands. — Bull. of miscellaneous information. Royal Bot. Gard. Kew 1—3.
- Bartnicki L. 1930, Prądy powietrzne dolne w Polsce (Les courants atmosphériques en Pologne). — Prace geofizyczne. Vol. 7, No. 3, 1—98, nombreuses cartes.
- Brooks C. E. P. 1920, The climate and weather of the Falkland Islands and South Georgia. — Meteorological Office. Geophysical Memoirs No. 15, 97—146, 8 pl.
- Hauman L. 1926, Etude phytogéographique de la Patagonie. — Bull. Soc. Roy. Belgique. Vol. 58, 105—171, pl. I—XIII.
- Johnson T. 1910, Die Flora von Irland. — Karsten-Schenck's Vegetationsbilder. Série 8, fasc. 5—6.
- Keller B. A. 1927, Distribution of vegetation on the plains of European Russia. — Journal of Ecology. Vol. 15, 189—233, pl. II—VIII, 8 cartes, 1 fig.
- Kiersnowski J. 1889, Über den täglichen und jährlichen Gang und die Verteilung der Windgeschwindigkeiten im russischen Reiche. — Repertorium für Meteorologie herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. St. Pétersbourg. Vol. 12, Nr. 3, 1—94, 3 cartes.
- Kouznetsow N. N. 1912, Essai d'une subdivision de la Sibérie en provinces phytogéographiques. — Bull. Acad. Sc. St. Pétersbourg. Année 1912, 871—897, 4 cartes (en russe).

- Rykatchew M. A.** 1919, La fréquence des différentes vitesses du vent en Russie. — Les sources naturelles de la production en Russie. Édition d'une commission de l'Académie des Sciences, Petrograd, I, première partie, 1—114, 11 cartes (en russe).
- Schenck H.** 1905, Vergleichende Darstellung der Pflanzengeographie der sub-antarktischen Inseln, insbesondere über Flora und Vegetation von Kerguelen. Mit Einfügung hinterlassener Schriften A. F. W. Schimpers. — Deutsche Tiefsee-Expedition. Vol. II. 1.
- Skottsberg C.** 1913, A botanical survey of the Falkland Islands. — Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, vol. 50, No 3.
- Travniček F.** 1937, Die Aenderungen der mittleren Luftbewegung während langer Zeiträume. — Naturwissenschaften, vol. 25, 23—4, 2 fig.
-

Fot. K. Starmach

Desmotrichum undulatum, *D. balticum* i *D. scopulorum* na listku zostery
Powiększenie 2·4 ×

Desmotrichum undulatum, *D. balticum* and *D. scopulorum* on a leaf of *Zostera*
Magnification 2·4 ×

Fot. J. Treszka

Owocujący okaz *Stratiotes aloides* L. z okolicy Mariampola
bezpośrednio po wyjęciu z wody

A fructiferous specimen of *Stratiotes aloides* L. from the sur-
roundings of Mariampol seen directly after taking out of water