Contribution à l'étude de l'hydrolyse dissymétrique effectuée par des estérases

F. GÓRSKI

(wpł. 29. V. 1950)

En 1903 D a k i n découvrit qu'un substratum racémique, à savoir l'ester méthylique de l'acide dl-mandélique est décomposé d'une manière dissymétrique par un ferment d'origine animale:

Il constata que l'inverse droit était attaqué plus rapidement que l'inverse gauche: en effet l'acide mandélique isolé présentait un mélange des deux inverses et déviait la lumière polarisée à droite. Ce phénomène a fait ensuite l'objet de recherches de W i l l s t ä t t e r, de B a m a n n et de leurs collaborateurs. Ils étudièrent la décomposition hydrolitique de plusieurs esters catalisée par des ferments d'origine animale ou végétale et ils observèrent que dans la majorité des cas l'ester racémique subissait finalement une décomposition complète, l'un des inverses étant toutefois attaqué plus rapidement que l'autre. La différence entre les vitesses de décomposition déterminait la sélectivité du ferment étudié, plus cette différence était grande, plus la sélectivité était prononcée. Sa valeur dépendait des conditions d'expériences, notamment de l'origine du ferment. Dans d'autres cas, moins nombreux (par ex. l'ester propylique de la leucine racémique, W a r b u r g 1906, W i l l s t ä t t e r et M e m m e n 1923), un seul inverse, le gauche, était décomposé par le ferment, tandis que le droit résistait presque complètement à son action. Dans la suite nous laissons ce cas de côté.

Dans ce mémoire nous voulons démontrer en nous basant sur le matériel expérimental réuni par les auteurs cités, que les résultats auxquels nous sommes arrivés dans un mémoire précédent (G ó r-

s k i 1947) consacré à l'étude du métabolisme dissymétrique des plantes hétérotrophes, sont également applicables à l'étude des actions hydrolitiques effectuées par des ferments, à conditions toutefois de remplacer le terme taux d'utilisation par l'expression taux de décomposition. Dans le mémoire cité nous avons montré qu'on a avantage à représenter la marche de l'utilisation des inverses non pas en fonction du temps, mais en fonction de l'utilisation du substratum racémique envisagé comme une substance simple.

Nous désignerons donc par les symboles $\%l$ et $\%d$ les quantités des inverses gauche et droit décomposées par le ferment et exprimées en pourcents des quantités initiales et par $\%s$ le taux de décomposition du total des inverses. Entre les grandeurs en question on a la relation:

$$\%_0 l + \%_0 d = 2\%_0 s. \quad (1)$$

Supposons en effet qu'à un moment donné l'hydrolyse ait atteint 30% de l'inverse gauche et 60% de l'inverse droit: cela revient à dire que $30 + 60 = 90$ parties sur 200 ou $90/2 (= 45 = \%s)$ sur 100 du racémate ont été décomposées. L'objet de cette note consiste à trouver une relation exprimant $\%l$ et $\%d$ en fonction de $\%s$.

Nous commencerons par admettre que la décomposition des inverses progresse conformément à la loi qui régit les réactions monomoléculaires. Nous supposerons donc que les quantités de substratum décomposées pendant le temps dt sont proportionnelles aux quantités encore non décomposées au moment t et à la quantité q du ferment. A ces relations correspondent les équations suivantes:

$$dy_1 = K_1(A - y_1)qdt \quad \text{et} \quad dy_2 = K_2(A - y_2)qdt \quad (2)$$

dans lesquelles y_1 et y_2 sont les quantités des inverses décomposées au moment t , A la quantité de l'inverse droit ou gauche présente dans la solution au début ($t = 0$) et K_1 et K_2 deux constantes positives. Nous supposerons toujours $y_1 > y_2$, y_1 représentera donc l'inverse décomposé plus rapidement. Ainsi qu'il est bien connu, l'intégration des équations (2) conduit aux fonctions:

$$y_1 = A(1 - e^{-c_1 t}) \quad \text{et} \quad y_2 = A(1 - e^{-c_2 t}) \quad (3)$$

dans lesquelles $c_1 = K_1 q$ et $c_2 = K_2 q$. Si l'on exprime la décomposition en pourcents, A prendra la valeur 100 et y_1 et y_2 représenteront les taux de décomposition $\%l$ et $\%d$ des inverses.

Pour exprimer %*l* et %*d* en fonction de %*s* nous allons éliminer la variable *t* entre *y*₁ et *y*₂ d'une part et leur moyenne que nous désignerons par *x* d'autre part, $x = \frac{y_1 + y_2}{2}$. De la première équation (3) nous tirons — *t*:

$$-t = \frac{1}{c_1} \log \frac{A - y_1}{A}$$

que nous substituons dans *x*:

$$x = \frac{y_1 + y_2}{2} = A - \frac{A}{2} [e^{-c_1 t} + e^{-c_2 t}]$$

$$x = A - \frac{A}{2} \left[e^{\log \frac{A - y_1}{A}} + e^{\frac{c_2}{c_1} \log \frac{A - y_2}{A}} \right] = A - \frac{A}{2} \left[\frac{A - y_1}{A} + \left(\frac{A - y_2}{A} \right)^{1/c} \right]$$

ou enfin

$$x = \frac{y_1}{2} + \frac{A}{2} - \frac{A}{2} \left(\frac{A - y_1}{A} \right)^{1/c} \quad (4)$$

si nous convenons de désigner par *c* le rapport *c*₁/*c*₂. Le même procédé éliminatoire appliqué à *y*₂ et à *x* conduit à l'expression analogue:

$$x = \frac{y_2}{2} + \frac{A}{2} - \frac{A}{2} \left(\frac{A - y_2}{A} \right)^c \quad (5)$$

Les fonctions définies par les formules (4) et (5) sont identiques à celles auxquelles nous sommes arrivés en étudiant l'utilisation des inverses des racémates par des organismes vivants. Pour cette raison il est inutile de discuter encore une fois leur propriétés en détail. Rappelons seulement que le paramètre $c = c_1/c_2 = K_1/K_2$ peut être pris comme une mesure du pouvoir sélectif du ferment; il se calcule au moyen de la formule:

$$c = \frac{\log A - \log (A - y_1)}{\log A - \log (A - y_2)} \quad (6)$$

que l'on obtient de (5) en tenant compte de la relation (1). Il est toutefois préférable de mesurer le pouvoir sélectif au moyen des taux réduits de décomposition ${}^0/_{0}l_{red}$ et ${}^0/_{0}d_{red}$, c'est à dire des taux exprimant la décomposition des inverses correspondant à ce moment pour lequel la moitié ($x = A$ ou %*s* = 50) du substratum

racémique a été décomposée. Les taux réduits, ainsi qu'il résulte de l'égalité (1), sont liés par la relation $\%l_r + \%d_r = 100$. Elle permet de trouver immédiatement $\%d_r$ quand on connaît $\%l_r$ et réciproquement.

Graphique 1. — Représentation graphique des nos 1 et 2 du tableau I. Abscisses: $\%s$, ordonnées: $\%l$ ou $\%d$. Cercles: estérase du foie de cochon, $c = 2,76$; points: estérase du foie de brebis, $c = 2,72$. Dans ce graphique, pour plus de clarté on a représenté uniquement les valeurs $\%l$ du no 1 et les valeurs $\%d$ du no 2.

D'après les données de Willstätter, Kuhn et Bamann, 1928, 1929.

Nous empruntons à de différents mémoires de Willstätter, de Bamann, de Laeverenz et de leurs collaborateurs les données expérimentales destinées à confirmer l'exactitude des formules (4) et (5). Ces données se rapportent toutes à l'hydrolyse de l'ester éthylique de l'acide dl-mandélique effectuée par des ferments d'origine animale (estérases du foie et du pancréas) ou végé-

tale (diastase „taka“ provenant du mycélium de *Aspergillus oryzae*). Nous n'avons pas hésité à grouper ensemble dans les tables 1—6 les résultats d'expériences exécutées dans des conditions différentes. Ces différences concernaient le pH ou la concentration du

Graphique 2. — Représentation graphique des nos 3, 4, 5, du tableau I. Abscisses: %s, ordonnées: %l et %d. Croix: diastase „taka“, $c = 5,94$; cercles: estérase du foie de cochon, $c = 29,8$; points: estérase du foie de lapin, $c = 1,92$.

D'après les données de Bamann et Laeverenz, 1929, 1930.

substratum et du ferment ou le procédé employé pour son extraction etc. Toutefois il résulte de l'accord observé entre les données expérimentales que les dites différences étaient sans exercer d'influence notable sur la sélectivité du ferment. Dans les mémoires cités les données expérimentales sont présentées sous forme de %s et de $[\alpha]$, c'est à dire de la rotation spécifique de l'acide mandélique décomposé et isolé. Or pour pouvoir appliquer les formules

(4) et (5) il faut connaître $\%l$ et $\%d$. Il est toutefois possible de calculer ces taux à partir de $\%s$ et de $[\alpha]$ (voyez la note 1). Une fois $\%l$ et $\%d$ connus nous calculons la valeur du paramètre c au moyen de la formule (6) et nous trouvons à l'aide de la table VI de notre mémoire de 1947 la valeur correspondante y_2 red caractérisant le pouvoir sélectif. La moyenne des valeurs de c substituée dans (4) et (5) permet de tracer les courbes correspondantes et de vérifier de la sorte l'accord entre la théorie et l'expérience.

Ainsi qu'il résulte du tableau I et des graphiques 1—3 cet accord est en général satisfaisant, en effet les données expérimentales s'ajustent bien aux courbes correspondantes. Toutefois l'accord est moins bon pour les valeurs élevées de $\%s$. Ce fait a pour cause d'une part l'autolyse du substratum qui, indépendamment de la présence du ferment, se décompose lentement de lui-même. Cette autolyse en hydrolysant les deux inverses dans la même proportion a pour effet d'abaisser le pouvoir sélectif du ferment. D'autre part il est probable que par suite de son activité prolongée le ferment dégénère et perd son pouvoir sélectif pour de hautes valeurs de $\%s$.

Remarquons pour terminer que les résultats que nous venons d'exposer ne sont pas à l'abri de critiques, en effet le système d'équations (2) présume implicitement que la décomposition du premier inverse se fait indépendamment de celle du second, tout comme s'il y avait deux ferments, l'un attaquant l'inverse droit, l'autre l'inverse gauche. En réalité il n'y a qu'un seul ferment qui se répartit d'une certaine manière entre l'inverse gauche et l'inverse droit et à un moment donné une certaine quantité q_1 du ferment s'est combinée avec le premier et une autre $q_2 = q - q_1$, avec le second; q_1 et q_2 sont des fonctions du temps ou de $\%s$. Il résulte de ces remarques que l'hydrolyse du premier inverse n'est pas indépendante de l'hydrolyse du second et réciproquement. Si l'on veut tenir compte de cette dépendance mutuelle dans la décomposition des inverses il faut introduire certaines hypothèses supplémentaires sur la manière dont se fait la répartition du ferment entre les inverses. Ces hypothèses peuvent être de nature variée, on peut par exemple supposer que cette répartition se fait conformément à la loi de l'action des masses ou que le rapport q_2/q_1 satisfait à certaines conditions. Les équations différentielles qui correspondent à ces hypothèses sont en général intégrables, mais leurs solutions sont compliquées et d'une application difficile. Nous ne les présentons pas

ici en détail, car nous sommes d'avis que le bon accord observé entre l'expérience et la théorie exposée plus haut rend ces développements superflus.

Note 1.

Les auteurs qui se sont occupés de l'hydrolyse dissymétrique catalysée par les ferments expriment leurs résultats en indiquant les taux de décomposition ($\%s$) de la quantité globale du substratum et la rotation spécifique $[\alpha]$ de l'acide libéré. Pour pouvoir appliquer les formules (4), (5), (6) il faut toutefois connaître les taux de décomposition $\%l$ et $\%d$ pour chacun des inverses formant le substratum racémique. Les formules suivantes permettent de calculer ces taux à partir de $\%s$ et $[\alpha]$:

$$y_1 = \frac{[\alpha]^* + [\alpha]}{[\alpha]^*} \cdot x \quad y_2 = \frac{[\alpha]^* - [\alpha]}{[\alpha]^*} \cdot x, \quad (7)$$

y_1 et y_2 indiquant les taux de décomposition ($\%l$ et $\%d$) des deux inverses, $y_1 > y_2$, $x = \%s = \frac{y_1 + y_2}{2}$ représente la décomposition globale du substratum exprimé en pourcents de la quantité du début, $[\alpha]^*$ est la rotation spécifique de l'inversé droit ou gauche pur (par ex. 158° pour l'acide mandélique, $\lambda = 5893 \text{ \AA}$), $[\alpha]$ est la

Graphique 3. — Représentation graphique du no. 6 du tableau I. Estérase du foie de cochon $c = 4.33$. D'après les données de Bamann et Feichtner, 1936. Abscisses: $\%s$, ordonnées $\%l$ et $\%d$.

TABLEAU I

Taux de décomposition, $\% s$, $\% l$, $\% d$, c , $\% l_{red}$ ou $\% d_{red}$.

Substratum décomposé: ester éthylique de l'acide dl-mandélique.

1. Estérase du foie de cochon
(Willstätter, Kuhn & Bamann 1929)

$\% s$	$\% l$	$\% d$	c	$\% l_r$
9,2	5,4	13,0	2,51	34,5
35,0	21,0	49,0	2,86	32,5
67,1	60,8	73,4	(1,44)	(43,7)
40,2	24,2	56,2	2,98	31,8
77,0	71,0	83,0	(1,43)	(43,8)
12,6	7,3	17,9	2,60	34,0
48,8	31,1	66,5	2,94	32,1
18,9	10,4	27,3	2,87	32,4
52,5	37,7	67,3	2,36	35,5
72,9	68,4	77,4	(1,29)	(45,6)
8,6	5,3	11,9	2,33	35,7
22,4	12,6	32,2	2,89	32,4
34,0	19,7	48,3	3,07	31,4
45,5	29,7	61,3	2,69	33,4
61,4	50,1	72,7	(1,87)	(39,3)
79,5	78,0	81,0	(1,1)	(48,3)
7,6	4,6	10,6	2,38	35,4
13,7	7,7	19,7	2,74	33,2
29,5	16,9	42,1	2,95	32,0
42,2	26,2	58,8	3,00	31,8
50,5	32,4	68,6	2,96	32,0
67,2	59,0	75,4	(1,57)	(42,2)
moyennes:			2,76	33,1

2. Estérase du foie de brebis
(Bamann, 1929)

$\% s$	$\% l$	$\% d$	c	$\% l_r$
10,3	5,4	15,7	2,97	31,9
5,7	3,1	8,3	2,74	33,2
14,9	8,7	21,1	2,86	32,5
22,0	12,5	31,5	2,83	32,7
28,0	17,4	38,6	2,55	34,3

$\% s$	$\% l$	$\% d$	c	$\% l_r$
51,6	34,3	68,9	2,78	32,9
66,6	51,4	81,8	2,36	35,5
85,6	79,5	91,5	(1,56)	(42,4)
12,5	7,1	17,9	2,63	33,8
49,2	32,9	65,5	2,75	33,1
82,9	74,8	91,0	(1,75)	(40,4)
moyennes:			2,72	33,3

3. Estérase du foie de cochon
(Bamann & Laeverenz, 1930 a)

$\% s$	$\% l$	$\% d$	c	$\% l_r$
5,5	2,8	8,2	3,02	31,6
16,4	8,7	24,1	3,03	31,6
64,8	50,1	79,5	(2,28)	(36,1)
72,8	63,0	82,6	(1,76)	(40,3)
5,3	2,7	7,9	3,00	31,8
16,1	8,6	23,6	2,99	31,8
68,3	55,6	80,7	(2,01)	(38,1)
6,1	3,2	9,0	2,91	32,2
17,5	9,5	25,5	2,95	32,0
28,1	15,7	40,5	3,04	31,6
13,3	7,2	19,4	2,89	32,3
43,8	27,2	60,4	2,94	32,1
19,9	10,6	29,2	3,08	31,4
4,3	2,2	6,4	3,36	30,1
9,7	5,8	13,2	(2,37)	(35,5)
57,0	40,4	73,6	2,58	34,2
81,5	75,9	87,1	(1,44)	(43,7)
moyennes:			2,98	31,9

TABLEAU I (suite)

4. Estérase du foie de lapin
(Bamann, 1929)

% s	% l	% d	c	% d _r
5,9	7,9	3,9	2,06	37,7
16,4	21,3	11,5	1,96	38,2
23,7	29,9	17,5	1,85	39,5
6,9	9,2	4,6	2,05	37,8
12,9	16,7	9,1	1,92	38,9
25,7	32,6	18,8	1,89	39,1
43,7	52,7	34,7	1,76	40,3
63,1	74,0	52,2	1,83	39,7
72,1	83,4	60,8	1,92	38,9
moyennes:			1,92	38,9

5. Diastase „taka“
(Bamann & Laeverenz, 1930 b)

% s	% l	% d	c	% l _r
10,0	3,0	17,0	6,13	21,9
21,9	7,0	36,8	6,33	21,5
37,2	15,8	58,6	5,13	24,1
10,7	3,3	18,1	5,94	22,4
19,5	6,6	32,4	5,73	22,7
18,7	5,8	31,6	6,36	21,5
27,1	11,3	42,9	(4,67)	(25,4)
moyennes:			5,94	22,3

6. Estérases du foie et du pancréas de cochon
(Bamann & Feichtner, 1936).

% s	% l	% d	c	% l _r
46,5	21,8	71,2	5,06	24,4
47,8	22,8	72,8	5,03	24,5
9,0	3,6	14,4	4,25	26,7
46,2	22,2	70,2	4,82	25,0
8,0	3,2	12,8	4,22	26,8
8,7	3,5	13,9	4,19	26,9
17,4	7,4	27,4	4,16	27,0
4,1	1,9	6,3	3,90	27,9
8,0	4,0	12,0	(3,14)	(31,1)
10,6	4,3	16,9	4,21	26,8
43,5	21,1	65,9	4,54	25,8
45,7	22,4	69,0	4,62	25,6
8,4	3,9	12,9	3,47	29,6
43,2	20,7	65,7	4,61	25,6
7,9	3,0	11,8	4,13	27,1
8,1	3,6	12,6	3,68	28,7
17,2	8,2	26,2	3,55	29,3
3,8	2,1	5,5	(2,67)	(33,6)
7,8	4,4	11,2	(2,60)	(34,0)
10,4	5,0	15,8	3,35	30,1

% s	% l	% d	c	% l _r
9,9	4,2	15,6	4,24	26,7
19,8	8,3	31,3	4,34	26,4
30,0	13,3	46,7	4,31	26,2
40,0	18,4	61,6	4,71	25,3
9,2	3,8	14,6	4,08	27,3
18,7	7,8	29,6	4,32	26,5
28,0	11,7	44,3	4,70	25,3
36,2	15,9	56,5	4,8	25,1
32,3	14,0	50,6	4,68	25,4
13,8	5,8	21,8	4,12	27,1
28,1	11,9	44,3	4,62	25,6
29,1	12,2	46,0	4,73	25,2
13,8	5,8	21,8	4,12	27,1
28,0	11,9	44,1	4,59	25,7
moyennes:			4,33	26,5

Dans les expériences 1—10, 21—31 le ferment employé était un extrait du foie, dans les expériences 11—20 et 32—34 cet extrait était additionné d'un extrait dilué du pancréas.

rotation spécifique observée de l'acide isolé provenant de la décomposition du substratum. On vérifie l'exactitude des formules (7) en montrant que la somme $y_1 + y_2 = 2x$.

Exemple: soient $^0_0s = 40^0_0$, $[\alpha] = -60$ et $[\alpha]^* = \pm 158$. On trouve en appliquant les formules:

$$y_1 = ^0_0l = \frac{-158 - 60}{-158} \cdot 40 = \frac{-218}{-158} \cdot 40 = 55,2$$

$$y_2 = ^0_0d = \frac{+158 - 60}{158} \cdot 40 = \frac{98}{158} \cdot 40 = 24,8$$

Quand on a calculé y_1 (ou y_2) on trouve plus rapidement y_2 (ou y_1) au moyen de la relation $y_1 + y_2 = 2x = 2\%s$: par ex. $y_2 = 80 - 55,2 = 24,8 = \%d$.

SUMMARY.

It is a well known fact that enzymatic hydrolysis of racemic esters by esterases of animal or vegetal origin proceeds asymetrically, the right (or the left) isomer being decomposed with a greater velocity than the left (or the right). The author assumes that the decomposition of each of the optical isomers is a monomolecular reaction and from this assumption he deduces two relations (4) and (5) expressing the decomposition rate each of the optical isomers as a function of the decomposition rate of the sum of the two optical forms. The experimental data extracted from papers of Willstätter, B a m a n n, L a e v e r e n z and their collaborators and referring to the hydrolytic decomposition of racemic ethyl mandelate show a good agreement with the theory.

Laboratoire de physiologie végétale de l'Université des Jagellons à Cracovie, Pologne.

BIBLIOGRAPHIE

- 1906 — W a r b u r g, O.: Spaltung des Leucinesters durch Pankreasferment Zeitschr. f. physiol. Chem. 48, 205—13.
- 1924 — W i l l s t ä t t e r, R. & M e m m e n, F.: Vergleich von Leberesterase mit Pankreaslipase; über die stereochemische Spezifität der Lipasen. Ibid. 138, 216—53.
- 1928 — W i l l s t ä t t e r, R., K u h n, R. & B a m a n n, E.: Über asymmetrische Ester-hydrolyse durch Enzyme. Ber. d. deut. Chem. Ges. 61, 886—95.

- 1929 — B a m a n n, E.: Über die Konfigurationsspezifität der Leberesterase verschiedener Tiere und ihre Abhängigkeit von Aenderungen am Enzymkomplex. Ibid. 62, 1538—48.
- 1930a— B a m a n n, E. & L a e v e r e n z, P.: Über den Einfluss von optisch aktiven Fremdstoffen auf die Konfigurationsspezifität der Leberesterase verschiedener Tiere. Ibid. 63, 394—404.
- 1930b— B a m a n n, E. & L a e v e r e n z, P.: Die Konfigurationsspezifität der Leberesterase in ihrer Abhängigkeit von Aenderungen am Enzymkomplex. Ibid. 63, 2939—48.
- 1936 — B a m a n n, E. & F e i c h t n e r, Ch.: Die Konfigurations-Spezifität einer „komponierten“ Esterase. Biochem. Zeitschr. 288, 70—8.
- 1947 — G ó r s k i, F.: Pouvoir sélectif des végétaux hétérotrophes dans l'utilisation des inverses optiques. Bull. Acad. Polonaise d. Sc. et Lettres, série A. Sc. mathem. 168—201.