Zbiorowiska leśne Nadleśnictwa Murcki na Wyżynie Śląskiej

*Forest communities in the chief forestry of Murcki
on the Silesian Upland*

ST. MYCZKOWSKI

WSTĘP

Prace związane z wyróżnieniem oraz skartowaniem zbiorowisk leśnych Nadleśnictwa Murcki zostały podjęte z inicjatywy Komisji Gleboznawczo-Górnictwej Komitetu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przy Polskiej Akademii Nauk. Wybór padł na wymienione Nadleśnictwo ze względu na daleko sięgające szkodliwe wpływy gospodarki człowieka, które od dawna usunęły w cień sprawy przyrodniczo-leśne w Murckach. W następstwie dawnych i współczesnych błędów gospodarczych powstały tu niekorzystne zmiany środowisk leśnych, co wpłynęło z kolei na roślinność leśną.

Tak dawna, jak i obecna gospodarka leśna w Murckach była podporządkowana potrzebom przemysłu i górnictwa. Wyraziło się to m.in. w zamianie pierwotnych drzewostanów dębowych, dębowo-sosnowych, dębowo-grabowych i in., odznaczających się na ogół przewagą lub znacznym udziałem gatunków liściastych, na monotonne uprawy sosny i świerka, których zaletą i celem było produkowanie kopalniaków dla miejscowych kopalń węgla. Obecne rozmieszczenie świerczyn w Murckach świadczy, iż dla tego gatunku drzewa przeznaczono siedliska wilgotniejsze, zaś dla sosny — suchsze. Pomimo tej ostatniej zasady była to jednakże szablonowa gospodarka leśna, w wyniku której wyniszczono naturalne drzewostany liściaste i mieszane. Ocalały przy tym jedynie lokalnie starodrzewy bukowe i dębowe zgrupowane głównie na wyżynie przy samej miejscowości Murcki (J a r o s z 1956) oraz mniejsze ich skupienie w pobliżu sąsiedniego Giszowca. Wyniszczanie wspomnianych starodrzewi rozpoczęto dopiero po 1945 roku, kiedy to rozpoczął się okres całkowitego pominięcia potrzeb racjonalnej gospodarki leśnej w Murckach przez gwałtownie rozwijające się górnictwo i przemysł.

Wpływy gospodarki przemysłowej na lasy w Murckach, wywołujące zaburzenie stosunków wodnych w zbiorowiskach roślinnych oraz zanieczyszczenia poprzemysłowe roślinności lasów można podzielić ogólnie na dwie grupy: a) bezpośrednio szkodliwe oraz b) pośrednio szkodliwe. W zakresie wpływów bezpośrednich znajdują się m.in.: 1) założenie kopalni odkrywkowych na terenach leśnych, co stworzyło konieczność wyřębu przedrębnych drzewostanów, oraz trwale zniszczenie gleb leśnych (oddziały: 18, 19, 49, 50, 88, 89, 100, 105, 106 i in.), 2) powstanie pogórnich zapadlisk powierzchniowych, które wypełniły się wodą zalewając rosnące na nich drzewostany wykluczając tym samym możliwość ich dalszego zagospodarowania (oddziały: 4, 5, 130, 136, 157 i in.), 3) zalewanie drzewostanów wodami wprost z płuczkarni kopalnianych (oddziały: 107, 108, 131, 156, 157 i in.), 4) zatrucie wód powierzchniowych przez ścieki papierni w Czulowie (oddziały: 203, 204, 205 i in.), 5) pożary leśne (oddziały: 146, 147, 148 i in.) oraz 6) zadymianie i zapyłanie powietrza przez zakłady przemysłowe w szczególności w północnej części Nadleśnictwa od strony Katowic (Paprzycki 1960).

Niektóre z wymienionych dewastacji wywarły, oprócz szkód bezpośrednich, jeszcze i pośrednio różnorodne zaburzenia w środowiskach leśnych. Z zakresu pośredniego oddziaływania najbardziej szkodliwie wpłynęły na lasy Murcek te wszystkie zmiany i zaniedbania, które wywołały odkształcenie stosunków wodnych. Podobnie jak w innych obszarach Wyżyny Śląskiej dał się w Murckach zaobserwować wysoki na ogół poziom wód gruntowych. O sztucznym odwadnianiu badanych lasów w przeszłości świadczą stare, bardzo głębokie i szerokie rowy melioracyjne w oddziałach 171, 172 i in. Fakt pierwotnego zabagnienia niżej położonych partii lasów w Murckach potwierdza, oprócz ustnej tradycji wśród ludności miejscowej, także rozmieszczenie wielu starych dróg leśnych, łączących z reguły lokalne wyniosłości terenu, np. w oddziałach 177, 198, 199, 200 i in. Zaniedbanie dawnych urządzeń melioracyjnych, osiadanie pogórnich gruntu oraz zalewy powierzchniowe wodami poprzemysłowymi wywołały tak mordercze dla roślinności, obustronne wahnienia poziomu wód gruntowych, że w większości zostały wyniszczone gatunki bardziej wymagające, zaś na ich miejsce rozprzestrzeniła się pospolita i wszędobylska roślinność zrębów leśnych, płazowin itp.

Lasy Nadleśnictwa Murcki pomimo licznych zniszczeń tworzą dosyć wyraźny, odrębny kompleks otoczony przez pola i zabudowania miejscowości: Katowic, Janowa, Wesołej, Krasowego, Łędzin, Wygorzela, Tych, Podlesia oraz Piotrowic. Opisywane lasy zostały jednakże pocięte przez gęstą sieć rozmaitych szlaków i urządzeń komunikacyjnych oraz przemysłowych, jak szosy, tory kolejowe, drogi wywozowe, linie telefoniczne i energetyczne, kolejki linowe, transportery, urządzenia wiertnicze, rowy i rowki ściekowe oraz kopalnie, fabryki, składy etc.

Krótki i gólny opis degradujących wpływów gospodarki człowieka na siedliska leśne w Murckach nie może wyczerpująco scharakteryzować zniekształcenia tutejszych biocenoz leśnych. Jednakże na podstawie przytoczonych powyżej okoliczności można będzie wykazać niektóre przyczyny zubożenia florystycznego zbiorowisk leśnych badanego obszaru.

METODYKA I CEL OPRACOWANIA

Fitosocjologiczna charakterystyka lasów wykonana według znanej metody J. Brauna-Blanqueta (1951) została objęta założeniami kompleksowego opracowania terenu Nadleśnictwa Murcki przez Komisję Gleboznawczo-Górnictw GOP. Prace terenowe trwały przez trzy okresy wegetacyjne w latach 1958—1960. W roku 1958 wykonano wstępne opracowania, których wyniki pozwoliły na wyznaczenie grup gatunków roślin lokalnie wyróżniających poszczególne jednostki fitosocjologiczne. W latach 1959 do 1960 uzupełniono sieć około 120 zdjęć fitosocjologicznych, które dały podstawę wyodrębnienia 11 zbiorowisk (por. tab. 12) oraz skartowano (por. Hartmann 1958) zasięgi zbiorowisk leśnych na mapie w skali 1 : 20 000. Kartowanie ułatwiły znacznie dobre podkłady mapowe oraz doskonale widoczne w terenie linie podziału przestrzennego drzewostanów oddziałowe i wywozowe, a także wspomniane wyżej urządzenia komunikacyjne.

Nazwy gatunkowe roślin wyższych przyjęto zgodnie z Szafere, Kulczyńskim, Pawłowskim (1953), zaś nazwy mszaków według Gamsa (1957). Wzniesienia nad poziom morza ustalono przy pomocy altimetru firmy C. Stichling z Genewy, nachylenia stoków oraz ekspozycję terenu zbadano busolą geologiczną ze spadkomierzem czechosłowackiej marki Me-Opta, wysokość drzew pomierzono listewką Christena z dokładnością do 1 m, zaś ich grubość zmierzono zwykłym pierśnicomierzem z dokładnością do 0,5 cm. Wiek drzew określono na przekrojach pniaków lub świdrem przyrostowym Presslera na drzewach stojących.

Ze względu na równoczesne, szczegółowe opracowanie gleb leśnych badanego obszaru przez gleboznawców nie wykonano w ramach niniejszej pracy niemal żadnych badań gleboznawczych poza małymi odkrywkami kontrolnymi w badanych płatach. Natomiast prace terenowe, a zwłaszcza kartograficzne, zostały w ogromnej większości przeprowadzone wspólnie z grupą gleboznawców.

Wspomniane już kompleksowe opracowanie przyrodnicze lasów Nadleśnictwa Murcki objęło gospodarczą przeszłość drzewostanów, tak ważną dla bieżącej gospodarki leśnej (Minckwitz 1958), oraz istniejące warunki rozwoju zbiorowisk leśnych, a mianowicie: podłoże geologiczne, gleby, stosunki wodne, osiadanie gruntu, szkody przemysłowe etc. Na

tak szerokim tle zostały scharakteryzowane typy siedliskowe lasu oraz zbiorowiska leśne. Te ostatnie stały się przedmiotem przedłożonej pracy, przy czym, jak już wspomniano, wykazały one wyraźne zubożenie florystyczne. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż na zbadanym obszarze nie wyróżniono ani jednego takiego zbiorowiska leśnego, któremu można by nadać rangę zespołu (por. P a w ł o w s k i 1959), tak wielkie było tu bowiem zniekształcenie szaty leśnej. Nazwy łacińskie użyte w tabelach określiły przeto jedynie roślinność naturalną (por. J a h n 1952, 1955 i in.), której mniej lub więcej zniekształcone resztki napotkano w granicach Nadleśnictwa Murcki.

OGÓLNY OPIS OBSZARU BADAŃ

Kompleks leśny Murcki o łącznej powierzchni około 6000 ha zajmuje środkowy wycinek południowej części płaskowyżu katowickiego z najwyższym wzniesieniem 340 m n.p.m. oraz sięga przez południową jego krawędź do części nizinnej obniżonej minimalnie do 240 m n.p.m., graniczącej z płaskowyżem mikołowskim (L e n c e w i c z 1955). W związku z tym badane Nadleśnictwo składa się z dwóch części, nizinnej i wyżynnej.

W geobotanicznym ujęciu S z a f e r a (1959) teren Murcek znajduje się w Poddziale A₄, Pasie Wyżyn Środkowych, w Krainie 15 Wyżyny Śląskiej. Zgodnie z danymi paleobotanicznymi wyżynne partie Murcek, podobnie jak całej Wyżyny Śląskiej, zajmowały pierwotnie rozległe lasy bukowe (*Fagetum*), zaś stoki wyżyn porastały dąbrowy (*Querceto-Carpinetum*) na żyznych i zasobnych siedliskach. Oprócz dwóch powyższych najważniejszych zbiorowisk na mniejszą skalę wchodziły w skład naturalnego krajobrazu tej części Śląska jeszcze sośniny i dąbrowy (*Pineto-Quercetum*) oraz podmokłe zbiorowiska olesów (*Alnetum*) i zalewowe łągów (*Fraxineto-Alnetum*). Jednakże bory iglaste (*Pineto-Vaccinietum myrtilli*) rozprzestrzenione z natury w innych częściach niżu polskiego na Wyżynie Śląskiej odgrywały niewielką rolę (S z a f e r 1959 i in.).

Obecnie jednym z uderzających objawów w składzie zdegradowanej roślinności leśnej w Murckach okazał się znaczny udział, a nawet przewaga gatunków wszędobylskich i kwasolubnych. Dosyć osobliwym zjawiskiem tego rodzaju są szeroko rozprzestrzenione łąny trzcinnika owłosionego (*Calamagrostis villosa*), który dotychczas był rzadko podawany z niżu, a którego znaną domeną są górskie piętra subalpejskie i górno-reglowe. Okazało się, że w Murckach, a także w przyległych nadleśnictwach, jak Kobiór i in., *Calamagrostis villosa* jest najpospolitszym gatunkiem runa leśnego (por. tab. 14). Zjawisko opanowania dna lasu przez roślinność kwasolubną (należy tu jeszcze wymienić m.in. trzcinnik (*Calamagrostis epigeios*), śmiełek (*Deschampsia flexuosa*) i borówkę

Ryc. 1. Kompleks leśny Nadleśnictwa Murcki na Wyżynie Śląskiej

Zasięgi zbiorowisk leśnych w Nadleśnictwie Murcki
Ranges of sylvan communities in the chief forestry of Murcki

1. Zbiorowisko łęgowe: *Fraxinetum-Alnetum*
Sylvan community in areas flooded temporarily: *Fraxinetum-Alnetum*
2. Zbiorowisko grądowe: *Querceto-Carpinetum*
Broadleaved sylvan community: *Querceto-Carpinetum*
3. Zbiorowisko buczyny: *Fagetum*
4. Beech community: *Fagetum* Zbiorowisko buczyny kwaśnej: *Luzulo-Fagetum*
Acid beech community: *Luzulo-Fagetum*

Zbiorowisko boru mieszanego: *Pineto-Quercetum* w facjach:
Sylvan coniferous-broadleaved mixed community: *Pineto-Quercetum*, facies:

5. *Pteridium aquilinum*
6. *Vaccinium vitis-idaea*
7. typowej — typical
8. *Calamagrostis* sp.
9. *Molinia arundinacea arundinacea*
10. *Vaccinium myrtillus*
11. Zbiorowiska przejściowe oraz zdeformowane
Transition- and deformed sylvan communities
12. Granice leśnictw
Ranges of forestries

(*Vaccinium myrtillus*), nie zmienia się nawet w drzewostanach z dużym udziałem lub przewagą grabu (*Carpinus betulus*), z którym w innych zbadanych obszarach jest związana roślinność mezo- lub nawet eutroficzna (Lohmeyer 1951, Jahn 1952, Medwecka-Kornaś 1952, 1959, Seibert 1954, Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1956 b).

Wtórne rozprzestrzenienie roślinności acidofilnej wywołało zmiany w składzie florystycznym, nawet w ocalałych resztkach naturalnych drzewostanów, a mianowicie: buczyn, grondów, dąbrów i sośnin. Natomiast łatwiejsze do wyodrębnienia na podstawie metod fitosocjologicznych okazały się siedliska lasów łęgowych (*Fraxineto-Alnetum*), które (por. tab. 14) znalazły się na ogół poza zasięgiem zaborczych gatunków acidofilnych.

Najmniej stosunkowo zmienione okazały się partie wyżynne w leśnictwach Szklarnia i Kostuchna. Są to w części środkowej i wschodniej buczyny, zaś w części zachodniej — sośniny z brusznicą. Można to tłumaczyć mniejszym nasileniem szkód pośrednich, przede wszystkim niewielkimi wahaniami poziomu wód gruntowych w obszarze wyżynnym oraz wrodzoną odpornością buczyn na bezpośrednie szkodliwe wpływy przemysłu (Paprzycki 1960). W pozostałych częściach opisywanej wyżyny zostały zniszczone głównie przez wykopy i wyřęby drzewostany w Leśnictwie Murcki oraz w części środkowej Leśnictwa Kostuchna w otoczeniu kopalni „Boże Dary“, a także w części zachodniej Leśnictwa Szklarnia obszary przyległe do kopalń „Wesoła“ I i II.

W przeciwieństwie do części wyżynnej Nadleśnictwa, lasy w jego nizinnej części zostały bardzo zmienione i zdewastowane. Największe odkształcenia zaobserwowano w leśnictwie Łędziny i Wygorzele oraz w południowej części Leśnictwa Kostuchna. Te nisko położone lasy, zalewane okresowo w czasie wylewów wiosennych i jesiennych przez wody zanieczyszczone ściekami papierni w Czułowie oraz pokrywane osadami miału węglowego nanoszonymi przez wody z płuczek kopalniowych, nie mówiąc już o zanieczyszczaniu powietrza, zostały silnie zdegradowane i ograniczone w swoich możliwościach życiowych. Powyższe okoliczności spowodowały fakt szerokiego rozprzestrzenienia się w nizinnej części Nadleśnictwa Murcki zbiorowisk leśnych o charakterze przejściowym lub zupełnie zniekształconych (tab. 11 i mapa na ryc. 1).

CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWISK LEŚNYCH

Na mapie (ryc. 1) zostały skartowane zasięgi zbiorowisk leśnych w Murckach. Największy obszar zajął bór mieszany = kwaśna dąbrowa (*Pineto-Quercetum*), wykształcona w sześciu odrębnych facjach. Na drugim miejscu co do zajmowanego obszaru znalazły się obszary tak znie-

kształcone i zmienione przez człowieka (tab. 11), że ich dawną, naturalną roślinność można jedynie z pewnym tylko prawdopodobieństwem odtworzyć na podstawie ocalałych resztek dawnych zbiorowisk. Na trzecim miejscu co do udziału powierzchniowego należy postawić zbiorowiska buczyn (*Fagetum* i *Luzulo-Fagetum*) = las mieszany w odmianach $\pm$ typowej oraz zubożałej, następnie zbiorowisko łęgowe (*Fraxineto-Alnetum*) i wreszcie najmniej wyraźnie zachowany grond (*Querceto-Carpinetum*).

A. Zbiorowisko łęgowe (*Fraxineto-Alnetum*)

Łęgi są jednym z najsłabiej poznanych zbiorowisk leśnych w Polsce, pomimo że ostatnie prace fitosocjologiczne pogłębiły znacznie znajomość czynników siedliskowych uzależniających występowanie i zmienność omawianego zbiorowiska (Matuszkiewicz, Borowik 1957, Medwecka-Kornaś 1959, Wojterski 1960 i in.). Ogólnie stwierdzone zostały znaczne różnice florystyczne i systematyczne pomiędzy łęgami Polski północnej i południowej (Medwecka-Kornaś 1952). Łęgi, będące na ogół miejscami przepływu wód powierzchniowych, sąsiadują zwykle ze zbiorowiskami olesów, tj. siedlisk leśnych zajmowanych przynajmniej okresowo przez stagnujące wody powierzchniowe. Nawet w warunkach naturalnych lub mało zmienionych, wyodrębnienie siedlisk łęgów i olesów natrafia zwykle na duże trudności (Matuszkiewicz, Traczyk H., Traczyk T. 1958, Traczyk 1960).

W Murckach wobec tak daleko posuniętego odwodnienia lasów przez dawne zabiegi melioracyjne, oraz wobec wtórnych zalewów przez wody powierzchniowe spowodowanych pogórnym osiadaniem gruntu, wyróżnienie i odgraniczenie w terenie dawnych zespołów olesów i łęgów było niemożliwe. Skartowano przeto łącznie całość obszarów pozostających pod działaniem wód powierzchniowych, co znalazło m. in. uzasadnienie w fakcie, iż dawne olesy — miejsca bezodpływowe — są obecnie trwale odwadniane przez rowy melioracyjne. Omawiane zbiorowisko lasów łęgowych w Murckach dało się jednakże, jak to już wspomniano, najlepiej wyodrębnić pośród zmienionych i zniekształconych zbiorowisk leśnych tutejszego kompleksu leśnego (tab. 12).

Łęgi dosyć dobrze wyróżnia duży udział olch (*Alnus glutinosa*) w drzewostanie, przy czym niejednokrotnie pochodzi ona ze sztucznych upraw leśnych, założonych jednakże zgodnie z warunkami siedlisk. Często towarzyszy jej jesion (*Fraxinus excelsior*) i to nawet w znacznej domieszce. Sporadycznie, zwykle na pograniczu grondów, pojawia się grab (*Carpinus betulus*). Nierzadko dało się stwierdzić występowanie w domieszce, a nawet i czystym drzewostanie sztucznie wprowadzonego świerka (*Picea excelsa*), dla którego siedliska łęgów okazały się zupełnie

fol. S. Myczkowski

Ryc. 2. Las łęgowy olchowo-jesionowy (*Fraxineto-Alnetum*)

nieodpowiednie. Świerki uległy tu licznym zniekształceniom, zahamowaniu wzrostu, omrożeniom etc.

Gleby łęgów przedstawiają typ zdegradowanych czarnych ziem z fragmentami tego typu nie zdegradowanego *.

Istotnym odkształceniem warunków glebowych łęgów, oprócz ich stałego zanieczyszczania ściekami przemysłowymi, było przeprowadzenie licznych dróg oraz torów kolejowych przecinających lasy. Nasypy ziemne

* Informacje co do typów gleb leśnych w Murckach podał ustnie mgr Jan Greszta z Krakowa.

fot. S. Myczkowski

Ryc. 3. Starzec kędzierzawy (*Senecio rivularis*) wyróżniający lasy łęgowe

wymienionych urządzeń komunikacyjnych wywołały zasadnicze zmiany w kierunkach i spływie wód powierzchniowych. Jak wiadomo, właśnie okresowe zalewy oraz przepływy wód decydowały w warunkach naturalnych o żyzności oraz zdolnościach produkcyjnych łęgów.

Największy udział omawianych siedlisk dał się zaobserwować w obszarach płaskich lub słabo nachylonych, i to tak w części nizinnej, jak i na płaskowyżu. Jedynie we fragmentach występują natomiast łęgi w strefach przejściowych na krawędziach płaskowyżu. Bujne runo tworzy niejednokrotnie dwie warstwy z górującymi zazwyczaj pokrzywami (*Urtica dioica* i *U. urens*). W partiach bardziej zdegradowanych często masowo pojawiają się ostrożeńce (*Cirsium oleraceum* i *C. rivulare*). Najtrwalszym gatunkiem łęgowym okazał się śmiełek (*Deschampsia caespitosa*), który nawet w sztucznych uprawach olchowych rozwijał się pomysłnie, np. w oddziale 186. W okresach wiosennych lasy łęgowe wyróżniały się przez masowe pojawy biało kwitnącej gęsiówki (*Arabis Halleri*), zajmującej w szczególności, i to masowo, zręby, luki, płazowiny oraz okrajki drzewostanów. W lepiej zachowanych zbiorowiskach łęgowych napotkano łany turzycy (*Carex remota*). Oprócz gatunków wyróżniających, zestawionych w tabelach 12, 13, 14, łęgi wyodrębniły się ponadto przez pojawy następujących gatunków roślin, które wystąpiły wyłącznie w granicach omawianych siedlisk, i to z dosyć dużym stopniem stałości (por. tab 1): *Urtica urens*, *Senecio rivularis*, *Myosotis palustris*, *Glyceria*

fluitans, *Peucedanum palustre*, *Poa palustris*, *Glyceria aquatica*, *Scirpus silvaticus*, *Cyperus fuscus*, *Scutellaria galericulata*, *Rumex hydrolapathum*, *Cardamine amara*, *Crepis paludosa*, *Stellaria nemorum*, *Galium aparine* oraz *Galeopsis pubescens*.

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 1*

Nr 34. W niewielkim, słaboodpływowym zagłębieniu terenu, na wilgotnej glebie zachowała się olszynka odwadniania przez rów melioracyjny. W otoczeniu sztuczna świerczyna w II klasie wieku. Drzewostan: olcha 100%, 7—25 cm, 8—16 m, około 50 lat.

Nr 36. U zbiegu szosy Katowice—Tychy i linią kolejową do Wesolej, na obrzeżu łąk w zasięgu okresowego przepływu wód. Drzewostan (z sadzenia): olcha 60%, 15—45 cm, około 24 m, 90 lat; jesion 40% 10—30 cm, około 22 m, 90 lat. Runo mozaikowe z synuzjami: *Urtica dioica*, *Carex brizoides*, *Stachys silvatica*, *Stellaria nemorum*, *Deschampsia caespitosa*, zaś jednostkowo na całym placie *Festuca gigantea*. Często omrożenia świerków.

Nr 37. Opodał poprzedniego płatu, po przeciwległej stronie łąk. Runo dwuwarstwowe z górującymi pokrywami do 120 cm wysokości. W dolnej warstwie panuje *Chaerophyllum hirsutum*. Drzewostan (z sadzenia): olcha 100%, 15—45 cm, 32 m, 100 lat.

Nr 38. Partia nieco wzniesionego łągu na płaskim i wyrównanym obszarze z synuzjami *Urtica dioica*, *Carex brizoides*, *Festuca gigantea*, *Brachypodium silvaticum* oraz we wiosennym aspekcie *Arabis Halleri*. Drzewostan (z sadzenia): olcha 70%, 15—45 cm, 28 m, około 80 lat; jesion 25% 20—30 cm, 25 m; grab 5% 7—25 cm, do 15 m, około 80 lat.

Nr 39. Teren podmokły, słaboodpływowy, ze starymi rowami melioracyjnymi. W drzewostanie dużo bocznego światła. W runie panuje *Cirsium oleraceum*, a lokalnie *Carex remota*. Drzewostan (z sadzenia): olcha 60%, 20—40 cm, około 28 m, 90 lat; jesion 40%, 15—45 cm, około 30 m, 90 lat.

Nr 44. Obszar zagłębiony i odwadniany przez płytki rów. Gleba podmokła i zadarniona. Drzewostan tworzy olcha 100%, 7—20 cm, 15 m, 40 lat.

Nr 46. Resztką naturalnego lasu łąkowego na osuszonym okrajkach łąk i zrębu wyraźnie wyodrębniona florystycznie. Drzewostan: olcha 70%, 10—20 cm, 20 m, 80 lat; jesion 20%, 25—45 cm, 22 m, około 100 lat.

Nr 70. Miejsce wgłębione, sztucznie osuszane. W runie masowo występują trzciniki (*Calamagrostis villosa*) na przemian z gatunkami gronowymi np. *Galeobdolon luteum*. Zmurszałe przeważnie olchy i jesiony nie odnawiają się zupełnie; gleba jest zdegradowana. W runie obficie występują ponadto *Carex brisoides*, *Lysimachia vulgaris*, *Stachys silvatica*, *Chrysosplenium alternifolium*. Drzewostan (z sadzenia): olcha 70%, 20—35 cm, 18—20 m, około 75 lat; jesion 30%, 10—20 cm, 15—18 m, 60 lat.

Nr 85. Teren wgłębiony przylegający do nasypu kolejowego i szosy od dawna osuszany. Drzewostan przerzedzony: olcha 100%, 10—25 cm, 8—18 m, około 100 lat.

Nr 88. Resztką naturalnego drzewostanu olchowego w zagłębieniu terenu. Drzewa rosną na typowych kępach otoczonych wodą. Wśród olch — 100%, 12—50 cm, 10—22 m, 10 lat, sporadycznie posadzono świerki.

* Wszystkie tabele do art. St. Myczkowskiego są umieszczone na końcu numeru.

Nr 89. Teren kępiasty z wodą powierzchniową. W drzewostanie olcha 70%, 7—20 cm, 5—15 m, 50 lat; brzozy 10%, 25 cm, 25 m, 100 lat; grab 10%, 20 cm, 15 m; dęby 10, 7—15 cm, 8—15 m, świerk sporadycznie.

B. Zbiorowisko grondowe * (*Querceto-Carpinetum*)

Grondy, czyli typy siedliskowe lasów liściastych, zajmowały w naturalnych warunkach bez wątpienia większy obszar powierzchni leśnej w Murckach aniżeli na to wskazują zachowane ich ślady. Obecnie płyty grondów zajmują przede wszystkim krawędzie płaskowyżu, wilgotniejsze i żyzniejsze partie na wierzchowinie oraz jedynie fragmenty w nizinnej części Nadleśnictwa, np. w oddziale 189 leśnictwa Mąkołowiec. Stosunkowo dobrze zachowały się drzewostany grondowe z udziałem dorodnego grabu, lipy (*Tilia cordata*), wiązu (*Ulmus laevis*), klonu (*Acer platanoides*) oraz wyjątkowo pięknego modrzewia (*Larix decidua*), a także rodzimego świerka (*Picea excelsa*) w oddziałach 87, 88, 105 oraz 106, na krawędzi wyżyny opadał siedziby Nadleśnictwa. Te i inne jeszcze obszary grondów zostały jednak w dużym stopniu zdewastowane ostatnio przez kopalnictwo odkrywkowe. Gleby grondów w Murckach zaliczono do typu bielicowo-glejowych wytworzonych na piaskach, glinach i ilach karbońskich. Odróżnienie tutejszych siedlisk grondów od siedlisk buczyn natrafia na duże trudności, podobnie jak to ma miejsce także i w innych obszarach Polski niżowej (M e d w e c k a - K o r n a ś 1959, W o j t e r s k i 1960 i in.). Lokalnie najlepiej wyodrębnia badane siedliska *Querceto-Carpinetum* duży udział grabu w drzewostanie oraz jego obfite odnawianie się w nalotach, czego w zasięgu siedlisk *Fagetum* nie obserwowano. Ponadto w grondach graby wykształcały dorodniejsze i gonniesze pnie, podczas gdy w tutejszych buczynach żywotność tak grabu, jak i innych wybredniejszych gatunków drzew, jak np. jesionu, klonów, wiązów, była o wiele słabsza. Powyższe zróżnicowania drzewostanowo-siedliskowe w obrębie płaskowyżu wystąpiły jednakże niezbyt wyraźnie ze względu na ogromną ekspansywność buka, który na obu omawianych kategoriach siedlisk grondów i buczyn jednakowo dobrze się rozwijał (por. tabele 2 oraz 3).

Duże obszary siedlisk grondowych w Murckach zostały zajęte przed około 80 laty pod uprawę świerka, i to z nasion obcego pochodzenia. Świerczyny te obecnie przedstawiają się w bardzo złym stanie. Pozostały z nich zachwaszczone płazowiny, zręby lub niedoręby kiepskich, zastojowych drzewostanów. Ze względu na wyniszczenie roślinności naturalnej przez okresowe uprawy rolne (przed zalesieniem), ponadto przez

* S. J o d ł o w s k i i W. T a s z y c k i podają „W Zasadach Pisowni Polskiej“ (1956) termin „Grąd“. W artykule niniejszym użyto terminu „Grond“ na specjalne życzenie autora. (Red.).

nagłe odsłanianie gleby, szkody przemysłowe itp. trudno obecnie dostrzec się tu jakichkolwiek śladów dobrych gatunków gronowych. Najwytrwalsze okazały się grab oraz turzyca (*Carex brizoides*) por. tab. 11).

Niejednokrotnie obserwowano klęski powałów we wspomnianych, sztucznie wprowadzonych na siedliska gronów świerczynach oraz scśninach. Natomiast naturalne lub mieszane drzewostany na opisywanych siedliskach w pobliżu miejsc powału nawet — pozostawały nieknięte.

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 2

Nr 62. Resztką naturalnego starodrzewu, na którym „zatrzymał się” wiatrołom z roku 1958. Drzewostan zachodnią ścianą przylega do szosy pszczyńskiej. Teren wyżynny, w podłożu zalegają płytko łupki i piaskowce karbońskie. Drzewostan: buk 60%, 20—50 cm, 25 m, 100 lat; grab 10%; wiązy 5%; sosna 15%; dęby 10%;

Nr 24. Na wyżynie po zachodniej stronie kopalni odkrywkowej. W drzewostanie liczne gonnie i dorodne graby. Facje runa tworzą *Carex brizoides* oraz *Calamagrostis villosa*, zaś pojedynczo na całości *Festuca gigantea*. Drzewostan: buk 80%, 10—60 cm, 35 m, 100 lat; grab 15%; dęby 5%.

Nr 59. Południowa krawędź płaskowyżu nad pasem łąk. Uderza doskonała jakość sosen oraz sukcesja nalotów lipy (*Tilia cordata*) i innych drzew liściastych, jak dębów, buka i grabu. Drzewostan: sosna 80%, 35 cm, 28 m, 120 lat; dęby 10%; buk 10%; grab sporadycznie.

Nr 60. W obrębie wyżyny na płytkich utworach karbońskich obok wykopów odkrywkowych. Lipa tworzy tu odrębne, zwarte młodniki z samosiewu. W płacie rośnie pomnikowy ponad 200-letni buk. Drzewostan: buk 40%, 20—40 cm, 28 m, 100 lat; grab 10%; sosna 50%; dęby sporadycznie.

Nr 61. Opodał powyższego płatu w naturalnym drzewostanie z udziałem buka 50%, 20—60 (100) cm, 30 m, 100 lat; dębów 20%; grabu 5%; sosny 20%; modrzewia 5%. Tu i ówdzie występują kępy podrostów świerka obsiane z dorodnych drzew matecznych spoza płatu.

Nr 71. Jeden z najpiękniejszych starodrzewi w Murckach. W runie facje tworzą *Carex brizoides*, *Rubus idaeus* i *Chamaenerion angustifolium*. Dorodne i gonnie modrzewie, dęby i graby tworzą drzewostan, w którym w domieszce występuje rodzimy świerk. Dęby 50%, 20—45 cm, 18—22 m, 120 lat; sosna 10%; świerk 10%; modrzew i grab 30%.

Nr 104. Obszar wyżyny wyrównany i zmeliorowany obok drogi Murcki — Łędziny. W drzewostanie występują dęby 80%, 15—30 cm, 13—20 m, 100 lat; grab 10%; buk 10%.

Nr 109. Zdjęcie obejmuje krawędź wyżynną nad potokiem z odsłoniętymi wkładkami ciężkich ilów karbońskich. W drzewostanie gonnie graby 50%, 7—30 cm, 10—15 m, 100 lat; dęby 30%; buk 20%. Facje runa tworzą *Carex brizoides* oraz *Calamagrostis villosa*.

Nr 2. Wyżyna obok siedziby Nadleśnictwa, grond występuje mozaikowo w buczynie w facji z *Carex brizoides*. W drzewostanie dęby 80%, 20—60 cm, 22—26 m, 100 lat; buk 15%; grab 5%.

Nr 1. Przerzedzony drzewostan bukowy obok poprzedniego płatu. Dorodne buki o spękanej jak u dębów korze 80%, 20—65 cm, 24—28 m, ponad 100 lat; dęby 10%; grab 10%.

C. Zbiorowisko buczyny (*Fagetum*)

Zbliżona siedliskowo do opisanego powyżej grondu buczyna zajmuje w Murckach jednakże uboższe nieco gleby typu biellic, wykazujących pierwsze stadia procesów biellicowania, suchszych i uboższych na ogół od biellicowo-glejowych utworów glebowych spotykanych w zasięgu tu-tejszych grondów. Buczyny występują w wyżynnych partiach Nadleśnictwa, przy tym na stokach najsilniej nachylonych. Pomimo bliskości osiedli, dróg, ścieżek etc. w drzewostanach bukowych napotkano tylko nieliczne stanowiska gatunków roślin synantropijnych, co należy przypisać wpływowi drzewostanów bukowych, które przy nieprzerwanym zwarciu silnie wyodrębniają pod względem ekologicznym zajęte przez siebie obszary (Matuszkiewicz A. 1958 i in.).

W północnej części badanego obszaru buczyny zostały niemal doszczętnie wyniszczone przez przemysł. Ocalały jedynie pojedyncze okazy buków lub ich ugrupowania. Wzdłuż południowej krawędzi płaskowyżu przebiegała naturalna, miejscowa granica wyżynnych siedlisk buczyny. Dalej ku południowi w nizinnej części Nadleśnictwa ograniczają się one jedynie do lokalnych wzniesień terenu. Do obecnej chwili ocalały na nich buki w oddziałach 178, 181, 200, 217, gdzie stwierdzono ponadto występowanie w runie trawy *Elymus europaeus*, wawrzynka (*Daphne*

fot. S. Myczkowski

mezereum) oraz trzcinnika (*Calamagrostis arundinacea*) będących lokalnymi wskaźnikami siedlisk buczyny w Murckach.

W środkowej części płaskowyżu zachowały się dosyć rozległe i stosunkowo mniej zdegradowane obszary naturalnych buczyn. Położone poza zasięgiem zalewów powierzchniowych i z natury raczej suche gleby omawianej kategorii siedliskowej nie ucierpiały przez zaburzenia stosunków wodnych tak jak inne wilgotniejsze obszary. Uderzający jest jedynie fakt słabego odnawiania się buka w okresie ostatnich lat. Może to być następstwem zanieczyszczania powietrza przez odpady przemysłowe (Paprzycki 1960).

Zbyt mały obszar badań nie pozwolił na ustalenie dokładniejszej nazwy opisywanego zbiorowiska buczyny w Murckach, które jak cała Wyżyna Śląska znajdują się w strefie przejściowej pomiędzy granicami zasięgów geograficznych obu naszych zespołów buka (Szafer 1959). Z natury buczyna w Murckach wykazuje podobieństwo do buczyny niżowej (*Fagetum boreoatlanticum*) (Matuszkiewicz A. 1958, Medwecka-Kornaś 1959, Wojterski 1960 i in.). Podobnie jak w powyższym zespole w zbiorowisku buczyny w Murckach występują obficie trawy w runie leśnym, zaś w drzewostanie dęby. Jednym z najlepszych wskaźników lokalnych, szczególnie w bardziej zdegradowanych płatach buczyny, okazał się trzcinnik (*Calamagrostis arundinacea*). Wszędzie w towarzystwie buka wystąpił on tutaj z uderającą stałością i tylko na siedliskach buczyny (*Fagetum*) odznaczył się wybitną żywotnością.

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 3

Nr 21. Teren amfiteatralnie wgłębiony w stoku wyżyny, odwadniany. W drzewostanie dęby 75%, 10—30 cm, od 30 m, około 70 lat; buk 20%, 10—30 cm, do 24 m; jesion 5%.

Nr 3. Płazowina otoczona drzewostanem bukowym, teren wyżynny, pojedynczo dęby około 60 lat.

Nr 8. Spłaszczenie stoku wyżyny sztucznie odwodnione. Drzewostan złej jakości silnie przerzedzony: buk 80%, 10—40 cm, 8—20 m, 80 lat; sosna 20%.

Nr 10. Typowy skład florystyczny runa tutejszych buczyn zbliżonych do stanu naturalnego. Mozaikowe runo jest bujniejsze w miejscach przerwanego zwarcia koron drzew. Buk 100%, 20—100 cm, do 32 m, około 250 lat; sporadycznie dęby.

Nr 22. Teren wyżynny. W wyżej położonych partiach płatu wzrasta udział dębów i brzozy; w drzewostanie buk 40%, 7—50 cm, 22 m, około 120 lat; dęby 50%; brzozy 10%; w podglebiu zalegają płytko utwory karbońskie. Na dnie lasu występuje mozaika płatów ścioly bukowej i darni traw.

Nr 105. Wyżyna opodal siedziby Nadleśnictwa w obrębie dużego, łącznego kompleksu drzewostanów bukowych. Buk 60%, 5—15 cm, 6—15 m, 40 lat; dęby 40%.

Nr 63. Resztki naturalnego starodrzewia w rezerwacie leśnym „Murcki“, przy szosie obok kopalni. W płacie pojedyncze około 250-letnie drzewa są otoczone młodnikami i drągowinami dębowo-bukowymi z wiązami i lipami. Buk 100%. 20—110 cm,

do 38 m; w domieszce brzość (*Ulmus scabra*), dęby, klony graby ponad 70 cm. grubości.

Nr 55. Lokalnie, wypowse wzniesienie terenu porośnięte przez drzewostan bukowy odcinający się wyraźnie na tle rozległych litych sośnin. Buk 30%, 20—70 cm, do 35 m, 120 lat; sosna 60%; świerk 10%.

Nr 90. Płat zbliżony warunkami ekologicznymi do zdjęcia nr 105. W drzewostanie buk 80%, 15—100 cm, 18—25 m, 120 lat; dęby 20%.

D. Zbiorowisko buczyny kwaśnej (*Luzulo-Fagetum*)

Luzulo-Fagetum zajmuje w Murckach najbardziej zubożałe i zdegradowane obszary pozostające w zasięgu buka. W porównaniu z roślinnością opisaną powyżej buczyny (*Fagetum*) buczyna kwaśna wykazuje wyraźne zubożenie florystyczne przy równoczesnym obfitym nadal udziale buka w drzewostanach. Runo tworzą wyłącznie gatunki acidofilne i występujące pospolicie w lasach. Tak one, jak i sam buk wykazują na omawianych siedliskach normalną żywotność. *Luzulo-Fagetum* wyodrębnia lokalnie całkowity brak domieszki grabu, wiązów, klonów, a więc tych gatunków drzew, które dla swego rozwoju wymagają bardziej zasobnych siedlisk. W porównaniu z grondami oraz buczyną w Murckach *Luzulo-Fagetum* zajmuje bardziej połogie, często wierzchowinowe obszary płaskowyżu.

Naturalne siedliska *Fagetum* i *Luzulo-Fagetum* zostały w przeszłości w myśl zasad szablonoj gospodarki leśnej zajęte przez sztuczne uprawy sosny, która na ogół, poza obszarami bezpośrednio sąsiadującymi z obiektami przemysłowymi, rozwinęła się dosyć dobrze. Czyste sośniny na siedliskach buczyn powinny być jednakże stopniowo przebudowywane przez wprowadzanie gatunków drzew liściastych np. dębów i buka, co podniesie zdrowotność i odporność wspomnianych litych drzewostanów sosnowych. Siedliska kwaśnej buczyny są powiązane na terenie Murcek z glebami typu bielcowego. Są to bielice typowe z daleko posuniętym procesem wylugowania wierzchnich warstw gleby oraz z wyraźną, grubą warstwą butwiny na powierzchni. W *Luzulo-Fagetum* występuje w badanym obszarze z dużą stałością trzcinnik (*Calamagrostis arundinacea*). Trawę tę należy przeto przyjąć jako lokalny wskaźnik obu tutejszych buczyn (tab. 13).

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 4

Nr 92. Teren wyżynny, wyrównany, gleba piaszczysta, sucha i przepuszczalna. W drzewostanie buk 90%, 15—80 cm, 20—25 m, ponad 100 lat; sosna 10%; sporadycznie świerk.

Nr 4. Płat reprezentuje fragment wierzchowiny. Uderzające jest zubożenie florystyczne runa. W drzewostanie buk 90%, 15—70 cm, 20—30 m, 120 lat; dęby 10%.

Nr 5. Opodal powyższego, lecz w luźniejszym drzewostanie. Buk 40%, 20—45 cm, do 25 m, około 100 lat; dęby 60%.

Nr 6. Płat typowy dla tutejszych buczyn kwaśnych w partii nieco spłaszczonego stołu. W drzewostanie buk 95%, 15—110 cm, 20—35 m, ponad 100 lat; sporadycznie dęby.

Nr 7. Obszar przejściowy od wyżyny do części nizinnej. Pojedyncze buki o złej jakości tworzą płazowinę. Buk 95%, 15—40 cm, do 25 m, 100 lat; sosna 5%.

Nr 9. Duża luka otoczona drzewostanem bukowym takim jak w zdjęciu nr 6.

Nr 14. Wierzchowina obok siedziby Nadleśnictwa. W runie facja z *Majanthemum bifolium*. Drzewostan buk 70%, 10—30 cm, 20 m, około 70 lat; dęby 30%.

Nr 19. Sośnina zajmująca teren wyżynny. W podrostandach uderza ekspansywność i doskonała jakość młodych buków. W drzewostanie sosna 90%, 15—25 cm, 22 m, 75 lat; dęby 10%; sporadycznie świerk.

Nr 91. Sucha partia wierzchowiny. W drzewostanie buk 90%, 15—90 cm, 22—26 m, ponad 100 lat; sosna 5%; świerk 5%.

E. Zbiorowisko boru mieszanego (*Pineto-Quercetum*)

Siedliska *Pineto-Quercetum* zajmują większą część obszaru Nadleśnictwa Murcki. Obecne tak szerokie rozprzestrzenienie tego acidofilnego zbiorowiska nastąpiło w wyniku daleko posuniętej degradacji siedlisk leśnych. W wielu przypadkach sośniny lite, sośniny z dębem oraz dąbrowy z sosną zajęły przy pomocy człowieka lub na drodze wtórnej sukcesji zubożałe siedliska grądów i buczyn. W następstwie powyższych przemian wszystkie tutejsze zbiorowiska leśne, z wyjątkiem łęgów, nawiązują w pewnym stopniu do roślinności *Pineto-Quercetum*, czyli zubożalego boru mieszanego, którego przeciętny obraz florystyczny przedstawiono na tabeli 7.

Pineto-Quercetum w Murckach odznacza się dosyć daleko posuniętą zmiennością jako zbiorowisko o stosunkowo dużej skali warunków ekologicznych. Fakt ten jest znany także i z innych obszarów (Meisel-Jahn 1955, Matuszkiewicz, W., Matuszkiewicz A. 1956 a, b, Medwecka-Kornaś 1959, Schubert 1960 i in.). Jednakże pomimo znacznej rozpiętości siedlisk oraz wspomnianych powyżej powiązań florystycznych z innymi zbiorowiskami tabele fitosocjologiczne *Pineto-Quercetum* obrazują obfite występowanie gatunków z klasy *Vaccinio-Piceetea* przy zupełnym niemal braku gatunków mezofilnych, które w łęgach, grądach i buczynach były często i z dużą stałością reprezentowane (por. tabela 11 i 12). W sośninach z dębem wystąpił jeszcze w znacznej ilości świerk, ponadto brzozy i osika. Również i buk, w szczególności w facji typowej, zdołał utrzymać się w sporej domieszce. Opisywane zbiorowisko podzielono na szereg facji, które zostaną kolejno opisane według żyzności zajmowanych przez nie siedlisk.

1. Facja z orlicą (*Pteridium aquilinum*).

W płatach opisywanej facji uderzającą przewagę wśród roślinności runa uzyskały paprocie, przede wszystkim bujna i na ogół wspaniale rozwinięta orlica w aspektach letnim i jesiennym. Natomiast na wiosnę

fot. S. Myczkowski

Ryc. 5. Paproć orlica (*Pteridium aquilinum*) w zbiorowisku *Pineto-Quercetum*

występuje tu spontanicznie siódmaczek (*Trientalis europaea*). Facja z orlicą nawiązuje silnie do typu siedliskowego grondu, cechują ją przeto mniej zdegradowane utwory glebowe, przeważnie bielice glejowe na piaskach gliniastych lekkich i mocnych.

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 5

Nr 29. Przejście od wierzchowiny do obszaru nizinnego, bujne łąny orlicy z licznymi śladami buchtowania dzików. Drzewostan sztucznie wprowadzony, uszkodzony poważnie przez powały od wiatru. Sosna 100%, 7—20 cm, 12—18 m, do 60 lat.

Nr 35. Nizina porośnięta 30-letnią drągowiną sosnową. W runie mozaika facji orlicy i trzcinników.

Nr 48. Skłon wyżyny z runem mozaikowym jw.; w drzewostanie sosna 100%, 15 cm, 23 m, 90 lat.

Nr 74. Teren na przejściu od niziny do wyżyny; w drzewostanie sosna 100%, 10—25 cm, 12—16 m, około 70 lat; sporadycznie świerk.

Nr 83. Teren jw. Silnie prześwietlony, samosiewny drzewostan sosna 80%, 20—45 cm, 20—25 m, 100 lat; świerk 20%.

Nr 96. Nizina okresowo podmokła, sztucznie wprowadzony drzewostan sosna 100%, 15—25 cm, 18—22 m, 80 lat.

Nr 98. Przejście do partii wyżynnej opodal powyższego płatu. Drzewostan posadzony rzędami, sosna 95%, 15—30 cm, 11—22 m, 80 lat; świerk 5%.

Nr 100. Teren nizinny z bujnie rozwiniętą orlicą. Drzewostan jw.

Nr 102. Przejście od niziny do wyżyny. W drzewostanie świerk 60%, 7—25 cm, 8—20 m, 80 lat; sosna 40%.

Nr 103. Teren jw. W drzewostanie sosna 100%, 15—25 cm, 20 m, 90 lat; sporadycznie świerk.

Facja z brusznicą (*Vaccinium vitis-idaea*)

Są to niejednokrotnie naturalne, ubogie florystycznie sośniny, obejmujące suchsze, piaszczyste partie wyżyny oraz niewielkie skrawki lokalnych wyniosłości w nizinnej części Nadleśnictwa. W drzewostanach spada tu uderzająco udział świerka. Dęby, grab i buk są reprezentowane jedynie w podrostach, spontanicznie natomiast rozwija się sosna. Granice facji z brusznicą były stosunkowo wyraźnie zarysowane w terenie, przeto łatwe do kartowania. Być może, uzależniała ten fakt odrębność gleb typu biellic, jednakże silnie zbielicowanych, wykształconych na piaskach luźnych lub słabo gliniastych. Opisywana facja nawiązuje dosyć wyraźnie do typu siedliskowego „boru“ (*Pineto-Vaccinietum myrtilli*) (por. Wołak 1959).

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 6

Nr 30. Lokalne wzniesienie terenu otoczone łąnami trzęślicy (*Molinia arundinacea*), odrębne florystycznie pomimo podobieństwa drzewostanów. Sosna 100%, 20—30 cm, około 20 m, około 70 lat.

Nr 47. Stok lokalnej wyniosłości terenu, wyraźnie odgraniczony od łąnu trzęślicy występującej w dole. W drzewostanie sosna 100%, 10—20 cm, około 23 m, 80 lat.

Nr 50. Podnóże wyżyny sięgającej stąd do Podlesia i Kostuchny. Przeciętny typ dla facji z brusznicą. W drzewostanie lita sośnina.

Nr 56. Piaszczysty wzgórek o wydłużonym kształcie porasta uderzająco piękny i dorodny drzewostan sosnowy, na którym „zatrzymał się“ wiatrołom w 1958 r. po doszczętnym wyniszczeniu przyległej sośniny w facji z trzcinnikami. Sosna 100%, 20—30 cm, około 22 m. 90 lat; sporadycznie świerk.

Nr 64. Podłużne piaszczyste wzniesienie terenu z przebiegającą tędy starą drogą śródleśną wśród nizinnej i dawniej zabagnionego obszaru. Drzewostan sosnowy 20—30 cm, do 25 m, około 80 lat.

Nr 80. Tak samo jak przy płacie nr 50. Sadzona rzędami sosna.

Nr 81. Opodal powyższego w wierzchwinowej partii wyżyny.

Nr 82. Strefa przejściowa od płaskowyżu do niziny, gleba piaszczysta, świeża. Piękne podrosty sosny, dębu i nieco słabsze grabu. Drzewostan czysto sosnowy 20—45 cm, 15—20 m, 100 lat.

Nr 87. Opodal płatu nr 64 na tym samym wzniesieniu tworzącym mały, lokalny dział wód pomiędzy dwoma obniżeniami łąk śródleśnych. Drzewostan z dużą ilością bocznego światła; sosna 90%, 25—45 cm, 20—24 m, 120 lat; świerk 10%; sporadycznie dęby.

Nr 94. Teren wyżynny, gleba sucha, piaszczysta. Lity młodnik sosnowy.

3. Facja typowa *Pineto-Quercetum*

Zaliczone tu płaty reprezentują obecny, przeciętny typ florystyczny zbiorowiska kwaśnej dąbrowy w Murckach odznaczający się mniej więcej równomiernym udziałem poszczególnych gatunków. Dopiero porównanie większej ilości zdjęć fitosocjologicznych umożliwiło wyodrębnienie opisywanej facji (por. tab. 7). W terenie zajmuje ona nieduży stosunkowo obszar partii wierzchwinowych z płytkimi glebami o typie średnich biellic.

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 7

Nr 11. Wierzchowina z sadzoną w rzędy dębina oraz pojedynczym bukiem; Resztki dogorywających lub obumarłych świerków. Drzewostan: dęby 80%, 10—25 cm, do 20 m, około 80 lat; buk 20%.

Nr 12. Dębina sadzona na wierzchowinie z licznymi podrostami jarzębu (*Sorbus aucuparia*). W drzewostanie dęby 100%, 10—20 cm, 18 m, około 60 lat; sporadycznie buk i sosna.

Nr 13. Opodal poprzedniego płatu w tym samym drzewostanie.

Nr 15. Obok obu poprzednich płatów w młodniku brzozy samosiewnego pochodzenia, który zajął dawny zrąb z przestojami sosny i modrzewia.

Nr 17. Fragment brzeziny na tej samej co i powyżej wierzchowinie. Drzewostan: brzozy 95%, 15 cm, 22 m, 60 lat; świerk 5%; pojedyncze dęby.

Nr 18. Sośnina złej jakości opodal poprzednich płatów, około 60 lat.

Nr 20. Dębina złej jakości opodal płatów nr 12 i nr 13; w drzewostanie dęby 100%, 7—20 cm, 8—18 m, 70 lat; sporadycznie brzozy i buk.

Nr 23. Przerzedzona sośnina przylegająca do kopalni „Murcki”. Sosna 90%, 15—45 cm, 25 m, około 110 lat; dęby i brzozy 10%.

Nr 25. Na południowym skłonie wyżyny suche i ubogie siedlisko porastają dęby 90%, 7—34 cm, 16 m, około 70 lat; świerk obumiera 10%.

Nr 27. Teren wyżynny porastają sztuczne świerczyny otaczające płat sosny 100%, 7—20 cm, do 16 m, około 70 lat.

Nr 42. Przy granicy łąk i lasu w terenie nizinnym na lokalnym wzniesieniu występuje drągowina z $\pm$ równomiernym udziałem poszczególnych gatunków drzew oraz pojedynczymi przestojami dębów.

Nr 54. Młodnik dębowy sadzony rzędami na wyrównanym terenie.

Nr 67. Odosobniony płat dąbrowy otoczonej sośninami i świerczynami. Synuzje runa tworzą *Vaccinium myrtillus*, *Pteridium aquilinum*, *Calamagrostis villosa* i *Deschampsia flexuosa*. Pojedynczo na calości występuje *Trientalis europaea*. W drzewostanie dęby 95%, 7—18 cm, 8—12 m, do 40 lat; brzozy i sosna 5%.

Nr 68. Lokalna wyniosłość terenu porośnięta sosną w wieku około 60 lat. W domieszcze występują samosiewne brzozy i buki, w podrostach świerki.

Nr 69. Resztki dawnego starodrzewia świerkowego wśród sztucznie posadzonej sośniny. Drzewostan złej jakości.

Nr 33. Wyżynny ostrówek w obniżeniu łąk śródlęśnych. Około 50-letnia sośnina z brzożami i świerkiem uszkodzona przez wiatrołomy.

4. Facja z trzcinnikami (*Calamagrostis* sp.)

Płaty tej facji wyodrębniła zdecydowana przewaga traw w runie leśnym, przede wszystkim trzcinników z przytłaczającym udziałem *Calamagrostis villosa*, który zajmuje rozległe obszary lasów w Murckach. W zasięgu omawianej facji tylko w nielicznych przypadkach mógł inny gatunek runa konkurować pomyślnie z wymienionym gatunkiem trzcinnika. Zwykle zwarta darń łądyg *Calamagrostis villosa* pokrywała miejscami lekko wgłębione; towarzyszył mu w nielicznych egzemplarzach *Calamagrostis epigeios*, a także mszaki i rzadko trzęślica lub wierzbówka. Orlica, borówki i inne gatunki roślinności runa, wykazane w tabeli 8, znajdowały możliwość rozwoju w łąkach trzcinnika jedynie na lokalnych wzniesieniach przy pniach drzew. Niejednokrotnie dało się stwierdzić

fot. S. Myczkowski

Ryc. 6. Trzcinnik owłosiony (*Calamagrostis villosa*) w sośninie

osłabienie żywotności u *Calamagrostis villosa* wyrażające się brakiem kwitnienia i owocowania całych jego łanów. Silne zwarcie darni w łanach tej trawy nasuwa w opisywanym przypadku przypuszczenie występowania w nich zjawiska niekorzystnej konkurencji wewnątrzgatunkowej. Kwestia ta powinna zostać jeszcze dokładniej zbadana. Facja z trzcinnikami zajmuje w Murckach obszary nizinne lub niżej położone partie płaskowyżów. Wykształciła się na glebach typu bielie glejowych, na ogół wilgotnych lub nawet podmokłych. Często napotymano tu dawniejsze albo zupełnie świeże miejsca rozległych, katastrofalnych powalów od wiatru, i to tak w obrębie sośnin, jak i świerczyn. Wydaje się, że facja trzcinnikowa z Murcek rozwinęła się w nieco zbliżonych warunkach ekologicznych do siedlisk zespołu *Pinetum-Calamagrostidetum villosae* opisanego z Kotliny Nowotarskiej (S t a s z k i e w i c z 1958). Pomiedzy obu omawianymi jednostkami fitosocjologicznymi wystąpiły jednakże zdecydowane różnicowania florystyczne, jak np. zupełny brak gatunków torfowych *Carex fusca*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum Girgensohnii*, które zespołowi z Borów Nowotarskich nadały swoistą fizjonomię. Facja trzcinnikowa z Murcek, przeciwnie, wydaje się wyodrębniać jedynie przez wtórne rozprzestrzenienie się trzcinnika w korzystnych dla niego warunkach, wytworzonych sztucznie przez człowieka, a nawiązujących do siedlisk *Pinetum-Calamagrostidetum villosae*.

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 8

Nr 31. Rozległe łąny trzcinników przenikają mozaikowo: orlica, brusznica i trzęślica. Sosna 100%, do 40 cm, 25 m, 90 lat.

Nr 32. Płat w zasięgu wód zanieczyszczonych ściekami papierni. Drzewostan sosnowy około 10-letni silnie uszkodzony przez pował.

Nr 41. Łany trzcinnika z lokalnymi płatami trzęślicy. Drzewostan sosnowo-świerkowy około 70 lat.

Nr 57. Sośnina jw. z domieszką świerka i masowymi podrostami osiki.

Nr 75. Zwarta darń trzcinnika wyparła lub przygłuszyła inne gatunki runa. Jedynie orlica zajęła suchsze wzniesienia w płacie. W drzewostanie sosna 90%, 15—40 cm, do 22 m, do 100 lat; świerk 10%.

Nr 78. Drzewostan złej jakości, sadzony w rzędach na skraju lasu i pola, lita sośnina około 90 lat, teren wyżynny, dużo *Calamagrostis epigeios*.

Nr 84. Teren nizinny, lekko wgłębiony, porośły sosną poniżej 30 lat z domieszką świerka, na zwartej darni trzcinników.

Nr 95. Teren płaski, nizinny. W drzewostanie sosna około 100 lat z domieszką świerka.

Nr 99. Teren na przejściu do niziny zadarniony przez trzcinniki. Wyraźne ślady dawnych, masowych wykrotów drzew. 80-letnia sośnina z domieszką świerka.

Nr 110. Teren lekko wgłębiony ze zwartym łańcem trzcinników porasta sośnina złej jakości, około 70 lat.

5. Facja z trzęślicą (*Molinia arundinacea*)

Facja z trzęślicą, podobnie jak i opisana powyżej facja z trzcinnikami w lasach Murcek, nie były łatwe do wyodrębnienia i skartowania w terenie. Pracę utrudniał ubikwistyczny charakter obu panujących gatunków trzęślicy i trzcinnika owłosionego, które przenikały w obręb innych zbiorowisk. Z powyższych względów na mapie (ryc. 1), przy kartowaniu granic zasięgowych obu omawianych facji, włączono w ich obszar tylko najbardziej typowe płaty.

Zdjęcia fitosocjologiczne zaliczone do facji z *Molinia arundinacea* zajmują w Murckach najniższej położone obszary zbiorowiska *Pineto-Quercetum*. Sama trzęślica rozwinęła się w nich spontanicznie, głuszając inne gatunki runa, podobnie jak poprzednio trzcinnik. W najniższych i niemal bezodpływowych miejscach w oddziałach nr 25, 59, 60, 172 oraz 173 występują w obrębie łąnów trzęślicowych mniejsze lub większe synuzje resztek dawnych torfów z torfowcami, *Ledum palustre*, *Vaccinium uliginosum* i in., nawiązujące do zespołu *Pineto-Vaccinietum uliginosii*, czyli boru bagiennego. Jest rzeczą interesującą, że właśnie w wymienionych oddziałach stwierdzono istnienie najstarszych i bardzo głębokich rowów odwadniających. Wspomniane podtorfiałe zbiorowiska leśne są jednakże bardzo zdegradowane i zmienne florystycznie, zajmują niewielkie partie terenu, przeto nie ujęto ich w ramach osobnego zbiorowiska, ale włączono do najbliższej dla nich pod względem ekologicznym facji z trzęślicą.

fot. S. Myczkowski

Ryc. 7. Drzewostan powalony przez huragan

Uderzający jest fakt, że wzniesienia terenu zamykające lokalnie odpływy wód powierzchniowych z obszarów facji z *Molinia arundinacea* są w Murckach często zajęte przez fację z *Vaccinium vitis-idaea*; obie wymienione facje silnie kontrastują ze sobą pod względem florystycznym, brusznicowa na suchszych siedliskach, zaś trzęślicowa — na wilgotnych. Facja z *Molinia arundinacea* występuje w Murckach na glebach typu gleju właściwego z fragmentami torfu. Podobnie jak w facji trzcinnikowej wystąpiły w łąkach z trzęślicą zjawiska powalów sośnin i świerczyn od wiatru, i to na dużą skalę. W aspekcie wiosennym, przed rozwojem bujnej trzęślicy, płaty opisywanej facji porastają białe łąny siódmaczka, który masowo tu zakwita podobnie jak na całym obszarze *Pineto-Quercetum* w Murckach.

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 9

Nr 28. Płaski teren obsadzony sosną. Runo zmienione przez uprawę. W drzewostanie: brzozy 40%, 7—22 cm, 5—18 m, do 25 lat; sosna 40%; dęby z samosiewu 20%.

Nr 40. Jeden z najbardziej typowych płatów z trzęślicą. W drzewostanie sosna około 70 lat, zaś w podrośtach świerk.

Nr 45. Teren płaski powgłębiany z mozaikowym runem. Około 70-letni drzewostan utworzyła sosna z domieszką świerka.

Nr 51. Spory obszar lasu w otoczeniu zapadliska z wodą. Przeważają ponad 50-letnie sośniny z domieszką świerka.

Nr 52. Rozległe świerczyny wprowadzone sztucznie, około 80-letnie, katastrofalnie uszkodzone przez wiatrołomy, opieńkę i korniki.

Nr 53. Nizinny i płaski teren osuszany przez rowy. Kiepska, krzywulcowa sośnina z dużą domieszką świerka w wieku około 70 lat.

Nr 65. Typowy dla znacznych obszarów ponad 100-letni drzewostan sosnowy przerzedzony i podszyty świerkiem.

Nr 79. Teren płaski, zagłębiony na skraju lasu obok toru kolejowego. Dragowina sosnowa około 20-letnia z osiką i brzoźami.

Nr 86. Teren wgłębiony i osuszany przez głębokie rowy. Runo z resztkami roślinności torfowej. Drzewostan: sosna 100%, 10—35 cm, 10—16 m, 100 lat; sporadycznie świerk.

Nr 97. Miejsce pożaru leśnego ze sterczącymi jeszcze resztkami pni spalonych sosen. Teren pofałdowany przez wykroty. Sośnina $\pm$ 60 lat.

6. Facja z borówką (*Vaccinium myrtillus*)

Opisywana jednostka została najslabiej wyodrębniona pod względem florystycznym pośród wszystkich innych opisanych z Murcek. Znaleziono w terenie tylko 4 płaty nadające się do wykonania zdjęcia fitosocjologicznego. Pomimo silnego powiązania z *Pineto-Quercetum* wykazały one pewną odrębność florystyczną. Doskonale i bujnie rozwinięte łany *Vaccinium myrtillus* występują na glebach bielicowych z cienką warstwą butwiny na powierzchni, podobnych do gleb zespołu *Pineto-Vaccinietum myrtilli*, czyli typu siedliskowego boru świeżego (Wolak 1959). Brak gatunków wyróżniających *Pineto-Vaccinietum myrtilli* w opisywanej facji nie pozwolił na wyłączenie jej z obrębu zbiorowiska *Pineto-Quercetum*. Jeżeli bór świeży występował z natury w Murckach, to bez wątpienia zajmował on znikomo małe obszary w porównaniu do innych zbiorowisk.

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 10

Nr 43. Pas lasu wcięty w obszar łąk w kierunku południowym. Drzewostan ocalał od powalów, które wystąpiły w przyległych partiach sośnin. Teren wzniesiony, niemal płaski. W drzewostanie sosna 90%, 15—35 cm, do 30 m, 80 lat; świerk 5%; dęby 5%.

Nr 49. Płat ten wyodrębnia się wśród rozległych, czystososnowych drzewostanów z facjami trzcinnikową i paprociową z orlicą. W drzewostanie sosna 100%, 10—20 cm, do 23 m, około 90 lat.

Nr 93. Obszar nizinny, płaski. W drzewostanie sosna 90%, 20—45 cm, 20—25 m, 100 lat; świerk 10%.

Nr 101. Obok poprzedniego płatu w nieco młodszym drzewostanie z sosną 100%, 20—25 cm, 18—22 m, 80 lat; sporadycznie świerk.

F. Zbiorowiska przejściowe oraz zniekształcone

Roślinność tych obszarów, reprezentujących przy obecnym złym stanie lasów, dosyć dużą część Nadleśnictwa Murcki (por. mapa ryc. 1), nie została zaliczona do żadnego bliżej określonego typu florystycznego.

fot. S. Myczkowski

Ryc. 8. Zniekształcenie świerków (*Picea excelsa*) przez przymrozki i owady

Jedną wskazówką w tym względzie są, uwidocznione na wspomnianej mapie, resztki naturalnej roślinności nawiązujące w partiach wyżynnych przeważnie do buczyn, zaś w nizinnej części Nadleśnictwa — do gron-dów. Znaczny udział gatunków acidofilnych z klasy *Vaccinio-Piceetea*, jaki obserwujemy w zdjęciach tabeli 11, jest bez wątpienia jednym z objawów degradacji siedlisk, m.in. po wprowadzeniu sztucznych upraw sosny i świerka na opisywane obszary. Jednakże stałe i obfite przy tym pojawy takich gatunków, jak wierzbówki (*Chamaenerion angustifolium*), turzycy (*Carex digitata*), trędownika (*Scrophularia nodosa*) oraz innych,

np. *Mycelis muralis*, *Carex brizoides*, *Juncus effusus*, a również grabu w podrostach i drzewostanach świadczą o żyzności oraz dostatecznym nawilgoceniu gleb. Z natury bogate, siedliska te były pierwotnie domeną lasów liściastych, na których miejsce sztucznie wprowadzono przede wszystkim świerk, i to na znacznych obszarach. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanów, okresowe uprawy rolne na glebach leśnych oraz wtórne, późniejsze kłęski okiści, powalów, opieńki i korników doprowadziły opisywaną część lasów w Murckach do obecnego zastraszającego stanu. Obszary zniekształcone stały się widownią spontanicznej sukcesji lekkonasiennych brzoź i topoli. To ze wszech miar pożądane zjawisko, należy wykorzystać w przyszłej gospodarce leśnej, ponieważ przyroda przychodzi przy tym sama na pomoc leśnikowi. Świerczyny i sośniny sztucznego pochodzenia powinny być natomiast stopniowo przebudowywane przez wprowadzanie gatunków liściastych na wzór miejscowych, naturalnych drzewostanów mieszanych.

Opisy zdjęć fitosocjologicznych tabeli 11

Nr 16. Zastojowa świerczyna, sztucznego pochodzenia, silnie przerzedzona i zachwaszczona. Teren zalesiono po uprzedniej uprawie rolnej. Warstwa butwiny do 10 cm grubości pokrywa doskonałą gliniasto-piaszczystą glebę. W runie panują gatunki anemochoryczne, nitrofilne oraz synantropijne. W drzewostanie świerk 90%, 15 cm, 20 m, 70 lat; sporadycznie sosna, brzozy i dęby.

Nr 26. Świerczyna na siedlisku buczyny na wierzchowinie. W lukach łąny wierzbowki. Drzewostan przetknięty bukiem, dębem i grabem; świerk 60%, 7—17 cm, do 13 m, 70 lat; brzozy 40%; pjd. sosna.

Nr 58. Teren nizinny, lecz nie podmokły. Zdegradowana świerczyna około 5-letnia z domieszką sosny nieco starszej. Obok papierni w Czułowie nisko położone obszary przy stawach, pozostające pod wpływem okresowych zalewów. Drzewostan sosnowy ze świerkiem i brzozą z domieszką dębu i osiki w wieku 50—70 lat.

Nr 73. Zniszczona sośnina w niskim i płaskim terenie ze śladami licznych, dawnych wykrotów. Stuletnie sosny z pjd. dębem i świerkiem.

Nr 76. Płazowina świerkowa z sosną przerzedzona przez dawniejsze powale od skraju pasa łąk. Wiek 70—100 lat.

Nr 77. Sośnina złej jakości, gałęzista i kręta na zdegradowanym siedlisku gron-dowym. Wiek ponad 30 lat.

Nr 106. Teren wyżynny, zdegradowane siedlisko buczyny. Obecnie świerczyna około 50 lat z dużym udziałem brzozy i pjd. sosny.

Nr 107. Skłon płaskowyżu porośnięty brzozą z dużym udziałem świerka, dębu i sosny. Wiek około 40 lat.

Nr 108. Teren nizinny, porośnięty przez brzozy z domieszką świerków oraz sporadycznymi dębami i sosnami w wieku do 40 lat.

Nr 66. W oderwanym kompleksie leśnym Jaroszowice obok wsi Lędzin. Teren był przejściowo pod uprawą rolną, przez co zdegradowano wierzchnie warstwy gleby oraz zmieniono całkowicie naturalną roślinność *Querceto-Carpinetum*. Obecnie sztucznie wprowadzony, lukowaty drzewostan tworzą sosna 100%, 15—25 cm, 23 m, 80 lat; pjd. świerk.

STRESZCZENIE WYNIKÓW PRACY

Dane fitosocjologiczne co do stałości występowania gatunków roślin w obrębie jedenastu wyróżnionych w Murckach jednostek roślinnych zestawiono razem i porównano w tabelach 12, 13 oraz 14.

Pierwsza z nich ilustruje powiązania florystyczne współczesnych zbiorowisk leśnych z ich wyjściowymi, naturalnymi zespołami. Zestawiono tu bowiem jedynie te gatunki, które w nauce fitosocjologii zostały uznane za stosunkowo lepiej „wyspecjalizowane“ i będące wskaźnikami swoich siedlisk w Europie środkowej (Braun-Blanquet 1951, Pawłowski 1959 i in.). Należy jednakże raz jeszcze silnie podkreślić, że w Murckach nie napotkano niemal zupełnie dobrych gatunków wskaźnikowych dla zespołów i związków i że na tym fakcie została oparta teza o zubożeniu florystycznym tutejszej szaty leśnej. Zestaw gatunków tabeli 12 obejmuje przeto z konieczności gatunki o szerszych skalach wyżycia. Odznaczają się one niewielką tylko odrębnością ekologiczną w porównaniu do gatunków roślin występujących pospolicie. W omawianej tabeli znajduje się sporo gatunków roślin z klas *Alnetea glutinosae* oraz *Querceto-Fagetea* i objętych nimi węższych jednostek fitosocjologicznych. Gatunki te wyróżniły „lasy“ od „borów“. Jedynie facja typowa *Pineto-Quercetum* wykazała, w obrębie „borów“ dosyć jednakże wyraźne powiązania z typami siedliskowymi „lasów“. Wiele z powyższych gatunków „lasowych“ wystąpiło w Murckach na nikłych i reszkowych stanowiskach, zaś niektóre sporadycznie sięgnęły także i na siedliska „borów“ (tab. 12).

Znacznie mniejsza była liczba znalezionych gatunków acidofilnych z klasy *Vaccinio-Piceetea*. Wystąpiły one jednakże obficie i powszechniej od gatunków z klas *Querceto-Fagetea* i *Alnetea*. Powyższe fakty wskazały na dwie ważne tezy, które należy brać pod uwagę przy realizacji postulatów gospodarki leśnej w Murckach, a mianowicie:

1. W przeszłości obszary zajęte przez zespoły „lasów“ (*Alnetum*, *Querceto-Carpinetum* i *Fagetum*) były znacznie rozleglejsze aniżeli to obecnie ma miejsce oraz

2. Teraźniejsze rozprzestrzenienie „borów“ (*Pineto-Quercetum*) jest zjawiskiem wtórnym, a zdegradowanie i zakwaszenie siedlisk, które je wywołało, objęło również w znacznym stopniu obszary obecnie jeszcze zaliczone do „lasów“ (*Fagetalia*).

Poza zbiorowiskiem łęgowym nie napotkano niemal gatunków roślin charakteryzujących lokalnie w Murckach jedno tylko zbiorowisko leśne. Znacznie więcej natomiast wystąpiło gatunków roślin charakteryzujących grupy zbiorowisk, a mianowicie wspomniany już podział na a) łęgi oraz lasy liściaste i b) bory mieszane. Podział ten zilustrowano w tabeli 13. Przedstawiono w niej wszystkie gatunki lokalnie wy-

różniącej, bez względu na ich przynależność do jednostek fitosocjologicznych i w porządku zależnym od stopnia stałości ich pojawów w badanym obszarze. I tu daje się stwierdzić przewagę gatunków „lasowych” nad „borowymi”. Te ostatnie wyróżniają się przy tym, podobnie jak wyżej, stałym i bardziej obfitym występowaniem w szczególności w granicach *Pineto-Quercetum*.

W tabeli 14 porównano stałość występowania gatunków rosnących pospolicie na obszarze całego Nadleśnictwa. Dało się przy tym wyodrębnić dwie ich grupy: 1. gatunki występujące wszędzie obficie z wyjątkiem łągów, co podkreśliło raz jeszcze konieczność osobnego potraktowania tego zbiorowiska oraz 2. występujące wszędzie, także i w łągach, z dużą na ogół stałością. W omawianej tabeli znajduje się sporo gatunków drzew i krzewów, co podkreśla znany zresztą fakt osiągania przez nie szerszej amplitudy ekologicznej w porównaniu z gatunkami roślin zielnych.

Z przedłożonych materiałów wynika, że stan zdrowotności lasów w Murckach jest poważnie zagrożony. Wydaje się przeto sprawą pilną i ważną zachowanie resztek lasów zbliżonych do naturalnych, które powinny stać się wzorem dla tutejszej gospodarki leśnej, przede wszystkim zaś dla przebudowy tak zniekształconego drzewostanu. Na pierwszym miejscu należy przy tym chronić rezerwat „Murcki” oraz jego otoczenie (Jarosz 1956, Dudziak, Gut, Krzywoń 1956) w oddziałach nr 85, 86, 88, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 i 105. Ponadto las na Mąkółcu w oddziale nr 189, las bukowy w oddziale nr 178 oraz sośniny w oddziałach nr 200 i 136. Drzewostany powyższe należy wyłączyć z normalnego etatu cięć. W oddziałach tych, a być może, i w innych jeszcze, powinny być założone stałe powierzchnie badawcze i stąd można będzie czerpać wskazówki tak potrzebne w trudnych warunkach gospodarki leśnej w Murckach.

Z Zakładu Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie

(Wpłynęło: dn. 9.9.1961 r.)

SUMMARY

In the course of this investigation the following three main forest communities floristically related with the natural forest associations of the Silesian Upland have been distinguished and described: sylvan communities in temporarily flooded areas (*Fraxineto-Alnetum*), broadleaved and mixed forests (*Querceto-Carpinetum/Fagetum*), and coniferous-broadleaved mixed forests (*Pineto-Quercetum*). The analysis of the floristic composition of these forest communities and the distribution maps that were plotted have shown that in the Murcki Forest, in spite of the degradation caused by the local industry and mining operations, the habitats of the broadleaved forests and the coniferous-broadleaved mixed forests occupy approximately equal areas. On the other hand, the share of the coniferous forests

was strikingly small. The results have thus confirmed once again the well known fact (Szafer 1959) that the share of broadleaved forests and beech forests in the natural forest cover of this part of the Silesian Upland is high.

One of the most important conclusions to be drawn from the assembled informations is that the low-lying stands are far more degraded than the higher parts of the Murcki Forest where there are still many stretches differing little from the natural forest communities. The low-lying areas have been more strongly affected by differences in the ground-water level, by surface flooding lethal for many plant species, and by poisonous substances deposited by flooding industrial waste waters. All these changes caused directly or indirectly by the industry have the most harmful effect on the proper management of the Murcki Forest and are very difficult to reverse. Besides the changes in the hydrological conditions there are other causes of devastation the most important being the mining subsidences of the ground. Damages are also caused by other human activities such as strip-mines, excavations, incorrect methods of felling etc., but these at least leave untouched the neighbouring tracts of forest. The lethal effect of air pollution by industrial dusts and gases (Paprzycki 1960) is a separate problem.

An important finding for phytosociological investigations in forestry is the "specialization" of some common under natural conditions forest species, which in the Murcki Forest distinguish only some habitats. In this investigation they have been defined as locally distinguishing species (Table 13) in contrast to the generally accepted distinguishing species (Table 12). However, in spite of the significant differences between Tables 12 and 13, it has been found that the first positions on the lists of the locally distinguishing species are occupied by some of the species accepted in phytosociology as distinguishing the higher phytosociological units. E.g. in the Murcki Forest *Calamagrostis arundinacea* distinguishes beech forests, *Trientalis europea* distinguishes coniferous-broadleaved mixed forest, *Deschampsia caespitosa* distinguishes even the degraded sylvan communities in temporarily flooded areas, and *Carex brizoides* distinguishes the group of broadleaved forest habitats. The results here reported once again confirm the usefulness of phytosociological investigations for the recording of changes taking place in the plant cover even when these investigations are concerned with forest biocoenoses drastically disturbed by human activities.

LITERATURA

- Braun-Blanquet J., 1951, Pflanzensoziologie, 2 Wyd. Wiedeń.
 Dudziak J., Gut S., Krzywoń R., 1956, Osobliwości przyrody między Olzą a Górrą Wartą, Wyd. Śląskie, Katowice.
 Gams H., 1957, Kleine Kryptogamenflora, T. 4, Wyd. Gustav Fischer, Jena.
 Hartmann F., 1952, Forstökologie, Wyd. Georg. Fromme, Wiedeń.
 Hartmann F., 1958, Grundsatzliches zur „Forstlichen Standortskartierung“, Allgemeine Forstzeitung 69 (9/10).
 Hartmann F., 1960, Forstliche Standortskartierung auf naturgesetzlicher Grundlage, Allgemeine Forstzeitung, 71 (17/18).
 Jahn S., 1952, Die Wald- und Forstgesellschaften des Hils-Berglandes (Forstamt-bezirk Wenzeln), Angewandte Pflanzensoziologie 5.
 Jarosz S., 1956, Krajobrazy Polski, Inst. Urban. i Architekt., Warszawa.
 Lencewicz S., 1955, Geografia fizyczna Polski, Wyd. 3, Warszawa.
 Lohmeyer W., 1951, Die Pflanzengesellschaften der Eilenriede bei Hannover, Angewandte Pflanzensoziologie 3.

- Matuszkiewicz A., 1958, Materiały do fitosocjologicznej systematyki buczyn i pokrewnych zespołów (związek *Fagion*) w Polsce, Acta Soc. Bot. Pol. Vol. 27 (4).
- Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A., 1956a, Pflanzensoziologische Untersuchungen im Forstrevier „Ruda“ bei Puławy (Polen), Acta Soc. Bot. Pol. 25 (2).
- Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1956b, Materiały do fitosocjologicznej systematyki ciepłolubnych dąbrów w Polsce, Acta Soc. Bot. Pol. 26 (4).
- Matuszkiewicz W., Borowik M., 1957, Materiały do fitosocjologicznej systematyki lasów łęgowych w Polsce, Acta Soc. Bot. Pol. 26 (4).
- Matuszkiewicz W., Traczyk H., Traczyk T., 1958, Materiały do fitosocjologicznej systematyki zespołów olsowych w Polsce, Acta Soc. Bot. Pol. 27 (1).
- Medwecka-Kornaś A. 1952, Zespoły leśne Jury Krakowskiej, Ochr. Przyr. 20.
- Medwecka-Kornaś A. 1959, Zespoły leśne i zaroślowe, Wyd. „Szata Roślinna Polski“. T. 1, Warszawa.
- Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., 1959, Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski, Wyd. „Szata Roślinna Polski“ 1.
- Meisel-Jahn S., 1955, Die Kiefernforstgesellschaften des nordwestdeutschen Flachlandes. Angewandte Pflanzensoziologie 11.
- Minckwitz H., 1958, Vorkommen und Zusammensetzung der Holzarten im Wuchsbezirk „Mittlerer Thüringer Wald“ in früherer Zeit. Länderkunde, Wyd. Otto Harrasowitz, Lipsk.
- Paprzycki E., 1960, Wpływ zanieczyszczeń powietrza la lasy Górnoląskiego Okręgu Przemysłowego, Sylwan 12.
- Pawłowski B., 1959, Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania, Wyd. „Szata Roślinna Polski“ T. I.
- Schubert R., 1960, Die zwergstrauchreichen, azidiphilen Pflanzengesellschaften Mitteldeutschlands. Pflanzensoziologie, Wyd. Gustav Fischer, Jena.
- Seibert P., 1954, Die Wald- und Forstgesellschaften im Graf Gortzischen Forstbezirk Schlitz, Angewandte Pflanzensoziologie T. 9.
- Staszkiewicz J., 1958, Zespoły sosnowe Borów Nowotarskich, Fragm. Flor. et Geobot. 3. Cz. 2.
- Szafer W., 1959, Szata roślinna Polski Niżowej, Wyd. „Szata Roślinna Polski“ T. 1, PWN, Warszawa.
- Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1953, Rośliny Polskie, PWN, Warszawa.
- Traczyk T., Badania nad strefą przejścia zbiorowisk leśnych, Ekologia Polska Ser. A, 8 (5).
- Wojterski T., 1960, Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 22 (3).
- Wolak J., 1959, Fitosocjologiczne różnicowanie borów sosnowych na obszarze krainy wyżów środkowopolskich, Prace IBL 191.
- Wuttky K., 1954, Die Gefährdung der Fichtenwirtschaft des Harzes durch Sturm, Archiv für Forstwesen, 3 (3/4).

Tabela 1 - Table 1

Zbiorowisko łąkowe: Fraxinetum-Alnetum
Sylvan community in areas flooded temporarily: Fraxinetum-Alnetum

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	34	36	37	38	39	44	46	70	85	88	89	
Leśnictwo Forestry	Wygo- rzele	S z k l a r n i a				Wygo- rzele	Kos - tuchna nia	Szklar- nia	Wygorzele		Szklar- nia	
Nr oddziału No. of division	181	128	128	128	129	242	159	126	156	153	100	
Data wykonania zdjęcia Date of record	13.9 1958	15.9 1958	15.9 1958	15.9 1958	15.9 1958	16.9 1958	16.9 1958	22.5 1959	18.8 1959	18.8 1959	18.8 1959	
Wysokość m n.p.m. Altitude above sea level	255	255	255	255	260	255	250	255	250	260	270	
Ekspozycja Exposition	-	-	-	-	-	-	W	SE	-	E	S-SE	
Nachylenie terenu w stopniach Inclination of area - grades	-	-	-	-	-	-	5	1	-	3	2	
Ukształtowanie terenu Configuration of the territory	w y r ó w n a n y				w g ł ę b i o n y				d e p r e s s e d			
Pokrycie koron drzew % Cover of trees	a	40	75	60	75	80	75	75	50	75	80	100
Pokrycie warstwy krzewów % Cover of shrubs	b	1	1	1	1	5	40	10	1	15	1	1
Pokrycie runa Cover of ground flora	c	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pokrycie mszaków % Cover of mosses		10	-	10	-	-	5	-	1	-	-	-
Powierzchnia zdjęcia w arach Area of record in 100 square m.		4	3	50	4	25	2	3	20	1	3	5
Alno-Padion												
Carex remota		1.2	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	+ 2
Agropyron caninum		+ 3	+ 2	+ 2	+ 3	+ 3	.	.	.	+ 2	.	.
Chrysosplenium alternifolium		+ 2	+ 3	+ 3	+ 2	.	.	+ 4	.	.	.	.
Stachys silvatica		.	+ 3	.	+ 2	.	1.2	+ 2	2.3	.	.	.
Equisetum silvaticum		.	.	.	.	1.1	.	.	.	+ 2	.	.
Rumex hydrolapathum		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mnium undulatum		.	.	1.3	.	.	1.2	.	+ 2	.	.	.
Alnion i Alnetalia glutinosae												
Carex elongata		.	.	.	.	+ 2	1.2	.	.	.	.	.
Solanum dulcamara b		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Solanum dulcamara c		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lycopus europaeus		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fagetalia												
Galeobdolon luteum		+ 2	+ 2	.	1.2	+ 2	.	+ 2	+ 3	.	.	.
Festuca gigantea		+ 2	1.2	+ 2	+ 3	1.2	.	+ 2	.	2.2	2.1	2.2
Fraxinus excelsior a		.	2.1	.	2.1	2.1	.	2.1	1.1	.	.	.
Fraxinus excelsior b		.	r	.	.	1.2	.	2.2	+ 2	.	.	.
Fraxinus excelsior c		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus lanuginosus		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Brachypodium silvaticum		.	+ 2	.	1.3	1.2	.	3.3	+ 2	.	.	.
Milium effusum		.	.	+ 2	.	.	.	.	.	+ 2	.	.
Querceto-Fagetea												
Aegopodium podagraria		.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.
Scrophularia nodosa		.	+ 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vaccinio-Piceetea												
Picea excelsa a		.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.
Picea excelsa b		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dryopteris austriaca		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gatunki towarzyszące Accompanying species												
Alnus glutinosa a		4.1	4.1	4.1	4.1	5.2	3.1	4.1	4.1	4.3	4.2	V
Alnus glutinosa b		1.1	r	.	.	1.3	1.2	+ 2	+ 2	2.2	+ 2	V
Alnus glutinosa c		.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Urtica urens		4.3	.	5.5	1.1	.	.	.	.	.	+ 3	III
Urtica dioica		2.2	3.4	.	2.4	+ 2	.	.	3.4	3.4	+ 2	V
Carex brizoides		+ 3	2.3	.	1.3	+ 3	+ 3	+ 4	3.4	1.3	2.4	V
Cirsium rivulare		.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	IV
Cirsium oleraceum		.	.	.	.	4.2	.	.	.	1.1	.	IV
Rubus idaeus b		.	.	.	.	.	.	+ 3	.	1.2	.	I
Rubus idaeus c		.	.	.	.	.	.	.	.	.	+ 2	II
Glyceria aquatica		+ 3	.	.	.	.	.	.	.	+ 2	+ 2	II
Lysimachia vulgaris		.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	+ 2	IV
Galeopsis tetrahit		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Peucedanum palustre		.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	II
Senecio rivularis		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV
Deschampsia caespitosa		.	2.4	1.2	+ 2	+ 2	2.2	+ 2	+ 2	1.2	3.4	V
Glechoma hederacea		.	1.2	+ 2	+ 2	+ 2	.	.	.	.	.	II
Oxalis acetosella		.	+ 2	.	+ 2	.	+ 3	+ 2	+ 2	.	+ 3	IV
Arabis Halleri		.	+ 3	.	+ 2	.	.	+ 2	+ 3	.	+ 2	III
Athyrium filix-femina		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Ajuga reptans		.	.	.	.	.	.	.	+ 2	.	.	II
Crepis paludosa		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Galeopsis pubescens		.	.	.	.	.	.	.	+ 2	.	.	I
Stellaria nemorum		.	+ 3	.	+ 2	+ 2	.	.	.	.	.	II
Frangula alnus b		.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	II
Frangula alnus c		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Galium aparine		.	.	5.2	.	.	.	.	.	+ 2	.	I
Glyceria fluitans		.	.	+ 2	+ 2	+ 2	3.2	.	1.2	+ 2	+ 2	IV
Chaerophyllum hirsutum		.	.	4.3	.	+ 3	.	.	1.2	.	.	II
Ranunculus repens		.	.	1.1	+ 2	.	+ 2	.	.	.	+ 3	IV
Galium verum		.	.	+ 2	.	.	.	+ 2	.	.	.	I
Myosotis palustris		.	.	+ 2	+ 2	.	.	.	.	.	+ 2	III
Rumex crispus		.	.	+ 2	+ 2	.	+ 2	.	.	.	.	III
Ranunculus acer		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Cardamine amara		.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	II
Equisetum arvense		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Angelica silvestris		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Chaerophyllum aromaticum		.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	II
Dryopteris spinulosa		.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	III
Mycelis muralis		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Sambucus nigra b		.	.	.	.	.	.	.	+ 2	+ 2	.	I
Calamagrostis villosa		.	+ 3	.	.	.	.	.	+ 2	.	.	I
Calamagrostis epigeios		.	+ 3	.	.	.	.	.	+ 4	.	.	I
Scirpus silvaticus		.	.	.	.	.	.	.	+ 2	.	.	I
Agrostis vulgaris		.	.	.	.	.	.	.	.	+ 2	.	I
Cyperus fuscus		.	.	.	.	.	.	.	.	+ 4	1.4	I
Poa palustris		.	.	.	.	.	.	.	1.3	+ 2	1.2	II
Scutellaria galericulata		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Galium palustre		.	+ 2	+ 2	+ 2	.	.	.	.	+ 2	.	II
Lychnis flos-cuculi		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species		2	5	8	5	7	4	10	10	8	6	10 = 75

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Betula pubescens a 44,46. B.verrucosa a 89, c 34,89. Solidago serotina 36. Calamagrostis arundinacea 36.
Galium verum 36. Lamium maculatum 36. Poa annua 36,89. Evonymus europaea b 39,46, c 37. Eupatorium
cannabinum 37,39. Veronica chamaedrys 37,70. Anthriscus nitida 37. Holcus mollis 37,39. Carpinus betulus
a 38,39,89, b 38. Mentha longifolia 38. Geum urbanum 38. Arctium Lappa 38. Impatiens noli-tangere 38.
Juncus acutiflorus 39. Heracleum sphondylium 39,85. Chamaenerion palustre 39. Rubus cfr caesius b 44,
c 44,89. Viola palustris 44. Polygonum amphibium 44. Pinus silvestris a 46. Rubus cfr plicatus b 46.
Sambucus racemosa b 46, c 89. Mercurialis perennis 46. Senecio Fuchsii 46. Geranium Robertianum 46.
Quercus robur a 46,89, b 89, c 88. Agrostis alba 70. Paris quadrifolia 70. Majanthemum bifolium 70.
Holcus lanatus 70. Rumex acetosa 70. Galium boreale 70. Vicia cracca 70. Festuca pratensis 70,88. Anthoran-
thum odoratum 70. Acer pseudoplatanus b 85. Vicia silvestris 85. Dactylis glomerata 85. Galium mollugo 85.
Glyceria plicata 85. Calamagrostis canescens 85. Galeopsis speciosa 88. Carex hirta 88. Melandrium rubrum
88. Pagus silvatica c 88. Sorbus aucuparia b c 89. Juncus effusus 89. Bromus Benekenii 89. Thuidium
tamariscifolium 37. Mnium affine 37. Brachythecium salebrosum 34.

Zbiorowisko grądowe: Querceto-Carpinetum
Broadleaved sylvan community: Querceto-Carpinetum

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	62	24	59	60	61	71	104	109	2	1
Leśnictwo Forestry	Szklar- nia	Kos- tuchna	Szklar- nia	K o s t u c h n a			Szklar- nia	Kos- tuchna	Szklarnia	
Nr oddziału No. of division	103	87	105	106	105	189	101	88	100	99
Data wykonania zdjęcia Date of record	18.9 1958	17.8 1958	18.9 1958	18.9 1958	18.9 1958	13.8 1959	15.9 1959	15.9 1959	15.8 1958	15.8 1958
Wysokość m n.p.m. altitude above sea level	285	270	275	285	295	280	290	295	265	275
Ekspozycja Expozycja	S	W	SW	S-SW	SW-W	S	W	N-NW	E	E-NE
Nachylenie terenu w stopniach Inclination of area - grades	8	5	10	7	7	2	10	20	5	8
Ukształtowanie terenu Configuration of the territory	pofalowany undulated		wyrówn. flat	pofal. undul.	wyrównany flat	w y ż y n n y u p l a n d			wyrównany flat	
Pokrycie koron drzew % a	75	75	40	40	75	85	95	100	40	75
Pokrycie warstwy krzewów % b	1	1	20	70	1	70	-	1	-	-
Pokrycie runa Cover of ground flora % c	80	60	100	90	75	100	100	40	90	50
Pokrycie mśzaków %	-	-	-	-	1	1	-	5	-	-
Powierzchnia zdjęcia w arach Area of record in 100 square m.	2	50	4	5	4	8	1	3	1	3

Stopień stałości - Constancy

Carpinion

Carpinus betulus a	1.1	2.3	+	2.1	1.2	+	1.1	4.2	1.1	1.1	V
Carpinus betulus b	+	r	+	1.1	.	+	.	+	.	.	III
Carpinus betulus c	.	1.1	+	1.1	+	+	.	+	.	r	IV
Tilia cordata a	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	+
Tilia cordata b	.	.	1.1	2.3	.	.	.	.	.	.	I
Tilia cordata c	+	.	+	1.1	.	.	.	.	.	.	I
Galium Schultesii	+ 2	.	+	.	.	+	.	.	.	.	I

Fagion

Fagus silvatica a	3.1	3.2	2.1	3.1	3.2	.	2.1	3.1	1.1	4.4	V
Fagus silvatica b	+	r	+	.	+	.	.	.	.	.	II
Fagus silvatica c	.	+	+	.	+	.	.	+	.	+	III

Fagetalia

Festuca gigantea	1.2	3.2	.	+ 2	+ 2	3.4	.	3.5	.	.	III
Epilobium montanum	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	II
Carex silvatica	.	.	.	.	.	+ 2	.	.	.	r	I
Catharinea undulata	.	.	.	.	.	+ 3	.	1.3	.	.	I

Querceto-Fagetea

Scrophularia nodosa	+	.	.	+	.	+	.	.	r	+	III
Epipactis latifolia	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	I
Melica nutans	.	r	1.1	.	+ 2	+ 2	.	.	+ 2	+ 3	III
Poa nemoralis	+ 2	.	.	.	+ 2	.	.	.	.	.	I
Carex digitata	+ 2	.	.	.	.	1.2	+ 2	.	.	.	II

Vaccinio-Piceetea

Picea excelsa a	r	.	r	.	.	1.1	.	.	.	.	II
Picea excelsa b	.	1.1	+	.	+ 4	+	.	.	.	.	II
Picea excelsa c	.	+	.	.	r	+	.	.	.	.	II
Sorbus aucuparia a	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Sorbus aucuparia b	.	r	+	+	.	2.2	.	.	.	.	II
Sorbus aucuparia c	+	+	+	+	+	.	.	+	.	.	III
Deschampsia flexuosa	.	+ 3	+ 3	.	1.2	1.4	.	+ 3	+ 2	2.2	IV
Vaccinium myrtillus	+ 3	+ 2	+ 3	+ 2	1.4	1.4	.	+	.	+	IV
Calamagrostis arundinacea	+ 2	1.4	.	+ 2	.	+ 2	.	.	.	3.4	III
Pteridium aquilinum	.	.	+ 4	+ 3	.	.	.	.	.	.	I
Majanthemum bifolium	+	.	1.1	.	.	+ 3	.	+ 2	.	+	III
Polytrichum formosum	.	.	.	.	+ 2	+ 4	.	.	.	.	I

Gatunki towarzyszące
Accompanying species

Quercus robur a	1.1	1.1	1.1	+	1.1	1.1	3.1	1.1	3.2	1.1	V
Quercus robur b	.	.	1.1	+	.	+	.	+	.	.	II
Quercus robur c	.	.	+	.	.	+	.	+	.	r	II
Quercus sessilis a	1.1	1.1	1.1	.	1.1	3.1	3.1	.	2.1	.	IV
Quercus sessilis b	.	r	1.1	+	.	+	.	.	.	.	II
Quercus sessilis c	+	+	+	.	1.1	+	.	.	r	.	III
Betula verrucosa a	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Betula verrucosa b	.	.	1.1	+	.	+	.	.	.	.	II
Betula verrucosa c	.	.	+	+	.	+	.	.	.	.	II
Pinus silvestris a	2.1	.	2.1	2.1	2.1	1.1	.	+	.	.	III
Pinus silvestris b	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Pinus silvestris c	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Larix decidua a	.	.	.	.	1.1	3.1	.	.	.	.	I
Larix decidua b	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Larix decidua c	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Populus tremula a	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Populus tremula b	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Populus tremula c	+	+	+	.	+	.	.	.	.	.	II
Carex brizoides	+ 3	1.5	2.3	1.4	4.4	1.4	4.4	2.4	5.5	+ 2	V
Lysimachia vulgaris	+	.	.	+	.	1.1	+	.	+	+	II
Luzula pilosa	+ 2	+ 2	.	+ 2	+ 2	1.2	.	1.2	.	1.2	IV
Oxalis acetosella	+ 3	+ 2	r	1.2	.	1.4	.	+ 2	2.2	+ 2	IV
Dryopteris spinulosa	+	+	.	.	+	1.1	.	.	.	.	III
Calamagrostis villosa	+ 3	+ 4	+ 4	.	+ 2	+ 4	.	+ 2	.	+ 4	IV
Athyrium filix-femina	.	+	.	.	.	1.1	1.1	+	+	+ 2	III
Rubus cfr hirtus c	.	.	+	+ 2	.	.	+	.	.	+ 3	II
Galeopsis tetrabit	.	+	+ 2	.	.	1.2	+	1.1	+ 2	.	III
Deschampsia caespitosa	+ 2	.	2.3	+ 2	.	1.2	+ 2	+ 2	.	+ 2	IV
Urtica dioica	+	+	.	+ 2	.	.	2.3	.	.	.	III
Rubus idaeus b	+ 2	.	.	+ 2	.	1.3	.	.	.	.	II
Rubus idaeus c	+	+	.	.	.	+ 2	.	.	.	.	II
Mycelis muralis	1.2	+ 2	.	+	.	1.1	+	1.1	.	+	IV
Agrostis vulgaris	.	+ 2	+ 3	.	.	1.2	+ 2	+ 2	.	.	III
Chamaenerion angustifolium	.	+	.	+	.	1.3	.	.	.	.	II
Sambucus racemosa b	.	.	+	+	.	+	.	.	.	.	II
Sambucus racemosa c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	+
Rubus cfr plicatus b	.	.	+ 2	+ 2	.	1.2	.	.	.	.	II
Rubus cfr plicatus c	.	.	.	+ 2	.	2.2	.	.	.	.	I
Calamagrostis epigeios	.	.	+ 2	+ 2	.	+ 2	r	.	.	.	II
Carex pilulifera	.	.	+ 2	.	.	1.2	.	+ 2	.	+ 2	II

Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species	10	3	6	6	1	18	11	2	-	3	= 60
---	----	---	---	---	---	----	----	---	---	---	------

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Quercus rubra c 24,59. Arabis Halleri 24,1. Fragaria vesca 59,60. Holcus mollis 59,71. Veronica chamaedrys 60,104. Galium boreale 62,60. Ulmus laevis a 62, b 62. Fraxinus excelsior a 24. Geum urbanum 104. Aegopodium podagraria 62. Brachypodium silvaticum 62. Glechoma hederacea 104. Pinus nigra a 59. Ranunculus acer 59. Vicia silvatica 59. Hieracium sabaudum 60. Ajuga reptans 60. Viola Riviniana 60. Veronica officinalis 60. Alliaria officinalis 62. Galium verum 62. Phyteuma spicatum 62. Senecio Fuchsii 62. Luzula nemorosa 1. Polygonatum verticillatum 1. Salix caprea a 71. Prangula alnus b c 71. Sambucus nigra b c 71. Piroia minor 61. Juncus buffonius 71. Luzula campestris 71. Blechnum spicant 71. Trientalis europaea 71. Dryopteris austriaca 71. Angelica silvestris 71. Viburnum opulus c 71. Viola silvestris 62. Poa annua 71. Anthoxanthum odoratum 71. Potentilla silvestris 71. Hypericum perforatum 71. Abies alba c 71. Dryopteris filix-mas 71,109. Tussilago farfara 104. Rumex sanguineus 104. Vincetoxicum officinale 104. Arctium lappa 104. Dactylis glomerata 104. Anthriscus silvestris 104. Eupatorium cannabinum 104. Ranunculus repens 104. Equisetum arvense 104. Phegopteris dryopteris 109. Eurychordium Swartzii 109.

Tabela 3 - Table 3

Zbiorowisko buczyny: Fagetum
Beech community: Fagetum

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	21	3	8	10	22	105	63	55	90	
Leśnictwo Forestry	S	z	k	l	a	r	n	i	a	Wygo- rzele
Nr oddziału No. of division	102	100	98	98	102	84	86	178	100	Szklar- nia
Data wykonania zdjęcia Date of record	17.8	15.8	15.8	16.8	17.8	15.9	18.9	17.9	18.8	
1958	1958	1958	1958	1958	1958	1959	1958	1958	1959	
Wysokość m n.p.m. Altitude above sea level	285	280	295	290	275	330	325	260	275	
Ekspozycja Exposition	SW	E-NE	E-SE	E-SE	S	S	W	E	SE	
Nachylenie terenu w stopniach Inclination of area - grades	10	8	2	3	5	15	12	8	12	
Ukształtowanie terenu Configuration of the territory	wgłęb. depres.	wyrównany flat			wgłębiony depressed upl.	wyż. upl.	wyrówn. flat	wyżynny upland		
Pokrycie koron drzew % Cover of trees	75	-	30	40	80	100	90	60	100	
Pokrycie warstwy krzewów % Cover of shrubs	1	1	15	1	30	1	60	1	-	
Pokrycie runa Cover of ground flora	100	100	100	90	65	50	25	100	50	
Pokrycie mszaków % Cover of mosses	-	-	-	1	-	5	-	-	-	
Powierzchnia zdjęcia w arach Area of record in 100 square m.	50	1	2	16	10	2	5	3	3	
Fagion										
Fagus silvatica a	1.1	+	2.2	3.2	3.3	4.1	4.1	2.1	4.3	V
Fagus silvatica b	+	.	+	+	2.2	+	+	.	.	IV
Fagus silvatica c	+	.	.	.	+	.	.	1.1	+	III
Acer pseudoplatanus c	.	.	.	.	.	.	+ 2	.	1.1	I
Carpinion										
Carpinus betulus a	.	.	.	.	.	.	+	.	+	I
Carpinus betulus b	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Carpinus betulus c	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Fagetalia										
Festuca gigantea	1.3	.	.	+ 3	2.2	.	2.4	.	+ 2	III
Catharinaea undulata	.	.	.	+ 3	.	+ 3	.	.	.	I
Querceto-Fagetea										
Scrophularia nodosa	+	.	.	+	.	.	+	.	.	I
Melica nutans	.	.	.	.	.	+ 2	+ 2	.	.	I
Epipactis latifolia	.	+	.	+	+	+	.	.	.	II
Aegopodium podagraria	+	.	.	.	.	.	+	.	.	I
Viola silvestris	.	.	.	.	.	+	1.1	.	.	I
Viola Riviniana	.	.	.	.	.	+ 2	+ 2	.	.	I
Vaccinio-Piceetea										
Picea excelsa a	.	.	.	r	.	.	.	1.1	+	I
Picea excelsa b	+	.	2.2	.	+	.	.	1.1	.	II
Picea excelsa c	.	.	+	.	r	.	.	+	.	I
Deschampsia flexuosa	.	+ 3	.	+ 4	+ 2	1.3	.	+ 2	+ 2	III
Vaccinium myrtillus	.	+ 3	1.2	.	+ 2	+ 3	+ 2	+ 4	.	III
Majanthemum bifolium	.	+	.	.	+	+ 2	+	+	.	II
Pirola rotundifolia	.	.	.	.	+ 2	+	.	.	.	I
Calamagrostis arundinacea	.	1.4	.	3.4	1.2	2.2	+ 2	4.2	4.3	IV
Sorbus aucuparia b	+	1.1	+	.	.	+	.	+	.	III
Sorbus aucuparia c	+	+	+	+	+	+	+	.	.	V
Gatunki towarzyszące Accompanying species										
Quercus robur a	3.1	+	.	.	3.1	3.1	1.1	+	.	IV
Quercus robur b	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+
Quercus robur c	.	.	+	.	+	+	.	.	.	+
Quercus sessilis a	+	.	.	+	1.1	3.1	1.2	.	1.1	IV
Quercus sessilis b	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+
Quercus sessilis c	.	.	.	.	+	.	+	.	+	I
Pinus silvestris a	.	.	1.1	.	.	.	+	3.1	.	I
Carex brizoides	4.4	+ 3	5.5	+ 3	.	.	+ 2	+ 2	1.3	IV
Oxalis acetosella	1.2	1.2	.	.	2.2	.	1.3	.	.	III
Athyrium filix-femina	+	+	+	+ 3	+	.	+	.	.	IV
Lysimachia vulgaris	1.1	4.3	.	.	+	.	.	.	.	I
Galeopsis tetrahit	+	+ 2	.	.	.	.	+ 2	.	.	II
Urtica dioica	+	.	.	+	.	.	+ 2	.	.	I
Dryopteris spinulosa	+	.	.	+	+	.	+	+	+	III
Rubus idaeus b	.	+ 2	.	.	.	.	+	.	.	I
Rubus idaeus c	.	+ 2	.	+	.	+	.	.	+	II
Convallaria majalis	.	2.4	.	.	.	3.1	.	1.1	.	I
Calamagrostis villosa	+	+ 2	.	+ 4	.	.	.	+ 2	.	II
Deschampsia caespitosa	+ 2	+ 2	.	2.3	1.2	+ 2	.	.	1.2	III
Luzula pilosa	+ 2	+ 2	.	1.2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	V
Mycelis muralis	.	.	.	1.1	.	.	.	+	+	I
Rubus cfr hirtus c	+ 2	.	.	+ 2	.	+	+	.	.	II
Agrostis vulgaris	.	.	.	.	+ 2	+ 2	+ 2	.	+ 2	II
Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species	5	-	2	13	5	7	17	8	13	= 70

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Tilia cordata a b 63, c 63, 105. Acer platanoides a b c 63. Ulmus scabra a b 63. Fraxinus excelsior a b 21, c 21, 90. Carex silvatica 10. Brachypodium silvaticum 21. Ranunculus lanuginosus 63. Moehringia trinervis 10. Poa nemoralis 63. Phyteuma spicatum 63. Geum urbanum 21. Stachys silvatica 63. Equisetum silvaticum 21. Betula verrucosa a 22, 63, 55, b c 8. Veronica chamaedrys 10, 63. Veronica officinalis 10. Frangula alnus b 55, c 10, 105, 55. Arabia Halleri 10, 90. Luzula nemorosa 10, 90. Plantago maior 10. Pirola minor 10. Linaria vulgaris 10. Dryopteris austriaca 10. Chaerophyllum aromaticum 10. Hieracium sabaudum 10. Quercus rubra a 22. Dryopteris filix-mas 22, 105. Sambucus racemosa b 63, c 22, 63, 90. Populus tremula a b 63, c 22, 63, 55. Ulmus effusa b 63. Senecio Fuchsii 63. Sambucus nigra b c 63. Lysimachia nummularia 63. Helidonium majus 63. Ajuga reptans 63. Pteridium aquilinum 55. Polygonatum verticillatum 55. Trientalis europaea 55. Vaccinium vitis-idaea 55. Molinia arundinacea 55. Betula pubescens a 21. Bromus Benekenii 21, 90. Salix caprea c 90. Chamaenerion angustifolium 105. Pirola secunda 105. Carex pilulifera 90. Hieracium cfr murorum 90. Festuca pratensis 90. Plantago media 90. Galium cfr mollugo 90. Holcus lanatus 90. Luzula campestris 90. Hieracium cfr pilosella 90. Anemum hepaticum 105.

Tabela 4 - Table 4
Zbiorowisko buczyny kwaśnej: Luzulo-Fagetum
Acid beech community: Luzulo-Fagetum

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	92	4	5	6	7	9	14	19	91		
Leśnictwo Forestry	Kos- tuchna	S	z	k	l	a	r	n	i	a	Kos- tuchna
Nr oddziału No. of division	88	99	99	98	98	98	97	85	72		
Data wykonania zdjęcia Date of record	12.9 1959	15.8 1958	15.8 1958	15.8 1958	15.8 1958	15.8 1958	15.8 1958	17.8 1958	12.9 1959		
Wysokość m n.p.m. Altitude above sea level	315	285	290	280	275	270	280	335	310		
Ekspozycja Exposition	W-S	E	E	S	S	SE	SE	SW	SW-S		
Nachylenie terenu w stopniach Inclination of area - grades	5	5	-	7	1	5	5	2	10		
Ukształtowanie terenu Configuration of the territory	wyżyn. upland	wyrównany flat	wyrównany flat	wgłęb. depress.	pofaladowany undulated	pofaladowany undulated	wyrównany flat	wyrównany flat	wyżyn. upland		
Pokrycie koron drzew % a Cover of trees	75	60	40	85	20	-	100	40	50		
Pokrycie warstwy krzewów % b Cover of shrubs	10	1	1	1	5	-	1	80	5		
Pokrycie runa Cover of ground flora % c	100	40	85	25	100	90	25	100	90		
Pokrycie mszaków % Cover of mosses	-	-	1	1	-	-	-	-	5		
Powierzchnia zdjęcia w arach Area of record in 100 square m.	3	0.3	1	15	25	2	1	50	4		
Fagion											
Fagus silvatica a	4.3	4.3	3.1	4.4	2.2	.	3.3	+	3.3	V	
Fagus silvatica b	+	+	+	+	+	.	+	.	.	III	
Fagus silvatica c	+	+	+	+	.	+	.	r	.	III	
Vaccinio-Piceetea											
Picea excelsa a	1.1	.	.	.	.	.	.	+	1.1	II	
Picea excelsa b	1.2	.	.	.	1.2	.	.	.	.	I	
Picea excelsa c	+	.	+	.	.	.	.	.	.	I	
Calamagrostis arundinacea	.	2.2	1.2	2.2	.	1.4	+ 2	.	.	III	
Vaccinium myrtillus	4.4	.	+ 2	.	3.3	.	+ 2	+ 2	+ 3	IV	
Majanthemum bifolium	+	.	.	.	.	.	3.2	.	.	I	
Deschampsia flexuosa	1.2	1.2	1.3	1.2	+ 2	1.2	+ 2	.	2.2	V	
Pteridium aquilinum	1.3	.	.	.	2.3	.	.	.	+	II	
Dryopteris austriaca	+	.	.	.	.	.	.	.	+	I	
Veronica officinalis	.	.	.	+	.	.	.	+	.	I	
Sorbus aucuparia b	+	.	.	.	.	.	.	4.3	+	II	
Sorbus aucuparia c	+	.	.	.	.	+	.	+	.	II	
Gatunki towarzyszące Accompanying species											
Quercus robur a	.	.	3.1	.	.	.	1.1	1.1	.	II	
Quercus robur b	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	
Quercus robur c	+	+	+	.	.	.	.	.	+	II	
Quercus sessilis a	.	2.1	1.1	+	.	.	2.1	.	.	II	
Quercus sessilis b	+	.	.	.	.	.	.	.	+	I	
Quercus sessilis c	+	.	.	.	+	.	+	.	1.1	II	
Pinus silvestris a	2.1	.	.	1.1	1.2	.	.	4.1	1.1	III	
Pinus silvestris b	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
Pinus silvestris c	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	
Betula verrucosa a	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	+	
Betula verrucosa b	.	.	.	.	+	.	.	+	+	II	
Betula verrucosa c	.	.	.	.	+	.	.	+	.	I	
Populus tremula b	+	.	.	.	.	.	.	.	+	I	
Populus tremula c	+	+	+	.	.	.	.	+	+	III	
Frangula alnus b	.	.	.	.	+	.	.	+	+	II	
Frangula alnus c	.	.	.	.	+	.	.	+	.	I	
Luzula nemorosa	.	.	.	+	.	+	3	.	.	I	
Luzula pilosa	+ 2	2.2	.	1.2	.	+	2	2.2	+ 2	IV	
Deschampsia caespitosa	.	+ 2	+ 2	+ 2	.	.	+ 2	.	.	II	
Carex brizoides	.	+ 2	.	+	+ 3	.	.	.	r	II	
Athyrium filix-femina	+	.	.	.	.	+	.	+	.	II	
Carex pilulifera	.	1.2	+ 2	+ 2	.	+	2	.	.	II	
Agrostis vulgaris	1.2	+ 2	.	+ 2	.	.	.	.	+ 2	II	
Poa pratensis	.	+ 3	r	.	.	+	+	.	.	II	
Calamagrostis villosa	+ 3	.	4.4	.	1.4	4.5	.	.	3.4	III	
Dryopteris spinulosa	.	.	+	.	.	.	.	+	+	II	
Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species	3	4	4	5	2	4	3	11	6 = 42		

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Melica nutans 6. Carex digitata 4. Festuca gigantea 19. Viola Riviniana 19. Poa nemoralis 92
 Arabis Halleri 9,19. Sambucus racemosa b c 19. Rubus cfr hirtus c 7. Juncus bufonius 4. Luzula
 campestris 4,9. Anthoxanthum odoratum 4. Carex pallescens 5. Agrostis alba 5. Hieracium cfr
 pilosella 5. Holcus mollis 5,9. Festuca rubra 6. Molinia arundinacea 7. Phegopteris polypodioides
 14. Hypericum perforatum 14. Sambucus nigra b 19. Chamaenerion angustifolium 19. Galeopsis tetrahit
 19. Urtica dioica 19. Abies alba c 92. Salix caprea c 91. Plagiothecium denticulatum 5,6. P. succulentum 91.

Tabela 5 - Table 5

Zbiorowisko boru mieszanego: Pineto-Quercetum w facji Pteridium aquilinum
 Sylvan coniferous-broadleaved mixed community: Pineto-Quercetum, facies Pteridium aquilinum

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	29	35	48	74	83	96	98	100	102	103		
Lesnictwo Forestry	Wygorzele		Kos- tuchna	Mako- łowiec	Kos- tuchna	L	ę	d	z	i	n	y
Nr oddziału No. of division	159	182	133	160	109	148	150	211	230	228		
Data wykonania zdjęcia Date of record	13.9 1958	13.9 1958	16.9 1958	17.8 1959	17.8 1959	15.9 1959	15.9 1959	15.9 1959	15.9 1959	15.9 1959		
Wysokość m n.p.m. Altitude above sea level	255	260	265	265	330	265	265	260	260	265		
Ekspozycja Exposition	S	SW	SW	S-SW	S	W	W	W	E	E		
Nachylenie terenu w stopniach Inclination of area - grades	5	5	5	3	10	7	1	3	3	10		
Ukształtowanie terenu Configuration of the territory	w y r ó w n a n y f l a t					p o f a ł d o w a n y u n d u l a t e d		w y r ó w n a n y f l a t				
Pokrycie koron drzew % a	75	80	60	75	50	75	65	75	95	80		
Pokrycie warstwy krzewów % b	15	1	1	15	30	15	5	5	1	5		
Pokrycie runa Cover of ground flora % c	90	100	100	100	100	100	100	100	80	100		
Pokrycie mszaków %	10	1	10	-	1	5	1	-	5	-		
Powierzchnia zdjęcia w arach Area of record in 100 square m.	2	50	1	3	2	2	2	3	2	4		

Stopień stałości - Constancy

Constancy

Stopień stałości

Vaccinio-Piceetea

Picea excelsa a	.	.	.	1.1	1.1	.	1.1	1.1	4.1	1.1	III
Picea excelsa b	2.2	+	+	2.1	1.1	2.3	1.2	1.1	+	1.1	V
Picea excelsa c	.	.	+	+	+	+	.	.	+	+	III
Pteridium aquilinum	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	3.3	4.4	V
Vaccinium vitis-idaea	1.2	+ 2	+ 2	+	1.1	+ 2	.	+ 2	.	+ 3	IV
Deschampsia flexuosa	1.2	1.3	+ 3	+ 2	4.4	1.3	1.3	3.3	3.3	1.3	V
Vaccinium myrtillus	+ 3	+ 3	4.4	+	2.3	+ 2	+ 2	+ 2	2.2	1.3	V
Pleurozium Schreberi	1.3	.	1.3	.	.	1.3	+ 3	.	1.3	.	III
Trientalis europaea	+	+	.	+	.	+ 2	+	+ 2	+ 2	.	IV

Gatunki towarzyszące
Accompanying species

Pinus silvestris a	4.4	5.5	4.1	4.1	2.1	4.1	4.1	4.1	3.1	5.1	V
Pinus silvestris b	.	.	+	.	2.1	.	.	r	.	+	II
Pinus silvestris c	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1.1	II
Betula verrucosa a	1.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Betula verrucosa b	.	.	.	.	+	.	+	.	.	+	II
Betula verrucosa c	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	I
Populus tremula a	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Populus tremula b	.	.	.	+	+	+	.	+	.	.	II
Populus tremula c	+	.	.	+	+	+	.	+	.	.	III
Quercus sessilis b	.	1.1	+	.	1.1	+	+	.	.	+	III
Quercus sessilis c	+	+	+	.	+	+	.	.	.	.	III
Frangula alnus b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
Frangula alnus c	+	+	.	.	+	+	.	.	.	+	III
Chamaenerion angustifolium	+	+	.	+ 2	+	r	+ 2	.	+	.	IV
Hieracium cfr pilosella	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	II
Molinia arundinacea	+ 2	+ 2	.	.	.	+ 2	.	+ 2	+ 2	.	III
Luzula pilosa	+ 2	.	.	+ 2	.	.	.	+ 2	.	+ 2	II
Potentilla silvestris	.	+	.	.	.	.	.	.	r	+ 2	II
Calamagrostis villosa	.	1.4	+ 2	1.3	.	1.3	+ 2	.	+ 3	+ 2	IV
Dryopteris spinulosa	.	+	.	.	.	+	+	.	+	+	III
Calluna vulgaris	.	.	r	.	1.2	.	.	1.2	.	+ 3	II
Agrostis vulgaris	.	.	.	+ 2	.	.	+ 2	.	.	+ 2	II
Carex pilulifera	.	.	.	+ 2	+ 2	.	.	.	+ 2	+ 2	II
Calamagrostis epigelos	.	.	.	+	+ 3	+ 2	.	.	.	.	II
Holcus lanatus	.	.	.	.	+ 2	.	.	.	+ 2	+ 2	II
Hypochoeris radicata	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	I
Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species	16	8	2	8	9	3	1	2	7	10 = 66	

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Epilobium montanum 29. Brachypodium silvaticum 35. Epipactis latifolia 35. Catharinaea undulata 96.
 Eurhynchium Swartzii 83. Calamagrostis arundinacea 29, 74. Blechnum spicant 103. Dicranella hetero-
 mala 29. Polytrichum formosum 29, 96. Mycelis muralis 29, 74. Betula pubescens c 29. Salix caprea c
 29. Luzula campestris 29. Rubus cfr hirtus 29. Urtica dioica 29. Quercus robur b 35, 83. Polygonatum
 odoratum 35. Polygonum aviculare 35, 102. Athyrium filix-femina 35, 102, 103. Sambucus nigra b 74.
 Galeopsis tetrahit 74, 103. Rubus idaeus c 74. Juncus effusus 74, 102. Carex pallescens 74. Sorbus
 aucuparia b 83, 98, 103, c 83, 98, 100, 103. Poa pratensis 83. Tussilago farfara 83. Hieracium cfr
 murorum 83. Plantago maior 83. Melampyrum nemorosum 83. Rumex crispus 96. Leontodon hispidus 102.
 Salix cinerea c 102. Rumex obtusifolius 103. Nardus stricta 103. Thuidium tamariscifolium 29.
 Bryum capillare 29. Brachythecium salebrosum 29, 35. Plagiothecium succulentum 29, 96.

Tabela 6 - Table 6

Zbiorowisko boru mieszanego: Pineto-Quercetum w facji Vaccinium vitis-idaea

Sylvan coniferous-broadleaved mixed community: Pineto-Quercetum, facies Vaccinium vitis-idaea

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	30	47	50	56	64	80	81	82	87	94	Stopień stałości Constancy
Leśnictwo Forestry	Wygo- rzele	Kostuchna		Wygorzele		K o s t u c h n a			Wygo- rzele	Lędzi- ny	
Nr oddziału No. of division	157	134	110	200	199	90	90	110	199	190	
Data wykonania zdjęcia Date of record	13.9 1958	16.9 1958	16.9 1958	17.9 1958	19.9 1958	19.8 1959	17.8 1959	17.8 1959	18.8 1959	14.9 1959	
Wysokość m n.p.m. Altitude above sea level	250	265	275	265	265	335	350	310	265	250	
Ekspozycja Exposition	-	SW	W-SW	S	S	N	W-SW	S-SW	S-SE	S-SW	
Nachylenie terenu w stopniach Inclination of area - grades	.	5	5	1	5	10	10	7	4	5	
Ukształtowanie terenu Configuration of the territory	wyrównany flat		wyrównany flat		w y ż y n n y u p l a n d		wyrów. flat		wyżyny upland		
Pokrycie koron drzew % a	70	60	50	80	60	85	80	75	65	80	
Pokrycie warstwy krzewów % b	20	5	50	25	25	1	1	40	25	5	
Pokrycie runa Cover of ground flora % c	75	100	80	50	90	100	100	100	85	90	Stopień stałości Constancy
Pokrycie mszaków %	-	-	10	10	5	10	5	5	5	1	
Powierzchnia zdjęcia w arach Area of record in 100 square m.	2	1	2	3	1	4	4	4	1	2	

Vaccinio-Piceetea

Picea excelsa a	.	.	1.1	3.2	.	.	+	.	1.1	.	II
Picea excelsa b	+	.	1.1	2.2	2.3	.	.	+	1.1	.	III
Picea excelsa c	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	II
Vaccinium vitis-idaea	3.4	4.4	4.4	3.4	4.4	3.4	3.4	3.3	3.3	5.4	V
Deschampsia flexuosa	1.3	1.3	1.3	1.3	2.2	2.3	1.3	3.2	2.3	1.2	V
Vaccinium myrtillus	+ 2	+ 2	+ 3	1.2	+ 2	3.4	2.3	1.2	2.3	1.2	V
Trientalis europaea	.	.	.	.	.	.	.	.	+ 2	+	I
Pteridium aquilinum	+	.	+ 2	.	.	.	+ 2	+	1.2	.	III
Pleurozium Schreberi	.	.	2.4	2.3	1.3	2.3	1.3	1.3	1.2	+ 2	IV
Sorbus aucuparia b	+	.	+	.	.	+	+	+	.	.	II
Sorbus aucuparia c	.	.	+	.	.	+	+	+	.	+	III

Gatunki towarzyszące
Accompanying species

Pinus silvestris a	4.4	4.1	3.2	4.1	4.1	5.1	5.1	4.1	4.1	4.1	V
Pinus silvestris b	.	.	4.3	1.1	.	.	+	2.1	2.2	1.1	III
Pinus silvestris c	1.1	+	1.1	1.1	.	+	+	+	1.1	+	V
Betula verrucosa b	1.1	.	+	.	.	+	+	+	.	+	III
Betula verrucosa c	.	.	+	.	+	+	+	.	.	+	III
Quercus robur b	1.1	.	.	.	.	.	2.1	+	.	.	II
Quercus robur c	+	.	+	.	.	+	+	1.1	.	.	III
Quercus sessilis b	+	.	+	.	.	.	.	1.1	1.1	.	II
Quercus sessilis c	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	V
Frangula alnus b	.	.	.	.	.	r	.	+	.	.	I
Frangula alnus c	.	.	.	.	+	+	.	+	+	+	II
Calluna vulgaris	+ 3	+ 2	.	+ 3	1.4	1.2	1.2	1.2	+ 3	+ 3	V
Calamagrostis epigeios	+	+	+ 2	.	.	.	.	.	+	.	II
Calamagrostis villosa	+ 3	+ 2	.	.	.	.	.	.	+ 2	.	II
Luzula pilosa	+ 2	.	.	.	.	.	+ 2	+ 2	+ 2	.	II
Populus tremula b	.	.	+	.	.	r	+	+	+	.	III
Populus tremula c	+	.	+	.	.	+	.	.	+	.	II
Nardus stricta	.	.	1.3	+ 2	.	.	+ 2	1.2	+ 2	+ 2	III
Melampyrum nemorosum	.	.	+ 2	.	.	.	+ 4	2.4	.	+	II
Festuca cfr ovina	.	.	+ 2	+ 2	.	.	+ 3	.	.	.	II
Agrostis vulgaris	.	.	+ 2	+ 2	.	+ 3	.	+ 2	.	+ 2	III
Molinia arundinacea	.	.	.	r	1.2	.	.	+ 2	+ 2	.	II

Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species	3	2	11	4	-	3	1	7	2	3 = 36
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	--------

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Carpinus betulus b c 82. Fagus silvatica a b 30, 82, c 56. Pirus communis c 30. Anthoxanthum odoratum 30, 81. Luzula campestris 47, 50. Poa pratensis 47, 82. Melampyrum vulgatum 50. Senecio vulgaris 50. Chamaenerion angustifolium 50. Salix caprea b 82, c 50, 82. Rubus cfr plicatus 50, 94. Carex pallens 50, 87. Plantago media 50, 80. Carex pilulifera 50. Potentilla silvestris 50. Hieracium cfr pilosella 50. Holcus mollis 56. Calamagrostis arundinacea 56. Poa annua 56. Salix caprea x S. silesiaca b c 80. Holcus lanatus 80. Deschampsia caespitosa 82. Rumex acetosa 82. Convallaria majalis 82. Sieglia decumbens 87. Leontodon autumnalis 94.

Zbiorowisko boru mieszanego: *Pineto-Quercetum* w facji typowej

Sylvan coniferous-broadleaved mixed community: Pineto-Quercetum - typical facies

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	11	12	13	15	17	18	20	23	25	27	42	54	67	68	69	33	
Lesnictwo Forestry	s	z	k	l	a	r	n	i	a	Wygorzele						Wygo- rzele	
Nr oddziału No. of division	82	85	85	84	82	82	85	85	85	96	239	157	217	234	234	204	
Data wykonania zdjęcia Date of record	16.8 1958	16.8 1958	16.8 1958	16.8 1958	16.8 1958	16.8 1958	17.8 1958	17.8 1958	19.8 1958	20.8 1958	16.9 1958	17.9 1958	21.5 1959	21.5 1959	21.5 1959	13.9 1959	
Wysokość m n.p.m. Altitude above sea level	330	330	330	335	270	285	305	310	340	290	260	265	270	265	270	275	
Ekspozycja Exposition	E-SE	N	N	N	NW	NW	SW	NW	S	NE-N	-	S	E	E	W-NW	S	
Nachylenie terenu w stopniach Inclination of area - grades	3	3	3	2	5	5	1	5	3	10	-	3	1	3	2	1	
Ukształtowanie terenu Configuration of the territory	wyrównany flat			wyrównany flat			wyżyny upland	wyrówn. flat	pofalowany undulated			wyrównany flat					
Pokrycie koron drzew % a Cover of trees	80	75	75	85	50	70	50	50	70	50	40	-	70	60	60	40	
Pokrycie warstwy krzewów % b Cover of shrubs	10	15	15	30	1	20	5	15	1	10	75	90	1	50	5	1	
Pokrycie runa % c Cover of ground flora	90	100	100	100	50	100	100	100	25	100	100	85	85	100	100	100	
Pokrycie mśzaków % Cover of mosses	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	-	5	-	-	
Powierzchnia zdjęcia w arach Area of record in 100 square m.	25	3	2	100	1	100	50	200	9	2	200	1	20	5	1	1	
Vaccinio-Piceetea																	
Picea excelsa a	.	.	.	.	1.1	+	.	+	1.1	.	.	.	.	1.1	1.1	1.1	II
Picea excelsa b	1.1	+	+	.	+	+	.	+	+	1.2	+	.	+	4.2	2.1	+	V
Picea excelsa c	+	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	+	+	+	.	II
Sorbus aucuparia a	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	+
Sorbus aucuparia b	+	2.1	2.1	1.1	.	.	1.2	+	.	+	1.2	.	.	.	.	.	III
Sorbus aucuparia c	+	+	+	+	.	.	+	+	+	+	.	.	.	.	+	+	IV
Vaccinium myrtillus	2.4	1.2	5.5	1.4	.	+	2	5.4	+	2	1.3	2.4	2.3	+	4.4	2.4	V
Deschampsia flexuosa	1.3	.	+	+	1.3	+	+	+	+	+	1.4	2.3	+	3.3	2.3	3.3	V
Majanthemum bifolium	+	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	+	+	II
Trientalis europaea	+	+	+	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	1.1	1.1	2.1	III
Calamagrostis arundinacea	+	+	.	.	.	+	1.2	1.2	2.2	+	+	.	1.4	1.2	.	.	III
Vaccinium vitis-idaea	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	+	+	+	.	II
Pteridium aquilinum	.	.	.	+	.	.	.	.	.	3.4	.	.	1.3	2.2	.	.	II
Pleurozium Schreberi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	1.3	.	1.3	.	.	I
Querceto-Fagetea																	
Fagus silvatica a	1.2	1.1	1.1	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Fagus silvatica b	+	+	+	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II
Fagus silvatica c	+	+	.	.	.	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II
Festuca gigantea	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	I
Scrophularia nodosa	+	.	+	.	.	+	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	II
Carex digitata	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	I
Gatunki towarzyszące Accompanying species																	
Quercus robur a	1.1	3.1	3.1	.	+	+	3.1	1.1	+	.	1.1	.	4.1	.	.	.	III
Quercus robur b	.	+	+	.	+	.	.	.	.	+	+	3.2	.	.	.	.	II
Quercus robur c	.	+	.	+	.	+	+	.	.	.	+	1.1	+	.	.	.	III
Quercus sessilis a	3.1	3.1	3.1	.	.	.	3.1	+	4.1	.	1.1	.	+	.	.	.	III
Quercus sessilis b	+	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	3.2	.	.	.	.	II
Quercus sessilis c	+	.	+	.	.	+	+	+	+	+	1.1	.	.	.	.	+	IV
Pinus silvestris a	1.1	+	+	+	.	4.4	.	4.1	.	4.1	1.1	.	1.1	4.1	4.1	4.3	IV
Pinus silvestris b	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I
Pinus silvestris c	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Betula verrucosa a	+	.	.	5.5	4.2	.	+	+	.	1.2	1.1	.	+	1.1	.	1.1	III
Betula verrucosa b	.	.	.	1.2	+	.	+	+	.	+	.	+	.	.	.	.	II
Betula verrucosa c	+	+	+	+	+	+	.	+	1.1	+	.	.	.	.	.	.	III
Populus tremula a	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	+
Populus tremula b	.	.	.	.	+	1.3	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I
Populus tremula c	+	.	.	.	+	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II
Betula obscura a	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	+	I
Betula obscura c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Luzula nemorosa	2.3	.	.	+	+	.	1.2	.	.	.	.	.	+	+	.	1.1	II
Luzula pilosa	1.2	+	1.2	.	.	.	+	+	+	.	.	.	+	+	.	+	IV
Frangula alnus b	.	+	+	.	.	+	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	+	II
Frangula alnus c	+	.	.	+	.	.	+	.	.	.	1.1	.	+	+	+	.	III
Deschampsia caespitosa	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	I
Carex brizoides	+	4.5	.	.	.	1.4	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	II
Arabis Halleri	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	+	II
Athyrium filix-femina	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Calamagrostis villosa	+	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	2.3	.	.	+	+	II
Dryopteris spinulosa	+	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	+	+	III
Chamaenerion angustifolium	+	.	.	+	+	2.4	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	III
Oxalis acetosella	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	I
Agrostis vulgaris	+	.	+	+	+	+	+	+	+	.	+	+	.	.	.	4.3	IV
Rubus cfr plicatus b	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	+
Rubus cfr plicatus c	.	+	.	2.2	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	II
Calamagrostis epigeios	.	.	.	4.4	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+	II
Hieracium cfr pilosella	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I
Juncus squarrosus	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	I
Hypochoeris radicata	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	II
Mycelis muralis	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	II
Rubus idaeus b	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Rubus idaeus c	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Sambucus racemosa b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	II
Luzula campestris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Melampyrum nemorosum	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	II
Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species	7	3	3	4	10	3	-	4	19	-	9	17	4	3	1	11	= 98

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Carpinus betulus b 23,25. *Fraxinus excelsior* c 54. *Carex silvatica* 17. *Epilobium montanum* 17,25. *Equisetum silvaticum* 25. *Moehringia trinervia* 25. *Epipactis latifolia* 25. *Corylus avellana* b 42. *Viola Riviniana* 42. *Aegopodium podagraria* 42. *Poa nemoralis* 69. *Viola silvestris* 12. *Catharinaea undulata* 68. *Dryopteris austriaca* 17. *Veronica officinalis* 25. *Rubus* cfr *hirtus* c 42,54. *Agrostis alba* 11. *Phegopteris polypodioides* 11. *Pirola rotundifolia* 11. *Aesculus hippocastanum* c 11. *Hypericum perforatum* 11,54. *Lysimachia vulgaris* 11,42. *Poa pratensis* 11. *Pinus strobus* a 12,13, c 12, 15. *Vicia silvatica* 12. *Molinia arundinacea* 13,54. *Senecio Fuchsii* 13,18. *Larix decidua* a b c 15. *Hieracium* cfr *murorum* 15. *Malus silvestris* c 54. *Quercus rubra* c 15,18. *Sambucus nigra* b c 17,18. *Holcus mollis* 17. *Erigeron acer* 17. *Tussilago farfara* 17. *Rumex acetosella* 17,23. *Poa annua* 17,25. *Anthoxanthum odoratum* 23. *Ajuga reptans* 25. *Cirsium oleraceum* 25. *Carex hirta* 25. *Urtica dioica* 25. *Salix* cfr *aurita* b 25, c 42. *Carex pilulifera* 25,67. *Taraxacum* cfr *officinale* 25. *Senecio vulgaris* 25. *Sonchus arvensis* 25. *Alnus glutinosa* a 25, b 42. *Abies alba* b 23. *Nardus stricta* 42. *Orobancha vulgaris* 54. *Pirus communis* c 54. *Rubus saxatilis* 42. *Veronica chamaedrys* 54. *Hieracium* cfr *Lachenalii* 54. *Fragaria vesca* 54. *Chaerophyllum aromaticum* 54. *Pirola minor* 54. *P. secunda* 54. *Heracleum sphondylium* 54. *Potentilla silvestris* 54. *Eupatorium cannabinum* 33. *Rubus* cfr *caesius* 33. *Galium* cfr *mollugo* 54,33. *Galeopsis tetrahit* 33. *Campanula patula* 33. *Ranunculus acer* 33. *Cirsium rivulare* 33. *Holcus lanatus* 33. *Leontodon autumnalis* 33. *Poa trivialis* 67. *Festuca rubra* 67. *Calluna vulgaris* 67. *Plagiothecium succulentum* 54,68. *Dicranella heteromala* 25. *Bryum capillare* 25. *Plagiothecium denticulatum* 25,27,54. *Polytrichum formosum* 25,42,68.

Tabela 8 - Table 8

Zbiorowisko boru mieszanego: Pineto-Quercetum w facji Calamagrostis sp.

Sylvan coniferous-broadleaved mixed community: Pineto-Quercetum, facies Calamagrostis sp.

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	31	32	41	57	75	78	84	95	99	110	
Leśnictwo Forestry	W y g o r z e l e			K o s t u c h n a				Łędziny		Wygo- rzele	
Nr oddziału No. of division	182	205	221	160	161	136	133	168	144	150	
Data wykonania zdjęcia Date of record	13.9 1958	13.9 1958	16.9 1958	18.9 1958	17.8 1959	17.8 1959	17.8 1959	14.9 1959	15.9 1959	15.9 1959	
Ekspozycja Exposition	S	-	S-SW	NE	W	E	SW	SW	SE-S	S	
Wysokość m n.p.m. Altitude above sea level	255	255	245	265	270	275	265	260	270	270	
Nachylenie terenu w stopniach Inclination of area - grades	1	-	5	5	5	2	2	2	5	2	
Ukształtowanie terenu Configuration of the territory	wyrównany flat		wyrównany flat		pofałd. undul.	wyrównany flat		pofałdowany undulated		wyrówn. flat	
Pokrycie koron drzew % a Cover of trees	60	70	75	60	85	80	90	75	50	80	
Pokrycie warstwy krzewów % b Cover of shrubs	5	25	40	30	5	1	1	5	1	1	
Pokrycie runa % c Cover of ground flora	100	100	85	100	100	100	100	100	100	100	
Pokrycie mszaków % Cover of mosses	-	1	15	5	1	-	1	1	1	1	
Powierzchnia zdjęcia w arach Area of record in 100 square m.	3	4	60	4	6	2	2	2	2	1	

Stopień stałości - Constancy

Vaccinio-Piceetea

Picea excelsa a	1.1	.	1.1	1.1	1.1	.	+	1.1	1.1	.	IV
Picea excelsa b	2.1	2.1	2.1	+	1.1	.	+	1.1	+ 2	1.1	V
Picea excelsa c	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	I
Pteridium aquilinum	.	1.4	+ 3	.	+ 2	.	.	+ 3	+	.	III
Vaccinium myrtillus	1.3	+ 2	1.2	+ 2	+ 2	+	1.1	1.2	+ 2	+ 2	V
Deschampsia flexuosa	+ 3	1.4	1.3	1.3	+ 2	1.2	+ 2	1.3	.	1.3	V
Trientalis europaea	+	+	.	.	+ 2	.	+	.	.	+	III
Vaccinium vitis-idaea	.	1.2	+ 2	.	.	.	+	+ 2	.	+	III
Pleurozium Schreberi	.	.	2.3	.	.	.	.	+ 2	+ 2	+ 3	II
Polytrichum formosum	.	+ 4	1.3	1.4	.	.	+ 2	+ 2	+ 2	.	III
Sphagnum Girgensohnii	.	+ 3	+ 3	.	.	.	.	+ 2	.	.	II

Gatunki towarzyszące
Accompanying species

Pinus silvestris a	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	5.1	5.1	4.1	3.1	4.1	V
Pinus silvestris c	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Quercus robur a	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	+
Quercus robur b	+	.	.	+	+	+	.	.	.	.	II
Quercus robur c	+	.	+	+	.	+	+	.	.	.	III
Quercus sessilis b	+	.	.	+	.	.	+	.	.	.	II
Quercus sessilis c	+	+	+	+	.	+	+	r	.	+	IV
Betula verrucosa a	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+
Betula verrucosa b	.	.	.	1.1	+	.	.	.	.	.	I
Betula verrucosa c	+	.	.	1.1	.	.	.	.	+	.	II
Populus tremula b	.	.	.	2.2	.	+	.	.	.	.	I
Populus tremula c	+	.	+	1.1	.	+	.	.	.	.	II
Betula pubescens c	.	+	+	1.1	.	.	.	.	.	.	II
Rubus cfr plicatus b	.	.	.	+	+	.	+	.	.	.	I
Rubus cfr plicatus c	.	+	.	+	+	+	.	r	.	.	III
Frangula alnus b	+	.	.	+	+	+	+	.	.	+	III
Frangula alnus c	+	.	.	.	+	.	+	.	.	.	II
Calamagrostis epigeios	+ 2	.	.	+ 2	+ 2	1.2	.	1.2	1.2	.	III
Calamagrostis villosa	4.5	4.4	4.4	1.3	5.5	3.3	5.5	4.4	5.5	4.4	V
Molinia arundinacea	r	+ 2	+ 2	.	.	+	+ 2	+ 2	+ 2	1.2	IV
Chamaenerion angustifolium	+	.	+ 2	3.3	+ 2	+	.	+	+	.	III
Dryopteris spinulosa	+	+	+	1.1	1.1	1.1	.	+	1.1	+	V
Luzula pilosa	+ 2	.	.	.	.	+ 2	+ 2	.	.	.	II
Athyrium filix-femina	+	.	.	+	+	+	.	1.1	1.1	.	III
Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species	3	2	7	19	5	11	1	5	-	2 = 55	

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Pagus silvatica b 57, c 57, 110. Carex digitata 41. Sorbus aucuparia b 75, 78, 84, 95, c 32, 78, 95, 110. Bazzania trilobata 41. Carex pallescens 41, 57. Mycelis muralis 32, 41, 57. Salix aurita c 57. Senecio Fuchsii 31. Genista tinctoria 31. Dryopteris austriaca 57. Vaccinium uliginosum 32. Hypochaeris radicata 41, 78. Senecio vulgaris 41. Sambucus racemosa b 57, c 95. Populus angulata b c 57. Alnus glutinosa b 57. Rubus idaeus b 57, c 57, 75. Sambucus nigra b 57. Salix cinerea b 57. Fragaria vesca 57. Dryopteris oreopteris 57. Juncus bufonius 57. Agrostis vulgaris 57, 78. Rubus cfr hirtus 57. Arabis Halleri 57. Deschampsia caespitosa 57. Quercus rubra c 57. Oxalis acetosella 75. Poa annua 78. Hieracium cfr Lachenalii 78. Luzula nemorosa 78. Rumex crispus 78. Hieracium cfr pilosella 78. Salix silesiaca c 78. Anthoxanthum odoratum 78. Holcus mollis 95. Stellaria graminea 95. Rhytidiadelphus squarrosus 75. Plagiothecium succulentum 41, 57.

Tabela 9 - Table 9

Zbiorowisko boru mieszanego: Pineto-Quercetum w facji Molinia arundinacea

Sylvan coniferous-broadleaved mixed community: Pineto-Quercetum, facies Molinia arundinacea

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	28	40	45	51	52	53	65	79	86	97	
Leśnictwo Forestry	Wygorzele		K o s t u c h n a				Lędzi- ny	Kos- tuchna	Lędziny		
Nr oddziału No. of division	157	221	158	130	132	154	235	137	172	148	
Data wykonania zdjęcia Date of record	13.9 1958	16.9 1958	16.9 1958	17.9 1958	17.9 1958	17.9 1958	19.9 1958	17.8 1959	18.8 1959	15.9 1959	
Wysokość m n.p.m. Altitude above sea level	265	255	265	255	265	265	270	275	260	270	
Ekspozycja Exposition	-	S-SW	SW	S-SW	S	S	W	N-NW	-	SE	
Nachylenie terenu w stopniach Inclination of area - grades	-	5	2	8	7	1	3	1	-	3	
Ukształtowanie terenu Configuration of the territory	w y r ó w n a n y f l a t			p o f a l d o w a n y u n d u l a t e d		w y r ó w n a n y f l a t			w g ł ę b . p o f a l d . d e p r e s . u n d u l .		
Pokrycie koron drzew % Cover of trees	a	20	75	65	60	20	70	40	100	75	50
Pokrycie warstwy krzewów % Cover of shrubs	b	35	40	20	5	50	1	30	1	1	1
Pokrycie runa Cover of ground flora	% c	100	85	50	100	100	80	100	100	100	100
Pokrycie mszaków % Cover of mosses		-	15	5	5	-	10	-	1	30	5
Powierzchnia zdjęcia w arach Area of record in 100 square m.	25	50	60	2	25	50	3	2	2	4	

Constancy

Stopień stałości

Vaccinio-Piceion

Picea excelsa a	r	.	1.1	1.1	3.2	1.1	1.1	.	1.1	.	IV
Picea excelsa b	3.2	3.2	3.1	1.1	+	+	1.1	r	+	.	V
Picea excelsa c	.	+	+	.	+	.	+	.	.	+	III
Pteridium aquilinum	1.1	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	4.3	+	.	+ 3	V
Vaccinium vitis-idaea	+ 2	1.2	+	+	.	.	3.2	r	+ 2	+ 2	IV
Deschampsia flexuosa	+ 3	+ 3	1.3	+ 3	+ 3	+ 2	1.3	+ 2	3.4	.	V
Vaccinium myrtillus	.	1.3	+ 2	+ 2	.	.	1.2	+ 2	1.2	+ 2	IV
Vaccinium uliginosum	.	1.2	.	.	.	.	1.2	.	2.3	.	II
Trientalis europaea	.	+ 2	+	+	.	.	+	r	+	.	III
Sphagnum Girgensohnii	.	1.3	.	.	.	1.3	.	.	.	+ 3	II
Pleurozium Schreberi	.	1.4	+ 2	.	.	1.2	.	.	3.3	.	II
Polytrichum formosum	.	1.3	.	+ 3	.	1.3	.	+ 2	2.2	.	III

Gatunki towarzyszące
Accompanying species

Pinus silvestris a	2.1	4.1	4.1	4.1	1.1	4.1	4.1	5.1	5.1	3.1	V
Pinus silvestris b	3.2	.	.	.	.	.	1.1	.	+	+	II
Pinus silvestris c	+	+	.	.	+	.	+	.	.	+	III
Quercus robur a	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Quercus robur b	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I
Quercus robur c	+	+	+	+	.	.	.	+	.	.	III
Quercus sessilis a	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Quercus sessilis b	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Quercus sessilis c	+	+	+	.	.	+	+	.	.	+	III
Betula verrucosa a	2.2	.	+	.	1.1	.	1.1	+	.	.	III
Betula verrucosa b	+	.	r	.	4.3	.	2.1	r	.	+	III
Betula verrucosa c	.	.	.	.	1.2	.	+	.	.	+	II
Betula pubescens a	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Betula pubescens b	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	I
Betula pubescens c	.	+	+	+	+	+	.	r	+	.	IV
Populus tremula a	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+
Populus tremula b	1.1	.	.	.	1.1	.	.	r	.	+	II
Populus tremula c	+	+	.	.	.	+	+	+	.	+	III
Salix aurita b	+ 2	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I
Salix aurita c	+ 2	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I
Frangula alnus b	.	.	.	.	+	.	2.2	r	.	.	II
Frangula alnus c	+	+	.	+	.	.	+	+	.	.	III
Molinia arundinacea	4.4	3.4	4.4	1.4	3.2	1.3	2.4	5.5	1.2	5.5	V
Calluna vulgaris	1.3	+ 2	+ 2	.	.	.	+ 2	.	+ 2	1.3	III
Calamagrostis epigeios	+ 3	.	.	.	2.4	.	.	.	1.3	.	II
Agrostis vulgaris	+ 2	.	.	+ 3	.	.	.	.	+ 2	.	II
Dryopteris spinulosa	.	+	+	+	+	+	.	.	1.1	.	III
Chamaenerion angustifolium	.	+ 2	+ 4	+ 2	2.4	4.4	.	.	.	.	III
Calamagrostis villosa	.	+ 3	+ 4	1.4	1.3	+ 3	+	+ 2	.	+ 2	IV

Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species	3	2	10	7	11	14	-	3	5	1	= 56
---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	------

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Epilobium montanum 45. Scrophularia nodosa 52. Galium cfr palustre 86. Solanum dulcamara 51. Dryopteris austriaca 86. Polytrichum commune 97. Larix decidua a 28,79, b 28. Festuca cfr ovina 28. Rubus cfr plicatus b 51, c 28,52. Juncus bufonius 40,52. Mycelis muralis 45,51. Sambucus racemosa b 51,52, c 45. Rubus idaeus c 45,53. Fagus sylvatica c 45. Rumex acetosa 53. Hypochaeris radicata 45. Eupatorium cannabinum 51,52. Salix caprea b 52, c 45,51. Deschampsia caespitosa 52. Athyrium filix-femina 52,53. Senecio Fuchsii 52,53. Cirsium rivulare 52,53. Lysimachia vulgaris 52. Galeopsis tetrahit 53. Carex pallescens 53. Sambucus nigra c 53. Rubus cfr hirtus c 53. Tussilago farfara 53. Senecio vulgaris 53. Cirsium oleraceum 53. Salix silesiaca c 79. Ledum palustre 86. Stellaria graminea 86. Veronica chamaedrys 86. Rhytidadelphus squarrosus 79. Bryum capillare 53. Plagiochila asplenoides 45. Brachythecium velutinum 45. B. salebrosum 40. Plagiothecium succulentum 45,51,53.

Tabela 10 - Table 10

Zbiorowisko boru mieszanego: Pineto-Quercetum

w facji Vaccinium myrtillus

Sylvan coniferous-broadleaved mixed community: Pineto-Quercetum

facies Vaccinium myrtillus

Nr zdjęcia fitosocjologicznego	43	49	93	101	Stopień stałości - Constancy
No. of record					
Leśnictwo	Wygo-	Kos -			
Forestry	rzele	tuchna	Lędziny		
Nr oddziału	237	133	190	190	
No. of division					
Data wykonania zdjęcia	16.9	16.9	14.9	15.9	
Date of record	1958	1958	1959	1959	
Wysokość m n.p.m.	260	265	250	260	
Altitude above sea level					
Ekspozycja	S	S	W	W	
Exposition					
Nachylenie terenu w stopniach	3	3	2	2	
Inclination of area - grades					
Ukształtowanie terenu	w y r ó w n a n y				
Configuration of the territory	f l a t				
Pokrycie koron drzew % a	65	60	75	80	
Cover of trees					
Pokrycie warstwy krzewów % b	1	5	20	15	
Cover of shrubs					
Pokrycie runa % c	80	100	100	100	
Cover of ground flora					
Pokrycie mszaków %	10	5	5	1	
Cover of mosses					
Powierzchnia zdjęcia w arach	3	1	4	2	
Area of record in 100 square m.					

Vaccinio-Piceetea

Picea excelsa a	1.1	.	1.1	1.1	IV
Picea excelsa b	+	1.1	1.1	2.2	V
Vaccinium myrtillus	3.5	4.4	4.4	4.3	V
Vaccinium vitis-idaea	1.2	+	+ 2	+ 2	V
Vaccinium uliginosum	.	.	r	r	II
Trientalis europaea	.	+	.	+ 2	II
Deschampsia flexuosa	3.3	1.3	3.3	3.3	V
Pleurozium Schreberi	.	1.3	+ 3	.	II
Polytrichum formosum	2.4	.	.	+ 3	II

Gatunki towarzyszące
Accompanying species

Pinus silvestris a	4.1	4.1	4.1	5.1	V
Pinus silvestris b	.	.	1.2	.	I
Pinus silvestris c	+	.	+	.	II
Quercus sessilis b	.	.	+	.	I
Quercus sessilis c	+	+	.	+	III
Populus tremula c	+	.	+	+	III
Calamagrostis villosa	+ 3	1.2	+ 3	+ 3	V
Chamaenerion angustifolium	+ 2	.	.	+	II
Poa annua	+ 3	.	+ 2	.	II
Calamagrostis epigeios	+ 3	.	.	+ 2	II
Athyrium filix-femina	+	+	+ 2	+	V
Frangula alnus b	.	.	+	.	I
Frangula alnus c	+	.	+	.	II
Hieracium cfr pilosella	+ 2	.	+	.	II
Molinia arundinacea	.	2.3	+	1.2	III
Calluna vulgaris	.	+ 2	+ 2	+ 2	III
Dryopteris spinulosa	.	.	1.2	+	II

Liczba gatunków sporadycznych	16	1	6	2	= 25
Number of sporadic species					

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Quercus robur a 43, b 49. Epilobium montanum 43. Carex pilulifera 43. Juncus conglomeratus 43. Rubus cfr hirtus c 43. Rubus cfr plicatus b 93, c 43. Potentilla anserina 43. Solanum dulcamara 43. Holcus mollis 43. Sambucus racemosa c 43. Rumex acetosella 43. Polygonum aviculare 43. Hieracium cfr murorum 43. Betula pubescens c 43. Arabis Halleri 43. Anthoxanthum odoratum 93. Betula verrucosa c 93. Plantago media 93. Leontodon hispidus 101. Stellaria graminea 101. Eurhynchium Zetterstedtii 93. Polytrichum commune 93.

Tabela 11 - Table 11

Zbiorowiska przejściowe oraz zupełnie zniekształcone: zręby, uprawy, nieużytki..

Transition- and deformed sylvan communities

Nr zdjęcia fitosocjologicznego No. of record	16	26	58	72	73	76	77	106	107	108	66	Constancy <
---	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	--

Querceto-Fagetea

Carex digitata	.	+ 2	+ 2	+ 2	.	.	.	.	.	.	.	+ 2	II
Scrophularia nodosa	.	.	.	+	+	.	+ 2	.	.	.	.	.	I

Vaccinio-Piceetea

Picea excelsa a	3.3	3.1	4.2	3.1	+	3.1	.	3.1	2.1	1.1	1.1	V
Picea excelsa b	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	1.1	I
Picea excelsa c	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	+	I
Deschampsia flexuosa	+ 2	1.2	+ 3	1.3	1.3	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	.	4.4	V
Vaccinium myrtillus	.	+ 2	+	.	+ 2	+	.	.	+ 2	.	1.2	III
Pteridium aquilinum	.	.	+	+ 2	1.2	.	.	.	.	.	+ 4	II
Trientalis europaea	.	.	.	.	+ 2	.	+	.	.	.	+	I
Polytrichum formosum	.	.	1.4	1.3	+ 4	1.4	.	.	.	.	1.3	II

Gatunki towarzyszące
Accompanying species

Pinus silvestris a	1.1	1.1	1.1	4.1	4.1	2.1	5.1	+	1.1	+	4.1	V
Pinus silvestris b	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	4.2	I
Pinus silvestris c	+	.	.	.	+ 2	.	.	.	.	.	+	I
Quercus robur a	+	.	.	.	+	.	.	+	2.1	1.1	.	II
Quercus robur b	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	I
Quercus robur c	+	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	I
Betula verrucosa a	+	2.2	.	1.1	.	.	.	3.1	3.1	4.1	.	III
Betula verrucosa b	1.1	+	+	+	+ 2	1.1	.	.	.	.	1.2	III
Betula verrucosa c	+	+	.	+	.	.	.	+	+	+	+	III
Populus tremula a	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I
Populus tremula b	1.1	.	+	3.4	3.3	3.3	.	.	2.1	+	.	III
Populus tremula c	+	.	+	+	+	.	.	+	1.1	+	.	III
Quercus sessilis a	.	+	.	+	.	.	.	.	2.1	.	.	I
Quercus sessilis b	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I
Quercus sessilis c	.	+	.	+	+	.	+	+	.	.	+	III
Sambucus racemosa b	+	.	+	+ 2	+	.	3.2	.	.	+	.	III
Sambucus racemosa c	+	+	+	.	.	.	+	+	+	.	.	II
Sambucus nigra b	+	+	.	.	.	.	1.2	.	.	1.1	.	II
Sambucus nigra c	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I
Frangula alnus b	.	.	.	.	1.2	1.1	+ 2	.	.	.	+ 2	II
Frangula alnus c	+	+	+	.	+	+	+	+	+	+	+	V
Rubus cfr plicatus b	.	.	.	+	+ 2	+ 2	+ 2	.	.	.	.	II
Rubus cfr plicatus c	+	.	.	+ 2	+	+	+	.	.	.	+	III
Chamaenerion angustifolium	4.5	+ 2	4.4	4.3	3.2	4.4	1.2	3.3	4.4	4.4	.	V
Juncus effusus	+ 2	+ 2	+ 2	1.2	1.2	1.2	.	1.2	1.2	1.2	.	V
Calamagrostis epigeios	2.3	+ 2	+ 3	+ 3	+ 2	1.3	+	+ 3	+ 3	1.3	+	V
Calamagrostis villosa	.	.	+ 2	+ 4	1.4	1.4	.	+ 3	.	.	+ 4	III
Athyrium filix-femina	+	.	+	+	1.1	+	+	.	.	+	+	IV
Agrostis vulgaris	+ 3	+ 2	.	+ 3	1.2	+ 2	1.3	+ 2	+ 3	+ 3	+ 4	V
Poa annua	+ 2	.	.	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	.	+ 3	.	.	III
Mycelis muralis	+	.	.	1.1	+ 2	+	1.2	.	.	.	.	II
Carex pilulifera	+ 2	.	.	.	+ 2	.	.	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	III
Cerastium arvense	+ 3	+ 3	.	.	.	.	.	+ 2	+ 2	.	.	II
Dryopteris spinulosa	.	+	.	+	+	+	+	.	+	+	+	III
Deschampsia caespitosa	.	.	.	+ 2	.	1.2	+ 2	.	.	.	+ 2	II
Cirsium rivulare	.	.	.	+	+	+ 2	.	.	.	.	.	I
Molinia arundinacea	.	.	.	+ 2	+ 2	.	+ 2	.	.	.	.	I
Rumex acetosella	.	.	.	+ 3	.	.	+ 3	.	+ 2	+ 3	.	II
Lysimachia vulgaris	.	.	.	+ 2	+	.	3.3	.	.	.	.	I

Liczba gatunków sporadycznych Number of sporadic species	5	6	7	8	9	6	12	1	4	1	12	= 71
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	----	------

Gatunki występujące sporadycznie
Species occurring sporadically

Senecio Fuchsii 16,77. Hieracium cfr pilosella 16,107. Calamagrostis arundinacea 26. Rumex sanguineus 26. Carex hirta 26. Hieracium cfr murorum 26,73. Blechnum spicant 26,66. Dryopteris oreopteris 26,66. Betula pubescens c 58. Stellaria graminea 58,106. Sonchus arvensis 58. Salix caprea b 72, c 58,76. Potentilla silvestris 76. Luzula pilosa 73. Vaccinium vitis-idaea 66. Anthoxanthum odoratum 66. Festuca pratensis 66. Lycopodium clavatum 66. Salix cinerea c 66. Majanthemum bifolium 66. Calluna vulgaris 66. Salix aurita b 72,73. Fragaria vesca 72,73. Gnaphalium silvaticum 72. Galium cfr mollugo 72,77. Carex pallescens 73,107. Chaerophyllum aromaticum 73. Ranunculus repens 73. Vicia cracca 73. Verbascum nigrum 77. Hypericum perforatum 77. Holcus lanatus 77. Arctium Lappe 77. Tussilago farfara 77. Galeopsis tetrahit 77. Solidago virga-aurea 77. Fagus silvatica b 106. Hypochaeris radicata 107. Rubus cfr hirtus 107. Mnium normum 72. Bryum capillare 58. Sphagnum Girgensohnii 58. Dicranella heteromala 16. Plagiothecium denticulatum 16. Plagiothecium succulentum 16.

Zestawienie stałości gatunków lokalnie wyróżniających grupy zbiorowisk leśnych

List of constancy of species locally distinguishing the sylvan communities

Nr tabeli fitosocjologicznej No. of phytosociological table	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gatunki lokalnie wyróżniające łęgi oraz inne lasy liściaste Species locally distinguishing Alnetalia and other broadleaved forests											
Geum urbanum	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Dryopteris filix-mas	.	I	I	.	.	.	.	.	.	.	.
Stachys silvatica	III	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Glechoma hederacea	II	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Melica nutans	.	III	I	+	.	.	.	.	.	.	.
Tilia cordata a	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Tilia cordata b	.	I	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Tilia cordata c	.	I	I	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulmus laevis a	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ulmus laevis b	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Acer pseudoplatanus b	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acer pseudoplatanus c	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.
Phyteuma spicatum	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Dactylis glomerata	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus lanuginosus	II	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Angelica silvestris	I	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bromus Benekenii	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Hieracium sabaudum	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Polygonatum verticillatum	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Galium boreale	+	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gatunki przeważające w łęgach oraz w innych lasach liściastych Species predominating in Alnetalia and other broadleaved forests											
Urtica dioica	V	III	I	+	+	.	+	.	.	.	.
Carex brizoides	V	V	IV	II	.	.	II	.	.	.	I
Festuca gigantea	V	III	III	+	.	.	I	.	.	.	.
Deschampsia caespitosa	V	IV	III	II	.	+	I	+	+	.	II
Aegopodium podagraria	III	+	I	.	.	.	+	.	.	.	.
Cirsium oleraceum	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rubus caesius b	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rubus caesius c	I	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
Calamagrostis arundinacea	+	III	IV	III	I	+	III	.	.	.	+
Oxalis acetosella	IV	IV	III	.	.	.	I	+	.	.	.
Pirola rotundifolia	.	.	I	.	.	.	+	.	.	.	.
Convallaria majalis	.	.	I	.	.	+	.	.	.	.	.
Scrophularia nodosa	II	+	I	.	.	.	II	.	+	.	I
Pirola minor	.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	.
Arabis Halleri	III	I	I	I	.	.	II	+	.	I	I
Dryopteris austriaca	II	+	+	+	.	.	+	+	+	.	.
Galium palustre	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Brachypodium silvaticum	III	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.
Ajuga reptans	II	+	+	.	.	.	+	.	.	.	.
Galeopsis tetrahit	II	III	II	+	I	.	+	.	+	.	+
Carex digitata	.	II	.	+	.	.	I	+	.	I	II
Poa nemoralis	.	I	+	+	.	.	+	.	.	.	.
Solanum dulcamara	III	.	.	.	.	.	.	.	+	I	.
Carex silvatica	.	I	+	.	.	.	+	.	.	.	.
Lysimachia vulgaris	IV	III	I	.	.	.	+	.	+	.	I
Rumex crispus	III	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.
Equisetum silvaticum	IV	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.
Carex pilulifera	.	II	+	II	II	+	+	.	.	I	III
Ranunculus repens	IV	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Alnus glutinosa a	V	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
Alnus glutinosa b	V	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.
Alnus glutinosa c	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carpinus betulus a	II	V	I	.	.	.	.	.	.	.	.
Carpinus betulus b	+	III	+	.	.	+	+	.	.	.	.
Carpinus betulus c	.	IV	+	.	.	+	.	.	.	.	.
Fagus silvatica a	.	V	V	V	.	.	II	.	.	.	.
Fagus silvatica b	.	II	IV	III	.	I	II	+	.	.	+
Fagus silvatica c	+	III	III	III	.	+	II	I	+	.	.
Fraxinus excelsior a	III	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Fraxinus excelsior b	III	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Fraxinus excelsior c	I	+	I	.	.	.	+	.	.	.	.
Chaerophyllum aromaticum	II	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+
Veronica chamaedrys	I	I	I	.	.	.	+	.	+	.	.
Cirsium rivulare	IV	.	.	.	.	.	+	.	I	.	I
Veronica officinalis	.	+	+	+	.	.	+	.	.	.	.
Viola silvestris	.	+	I	.	.	.	+	.	.	.	.
Viola Riviniana	.	+	I	+	.	.	+	.	.	.	.
Majanthemum bifolium	+	III	II	I	.	.	II	.	.	.	.
Luzula nemorosa	.	+	I	I	.	.	II	+	.	.	.
Epipactis latifolia	.	I	II	.	+	.	+	.	.	.	.
Catharinaea undulata	.	I	I	+	+	.	+	.	.	.	I
Gatunki przeważające w lasach mieszanych i borach mieszanych Species predominating in mixed and coniferous forests											
Vaccinium vitis-idaea	.	.	+	.	IV	V	II	III	IV	V	+
Trientalis europaea	.	+	+	.	IV	I	III	III	III	II	I
Pteridium aquilinum	.	I	+	II	V	III	II	III	V	.	II
Molinia arundinacea	.	.	+	+	III	II	+	IV	W	III	I
Polytrichum formosum	.	I	.	I	I	.	I	III	III	II	II
Potentilla silvestris	.	+	.	.	II	+	+	.	.	.	I
Betula pubescens a	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.
Betula pubescens b	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.
Betula pubescens c	.	.	.	.	+	.	.	II	IV	I	I
Salix aurita b	.	.	.	.	.	.	+	.	I	.	I
Salix aurita c	.	.	+	.	.	.	+	I	I	.	.
Carex pallescens	.	.	.	I	+	I	+	I	+	.	I
Salix caprea a	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix caprea b	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	+
Salix caprea c	.	.	.	+	+	I	.	.	I	.	I
Plagiothecium succulentum	.	.	.	+	+	.	+	I	II	.	+
Plagiothecium denticulatum	.	.	.	+	.	.	I	.	.	.	+
Epilobium montanum	.	+	.	.	+	.	+	.	+	I	I
Blechnum spicant	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	I
Gatunki lokalnie wyróżniające lasy mieszane i bory mieszane Species locally distinguishing mixed and coniferous forests											
Pleurozium Schreberi	.	.	.	.	III	IV	I	II	II	II	.
Galluna vulgaris	.	.	.	.	II	V	+	.	III	III	+
Hypochoeris radicata	.	.	.	.	I	.	II	I	+	.	+
Senecio vulgaris	.	.	.	.	I	+	+	+	.	.	.
Nardus stricta	.	.	.	.	+	III	+	.	.	.	.
Melampyrum nemorosum	.	.	.	.	+	II	II	.	.	.	.
Salix silesiaca b	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+
Salix silesiaca c	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	+
Rumex acetosella	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I	II
Vaccinium uliginosum	.	.	.	.	.	.	.	+	II	II	.
Dryopteris creoptera	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I
Sphagnum Girgensohnii	.	.	.	.	.	.	.	II	II	.	+
Polytrichum commune	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I	.
Dicranella heteromala	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	+
Bryum capillare	.	.	.	.	+	.	+	.	+	.	+
Festuca cfr ovina	.	.	.	.	.	II	.	.	+	.	.

Tabela 13 - Table 13

Zestawienie stałości gatunków lokalnie wyróżniających grupy zbiorowisk leśnych

List of constancy of species locally distinguishing the sylvan communities

Nr tabeli fitosocjologicznej No. of phytosociological table	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Tabela 12 - Table 12

Stażność fitosocjologicznych grup gatunków w wyróżnionych zbiorowiskach leśnych

Constancy of phytosociological groups of species in sylvan communities

Nr tabeli fitosocjologicznej No. of phytosociological table	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alnetes, Alnetalia i Alnion glutinosae											
Calamagrostis canescens	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex elongata	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lycopus europaeus	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Solanum dulcamara	III	.	.	.	.	.	.	.	+	I	.
Querceto-Fagetes											
Carex digitata	.	II	.	+	.	.	I	+	.	I	II
Corylus avellana	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.
Eurhynchium Zetterstedti	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.
Evonymus europaea	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Geum urbanum	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Melica nutans	.	III	I	+	.	.	.	.	.	.	.
Poa nemoralis	.	I	+	+	.	.	+	.	.	.	.
Viola silvestris	.	+	I	.	.	.	+	.	.	.	.
Fagetalia											
Acer platanoides	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Fraxinus excelsior	III	+	I	.	.	.	+	.	.	.	.
Ulmus scabra	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Aegopodium podagraria	III	+	I	.	.	.	+	.	.	.	.
Alliaria officinalis	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Brachypodium silvaticum	III	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.
Carex silvatica	.	I	+	.	.	.	+	.	.	.	.
Catharinaea undulata	.	I	I	+	+	.	+	.	.	.	I
Epilobium montanum	.	+	.	.	+	.	+	.	+	I	I
Galeobdolon luteum	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mercurialis perennis	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Milium effusum	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Paris quadrifolia	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phyteuma spicatum	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus lanuginosus	II	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Viburnum opulus	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Alno-Padion											
Ulmus laevis	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Agropyron caninum	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex remota	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chaerophyllum hirsutum	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chrysosplenium alternifolium	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Equisetum silvaticum	IV	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.
Equisetum pratense	II	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Festuca gigantea	V	III	III	+	.	.	I	.	.	.	.
Mnium undulatum	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stachys silvatica	III	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Carpinion											
Carpinus betulus	II	V	I	.	.	+	+	.	.	.	.
Tilia cordata	.	I	I	.	.	.	.	.	.	.	.
Galium Schultesii	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fagion											
Acer pseudoplatanus	+	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.
Fagus silvatica	+	III	IV	III	.	I	II	I	+	.	+
Quercetalia pubescentis i Quercion pubescentis-sessiliflorae											
Polygonatum odoratum	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
Vincetoxicum officinale	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vaccinio-Piceetea											
Sorbus aucuparia	+	III	V	II	II	III	IV	II	III	I	III
Calamagrostis arundinacea	+	III	IV	III	I	+	III	.	.	.	+
Deschampsia flexuosa	.	IV	III	V	V	V	V	V	V	V	V
Pleurozium Schreberi	.	.	.	.	III	IV	I	II	II	II	.
Pteridium aquilinum	.	I	+	II	V	III	II	III	V	.	II
Solidago virga-aurea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Vaccinio-Piceetalia											
Dryopteris austriaca	II	+	+	+	.	.	+	+	+	.	.
Pirola minor	.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	.
Pirola secunda	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.
Trientalis europaea	.	+	+	.	IV	I	III	III	III	II	I
Vaccinium myrtillus	.	IV	III	IV	V	V	V	V	IV	V	III
Vaccinium vitis-idaea	.	.	+	.	IV	V	II	III	IV	V	+
Pineto-Quercion											
Populus tremula	.	II	I	III	III	III	II	II	III	III	III
Hieracium sabaudum	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
Pirola rotundifolia	.	.	I	.	.	.	+	.	.	.	.
Polytrichum formosum	.	I	.	I	I	.	I	III	III	II	II
Veronica officinalis	.	+	+	+	.	.	+	.	.	.	.
Vaccinio-Piceion											
Bazzania trilobata	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Sphagnum Girgensohnii	.	.	.	.	.	.	.	II	II	.	+
Vaccinium uliginosum	.	.	.	.	.	.	.	+	II	II	.

Tabela 14 - Table 14

Zestawienie stałości występowania gatunków pospolitych w lasach

List of constancy of species common in forests

Nr tabeli fitosocjologicznej No. of phytosociological table	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gatunki występujące pospolicie z wyjątkiem łęgów: Fraxinetum-Alnetum Species common in forests with exception of Fraxinetum-Alnetum											
<i>Deschampsia flexuosa</i>	.	IV	III	V	V	V	V	V	V	V	V
<i>Vaccinium myrtillus</i>	.	IV	III	IV	V	V	V	V	IV	V	III
<i>Pinus silvestris</i> a	.	III	I	III	V	V	IV	V	V	V	V
<i>Pinus silvestris</i> b	.	+	.	+	II	III	I	.	II	I	I
<i>Pinus silvestris</i> c	.	+	.	+	II	V	I	+	III	II	I
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	.	II	+	I	IV	+	III	III	III	II	V
<i>Betula verrucosa</i> a	.	+	I	+	I	.	III	+	III	.	III
<i>Betula verrucosa</i> b	.	II	+	II	II	III	II	I	III	.	III
<i>Betula verrucosa</i> c	.	II	+	I	I	III	III	II	II	I	III
<i>Luzula pilosa</i>	.	IV	V	IV	II	II	IV	II	.	.	I
<i>Populus tremula</i> a	.	+	+	.	+	.	+	.	+	.	I
<i>Populus tremula</i> b	.	I	+	I	II	III	I	I	II	.	III
<i>Populus tremula</i> c	.	II	I	III	III	II	II	II	III	III	III
<i>Quercus sessilis</i> a	.	IV	IV	II	.	+	III	.	+	.	I
<i>Quercus sessilis</i> b	.	II	+	I	III	II	II	II	+	I	I
<i>Quercus sessilis</i> c	.	III	I	II	III	V	IV	IV	III	III	III
<i>Hieracium cfr pilosella</i>	.	.	+	+	II	+	I	+	.	II	I
<i>Luzula campestris</i>	.	+	+	I	+	I	.	.	.	.	.
Gatunki występujące pospolicie Species common in forests											
<i>Frangula alnus</i> b	II	+	+	II	+	I	II	III	II	I	II
<i>Frangula alnus</i> c	I	+	I	I	III	II	III	II	III	II	V
<i>Calamagrostis villosa</i>	I	IV	II	III	IV	II	II	III	II	II	V
<i>Calamagrostis epigeios</i>	I	II	+	I	II	II	II	V	IV	V	III
<i>Picea excelsa</i> a	I	II	I	II	III	II	II	IV	IV	IV	V
<i>Picea excelsa</i> b	III	II	II	I	V	III	V	V	IV	V	I
<i>Picea excelsa</i> c	.	II	I	I	III	II	II	I	III	.	I
<i>Sorbus aucuparia</i> a	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Sorbus aucuparia</i> b	+	II	III	II	II	II	III	II	I	II	II
<i>Sorbus aucuparia</i> c	+	III	V	II	II	III	IV	II	III	I	III
<i>Agrostis vulgaris</i>	I	III	II	II	II	III	IV	I	II	.	V
<i>Dryopteris spinulosa</i>	III	III	III	II	III	.	III	V	III	II	III
<i>Athyrium filix-femina</i>	III	III	IV	II	II	.	II	III	I	V	IV
<i>Mycelis muralis</i>	I	IV	I	.	I	.	I	II	I	.	II
<i>Senecio Fuchsii</i>	+	+	+	.	I	.	+	+	I	.	I
<i>Rubus cfr hirtus</i> c	II	.	II	+	+	.	I	+	+	I	+
<i>Sambucus racemosa</i> b	+	II	+	+	+	.	II	+	I	.	III
<i>Sambucus racemosa</i> c	+	+	I	+	II	.	.	+	I	I	II
<i>Rubus cfr plicatus</i> b	+	II	.	I	II	.	+	I	+	I	II
<i>Rubus cfr plicatus</i> c	.	I	.	I	I	I	II	III	I	I	III
<i>Quercus robur</i> a	I	V	IV	II	.	.	III	+	+	I	II
<i>Quercus robur</i> b	+	II	+	+	I	II	II	II	I	I	I
<i>Quercus robur</i> c	+	II	I	II	I	III	III	III	III	.	I
<i>Rubus idaeus</i> b	I	II	I	.	.	.	+	+	.	.	+
<i>Rubus idaeus</i> c	II	II	II	.	+	.	II	I	I	.	I