Roślinność wodna Jeziora Zegrzyńskiego

Vegetation of artificial lake at Zegrze

H. TOMASZEWICZ

WSTĘP

Celem niniejszej pracy było zbadanie roślinności Jeziora Zegrzyńskiego (Zalewu Zegrzyńskiego), który powstał wskutek zamknięcia koryta Narwi zaporą w Dębem i spiętrzenia wód Narwi i Bugu. Woda została spiętrzona w 1963 roku, tak więc obecny stan roślinności jest wynikiem pięcioletniego procesu jej rozwoju.

Powierzchnia całego jeziora wraz z cofką wynosi około 3300 ha. Cofka sięga na Narwi po Pułtusk (od Zegrza 35 km), a na Bugu — po Barcice (od Zegrza 26 km). Pojemność zbiornika wraz z cofką ocenia się na przeszło 90 mln m³ wody. Głębokość jeziora wynosi koło zapory pod Dębem 5,7 m, zaś minimalna tranzytowa na całym zalewie 2 m.

Badania w obrębie zalewu zostały ograniczone do miejsc zalanych po obu stronach koryta Narwi. Szczegółowo przeprowadzono je na odcinku zalewu od miejscowości Kacice do miejscowości Łacha. Powyżej Kacic wykonano tylko kilka zdjęć fitosocjologicznych, ponieważ zalane są tam małe obszary przybrzeżne, a tylko woda w Narwi ma podwyższony poziom i płynie wartkim nurtem. Poniżej Łachy gdzieś tam występują małe skupienia roślin wodnych i fragmentarycznie rozwinięte zbiorowiska szuwarowe. Najlepiej rozwinięta ilościowo i jakościowo roślinność wodna i szuwarowa występuje na odcinku dawnego koryta Narwi pomiędzy Łubiennicą i Dzierżeninem, więc głównie tam skoncentrowano badania. Akwen wybrany do szczegółowego opracowania jest najbardziej bogaty i różnorodny pod względem roślinności z całego zalewu. W pozostałych częściach zalewu nie spotykano żadnych nowych gatunków ani zbiorowisk roślinnych. Występują tam te same zbiorowiska tworząc małe, przybrzeżne skupienia. W związku z tym nie było celowe przeprowadzanie szczegółowych badań wzdłuż całego zalewu.

Większość zdjęć fitosocjologicznych i transekty pasowe wykonano po lewej stronie zalewu, ponieważ prawy brzeg jest wysoki i przy nim zwy-

kle przebiega koryto Narwi. Lewą krawędź zalewu tworzy sztucznie usypany wał. Od koryta do wału rozciąga się olbrzymie rozlewisko z bujną i różnorodną roślinnością.

Nie uwzględniono w tym opracowaniu roślinności pozostałej na nie zatopionych łąkach oraz przybrzeżnych zarośli wierzbowych.

Pracę niniejszą wykonano w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. dr A. Skirgiełło pragnę podziękować za pomoc w pracy. Dziękuję również doc. drowi Z. Podbielkowskiemu za cenne rady i wskazówki.

METODY PRACY

Badania nad roślinnością w Jeziorze Zegrzyńskim były prowadzone w okresie 3.07.—8.08.67 r. Wykonano metodą Braun-Blanqueta 185 zdjęć fitosocjologicznych, z których 177 zestawiono w tabelę. Zrobiono również w skali 1 : 500 osiem transektów pasowych (o szerokości 50 m) od wału do koryta Narwi. Z tego 2 dołączono do pracy dla zobrazowania stosunków socjalnych roślin. Przy umiejscawianiu transektów wybierano miejsca reprezentatywne i różnorodne. Aby można było transekty z tych samych miejsc powtórzyć w latach następnych, zostały one zrobione przy słupach kamiennych oznaczających długość wału co 100 m. Na transekcje z prawej lub lewej strony zaznaczono słup z liczbą kilometrową.

Transekt od wału do koryta Narwi wyznaczano z obu stron tyczkami co 25 m. Następnie przez środek transektu przeciągano sznur z pływakami długości 100 m, oznaczony co 5 m. Po dokonaniu tych czynności nanoszono zbiorowiska roślinne na papier milimetrowy zaczynając od wału. Do mniejszych pomiarów używano dziesięciometrowego sznura z oznaczeniami co 1 m oraz tyczki o długości 2,5 m oznaczonej co 0,5 m. Przy zbiorowiskach szuwarowych dodatkowo wyłamywano szuwar przed wytyczeniem tyczkami i sznurem lub robiono transekt tak, aby jeden z boków był otwartym lustrem wody z roślinnością wodną.

Po zalewie poruszano się łodzią „pychówką”. Głębokość wody mierzono wiosłem 3 m długości z oznaczeniami co 0,2 m.

Przy robieniu zdjęć fitosocjologicznych nie wyznaczano żadnych kwadratów, lecz robiono je z całych, jednorodnych płatów, których powierzchnia była różna i wahała się w granicach od 10 do 500 m². W miejscach głębszych nurkowano przy użyciu tzw. „fajki” (rurki oddechowej) i maski.

Klasyfikację zbiorowisk roślinnych wykonałem głównie na podstawie pracy Oberdorfera (1957). Korzystałem również z prac: Dąb-skiej (1961), Donselaara (1961), Kępczyńskiego (1960, 1965), Ellenberga (1963), Rolli (1938), Matuszkiewicza (1962),

Oberdorfera (1949), Miyawaki i Tüxena (1960), Scamoniiego (1967), Cwiertni (1966), Sławińskiego (1949), Podbielkowskiego (1967), Pawłowskiego (1959), Tüxena (1937, 1955, 1956), Balátovej-Tulačkovéj (1963).

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA AKWENU, ROŚLINNOŚCI I JEJ ROZMIESZCZENIA W ZALEWIE

W wyniku spiętrzenia wód Narwi i Bugu zostały zalane tereny, na których przedtem były pastwiska, pola uprawne, łąki, starorzecza itp. Były tu miejsca położone na różnej wysokości, co można stwierdzić na podstawie obecnej głębokości. Tu i ówdzie pozostały wyższe miejsca wyniesione często jeszcze teraz na kilkadziesiąt centymetrów ponad wodę, na których pozostała rodzima roślinność z przed pięciu lat.

Podłoże w miejscach, gdzie nie ma nurtu, ma charakter mulisty. Na twardym podłożu leży kilkudziesięciocentymetrowa warstwa osadu organiczno-mineralnego. Płycizny w pobliżu koryta mają podłoże piaszczyste.

Od Pułtuska do Grabowca zaznacza się jedynie podniesiony poziom wody w Narwi, która płynie wartkim nurtem. Występują tu tylko nie-duże rozlewiska przybrzeżne. Prawy brzeg jest stromy i wysoki, lewy łagodny i niski. W okresie badań poziom wody utrzymywał się tu w korycie. Poniżej Grabowca z lewej strony od koryta do wału występują różnej wielkości rozlewiska w miejscach niżej położonych i tam, skąd wybrana została ziemia do usypania wału. Są to akweny mało interesujące bądź zniszczone przez wypasanie bydła. Dopiero od Strzyży, od wału do koryta utworzyło się jedno duże rozlewisko. W miarę posuwania się w dół zalewu poziom wody wzrasta, a nurt Narwi staje się coraz mniej widoczny.

Roślinność wodna i szuwarowa występuje głównie między wałem a korytem z lewej strony zalewu i między korytem a brzegiem z prawej strony. Ponieważ z różnych przyczyn głębokość wody jest bardzo zmienna w różnych miejscach, nie można stwierdzić żadnych prawidłowości w rozmieszczeniu roślin na zatopionych terenach. Nie ma tam ustabilizowanych i wykształconych stref i typowych zespołów roślinnych, ale jedynie bezładnie rozmieszczone głównie jednogatunkowe agregacje roślin wodnych i szuwarowych. Wyróżnione zespoły roślinne są gatunkowo uboższe od takich samych, jakie występują w starorzeczach Bugu i Narwi.

Bardzo często na powierzchni 300—400 m², przy głębokości 0,5—0,6 m, spotykano miejsca pozbawione roślin lub też płyty wielkości 10—20 m² z *Potamogeton perfoliatus* i takie same z *P. lucens*, kilka skupień *Typha latifolia* i *T. angustifolia* rosnących obok siebie, a także skupienia *Glyceria aquatica* i *Sparganium ramosum*. W innym miejscu na takiej samej głębokości rosła tylko *Phragmites communis* lub *Potamogeton pectinatus*.

Olbrzymie płaty z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum* występowały zarówno na głębokości 1,0—1,2 m, jak również na głębokości 2,0—2,5 m.

Tylko w zbiornikach sztucznych da się dobrze zaobserwować, jak duża jest amplituda ekologiczna poszczególnych gatunków.

Ponieważ poznane zbiorowiska są głównie zbiorowiskami jednogatunkowymi lub z małą domieszką innych gatunków, trudno jest mówić o socjalnych powiązaniach i zależnościach gatunkowych w obrębie danego skupienia. Prawdopodobnie z biegiem czasu wykształcą się wielogatunkowe zespoły roślinne, chociaż i to jest wątpliwe, gdyż jak twierdzi miejscowa ludność, ruszające na wiosnę lody wyrrywają wmarznięte w lód rośliny i niosą je w dół zalewu. Często w tych samych miejscach po okresie zimy wyrastają zupełnie inne skupienia roślin. Taki stan rzeczy na pewno nie pozwoli na szybkie ukształtowanie się stałych i określonych zbiorowisk roślinnych. Badania przeprowadzone w przyszłych latach pozwolą na sprawdzenie przypuszczeń i dalsze poznanie rozwoju roślinności w zalewie.

Wyróżnione zespoły i zbiorowiska roślinne

Klasa *Potametea* Tx. et Preisg. 42.

Rząd *Potametalia* W. Koch 26.

Związek *Nymphaeion* W. Koch 26.

Zespół *Myriophyllo-Nupharetum* W. Koch 26. (fragm.)

Zespół *Hydrocharo-Stratiotetum* Krusem. et Vlieger 37.

Zbiorowisko z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*

Związek *Eu-Potamion* W. Koch 26.

Zespół *Potametum lucentis* Hueck 31.

Zbiorowisko z *Potamogeton perfoliatus*

Zbiorowisko z *Potamogeton pectinatus*

Zbiorowisko z *Potamogeton natans*

Zbiorowisko z *Batrachium circinatum* i *Myriophyllum spicatum*

Klasa *Phragmitetea* Tx. et Preisg. 42.

Rząd *Phragmitetalia* W. Koch 26.

Związek *Phragmition* W. Koch 26.

Zespół *Scirpo-Phragmitetum* W. Koch 26. (fragm.)

Zespół *Glycerietum maximae* Hueck 31.

Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 26. (fragm.)

Zespół *Myriophyllo-Nupharetum* (tab. 1), podobnie jak inne zbiorowiska wodne w zalewie, w stadium inicjalnym ma charakter agregacji roślinnej. *Nuphar luteum* i *Nymphaea alba*, które w starorzeczach Bugu i Narwi występują z reguły razem i wraz z innymi gatunkami tworzą złożony zespół roślinny zajmujący określone części zbiorników, tutaj

występują oddzielnie i w obrębie zalewu rozmieszczone są zupełnie przypadkowo.

Głębokość, na jakiej spotykano płyty z *Nuphar luteum*, była różna i wahała się w granicach 1,8—3,2 m. Skupienia z *Nuphar luteum* zajmują większe powierzchnie niż z *Nymphaea alba* i są częstsze. Płyty z *N. alba* występują bardzo rzadko i tylko w postaci małych skupień rzędu 10—20 m². Głębokość wody w tych miejscach wynosiła 1,3—2,0 m. Podłoże w obu przypadkach jest mniej lub bardziej zamulone. Inne gatunki w tych zbiorowiskach występują rzadko i w małej ilości.

Średnie pokrycie przez roślinność wynosi około 80%.

Tabela 1 - Table 1
Myriophyllo-Nupharetum W.Koch 26 /fragm./

nr zdjęcia - No. of the record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Stalność Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
data - Date	6.8. 67	9.7. 67	8.7. 67	8.7. 67	7.7. 67	5.7. 67	7.7. 67	8.8. 67	7.7. 67	5.7. 67	6.8. 67	3.7. 67	3.7. 67		
Głębokość - Depth m	1,8- -2,3	2,3- -2,6	2,4- -2,6	2,6	2,4- -2,6	2,0- -2,5	1,5- -1,7	2,5- -2,8	2,8- -3,2	2,1	2,0	1,6	1,2		
Pokrycie - Cover %	90	80	80	90	80	80	40	70	50	50	100	70	100		
Powierzchnia zdjęcia Area of sample plot m ²	200	100	200	200	50	50	100	100	200	100	20	10	10		
gat. charakt. dla zespołu species charact. of the association															
<i>Nuphar luteum</i>	5.5	4.4	4.4	5.5	4.4	4.4	2.2	4.4	3.4	3.3	+	4.4	3.3	V 85	4462
<i>Nymphaea alba</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	4.4	3.3	II 23	1442
gat. charakt. dla związku species characteristic of the alliance <i>Nymphaeion</i>															
<i>Polygonum amphibium</i>	+	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II 30	3
<i>Stratiotes aloides</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I 8	1
gat. wyróżniające dla związku species differential of the alliance															
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	.	+	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	II 30	3
gat. charakt. dla kl. i rzędu species charact. of the class and the order <i>Potamogetalia</i>															
<i>Elodea canadensis</i>	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	1.1	II 23	40
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	I 8	38
gat. sporadyczne /Species sporadic/: <i>Equisetum limosum</i> /13/, <i>Menyanthes trifoliata</i> /13/, <i>Schoenoplectus lacustris</i> /7/;															
stanowiska zdjęć fitosocjologicznych: 5, 6, 9, 10 - Holendry; 3, 4, 8 - Burlaki; 1, 11 - Karniawek; 13 - Grabowiec;															
records' localization: 7, 12 - Łubiennica; 2 - Kruczy Borek															

Hydrocharo-Stratiotetum Krusem et Vlieger 37.

Zespół *Hydrocharo-Stratiotetum* (tab. 2) występuje tylko w jednym miejscu w Jeziorze Zegrzyńskim, koło Łubiennicy, z prawej strony jeziora. Jest to silnie wypłycone bezprzepływowe starorzecze, w którym prawdopodobnie przed spiętrzeniem wód również rozwijał się ten zespół. Ponieważ poziom wody na tym odcinku nie uległ zbyt dużemu podwyższeniu, dlatego omawiany zespół występuje tam w dalszym ciągu. Głębokość wody wahała się w granicach 0,8—1,1 m. Woda miała rdzawy

kolor i bardzo cuchnący zapach. Podłoże miało charakter mulisty. Gruba warstwa osadów dennych utworzona jest głównie z obumarłych, miejscowych roślin.

Gatunkiem budującym jest *Stratiotes aloides*. W mniejszych ilościach występuje drugi gatunek charakterystyczny zespołu — *Hydrocharis morsus-ranae*. Po całych płatach rozrzucone są pojedyncze okazy roślin szuwarowych. Wolne przestrzenie pomiędzy powyższymi roślinami wypełniają: *Spirodela polyrrhiza*, *Lemna trisulca* i *L. minor*.

Zespół *Hydrocharo-Stratiotetum* przechodzi w różnego typu jednogatunkowe zbiorowiska szuwarowe, najczęściej jednak graniczy z zespołem *Glycerietum maximae*. Na granicy tych dwóch zespołów występuje różnej szerokości pas utworzony przez *Equisetum limosum*.

Pokrycie przez roślinność wynosi 100%.

Tabela 2 - Table 2
Hydrocharo-Stratiotetum Krusem et Vlieger 37

Nr zdjęcia - No. of the record	1	2	3	4	5	6	Stość współczynnika pokrycia Coefficient of cover	Stość współczynnika pokrycia Coefficient of cover
Data - Date	3.7. 67	5.8. 67	5.8. 67	5.8. 67	5.8. 67	5.8. 67		
Głębokość - Depth m	0,9- -1,0	0,9- -1,1	1,0- -1,1	1,0- -1,1	0,8- -1,0	0,8- -0,9		
Pokrycie - Cover %	100	100	100	100	100	100		
Powierzchnia zdjęcia Area of sample plot m ²	20	50	500	100	200	200		
Gat. charakt. dla zespołu Species characteristic of the association								
<i>Stratiotes aloides</i>	4,4	4,4	5,5	4,4	5,5	5,5	6	7500
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	+	1,1	1,1	.	+	+	5	171
Gat. charakt. dla związku Species characteristic of the alliance Nymphaeion								
<i>Polygonum amphibium</i>	.	.	+	.	+	+	3	5
Gat. wyróżniające związku Species differential of the alliance								
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	+	2,2	1,1	+	1,1	2,2	6	752
<i>Lemna trisulca</i>	2,2	1,1	+	+	+	+	6	381
<i>Lemna minor</i>	+	1,1	+	+	+	+	6	71
Gat. charakt. dla kl. i rzędu Species charact. of the class and the order Potametalia								
<i>Elodea canadensis</i>	2,2	.	.	.	.	.	1	291
Gat. towarzyszące Accompanying species								
<i>Rumex hydrolapathum</i>	.	+	+	+	+	.	4	6
<i>Sparganium ramosum</i>	.	.	+	+	+	+	4	6

Gat. sporadyczne : *Menyanthes trifoliata* /4/, *Sagittaria sagittifolia* /1/,
Species sporadic *Sium latifolium* /6/

Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych: 1,2,3,4,5,6 - Łubienica
Records' localization

Zbiorowisko z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*

Spośród roślinności wodnej w zalewie najczęściej występuje zbiorowisko z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum* (tab. 3). Spotyka się zarówno małe, jak i duże, do kilkuset m² powierzchnie, zajęte przez ten gatunek. Głębokość wody w tych miejscach była różna i wahała się

w granicach 0,8—3,1 m. Średnia optymalna głębokość wody wynosiła 1,3—1,6 m.

Jak widać ze zdjęć zestawionych w tabeli 3, zbiorowisko to ma typowy charakter agregacji roślinnej. Poza *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum* inne gatunki występowały w małej ilości.

W związku z dużą amplitudą ekologiczną i szybkim, ekspansywnym sposobem rozprzestrzeniania się, roślina ta będzie zajmowała coraz to większe połacie zalewu. Duża ilość produkowanej masy organicznej przyczyni się w znacznym stopniu do wypłycenia zbiornika. Gęsty splot łodyg wpływa tamująco na przepływające resztki organiczne i mineralne, powodując ich osadzanie się. W związku z tym miejsca, na których spotykano to zbiorowisko, są silnie zamulone.

W jakim kierunku będzie szedł rozwój tego zbiorowiska, trudno jest w tej chwili odpowiedzieć. Jak wynika z obserwacji, największą szansę opanowania tych siedlisk ma *Equisetum limosum*, co już obecnie w niektórych miejscach wyraźnie widać. W tabeli 9, w dwu zdjęciach (44, 45) mamy taką sytuację, gdzie na głębokości 1,4—1,5 m ilość *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum* i *Equisetum limosum* jest równa i wszystko wskazuje na to, że w miarę wypływania się ilość *E. limosum* będzie zwiększała się w płatach z *P. amphibium* modif. *aquaticum*. Natomiast prawdopodobieństwo zastąpienia tego zbiorowiska przez inne zbiorowisko wodne jest bardzo małe. Szeroka amplituda ekologiczna nie pozwoli na wyparcie tego zbiorowiska przez inne zbiorowisko wodne nawet przy znacznych zmianach siedliska, tym bardziej, że *P. amphibium* ma zdolność wytwarzania dwóch modyfikacji — modif. *aquaticum* i modif. *terrestre*, oraz jest odporne na zmianę warunków ekologicznych. W miejscach o dużym zagęszczeniu osobników, obserwować można w chwili obecnej pojawianie się pędów modyfikacji *terrestre* wyrastających z roślin należących do modyfikacji *aquaticum*.

Ze zbiorowisk wodnych to zbiorowisko prawdopodobnie odegra zasadniczą rolę w procesie zarastania, wypływania i przygotowania siedliska pod przyszłe zbiorowiska szuwarowe.

Pokrycie przez roślinność wynosiło średnio około 70%.

Potametum lucentis Hueck 31.

Zespół *Potametum lucentis* (tab. 4) jest jednym z częściej spotykanych zbiorowisk wodnych w zalewie. Występuje przeważnie w płytkich, zacisznych, mniej lub bardziej zamulonych miejscach, gdzie obserwuje się minimalny przepływ wody lub w ogóle go nie widać. Rzadziej rozwija się na podłożu piaszczystym o widocznie zaznaczającym się nurcie. Tworzy często płyty o powierzchni ponad 100 m². Zwyczajnie jednak zajmuje mniejsze powierzchnie, rzędu 20—50 m². Głębokość wody w tych miejscach była różna: od 0,2 do 1,6 m — średnio około 1 m.

Tabela 3 - Table 3
Zbiorowisko z Polygonum amphibium

Nr zdjęcia - No. of the record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Data - Date	4.7. 67	3.8. 67	4.8. 67	9.7. 67	8.7. 67	8.7. 67	7.7. 67	7.7. 67	7.7. 67	5.7. 67	5.7. 67	7.8. 67	7.8. 67	4.8. 67	6.8. 67	4.8. 67	7.7. 67	7.7. 67	8.7. 67	7.7. 67	5.7. 67	5.7. 67	5.7. 67
Głębokość - Depth m	1,1-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,4-1,6	1,3-1,5	1,5-1,7	1,2-1,4	1,2-1,5	1,5-1,6	2,0-2,5	1,0-1,1	2,0-2,5	1,3-1,5	1,8-2,0	1,2-1,5	1,4-1,5	1,2-1,3	1,8-2,0	2,0-2,1	1,2-1,3	1,2-1,3	0,8-1,0	0,8-1,0
Powierzchnia zdjęcia Area of sample plot m ²	100	200	50	100	200	100	300	200	300	100	100	300	300	100	70	50	200	50	50	80	100	50	200
Pokrycie - Cover %	40	70	70	70	80	90	90	90	80	60	60	50	70	70	60	70	60	80	80	70	50	70	70
Get. charakt. dla związku Species charact. of the alliance Nymphaeion	3,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,3	3,3	3,3	4,4	4,4	4,4	4,4	3,3	4,4	4,4	4,4	3,3	4,4	4,4
Polygonum amphibium	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ratichium circinatum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stratiotes aloides	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nuphar luteum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Get. wyróżniające dla związku Species differential of the alliance Nymphaeion	1,1	+	+	+	+	+	1,1	1,1	1,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Iemma trisulca	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Iemma minor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Spirodela polyrrhiza	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Get. charakt. dla kl. i rzędu Species charact. of the class and the order Potametalia	1,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Potamogeton lucens	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Elodea canadensis	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Potamogeton perfoliatus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Get. sporadyczne /Species sporadic/	1,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rumex hydrolapathum /4/, Sparganium ramosum /4,7/, Equisetum limosum /5,6/, Sagittaria sagittifolia /5/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Get. sporadyczne /Species sporadic/	1,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stanońska zdjęć fitosocjologicznych: 2, 5, 6, 22, 23 - Buriaki; 7, 8, 9 - Kamińskie; 10, 18, 21 - Holendary; 3, 16 - Strzyże; 4, 11 - Kruczy Borek; 13, 14 - Pogorzelec; 15, 17 - Rusin;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Records localization	19, 20 - Dzierżenin; 1 - Łubienica; 12 - Kłusek	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Get. sporadyczne /Species sporadic/ Rumex hydrolapathum /4/, Sparganium ramosum /4,7/, Equisetum limosum /5,6/, Sagittaria sagittifolia /5/

Stanońska zdjęć fitosocjologicznych: 2, 5, 6, 22, 23 - Buriaki; 7, 8, 9 - Kamińskie; 10, 18, 21 - Holendary; 3, 16 - Strzyże; 4, 11 - Kruczy Borek; 13, 14 - Pogorzelec; 15, 17 - Rusin;

Records localization

19, 20 - Dzierżenin; 1 - Łubienica; 12 - Kłusek

Tabela 4 - Table 4
Potametum lucentis Hueck 31

[illegible]

Stanowiska zdjąć fitosocjologicznych: 3, 10, 15, 16 - Łacha; 11, 14, 18 - Karniawek; 9, 19 - Pogorzelec; 1, 8 - Dzierżenin; 2, 7 - Kania Nowa; 12 - Gąsiorowo; 13 - Kopaniec; 17 - Wolica; 4 - Kruczy Borek; 5 - Tusin; 6 - Strzyże

Gatunkiem dominującym, z wyjątkiem facji z *Potamogeton perfoliatus* i facji z *Potamogeton pectinatus*, jest *Potamogeton lucens*. Inne gatunki występują w bardzo małej ilości lub w ogóle ich nie ma i wtedy mamy typową agregację roślinną.

W obrębie tego zespołu wyróżniono dwie facje: z *P. perfoliatus* i z *P. pectinatus*. Obie facje wydzielono jedynie na podstawie obecności gatunku *P. lucens* w zdjęciach, w których dominuje *P. perfoliatus* lub *P. pectinatus*. Czy to jest słuszne? Trudno jest twierdząco odpowiedzieć. Prawdopodobnie więcej wspólnego mają te płaty ze zbiorowiskami z *P. pectinatus* i *P. perfoliatus* omówionymi niżej niż z zespołem *Potamogeton lucensis*. Warunki ekologiczne we wszystkich przypadkach są bardzo podobne. W składzie florystycznym zaznacza się tylko wyraźna dominacja któregoś z gatunków.

Pokrycie przez roślinność w większości płatów wynosiło 100%.

Zbiorowisko z *Potamogeton perfoliatus*

Podobnie jak inne zbiorowiska, zbiorowisko z *Potamogeton perfoliatus*, w obrębie zalewu ma charakter agregacji roślinnej. Jedynie w kilku płatach mamy większą domieszkę innych gatunków (tab. 5). W pozostałych płatach występuje głównie *P. perfoliatus*. Obecność innych gatunków, o ile takowe tam rosły, nie wpływała absolutnie na strukturę i fizjonomię danego płatu, gdyż były to pojedyncze, przypadkowe osobniki, które są raczej skazane na zagładę niż na rozwój, ponieważ nie wytrzymają konkurencji z roślinami panującymi.

Głębokość wody, na jakiej spotykano to zbiorowisko, była różna i wynosiła od 0,3 do 1,5 m. Większość zdjęć wykonano przy głębokości od 0,5 do 0,9 m. Podłoże w tych miejscach było w różnym stopniu zamulone. Płaty, w których występuje *Myriophyllum spicatum* lub *Batrachium circinatum*, rozwinięte były z reguły na podłożu słabo zamulonym. To samo odnosi się do innych zbiorowisk roślin wodnych.

Wielkość płatów była różna i wynosiła od 20 do 100 m². W większości przypadków nie przekraczała 50 m².

Pokrycie przez roślinność w przeważającej większości zdjęć wynosiło 100%.

Zbiorowisko z *Potamogeton pectinatus*

Zbiorowisko z *Potamogeton pectinatus* spotyka się dość często w zalewie. Jak widać z załączonej tabeli (tab. 6), tworzy ono również w większości przypadków jednogatunkowe agregacje roślinne. W dwu zdjęciach mamy tylko większą ilość *P. perfoliatus*, w pozostałych zawsze dominuje *P. pectinatus* mający współczynnik pokrycia 5. Głębokość wody w tych

Tabela 5 - Table 5
Zbiorowisko z Potamogeton perfoliatus

Nr zdjęcia - No. of the record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Stalność	Współczynnik pokrycia
Data - Date	5.7. 67	6.7. 67	7.7. 67	6.8. 67	5.7. 67	7.7. 67	11.7. 67	3.8. 67	4.8. 67	9.7. 67	6.7. 67	3.7. 67	3.7. 67	7.7. 67	6.7. 67	6.7. 67	5.7. 67	V	6779
Głębokość - Depth m	0,6	0,7	0,6-0,9	0,5-0,8	0,4	1,2-1,3	1,0	0,6	0,6-0,7	0,9-1,1	1,3-1,5	0,6-0,7	0,5-0,7	0,8	0,3-0,8	0,5-0,6	0,5	II	88
Pokrycie - Cover %	100	80	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Fowierzchnia zdjęcia	10	20	50	30	10	50	20	20	50	100	10	20	50	50	100	100	20		
Area of sample plot m ²																			
Cat. charakt. dla związku																			
Species charact. of the alliance Eu-Potamion																			
Potamogeton perfoliatus	5.5	4.4	5.5	5.5	3.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.4	3.3	4.4	4.4	4.4	3.3		
Potamogeton pectinatus															1.1	1.1	1.1		
Cat. charakt. dla związku																			
Species charact. of the alliance Nymphaeion																			
Myriophyllum spicatum																		I	12
Polygonum amphibium																		I	12
Ratrum circinatum																		I	1
Nuphar luteum																		I	1
Stratiotes aloides																		I	1
Cat. towarzyszące																			
Accompanying species																			
Sagittaria sagittifolia																		III	41
Cat. charakt. dla kl. i rzędu																			
Species charact. of the class and the order Potmetalia																			
Elodea canadensis																			
Cat. sporadyczne																			
Species sporadic																			
Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych:																			
Records localization																			

Cat. sporadyczne: Lemna trisulca / 10/, Spirodela polyrrhiza / 14/, Butomus umbellatus / 13, 16/, Equisetum limosum / 13/, Alisma plantago-aquatica / 9/
Species sporadic
Stations of phytosociological photographs: 2, 15, 16 - Kopianiec; 1, 5 - Holendry; 3, 14 - Dzierżenie; 7, 9 - Strzyże; 10, 17 - Kruczy Borek; 12, 13 - Lubien-
nica; 4 - Kamiarek; 6 - Pogorzelec; 8 - Barłaki; 11 - Łacha

Tabela 6 - Table 6
Zbiorowisko z *Potamogeton pectinatus*

Nr zdjęcia - No. of the record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Stalność Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
Data - Date	8.8. 67	11.7. 67	6.7. 67	5.7. 67	6.7. 67	5.7. 67	5.7. 67	5.7. 67	6.7. 67	7.7. 67		
Głębokość - Depth m	0,7	0,6- 0,7	0,5	0,5	0,6- 0,7	0,3	0,4	0,4	0,3	0,9- 1,0		
Pokrycie - Cover %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90		
Powierzchnia zdjęcia Area of sample plot m ²	20	20	10	10	50	50	20	10	10	50		
Gat. charakt. dla związku Species characteristic of the alliance Eu-Potamion												
<i>Potamogeton pectinatus</i>	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.4	4.4	V 100	8250
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	.	.	.	.	.	.	+	+	1.1	1.1	II 40	102
Gat. charakt. dla związku Species characteristic of the alliance Nymphaeion												
<i>Myriophyllum spicatum</i>	.	.	.	.	+	+	.	.	.	+	I 20	2
<i>Sagittaria arifolia</i>	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	I 20	2
Gat. charakt. dla kl. i rzędu Species charact. of the class and the order Potametalia												
<i>Elodea canadensis</i>	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	II 30	3
Gat. sporadyczne /Species sporadic/: <i>Sagittaria sagittifolia</i> /1/, <i>Eutomas umbellatus</i> /1/.												
Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych: 4, 6, 7, 8 - Holendry; 1 - Łacha; 2 - Strzyże; 3 - Kopeniec;												
Records' localization: 5 - Kania Nowa; 9 - Kruczy Borek; 10 - Dzierżenin												

Tabela 7 - Table 7
Zbiorowisko z *Potamogeton natans*

Nr zdjęcia - No. of the record	1	2	3	4	Stalność Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
Data - Date	10.7. 67	9.7. 67	8.8. 67	7.7. 67		
Głębokość - Depth m	1,1	1,0- 1,1	0,9	0,9- 1,0		
Pokrycie - Cover %	90	90	100	100		
Powierzchnia zdjęcia Area of sample plot m ²	10	20	20	100		
Gat. charakt. dla związku Species charact. of the alliance Nymphaeion						
<i>Polygonum amphibium</i>	+	.	+	.	2	5
<i>Myriophyllum spicatum</i>	.	.	.	+	1	3
Gat. charakt. dla kl. i rzędu Species charact. of the class and the order Potametalia						
<i>Potamogeton natans</i>	5.5	5.5	5.5	5.5	4	8750
<i>Elodea canadensis</i>	.	+	+	.	2	5
Gat. sporadyczne: <i>Lemna trisulca</i> /2/, <i>Spirodela polyrrhiza</i> /2/,						
Species sporadic: <i>Sparganium ramosum</i> /1/, <i>Glyceria aquatica</i> /1/,						
<i>Equisetum limosum</i> /2/						
Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych: 1 - Burlaki; 2 - Kruczy Borek;						
Records' localization: 3 - Dzierżenin; 4 - Tusin						

miejskach była różna i w skrajnych przypadkach wynosiła 0,3—1,0 m. Należy stwierdzić, że zbiorowisko z *P. pectinatus* zajmuje płytsze miejsca w zalewie, o średniej głębokości 0,3—0,5 m. Podłoże jest z reguły słabo zamulone lub czysto mineralne. Zbiorowisko to rozwija się zarówno w miejscach o wyraźnie zaznaczającym się nurcie, jak i zupełnie spokojnych. Bardzo często można je spotkać w płytkich miejscach na krawędzi koryta Narwi w górnej części rzeki i w zalewie.

Pokrycie przez roślinność jest prawie zawsze 100%.

Zbiorowisko z *Potamogeton natans*

Tylko w kilku miejscach spotkano większe skupienia *Potamogeton natans*. Głębokość wody w tych miejscach wynosiła 0,9—1,1 m. Podłoże było słabo zamulone lub czysto mineralne.

Pod względem florystycznym jest to również zbiorowisko agregacyjne (tab. 7). Pojedyncze okazy roślin wodnych lub szuwarowych nie mają żadnego znaczenia wobec olbrzymiej ilości *P. natans*. Płaty tego zbiorowiska występują przeważnie w przybrzeżnych partiach zalewu, gdzie nie ma dużego falowania i zaznaczającego się wyraźnie nurtu.

Srednie pokrycie przez roślinność wynosi około 100%.

Zbiorowisko z *Batrachium circinatum* i *Myriophyllum spicatum*

Rozległe płaty zbiorowiska z *Batrachium circinatum* i *Myriophyllum spicatum* spotyka się w kilku miejscach zalewu. Największe płaty występują koło Dzierżenina. Warunki ekologiczne są tu trochę inne niż przy innych zbiorowiskach wodnych. Głębokość wody nie przekracza 1 m, podłoże ma charakter piaszczysty i zaznacza się słaby, ale widoczny przepływ wody. Zaobserwowano, że były to wyżej położone miejsca pochodzenia aluwialnego użytkowane przed zalaniem jako pastwisko. Stąd ta mała głębokość i piaszczysty charakter podłoża.

Tabela 8 - Table 8
Zbiorowisko z *Batrachium circinatum* i *Myriophyllum spicatum*

Nr zdjęcia - No. of the record	1	2	3	4	5	6	7	8	Stalność Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
Data - Date	15.7. 67	23.7. 67	7.7. 67	8.8. 67	7.8. 67	8.8. 67	7.8. 67	8.8. 67		
Głębokość - Depth m	0,5- -0,9	0,5- -0,8	0,7- -0,8	0,5- -0,6	0,3- -0,4	0,7- -0,8	0,4- -0,9	0,8- -1,0		
Pokrycie - Cover %	100	100	100	100	100	100	100	100		
Powierzchnia zdjęcia Area of sample plot m ²	500	50	100	50	100	100	200	100		
Gat.charakt.dla związku • Species characteristic of the alliance Nymphaeion										
<i>Batrachium circinatum</i>	5,5	5,5	5,5	4,4	3,3	4,4	2,2	+	V 100	5532
<i>Myriophyllum spicatum</i>	1,1	1,1	+	1,1	2,2	1,1	3,3	5,5	V 100	2032
Gat.charakt.dla związku Species characteristic of the alliance Eu-Potamion										
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	.	+	.	+	.	+	.	.	II 37	4
Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych: Records' localization	1,6 - Dzierżenin; 2,3 - Tusin; 4,8 - Lacha; 5 - Pogorzelec; 7 - Klusek									

Pod względem florystycznym jest to również zbiorowisko bardzo proste (tab. 8). Gatunkiem dominującym w większości przypadków jest *Batrachium circinatum*. *Myriophyllum spicatum* występuje w mniejszej ilości, chociaż sytuacja odwrotna w tych samych warunkach nie należy do rzadkości. Z wyjątkiem *Potamogeton perfoliatus*, który jest nie we

wszystkich zdjęciach i w małej ilości, innych gatunków mimo tak dużych płątów, nie spotykano.

Pokrycie przez roślinność wynosi zawsze 100%.

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 26.

W całym zalewie nie znajdujemy ani jednego skupienia roślin szuwarowych, które odpowiadałoby w jakimś stopniu zespołowi *Scirpo-Phragmitetum* w pełnym tego słowa znaczeniu. Rośliny szuwarowe tworzą oddzielne, głównie jednogatunkowe agregacje roślinne (tab. 9), pośród których niekiedy występują towarzyszące im rośliny wodne jako pozostałość poprzednich zbiorowisk lub jako enklawy zbiorowisk sąsiednich.

Fakt rozwoju określonego skupienia roślinnego w różnych miejscach zalewu, w różnych warunkach ekologicznych, lub też różnych skupień w tych samych warunkach, wskazuje na zjawisko chaotycznego procesu zasiedlania zalanego terenu w pierwszym okresie po spiętrzeniu wody i jest kwestią czystego przypadku.

W największej ilości spotykano jednogatunkowe agregacje roślinne z *Typha angustifolia* i takie same z *T. latifolia*. Głębokość wody w tych miejscach była różna i wynosiła 0,2—1,1 m. Średnia, optymalna głębokość dla obu skupień wynosiła około 0,5 m. Podłoże było różne, od piaszczystego do mniej lub bardziej zamulonego mineralno-organicznym mułem. Jednak w przeważającej większości przypadków skupienia z *T. angustifolia* rosły na podłożu czysto mineralnym lub słabo zamulonym, a skupienia z *T. latifolia* na podłożu przeważnie silnie zamulonym, rzadko na czysto mineralnym.

Jeżeli te dwie wspomniane wyżej agregacje roślinne graniczą bezpośrednio ze sobą, to granica między nimi jest przeważnie bardzo ostra, bez żadnej strefy przejść. Odnosi się to również do innych agregacji roślinnych w zalewie. Zjawisko to można łatwo wytłumaczyć, jeżeli przyjrzymy się dokładnie obecnie sąsiadującym, ale nie łączącym się ze sobą skupieniom jednogatunkowym z *T. latifolia* i z *T. angustifolia*. Rośliny te opanowują wolne miejsca wokół pierwotnego skupienia, rozmnażając się wegetatywnie. Kiedy następuje spotkanie się dwu różnych agregacji, to ilość osobników w obu przypadkach na jednostkę powierzchni jest maksymalna i wzajemne przenikanie się kęp obu gatunków staje się niemożliwe.

Z gatunków charakterystycznych dla zespołu, głównie w formie agregacyjnej, występuje również *Sparganium ramosum* i *Schoenoplectus lacustris* (tab. 9). Skupienia *Sparganium ramosum* rosły w miejscach zamulonych na głębokości od 0,2 do 1,1 m. Średnia, optymalna głębokość wody wynosiła 0,4—0,5 m. Jest to również jednogatunkowe skupienie roślin szuwarowych z większą domieszką roślin wodnych i pływających.

Tabela 9 - Table 9
Scirpo-Phragmitetum W.Koch 26 /fragm./

[illegible]

Inne gatunki szuwarowe występowały tu w małych ilościach i nie wpływały na strukturę i fizjonomię zbiorowiska.

W kilku miejscach zalewu, szczególnie w górnej części, występują nieduże kępy z *Schoenoplectus lacustris*. Głębokość wody w tych miejscach była różna i wahała się od 0,8 do 1,5 m. Średnia, optymalna głębokość wynosiła 1—1,2 m. Podłoże było w większym lub mniejszym stopniu zamulone. Inne, spotykane tam gatunki należały do zbiorowisk wodnych.

Koło Holendrów i Burlaków spotykano większe skupienia *Phragmites communis*. Podłoże było tam muliste, głębokość wody wahała się w granicach 0,3—1,1 m. W zwartych płatach trzciny rosły jedynie w małych ilościach rośliny wodne. Zwarty łan trzciny wykluczał możliwość rozwoju innych gatunków szuwarowych. Zbiorowisko to wkraczało w rosnące na niedużej głębokości płaty z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*.

W starorzeczach Bugu i Narwi *Acorus calamus* rośnie bardzo często w różnych zbiorowiskach szuwarowych. W zalewie jest on reprezentowany w małej ilości. Pojedyncze, mniejsze lub większe skupienia tataraku występują głównie przy prawym, stromym brzegu. Podłoże w tych miejscach ma charakter mineralny lub jest lekko zamulone. Średnia głębokość wody wynosi tam około 0,2 m. Zbiorowisko powyższe, podobnie jak poprzednie, pod względem florystycznym jest również ubogie. Czasem w większej ilości razem z tatarakiem rosło *Equisetum limosum*. Inne gatunki wodne i szuwarowe występowały sporadycznie. W skrajnym przypadku są to jednogatunkowe agregacje *Acorus calamus* i one to właśnie rozwinęły się na podłożu czysto mineralnym.

Bardzo ciekawym zbiorowiskiem roślinnym jest zbiorowisko z *Equisetum limosum*, którego większe skupienia występowały koło Burlaków i Łubiennicy. Są to zaciszne miejsca, w których przepływ wody jest tak minimalny, że niemal nieuchwytny. Występujące w pobliżu inne zbiorowiska szuwarowe i wodne uniemożliwiają falowanie wody. Podłoże jest grząskie, z grubą warstwą mułu. Te warunki odpowiadają wymaganiom *Equisetum limosum*. Głębokość wody w tych miejscach jest różna i waha się w granicach 0,2—1,5 m. Z wyjątkiem dwu zdjęć, wszędzie dominuje *E. limosum*. Występowanie innych gatunków uzależnione jest od głębokości wody. W miejscach płytszych (0,2—0,6 m) spotyka się większą ilość gatunków szuwarowych. W miejscach głębszych (1,4—1,5 m) ilość *E. limosum* i *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum* jest taka sama, natomiast już na głębokości 1,0—1,2 m dominuje *E. limosum*. Powyżej 1,5 m w głąb rosną tylko pojedyncze okazy *E. limosum* w płatach z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*.

Prawdopodobnie w przyszłości miejsca, gdzie obecnie rozwija się agregacyjne zbiorowisko z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*, zostaną zajęte przez zbiorowisko z *E. limosum*, a to następnie zostanie zastąpione przez któryś z wariantów zespołu *Scirpo-Phragmitetum* lub zespół *Glycerietum maximae*, co jest najbardziej prawdopodobne.

W obrębie Zalewu Zegrzyńskiego, szczególnie w górnej części, gdzie poziom wody sięga brzegów koryta lub jest minimalnie wyższy, spotykamy wokół płytkich rozlewisk zbiorowisko z *Heleocharis palustris*. Głębokość wody w tych miejscach dochodzi do 0,3 m. W większej ilości spotykamy tam gatunki wodne, a szczególnie *Elodea canadensis*. Gatunki szuwarowe występują w małej ilości. Podłoże jest różne, od silnie замуłonego do czysto mineralnego.

Oprócz wyżej opisanych zbiorowisk szuwarowych, które występują dość często, spotyka się jeszcze różnej wielkości płaty z *Butomus umbellatus* na głębokości ponad 0,5 m oraz skupienia *Sagittaria sagittifolia*.

Ogólnie można stwierdzić, że omawiane powyżej zbiorowiska szuwarowe w większości mają charakter typowych agregacji roślinnych.

Glycerietum maximae Hueck 31.

Zespół *Glycerietum maximae* (tab. 10) w zalewie spotykamy bardzo często. Występuje przeważnie w postaci dużych płatów, zarówno w miejscach замуłonych jak i na podłożu czysto mineralnym. Głębokość wody w tych miejscach jest różna i dochodzi do 1 m. Optymalna głębokość wynosi 0,1—0,5 m. Zespół ten występuje w różnych miejscach w zalewie. Spotykamy go przy brzegach, na środku zalanego obszaru lub na wyższych miejscach, które obecnie pokrywa warstwa wody o grubości 0,1—0,2 m. Skład gatunkowy jest różny w zależności od rozmieszczenia. Z reguły w strefie przybrzeżnej i na zatopionych wyższych miejscach skład gatunkowy jest bogatszy, natomiast jednogatunkowe agregacje tego zespołu występują na większej głębokości, w miejscach świeżo zatopionych i często silnie замуłonych. Oczywiście ten podział nie jest regułą, można również spotkać jednogatunkowe skupienia *Glyceria aquatica* w pasie przybrzeżnym i na zatopionych łachach.

Pod względem florystycznym jest to jedno z najbogatszych zbiorowisk roślinnych w zalewie. W porównaniu z analogicznym zespołem w starorzeczach Bugu (T o m a s z e w i c z 1969), ogólna liczba gatunków tu występujących jest większa. Natomiast ogólny współczynnik pokrycia wszystkich gatunków, z wyjątkiem *Glyceria aquatica*, jest w starorzeczach Bugu, wielokrotnie większy niż w Zalewie Zegrzyńskim.

Ranunculus lingua, który w starorzeczach Bugu w zespole *Glycerietum maximae* osiąga prawie 60% stałości, w tym samym zespole w Zalewie Zegrzyńskim w ogóle nie występuje. Również *Polygonum amphibium* modif. *terrestre* w starorzeczach Bugu ma stałość sięgającą ponad 40%. W zalewie spotkano w kilku zdjęciach *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*, które przenikło z sąsiadującego zbiorowiska z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*. *Equisetum limosum* w starorzeczach osiągało ponad 70% stałości, w zalewie tylko w granicach 30%, przy małym

Tabela 10 - Table 10
Glycerietum maximae Hueck 31

Nr zdjęcia - No. of the record		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Data - Date		6.8. 67	9.7. 67	5.7. 67	4.7. 67	7.7. 67	5.7. 67	5.7. 67	7.7. 67	6.7. 67	7.7. 67	3.7. 67	4.7. 67	5.7. 67	6.7. 67	6.7. 67	5.8. 67	3.7. 67	3.7. 67	4.7. 67	3.7. 67	3.7. 67	3.7. 67
Głębokość - Depth m		0.2-0.4	0.3-0.4	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3
Pokrycie - Cover %		100	100	80	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Powierzchnia zdjęcia - Area of sample plot m ²		100	50	20	100	100	20	100	200	100	100	50	100	200	20	100	100	200	200	100	200	200	50
Gat. charakt. dla zespołu - Species charact. of the association		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Glyceria aquatica		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Gat. charakt. dla związku - Species charact. of the alliance		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Phragmites		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Rumex hydrolapathum		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Stum latifolium		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Rorippa amphibia		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Rutotus umbellatus		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Typha latifolia		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Spergularia ramosa		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Oenanthe aquatica		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Schoenoplectus lacustris		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Sagittaria sagittifolia		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Typha angustifolia		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Gat. charakt. dla kl. i rzędu - Species charact. of the class and the order		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Phragmites		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Rumex limosum		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Alisma plantago-aquatica		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Helleborus palustris		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Cicuta virosa		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Phalaris arundinacea		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Carex vesicaria		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Gat. towarzyszące - Accompanying species		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Spirodela polymorpha		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna minor		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Mentha aquatica		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lythrum salicaria		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Hydrocharis morsus-ranae		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Polygomon amphibium		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Gat. sporadyczne / Species sporadic		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Caltha palustris		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Stratiotes aloides		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Eleocharis palustris		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5																					
Lemna trisulca		5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.																					

jednocześnie współczynnika pokrycia. Pomimo tych różnic oba te zespoły szuwarowe są najbardziej podobne do siebie.

Prawdopodobnie z biegiem czasu skład gatunkowy powyższego zespołu ulegnie zmianie, dotyczy to szczególnie jednogatunkowych agregacji z *Glyceria aquatica*, w których ilość gatunków będzie wzrastała.

Ogólne pokrycie przez roślinność wynosiło około 85%.

Tendencje rozwojowe zbiorowisk roślinnych

Zbiorowiska roślinne występujące obecnie w Zalewie Zegrzyńskim nie tworzą określonych stref roślinnych, ponieważ głębokość wody jest bardzo zmienna w różnych miejscach. Jest to jedna z przyczyn bezładnego rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w obrębie całego zbiornika. Załączone ryciny (ryc. 1, 2) dobrze obrazują ten stan rzeczy. Rozwój zbiorowisk jest jeszcze głównie na etapie opanowywania wolnych, zalanych przestrzeni, które nie są zajęte przez żadną roślinność, a odpowiadają wymogom ekologicznym tych lub innych gatunków. W ten sposób należałoby tłumaczyć między innymi agregacyjny charakter występujących tam zbiorowisk roślinnych. Jak wynika z obserwacji, największe połacie zalewu zajęte są przez te agregacje roślinne, w których panujący gatunek jest przystosowany do szybkiego, ekspansywnego rozprzestrzeniania się i którego amplituda ekologiczna jest dość szeroka. Rośliny te opanowują wolne przestrzenie rozmnażając się głównie wegetatywnie za pomocą kłaczy. Przykładem takich roślin szuwarowych może być *Typha angustifolia*, *T. latifolia*, *Phragmites communis*, a roślin wodnych — *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*.

Zbiorowiska agregacyjne o maksymalnym nasyceniu osobników na jednostkę powierzchni (różna dla różnych gatunków) mają szansę przetrwania przez tak długi okres czasu, aż warunki ekologiczne nie ulegną zasadniczym zmianom. Występujące w tych agregacjach pojedyncze gatunki innych roślin muszą zginąć, gdyż nie wytrzymają konkurencji z gatunkiem panującym. Fakt, że rozwinęła się określona agregacja roślinna, wskazuje na to, że panujący gatunek w danym miejscu znalazł optymalne warunki ekologiczne do swego rozwoju i będzie rozwijał się dotąd, aż ulegną one zmianie. Charakter tych zmian będzie inny przy zbiorowiskach wodnych, a inny przy zbiorowiskach szuwarowych. Jednak głównym czynnikiem warunkującym przyszłe zmiany roślinności będzie zmiana głębokości wody, w związku z akumulacją osadów dennych. Związana z tym zmiana charakteru podłoża tylko przy niektórych zbiorowiskach

Koryto Narwi

Ryc. 1

wpłyne na zmianę ich składu gatunkowego i przejście w zupełnie inną asocjację roślinną. Nie należy jednak zapominać, że nasilająca się z biegiem czasu konkurencja międzygatunkowa, będzie miała również duże znaczenie w kształtowaniu się zrównoważonych i zamkniętych wielogatunkowych płatów zespołów.

Jeżeli przeanalizować kolejno roślinne agregacje wodne, to można stwierdzić, że płaty z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum* będą rozwijały się i powiększały swój zasięg dotąd, aż miejsca te zostaną wypłycone tak, że będą mogły rosnąć tam w coraz to większej ilości gatunki szuwarowe. W tych miejscach prawdopodobnie w przyszłości powstaną wielogatunkowe asocjacje roślin szuwarowych. Proces ten daje się już zaobserwować w zacisznych miejscach, gdzie nagromadzone zostały znaczne ilości osadów organiczno-mineralnych, przepływ wody jest czasem niewidoczny i w zwartej masie rośnie *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*. W miarę zmniejszania się głębokości wody zaczyna w nie wkraczać *Equisetum limosum*. Przy dalszym zmniejszaniu się głębokości zaczynają pojawiać się takie gatunki jak: *Glyceria aquatica*, *Sium latifolium*, *Alisma plantago-aquatica*, *Butomus umbellatus*, *Sagittaria sagittifolia* i inne. Są to pierwsze sygnały tego, że w tych miejscach rozwiną się już nie agregacyjne zbiorowiska szuwarowe, ale wielogatunkowe asocjacje roślinne.

Jak będą przebiegały zmiany roślinności w tych miejscach, gdzie rosną obecnie zbiorowiska rdestnic, trudno jest w tej chwili przewidzieć. Te, które bezpośrednio graniczą ze zbiorowiskiem z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*, zostaną prawdopodobnie przez nie opanowane. Natomiast te, które rosną na małej głębokości i graniczą z agregacjami szuwarowymi z *Typha latifolia* lub *T. angustifolia*, zostaną przez te agregacje wyparte.

Zespół *Hydrocharo-Stratiotetum* zostaje już z wolna zajmowany przez gatunki szuwarowe i prawdopodobnie powstanie w tym miejscu zespół *Glycerietum maximae*.

Trudno jest przewidzieć, jaki będzie dalszy rozwój zespołu *Myriophyllo-Nupharetum* i zbiorowiska z *Batrachium circinatum* i *Myriophyllum spicatum*.

Rozwój agregacyjnych zbiorowisk szuwarowych będzie zależał głównie od radykalnych zmian ekologicznych w danym miejscu. Obecnie np. w olbrzymich płatach z *Typha angustifolia* i z *T. latifolia* obserwuje się

Ryc. 2. Transekt pasowy wykonany na odcinku 0,9—0,95 km

Band transection on segment 0,9—0,95 km

1 — *Equisetum limosum*, 2 — *Typha angustifolia*, 3 — *Nuphar luteum*, 4 — *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*, 5 — *Glyceria aquatica*, 6 — *Typha latifolia*, 7 — *Potamogeton lucens*, 8 — *Myriophyllum spicatum*, 9 — *Sparganium ramosum*, 10 — Zarośla wierzbowe (Willow brushwood, 11 — *Sagittaria sagittifolia*, 12 — Zespół (Association) *Glycerietum maximae*

Ryc. 2

jedynie zmniejszenie liczby osobników na jednostkę powierzchni w środku płatu w porównaniu do jego części brzeżnych. Żadne inne gatunki w te mniej zwarte fragmenty jeszcze nie wkraczają. Prawdopodobnie jest to proces związany z ustalaniem się optymalnej liczby osobników na jednostkę powierzchni. Konkurencja międzygatunkowa będzie tu miała mniejsze znaczenie.

PODSUMOWANIE

Badania nad roślinnością Zalewu Zegrzyńskiego zostały przeprowadzone w piątym roku po spiętrzeniu wód Bugu i Narwi. Szczegółowe opracowanie objęło około 16-kilometrowy odcinek zalewu po obu stronach dawnego koryta Narwi, pomiędzy miejscowościami Lubiennica i Lacha. Odcinek ten posiada najbardziej charakterystyczną i najlepiej rozwiniętą roślinność wodną i szuwarową w całym Jeziorze Zegrzyńskim. Nie uwzględniono w opracowaniu przybrzeżnych zbiorowisk wierzbowych, które występują w górnej części zalewu i nie są z nim bezpośrednio związane, a także roślinności na wyższych aluwialnych miejscach, które nie są zatapiane.

Wyróżniono trzy zespoły wodne: *Myriophyllo-Nupharetum*, *Hydrocharo-Stratiotetum*, *Potametum lucentis*; dwa zespoły szuwarowe: *Scirpo-Phragmitetum* i *Glycerietum maximae* oraz pięć zbiorowisk wodnych o nieokreślonej randze systematycznej: zbiorowisko z *Polygonum amphibium* modif. *aquaticum*, zbiorowisko z *Potamogeton perfoliatus*, zbiorowisko z *P. pectinatus*, zbiorowisko z *P. natans* i zbiorowisko z *Batrachium circinatum* i *Myriophyllum spicatum*.

Z różnych przyczyn głębokość wody w zalewie jest bardzo zmienna w różnych miejscach, nie można stwierdzić żadnych prawidłowości w rozmieszczeniu roślin na zatopionych terenach. Nie ma tam ustabilizowanych i wykształconych stref roślinnych, ale jedynie bezładnie rozmieszczone, głównie jednogatunkowe agregacje roślin wodnych i szuwarowych. Wyróżnione zespoły roślinne są gatunkowo uboższe od takich samych, jakie występują w starorzeczach Bugu i Narwi. Często w stadium inicjalnym mają one charakter agregacji roślinnych.

Rozwój wszystkich zbiorowisk jest jeszcze głównie na etapie opanowywania wolnych, zalanych przestrzeni, które nie są zajęte przez żadną roślinność, a odpowiadają wymogom ekologicznym tych lub innych gatunków. W ten sposób należałoby tłumaczyć między innymi agregacyjny charakter występujących tam zbiorowisk roślinnych.

Zakład Systematyki i Geografii Roślin
Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4

(Wpłynęło dn. 8.11.1968 r.)

SUMMARY

Investigations on the flora of the Zegrze water reservoir were performed in the fifth year after elevation of the waters of the Bug and Narew rivers. The study involved the 16-km segment of the lake on both sides of what used to be the bed of the Narew between the localities Lubienice and Lacha. In this segment the aquatic and bulrush flora is most characteristic and best developed. The coastal

willow communities occurring in the upper part of the reservoir and not directly associated with it as well as the vegetation of higher alluvial not submerged sites were not taken into account.

Three aquatic associations, two bulrush associations and five aquatic plant communities were distinguished.

— The association *Myriophyllo-Nupharetum* W. Koch 26 occurs in the initial stage in the form of a plant aggregation. It consists mainly of one-species aggregations of *Nuphar luteum* growing at a depth of 1.8—3.2 m. Aggregations of *Nymphaea alba* are rare and occupy only small areas. The distribution of this association in the reservoir is random and not related to zones or depth.

— The association *Hydrocharo-Stratiotetum* Krusem et Vlieger 37 occurs on one site near Lubienica in a shallow endorheic old bed. The dominating species is *Stratiotes aloides*. *Hydrocharis morsus-ranae* occurs in small quantities. The water depth is 0.8—1.1 m. The singly scattered specimens of various bulrush plants over the whole patches are an indication of rapid supplantation of this association by bulrush communities.

— The association with *Polygonum amphibium* is one of the most frequently met aquatic plant communities in the lake. It occupies enormous areas in it. It grows at a depth of 0.8—3.1 m on a very silty substrate. This community exhibits also the character of a typical plant aggregation. The prevailing plant is always *Polygonum amphibium*, other species occur sporadically in small numbers. The further development of this community will be decisive for the overgrowth and shallowing of the inundated area.

— The association *Potametum lucentis* Hueck 31 is one of the more frequently found plant communities. It develops in shallow calm more or less silted areas at a depth of 0.2—1.6 m. Facies with *Potamogeton perfoliatus* and with *P. pectinatus* were distinguished. The association forms patches with a typical aggregation structure.

— The community with *Potamogeton perfoliatus*, like most aquatic communities, forms in most cases typical plant aggregations. The depth at which it developed was 0.3—1.5 m. The substrate was not uniform.

— The community with *Potamogeton pectinatus* develops at a depth of 0.3—1.0 m on a slightly silted or purely mineral substrate. This community forms also mostly typical aggregations.

— The community with *Potamogeton natans* was found at several places in the lake at a depth of 0.9—1.1 m on a slightly silted or pure mineral substrate. It consists mainly of one-species *Potamogeton natans* aggregations.

— The community with *Batrachium circinatum* and *Myriophyllum spicatum* forms frequently extensive patches on a purely mineral substrate at a depth of about 1 m. From the floristic point of view it is also a very simple community with predominance in general of *Batrachium circinatum* and small quantities of *Myriophyllum spicatum*. Sometimes the reverse situation occurs.

— The association *Scirpo-Phragmitetum* W. Koch 26 occurs in the Zegrze reservoir mainly in the form of facial communities which often form one-species plant aggregations. The widest areas are overgrown with one-species aggregations of *Typha angustifolia* and of *T. latifolia*. More or less frequently there occur patches of varying size with aggregations of *Sparganium ramosum*, *Schoenoplectus lacustris*, *Phragmites communis*, *Acorus calamus*, *Equisetum limosum*, *Sagittaria sagittifolia*, *Butomus umbellatus*, *Heleocharis palustris*. The depth of the water and the character of the substrate vary in the individual aggregations. It should once more be stressed that the association *Scirpo-Phragmitetum* in the Zegrze lake occurs only in various facial forms or in the form of pure aggregations.

— The association *Glycerietum maximae* Hueck 31 is very frequent forming sometimes enormous patches. The water depth in these places reached sometimes 1 m. The substrate varies from purely mineral to strongly silted. The optimal depth was 0.1—0.5 m. The association in the littoral zone is rich in species, whereas in the submerged parts one-species aggregations of *Glyceria aquatica* occur.

LITERATURA

- Balátová-Tulačková E., 1963, Zur Systematik der europäischen *Phragmitetea*, Preslia, 35, 2.
- Cwiertnia J., 1966, Zarastanie zbiornika zaporowego w Goczałkowicach w latach 1961—1963, Acta Hydrobiologica, 8, Suppl. 1.
- Dąmbaska T., 1961, Roślinne zbiorowiska jeziorne okolic Sierakowa i Międzychodu, Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Prace Kom. Biol., XXIII, 4.
- Donselaar J. Van, 1961, On the vegetation of former river beds in the Netherlands, Wentia, 5.
- Ellenberg H., 1963, Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in kausaler, dynamischer und historischer Sicht, Einführ. in die Phytologie, Bd. IV, II Teil, Stuttgart.
- Kępczyński K., 1960, Zespoły roślinne Jezior Skepskich i otaczających je łąk, Stud. Soc. Sc. Tor., Suppl. VI.
- Kępczyński K., 1965, Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej, Uniw. im. M. Kopernika, Toruń.
- Matuszkiewicz W., 1962, Dyskusja nad systemem zbiorowisk roślinnych Europy Zachodniej i Środkowej, Wiad. Bot. 6, 3.
- Miyawaki A. u. Tüxen R., 1960, Über *Lemnetea*-Gesellschaften in Europa und Japan, Mitt. d. Flor.-Soz. Arbeitsgem., N. F. 8.
- Oberdorfer E., 1949, Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland und die angrenzenden Gebiete, Stuttgart.
- Oberdorfer E., 1957, Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Pflanzensoziologie, 10, Jena.
- Pawłowski B., 1959, Szata roślinna Polski I: 307—315, Warszawa.
- Podbielkowski Z., 1967, Zarastanie rowów melioracyjnych na torfowiskach okolic Warszawy, Monogr. Bot., 23, 1.
- Roll H., 1938, Die Pflanzengesellschaften ostholsteinischer Fließgewässer, Arch. f. Hydrobiol., XXXIV, 2.
- Scamoni A., 1967, Wstęp do fitosocjologii praktycznej, P.W.R.i.L., Warszawa.
- Sławiński W., 1949, Podstawy fitosocjologii, Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, I, II, Lublin.
- Tomaszewicz H., 1969, Roślinność wodna i szuwarowa starorzeczy Bugu na obszarze województwa warszawskiego, Acta Soc. Bot. Pol. 38(2): (w druku).
- Tüxen R., 1937, Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands, Mitt. d. Flor.-Soz. Arbeitsgem. in Niedersachs., 3.
- Tüxen R., 1955, Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften, Mitt. d. Flor.-Soz. Arbeitsgem., N. F. 5.
- Tüxen R., (1956), Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Wegweiser durch die pflanzensoziologisch-systematische Abteilung, Bremen.