MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. XI, nr 2, 1961

J. NOWAK

POROSTY WYŻYNY (JURY)
KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

THE LICHENS OF THE KRAKÓW — CZĘSTOCHOWA
UPLAND

WARSZAWA

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE — WARSZAWA 1961

Wydanie I. Nakład 800+150 egz. Ark. wyd. 10,5. Ark. druk. 8 + wkładki. Papier rotoogr. III kl. 80 g, 70 × 100/16. Oddano do składu we wrześniu 1960. Podpisano do druku w czerwcu 1961. Druk ukończono w czerwcu 1961.

Zam. 6010/A. S-83. Cena zł 33.—

Zakł. Graf. Dom Słowa Polskiego, Warszawa

WSTĘP

Praca niniejsza jest lichenologicznym opracowaniem kolejnego w Polsce wapiennego pasma. Cykl takich opracowań rozpoczęty został „Porostami Pienin” przez Z. T o b o l e w s k i e g o (1958).

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska była dotychczas badana przez lichenologów fragmentarycznie i stosunkowo dawno. Pierwsze doniesienie, które wymienia stąd 69 gatunków porostów, pochodzi od węgierskiego badacza H. L o j k i (1868). W. J a b ł o ń s k i (1872) podaje 43 gatunki porostów. W pracy F. B e r d a u a (1876) znajdują się dane o 30 gatunkach. Najbogatszą listę, zawierającą już 153 pozycje, ogłosił A. R e h m a n (1879). Równolegle z nim zbierał porosty K. F i l i p o w i c z (1881), który podaje 95 gatunków. Wyniki wszystkich tych prac zestawił W. B o b e r s k i (1886). Obok wymienionych uprzednio autorów, którzy interesowali się porostami południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, F. B ł o ń s k i (1890) dostarczył wiadomości o 60 gatunkach części północnej.

Po dwudziestoletnim okresie znacznego ożywienia badania te zostały przerwane. Tymczasem w lichenologicznych stosunkach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nastąpiły nieodwracalne zmiany, dotyczące szczególnie porostów epifitycznych i naziemnych. Są one powodowane przetrzebieniem starych i naturalnych drzewostanów i zniekształcają w dużym stopniu obraz pierwotny. Dawniej (1868—1890) epifity obejmowały 42% ówczesnie znanej flory. Obecnie, biorąc pod uwagę tylko moje znalezienia, udział ich spadł do 28%, a w stosunku do całej flory aktualnie zbierane epifity stanowią tylko 19%.

W takiej sytuacji zrozumiąla będzie konieczność przesunięcia punktu ciężkości obecnych poszukiwań w kierunku najmniej stosunkowo na tym obszarze zniszczonej flory porostów kalcifylanych.

Badania terenowe prowadziłem przez cztery lata (1955—1958), opracowując kolejno florę, rozmieszczenie gatunków i związane z tym problemy ekologiczne oraz zbiorowiska porostów skał wapiennych. Zmuszony byłem natomiast bardzo pobieżnie potraktować zagadnienie elementów geograficz-

nych, ze względu na słaby stopień wiedzy o rozmieszczeniu większości gatunków.

Poprzednicy moi podali ogółem 205 gatunków porostów. Po odrzuceniu 17 niewątpliwie błędnie wymienionych i po dołączeniu 177 nowo znalezionych (dane Z. Tobolewskiego 1958 pochodzą z nie ukończonego rękopisu mojej pracy), otrzymamy aktualną w tej chwili listę, która zawiera 366 pozycji. Poszukiwania dostarczyły mi okazów 288 gatunków. Pozostało zatem do odnalezienia jeszcze 77 (w tym 47 nadrzewnych, 18 naskalnych i 12 z innych grup ekologicznych); niektóre zresztą miałem możność sprawdzić w zielniku A. Rehmana.

Niektóre z gatunków, stwierdzonych po raz pierwszy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, to prawdziwe ciekawostki lichenologiczne, np.: *Caloplaca aurantia*, *Anema decipiens*, *Caloplaca coronata*, *C. xantholyta*, *Collema callopismum*, *Fulgensia bracteata*, *Gyalecta geoica* f. *muscicola*, *Ionaspis epulotica*, *Lecanactis stenhammari*, *Squamarina lentigera*, *Lecanora pruinosa*, *L. reuteri*, *Lecidea deceptor*, *L. lurida*, *L. monticola*, *Lempholemma chalazanum*, *Opegrapha mougeotii*, *Phycia tribacia*, *Placynthium subradiatum*, *Porina byssophila*, *Ramalina intermedia*, *Rinodina immersa*, *Sagiolechia protuberans*, *Synalissa symphorea*, *Thyrea pulvinata*, *Toninia aromatica*, *T. toniniana*.

Nie brak porostów zupełnie nowych dla flory polskiej, a mianowicie: *Caloplaca arenaria*, *Candelariella medians*, *Polyblastia bavarica*, *Thelidium dionantense*, *Verrucaria bagliettoaeformis*, *V. congregata*, *V. fatrana*, *V. gyele-nikii*, *V. lecideoides*, *V. lettaui*, *V. minuta*, *V. nigrofusca*, *V. obfuscans*, *V. parmigerella*, *V. policensis*, *V. velana*, a nawet gatunku nowego dla wiedzy, którym jest *Verrucaria polonica* (Nowak 1959).

Tym wszystkim, którzy pomagali mi przy powstawaniu pracy, składam bardzo gorące podziękowania. Dziękuję zwłaszcza prof. drowi Józefowi Motyce (Lublin) za licznę radę i wskazówki oraz oznaczenie gatunków z rodzajów: *Alectoria*, *Ramalina* i *Usnea*, drowi J. Poeltowi (München) za oznaczenie niektórych gatunków z rodzajów: *Caloplaca* i *Buellia*, drowi Miroslavovi Servítovi (Czechosłowacja) za wskazanie literatury dotyczącej rodziny *Verrucariaceae*, prof. drowi Bronisławowi Szafranowi za szczególnie serdeczną opiekę i miejsce do pracy, którego mi przez długi okres udzielał w swej ciasnej, nie związanej z lichenologią Pracowni Bryologicznej, doc. drowi Janowi Kornasiowi za cenne uwagi.

Osobno pragnę podziękować doktorowi Zygmuntowi Tobolewskiemu (Poznań), który pierwszy zawsze chętnie służył mi pomocą fachową w oznaczaniu krytycznych gatunków skorupiatych.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Według obecnych poglądów (Wł. Szafer 1959) Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest osobną krainą geobotaniczną i wchodzi w skład pododziału (jednostka geobotaniczna wyższej rangi) tzw. Pasa Wyżyn Środkowych.

Równorzędnie należą tam następujące krainy: 1. Wzgórza Trzebnicko-Ostrzeszowskie, 2. Wyżyna Śląska, 3. Wyżyny Lessowe (Kraina Miechowsko-Sandomierska), 4. Kraina Świętokrzyska, 5. Północne Wysoczyzny Brzeźne, 6. Wyżyna Lubelska, 7. Roztocze.

Materiałem skalnym, z którego zbudowana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, są wapienie jurajskie. Inne utwory, np. wapienie karbońskie, zlepieńce myślachowickie czy porfiry i melafiry, stanowią niewielkie wyspy i nie mają większego znaczenia jako siedlisko porostów. Wapień jurajski tworzy tu płytę miejscami grubą do 120 m. Od zachodu tzw. kuesta jurajska odcina ją od Wyżyny Śląskiej, ku wschodowi wapienie zapadają pod formacje kredowe i trzeciorzędowe, a granica Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest tam trudna do przeprowadzenia. Południowy jej kraniec oddzielony jest od Karpat rowem tektonicznym z przepływającą przez to obniżenie Wisłą. Podobna graniczna rola przypada na północy tzw. Bramie Warciańskiej.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska nie jest obszarem geobotanicznie jednolitym. Wyróżniono tu dwa okręgi: południowy i północny (w dalszym ciągu pracy będę je określał jako Jurę Południową i Jurę Północną). Zwykło się uważać (np. J. Kornaś 1950) za okręg pierwszy tereny leżące na południe od pradoliny Białej Przemszy, za okręg drugi obszary położone na północ od niej. Jednym z zasadniczych kryteriów takiego podziału było rozmieszczenie przykrywających skały wapienne lessów i piasków. Lessy zalegają głównie wierzchowinę Jury Południowej, natomiast piaski mają swą domenę na Jurze Północnej (i tu i tam trafiają się zresztą miejsca o stosunkach odwrotnych). Nie trzeba specjalnie udowadniać, że ma to decydujący wpływ na ogólny charakter szaty roślinnej obu okręgów. Jednakże, jeśli chodzi o stosunki lichenologiczne, bardziej zasadniczym czynnikiem, który różnicuje flory porostów Jury Południowej i Jury Północnej, jest odmienna rzeźba obu terenów.

Na Jurze Południowej największą procentowo powierzchnię zajmuje wierzchowina. Jest ona dzisiaj prawie w całości wykorzystywana przez rolnictwo. Wierzchowinę rozcinają liczne, w większości przebiegające południkowo i względem siebie równoległe, głębokie, wąskie i długie doliny erozyjne, wąwozy lub jary. Tutaj na zboczach sterczą dziesiątki skałek, skał lub stromych i wyniosłych ścian wapiennych o znacznej niekiedy wysokości (do 100 m). Nadają one krajobrazowi dolin swoisty, dziki i prawie górski charakter. Nawet w najodleglejszych czasach, kiedy Jurę Południową porastały rozległe lasy, cyple skał podobnie jak dzisiaj były odsłonięte i silnie nasłonecznione. W większości przypadków dolinami płyną potoki albo mniejsze strugi. Ich obecność oraz rozwijająca się na zboczach, w postaci muraw, zarośli czy lasów, bujna szata roślinna sprzyja utrzymywaniu się w powietrzu pewnego stopnia wilgoci. W połączeniu z niektórymi cechami klimatu wszystko to sprawia, że istnieje tu zespół idealnych warunków dla wegetacji gatunków porostów nie spotykanych w Polsce poza obszarami gór. Stąd właśnie kalci-

filne flory Jury Południowej i Pienin wykazują tak uderzające podobieństwo (Z. Tobolewski 1958). Do najokazalszych dolin należą: około 20 km długa Dolina Prądnika i niewiele jej krajobrazowo ustępująca Dolina Bętkowska; lichenologicznie najciekawsza jest miniaturowa Dolina Bolechowicka.

Rzeźba Jury Północnej, gdzie płyta jurajska uległa silniejszemu zerodowaniu i przysypana została następnie przez pokrywę piasków dyluwialnych, jest inna. Nie ma tu tak charakterystycznych dla południowego okręgu głębokich dolin. Wychodniami wapieni są tylko ostańce płytowe o kształtach silnie urozmaiconych, często bardzo osobliwych. Sterczą one samotnie lub większymi grupami wśród monotonnych, odwodnionych pól, mizernych sosnowych lasów, albo wieńczą zbocza i wierzchołki wzgórz. Największe skupienia tworzą w okolicach Częstochowy i Olsztyna, Złotego Potoku i Niegowej, Kroczyce i Morska, Ogrodzieńca, Ryczowa i Smolenia. Zbiorowiska porostów, jakie rozwijają się tu na płaszczyznach bloków skalnych w warunkach mikroklimatu, znacznie suchszego niż na Jurze Południowej (ostańce, znajdujące się w przestrzeniach otwartych, poddawane są silniejszemu, osuszającemu działaniu wiatru), odznaczają się ubóstwem florystycznym. Panują gatunki pospolite na wszystkich wapiennych obszarach, a to: *Lecanora muralis*, *Physcia caesia*, *Lecanora albescens*, *L. dispersa*, *L. crenulata*, *Physcia nigricans*, *Verrucaria calciseda*, *V. nigrescens* s.l., *Candelariella aurella*, *Caloplaca velana*, *C. decipiens*, *Acarospora glaucocarpa*, *Lepraria* cfr. *crassissima*, *Protoblastenia rupestris* itp. Należy zaznaczyć, że dodatkowym czynnikiem, pogłębiającym to naturalne zubożenie, stał się ostatnio człowiek, który przeźrebił lasy i wyniszczył zarośla.

Klimatyczne warunki Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nie są zbyt dobrze poznane. Niektóre dane ilustruje załączona tabelka. Jak z nich wyni-

Miesięczne i roczne sumy opadów w mm — dane za lata 1891-1930
(wg W. Wiszniewskiego 1953)

Stacja		Wysokość n.p.m.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Srednia roczna
Jura Południowa	Czernichów	223	41	35	38	53	76	102	107	89	60	56	42	38	737
	Kraków Obs. Astr.	216	32	29	36	49	77	97	111	95	63	56	40	36	721
	Mydlniki	220	30	26	32	43	66	84	95	82	54	50	36	33	631
	Krzeszowice	266	36	31	35	46	64	87	100	82	54	52	41	38	666
	Nowa Góra	449	55	45	47	54	72	82	108	89	58	54	50	52	766
	Ojców	370	40	41	40	60	78	94	109	105	73	48	56	47	791
	Olkusz	365	45	38	40	48	64	81	113	89	55	55	45	53	726
Jura Północ.	Pilica	350	38	32	37	47	65	80	97	82	55	52	44	40	669
	Łazy	339	39	31	38	55	62	75	88	78	50	50	44	38	648
	Złoty Potok	279	39	35	40	53	64	79	98	78	52	47	43	40	668
	Częstochowa	259	31	35	36	48	80	92	93	69	46	60	45	43	678

Ryc. 1. Mapa Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (schematyczne jej granice zaznaczono linią przerywaną).

Fig. 1. Map of the Cracow-Częstochowa Upland (the schematic boundary of the Cracow-Częstochowa Upland has been marked with a broken line).

miejsowości (Localities): 1 — Olsztyn; 2 — Przemyłowice; 3 — Biskupice; 4 — Złoty Potok; 5 — Ludwinów; 6 — Gorzków; 7 — Żarki; 8 — Lutowiec; 9 — Niegowa; 10 — Kotowice; 11 — Mirów; 12 — Zdów; 13 — Rzędkowice; 14 — Morsko; 15 — Kroczyce; 16 — Podlesice; 17 — Piaseczno; 18 — Żerkowice; 19 — Karlin; 20 — Podzamcze; 21 — Pilica; 22 — Srubarnia; 23 — Ryczów; 24 — Złożeniec; 25 — Smoleń; 26 — Kąty koło Ryczówka; 27 — Krzywoploty; 28 — Dłużec; 29 — Wolbrom; 30 — Klucze; 31 — Rabsztyn; 32 — Skalskie; 33 — Michałówka; 34 — Sułoszowa; 35 — Pieskowa Skała; 36 — Wielmoża; 37 — Skała; 38 — Raclawice; 39 — Jerzmanowice (Dolina Szklarki); 40 — Ojców (Dolina Prądnika); 41 — Czajowice; 42 — Bębło; 43 — Czarna; 44 — Dolina Bętkowska; 45 — Wierzchowie; 46 — Dolina Kobylańska; 47 — Dolina Bolechowicka; 48 — Dolina Kluczwody; 49 — Dolina Kobylańska; 50 — Tenczynek; 51 — Nielepice; 52 — Kamyk; 53 — Brzostkwinia (Dolina Brzostkwinii); 54 — Zabierzów (Skała Kmita); 55 — Kryspinów; 56 — Sanka; 57 — Brodta; 58 — Rybna; 59 — Mników; 60 — Przegiń Duchowna; 61 — Bielany; 62 — Piekary; 63 — Tyniec (Podgórze Tynieckie); 64 — Czernichów; 65 — Ściejowice.

ka, suma opadów rocznych, osiągająca np. w Ojcowie prawie 800 mm, nasuwa analogie z Pieninami (porównaj Z. Tobolewski 1958).

Granice, w których obrębie prowadziłem badania, są granicami schematycznymi. Odbiegają one nieco od trudnych do ustalenia granic rzeczywistych. Ich przebieg wygląda w sposób następujący: a. granica zachodnia jest krzywą łączącą miejscowości: Okleśna, Rudno, Filipowice, Olkusz, Klucze, Ogrodzieniec, Kromiów, Włodowice, Żarki, Biskupice, Olsztyn, Częstochowa; b. granica wschodnia biegnie przez: Mstów, Janów, Mzurów, Kroczyce, Siamoszyce, Pilicę, Wolbrom, Skalę, Zielonki, Kraków; c. granica północna biegnie przełomem Warty na odcinku od Częstochowy do Mstowa; d. granica południowa natomiast doliną Wisły od Okleśnej do Tyńca i dalej przez Kostrze, Krzemionki po Kraków. Obszar zakreślony tymi granicami ma długość z południa na północ około 90 km, szerokość ze wschodu na zachód około 15—25 km. Powierzchnię jego oceniam w bardzo dużym przybliżeniu na około 1500 km². Nie objąłem badaniami sąsiedniej na północy Wyżyny Wieluńskiej. Pomimo że geologicznie jest ona rzeczywistym przedłużeniem płyty jurajskiej, silne argumenty geobotaniczne przemawiają za zaliczeniem tego okręgu do innej krainy, tzw. Krainy Północnych Wysoczyzn Brzeżnych (Wł. Szafer 1959).

II. ORIENTACYJNY PRZEGLĄD SIEDLISK I ZBIOROWISK POROSTÓW

Dokładne omówienie zagadnień składających się na ten rozdział zawarłem, jako problem specjalny, w osobnej pracy pod tytułem: „Naskalne zespoły porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej” (Nowak 1960). Tutaj przedstawiam tylko najogólniejszy szkic tematu, wyłącznie dla celów orientacyjnych.

Stopień zachowania poszczególnych typów siedlisk i zbiorowisk porostów w stanie zbliżonym do naturalnego jest na naszym terenie niejednakowy. W niektórych przypadkach gospodarka człowieka nie pozostawiła z pierwotnego obrazu. Dotyczy to szczególnie zbiorowisk porostów naziemnych czy nadrzecznych. Najlepiej zachowały się epilityczne zbiorowiska porostów kalcifilnych.

1. Zbiorowiska skał wapiennych

Do badań zbiorowisk skał wapiennych zastosowałem metodę fitosocjologiczną. Umożliwiło to nadanie zbiorowiskom rangi zespołów. Nie będę obecnie omawiał szczegółów metodycznych. Jak wspomniałem, poświęcona jest temu zagadnieniu osobna praca (Nowak 1960). Ograniczę się tutaj do wymienienia nazw zespołów i podania gatunków charakterystycznych dla każdego z nich.

a. Zespół *Candelariella medians-Physcia nigricans*. Gatunki charaktery-

styczne: *Candelariella medians*, *Physcia nigricans*, *Ph. orbicularis*, *Caloplaca decipiens*, *Lecanora albescens*.

b. Zespół *Dermatocarpon monstrosum*-*Buellia venusta*. Gatunki charakterystyczne: *Dermatocarpon monstrosum*, *Buellia venusta*, *Lecanora radiosa*, *Rinodina bischoffii*, *R. cfr calcarea*, *R. ocellata*, *Acarospora cervina*.

c. Zespół *Rinodina immersa*-*Verrucaria gyelnikii*. Gatunki charakterystyczne: *Rinodina immersa*, *Verrucaria gyelnikii*, *Lecidea stigmatea*, *Verrucaria congregata*, *Blastenia ochracea*, *Verrucaria minuta*.

d. Zespół *Lecania erysibe*-*Verrucaria policensis*. Gatunki charakterystyczne: *Lecania erysibe*, *Verrucaria policensis*.

e. Zespół *Caloplaca murorum*-*Lecanora pruinosa*. Gatunki charakterystyczne: *Caloplaca murorum*, *Lecanora pruinosa*, *L. reuteri*, *Physcia tribacia*.

f. Zespół *Peccania coralloides*-*Thyrea pulvinata*. Gatunki charakterystyczne: *Peccania coralloides*, *Thyrea pulvinata*, *Synalissa symphorea*, *Psorotichia* sp., *Anema decipiens*.

g. Zespół *Polyblastia papularis*-*Arthopyrenia conoidea*. Gatunki charakterystyczne: *Arthopyrenia conoidea*, *Polyblastia papularis*, *Gyalecta jenensis*, *Verrucaria polonica*, *Lecidea monticola*, *Verrucaria dolosa*, *Lecidea immersa*.

h. Zespół *Ionaspis epulotica*. Gatunki charakterystyczne: *Ionaspis epulotica*, *Verrucaria parmigerella*.

i. Zespół *Verrucaria velana*-*Caloplaca xantholyta*. Gatunki charakterystyczne: *Verrucaria velana*, *Caloplaca xantholyta*, *Ramalina intermedia*, *Lecanactis stenhammari*, *Buellia alboatra*, *Opegrapha mougeotii*.

2. Zbiorowiska skał krzemianowych

Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nie ma większych skupisk skał krzemianowych, te zaś które są, np. porfiry i melafiry koło Czernej, Tenczynka i Zalasza, nie tworzą naturalnych bloków i ścian. Gatunki acidofilne ograniczają swe występowanie do powierzchni niewielkich, granitowych i krzemiennych głazów polodowcowych rozrzuconych wśród piaszczystych pól Jury Północnej. Nic też dziwnego, że osiadła na nich flora jest bardzo uboga. Rosną tam jedynie: *Parmelia conspersa*, *Rhizocarpon ambiguum*, *Rh. excentricum*, *Candelariella vitellina*, *Lecanora atra*, *L. umbrina* f. *saxicola*, *Diploschistes scruposus*, *Lecanora muralis*, *L. polytropa*, *Lecidea crustulata*, *L. macrocarpa*, *Bacidia umbrina*, *Lecidea coarctata*, *Lecanora gibbosa* s.l. i inne jeszcze, pospolite na ogół gatunki, które na głazach tych nie tworzą zindywidualizowanych zbiorowisk.

3. Zbiorowiska naziemne

a. Lessy

Lessy Jury Południowej nie stwarzają warunków dla wykształcania się na nich odrębnych zbiorowisk porostów. Brak tu bowiem głębszych jarów o stromych zboczach (jak np. na terenie sąsiedniej Krainy Miechowsko-Sandomierskiej). Jedynie po szkarpach dróg polnych pojawiają się, niekiedy w większej ilości, skupienia plech: *Peltigera erumpens*, *Baeomyces roseus* czy też innych gatunków, np. z rodzaju *Cladonia*. Na lessowych zboczach dolin zwykle rosną: *Cladonia verticillata*, *Cl. furcata*, *Cl. cornutoradiata*, *Cl. pyxidata*, *Cl. fimbriata*, *Baeomyces roseus* i *B. rufus*.

b. Piaski dyluwialne

Nieco lepiej niż na lessach kształtują się zbiorowiska porostów naziemnych na piaskach. Na jałowych, szczerych piaskach, w miejscach bezleśnych, a zwykle opanowanych jedynie przez trawę *Corynephorus canescens*, rosną (czasem masowo) nieliczne jeszcze gatunki: *Cetraria islandica*, *Cornicularia tenuissima* i *Cladonia mitis*. W luźnych, przewiewnych, młodych lasach sosnowych, szczególnie tam, gdzie nie grabi się ściółki, rozwijają się już całe dywany porostów krzaczkowatych, takich jak: *Cladonia sylvatica*, *Cl. mitis*, *Cl. rangiferina*, *Cl. uncialis*, *Cl. gracilis*, *Cl. degenerans*, *Cl. cornuta*, *Cl. coccoifera*, *Cl. squamosa*, *Cl. alcicornis*, *Cetraria islandica*, *C. crispa*, *Cornicularia tenuissima*, *Stereocaulon incrustatum*, *S. condensatum*, *Lecidea uliginosa*, *L. granulosa*, *Cladonia turgida*. W starszych sośninach o dobrze wykształconym runie, spotyka się mniej gatunków. Zwykle są to tylko: *Cladonia furcata*, *Cl. bacillaris*, *Cl. chlorophaea*, *Cl. fimbriata*, *Cl. deformis*.

c. Humus i zwietrzelina skał wapiennych

Szereg gatunków porostów związanych jest na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z podłożem tego typu, jednak — podobnie jak w Pieninach (Z. Tobolewski 1958) — nie zauważyłem, by gatunki te formowały zindywidualizowane zbiorowiska. Rosną one albo pojedynczo, albo w układach przypadkowych. Na warstwach zwietrzeliny w szczelinach skał wapiennych, w miejscach suchych i nasłonecznionych, rosną: *Toninia coeruleonigricans*, *Endocarpon pusillum*, *E. pallidum*, *Toninia toniniana*, *Dermatocarpon hepaticum*, *Lecidea decipiens*, *Lempholemma chalazanum*, *Collema tenax*, *Squamarina lentigera*, *Fulgensia bracteata*, *Dermatocarpon* cfr. *cinereum*, *D. daedaleum*, *Diploschistes bryophilus*, *Cladonia pyxidata* var. *pocillum*. W podobnych szczelinach, lecz w miejscach eksponowanych na północ spotyka się: *Solorina saccata*, *Toninia lobulata*, *Gyalecta geioica*. Na warstwach humusu pokrywających półki skał wapiennych układ gatunków jest nieco inny. Zazwyczaj pa-

nują tu: *Cladonia symphylicarpa*, *Leptogium lichenoides*, *Cladonia pyxidata* var. *pocillum*, *Peltigera rufescens* f. *incusa*, *P. aphtosa*, *Cladonia furcata*, *Cl. cornutoradiata*, *Collema tenax*, *Toninia coeruleonigricans*, *Diploschistes bryophilus*.

4. Zbiorowiska porostów na mchach i szczątkach roślinnych

Zbiorowiska tego typu występują dopiero w wysokich górach lub na dalekiej północy (w Arktyce). Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, podobnie jak w przypadku humusu i zwietrzliny, porosty rosną na szczątkach roślinnych i mchach pojedynczo. Są to: *Caloplaca stillicidiorum*, *Bacidia muscorum*, *B. lignaria*, *B. fusca*, *B. sabuletorum*, *Lecidea atrofusca*, *Buellia punctata* f. *muscicola*.

5. Zbiorowiska epifitów

Z danych H. Lojki (1868), A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) wynika, że dawniej bogactwo flory epifitów było prawie tak samo wielkie, jak porostów kalcofilnych. Prawdopodobnie jeszcze wtedy zbiorowiska nadrzewne posiadały typowy i bogaty skład gatunkowy. Dzisiaj niestety o takich zbiorowiskach nie można mówić. Nawet w samym otoczeniu Ojcowa, Rabsztyna czy Złotego Potoku, gdzie istniejące drzewostany mają, przynajmniej częściowo, charakter starych i naturalnych, zaznacza się wyraźnie ujemny wpływ osuszenia mikroklimatu. W sytuacji tej nie pozostało nic innego, jak podać listy porostów rosnących na ważniejszych gatunkach drzew.

a. Epifity sosny (*Pinus silvestris*) i modrzewia (*Larix* sp.)

Pojedyncze okazy sosen i modrzewi (np. na zboczach dolin, na skraju lasów) porastają nieliczne gatunki porostów, np.: *Lecanora conizaea*, *Lecidea scalaris*, *L. flexuosa*, *Parmelia physodes*. Znacznie więcej gatunków występuje na sosnach tworzących luźne lasy na terenie Jury północnej; są to: *Parmeliopsis aleurites*, *Lecanora piniperda*, *Lecidea scalaris*, *L. flexuosa*, *Parmelia furfuracea*, *P. bitteriana*, *P. tubulosa*, *P. physodes*, *Lecanora varia*, *L. conizaea*, *Parmeliopsis ambigua*, *Lecanora chlorina* f. *pinastri*, *Cetraria pinastri*, *C. chlorophylla* oraz zawsze masowo (często nawet jako jedyny porost na sosnach) *Bacidia chlorococca*.

b. Epifity świerka (*Picea excelsa*)

Świerk przeważnie występuje w lasach sadzonych, np. koło Tenczyńska, w Ojcowie itp. Na korze tego drzewa rosną: *Parmelia physodes*, *Lecanora varia*, *Lecidea scalaris*, *Lecanora conizaea*.

c. Epifity buka (*Fagus silvatica*)

Lasy bukowe, jakie zazwyczaj rozwijają się na podłożu wapiennym w otoczeniu dolin, na ich zboczach o ekspozycji północnej, posiadają duże zwarcie, a tym samym niedosyt światła. Warunki takie są z reguły dla wegetacji porostów złe. Przeważnie też lasy bukowe tego typu posiadają ubogą florę epifitów. Na korze drzew występują jedynie pojedyncze okazy: *Graphis scripta*, *Pyrenula nitida*, *Lecanora varia*, *L. chlarona*, *L. carpinea*. Wszystkie one mają plechę skorupiastą. Form liściastych lub krzaczkowatych brak tu zupełnie. Natomiast w starych lasach bukowych o mniejszym zwarciu lub na skraju lasów, gdzie dostęp światła jest znaczniejszy, a przewiewność lepsza, obraz zmienia się na korzyść. Pojawia się znacznie więcej gatunków, a wśród nich liściaste i krzaczkowate. Rosną tu: *Bacidia rosella*, *Pertusaria discoidea*, *P. amara*, *P. leioplaca*, *P. coronata*, *Phlyctis argena*, *Lecanora subrugosa*, *L. chlarona*, *L. carpinea*, *L. varia*, *Parmeliopsis ambigua*, *Pyrenula nitida*, *Parmelia saxatilis*, *Opegrapha herpetica*, *O. lichenoides*, *Parmelia sulcata*, *Cetraria chlorophylla*, *Lecidea olivacea*, *Parmelia physodes*, *Xanthoria polycarpa*.

d. Epifity graba (*Carpinus betulus*)

Grab tworzy lasy na zboczach dolin. Warunki dla wegetacji porostów są tam podobne do tych, jakie panują w lasach bukowych. Ilość gatunków jest niewielka, przeważnie ogranicza się do: *Graphis scripta*, *Opegrapha herpetica*, *Lecanora carpinea*, *Pertusaria leioplaca*, *Pyrenula nitida*.

e. Epifity dębów (*Quercus sessilis*, *Q. robur*)

Dąb wchodzi w skład różnego typu lasów na zboczach dolin, wzgórz lub na wierzcholinie. Na korze dębów występuje dość znaczna ilość gatunków łatkowatych i krzaczkowatych. Tłumaczy się to tym, że lasy dębowe nie posiadają wielkiego zwarcia. Ponadto osiedlaniu się takich gatunków sprzyja bardzo nierówna korowina tego drzewa. Spotykamy tu: *Parmelia physodes*, *Cetraria glauca*, *Parmelia sulcata*, *Alectoria subcana*, *Parmelia caperata*, *P. saxatilis*, *P. subaurifera*, *Evernia prunastri*, *Parmeliopsis ambigua*, *Parmelia exasperatula*, *Lecanora carpinea*, *L. chlarona*, *Pertusaria discoidea*, *P. amara*, *P. globulifera*, *P. coronata* i *P. slesvicensis*.

f. Epifity olchy (*Alnus glutinosa*)

Na olchach, które najczęściej rosną nad brzegami potoków, panuje *Parmelia physodes*. Spotyka się ponadto: *Cetraria glauca*, *Parmelia tubulosa*, *P. sulcata*, *P. exasperatula*, *Parmeliopsis ambigua*, a na gałązkach *Cetraria saepincola*.

g. Epifity drzew przydrożnych

Wzdłuż dróg Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej sadzone są najczęściej następujące drzewa: kasztanowce (*Aesculus hippocastanum*), grochodrzewy (*Robinia pseudacacia*), jesiony (*Fraxinus excelsior*), topole (*Populus* sp.), lub wierzbzy (*Salix* sp.). Znajdujemy tu wcale pokąźną liczbę gatunków porostów. Liczne spomiędzy nich — to porosty nitrofilne. Na przykład na wierzbach i topolach występują: *Physcia grisea*, *Ph. tenella*, *Ph. orbicularis*, *Ph. ascendens*, *Ph. pulverulenta*, *Ramalina farinacea*, *R. obtusata*, *R. fastigiata*, *Xanthoria parietina*, *X. candelaria*, *X. polycarpa*, *Parmelia acetabulum*, *P. exasperatula*, *P. fuliginosa*, *P. sulcata*, *P. physodes*, *Phlyctis argena*, *Lecidea euphorea*, *Lecanora allophana*, *Anaptychia ciliaris*, *Bacidia incompta*, *B. rubella*, *Candelariella xanthostigma*, *Evernia prunastri*, *Lecanora carpineae*, *Caloplaca pyracea*, *Buellia punctata*, *Rinodina pyrina*, *Lecanora varia*.

h. Porosty „starych pŁotów”

Stare drewniane parkany przy zagrodach wiejskich, poręcze mostów oraz inne drewniane przedmioty porastają następujące gatunki: *Cetraria saepincola*, *Parmelia physodes*, *P. furfuracea*, *P. exasperatula*, *Rinodina pyrina*, *Caloplaca pyracea*, *Lecanora hagenii*, *Catillaria denigrata*, *Xanthoria parietina*, *Candelariella vitellina*, *Lecanora albescens* planta lignicola.

III. UWAGI O FLORZE POROSTÓW WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

Według dotychczasowych badań flora porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej liczy 366 gatunków. Największy udział mają w niej epifity. Jest ich 162 (45%). Dość liczną grupę stanowią także gatunki nadrzewne w ilości 123 (33%). Najmniej, bo tylko 81 (22%), jest gatunków naziemnych. Prawie połowa całej flory, czyli 174 (47%) gatunki, wiąże się w jakiś sposób z podłożem wapiennym.

Ta właśnie grupa — przeważają w niej gatunki kserotermiczne — wyróżnia pod względem lichenologicznym krainę Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej spomiędzy innych, przyległych krain geobotanicznych. Pobieżne i wrywkowe obserwacje, jakie robiłem na terenach: Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Miechowsko-Sandomierskiej, Wyżyny Wieluńskiej, łącznie z obserwacjami Z. Tobolewskiego (1958) z Krainy Świętokrzyskiej, przekonanie to potwierdzają.

Podobieństwa pod względem warunków wegetacyjnych, szczególnie dla form kserotermicznych, posiada natomiast Wyżyna Krakowsko-Częstochowska w stosunku do Pienin (Z. Tobolewski 1958). Specjalnie rzeźba Jury Południowej przypomina krajobraz tamtego pasma wapiennego. Istniejące tu głębokie doliny z wyniosłymi i przepaścistymi skalicami to nieomal Pieni-

ny w miniaturze. Do krajobrazowych i siedliskowych dołączają się podobieństwa klimatyczne oraz niezbyt wielkie różnice wzniesień (przeciętna wysokość Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wynosi około 450 m n.p.m., przy maksymalnej 504 m n.p.m., najwyższe wzniesienie w Pieninach osiąga 1052 m n.p.m.).

Już pierwsze lichenologiczne doniesienia, np. A. Rehmana (1879) co do Jury Południowej i W. Boberskiego (1886—1892) co do Pienin, pozwalały domyślać się zbliżonego składu gatunkowego flor porostów kalcifilnych na obu obszarach. Jednak dopiero obecnie, kiedy dysponujemy już wynikami gruntownych i nowocześnie przeprowadzonych badań, można się było pokusić o dokonanie przekonującego porównania. Zrobił to Z. Tobolewski (1958), któremu w tym celu udostępniłem w roku 1956 nieukończony rękopis tej pracy. Porównanie potwierdziło pierwotne domysły. Poniżej podaję (z uzupełnieniami) płynące z niego wnioski (wszystkie dotyczą tylko gatunków kalcifilnych).

1. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska i Pieniny posiadają przy obecnym stanie wiedzy wśród porostów przywiązanych do podłoża wapiennego ogromną większość, bo 114 gatunków wspólnych.

2. Gatunków takich, których dotyczyłoby w Pieninach nie stwierdzono, a wymienianych z obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, jest 52. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że niektóre (wśród gatunków przeze mnie nie zbieranych) mogły być podawane błędnie oraz że istnieje duże prawdopodobieństwo znalezienia w Pieninach może wszystkich rosnących na Wyżynie gatunków z rodziny *Verrucariaceae* (rodzina ta została tam opracowana prowizorycznie), można przyjąć, że Wyżynę Krakowsko-Częstochowską odróżnia od Pienin tylko 13 gatunków kalcifilnych, a mianowicie: *Endocarpon pallidum*, *Porina byssophila*, *Gyalecta hypoleuca*, *Lempholemma chalazanum*, *Collema callopismum*, *Lecidea cinnamomea*, *L. immersa*, *Bacidia sphaeroides*, *Sarcogyne pusilla*, *Lecanora coronata*, *Candelariella medians*, *Blastenia ochracea*, *Caloplaca arenaria*.

3. Grupa gatunków rosnących w Pieninach, a nie stwierdzonych do tej pory na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, wynosi 30.

4. Niektóre spośród porostów objętych punktami 2 i 3 mogą w trakcie dalszych badań zostać przesunięte do grupy gatunków wspólnych i tym samym uwypuklić podobieństwa flor lub w przypadku gatunków wątpliwych mogą zostać zupełnie z naszych rozważań wyeliminowane (jeśli zaistnieje pewność, że zostały podane błędnie).

Zestawienie kalcifilnych gatunków porostów wspólnych dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Pienin:

Verrucaria gyelnikii (w Pieninach leg. J. Nowak 1957), *V. parmigerella* (w Pieninach leg. J. Nowak 1957), *V. policensis* (w Pieninach leg. J. Nowak 1957), *V. muralis*, *V. plumbea*, *V. rupestris*, *V. fuscella*, *V. nigrescens*, *V. velana* (w Pieninach leg. J. Nowak

1957), *Thelidium immersum*, *Polyblastia papularis*, *P. plicata*, *Dermatocarpon hepaticum*, *D. daedaleum*, *D. lachneum*, *D. miniatum*, *D. monstrosus*, *Endocarpon pusillum*, *Arthopyrenia conoidea*, *Opegrapha mougeotii*, *O. saxicola*, *Lecanactis stenhammari*. *Diploschistes albissimus*, *D. bryophilus*, *Ionaspis epulotica*, *Petractis clausa*, *Gyalecta geioica*, *G. jenensis*, *G. ulmi* f. *musciola*, *Sagiolechia protuberans* (w Pieninach leg. J. Nowak 1957), *Psorotichia schaeferi*, *Anema decipiens*, *Thyrea pulvinata*, *Peccania coralloides*, *Synalissa symphorea*, *Collema auriculatum*, *C. cristatum*, *C. polycarpon*, *C. tenax*, *C. tunaeforme*, *Leptogium lichenoides*, *Placynthium nigrum*, *P. subradiatum*, *P. tremniacum*, *Pannaria pezizoides*, *Solorina saccata*, *Peltigera aphthosa*, *Lecidea jurana*, *L. stigmatea*, *L. atrofusca*, *L. monticola*, *L. deceptoria*, *L. decipiens*, *L. lurida*, *L. testacea*, *Catillaria lenticularis*, *Bacidia fusca*, *B. lingaria*, *B. muscorum*, *B. sabuletorum*, *Toninia aromatica*, *T. candida*, *T. coeruleonigricans*, *T. lobulata*, *T. toniniana*, *Rhizocarpon umbilicatum* (z Wyżyny prawdopodobnie podany błędnie), *Cladonia symphyrcarpia*, *Sarcogyne pruinosa*, *Acarospora cervina*, *A. glaucocarpa*, *A. macrospora*, *Lecanora calcarea*, *L. contorta*, *L. hoffmanii*, *L. radiosa*, *L. albescens*, *L. crenulata*, *L. dispersa*, *L. muralis*, *L. pruinosa*, *L. reuteri*, *Squamarina lentigera*, *Lecania erysibe*, *Candelariella aurella*, *Ramalina intermedia* (wg Z. Tobolewskiego 1958 jest to naskalna forma *R. pollinaria*), *Protoblastenia calva*, *P. incrustans*, *P. rupestris*, *Fulgensia bracteata*, *Caloplaca chalybaea*, *C. citrina*, *C. coronata*, *C. dolomiticola*, *C. flavovirescens*, *C. lactea*, *C. stillicidiorum*, *C. variabilis*, *C. aurantia*, *C. cirrochroa*, *C. decipiens*, *C. murorum*, *C. xantholyta*, *Xanthoria elegans*, *Buellia alboatra*, *B. epipolia*, *B. venusta*, *Rinodina bischoffii*, *R. calcarea*, *R. immersa*, *R. ocellata*, *Physcia caesia*, *Ph. nigricans*, *Ph. tribacia*.

Zestawienie kalcifylnych gatunków porostów rosnących na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a nie stwierdzonych dotychczas w Pieninach:

Verrucaria bagliettoaeformis, *V. baldensis*, *V. carnea*, *V. lettaui*, *V. obfuscans*, *V. polygonia*, *V. silvatica*, *V. viridicans*, *V. confluens*, *V. congregata*, *V. dalejensis*, *V. dolosa*, *V. fatrana*, *V. lecideoides*, *V. limitata*, *V. murina*, *V. polonica*, *V. rivalis*, *V. controversa*, *V. fusco-atroides*, *V. langhensis*, *V. maculiformis*, *V. nigricans*, *V. nigrofusca*, *V. nigroumbrina*, *V. elaeomelaena*, *Thelidium decipiens*, *T. dionantense*, *Polyblastia amota*, *P. bavarica*, *P. pseudoalbida*, *Dermatocarpon cinereum*, *Endocarpon pallidum*, *Porina byssophila*, *Opegrapha sazatisii*?, *Gyalecta hypoleuca*, *Lempholemma chalazanum*, *Collema callopismum*, *C. crispum*?, *Leptogium sinuatum*?, *Lecidea cinnamomea*, *Leptogium tenuissimum*?, *Lecidea immersa*, *Bacidia arnoldiana*, *B. coprodes*?, *B. sphaeroides*, *Sarcogyne pusilla*, *Lecanora coronata*, *L. prevostii*?, *Candelariella granulata*, *Blastenia ochracea*, *Caloplaca arenaria*.

Zestawienie kalcifylnych gatunków porostów rosnących w Pieninach, a nie stwierdzonych dotychczas na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej:

Verrucaria amylacea, *V. concinna*, *V. dufourii*, *V. floerkeana*, *V. glaucina*, *V. mastoidea*, *V. tristis*, *Polyblastia cupularis*, *P. intercedens*, *P. pallescens*? (gatunek skał krzemianowych), *Staurothele ventosa*, *Arthopyrenia salweii*, *Opegrapha personii*, *Psorotichia murorum*, *Thyrea heppi*, *Collema undulatum*, *Leptogium plicatile*, *Pterygium filiforme*, *Toninia tabacina*, *Lecanora ceracea*, *Squamarina conrescens*, *S. crassa* (była podawana błędnie z Jury Południowej), *S. gypsacea*, *Lecania albariella*, *Fulgensia fulgens*?, *Caloplaca lallavei*?, *C. leucoraea*, *C. schistidi*, *Rinodina conradii*, *Physcia muscigena*.

Należałoby z kolei przedstawić analizę geograficzno-historyczną flory porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Niestety, podobnie jak w przypadku Pienin (Z. Tobolewski 1958), jest to jeszcze w tej chwili niemożliwe; na przeszkodzie stoją skąpe wiadomości o rozmieszczeniu i pochodzeniu po-

szczególnych gatunków, głównie kalcofilnych. Ograniczę się zatem do przykładowego wymienienia przypuszczalnych składników niektórych tylko elementów geograficznych.

Tak jak w Pieninach, wśród wapieniolubnych porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej najwięcej jest stosunkowo oreofitów europejskich (przeważnie niższych położen górskich), np.: *Verrucaria gyelnikii*, *V. leci-deoides*, *V. minuta*, *V. fatrana*, *Thelidium dionantense*, *Polyblastia amota*, *Dermatocarpon lachneum*, *Endocarpon pusillum*, *Anema decipiens*, *Synalissa symphorea*, *Thyrea pulvinata*, *Placynthium subradiatum*, *Lecidea lurida*, *Toninia candida*, *Cladonia symphyrcarpia*, *Acarospora cervina*, *Caloplaca coronata*, *C. cirrochroa*, *Rinodina ocellata*. Prawie wszystkie są gatunkami częściej spotykanymi w Europie południowej, a stopniowo zanikają ku północy.

Element śródziemnomorski reprezentowałyby: *Dermatocarpon monstrosum*, *Lecidea deceptor*, *L. testacea*, *Toninia toniniana*, *Lecanora coronata*, *L. pruinosa*, *Squamarina lentigera*, *Blastenia ochracea*. Wszystkie te gatunki rosną u nas w miejscach silnie nasłonecznionych.

Gatunkami, które często występują w Arktyce (B. Lynge 1924—1940), oraz w wysokich górach, lecz nie umiem powiedzieć, czy rzeczywiście należą do elementu arktyczno-górskiego, są: *Bacidia muscorum*, *Dermatocarpon cinereum*, *D. daedaleum*, *Caloplaca stillicidiorum*, *Fulgensia bracteata*, *Lecidea atrofusca*, *Toninia lobulata* (wszystkie rosną na mchach, szczątkach roślinnych lub na warstwach humusu w szczelinach skał).

Szerokie, mniej więcej holarktyczne rozmieszczenie mają wg A. Zahlbrucknera (1922—1940): *Acarospora glaucocarpa*, *Gyalecta ulmi*, *Lecanora calcarea*, *L. contorta*, *L. dispersa*, *Protoblastenia rupestris*, *Sarcogyne pruinosa*, *Solorina saccata*.

Wreszcie kosmopolitami (A. Zahlbruckner 1922—1940) są: *Candelariella aurella*, *Diploschistes albissimus*, *Physcia caesia*, *Lecanora muralis*, *Verrucaria nigrescens*.

Niejednolitość rzeźby Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, z której wynika podział tej krainy na dwa okręgi geobotaniczne, znajduje swoje odzwierciedlenie w stosunkach lichenologicznych. Okręg południowy, gdzie mikroklimat siedliskowy jest prawie zawsze wilgotniejszy i bardziej zbliżony do górskiego, jest bezwzględnie bogatszy, jeśli chodzi o ilość gatunków, od wybitnie suchego pod względem mikroklimatycznym okręgu północnego.

Dobrze ilustruje zubożenie flory porostów Jury Północnej w stosunku do Jury Południowej załączone zestawienie wszystkich kalcofilnych gatunków porostów, rosnących na obszarach obu tych okręgów. Jest ono tak pomyślane, że oprócz różnic jakościowych (gatunek występuje albo go brak) uwzględnienia różnice ilościowe (gatunek na pierwszym terenie bardzo pospolity, na drugim już tylko częsty albo analogicznie: pospolity i rzadki itd.). Wszystkie gatunki uszeregowane są grupami według analogicznych par stopni

Zestawienie kalcifilnych gatunków porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej obrazujące podobieństwa oraz różnice ilościowe i jakościowe pomiędzy florą Jury Południowej i Jury Północnej

Okręg geobotaniczny	Jura Południowa	Jura Północna
<i>Caloplaca dolomiticola</i> <i>Candelariella aurella</i> <i>Lepraria crossissima</i> <i>Phycia caesia</i> <i>Phycia nigricans</i> <i>Phycia ascendens</i> <i>Placynthium nigrum</i> <i>Protoblastenia rupestris</i> <i>Lecanora albescens</i> <i>Lecanora crenulata</i> <i>Lecanora dispersa</i> <i>Lecanora muralis</i> <i>Verrucaria calciseda</i>	Gatunki bardzo pospolite	Gatunki bardzo pospolite
<i>Acarospora glaucocarpa</i> <i>Caloplaca cirrochroa</i> <i>Caloplaca decipiens</i> <i>Caloplaca lactea</i> <i>Caloplaca variabilis</i> <i>Collema tunaeforme</i> <i>Diploschistes bryophilus</i> <i>Leptogium lichenoides</i>	Gatunki pospolite	Gatunki pospolite
<i>Verrucaria velana</i>	Gatunek częsty	Gatunek częsty
<i>Bacidia muscorum</i> <i>Gyalecta geoica</i> <i>Lecanora pruinosa</i> <i>Verrucaria fuscella</i>	Gatunki rozproszone	Gatunki rozproszone
<i>Lecidea deceptor</i> <i>Thelidium decipiens</i> <i>Toninia lobulata</i> <i>Verrucaria nigrescens</i> s. stricto <i>Verrucaria nigricans</i> <i>Verrucaria parmigerella</i>	Gatunki rzadkie	Gatunki rzadkie
<i>Leptogium sinuatum</i> <i>Verrucaria nigroumbrina</i> <i>Verrucaria plumbea</i>	Gatunki bardzo rzadkie	Gatunki bardzo rzadkie
<i>Lecanora calcarea</i> <i>Verrucaria gyelnikii</i>	Gatunki bardzo pospolite	Gatunki pospolite

Okręg geobotaniczny	Jura Południowa	Jura Północna
<i>Gyalecta jenensis</i>	Gatunek pospolity	Gatunek częsty
<i>Acarospora macrospora</i> <i>Caloplaca aurantia</i> <i>Lecanora contorta</i> <i>Sarcogyne pruinoso</i>	Gatunki częste	Gatunki rozproszone
<i>Lecanora hoffmannii</i> <i>Lecidea stigmathea</i> <i>Ramalina intermedia</i> <i>Verrucaria dalejensis</i>	Gatunki rozproszone	Gatunki rzadkie
<i>Acarospora cervina</i> <i>Dermatocarpon hepaticum</i> <i>Lecidea decipiens</i> <i>Opegrapha mougeotii</i> <i>Placynthium tremniacum</i> <i>Polyblastia bavarica</i> <i>Protoblastenia calva</i>	Gatunki rzadkie	Gatunki bardzo rzadkie
<i>Anema decipiens</i> <i>Bacidia arnoldiana</i> <i>Bacidia lignaria</i> <i>Blastenia ochracea</i> <i>Caloplaca arenaria</i> <i>Collema callopismum</i> <i>Fulgensia bracteata</i> <i>Gyalecta ulmi</i> f. <i>musciicola</i> <i>Leptogium tenuissimum</i> <i>Polyblastia pseudoalbida</i> <i>Porina byssophila</i> <i>Sarcogyne pusilla</i> <i>Verrucaria fatrana</i> <i>Verrucaria fuscoatroides</i> <i>Verrucaria</i> cfr. <i>langhensis</i> <i>Verrucaria nigrofusca</i> <i>Verrucaria rivalis</i>	Gatunki bardzo rzadkie	—
<i>Caloplaca pyracea</i> v. <i>pyrithroma</i>	Gatunek częsty	Gatunek pospolity
<i>Bacidia sabuletorum</i> <i>Lecidea cinnamomea</i>	Gatunki rozproszone	Gatunki częste
<i>Polyblastia amota</i> <i>Verrucaria polygonia</i>	Gatunki rzadkie	Gatunki rozproszone

Okręg geobotaniczny	Jura Południowa	Jura Północna
<i>Bacidia sphaeroides</i> <i>Dermatocarpon daedaleum</i> <i>Verrucaria bagliettoaeformis</i> <i>Verrucaria carnea</i> <i>Verrucaria confluens</i> <i>Verrucaria viridicans</i>	—	Gatunki bardzo rzadkie
<i>Caloplaca chalybaea</i>	Gat. bardzo pospolity	Gatunek częsty
<i>Caloplaca murorum</i> <i>Collema tenax</i>	Gatunki pospolite	Gatunki rozproszone
<i>Buelia epipolia</i> <i>Caloplaca xantholyta</i> <i>Cladonia symphy carpia</i> <i>Polyblastia papularis</i> <i>Rinodina bischoffii</i> <i>Thelidium immersum</i> <i>Toninia candida</i>	Gatunki częste	Gatunki rzadkie
<i>Collema auriculatum</i> <i>Collema polycarpon</i> <i>Dermatocarpon cinereum</i> <i>Gyalecta hypoleuca</i> <i>Ionaspis epulotica</i> <i>Lecidea testacea</i> <i>Lempholemma chalazanum</i> <i>Physcia tribacia</i> <i>Placynthium subradiatum</i> <i>Toninia aromatica</i> <i>Verrucaria dolosa</i> <i>Verrucaria obfuscans</i> <i>Verrucaria rupestris</i>	Gatunki rozproszone	Gatunki bardzo rzadkie
<i>Bacidia fusca</i> <i>Endocarpon pallidum</i> <i>Lecanora coronata</i> <i>Squamarina lentigera</i> <i>Lecidea atrofusca</i> <i>Lecidea lurida</i> <i>Rinodina cfr. calcarea</i> <i>Synalissa symphorea</i> <i>Thelidium dionantense</i> <i>Thyrea pulvinata</i> <i>Toninia toniniana</i> <i>Verrucaria baldensis</i> <i>Verrucaria congregata</i>	Gatunki rzadkie	—

Okręg geobotaniczny	Jura Południowa	Jura Północna
<i>Verrucaria lecideoides</i> <i>Verrucaria minuta</i> <i>Verrucaria silvatica</i>	Gatunki rzadkie	—
<i>Buellia venusta</i> <i>Lecania erysibe</i> <i>Lecanora radiosa</i> <i>Lecidea jurana</i> <i>Solorina saccata</i> <i>Toninia coeruleonigricans</i>	Gatunki pospolite	Gatunki rzadkie
<i>Candelariella medians</i> <i>Dermatocarpon lachneum</i> <i>Lecanactis stenhammari</i> <i>Verrucaria policensis</i>	Gatunki częste	Gatunki bardzo rzadkie
<i>Arthropyrenia conoidea</i> <i>Buellia alboatra</i> <i>Catillaria lenticularis</i> <i>Endocarpon pusillum</i> <i>Lecanora reuteri</i> <i>Lecidea immersa</i> <i>Lecidea monticola</i> <i>Opegrapha saxicola</i> <i>Peccania coralloides</i> <i>Petractis clausa</i> <i>Protoblastenia incrustans</i> <i>Psorotichia schaeferi</i> <i>Verrucaria lettaui</i> <i>Verrucaria polonica</i>	Gatunki rozproszone	—
<i>Caloplaca citrina</i>	Gatunek rozproszony	Gatunek bardzo pospolity
<i>Dermatocarpon miniatum</i> <i>Rinodina ocellata</i>	Gatunki pospolite	Gatunki bardzo rzadkie
<i>Collema cristatum</i> <i>Diploschistes albissimus</i> <i>Sagiolechia protuberans</i>	Gatunki częste	—
<i>Dermatocarpon monstrosum</i> <i>Caloplaca coronata</i> <i>Rinodina immersa</i>	Gatunki pospolite	—

skali pospolitości (gatunek bardzo pospolity, pospolity, częstszy, rozproszony, rzadki, bardzo rzadki — porównaj objaśnienie skali na str. 27). Kolejność ustawienia tych grup w tabelce jest następująca: pierwsze grupy wyrażają podobieństwa, następne różnice minimalne (o jeden stopień skali, np. gatunek bardzo pospolity i pospolity, pospolity i częsty itd.), dalsze wyrażają różnice stopniowo coraz głębsze (o dwa stopnie skali, trzy itd.).

Z zestawienia tego wynika, że:

1. Gatunkami, których brak na Jurze Północnej lub których żywotność jest tam zmniejszona, są na ogół gatunki górskie (oreofity) i gatunki śródlądowe. Głównie ta grupa gatunków tworzy na terenie Jury Południowej charakterystyczne dla tego obszaru zespoły porostów.

2. Gatunkami pospolitymi na Jurze Północnej są formy o zasięgach szerszych, głównie holarktyczne i kosmopolityczne.

IV. SYSTEMATYCZNY WYKAZ GATUNKÓW

Wykaz ten, sporządzony według systemu A. Zahlbrucknera (1926), oparłem przede wszystkim na wynikach własnych badań przeprowadzonych w latach 1955—58. Uwzględniłem w nim również dane zawarte w pracach: H. Lojki (1868), W. Jabłońskiego (1872), F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881), F. Błońskiego (1890); wykorzystałem także różne notatki z publikacji: L. Łazarczyka (1914), H. Magnussona (1929), J. Motyki (1936—39), K. Redingera (1937), Z. Tobolewskiego (1955, 1956). Gatunki, co do których istnieje prawie pewność, że zostały przez moich poprzedników wymienione błędnie, zaznaczam *petitem* w nawiasie; gatunki przez nich podane prawdopodobnie słusznie, ale przeze mnie nie odnalezione — *petitem*; te zaś, których okazy albo sam zbierałem, albo widziałem, np. w zielniku A. Rehmana, drukiem zwykłym.

Dla każdego omawianego w wykazie gatunku porostu starałem się zestawić następujące dane:

1. ogólną charakterystykę siedliska;
2. ilość stanowisk;
3. wykaz stanowisk
4. uwagi (stopień pospolitości z uwzględnieniem okręgu, notatki systematyczne, morfologiczno-anatomiczne, w razie potrzeby opis gatunku, oraz, jeśli był dawniej zbierany, to informację, przez kogo i synonim, pod jakim go podawano).

Ilość stanowisk podana jest przed ich wykazem w postaci formułki liczbowej, osobno dla każdego okręgu geobotanicznego. Obejmuje ona wszystkie zanotowane stanowiska i w przybliżeniu dość dobrze określa stopień pospolitości gatunku. Przy gatunkach rzadkich, bardziej interesujących, oraz należących

cych do rodziny *Verrucariaceae*, odpowiada ona na ogół liczbie zebranych okazów zielnikowych. W wypadku form pospolitych i bardzo pospolitych, lub takich, których rozpoznanie w terenie nie nastrocza żadnych trudności, ilość stanowisk przewyższa znacznie ilość zebranych okazów. Nie byłoby bowiem potrzeby zbierać, np. 52 torebki z *Caloplaca stillicidiorum*.

Przy tak rozległym obszarze jak Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (około 1500 km²) nie będzie przesadą podanie przy większości gatunków całych kompletów zanotowanych stanowisk (osobno dla Jury Południowej, osobno dla Jury Północnej); jedynie w wypadku około 40 najpospolitszych gatunków stanowiska zostały wymienione przykładowo (częściowo), ale zawsze tak, aby naniesione na mapę nie sugerowały jakichkolwiek nie istniejących luk w rozmieszczeniu. Po każdym stanowisku, które jest lakonicznie określone nazwą miejscowości (wg mapy WIG 1:100 000) lub często np. na Jurze Południowej, nazwą doliny, podana jest orientacyjna wysokość wzniesienia w metrach n.p.m. Poszczególne stanowiska uszeregowane są w grupy według podziału administracyjnego na powiaty. Ma to na celu ułatwić odszukanie stanowiska na mapie, nie jest natomiast związane z podziałem geobotanicznym. W obrębie tych grup stanowiska oddzielone są od siebie przecinkami.

Przy tych gatunkach, które zbierałem osobiście, podaję ich wymagania siedliskowe, a przy gatunkach kalcofilnych nazwy zespołów porostów, w których obrębie występują one najczęściej. Nazwy te odpowiadają tym, jakich użyłem w rozdziale II.

Stopień pospolitości, który prawie zawsze określałem w obrębie uwag (osobno dla Jury Południowej, osobno dla Jury Północnej), oceniałem wprawdzie przy pomocy własnej, sześciostopniowej skali pospolitości, ale ponieważ żadna taka skala nie może być w pełni doskonała, nie trzymałem się jej rygorystycznie. Za gatunki bardzo pospolite przyjąłem takie, które rosną na wszystkich dostępnych im ekologicznie stanowiskach w obrębie większej ilości zespołów (np. *Lecanora muralis* czy *Physcia caesia*); gatunki pospolite to takie, których liczba stanowisk na terenie jednego okręgu przekracza 20; gatunki częste posiadają najwyżej 20 stanowisk, gatunki rozproszone — 10 stanowisk, rzadkie — 5, bardzo rzadkie — tylko jedno stanowisko na terenie okręgu.

VERRUCARIACEAE

Verrucaria (Wigg.) Th. Fr.

Klucz do oznaczania gatunków

1. Inwolukrelum $\pm$ proste, jedynie na brzegu — zwykle dość silnie — zagięte w dół, nie stykające się ze ścianką ekscipulum, ponad którym osadzone jest w postaci miniaturowego berecika, łatwo dającego się zdjąć igłą preparacyjną. Egzotecjum przeważnie wyraźnie promienisto splekane

- Inwolukrelum inne, zwykle spływające po ścianie ekscipulum, albo inwolukrelum niewykształcone lub zaczątkowe. Egzotecjum nie splekane promienisto 5
- 2. Ekscipulum szer. ponad 250 μ . Zarodniki nie wykształcone. Inwolukrelum wyraźnie węższe od szerokości ekscipulum 3
- Ekscipulum szer. około 150—220 (250) μ , początkowo całe jasne, potem brunatnawe. Inwolukrelum $\pm$ równej szerokości z ekscipulum. Plecha półendolityczna, biała, szarawo- lub różowobiaława, niekiedy z czarnymi liniami plechy pierwotnej. Makroferoidy liczne, szer. do 20 μ . Egzotecja szer. 0,1—0,15 mm, płaskie, potem wypukłe, wyraźnie promienisto splekane. Zarodniki 13—20 $\times$ 7—11 μ
Verrucaria gyeinikii Servit
- 3. Ekscipulum początkowo jasne, potem górą, niekiedy także dołem $\pm$ brunatniejące, $\pm$ kuliste 4
- Ekscipulum całe brunatne lub czarne, górą wyraźnie szyjowato wyciągnięte i zwężone, szer. około 270—320 μ i wys. 300—400 μ . Plecha półendolityczna, biaława lub niebieskawobiaława. Makroferoidy szer. do 8 μ , niekiedy paraplektenchymatycznie się zra-
stające. Egzotecjum szer. 0,1—0,2 mm, $\pm$ wyraźnie promienisto splekane
Verrucaria bagliettoaeformis (Hazsl.) Servit
- 4. Plecha niebieskawoszara, szaro- zielonawoniebieskawa. Warstwa korowa górą niebieskawa lub zielonawa. Makroferoidy liczne szer. 10—15 μ . Egzotecjum $\pm$ płaskie, szer. 0,1—0,2 mm, bez wyraźnych promienistych splekań. Ekscipulum szer. 250—350 μ .
Verrucaria parmigerella A. Zahlbr.
- Plecha biaława lub jasnoszara. Warstwa korowa górą nie jest zabarwiona na niebiesko lub zielono. Makroferoidy szer. do 20 μ . Egzotecjum szer. 0,15—0,2 mm. Ekscipulum szer. 250—350 μ , jasne, tylko górą brunatnawe
Verrucaria baldensis Mass.
- 5. Inwolukrelum nie rozwinięte, lub jako zaczątkowe, tylko wokół otworka 6
- Inwolukrelum dobrze wykształcone, schodzi przynajmniej do połowy wysokości ekscipulum 14
- 6. Powierzchniowa część plechy cienka 7
- Powierzchniowa część plechy zgrubiała 10
- 7. Całe ekscipulum brunatne lub czarne. Gonidia szer. ponad 12 μ 8
- Ekscipulum dołem lub całe jasne. Gonidia szer. tylko do 12 μ 9
- 8. Powierzchnia plechy $\pm$ równa, biała lub nieco żółtawa. Czarne linie plechy pierwotnej najczęściej wykształcone. Peritecja są rozmieszczone $\pm$ równomiernie na całej powierzchni plechy. Ekscipulum szer. 300—350 μ . Zarodniki 12—22 $\times$ 8—11 μ
Verrucaria calciseda DC.
- Powierzchnia plechy wyraźnie nierówna, jasno-niebieskawo-biaława; pod lupą białą kropkowana. Wypukłe części plechy zawierają peritecja; części wklęsłe są bez peritecjów. Ekscipulum szer. 250—320 (350) μ . Zarodniki 17—22 $\times$ 9—12 μ
Verrucaria lettaui Servit

9. Egzoteczja cielistoróżowe, szer. około 0,3—0,4 mm. Ekscipulum całe jasne, szer. około 350—400 μ . Zarodniki 24—30 (35) $\times$ 10—16 μ . Plecha półendolityczna lub epilityczna, brudno-szarozielonawa, jednolita lub często nieregularnie splekana

Verrucaria carnea Nyl. in Zw.

- Egzoteczja brunatne do czarnych, szer. około 0,1—0,2 mm, przyplaszczone. Ekscipulum szer. około 200—250 μ , początkowo dołem jasne, potem niekiedy całe ciemne. Zarodniki 17—22 $\times$ 7—8 (10) μ . Plecha w postaci plam szer. około 1 cm, brudno-jasnoszara do zielonawej, jednolita lub nieco porysowana

Verrucaria viridicans Servit

10. Ekscipulum szer. 120—250 μ , całe lub przynajmniej częściowo (dołem lub po bokach) jasne. Zarodniki 10—20 $\times$ 5—9 μ

11

- Ekscipulum szer. ponad 350 μ , brunatne lub czarne. Zarodniki znacznie większe

13

11. Plecha wewnątrz $\pm$ jasna. Peritecja mniej liczne we fragmentach

12

- Plecha posiada czarną wys. do 400 (600) μ warstwę. Plecha półendolityczna, brudno-oliwkowoszara lub szarawobrunatnawa, splekana na duże, szer. około 0,2—3 mm fragmenty. Peritecja bardzo liczne w pojedynczym fragmencie. Ekscipulum szer. (120) 150—200 μ , początkowo całe jasne, potem góra i dołem (dołem nie zawsze), czasem całe brunatnawe. Zarodniki 10—17 (20) $\times$ 6—8 μ

Verrucaria obfuscans Nyl.

12. Strzępki plechy J + intensywnie niebieskie. Gonidia szer. do 18 μ . Plecha ciemnoszara, złożona z $\pm$ skupionych lub rozrzuconych, okrągławych, okrągławokanciastych, niekiedy prawie łuseczkowatych, szer. około 0,3—1,5 mm fragmentów. Ekscipulum szer. 150—200 (250) μ , J + intensywnie niebieskie. Zarodniki 12—19 $\times$ 6—9 μ

Verrucaria sp.

- Strzępki plechy J —. Gonidia szer. 5—9 (12) μ . Plecha cieńsza, w postaci plam, szara lub ciemnoszara do brunatnoszarej, splekana na płaskie i kanciaste, gęsto skupione, szer. około 0,2—0,5 (0,7) mm fragmenty. Ekscipulum szer. 120—160 μ , J —. Zarodniki 14—19 $\times$ 6—9 μ

Verrucaria policensis Servit

13. Ekscipulum szer. 350—420 μ . Plecha brudnobiaława do brudnoszarawej, wyraźnie splekana na fragmenty. Zarodniki 23—34 $\times$ 12—21 μ

Verrucaria polygonia Körb.

- Ekscipulum szer. do 600 μ (lub szersze). Plecha biaława do brunatnawej, splekana tylko miejscami. Zarodniki 12—34 $\times$ 12—19 μ

Verrucaria silvatica (Arn.) Zsch.

14. Na kamieniach zanurzonych w wodzie

15

- Na nie zanurzonych w wodzie skałach wapiennych, niekiedy na ceglach

17

15. Zarodniki 6—9 $\times$ 5—7 μ , prawie kuliste. Ekscipulum szer. 100—150 μ . Na kamieniach o znikomej zawartości Ca

Verrucaria aquatilis Mudd.

- Zarodniki znacznie większe, 17—25 $\times$ 8—16 μ . Ekscipulum szer. 200—500 μ

16

16. Na wapieniach. Zarodniki 17—25 (30) $\times$ 10—16 μ

Verrucaria elaeomelaena Arn.

- Na skałach krzemianowych (gatunek prawdopodobnie podany błędnie).
Verrucaria hydrela Ach.
17. Gonidia szer. do 12 μ 22
- Gonidia szer. ponad 12 μ 18
18. Peritecja pogrążone pomiędzy fragmentami lub umieszczone na ich brzegach. Plecha zawsze wyraźnie splekana na fragmenty, szara lub szarobrunatnawa 19
- Peritecja inaczej rozmieszczone. Plecha $\pm$ jednolita lub tylko u starszych okazów splekana na fragmenty, biaława lub szara 20
19. Inwolukrelum zamknięte, u podstawy $\pm$ zgrubiałe. Plecha szarobrunatnawa do szarej. Fragmenty szer. około 0,4—0,8 mm, na brzegu $\pm$ czarno obwiedzione. Ekscipulum szer. 200—300 μ , czarne. Zarodniki 15—26 $\times$ 5—9 μ
Verrucaria lecideoides Trev.
- Inwolukrelum dołem otwarte, połowiczne lub wierzchołkowe. Plecha szara. Fragmenty szer. do 0,4 mm. Ekscipulum dołem jasne, szer. 180—250 μ . Zarodniki 15—18 $\times$ 5—8 μ
Verrucaria minuta (Hepp.) Zsch.
20. Inwolukrelum wierzchołkowe, $\pm$ odstające na boki. Plecha półendolityczna, biaława, pokryta brunatnymi plamkami szer. około 0,1 mm. Egzotecjum półkuliste, szer. około 0,18—0,3 mm. Zarodniki 12—20 $\times$ 7—9 μ (niektóre rzadko 2-komórkowe). Strzępki plechy w warstwie gonidialnej i błony gonidiów J + niebieskie.
Verrucaria limitata Kremp.
- Inwolukrelum połowiczne, ściśle przylegające do ekscipulum 21
21. Strzępki plechy J + intensywnie niebieskie. Plecha półendolityczna, biaława do szarej, jednolita lub porysowana aż do splekanej na fragmenty szer. około 0,2—0,6 mm. Makro-sferoidy liczne, szer. około 8—18 μ . Egzotecja szer. 0,25—0,35 mm. Ekscipulum szer. 160—230 μ , jasne do brunatnego. Zarodniki 12—18 (21) $\times$ (4) 5—7 μ
Verrucaria polonica J. Nowak
- Strzępki plechy J —. Plecha prawie cała endolityczna z brunatnymi plamkami, szer. 0,01 mm. Egzotecjum półkuliste, szer. 0,15—0,18 mm. Ekscipulum szer. 150—200 μ , dołem zwykle jasne. Zarodniki 16—23 $\times$ 6—8 (9) μ
Verrucaria murina Leight.
22. Plecha biała, szara lub brudnoszara. Inwolukrelum nie zlewa się z czarną warstwą plechy 23
- Plecha $\pm$ zielona do oliwkowobrunatnawej, przeważnie jednolita lub niekiedy miejscami splekana, cienka. Egzotecjum półkuliste, szer. 0,1—0,15 mm. Ekscipulum szer. 150—200 μ , całe jasne lub nieco brunatnawe. Inwolukrelum połowiczne. Zarodniki 14—19 (21) $\times$ 6—8 μ
Verrucaria dolosa Hepp
- Plecha $\pm$ brunatna do czarnej; jeśli brunatnoszara to inwolukrelum zlewa się z czarną warstwą plechy 29
23. Inwolukrelum wierzchołkowe 24

- Inwolukrelum zamknięte. Plecha prawie epilityczna, biaława lub szara, obwiedziona ciemniejszą linią plechy pierwotnej, splekana na fragmenty szer. około 0,4—0,8 (1,2) mm. Egzoteczum szer. 0,1—0,15 mm, płaskie lub słabo wypukłe. Ekscipulum szer. 140—180 (200) μ . Zarodniki 12—17 $\times$ 5—7 (8) μ

Verrucaria dalejensis Servit

24. Zarodniki 10—17 $\times$ 5—8 μ . Strzępki plechy J + niebieskie. Plecha cienka, szara lub szarobiaława, jednolita lub porysowana. Egzoteczum półkuliste, szer. 0,1—0,2 mm. Ekscipulum całe jasne, szer. 130—180 μ

Verrucaria fatrana Servit

- Zarodniki dłuższe, 19—25 μ dł. Strzępki plechy J —.

25

25. Plecha półendolityczna lub epilityczna

26

- Plecha prawie zupełnie endolityczna, biaława, pokryta bardzo drobnymi plamkami szer. około 0,07 mm. Egzoteczum szer. 0,25—0,35 mm. Ekscipulum szer. 250—300 μ , całe jasne. Zarodniki 20—25 $\times$ 9—11 μ

Verrucaria rupestris Schrad.

26. Plecha półendolityczna, biaława lub szarawa, jednolita lub porysowana aż do splekania na fragmenty szer. około 0,4—0,5 mm. Egzoteczum szer. 0,2—0,3 mm. Ekscipulum szer. 200—250 μ , całe jasne. Zarodniki 19—24 $\times$ 10—12 μ

Verrucaria confluens Mass.

- Plecha epilityczna, biaława do szarawej, złożona z gruzelków szer. około 0,03—0,3 mm, pojedynczych lub skupionych we fragmenty szer. około 0,3 mm, niekiedy zupełnie jednolita. Ekscipulum szer. 200—300 μ , całe jasne albo nieco brunatne. Zarodniki 21—24 $\times$ 11—13 μ

Verrucaria muralis Ach.

27. Plecha jednolita lub tylko miejscami splekana, endolityczna lub półendolityczna, cienka

28

- Plecha splekana na fragmenty szer. około 0,3—0,5 (0,7) mm, przeważnie epilityczna, szara, biaława lub szarobrunatnawa, obwiedziona ciemniejszą linią plechy pierwotnej. Egzoteczum szer. 0,1—0,2 mm słabo wynurzone. Ekscipulum szer. 160 (200) μ , brunatne. Zarodniki 14—17 $\times$ 5—8 μ ; niektóre rzadko 2-komórkowe

Verrucaria plumbea Ach.

28. Zarodniki (17) 20—25 $\times$ (9) 10—13 μ . Ekscipulum brunatne, szer. 240—315 μ . Egzoteczum półkuliste, szer. 0,3—0,4 mm, często dołem nakryte warstewką plechy. Plecha półendolityczna, bardzo cienka, niekiedy prawie zanikła, szara, często pokryta drobnymi czarnymi punkcikami

Verrucaria rivalis Zsch.

- Zarodniki 12—18 $\times$ 6—8 μ ; pojedyncze bardzo rzadko 2-komórkowe. Ekscipulum jasne, szer. 200—250 μ . Peritecja prawie siedzące, nagie, szer. 0,2—0,25 mm. Plecha prawie zupełnie endolityczna, biaława, żółtawa, szarawa aż do fioletowoszarawej

Verrucaria congregata Hepp

29. Inwolukrelum wierzchołkowe lub połowiczne, dołem nie odbiegające od ekscipulum i nie zlewające się z czarną podstawową warstwą plechy

30

- Inwolukrelum połowiczne, dołem odbiegające od ekscipulum lub zlewające się z czarną podstawową warstwą plechy 31
- 30. Zarodniki mniejsze: $14-18 \times 7-9 \mu$; pojedyncze, rzadko 2-komórkowe. Ekscipulum szer. $160-180 \mu$, brunatnoczarne. Inwolukrelum wierzchołkowe. Plecha cienka, oliwkowobrunatna, jednolita lub miejscami spękana. Egzotecjum szer. $0,2 \text{ mm}$
Verrucaria maculiformis Kremp.
- Zarodniki większe: $18-25 \times 9-13 (16) \mu$. Ekscipulum szer. $200-330 \mu$, plamkowato-brunatnawe do jasnego. Inwolukrelum wierzchołkowe lub połowiczne. Plecha silnie zgrubiała, brudno-żółtawobrunatna lub oliwkowobrunatna, spękana na fragmenty szer. około $0,3-1,5 (2) \text{ mm}$. Egzotecjum szer. $0,2-0,3 \text{ mm}$
Verrucaria velana (Mass.) A. Zahlbr.
- 31. Zarodniki do 18μ dł. Plecha szara lub szarobrunatnawa. Fragmenty obwiedzione i często poprzecinane czarnymi liniami 32
- Zarodniki ponad 18μ dł. Plecha i fragmenty inne 33
- 32. Plecha półendolityczna, grubsza, szara lub szarobrunatna, cała o dominującej barwie szarej. Fragmenty szer. $0,3-1,2 (1,5) \text{ mm}$. Egzotecjum płaskie, szer. $0,12-0,2 \text{ mm}$. Ekscipulum szer. $200-300 \mu$. Zarodniki $9-16 \times 5-7 \mu$
Verrucaria nigricans Nyl.
- Plecha prawie zupełnie epilityczna, cieńsza, cała ciemno-szaroczarniawa, o dominującej barwie czarnej (szare zabarwienie dobrze widoczne dopiero pod lupą). Fragmenty szer. $0,2-0,5 (0,8) \text{ mm}$. Egzotecjum szer. $0,15 \text{ mm}$, $\pm$ wypukłe i wyniesione nad powierzchnię plechy. Ekscipulum szer. $160-280 \mu$. Zarodniki $11-18 \times 6-8 (9) \mu$
Verrucaria fuscella Ach.
- 33. Ekscipulum szer. do 200μ 34
- Ekscipulum szer. $200-300 \mu$ 38
- 34. Egzotecjum nagie 35
- Egzotecjum $\pm$ nakryte warstwą plechy 36
- 35. Na skałach wapiennych. Plecha półendolityczna, brunatna do czarnej. Fragmenty szer. $0,1-1 \text{ mm}$. Czarna podstawowa warstwa plechy wys. do 300μ . Egzotecjum szer. $0,18 \text{ mm}$, słabo uwypukłone. Ekscipulum szer. 200μ . Zarodniki $(13) 20-29 \times 9-12 \mu$. Nukleus J + czerwony
Verrucaria nigrescens Pers.
- Na ceglach lub skałach o znikomej zawartości Ca. Plecha zupełnie epilityczna, kasztanowobrunatna. Fragmenty szer. $0,2-1 \text{ mm}$. Czarna podstawowa warstwa plechy wys. do 220μ . Egzotecjum szer. $0,15-0,25 \text{ mm}$. Ekscipulum szer. $200-240 \mu$. Zarodniki $18-25 (28) \times 12-14 \mu$. Nukleus J + niebieski
Verrucaria tectorum Körb.
- 36. Podstawowa warstwa plechy jasna 37
- Podstawowa warstwa plechy w starszych miejscach czarna lub brunatna. Plecha brunatna. Fragmenty płonne szer. do $0,3 \text{ mm}$, owocujące szer. do $0,5 (0,6) \text{ mm}$. Ekscipulum $\pm$ szer. $170-180 \mu$. Zarodniki $16-25 \times 8-11 \mu$
Verrucaria nigroumbrina Servit

37. Nukleus J + niebieski. Plecha cienka, oliwkowobrunatna. Fragmenty szer. około 0,2—0,35 (0,5) mm. Ekscipulum szer. 170—180 μ . Zarodniki 17—22 (28) $\times$ 9—12 (14) μ

Verrucaria fuscoatroides Servít

- Nukleus J + czerwony. Plecha na obwodzie cienka, brunatna i jednolita; w środku spekana, czarnobrunatna. Fragmenty szer. 0,1—0,3 mm. Ekscipulum szer. 150—180 (200) μ . Zarodniki 18—25 $\times$ 9—12 μ

Verrucaria nigrofusca Servít

38. Korowa warstwa plechy wys. około 15—60 μ . Warstwa brunatna lub czarna wys. do 500 μ . Plecha jasnobrunatna lub oliwkowobrunatna. Fragmenty szer. 0,2—0,5 mm. Egzotecjum szer. 0,25 mm. Ekscipulum szer. 200—300 μ . Zarodniki 24—28 $\times$ 11—17 μ

Verrucaria controversa Mass.

- Korowa warstwa plechy wys. 6—12 μ . Warstwa brunatno-czarna. wys. do 200 μ , Plecha brudnobrunatna lub oliwkowoczarna. Fragmenty szer. 0,2—0,6 mm. Egzotecjum nakryte warstewką plechy, szer. 0,3 mm. Ekscipulum szer. 200—300 μ . Zarodniki 17—32 $\times$ 10—15 μ

Verrucaria langhensis Servít

Podrodzaj 1. *Amphoridium* (Müll. Arg.)

1. *Verrucaria calciseda* DC. in Lam. et DC., Flore Franç., 2, 1805, p. 317.
[= *Amphoridium calcisedum* Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 32.]

Na skałach wapienia jurajskiego, przeważnie w miejscach nasłonecznionych. Występuje we wszystkich zespołach, najczęściej jednak w zespole *Dermatocarpon monstrosus*-*Buellia venusta* oraz w zespole *Rinodina immersa*-*Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 24 stan. Pow. Kraków: Tyniec 250 m, Piekary 230 m, Bielany 260 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Przeginia Duchowna 290 m, Rybna 300 m, Mników 270 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kobylańska 360—400 m, Dol. Kluczwody 380 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Chrzanów: Kamyk 320 m, Nielepice 340 m, Czerna 370 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 400 m, Dol. Szklarki 380—420 m, Jerzmanowice 460 m, Łazy Jawór 500 m, Wierzchowie 390 m, Bębło 430 m, Ojców 340—410 m, Wielmoża 390 m, Pieskowa Skała 390 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna: 21 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 390 m, Krzywopłoty 400—430 m; pow. Zawiercie: Podzamcze koło Ogrodzieńca 470—500 m, Złożeniec 450 m, Karlin 400 m, Piaseczno 360 m, Rzędkowice 400 m, Żerkowice 390 m, Podlesice 350 m, Kroczyce 330 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Leśniów koło Żarek 340 m, Mirów 370 m, Czarny Kamień 375 m, Lutowiec 400 m, Niegowa 360—410 m, Mzurów 370 m, Gorzków 330—370 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Przemyłowice 330 m, Olsztyn 300—350 m.

Gatunek bardzo pospolity. Był podany przez F. Berda u a (1876), A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890).

2. *Verrucaria* cfr. *carnea* (Arn.) Nyl. in Zw., D. Lich. Haidelb., 1883, p. 81; Servít, Studia Bot. Čech., 9, 2—4, 1948, p. 77. [= *V. leightonii* var. *carnea* Arn. ap. Zwackh in Flora, 47, 1864, p. 86.]

Na kamieniach wapienia jurajskiego wynurzających się z trawiastego zbocza.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Podlesickie Skały koło Kroczyca około 360 m.

Gatunek bardzo rzadki. Zbyt mały fragment plechy, zauważony dopiero pod lupą binokularną wśród plech *V. viridicans*, oraz tylko częściowo dojrzałe peritecja, sprawiają, że oznaczenie nie jest pewne. Również poważne wątpliwości nasuwa rodzaj podłoża. W Niemczech, skąd ją opisano, *Verrucaria carnea* rośnie na betonowych murach.

3. *Verrucaria lettai* Servít, l. c. p. 90. [= *V. calciseda* var. *jurana* Servít ap. Lettau in Fedde Repert. spec. nov. regn. vegetab., Beih. 119, 1—2, 1940, p. 71; = *Amphoridium lettai* Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 34.]

Na $\pm$ ocienionych skałach wapienia jurajskiego, np. w zespole *Polyblastia papularis*-*Arthopyrenia conoidea*. Niekiedy rośnie na wapiennych głazach wśród zarośli *Corylus avellana*.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Brzostkwinia 300 m, Dol. Kluczwody 290 m Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Wierzchowie 390 m, Ojców Brama Krakowska i Dol. Prądnika 350—390 m.

Gatunek rozproszony, występuje tylko na terenie Jury Południowej. Jest blisko spokrewniony z *V. calciseda*, od której różni się jednak wyraźnie zarówno pod względem morfologiczno-anatomicznym, jak też ekologicznym. Jest gatunkiem ceniolubnym (na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej); w literaturze brak danych o siedliskach. Okazy nasze są zgodne z opisem Servíta.

4. *Verrucaria obfuscans* Nyl., in Flora, 64, 1881, p. 540; Servít, Sborník Nár. Mus. v Praze, 5 B, 9/3, p. 38. 1949. [= *Amphoridium obfuscans* (Nyl.) Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 38.]

Na silnie nasłonecznionych, przeważnie pionowych skałach wapienia jurajskiego o wystawie południowej, zwykle w zespole *Rinodina immersa*-*Verrucaria gyelnikii* lub w zespole *Dermatocarpon monstrosum*-*Buellia venusta*.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Brzostkwinia 300 m, Rybna 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 390 m, Bębło 430 m, Czajowice 420 m, Ojców Dol. Prądnika 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Myszków: Mzurów 350 m.

Gatunek rozproszony na Jurze Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Niektóre z okazów naszych odbiegają nieco od opisu Servíta.

5. *Verrucaria policensis* Servít, in Studia Bot. Čech., 7, 2—4, 1946, p. 55. [= *Amphoridium deminutum* var. *policense* Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 38.]

Na pionowych, suchych i silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, u ich podstawy, w zespole *Lecania erysibe*-*Verrucaria policensis* i w zespole *Caloplaca murorum*-*Lecanora pruinosa*, w tym drugim znacznie rzadziej.

Jura Południowa. 14 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Dol. Sanki 280 m, Rybna 300 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Dol. Szklarki 400 m, Łazy Jawór 460 m,

Bębło 430 m, Ojców Dol. Prądnika 360 m, Grodzisko 370 m, Pieskowa Skała 390 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Karlin koło Ogrodzieńca 390 m.

Gatunek częsty na obszarze Jury Południowej, bardzo rzadki na Jurze Północnej. Okazy nasze odbiegają nieco od typu szerokością zarodników [typ: 9—10(11) μ , u naszych okazów: 6—8 μ].

6. *Verrucaria polygonia* Körb., Pererga, 1863, p. 377; Zschacke, in Rabenh. Kr. Fl., 9, 1/1, 1934, p. 283. [= *Amphoridium polygonium* Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 42.]

Na nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, na płaszczyznach poziomych, najczęściej w zespole *Candelanella medians-Physcia nigricans*.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Olkusz: Ojców 380 m, Saspów 440 m.

Jura Północna. 7 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 450 m, Podzamcze 480 m, Smoleń 485 m; pow. Myszków: Leśniów koło Żarek 340 m, Niegowa 380 m, Mzurów 370 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 340 m.

Gatunek rozproszony na Jurze Północnej, rzadki na Południowej.

7. *Verrucaria silvatica* (Arn.) Zschacke, in l. c. p. 139. [= *Amphoridium dolomiticum* f. *silvaticum* Arn., in Flora, 1861, p. 264, = *Amphoridium silvaticum* Servít, l. c. p. 42.]

Na ocienionych skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Olkusz: Wierzchowie 380 m, Pazurek koło Rabstyna 410 m.

Gatunek bardzo rzadki, możliwe, że przeoczany.

8. *Verrucaria viridicans* Servít, Studia Bot. Čech., 9, 2—4, 1948, p. 109.

Na małych kamieniach wapienia jurajskiego wynurzających się z trawistego zbocza, razem z *V. carnea*.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Podlesickie Skały koło Kroczy 360 m.

Gatunek bardzo rzadki. Okazy nasze są zupełnie zgodne z opisem Servíta.

Podrodzaj 2. *Verrucaria* (T)

9. *Verrucaria bagliettoaeformis* (Hazsl.) Servít, in Beiheft. z. Bot. Centralbl., 59, B, 1939, p. 156. [= *V. calciseda* f. *bagliettoaeformis* Hazsl., Magyar Birod. Zuzmofl., 1884, p. 270.]

Na nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego w partiach podszczytowych.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: „Berkowa Góra” koło Kroczy 450 m.

Gatunek bardzo rzadki. Zewnętrznie podobny do występującej z nim razem *V. calciseda*. Od pozostałych gatunków spokrewnionych z nim wyróżnia się bardzo wysokim ekscipulum, górą szyjowato zwężonym.

10. *Verrucaria baldensis* Mass., Ricerch. Auton. Lich., 1852, p. 173; Servít, l. c. p. 130.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego; na płaszczyznach poziomych.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Olkusz: Ojców Brama Krakowska 340 m, Pieskowa Skała 420 m.

Gatunek bardzo rzadki. Zbliżony jest do *V. parmigerella*, od której różni się białawą plechą i jasną warstwą korową.

11. *Verrucaria gyelnikii* Servít, l. c. p. 126.

Na nasłonecznionych lub nieco ocienionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle na płaszczyznach pionowych, przeważnie w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*, zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea* oraz w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*; rzadziej rośnie w zespołach płaszczyzn poziomych.

Jura Południowa. 27 stan. Pow. Kraków: Bielany 260 m, Tyniec 240 m, Ściejewice 225 m, Przeginia Duchowna 290 m, Rybna 300 m, Mników 280 m, Brzostkwinia 280 m, Dol. Kluczwoły 280—400 m, Dol. Bolechowicka 360—390 m, Dol. Kobyłańska 360—400 m; pow. Chrzanów: Nielepice 340 m, Krzeszowice (okaz A. Rehmana oznaczony jako *V. calciseda*) około 300 m, Brodla 270 m, Obora koło Żalasa 340 m, Czerna 370 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 380—420 m, Jerzmanowice 460 m, Dol. Bętkowska 320—400 m, Łazy Jawór 490 m, Wierzchowie 390 m, Bębło 440 m, Ojców 340—410 m, Grodzisko 370 m, Pieskowa Skała 400 m, Sułoszowa 430 m, Rabsztyn 430 m, Klucze 400 m.

Jura Północna. 12 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 440 m; Domaniewice 320 m; pow. Zawiercie: Ryczów 450 m, Piecki koło Kromolowa około 420 m, Piaseczno 360 m, Podlesice 360 m, Kroczyce 335 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mzurów 350 m, Gorzków 340 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 345 m, Olsztyn 330 m.

Gatunek bardzo pospolity na Jurze Południowej i pospolity na Jurze Północnej. Dawniej (na przykład przez A. Rehmana) mylony z *V. calciseda*. Łatwo go od niej odróżnić po nieco różowawym zabarwieniu plechy i zawsze wyraźnym promieniście spękanym egzotecjum. Zbierałem również ten gatunek w Pieninach na licznych stanowiskach oraz w Górach Świętokrzyskich.

12. *Verrucaria parmigerella* A. Zahlbr., Österr. Bot. Zeitschr., 68, 1919, p. 64. [= *V. sphinctrinella* var. *parmigerella* Servít, l. c. p. 140; = *Protobagliettoa parmigerella* Servít, in Rozprawy Česk. Akad. Věd, 65,3, 1955, p. 1—45.]

Na pionowych, eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego, najczęściej w zespole *Ionaspis epulotica*, nieco rzadziej w zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Prądnik Korzkiewski 320 m, Dol. Kluczwoły 290 m; pow. Olkusz: Ojców 340—380 m, Wierzchowie 360 m.

Jura Północna: 2 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 460 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 340 m.

Gatunek w obu okręgach bardzo rzadki. Zbierałem go także w Pieninach na północnych zboczach Zamkowej Góry około 650 m (1957).

13. *Verrucaria confluens* Mass., Symm. Lich., 1855, p. 77; Servít, Studia Bot. Čech. 11,3 1950, p. 9.

Na skałach wapienia jurajskiego.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 430 m.

Gatunek prawdopodobnie częstszy lecz przeoczany.

14. *Verrucaria congregata* Hepp ap. Arn., in Flora, 41, 1858, p. 238, [= *V. floerkeana* f. *congregata* (Hepp) A. Zahlbr., Cat. Lich. Univ., I, 1921, p. 40; = *Thelidium congregatum* (Hepp) Servít, Studia Bot. Čech., 11, 3, 1950, p. 28; = *Involucrothele congregata* (Hepp) Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 175.]

Na pionowych, suchych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, tylko w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Dol. Bolechowicka 360—390 m, Dol. Kobyłańska 360—400 m; pow. Olkusz: Ojców Dol. Prądnika 360—400 m.

Gatunek bardzo rzadki. Łatwy do zauważenia po prawie siedzących peritecjach i charakterystycznej barwie plechy (porównaj w kluczu na początku części systematycznej). U okazów naszych nie zauważyłem dotychczas zarodników podzielonych przegrodami, o czym jest wzmianka w opisie Servíta.

15. *Verrucaria* cfr. *dalejensis* Servít, Preslia, 24, 3—4, 1952, p. 353.

Na pionowych, ± ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego, rośnie w zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*, w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta* i w zespole *Ionaspis epulotica*.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Chrzanów: Brodła 270 m, Dubie 300 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Wierzchowie 390 m, Ojców 350 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Myszków: Lutowiec 380 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i rzadki na Jurze Północnej. Charakterystyczny dzięki wykształcaniu zamkniętego involukrelum. U naszych okazów jest ono dołem, podobnie jak u *V. lecideoides*, silnie zgrubiałe. Pod względem budowy morfologicznej zbliżony jest ten gatunek do *V. plumbea*.

16. *Verrucaria* cfr. *dolosa* Hepp, Flecht. Eur., 1860, p. 689; Servít, Sborník Nár. Mus. v Praze, V B, 9/3, 1949, p. 22.

Na ocienionych skałach wapienia jurajskiego, przeważnie w zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Skała Kmita koło Zabierzowa 260 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Chrzanów: Dubie 290 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 330 m, Wierzchowie 390 m, Ojców 350 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Podlesickie Skały koło Kroczyca 370 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Okazy nasze odbiegają nieco od diagnozy Servíta. Różnice przede wszystkim dotyczą szerokości ekscipulum (Servít: do 150 μ szer., u naszych okazów: 150—200 μ szer.), po części też szerokości zarodników (Servít: 6—8 μ szer., u naszych okazów: 6—12 μ szer.).

Ryc. 2. *Verrucaria minuta* (Hepp) Zschacke, okaz z Ojcowa. Pow. $3\times$.
 Fig. 2. *Verrucaria minuta* (Hepp) Zschacke Specimen from Ojców, $3\times$.

Ryc. 3. *Verrucaria lecideoides* Trevis., okaz z Ojcowa. Pow. $3\times$.
 Fig. 3. *Verrucaria lecideoides* Trevis. Specimen from Ojców, $3\times$.

17. *Verrucaria fatrana* Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 86.

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, w miejscach widnych albo ± ocienionych, zwykle razem z *V. dalejensis*.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 350 m, Ojców Dol. Prądnika i Wąwóz Korytania około 350 m.

Gatunek bardzo rzadki. Charakterystyczny po właściwości barwienia się na niebiesko strzępek plechy z jodem. Dotychczas znany tylko ze Słowacji. Servít uważa go za gatunek górski.

18. *Verrucaria lecideoides* Trevis., Spighe e Paglie, 1853, p. 19; Servít, l. c. p. 105.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii* oraz w zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Mników 275 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 380 m, Ojców Dol. Prądnika 370 m, Bębło 430 m.

Gatunek rzadki, rośnie tylko na terenie Jury Południowej.

19. *Verrucaria limitata* Kremp. in Mass., Sched. Crit., VI, 1856, p. 123. [= *Thelidium limitatum* (Kremp.) Servít, Věst. Kr. Čes. Spol. Nauk, 10, 1947, p. 3; = *Involucrothele limitata* (Kremp.) Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 177.]

Gatunek podany przez H. Lojkę (1868) z Podskalan koło Tomaszowic, ze skał wapiennych; dotychczas nie potwierdzony.

20. *Verrucaria minuta* (Hepp) Zschacke, in Rabenh. Kr. Fl., 9, 1/1, 1934 p. 262. [= *V. lecideoides* var. *minuta* Hepp, Fl. Eur., 1860, p. 683.]

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobyłańska 390 m; pow. Olkusz: Ojców Dol. Prądnika 370 m.

Gatunek rzadki, rośnie tylko na obszarze Jury Południowej. Jest blisko spokrewniony z *V. lecideoides*. Zbierałem go również w Pieninach w urwiskach Trzech Koron około 940 m (1957).

21. *Verrucaria muralis* Ach., Meth. Lich., 1803, p. 115; Servít, Studia Bot. Čech., 11,3, 1950, p. 17.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) z Modlnicy i Ojcowa, ze skał wapiennych; dotychczas nie potwierdzony.

22. *Verrucaria murina* Leight., Angioc. Lich., 1851, p. 44; Servít, l. c. p. 2.

Gatunek podawany przez K. Filipowicza (1881) z Ojcowa, ze skał wapiennych; dotychczas nie potwierdzony.

23. *Verrucaria polonica* J. Nowak, Fragm. Flor. et Geobot., 1959, 5, 1, p. 155.

Na ocienionych lub eksponowanych na północ, pionowych skałach wapiennych, przeważnie w zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobyłańska 370 m; pow. Chrzanów: Dubie 290 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Wierzchowie 390 m, Ojców 360 m.

Gatunek rozproszony, rośnie tylko na terenie Jury Południowej. Plecha półendolityczna w postaci plam 1—3 cm szer., często obwiedziona lub poprzercinana czarnymi liniami plechy pierwotnej, jednolita lub spękana, do spękanej na areole szerokości około 0,2—0,6 mm, biaława lub szara. Strzępki plechy J + niebieskie. W hypotalusie obecne są liczne makroferoidy szer. około 8—18 μ . Egzotecja szer. około 0,25—0,35 mm, wypukłe, czarne. Ekscipulum szer. około 160—230 μ , jasne do brunatnego. Inwolukrelum połowiczne, czarne. Perifyzy dł. do 30 μ . Zarodniki eliptyczne lub wydłużone 12—18 (24) $\times$ $\times$ (4) 5—7 μ . Nukleus J + różowy.

24. *Verrucaria plumbea* Ach., Lich. Univ., 1810, p. 285. [= *Thelidium plumbeum* (Ach.) Servít, Věst. Kr. Čes. Spol. Nauk, X, 1947, p. 2; = *Involucrothele plumbea* (Ach.) Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 174.]

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, w miejscach widnych lub nieco ocienionych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m,

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Podlesickie skały koło Kroczy 370 m.

Gatunek rzadki, prawdopodobnie przeoczany na skutek wielkiego podobieństwa z *V. dalejensis*, od której różni się głównie strukturą inwolukrelum.

25. *Verrucaria* cfr. *rivalis* Zschacke, Hedwigia, 67, 1927, p. 56; Servít, Studia Bot. Čech., II, 3, 1950, p. 24.

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego w miejscach widnych lub nieco ocienionych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców Brama Krakowska 370 m.

26. *Verrucaria rupestris* Schrad., Spic. Fl. Germ., 1794, p. 109; Servít, l. c. p. 22.

Na nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego i wapienia karbońskiego.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Tyniec około 240 m, Mników około 280 m, pow. Chrzanów: Krzeszowice około 300 m, Filipowice 340 m, Czerna około 370 m, Dol. Racławki 370 m; pow. Olkusz: Ojców około 360 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn około 330 m.

Gatunek rozproszony. Był podawany przez F. Berdaua (1867), A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890). Obecnie odnaleziony tylko na dwóch stanowiskach.

Podrodzaj 3. *Lithoidea* (Ach.) Servít

27. *Verrucaria controversa* Mass., Ricer. Aut. Lich., 1852, p. 177; Servít, Sborník Nár. Mus. v Praze, V B, 9/3, 1949, p. 20.

Gatunek podawany przez A. Rehmana (1879) jako *V. fuscoatra* var. *controversa* z Ojcowa, ze skał wapiennych; dotychczas nie potwierdzony.

28. *Verrucaria fuscella* Ach., Lich. Univ., 1810, p. 289. Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 123.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w par-

tiach szczytowych w zespole *Candelariella medians-Physia nigricans*, zespole *Dermatocarpon monstrosus-Buellia venusta* oraz w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzozkwinki 290 m, Dol. Kluczwo-
dy 310 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Olkusz: Wierzcho-
wie 380 m, Dol. Bętkowska 380 m, Ojców Brama Krakowska i Dol. Prądnika 350—400 m.

Jura Północna. 7 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 420 m; pow. Zawiercie: Rzęd-
kowice 410 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Mzurów 350 m, Gorzków 370 m;
pow. Częstochowa: Przemyłowice 330 m.

Gatunek rozproszony na terenie obu okręgów. Jest blisko spokrewniony
z *V. nigricans* (porównaj klucz na początku części systematycznej).

29. *Verrucaria fuscoatroides* Servít, Sborník Nár. Mus. v Praze, V B, 9/3,
1949, p. 25.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Dol. Kobylańska 380 m.

Gatunek prawdopodobnie częstszy, lecz przeoczany. Jest spokrewniony
z *V. nigrofusca* i *V. nigroumbrina*. Szczególnie łatwo pomylić go przy ozna-
czaniu z tą ostatnią. *V. fuscoatroides* winna mieć podstawową warstwę plechy
jasną (ale niekiedy może być ona brunatna). Podstawowa warstwa u *V. nigro-
umbrina* jest brunatna lub czarna, występuje ona jednak tylko u starszych
dobrze rozwiniętych okazów lub w grubszych miejscach plechy.

30. *Verrucaria* cfr. *langhensis* Servít, Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova,
64, 1950, p. 48.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Saspów koło Ojcowa 420 m.

Gatunek prawdopodobnie przeoczany. Zaliczenie tutaj okazów naszych
(*V. langhensis* jest gatunkiem południowym) nastąpiło na skutek dużej zgod-
ności morfologicznej i anatomicznej z diagnozą Servíta. Różnice dotyczą
tylko powierzchni areoli (u okazów naszych jest ona nierówna, według dia-
gnozy powinna być gładka).

31. *Verrucaria maculiformis* Kremp., Flora, 41, 1858, p. 303. [= *Thelidium maculi-
forme* Servít, Věstník Král. Česk. Spol. Nauk, X, 1948, p. 2; = *Involucrothele maculi-
formis* (Kremp.) Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc, 1954 p. 182.]

Gatunek podany przez A. Rehmana (1879) z Czernej ze skał wapiennych; dotych-
czas nie potwierdzony.

32. *Verrucaria nigrescens* Pers., in Ustr. Ann. Bot., 14, 1795, p. 36; Ser-
vít, Sborník Nár. Mus. v Praze, V B, 9/3, 1949, p. 37.

Na ± ocienionych skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców 360 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn około 330 m, Złoty Potok
około 340 m.

Gatunek prawdopodobnie nie rzadki. Podany przez F. Błońskiego (1890)
jako *V. nigrescens* var. *fuscoatra*. Dawniej uważany był za gatunek ogólnie

pospolity i bardzo zmienny. Jednakże jak stwierdził Servít (1954), okazało się, że „pod tą nazwą publikuje się często wszystkie *Verrucarie* o ciemnobraunatnej plesze, rosnące na wapieniach i skałach krzemianowych, posiadające zarówno małe, jak i duże gonidia, różniące się bardzo wielkością zarodników, a które należą do większej liczby gatunków”.

f. *nigricans* (Arn.) A. Zahlbr. razem z odmianą typową w Ojcowie. Okazy nasze są zgodne z eksykatem Arnolda nr 1189 a i b. Plecha prawie czarna. Warstwa gonidialna wykształcona tylko w postaci drobnych wysepek. Brak peritecjów.

33. *Verrucaria nigricans* Nyl., Flora, 64, 1881, p. 189; Servít, Preslia, 24, 3—4, 1952, p. 365.

Na pionowych, gładkich, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii* oraz w zespole *Lecania erysibe-Verrucaria policensis*.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Dol. Kluczwoły 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobyłańska 380 m; pow. Olkusz: Ojców 360 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 390 m; pow. Myszków: Mzurów 350 m.

Gatunek rzadki. Łatwo go pomylić, szczególnie według opisu Zschackego (1934), z pokrewnym gatunkiem, *V. fuscella*.

34. *Verrucaria nigrofusca* Servít, Sborník Nar. Mus. v Praze, V B, 9/3, 1949, p. 38.

Na luźnych ułamkach wapienia jurajskiego tworzących usypiska u podstawy pionowych, wietrzejących ścian skalnych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m.

Gatunek bardzo rzadki. Zbliżony do *V. fuscoatroides* (porównaj).

35. *Verrucaria nigroumbrina* Servít, Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 64, 1950; p. 52.

Na skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców 370 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Myszków: Gorzków 370 m.

36. *Verrucaria tectorum* (Mass.) Körb., Perer. Lich., 1863, p. 368; Servít, Sborník Nár. Mus. v Praze, V B, 9/3, 1949, p. 45. [= *Lithoidea tectorum* Mass., Symmict. Lich., 1855, p. 91.]

Gatunek podawany przez A. Rehmana (1879) z ceglanego muru Ogrodu Botanicznego w Krakowie; dotychczas nie potwierdzony.

37. *Verrucaria velana* (Mass.) A. Zahlbr., Ann. Naturh. Mus. Wien, 15, 1900, p. 211; Servít, 1. c. p. 49. [= *Acarospora velana* Mass., Lotos, 6, 1856, p. 75.]

Na pionowych, suchych, ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*, zespole *Ionaspis epulotica* oraz w zespole *Lecania erysibe-Verrucaria policensis* (w tym ostatnim rzadziej).

Jura Południowa. 14 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Rybna 290 m, Dol. Kluczwoły 290 m, Dol. Bolechowicka 360 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 330 m, Łazy Jawór 460 m, Jerzmanowice 410 m, Ojców Dol. Prądnika 350—370 m, Sąspów 420 m, Pieskowa Skała 380 m, Sułoszowa 430 m, Pazurek koło Rabsztyna 410 m.

Jura Północna. 11 stan. Pow. Zawiercie: Srubarnia 450 m, Podzamcze 480 m, wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 400 m, Złożeniec 450 m, Piaseczno 360 m, Podlesie 350 m, Kroczyce 320 m, Zdów 330 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Niegowa 390 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 340 m.

Gatunek częsty w obu okręgach. Łatwy do poznania już w terenie. Występuje najczęściej w stanie płonnym. Posiada grubą, rozległą plechę o dużych areolach, szerokich do 2 mm. Zbierałem go również w Pieninach (1957).

Podrodzaj 4. *Hydroverrucaria* Servít

38. *Verrucaria aquatilis* Mudd., Man. Brit. Lich., 1861, p. 285.

Na zanurzonych w wodzie strumieni kamieniach o znikomej zawartości Ca.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Chrzanów: Filipowice około 310 m, między Płokami a Myślachowicami około 360 m.

Gatunek rzadki na naszym terenie. Charakterystyczny dzięki małym, prawie kulistym zarodnikom.

39. *Verrucaria elaeomelaena* Arn., Verh. zool. bot. Gesell., 18, 1868, p. 958; Servít, Studia Bot. Čech., 11, 1—2, 1950, p. 14.

Na zanurzonych w czystej wodzie strumieni kamieniach wapiennych (zwykle w pobliżu źródeł), wyjątkowo (np. w Jeziorkach koło Kroczyce) na odpadkach węgla wrzuconych do wody.

Jura Południowa 2 stan. Pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 380 m, Ojców Dol. Sąspowska 380 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Zawiercie: Siamoszyce około 310 m (leg. M. Kuc), Jeziorki koło Kroczyce 310 m, Zdów 320 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok około 280 m.

Gatunek rzadki. Okazy nasze zgodne są z opisem Servíta z wyjątkiem barwnej reakcji nukleusa z jodem (u Servíta: nukleus J + fioletowy, u naszych okazów: nukleus J + czerwony); różnica ta jednak nie wydaje się być istotna.

[*Verrucaria hydrela* Ach.

Gatunek podawany błędnie z Czernej koło Krzeszowic przez A. Rehmana (1879). Rehman zapewne zbierał okazy *Verrucaria elaeomelaena*. Prawdziwa *V. hydrela* znana jest tylko ze Szwecji, gdzie rośnie na zanurzonych w wodzie kamieniach krzemianowych.]

Thelidium Mass

40. *Thelidium decipiens* Kremp., Denskschr. K. Bayer. Bot. Ges., 4, 2, 1861, p. 216; Zschacke, in Rabh. Krypt. Fl., 9, 1/1, 1934, p. 160; Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 52.

Na skałach wapienia jurajskiego, przeważnie w miejscach odsłoniętych, na płaszczyznach pionowych, zwykle w zespole *Rinodina immersa*-*Verrucaria gyełnikii*.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Dol. Szklarki 390 m.
Jura Północna. 2 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 370 m, pow. Zawiercie: Ryczów 450 m.

41. *Thelidium dionantense* (Hue) Zschacke, Hedwigia, 62, 1920—21, p. 130; Servit, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 55. [= *Verrucaria dionantensis* Hue, Soc. Bot. Fr., 44, 1897, p. 430.]

Na pionowych, eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska-Brama Bętkowska 370 m.

Gatunek rzadki. Odnacza się szerokim ekscipulum (około 400—500 μ), o jasnej ścianie w dolnej części lub po bokach.

42. *Thelidium immersum* (Leight.) Mudd., Man. Brit. Lich., 1861, p. 295 var. *amylaceum* (Mass.) Servit, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 55.

Na pionowych, zwykle gładkich, przeważnie nasłonecznionych (niekiedy również na ocienionych) skałach wapienia jurajskiego, w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*, zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*, zespole *Ionaspis epulotica* oraz w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Mników 270 m, Przegonia Duchowna 290 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Kamyk 320 m; pow. Chrzanów: Dubie 300 m; pow. Olkusz: Dol. Bolechowska 380 m, Dol. Kobylańska 380 m, Dol. Bętkowska 360 m, Ojców 360 m, Pazurek koło Rabsztyna 415 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m; pow. Zawiercie: wzgórze „Straszykowa” 490 m, Ryczów 470 m, Podzamecze 480 m.

Gatunek częsty. Zbliżony do *T. decipiens*, od którego różni się między innymi strukturą i wielkością ekscipulum. Posiada ekscipulum całe czarne, szer. 300—400 μ .

Polyblastia Lönnr.

43. *Polyblastia amota* Arn., Flora, 52, 1869, p. 264; Zschacke, in Rabenh. Krypt. Fl., 9, 1/1, 1934, p. 455. [= *Amphoroblastia amota* (Arn.) Servit, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 78.]

Na skałach wapienia jurajskiego, przeważnie na pionowych, eksponowanych na północ, płaszczyznach.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Dol. Bolechowska 370 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Bębło 430 m.

Jura Północna. 7 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 380 m, Niegowa 400 m, Gorzków 340 m; pow. Częstochowa: Przyłomowice 330 m.

Gatunek rzadki na Jurze Południowej, rozproszony na Jurze Północnej. Zarodniki 30—52 $\times$ 15—25 μ , podzielone poprzecznie do 10 $\times$, podłużnie (w środkowych odcinkach) 3—4 (5) $\times$.

44. *Polyblastia bavarica* (DT et Sarnth) Zschacke, Hedwig., 62, 1921, p. 108. [= *Thelidium bavaricum* DT et Sarnth., Die Flecht. Tirol, 1902, p.

542; = *Amphoroblastia bavarica* (DT et Sarnth.) Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc. 1954, p. 73.]

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, niekiedy na niedużych kamieniach wapiennych wynurzających się z trawiastych muraw.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Tyniec rezerwat „Skolczanka” 250 m; pow. Chrzanów: Brodła 270 m; pow. Olkusz: Bębło 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Kroczyce 330 m.

Gatunek rzadki na terenie Jury Południowej, bardzo rzadki na Jurze Północnej. Ekscypulum szer. 400—500 (600) μ , czarnobrunatne. Zarodniki 28—47 $\times$ 15—19 μ , podzielone poprzecznie 3—4 (5) $\times$, podłużnie 1 $\times$ (w całym zarodniku jest tylko 1 lub 2 (3) podłużne przegrody); ilość komórek waha się od 5 do 10.

45. *Polyblastia pseudoalbida* (Servít) J. Nowak comb. nova [= *Amphoroblastia pseudoalbida* Servít, Česk. Liš. Čel. Verruc., 1954, p. 76.]

Na kamieniach wapienia jurajskiego wynurzających się z trawiastej murawy.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Tyniec rezerwat „Skolczanka” 240 m.

Gatunek bardzo rzadki. Ekscypulum szer. 250—320 μ , czarnobrunatne. Zarodniki 24—35 (41) $\times$ 10—19 μ , podzielone poprzecznie 3—7 $\times$, podłużnie (w środkowych odcinkach) tylko 2—3 $\times$. *P. pseudoalbida* różni się od *P. amota*, między innymi krótszymi i mniej podzielonymi zarodnikami.

46. *Polyblastia papularis* (Fr.) Servít, l. c. p. 203. [= *Verrucaria papularis* Fr., Lich. Eur. Reform., 1831, p. 434; = *Thelidium papulare* Arn. Flora, 68, 1885, p. 145.]

Na pionowych, gładkich, ocienionych lub nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle u ich podstawy, w zespole *Polyblastia papularis*-*Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 15 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Mników 280 m, Rybna 290 m, Dol. Bolechowska 370 m, Dol. Kluczwody 290 m; pow. Chrzanów: Brodła 270 m, Dubie 290 m, Dol. Raławki 360 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 390 m, Jerzmanowice 420 m, Dol. Bętkowska 360 m, Wierzchowie 390 m, Ojców Dol. Prądnika 360 m, Pieskowa Skała 390 m, Pazurek koło Rabsztyna 420 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Zawiercie: wzgórze „Straszykowa” 480 m, Podleśskie Skały koło Kroczyce 370 m.

Gatunek częsty na obszarze Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej. Podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Thelidium pyrenophorum* Mass. Natomiast podane przez Z. Tobolewskiego (1956) *Thelidium pyrenophorum* Mudd. jest innym gatunkiem i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nie rośnie. Okazy nasze posiadają zwykle duże ilości zarodników murkowatych (zawsze z jednym tylko odcinkiem podzielonym jedną przegrodą podłużną — dlatego prawdopodobnie cecha ta uchodziła uwadze dawnych badaczy).

47. *Polyblastia plicata* (Mass.) Lönnr., Flora, 41, 1858, p. 631. Zschacke in Rabenh. Krypt. Fl., 9, 1/1, 1934, p. 415. [= *Verrucaria plicata* Mass Lotos, 6, 1856, p. 80.]

Gatunek podawany przez A. Rehmana (1879) z Ojcowa ze skał wapiennych; dotychczas nie potwierdzony.

DERMATOCARPACEAE

Dermatocarpon Th. Fr.

48. *Dermatocarpon* cfr. *cinereum* (Pers.) Th. Fr., Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsal, 3, 1861, p. 356. [= *Endocarpon cinereum* Pers., Neue Ann. Bot., 1794, p. 28. [= *Involucrocarpon cinereum* (Pers.) Servít, in Klíč k urč. Liš. ČSR I, 1956, p. 33.]

Na humusie, szczątkach roślinnych lub na mchach w szczelinach nasłonecznionych skał wapiennych.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Tyniec rezerwat „Skołczanka” 230 m, Mników 280 m, Podskalany koło Modlnicy około 300 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Olkusz: Bębło 430 m, Jerzmanowice 450 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 450 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Podany był przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) jako *Catopyrenium cinereum*. Okazy nasze zgadzają się z eksykatem Rabenhorsta nr. 374 oraz z opisem Servíta. Posiadają plechę prawie skorupiastą, białawoszarawą, szerokości 1–7 cm, w części środkowej złożoną z łuseczkowatych fragmentów, szer. około 0,5–1 mm. Łatkowate łuseczki pojawiają się tylko na obwodzie plechy. Są one ciemniejsze na brzegach. Warstwa korowa wys. około 50 μ . Gonidia ustawione w pionowych rządkach. Peritecja liczne, o współczynniku De około 600. Egzotecjum szer. 0,1–0,15 mm. Ekscipulum szer. 180–220 μ , brunatne lub dołem jasne. Inwolukrelum wierzchołkowe, zaczątkowe. Zarodniki 15–21 $\times$ 5–9 μ . Nukleus J + czerwony.

49. *Dermatocarpon hepaticum* Th. Fr., l. c. p. 355.

Na nagiej ziemi pomiędzy mchami na półczkach skał wapiennych, zwykle w miejscach nasłonecznionych.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Dol. Sanki 290 m, Dol. Brzozkinki 280 m, Dol. Kobylańska 370 m, Podskalany koło Modlnicy około 300 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Podzamcze 480 m.

Gatunek rzadki na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Podany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) jako *Endopyrenium hepaticum*.

50. *Dermatocarpon daedaleum* (Kremp.) Th. Fr., l. c. p. 355. [= *Endocarpon daedaleum* Kremp., Flora, 28, 1855, p. 66; = *Dermatocarpon carti-*

Ryc. 4. *Verrucaria obfuscans* Nyl., okaz z Doliny Kobylańskiej. Pow. $3\times$.
 Fig. 4. *Verrucaria obfuscans* Nyl. Specimen from Kobylańska Valley, $3\times$.

Ryc. 5. *Dermatocarpon monstrosum* (Schaer.) Vain., okaz z Ojcowa. Pow. $3\times$.
 Fig. 5. *Dermatocarpon monstrosum* (Schaer.) Vain. Specimen from Ojców, $3\times$.

lagineum f. *daedaleum* (Kremp.) A. Zahlbr., Catal. Lich. Univ., 1, 1922, p. 209.]

Na humusie pomiędzy mchami na półeczkach skał wapiennych.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Podzamcze 460 m.

Gatunek bardzo rzadki, możliwe że przeoczony na skutek dużego podobieństwa do płonnych łusek plechy u gatunków rodzaju *Cladonia*.

51. *Dermatocarpon lachneum* (Ach.) A. L. Sm., Monogr. Brit. Lich., 2, 1911, p. 270. [= *Lichen lachneus* Ach., Lich. Suec. Prodr., 1798, p. 140; = *Dermatocarpon hepaticum* var. *lachneum* (Ach.) A. Zahlbr., Catal. Lich. Univ., 1, 1922, p. 217; = *Dermatocarpon rufescens* Th. Fr., l. c. p. 354.]

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle na cienkiej warstwie zwietrzliny lub na porastających skałę mchach, niekiedy masowo razem z *Toninia candida*.

Jura Południowa. 19 stan. Pow. Kraków: Przegorzały 260 m, Bielany 250 m, Tyniec 235 m, Piekary 240 m, Przeginia Duchowna 290 m, Rybna 290 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Czernichów około 220 m, Dol. Kluczwody 300 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobyłańska 380 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Nielepice 340 m, Czerna 380 m, pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Szklarki 390 m, Ojców 380 m, Pieskowa Skała 400 m, „Januszkowa Góra” koło Olkusza 430 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m, Dłużec 390 m.

Gatunek częsty na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej. Podany przez H. Lojkę (1868), F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879), i K. Filipowicza (1881) jako *Endopyrenium rufescens* lub *Endocarpon rufescens*.

52. *Dermatocarpon miniatum* (L.) Mann, Lich. in Bohem. observ. Dispos. 1825, p. 66. [= *Lichen miniatus* L., Spec. Plant., 1753, p. 1149.]

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego i karbońskiego (niekiedy również w miejscach ocienionych), w zespole *Rinodina immersa*-*Verrucaria gyelnikii* oraz w zespole *Lecania erysibe*-*Verrucaria policensis*.

Jura Południowa. 25 stan. Pow. Kraków: Przegorzały 270 m, Zielonki 250 m, Bielany 260 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Mników 280 m, Dol. Sanki 260 m, Rybna 280 m, Przeginia Duchowna 290 m, Czernichów około 220 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Podskalany k. Modlnicy ok. 300 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobyłańska 380 m; pow. Chrzanów: Czerna 380 m, Tenczynek 310 m, Kamyk 330 m, Nielepice 340 m, Dubie 300 m, Dol. Raclawki 370 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 400 m, Dol. Bętkowska 360 m, Wierzhowie 390 m, Ojców 350—400 m, Pieskowa Skała 390 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Mimo licznych stanowisk, często trudny do odszukania na skutek niedużej ilości okazów na stanowiskach. Podany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872), A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Endocarpon miniatum*. Okazy nasze odbiegają nieco od opisu Servita

(1956). Posiadają znacznie szersze ekscypulum (u Servíta: do 200 μ , u naszych okazów szerokie: 200—400 μ) oraz mniejsze zarodniki (u Servíta: 11—16 $\times$ 7—8 μ , u naszych okazów: 8—13 $\times$ 5—7 μ). *D. miniatum* jest gatunkiem bardzo zmiennym. Jak się wydaje, na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rosną następujące odmiany: var. *aetneum* (Torn.) A. Zahlbr., var. *crispum* (Mass.) A. Zahlbr., var. *pruinoseum* (Mass.) Müll. Arg., var. *complicatum* (Light.) Hellb.

53. *Dermatocarpon monstrosum* (Schaer.) Vain., Természetr. Füzetek, 22, 1899, p. 336; [= *Endocarpon miniatum* var. *monstrosum* Schaer., Lich. Helvet. Spicil, sect. 7, 1836, p. 349.]

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, w partiach szczytowych i podszczytowych, na płaszczyznach poziomych lub ukośnych, w zespole *Dermatocarpon monstrosum*-*Buellia venusta*, rzadziej w zespole *Rinodina immersa*-*Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 34 stan. Pow. Kraków: Januszowice 300 m, Zielonki 240 m, Tyniec 235 m, Bielany 260 m, Piekary 240 m, Ściejowice 230 m, Kryspinów 240 m, Skały Twardowskiego 230 m, Muików 300 m, Dol. Sanki 310 m, Przegonia Duchowna 300 m, Rybna 290 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Podskalany koło Modlnicy około 300 m, Dol. Kluczwody 300 m, Dol. Bolechowska 390 m, Żelków 400 m, Dol. Kobyłańska 400 m; pow. Chrzanów: Brodła 280 m, Podłęże koło Okleśnej 300 m, Obora koło Żalasa 350 m, Tenczynek 310 m, Nielepice 340 m, Dubie 310 m, Dol. Racławki 370 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 320—400 m, Dol. Szklarki 380—420 m, Łazy Jawór 500 m, Bębło 440 m, Wierzchowie 400 m, Ojców 410 m, Pieskowa Skała 420 m, Sułoszowa 440 m, Michałówka 380 m.

(Jura Północna. 1 stan. nie potwierdzone. Pow. Częstochowa: Olsztyn około 300—350 m.)

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej; obecnie nie odnaleziony na terenie Jury Północnej. Podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) oraz z terenu Jury Północnej przez F. Błońskiego (1890) jako *Endopyrenium monstrosum*.

Endocarpon Hedw.

54. *Endocarpon* cfr. *pallidum* Ach., Lichenogr. Univers, 1810, p. 301. Servít, in Klíč k urč. Liš. ČSR, 1, 1956, p. 36.

Na szczątkach roślinnych lub na obumierających mchach w szczelinach silnie nasłonecznionych skał wapiennych. Niekiedy wprost na humusie.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Chrzanów: Nielepice 335 m; pow. Olkusz: Ojców 370 m.

Gatunek bardzo rzadki. Charakterystyczny dzięki odstającym od podłoża i dachówkowato się nakrywającym łuskom plechy. Górna powierzchnia łusek jest jasnoszara lub brunatnawoszara, dolna powierzchnia jest biała, później (i tylko dalej od brzegu) brunatnawa (ale nigdy nie czarna). Warstwa rdzeniowa plektenchymatyczna zbudowana ze strzępek przebiegających poziomo. Dolna warstwa korowa niewyraźna.

55. *Endocarpon pusillum* Hedw., Descr. et Adumbrat. Muscor. Frondos., 2, 1789, p. 56; Servít, l. c. p. 36.

Na humusie lub resztkach roślinnych w szczelinach skał wapiennych, niekiedy na nagiej ziemi.

Jura Południowa. 13 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Zielonki 250 m, Dol. Brzaskwinki 280 m, Przeginia Duchowna 290 m, Rybna 290 m, Dol. Sanki 280 m, Dol. Kluczwody 360 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 390 m, Dol. Bętkowska 380 m, Ojców 370 m, Sułoszowa 435 m.

Gatunek rozproszony, na terenie Jury Północnej dotychczas go nie znalazłem. Łuski plechowe przylegają ściśle i całą powierzchnią do podłoża. Są one albo rozrzucone, albo skupione (jeżeli natomiast nakrywają się dachówkowato, to i wtedy ich brzeg nigdy nie odstaje ku górze). Dolna powierzchnia łusek, szczególnie na brzegach, czarna. Warstwa rdzeniowa miejscami paraplektenchymatyczna.

PYRENULACEAE

Arthopyrenia Mass.

56. *Arthopyrenia alba* (Schrad.) A. Zahlbr.

Gatunek podawany ogólnie z okolic Krakowa przez A. Rehmana (1879) jako *Acrocordia gemmata*; dotychczas nie potwierdzony.

57. *Arthopyrenia conoidea* (Fr.) A. Zahlbr. apud Engler-Prantl, Naturl. Pflanzenfam., 1, 1, 1903, p. 65. [= *Verrucaria conoidea* Fr., Lichenogr. Eur. Reform., 1831, p. 432.]

Na pionowych, suchych, gładkich, ocienionych lub nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, w zespole *Polyblastia papularis*-*Arthopyrenia conoidea*, niekiedy też w zespole *Ionaspis epulotica*.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Dubie 290 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 330 m, Wierzchowie 380 m, Ojców Dol. Prądnika 360 m.

Gatunek rozproszony, możliwe że przeoczony.

58. *Arthopyrenia persoonii* Mass., Symmict. Lich., 1885, p. 110.

Na gałązkach leszczyny (*Corylus avellana*) lub trzmieliny (*Evomunus* sp.) na słonecznych zboczach wapiennych.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Dol. Kluczwody, 300 m; pow. Olkusz: Ojców Dol. Prądnika 400 m.

Gatunek prawdopodobnie częsty lecz przeoczony.

Porina Müll. Arg.

59. *Porina byssophila* (Körb.) A. Zahlbr., l. c. p. 66. [= *Sagedia byssophila* Körb. apud Hepp, Flecht. Eur., 1860, p. 695.]

Na pionowych, suchych, gładkich, ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Chrzanów: Brodła 270 m.

Gatunek bardzo rzadki. U nas znany ze Śląska. Plecha niska lub bardzo cienka, jasnoszara lub zielonkawobiała, jednolita lub miejscami spękana, KOH —. Gonidia typu *Trentepohlia* o komórkach szer. około 7—17 μ . Peritecja prawie siedząca, w plesze pogrążona samą podstawą. Egzotecja szer. 0,2—0,3 mm. Ekscipulum szer. około 200 μ , czarne. Inwolukrelum połowiczne, fioletowoczarne. Parafizy trwałe, nitkowate, nieporozgałęziane, znacznie dłuższe od worków. Zarodniki 4—6 (7)-komórkowe: 15—20 $\times$ 5—6 μ . Nukleus J —.

60. *Porina faginea* (Schaer.) Arn.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Sagedia lactea* z Modlnicy koło Krakowa (z kory gałązek leszczyny); dotychczas nie potwierdzony.

Pyrenula Mass.

61. *Pyrenula leucoplaca* (Wallr.) Körb.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) z Krakowa i Modlnicy (z kory dębów); dotychczas nie potwierdzony.

62. *Pyrenula nitida* (Weig.) Ach.

Na korze starych buków.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Chrzanów: Dol. Racławki 360 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 330 m, Ojców Dol. Prądnika 360 m, Rabsztyn 440 m.

var. *nitidella* (Flk.) Schaer. odmiana podana ogólnie z okolic Krakowa z gałązek leszczyny przez A. Rehmana (1879).

Gatunek obecnie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki. Niegdyś prawdopodobnie był znacznie częstszy.

CALICIACEAE

Chaenotheca Th. Fr.

63. *Chaenotheca phaeocephala* (Turn.) Th. Fr.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) z Modlnicy (z kory dębów) jako *Cyphelium chlorellum*; dotychczas nie potwierdzony.

64. *Chaenotheca schaeferi* (De Not.) A. Zahlbr.

Gatunek podany przez A. Rehmana (1879) z Modlnicy koło Krakowa (z kory dębów) jako *Cyphelium albidum*; dotychczas nie potwierdzony.

65. *Chaenotheca stemonea* (Ach.) Zwackh.

Gatunek podany przez A. Rehmana (1879) z Modlnicy (z kory brzoź) jako *Cyphelium stemoneum*; dotychczas nie potwierdzony.

66. *Chaenotheca trichialis* (Ach.) Hellb.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) z Modlnicy (z kory dębów) jako *Cyphelium trichiale* lub *Calicium trichiale*; dotychczas nie potwierdzony.

Calicium Pers.

67. *Calicium floerkei* A. Zahlbr.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) z Modlnicy koło Krakowa (z kory dębów) jako *C. pusillum*; dotychczas nie potwierdzony.

68. *Calicium sphaerocephalum* (L.) Ach.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) z Krakowa i Modlnicy (z kory wierzb i ze starych płotów) jako *C. trachelium*; dotychczas nie potwierdzony.

Coniocybe Ach.

69. *Coniocybe furfuracea* (L.) Ach.

Gatunek podany przez W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879); dotychczas nie potwierdzony.

70. *Coniocybe sulphurea* (Retz.) Nyl.

Gatunek podany przez W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) z Modlnicy (z kory dębów); dotychczas nie potwierdzony.

ARTHONIACEAE

Arthonia Ach.

71. *Arthonia cinnabarina* (DC.) Wallr.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) z Podskalan koło Modlnicy (z kory jesionów) jako *A. gregaria*; dotychczas nie potwierdzony.

72. *Arthonia dispersa* (Schrad.) Nyl.

Gatunek podany ogólnie z okolic Krakowa (z kory drzew liściastych) przez A. Rehmana (1879) jako *A. epipasta*; dotychczas nie potwierdzony.

73. *Arthonia punctiformis* Ach.

Gatunek podany z Tomaszowic (z gałązek drzew liściastych) przez W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879); dotychczas nie potwierdzony.

74. *Arthonia radiata* (Pers.) Ach., em. Th. Fr.

Gatunek podany ogólnie z okolic Krakowa przez A. Rehmana (1879) jako *A. vulgaris* dotychczas nie potwierdzony.

var. *astroidea* Ach. odmiana podawana z Ojcowa (z kory jodeł) przez A. Rehmana (1879).

GRAPHIDACEAE

Xylographa Fr.

75. *Xylographa abietina* (Pers.) A. Zahlbr. var. *parella* (Ach.) Red gr.

Gatunek podawany przez F. Berdaua (1876) i A. Rehmana (1879) z Ojcowa (z kłód butwiejących drzew) jako *X. parella*; dotychczas nie potwierdzony.

Opegrapha Humb.

76. *Opegrapha diaphora* Ach.

Gatunek podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) z Ojcowa (z kory drzew liściastych) jako *O. varia* var. *diaphora*; dotychczas nie potwierdzony.

[*Opegrapha gyrocarpa* (Spreng.) Fw.

Gatunek podany błędnie z Podskalania koło Modlnicy przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879). Okazy Lojki należały, jak to stwierdził K. Redinger (1938 p. 285) do innego kalcofilnego gatunku, *O. saxicola*. Prawdziwa *O. gyrocarpa* rośnie przeważnie na skałach krzemianowych, a nie na wapiennych.]

77. *Opegrapha herpetica* Ach.

Na korze drzew liściastych, np. na bukach i grabach.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Chrzanów: Tenczynek około 300 m; pow. Olkusz: Ojców Dol. Prądnika i Dol. Saspowska około 350 m.

Gatunek obecnie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki, niegdyś prawdopodobnie znacznie częstszy; był podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881).

78. *Opegrapha lichenoides* Pers.

Na korze grabów razem z *O. herpetica* i *Pertusaria leioplaca*.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców Dol. Saspowska 370 m.

Gatunek bardzo rzadki. Okazy moje są identyczne z eksykatem Rabenhorsta nr. 533.

79. *Opegrapha mougeotii* Mass., Mem. Lichenogr., 1853, p. 103; Redinger, Rabenh. Krypt. Fl., 9, 2/1, 1938, p. 314; var. *lutescens* (Ach.) Redinger, l. c. p. 317.

Na pionowych, ocienionych i niekiedy $\pm$ wilgotnych skałach wapienia jurajskiego, u podstawy w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Brzoskwinia 300 m, Kochanów 290 m; pow. Olkusz: Ojców Dol. Saspowska 360 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Olkusz: Złożeniec 440 m.

Gatunek rzadki (det. Z. Tobolewski).

80. *Opegrapha saxatilis* (Wallr.) DC.

Gatunek podany z Ojcowa (ze skał wapiennych) przez K. Filipowicza (1881) jako *O. varia* var. *saxatilis*; dotychczas nie potwierdzony. Jest bardzo prawdopodobne, że Filipowicz miał okazy *O. saxicola*.

81. *Opegrapha saxicola* Ach., Synops. Lich., 1814, p. 71; Redinger, l. c. p. 281.

Na pionowych, suchych, nasłonecznionych lub $\pm$ ocienionych skałach wapienia jurajskiego, w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii* lub w zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Dol. Sanki 280 m, Tomaszowice około 300 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobyłańska 380 m, Prądnik Korzkiewski 320 m; Pow. Chrzanów: Kamyk 320 m; pow. Olkusz: Ojców Dol. Prądnika 370 m, Pazurek koło Rabsztyna 415 m.

Gatunek rozproszony; prawdopodobnie rośnie tylko na terenie Jury Południowej. Był podany przez K. Redingera (1938).

82. *Opegrapha rimalis* Pers.

Gatunek podany z Ojcowa (z kory drzew) przez K. Filipowicza (1881) jako *O. varia* var. *rimalis*; dotychczas nie potwierdzony.

83. *Opegrapha viridis* (Ach.) Pers.

Gatunek podawany z Modlnicy (z kory brzoź) przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Zwackhia involuta*; dotychczas nie potwierdzony.

Graphis (Adans.) Müll. Arg.

84. *Graphis scripta* (L.) Ach.

Na korze starych buków i grabów.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Bielany 280 m, Dol. Kluczwody 290 m; pow. Chrzanów: Dol. Raclawki 370 m; pow. Olkusz: Ojców Dol. Sąspowska 360 m, Pazurek 410 m, Rabsztyn 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Blachownia koło Częstochowy około 280 m.

Gatunek rozproszony, niegdyś zapewne był znacznie pospolitszy. Podawany przez A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890).

Phaeographis Müll. Arg.

85. *Phaeographis dendritica* (Ach.) Müll. Arg.

Gatunek podany z Ojcowa (z kory buków) przez A. Rehmana (1879) jako *Graphis dendritica*; dotychczas nie potwierdzony.

LECANACTIDACEAE

Lecanactis Eschw.

86. *Lecanactis stenhammari* (Fr.) Arn., Flora, 55, 1871, 196; Lettau, Repert. spec. nov. regn. vegetabilis Beihefte, 69, 1937, p. 61. [= *Lecidea stenhammari* Fr., Summa Veget. Scand., 1846, p. 115.]

Na pionowych, ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego, u podstawy w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*.

Jura Południowa. 16 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Dol. Brzaskwinki 280 m, Przeginia Duchowna 290 m, Rybna 290 m, Dol. Kluczwody 280 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Chrzanów: Brodla 270 m, Nielepice 330 m, Kamyk 320 m; pow. Olkusz: Wierchowice 390 m, Dol. Bętkowska 340 m, Dol. Szklarki 380 m, Ojców 360 m, Pieskowa Skała 380 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Olkusz: Złożeniec 440 m.

Gatunek dość częsty na terenie Jury Południowej, bardzo rzadki na Jurze Północnej. Okazy moje barwią się podchlorynem słabiej od okazów pienińskich.

Schismatomma Mass.

87. *Schismatomma pericleum* (Ach.) Branth. et Rostr.

Gatunek podawany z Ojcowa i Złotego Potoku (z kory jodeł i świerków) przez F. Berdaa (1876), A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890); dotychczas nie potwierdzony.

CHRYSOOTRICACEAE

Crocynia (Ach.) Mass.

[*Crocynia membranacea* (Dicks.) A. Zahlbr. [= *C. lanuginosa* (Ach.) Hue]

Gatunek podawany błędnie z okolic Krakowa przez A. Rehmana (1879) jako *Pannaria lanuginosa*. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (na skałach wapiennych w miejscach ocienionych i wilgotnych lub eksponowanych na północ) rośnie i występuje jako bardzo pospolity inny porost, *Lepraria* cfr. *crassissima*. Plecha jego, białawoszara, jest podobna nieco do plechy *Crocynia membranacea*.]

DIPLOSCHISTACEAE

Diploschistes Norm.

88. *Diploschistes albissimus* (Ach.) DT. et Sarnth.

Na pionowych, ocienionych lub $\pm$ widnych skałach wapienia jurajskiego, w zespole *Polyblastia papularis*-*Arthopyrenia conoidea*, zespole *Ionaspis epulotica*; niekiedy wzdłuż szczelin i spękań.

Jura Południowa. 13 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Czarna 380 m, Dubie 300 m, Dol. Raclawki 360 m; pow. Olkusz: Wierchowice 390 m, Dol. Bętkowska 330 m, Dol. Szklarki 400 m, Ojców Dol. Prądnika i Brama Krakowska około 350—400 m.

Gatunek dość częsty; występuje tylko na terenie Jury Południowej. Podawany był przez F. Berdaia (1876), A. Rehmana (1879) i L. Łazarczyka (1914) jako *Urceolaria cretacea*, *U. scruposa* var. *cretacea* lub jako *U. scruposa* var. *albissima*.

89. *Diploschistes bryophilus* (Ehrh.) A. Zahlbr., Hedwigia, 31, 1892, p. 34.

Na mchach, szczątkach roślinnych, humusie lub na plechach innych porostów, np. na łuskach *Cladonia pyxidata* i *Cl. symphyrcarpia*, w silnie nasłonecznionych miejscach wśród skał wapiennych.

Jura Południowa. 36 stan. Pow. Kraków: Januszowice 300 m, Zielonki 250 m, Skały Twardowskiego 230 m, Przegorzały 270 m, Bielany 270 m, Olszanica 260 m, Kryspinów 240 m, Tyniec 240 m, Piekary 230 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Mników 300 m, Dol. Sanki 280 m, Rybna 300 m, Przeginia Duchowna 290 m, Czernichów 240 m, Dol. Brzoskwinki 290 m, Kochanów 290 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m, Dol. Kluczwody 310 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 290 m, Brodla 270 m, Tenczynek 300 m, Czarna 380 m, Dol. Raclawki 360 m, Nielepice 340 m, Kamyk 330 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 420 m, Dol. Bętkowska 380 m, Ojców 410 m, Pieskowa Skała 390 m, Sułoszowa 430 m, Michałówka 390 m, Pazurek 420 m, Rabsztyn 445 m.

Jura Północna. 20 stan. Pow. Olkusz: Ryczówek 370 m, Krzywopłoty 430 m, wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 460 m, Złożeniec 460 m; pow. Zawiercie: Ryczów 470 m, wzgórze „Straszykowa” 490 m, Podzamcze 490 m, Zerkowice 390 m, Piaseczno 370 m, Podlesice 400 m, Kroczyce 330 m, Zdów 330 m; pow. Myszków: Mirów 380 m, Lutowiec

Ryc. 6. *Gyalecta geoica* (Wg.) Ach., okaz z Ojcowa. Pow. $3\times$.
 Fig. 6. *Gyalecta geoica* (Wg.) Ach. Specimen from Ojców, $3\times$.

Ryc. 7. *Gyalecta ulmi* (Sw.) A. Zahlbr. f. *muscicola* (Müll. Arg.) A. Zahlbr., okaz z Ojcowa. Pow. $3\times$.
 Fig. 7. *Gyalecta ulmi* (Sw.) A. Zahlbr. f. *muscicola* (Müll. Arg.) A. Zahlbr. Specimen from Ojców, $3\times$.

400 m, Niegowa 410 m, Mzurów 385 m, Gorzków 350 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 340 m, Przyłubowice 330 m.

Gatunek pospolity na terenie obu okręgów. Podany przez W. Jabłońskiego (1872) H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Urceolaria bryophila* lub *U. scruposa* var. *bryophila*.

90. *Diploschistes scruposus* (Schreb.) Norm.

Na krzemieniach, skałkach melafirowych lub porfirowych.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Dol. Kluczwody około 300 m; pow. Chrzanów: Podzamcze koło Tenczynka 360 m; pow. Olkusz: Ojców około 360 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 360 m; pow. Częstochowa: Olsztyn około 340 m, Częstochowa około 250 m.

Gatunek rzadki. Podany przez A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890) jako *Urceolaria scruposa*.

GYALECTACEAE

Ionaspis Th. Fr.

91. *Ionaspis epulotica* (Ach.) Th. Fr., Lichen. Scand. I, 1871, p. 273; Lettau, Repert. spec. nov. regn. vegetabil. Beihefte, 69, 1937, p. 199. [= *Gyalecta epulotica* Ach., Lich. Univers., 1810, p. 151.]

Na pionowych, ocienionych lub ekspozowanych na północ, skałach wapienia jurajskiego u podstawy.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowska 360 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Kamyk 320 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 330 m, Dol. Szklarki 390 m, Ojców Brama Krakowska Dol. Prądnika Dol. Sądowska i Wąwóz Korytania 340—380 m, Wielmoża 390 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn 340 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej.

Microphiale (Stizenb.) A. Zahlbr.

92. *Microphiale diluta* (Pers.) A. Zahlbr.

Gatunek podawany przez F. Berdaua (1876) i A. Rehmana (1879) z Ojcowa (z kory świerków) jako *Biatorina pineti* lub *Biatora pineti*; dotychczas nie potwierdzony.

Petractis Fr.

93. *Petractis clausa* (Hoffm.) Kremp., Denkschr. K. Bayer. Bot. Gesell., 4, 2, 1861, p. 254; Lettau, l. c. p. 227.

Na pionowych, nasłonecznionych lub $\pm$ ocienionych, często spękanych skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Dol. Brzoskwinki 290 m, Dol. Bolechowska 370 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Chrzanów: Tataruchy koło Ten-

czynka około 310 m, Dubie 300 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Ojców Dol. Prądnika 380 m.

Gatunek rozproszony, rośnie tylko na terenie Jury Południowej; podany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *P. exanthematica*.

Gyalecta (Ach.) A. Zahlbr.

94. *Gyalecta geoica* (Wg.) Ach., Kgl. Vetensk. — Akad. Nya Handl., 1808, p. 229; Lettau, l. c. p. 148.

Na humusie, mchach lub na szczątkach roślinnych w szczelinach skał wapiennych, zwykle w miejscach $\pm$ widnych, często jednak eksponowanych na północ.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzostkiewicza 280 m, Mników 270 m, Dol. Bolechowska 380 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m; pow. Olkusz: Bębło 430 m, Ojców Dol. Prądnika 380 m, Rabsztyn (leg. B. Gumińska) około 400—440 m.

Jura Północna. 8 stan. Pow. Olkusz: „Glinianki” koło Krzywopłotów 400 m; pow. Zawiercie: Srubarnia 450 m, Podlesie koło Smolenia 450 m, Piaseczno 360 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 380 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 340 m, Przyłomice 330 m.

Gatunek rozproszony na terenie obu okręgów.

95. *Gyalecta hypoleuca* (Ach.) A. Zahlbr.

Na pionowych, ocienionych lub eksponowanych na północ, skałach wapieni jurajskich, u podstawy, w zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*, zespole *Ionaspis epulotica* i w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Dol. Bolechowska 370 m; pow. Chrzanów: Dubie 290 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Wierzchowie 390 m, Ojców Dol. Prądnika i Dol. Sąsowska około 360 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn około 330 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Podany przez K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890) jako *Secoliga gyalectoides*.

96. *Gyalecta jenensis* (Batsch.) A. Zahlbr.

Na ocienionych lub eksponowanych na północ, zwykle nieco wilgotnych i splekanych skałach wapienia jurajskiego, u podstawy w zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*, zespole *Ionaspis epulotica*; często też tworzy samodzielne zbiorowisko porostów.

Jura Południowa. 35 stan. Pow. Kraków: Zielonki 240 m, Sikornik koło Krakowa 270 m, Bielany 260 m, Kryspinów 240 m, Tyniec 230 m, Piekary 240 m, Mników 270 m, Dol. Brzostkiewicza 290 m, Rybna 290 m, Przeginia Duchowna 280 m, Czernichów około 240 m, Dol. Kluczwody 280 m, Dol. Bolechowska 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Brodla 270 m, Podłęże koło Okleśnej 290 m, Obora koło Zalasza 340 m, Tenczynek 290 m, Dubie 290 m, Filipowice 320 m, Dol. Raclawki 350 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 380 m, Zelków 380 m, Bębło 420 m, Dol. Bętkowska 330 m, Łazy Jawór 450 m, Jerzmanowice 450 m, Dol. Szklarki 390 m, Ojców 340—400 m, Pieskowa Skała 390 m, Sułoszowa 430 m,

Michałówka 380 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 430 m, „Januszkowa Góra” koło Olkusza 420 m.

Jura Północna. 15 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty około 400 m; pow. Zawiercie: Ryczów 450 m, Smoleń 480 m, wzgórze „Straszykowa” koło Ryczowa 480 m, Piaseczno 350 m, Podlesice 360 m, Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 380 m, Niegowa 380 m, Mzurów 350 m, Gorzków 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 330 m, Przyłubowice 330 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej i częsty na Jurze Północnej. Podawany był przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *G. cupularis*.

97. *Gyalecta ulmi* (Sm.) A. Zahlbr. f. *muscicola* A. Zahlbr.

Na mchach porastających szczeliny skał wapiennych; zwykle w miejscach ± nasłonecznionych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców Brama Krakowska, około 360 m.

Gatunek bardzo rzadki. U nas znany z Pienin i Roztocza (z góry „Krzemień” koło Stanisławowa leg. M. Kuc-1957).

Sagiolechia Mass.

98. *Sagiolechia protuberans* (Ach.) Mass.

Na pionowych, ocienionych lub eksponowanych na północ, często nieco wilgotnych skałach wapienia jurajskiego, w zespole *Polyblastia papularis*-*Arthopyrenia conoidea*, zespole *Verrucaria velana*-*Caloplaca xantholyta* oraz w zespole *Ionasp's epulotica*.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Dol. Brzozkwinki 280 m, Dol. Kluczwoły 300 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Dubie 290 m, Kamyk 330 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 380 m, Dol. Bętkowska 340 m, Ojców Dol. Prądnika i Brama Krakowska około 360 m, Pazurek 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 450 m.

Gatunek dość częsty na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej, możliwe że przeoczany ze względu na jego częste występowanie w stanie płonnym. Zbierałem go również w Pieninach na Trzech Koronach oraz w Tatrach zachodnich, np. na Kalackiej Turni 1400 m.

PYRENOPSIDACEAE

Psorotichia Mass.

99. *Psorotichia schaeferi* (Mass.) Arn.

Na nasłonecznionych, zwykle splekanych skałach wapienia jurajskiego, przeważnie w partiach szczytowych i podszczytowych.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Przegorzały 270 m, Tyniec rezerwat „Skołczanka” 240 m, Rybna 290 m; pow. Chrzanów: Tataruchy koło Tenczyńska 330 m; pow. Olkusz: Jerzmanowice 440 m, Ojców Dol. Prądnika i Dol. Saspowska około 380 m.

Gatunek rozproszony, rośnie tylko na terenie Jury Południowej. Prócz

P. schaereri zbierałem jeszcze kilka innych gatunków z tego rodzaju. Niestety, zmuszony jestem na razie zrezygnować z oznaczenia i opublikowania ich, brak jest bowiem nowoczesnego opracowania rodziny *Pyrenopsidaceae*.

Anema Nyl.

100. *Anema decipiens* (Mass.) Forss.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, razem z *Thyrea pulvinata* i *Synalissa symphorea*.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 380 m.

Gatunek bardzo rzadki.

Thyrea Mass.

101. *Thyrea pulvinata* (Schaer.) Mass. [= *Omphalaria pulvinata* (Schaer.) Nyl.]

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w miejscach, którymi okresowo spływa z górnych partii woda opadowa.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Przeginia Duchowna 290 m, Rybna 290 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m, Ojców około 360 m.

Gatunek rzadki. Okazy moje wyglądają bardzo nietypowo, są skarłate i mają łatki gęsto skupione.

Peccania (Mass.) Forss.

102. *Peccania coralloides* Mass.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, często w szczelinach.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzoskwinki 280 m, Przeginia Duchowna 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m, Ojców, Dol. Prądnika 380 m.

Gatunek rozproszony. Rośnie tylko na terenie Jury Południowej, gdzie występuje wyłącznie w stanie płonnym.

Synalissa Fr.

103. *Synalissa symphorea* (Ach.) Nyl.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego lub wapienia karbońskiego.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Dol. Kluczwoły 300 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Czerna 360 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska około 370 m, Ojców, Dol. Prądnika 390 m.

Gatunek rzadki, rośnie tylko na terenie Jury Południowej. Występuje tu w stanie płonnym w postaci małych, czarniawych kępek, wysokich około 3—4 mm, złożonych z $\pm$ cylindrycznych gałązek.

Lempholemma (Mass.) A. Zahlbr.104. *Lempholemma chalazanum* (Ach.) Arn.

Na humusie pomiędzy poduszkami mchów, zwykle w szczelinach skał wapiennych, w silnie nasłonecznionych miejscach; niekiedy wprost na nagiej ziemi.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Mników 270 m, Dol. San-ki 280 m, Przeginia Duchowna 270 m, Dol. Bolechowska 360 m; pow. Olkusz: Dol. Bętko-ska 360 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Myszków: Lutowiec 380 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej, bardzo rzadki na Jurze Północnej, możliwe zresztą, że przeoczany wskutek podobieństwa do młod-szych okazów *Collema tenax*, z którą bardzo często razem występuje.

Collema (Hill.) A. Zahlbr.105. *Collema auriculatum* Hoffm.

Na mchach porastających szczeliny skał wapiennych, zwykle na ocienio-nych i $\pm$ wilgotnych siedliskach.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Sikornik koło Krakowa 260 m, Dol. Brzostkiewski 280 m; pow. Chrzanów: Czerna 380 m; pow. Olkusz: Ojców Bra-ma Krakowska 350 m, Michałowka 380 m, Pazurek 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn około 330 m.

Gatunek rozproszony. Podawany przez A. Rehmana (1879) i F. Błoń-skiego (1890) jako *C. granosum*.

106. *Collema callopismum* Mass., *Miscell. Lichenol.*, 1856, p. 23; G. De-gelius, *Symb. Bot. Upsal.*, 13, 1954, p. 238.

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, np. u ich podstawy, nad brzegiem strumienia.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Chrzanów: Dubie około 290 m.

Gatunek bardzo rzadki. Okazy moje nie posiadają apotecjów. Znany z Tatr wapiennych (G. Degelius 1954).

107. *Collema crispum* (Huds.) G. H. Web.

Gatunek podawany z Ojcowa i Olsztyna koło Częstochowy przez K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890) jako *C. conchilobum* lub *C. cheileum*; dotychczas nie po-twierdzony.

108. *Collema cristatum* (L.) G. H. Web.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapiennych, zwykle w miejscach wietrzejących lub wzdłuż szczelin.

Jura Południowa. 14 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Przeginia Duchowna 280 m, Mników 300 m, Dol. Brzostkiewski 290 m, Podskalany koło Modlnicy około 300 m, Dol. Kluczwody 310 m, Dol. Bolechowska 380 m; pow. Olkusz: Wierchowice 390 m, Dol. Szklarki 400 m; pow. Chrzanów: Dol. Raclawki 360 m, Nielepice 340 m.

Gatunek dość częsty. Podany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) A. Rehmana (1879) jako *C. multifidum*. Okazy moje należą do odmiany var, *marginale* (Huds.) Degel. Pod nazwą *C. cristatum* W. Jabłoński, A. Rehman i K. Filipowicz podawali z Bielan i Ojcowa któryś z gatunków nadrzewnych. Niestety, bez obejrzenia oryginalnych okazów nie mogłem wyjaśnić, o który tu gatunek chodziło.

[*Collema flaccidum* Ach.

Gatunek podawany błędnie z Ojcowa (ze skał wapiennych) przez F. Berdausa (1876) i A. Rehmana (1879), kwestionowany już przez K. Filipowicza (1881). Prawdziwa *C. flaccidum* rośnie na skałach krzemianowych.]

109. *Collema polycarpon* Hoffm.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 9 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Dol. Sanki 290 m, Dol. Brzaskwinki 280 m, Dol. Kluczwody 300 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 390 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 410 m, Dol. Bętkowska 370 m, Ojców Dol. Prądnika 380 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Karlin 400 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej, bardzo rzadki na Jurze Północnej. Podany był przez W. Jabłońskiego (1872) i K. Filipowicza (1881).

110. *Collema tenax* (Sw.) Ach., em. Degel., Symb. Bot. Upsal., 13, 1954, p. 150.

Na nagiej ziemi lub pomiędzy mchami, zwykle w szczelinach skał wapiennych zarówno w miejscach ocienionych, jak i nasłonecznionych.

Jura Południowa. 23 stan. Pow. Kraków: Zielonki 240 m, Tyniec 240 m, Piekary 250 m, Mników 270 m, Dol. Sanki 280 m, Rybna 290 m, Przeginia Duchowna 300 m, Dol. Brzaskwinki 290 m, Dol. Kluczwody 380 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Brodla 270 m, Dol. Racławki 360 m, Czerna 380 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 390 m, Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Szklarki 400 m, Ojców 340—410 m, Wielmoża 380 m, Sułoszowa 430 m, Michałówka 380 m, „Januszkowa Góra” koło Olkusza 410 m.

Jura Północna. 8 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Podlesice 390 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Niegowa 360 m, Gorzków 350 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek dość pospolity na terenie Jury Południowej, rozproszony na Jurze Północnej. Podawany był przez A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890) jako *C. pulposum* lub *C. tenax* f. *coronata*.

111. *Collema tunaeforme* (Ach.) Ach., em. Degel., l. c. p. 330.

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w miejscach ocienionych lub eksponowanych na północ; przeważnie razem z *Gyalecta jenensis*.

Jura Południowa. 39. stan. Pow. Kraków: Zielonki 250 m, Januszowice 290 m, Skały Twardowskiego koło Krakowa 230 m, Sikornik koło Krakowa 270 m, Bielany 270 m, Tyniec 240 m, Piekary 240 m, Ściejowice 220 m, Kryspinów 240 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Mników 270 m, Dol. Sanki 270 m, Dol. Brzaskwinki 280 m, Rybna 290 m, Przeginia Duchowna 300 m, Czernichów 240 m, Prądnik Korzkiewski 320 m, Dol. Klucz-

wody 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Brodła 270 m, Obora koło Zalasa 340 m, Tenczynek 310 m, Filipowice 310 m, Dol. Raclawki 360 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 380 m, Zerków 360 m, Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Szklarki 380 m, Jerzmanowice 450 m, Łazy Jawór 450 m, Ojców 340—410 m, Pieskowa Skała 390 m, Sułoszowa 430 m, Michałowka 380 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 430 m, „Januszkowa Góra” koło Olkusza 420 m.

Jura Północna. 24 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m, Domaniewice 320 m, Krzywopłoty 420 m, Dłużec 390 m, Złożeniec 450 m; pow. Zawiercie: Ryczów 450 m, Srubarnia 460 m, Podzamcze 480 m, Karlin 400 m, Rzędkowice 410 m, Piaseczno 360 m, Zerkowice 380 m, Podlesice 360 m, Kroczyce 330 m, Zdów 330 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 390 m, Niegowa 380 m, Mzurów 340 m, Gorzków 360 m, Ludwinów 380 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 340 m, Przemyłowice 330 m.

Gatunek pospolity na terenie obu okręgów. Najczęściej występuje w stanie płonnym, w postaci pojedynczych łatek.

Leptogium (Ach.) S. Gray.

112. *Leptogium lichenoides* (L.) A. Zahlbr.

Na mchach wśród skał wapiennych, zarówno w miejscach ocienionych jak i silnie nasłonecznionych.

Jura Południowa. 43. stan. Pow. Kraków: Bielany 240 m, Kryspinów 240 m, Skały Twardowskiego koło Krakowa 230 m, Sikornik 270 m, Tyniec 230 m, Piekary 240 m, Ściejowice 230 m, Przegorzały 270 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Zielonki 240 m, Januszowice 290 m, Przeginia Duchowna 290 m, Czernichów 240 m, Rybna 290 m, Mników 270 m, Dol. Sanki 280 m, Dol. Brzozkwinki 280 m, Kochanów 280 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 390 m; pow. Chrzanów: Brodła 270 m, Obora koło Zalasa 340 m, Tenczynek 310 m, Kamyk 330 m, Nielepice 340 m, Podłęże koło Okleśnej 290 m, Filipowice 310 m, Czerna 380 m, Dol. Raclawki 360 m; pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Dol. Szklarki 380 m, Dol. Bętkowska 340 m, Łazy Jawór 490 m, Bębło 420 m, Wierzchowie 390 m, Ojców 340—410 m, Pieskowa Skała 390 m, Sułoszowa 430 m, Michałowka 380 m, Pazurek 420 m, Rabsztyn 430 m, „Januszkowa Góra” koło Olkusza 420 m.

Jura Północna. 18 stan. Pow. Olkusz: Ryczówek 370 m, Krzywopłoty 420 m, wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 430 m, Złożeniec 450 m, Dłużec 390 m, pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Podzamcze 490 m, Karlin 390 m, Piaseczno 360 m, Podlesice 380 m, Kroczyce 330 m, Zdów 330 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 380 m, Mzurów 350 m, Gorzków 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Przemyłowice 330 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek pospolity na terenie obu okręgów. Przeważnie występuje w stanie płonnym. Podawany przez A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890) jako *L. lacerum* lub *L. lacerum* var. *majus*. Najczęściej rośnie w odmianie var. *pulvinatum* (Hoffm.) Nyl.

113. *Leptogium saturninum* (Dicks.) Nyl.

Gatunek podawany z Modlnicy (z kory wierzb) przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Mallotium tomentosum*; dotychczas nie potwierdzony.

114. *Leptogium sinuatum* (Huds.) Mass.

Na mchach w szczelinach skał wapiennych, w miejscach widnych i suchych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Zabierzów 240 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn około 330 m.

Gatunek bardzo rzadki, możliwe że przeoczany. Podany był przez F. Błońskiego (1890). Okazy moje posiadają liczne apotecja, szer. około 0,2—0,6 mm. Zarodniki murkowate, na końcach zaostrome, $26-46 \times 10-14 \mu$.

115. *Leptogium tenuissimum* (Dicks.) Körb.

Gatunek podany przez K. Filipowicza (1881) z Ojcowa (z mchów); dotychczas nie potwierdzony.

PANNARIACEAE

Placynthium S. Gray.

116. *Placynthium nigrum* (Huds.) S. Gray.

Na skałach wapiennych zarówno w miejscach nasłonecznionych, jak i w cienistych i nieco wilgotnych, niekiedy na betonie; najobficiej rośnie w zespole *Polyblastia popularis*-*Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 33 stan. Pow. Kraków: Zielonki 240 m, Januszowice 300 m, Sikornik 270 m, Bielany 280 m, Zabierzów 270 m, Tyniec 240 m, Piekary 240 m, Kryspinów 240 m, Mników 270 m, Przeginia Duchowna 290 m, Brzostkwinia 280 m, Rybna 290 m, Kochanów 280 m, Dol. Kobyłańska 370 m, Dol. Bolechowicka 390 m; pow. Chrzanów: Brodla 270 m, Obora koło Zalasza 340 m, Podłęże koło Okleśnej 280 m, Tenczynek 310 m, Czarna 380 m, Filipowice 310 m, Dubie 290 m, Dol. Raclawki 360 m, Kamyk 320 m, Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Wierzchowice 380 m, Zelków 380 m, Bębło 430 m, Dol. Bętkowska 360 m, Łazy Jawór 490 m, Dol. Szklarki 390 m, Raclawice 400 m, Ojców 340—410 m.

Jura Północna. 25 stan. Pow. Olkusz: Ryczówek 370 m, Krzywopłoty 420 m, wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 430 m, Smoleń 480 m, Złożeniec 450 m, Dłużec 380 m, Domaniewice 320 m; pow. Zawiercie: Ryczów 450 m, Podzamecze 480 m, Karlin 400 m, Piaseczno 360 m, Podlesice 380 m, Kroczyce 330 m, Rzędkowice 410 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Czarny Kamień 370 m, Lutowiec 390 m, Niegowa 380 m, Mzurów 350 m, Gorzków 360 m, Ludwinów 400 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Przemiłowice 320 m, Olsztyn 350 m.

Gatunek bardzo pospolity na terenie obu okręgów. Podany był przez K. Filipowicza (1881) jako *Lecothecium corallinoides*. Jest gatunkiem bardzo zmiennym, często występuje w stanie płonnym. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zbierałem następujące formy: f. *crustaceum* Hepp, f. *nigrescens* Gyl., f. *majus* (Harm.) Gyl., f. *tapetiforme* Gyl.

117. *Placynthium subradiatum* (Nyl.) Arn.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, np. w zespole *Rinodina immersa*-*Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Skała Kmita koło Zabierzowa 270 m, Przeginia Duchowna 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m, Ojców 360 m, Pieskowa Skała 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Myszków Mzurów 340 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej, bardzo rzadki na Jurze Północnej.

118. *Placynthium* cfr. *tremniacum* (Mass.) Jatta.

Na pionowych, $\pm$ nasłonecznionych lub ocienionych skałach wapienia jurajskiego u podstawy.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kobyłańska 370 m; pow. Chrzanów: Nielepice 335 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Ojców 380 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Olkusz: Ryczówek 370 m.

Gatunek rzadki na obszarze Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Posiada plechę jaśniejszą niż *P. nigrum*, $\pm$ szarawo przyprószoną. Zarodniki 2-komórkowe, niekiedy niezupełnie dojrzałe.

Pannaria Del.

119. *Pannaria pezizoides* (Web.) Trev.

Gatunek podany przez L. Łazarczyka (1914) jako *P. brunnea* var. *genuina*; dotychczas nie potwierdzony — możliwe, że był podany błędnie.

STICTACEAE

Lobaria Schreb.

120. *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.

Gatunek podawany z Tenczynka, Ojcowa i Złotego Potoku (z kory starych drzew) przez A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890) jako *Sticta pulmonaria*; dotychczas nie potwierdzony. Widziałem zielnikowe okazy Rehmana. Obecnie prawdopodobnie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej zupełnie wyginął.

[*Sticta* Schreb.

[*Sticta silvatica* (Huds.) Ach.

Gatunek podawany błędnie z Ojcowa przez F. Berdaua (1876) i A. Rehmana (1879); kwestionowany już przez K. Filipowicza (1881).]

PELTIGERACEAE

Solorina Ach.

121. *Solorina saccata* (L.) Ach.

Na humusie lub na mchach w szczelinach skał wapiennych, zwykle w miejscach eksponowanych na północ i $\pm$ wilgotnych.

Jura Południowa. 35 stan. Pow. Kraków: Zielonki 240 m, Krzemionki koło Krakowa 220 m, Przegorzały 270 m, Bielany 260 m, Tyniec 230 m, Piekary 240 m, Skała Kmita koło Zabierzowa 270 m, Mników 270 m, Rybna 290 m, Dol. Sanki 280 m, Przeginia Duchowna 280 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kluczwody 300 m, Dol. Bolechowicka 380 m; pow. Chrzanów: Brodła 270 m, Podłęże koło Okleśnej 290 m, Obora koło Zalasza 340 m,

Czerna 380 m, Filipowice 300 m, Tenczynek 300 m, Dubie 300 m, Dol. Raclawki 360 m, Kamyk 320 m, Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 390 m, Zelków 380 m, Bębło 430 m, Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Szklarki 390 m, Ojców 340—410 m, Michałówka 380 m, Sułoszowa 430 m, Pazurek 410 m, Rabsztyn 420 m, „Januszkowa Góra” koło Olkusza 430 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 330 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej. Był podawany przez H. Lojkę (1868), F. Berdaua (1876) A. Rehmana (1879), i K. Filipowicza (1881).

Nephroma Ach.

122. *Nephroma laevigatum* Ach. f. *papyraceum* (Hoffm.) Körb.

Gatunek podany ze Złotego Potoku przez F. Błońskiego (1890) jako *Nephromium laevigatum-papyraceum*; dotychczas nie potwierdzony.

123. *Nephroma resupinatum* (L.) Ach.

Gatunek podany z Woli Duchackiej i Ojcowa przez A. Rehmana (1879) jako *Nephromium tomentosum*; dotychczas nie potwierdzony.

Peltigera Willd.

124. *Peltigera aptosa* (L.) Willd.

Na ziemi wśród poduszek mchów na skałach wapiennych.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzostkinki 280 m; pow. Olkusz: Ojców około 340—410 m; pow. Chrzanów: Czatkowice koło Krzenowic.

Gatunek rzadki. Podany był przez W. Jabłońskiego (1872), F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881). Okazy moje po zwilżeniu są bardzo wyraźnie seledynowozielonkawe. Posiadają łatki pokryte na górnej powierzchni cefalodiami, pod spodem jednolicie brunatne, filcowane, bez wyodrębniających się żyłek.

125. *Peltigera canina* (L.) Willd.

Na mchach porastających skały wapienne lub na nagiej ziemi, zwykle w miejscach cienistych.

Jura Południowa. 14 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Dol. Sanki 280 m, Dol. Brzostkinki 275 m, Rybna 280 m, Kochanów 280 m; pow. Chrzanów: Brodła 270 m, Filipowice 300 m, Czerna 370 m, Tenczynek, 310 m, Dol. Raclawki 360 m, pow. Olkusz: Dol. Szklarki 390 m, Dol. Bętkowska 380 m, Wierzchowie 390 m, Ojców 340—400 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Zawiercie: Podlesice 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok około 350 m.

Gatunek dość częsty na terenie Jury Południowej, rzadszy na obszarze Jury Północnej. Był podawany przez W. Jabłońskiego (1872), A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890). Najczęściej występuje w stanie płonnym.

126. *Peltigera erumpens* (Tayl.) Vain.

Na nagich lessowych szkarpach, nad drogami polnymi.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: między Nielepicami a Brzostkwinia około 300 m; pow. Chrzanów: Radwanowice 300 m.

Gatunek rzadki na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Występuje zawsze w stanie płonnym.

127. *Peltigera horizontalis* (L.) Baumg.

Na nagiej ziemi lub na mchach w obrębie skał wapiennych.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Dol. Kluczwody 280 m; pow. Chrzanów: Brodla 270 m; pow. Olkusz: Ojców, Dol. Saspowska 350 m.

Gatunek rzadki.

128. *Peltigera polydactyla* (Neck.) Hoffm.

Na mchach, w szczelinach skał wapiennych.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Dol. Kluczwody 340 m; pow. Olkusz: Ojców około 340—410 m.

Gatunek rzadki. Podany był przez F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881). Okazy moje posiadają łatki podnoszące się na brzegach, pofałdowane, mniejsze niż u typu; należą one zapewne do formy, f. *collina* Nyl.

129. *Peltigera praetextata* (Flk.) Vain.

Na mchach porastających pionowe, $\pm$ ocienione skały wapienne.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Dol. Brzostkwinia 280 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Dol. Racławki 360 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 390 m, Dol. Bętkowska 360 m, Ojców około 340—400 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: Ryczówek 370 m, Krzywopłoty 420 m; pow. Zawiercie: Podlesice 360 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej.

130. *Peltigera spuria* (Ach.) DC.

Gatunek podawany z Modlnicy i Ojcowa przez H. Lojkę (1868), F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *P. pusilla* lub *P. canina* var. *crispata*; dotychczas nie potwierdzony. Możliwe, że była to *P. erumpens*.

131. *Peltigera subcanina* Gyeln. [= *P. praetextata* (Flk.) Vain. var. *subcanina* Gyeln.]

Na mchach porastających ocienione skały wapienne.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m.

Gatunek bardzo rzadki.

132. *Peltigera rufescens* (Weiss.) Humb.

Na piaszczystej lub wapiastej ziemi, często na mchach w szczelinach skał wapiennych, w miejscach suchych i widnych.

Jura Południowa. 20 stan. Pow. Kraków: Zielonki 250 m, Januszowice 290 m, Bielany 250 m, Tyniec 240 m, Czernichów 240 m, Dol. Brzostkwinia 280 m, Dol. Kobylańska 370 m, Dol. Bolechowicka 380 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 290 m, Filipowice 350 m, Czarna 370 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Szklarki 390 m,

Ojców 370 m, Pieskowa Skała 390 m, Sułoszowa 430 m, Michałówka 390 m, Pazurek 410 m, Rabsztyn 430 m, „Januszkowa Góra” koło Olkusza 415 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Podzamcze 480 m.

Gatunek częsty. Podany przez A. Rehmana (1879).

f. *incusa* (Flot.) Körb.

Rośnie wśród mchów i traw w obszarach wapiennych w miejscach nasłonecznionych.

Jura Południowa. 40 stan.

Jura Północna. 23 stan.

Forma znacznie częstsza od typowej. Posiada łatki mniejsze niż u typu, o brzegach podnoszących się i $\pm$ falisto powyginanych. Górna powierzchnia łatek jest gęsto, szaro filcowana.

133. *Peltigera venosa* (L.) Hoffm.

Gatunek podawany z Ojcowa przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako rzadki; dotychczas nie potwierdzony.

LECIDEACEAE

Lecidea Ach., em. Th. Fr.

Sekcja 1. *Lecidea* (T)

134. *Lecidea* cfr. *cinnamomea* Hellb., Ofvers. K. V. A. Handl., 5, 1867, p. 272; Degelius, Acta Hort. Gothoburg., 20, 2, 1956, p. 49. [= *L. vulgata* f. *cinnamomea* (Hellb.) H. Magn., Acta Horti Gothoburg., 16, 1946, p. 133.]

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle na płaszczyznach poziomych w zespole *Candelanella medians-Physcia nigricans*.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Dol. Kluczwoły 290 m; pow. Olkusz: Bębło 430 m, Ojców 350 m, Wielmoża 380 m, Pieskowa Skała 390 m.

Jura Północna. 15 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 390 m, wzgórze „Straszykowa” 490 m, Smoleń 480 m; Pow. Zawiercie: Podzamcze 500 m, Piaseczno 370 m, Podlesice 390 m, Kroczyce 330 m, Rzędkowice 410 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Czarny Kamień 380 m, Niegowa 380 m, Mzurów 370 m, Gorzków 330 m; pow. Częstochowa: Przemyłowice 330 m, Olsztyn 350 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i częsty na Jurze Północnej. Należy do grupy *Lecidea goniophila*. Posiada plechę szarawobrunatną lub brunatną, ziarnistą lub splekaną. Apotecja szer. około 0,4–0,8 mm. Thecjum jasne. Hypotecjum jasne. Ekscipulum na zewnątrz zielononiebieskie, K zwykle + czerwone lub czerwone. Zarodniki 12–15 (17) $\times$ 7–9 μ .

135. *Lecidea crustulata* (Ach.) Spreng.

Na kamieniach krzemiennych piaskowcowych, na zlepieńcach, rzadziej na kamykach wapiennych.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Chrzanów: Zalas 320 m, Podzamcze koło Tenczyn-

ka 320 m, Filipowice 340 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 380 m, Ojców 360 m, Chełm koło, Wolbromia 400 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Zawiercie: Kajetanów koło Kroczyca 360 m; pow. Myszków: Mirów 360 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 340 m.

Gatunek rozproszony. Podany był przez F. Błońskiego (1890). Zbierałem również formy: f. *concentrica* Flk. i f. *subconcentrica* Stein apud Cohn.

136. *Lecidea euphorea* (Flk.) Nyl.

Na korze drzew liściastych, np. na wierzbach, topolach, lipach itp.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Bielany 230 m, Piekary 230 m, Dol. Brzostkiewicza 270 m, Brzezina koło Zabierzowa 240 m, Dol. Kluczwody 270 m, Prądnik Korzkiewski 300 m; pow. Chrzanów: Dol. Racławki 370 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 380 m, Jerzmanowice 390 m, Dol. Bętkowska 320 m, Ojców 330 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 370 m, Krzywopłoty 350 m, pow. Częstochowa: Olsztyn 300 m.

Gatunek prawdopodobnie częstszy niżby to wynikało z liczby stanowisk. Podany był przez F. Błońskiego (1890) jako *Lecidella sabuletorum* var. *enteroleuca* f. *euphorea*.

137. *Lecidea fuscoatra* (L.) Ach.

Na krzemieniach przy drodze polnej.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Kajetanów koło Kroczyca 360 m.

138. *Lecidea grisella* Flk. f. *mosigii* (Ach.) A. Zahlbr.

Gatunek podany ze Złotego Potoku przez F. Błońskiego (1890), ze skał krzemianowych jako *L. fumosa-subcontigua*; dotychczas nie potwierdzony.

139. *Lecidea jurana* Schaer.

Na pionowych, zwykle ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 22 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Tyniec 230 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Mników 280 m, Dol. Sanki 270 m, Dol. Brzostkiewicza 290 m, Rybna 280 m, Przeginia Duchowna 280 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m, Dol. Kluczwody 280 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Chrzanów: Brodla 270 m, Dubie 290 m, Dol. Racławki 370 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 380 m, Dol. Bętkowska 340 m, Wierzchowice 380 m, Bębło 430 m, Ojców 360 m, Pazurek 410 m, Rabsztyn 420 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: Smoleń 480 m, wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 330 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej. Był podany przez A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1884) i F. Błońskiego (1890).

140. *Lecidea micacea* Krb.

Na krzemieniach zatopionych w skale wapiennej.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m.

Gatunek bardzo rzadki.

141. *Lecidea macrocarpa* (DC.) Steud.

Na krzemieniach zatopionych w skale wapiennej.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców około 390 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej bardzo rzadki.

142. *Lecidea olivacea* (Hoffm.) Mass.

Na korze drzew liściastych, zwykle na starych bukach lub grabach.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Chrzanów: Dol. Raclawki 360 m; pow. Olkusz: Ojców 360 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m.

Gatunek obecnie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej dość rzadki. Podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Lecidella sabuletorum* var. *olivacea*.

143. *Lecidea stigmataea* Ach.

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, zarówno w miejscach nasłonecznionych, jak i $\pm$ ocienionych. Najczęściej w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Dol. Sanki 270 m, Dol. Kluczowy 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Chrzanów: Kamyk 320 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Ojców 360 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 420 m; pow. Zawiercie: Karlin 390 m, Podlesice 360 m, Kajetanów 380 m; pow. Częstochowa: Przemyłowice 320 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i rzadki na Jurze Północnej. Należy do grupy *Lecidea goniophila*. Charakterystyczny po bardzo cienkiej lub zupełnie zanikającej, białawej plesze.

144. *Lecidea vulgata* A. Zahlbr., em. H. Magn.

Gatunek podany przez F. Błońskiego (1890) z Częstochowy jako *Lecidella sabuletorum* var. *enteroleuca*; dotychczas nie potwierdzony.

Sekcja 2. *Biatora* (Fr.) Th. Fr.

145. *Lecidea atrofusca* (Flot.) Mudd.

Na mchach i szczątkach roślinnych w szczelinach skał wapiennych, zwykle w silnie nasłonecznionych miejscach.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzoskwinki 280 m; pow. Olkusz: Jerzmanowice 455 m.

Gatunek bardzo rzadki.

146. *Lecidea coarctata* (Sm.) Nyl., Act. Soc. Linn Bordeaux, 21, 1856, p. 358. [= *Lecanora coarctata* (Sm.) Ach., Lichen. Univers., 1810, p. 352; A. Zahlbr., Catal. Lich. Univ., 5, 1928, p. 419.]

Na kamieniach krzemiennych lub na piaskowcach.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Kraków 220 m; pow. Olkusz: Ojców 380 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Kajetanów koło Kroczy 360 m.

Gatunek w badanym obszarze rzadki. Był podany przez A. Rehmana (1879) jako *Zeora coarctata*.

147. *Lecidea cyclospora* Müll. Arg.?

Gatunek podany z Ojcowa (z wapieni) przez A. Rehmana (1879) jako *Biatora rupestris* var. *cyclospora* Kremp. Na podstawie dostępnej mi literatury nie potrafiłem się upewnić, czy nazwa ta jest rzeczywiście synonimem *Lecidea cyclospora*.

148. *Lecidea flexuosa* (Fr.) Nyl.

Na korze drzew, np. sosen u podstawy, na gałązkach jałowców, najczęściej jednak na murszejącym drewnie.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Dol. Kluczwoły 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Ojców 360 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Zawiercie: Kroczyce 320 m.

Gatunek częstszy, lecz przeoczany ze względu na występowanie przeważnie w stanie płonnym.

149. *Lecidea granulosa* (Ehrh.) Ach.

Na szczątkach roślinnych lub nagim piasku w widnych, młodych łaskach sosnowych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Czernichów około 230 m.

Gatunek rzadki.

150. *Lecidea humosa* (Ehrh.) Röhl.

Na szczątkach roślinnych i obumierających mchach w szczelinach nasłonecznionych skał wapiennych.

Jura Południowa 1 stan. Pow. Kraków: Dol. Sanki około 340 m.

Gatunek prawdopodobnie nierzadki lecz przeoczany ze względu na występowanie zwykle w stanie płonnym.

151. *Lecidea immersa* (Web.) Ach. [= *Protoblastenia immersa* (Web.) Stnr.]

Na pionowych, ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego, w zespole *Polyblastia papularis*-*Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Dol. Kluczwoły 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 390 m, Dol. Bętkowska 360 m, Ojców 360 m; pow. Chrzanów: Dubie 300 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Był podany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Lecidella immersa* lub *Lecidella immersa - calcivora*.

152. *Lecidea monticola* (Ach.) Schaer. [= *Protoblastenia monticola* (Ach.) Stnr.]

Na pionowych, ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego, zwykle w zespole *Polyblastia papularis*-*Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Przeginia Duchowna 280 m, Rybna 300 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Chrzanów: Kamyk 320 m; pow. Olkusz: Ojców, Brama Krakowska 360 m.

Gatunek rozproszony, możliwe że przeoczany. Plecha bardzo cienka lub zupełnie zanikająca, endolityczna, biaława. Apotecja szerokości około 0,3—0,6 mm. Krążek płaski lub wypukły, czerwono-brunatny do brunatno-czarnego. Thecjum jasne, wys, około 70—75 μ , J + niebieskie, po chwili brudnoczerwone. Hypotecjum i ekscipulum brunatne lub czarno-brunatne. Zarodniki 8—11 $\times$ 4—7 μ .

153. *Lecidea uliginosa* (Fr.) Nyl.

Na piaszczystej ziemi lub na nagich piaskach, po wrzosowiskach i młodych laskach sosnowych.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Czernichów 230 m; pow. Chrzanów: Tataruchy koło Tenczynka 320 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 370 m; pow. Zawiercie: Ryków 430 m, Kroczyce 320 m.

Gatunek częstszy niżby wynikało z ilości stanowisk. Często występuje w stanie płonnym.

154. *Lecidea vernalis* (L.) Ach.

Gatunek podawany z Podskalania koło Modlnicy (z nagiej ziemi) przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Biatora vernalis* lub *Biatora conglomerata*; dotychczas nie potwierdzony.

Sekcja 3 *Psora* (Hall) Th. Fr.

155. *Lecidea deceptor* Nyl.

Na zwietrzelinie, w szczelinach i spękaniach silnie nasłonecznionych skał wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Dol. Kobyłańska (masowo) 390 m, Dol. Bolechowicka 380 m; pow. Chrzanów: Czarna 380 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m, Ojców 390 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Zawiercie: „Góra Berkowa” koło Kajetanowa około 450 m; pow. Myszków: Lutowiec 395 m; pow. Częstochowa: Przysięłowice (masowo) około 330 m.

Gatunek rzadki na terenie obu okręgów. Okazy moje oznaczył Z. Tobolewski (Poznań). Według opinii Dra J. Poelta (München) miałyby one należeć do innego gatunku, *L. albilabra* Duf, a właściwie *Toninia albilabra*. *Lecidea albilabra* posiada zarodniki dość często 3- lub 4-komórkowe, 16—23 $\times$ 3—4 μ , gdy tymczasem u moich okazów są one zawsze 1-komórkowe i mniejsze: 9—14 $\times$ 5—8 μ .

156. *Lecidea decipiens* (Ehrh.) Ach.

Na ziemi pomiędzy poduszkami mchów wśród skał wapiennych razem z *Dermatocarpon hepaticum*.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzoskwinia 280 m, Ojców około 340—410 m, Dol. Sanki 270 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn około 340 m.

Gatunek bardzo rzadki na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Był podawany przez F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890) jako *Psora decipiens*. Od *L. deceptoria* różni się między innymi cielistą lub ceglastą barwą plechy.

157. *Lecidea lurida* (With.) Ach.

Na humusie w szczelinach skał wapiennych lub na warstwie zwietrzeliny, zwykle na silnie nasłonecznionych, pionowych skałach.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Rybna 300 m; pow. Olkusz: Sułoszowa 430 m, Rabsztyn (leg. B. Gumińska) około 420 m.

Gatunek rzadki zwykle występuje w stanie płonnym.

158. *Lecidea scalaris* Ach. [= *L. ostreata* (Hoffm.) Schaer.]

Na korze drzew (zazwyczaj szpilkowych), po płotach lub murszejących drewnianych przedmiotach.

Jura Południowa. 29 stan.

Jura Północna. 18 stan.

Jeden z najpospolitszych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nadrzewnych gatunków porostów. Występuje tu tylko w stanie płonnym.

159. *Lecidea testacea* (Hoffm.) Ach.

Na zwietrzelinie lub na silnie pokruszonych, nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego; najczęściej wzdłuż szczelin.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzoskwinki 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobyłańska 380 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m, Ojców Dol. Prądnika 380 m, Pieskowa Skała 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: „Berkowa Góra” koło Kajetanowa 450 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Był podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Psora testacea*.

Catillaria (Mass.) Th. Fr.

160. *Catillaria denigrata* (Fr.) Vain. [= *C. synothea* (Ach.) Beltram]

Na murszejących belkach (np. na płotach, poręczach mostów).

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców 350 m.

161. *Catillaria lenticularis* (Ach.) Th. Fr.

Na pionowych, ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego w zespole *Verrucaria valana-Caloplaca xantholyta* lub w zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Rybna 290 m, Tyniec 230 m; pow. Chrzanów: Kamyk 320 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 390 m, Ojców Brama Krakowska 370 m.

Gatunek rozproszony. Podany był przez K. Filipowicza (1881) jako *Biatorina lenticularis*. Posiada bardzo zmienną plechę, cienką lub zgrubiałą, białawą lub szarą do prawie czarnej.

162. *Bacidia acclinis* (Körb.) A. Zahlbr.

Gatunek podawany z Modlnicy (z kory wierzb) przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Arthrosporium accline*; dotychczas nie potwierdzony.

163. *Bacidia arnoldina* (Müll. Arg.) Körb.

Na pionowych, ocienionych, lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego, zwykle w szczelinach i $\pm$ wilgotnych miejscach.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Podskalany koło Modlnicy 300 m; pow. Chrzanów: Kamyk koło Nielepic 320 m.

Gatunek bardzo rzadki. Był podany przez H. Lojkę (1868).

164. *Bacidia chlorococca* (Graewe) Lettau.

Na korze drzew szpilkowych, zwykle na sosnach. Rzadziej na korze drzew liściastych, np. na młodych dębach.

Jura Południowa. 29 stan. Pow. Kraków: Bielany 230 m, Kryspinów 230 m, Tyniec 250 m, Ściejowice 220 m, Czernichów 240 m, Przegonia Duchowna 260 m, Rybna 270 m, Mników 260 m, Dol. Sanki 260 m, Dol. Brzoskwinki 290 m, Dol. Kluczwoły 280 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobyłańska 370 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 270 m, Brodła 260 m, Frywałd 300 m, Tenczynek 290 m, Filipowice 300 m, Czerna 400 m, Dol. Raclawki 380 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 390 m, Dol. Bętkowska 360 m, Wierchowice 390 m, Ojców 370 m, Pieskowa Skała 390 m, Michałówka 390 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Jura Północna. 18 stan. Pow. Olkusz: Wolbrom 380 m, Krzywopłoty 400 m, Smoleń 430 m, Złożeniec 450 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m, Podzamcze 460 m, Karlin 380 m, Piaseczno 340 m, Podlesice 330 m, Jezioriki koło Kroczyca 310 m, Kroczyce 320 m, Morsko 340 m; pow. Myszków: Czarny Kamień 370 m, Lutowiec 360 m, Niegowa 360 m, Gorzków 320 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Olsztyn 300 m.

Gatunek pospolity na terenach obu okręgów. Niekiedy rośnie jako jedyny porost na korze sosen; szczególnie w młodych, sadzonych przez człowieka drzewostanach.

165. *Bacidia coprodes* (Körb.) Lettau var. *seposita* (Th. Fr.) A. Zahlbr.

Gatunek podany z Ojcowa (ze skał wapiennych) przez K. Filipowicza (1881) jako *Bilimbia coprodes* var. *seposita*; dotychczas nie potwierdzony.

166. *Bacidia fusca* (Mass.) DR. [= *B. obscurata* (Smrft.) Th. Fr.]

Na obumierających mchach pokrywających głązy i skałki wapienne, zaw sze w miejscach cienistych, np. po zaroślach i lasach.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Czernichów 250 m; pow. Chrzanów: Dol. Raclawki 350 m; pow. Olkusz: Ojców 370 m.

Gatunek rzadki. Możliwe, że przeoczany. Od *B. sabuletorum* różni się między innymi 4-komórkowymi zarodnikami.

167. *Bacidia incompta* (Borr.) Anzi.

Na korze starych topoli.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców 340 m.

Gatunek bardzo rzadki. Plecha szarozielonkawa, $\pm$ ziarnista (u moich

okazów rozwinięta tylko wokół apotecjów). Apotecja szerokości około 0,3—0,5 mm. Krążek fioletowoczarny. Thecjum wys. około 50 μ , jasne lub brunatnoczerwone. Hypotecjum brunatno-fioletowo-czerwone. Ekscipulum podobnej barwy. Zarodniki igielkowate, 4-komórkowe, $15-29 \times 1,5-3 \mu$.

168. *Bacidia inundata* (Fr.) Kőrösi.

Gatunek podany przez W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) z Podskalania koło Modlnicy jako *B. arnoldiana* var. *inundata*; dotychczas nie potwierdzony.

169. *Bacidia lignaria* (Ach.) Lettau.

Na mchach lub szczątkach roślinnych w szczelinach skał wapiennych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzoskwinki 280 m.

Gatunek bardzo rzadki.

170. *Bacidia luteola* (Schröd.) Mudd.

Na korze wierzb lub topoli.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Modlnica 300 m; pow. Olkusz: Ojców 340 m.

Gatunek rzadki. Był podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Bacidia rubella*.

171. *Bacidia muscorum* (Sw.) Mudd.

Na mchach, szczątkach roślinnych lub na nagiej ziemi w szczelinach skał wapiennych.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Bielany 250 m, Skały Twardowskiego koło Krakowa 230 m, Tyniec 230 m, Dol. Kobylańska 380 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Chrzanów: Tenczynek 300 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Pazurek 420 m.

Jura Północna. 7 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 420 m; pow. Zawiercie: Podzamcze 490 m, Rzędkowice 410 m, Kroczyce 330 m, Zdów 350 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Niegowa 380 m.

Gatunek rozproszony.

172. *Bacidia rosella* (Pers.) D. Not.

Na korze starych buków.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Olkusz: Ojców około 340—400 m, Pazurek 400 m.

Gatunek rzadki. Był podany przez F. Berdaua (1876) i A. Rehmana (1879).

173. *Bacidia sabuletorum* (Flk.) Lettau.

Na mchach porastających skały wapienne, zwykle w szczelinach, zarówno w miejscach nasłonecznionych jak i ocienionych; niekiedy rośnie wprost na podłożu skalnym.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Mników 260 m, Skały Twardowskiego koło Krakowa 230 m, Tyniec 240 m; pow. Chrzanów: Dol. Racławki 360 m; pow. Olkusz: Łazy-Jawór 480 m, Ojców 370 m, Pazurek 410 m, „Januszkowa Góra” koło Olkusza 430 m.

Jura Północna. 12 stan. Pow. Olkusz: Domaniewice 320 m, Krzywopłoty 400 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m, Srubarnia 460 m, Złożeniec 450 m, Podzamcze 480 m, Karlin 400 m, Podlesice 380 m, Zdów 350 m; pow. Myszków: Czarny Kamień 380 m, Mzurów 350 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m.

Gatunek rozproszony. Okazy moje są identyczne z eksykatem Rabenhorsta nr 534. Posiadają zarodniki 4—8-komórkowe, $17-45 \times 4-8,5 \mu$.

174. *Bacidia sphaeroides* (Dicks.) A. Zahlbr. f. *subsphaeroides* (Nyl) A. Zahlbr. [= *B. sabuletorum* f. *sabsphaeroides* (Nyl.) Erichs.]

Na mchach w szczelinach skał wapiennych.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn 340 m.

Gatunek bardzo rzadki. Apotecja cieliste, wypukłe. Thecjum jasne, wys. około 85—100 μ . Hypotecjum i ekscipulum jasne. Zarodniki 4—6 (8)-komórkowe, $22-32 \times 4-6 \mu$.

175. *Bacidia umbrina* (Ach.) Bausch.

Na piaskowcach, betonowych słupkach, starych kapliczkach, nagrobkach itp.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Piekary 220 m, Dol. Kobyłańska 350 m; pow. Chrzanów: Filipowice 300 m; pow. Olkusz: Raclawice koło Krzeszowic 410 m.

Gatunek rzadki na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zarodniki igielkowate, silnie powyginane lub spiralnie skręcone, 4—8-komórkowe, $20-30 \times 2-3 \mu$.

Toninia Mass., em. Th. Fr.

176. *Toninia aromatica* (Sm.) Mass.

Na pionowych, zwykle nieco ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego, niekiedy również na poziomych płaszczyznach w szczytowych partiach cypli skalnych.

Jura Południowa. 9 stan. Pow. Kraków: Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Mników 280 m, Dol. Brzostkinki 290 m, Dol. Kluczwody 300 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobyłańska 400 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 380 m, Ojców 390 m, Pieskowa Skała 410 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 460 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej.

177. *Toninia candida* (Web.) Th. Fr.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapiennych albo wprost na skale, albo na cienkiej warstwie zwietrzliny, humusu lub na mchach, zwykle razem z *Dermatocarpon lachneum*.

Jura Południowa. 20 stan. Pow. Kraków: Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Bielany 260 m, Tyniec 240 m, Mników 270 m, Dol. Sanki 280 m, Przeginia Duchowna 290 m, Dol. Brzostkinki 290 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m, Dol. Kluczwody 330 m; pow. Chrzanów: Kamyk 320 m, Nielepice 340 m, Czerna 370 m, Dol. Raclawki 360 m; pow. Olkusz: Wierzchowice 390 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Bętkowska 380 m, Dol. Szklarki 390 m, Ojców 370 m, Michałówka 380 m, Rabsztyn 430 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Zawiercie: Karlin 400 m; pow. Częstochowa: Przy-
miłowice 330 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek dość częsty na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872),

F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890) jako *Thalloidima candidum*.

178. *Toninia coeruleonigricans* (Lightf.) Th. Fr.

W szczelinach skał wapiennych, na humusie, zwietrzelinie, wśród poduszek mchów, zwykle w miejscach silnie nasłonecznionych.

Jura Południowa. 35 stan. Pow. Kraków: Zielonki 250 m, Januszowice 290 m, Skały Twardowskiego koło Krakowa 220 m, Bielany 250 m, Kryspinów 240 m, Tyniec 240 m, Piekary 240 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Mników 280 m, Przegonia Duchowna 280 m, Rybna 290 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m, Dol. Kluczwoły 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Brodla 270 m, Obora koło Zalasza 340 m, Tenczynek 300 m, Filipowice 400 m, Ojców 400 m, Dol. Raławki 370 m, Dubie 300 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 390 m, Raławice 400 m, Dol. Bętkowska 380 m, Zerków 380 m, Bębło 430 m, Wierchowice 400 m, Ojców 400 m, Pieskowa Skała 390 m, Wielmoża 390 m, Sułoszowa 420 m, Michałówka 390 m, Pazurek 410 m, Rabsztyn 430 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Zawiercie: Karlin 380 m; pow. Częstochowa: Przy-
miłowice 330 m, Olsztyn 340 m; pow. Myszków: Mirów 370 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej, dość rzadki na Jurze Północnej. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) jako *Thalloidima vesiculare*. Jest gatunkiem bardzo zmiennym. Okazy nasze wyraźnie odbiegają od pienińskich czy tatrzańskich.

179. *Toninia lobulata* (Sommerf.) DR. [= *T. syncomista* (Flk.) Th. Fr.]
Na poduszkach mchów lub na szczątkach roślinnych, w szczelinach skał wapiennych, zwykle w miejscach eksponowanych na północ.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Kryspinów 240 m, Brzostkwinia około 300 m, Dol. Sanki 290 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Olkusz: Ojców 370 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Zawiercie: Srubarnia 460 m; pow. Myszków: Lutowiec 380 m; pow. Częstochowa: Przy-
miłowice 320 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek rzadki na terenie obu okręgów. Był podany przez K. Filipowicza (1881) jako *T. syncomista* (w błędnej pisowni *T. „symmicta”*).

180. *Toninia toniniana* Mass.

W szczelinach skał wapienia jurajskiego, zwykle w pojedynczych okazach, na silnie nasłonecznionych stanowiskach.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m.

Gatunek bardzo rzadki. W Polsce znany tylko z Pienin.

Rhizocarpon Ram., em. Th. Fr.

181. *Rhizocarpon ambiguum* (Schaer.) A. Zahlbr. [= *Rh. distinctum* Th. Fr.]

Na krzemiennych głazach rozrzuconych wśród piasków lub skał wapiennych.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Zawiercie: Piaseczno 360 m, Zdów 320 m; pow. Myszków: Mirów 360 m, Lutowiec 360 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki. Strzępki jego plechy barwią się z jodem na niebiesko.

182. *Rhizocarpon excentricum* (Ach.) Arn.

Na krzemiennych kamieniach lub porfirowym lepiszczu zlepieńców myślachowickich.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Gacki koło Zabierzowa 300 m; pow. Chrzanów: Filipowice 360 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki.

183. *Rhizocarpon umbilicatum* (Ram.) Jatta [= *Rh. calcareum* Th. Fr.]

Gatunek podany z Mnikowa, Dubia, Ojcowa (ze skał wapiennych) jako *Siegertia calcarea*. Dotychczas, mimo usilnych poszukiwań, nie potwierdzony. Możliwe, że był to któryś z gatunków rodzaju *Buellia*, sekcji *Diplotomma*.

CLADONIACEAE

Baeomyces Pers.

184. *Baeomyces roseus* Pers.

Na piaskach, nagiej ziemi lessowej, wśród wrzosów lub po młodych laskach sosnowych; po szkarpach dróg polnych; wszędzie w miejscach nasłonecznionych.

Jura Południowa. 25 stan. Pow. Kraków: Bielany 230 m, Tyniec 220 m, Mników 260 m, Brzostkwinia 270 m, Czernichów 230 m, Przeginia Duchowna 260 m, Rybna 270 m, Zabierzów 280 m, Dol. Klucz wody 280 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 360 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 270 m, Brodla 260 m, Sanka 370 m, Zalas 300 m, Rudno 320 m, Tenczynek 250 m, Dubie 310 m, Rudawa 270 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 330 m, Jerzmanowice 390 m, Szklary 380 m, Łazy Jawór 450 m, Zelków 380 m, Ojców 360 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Zawiercie: Podlesice 350 m; pow. Myszków: Gorzków 340 m.

Gatunek pospolity (również na Jurze Północnej częstszy niżby wynikało z ilości zanotowanych stanowisk). Był podany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881).

var. *complicatus* (Erichs.) Frey.

Na lessowej ziemi między wrzosami (*Calluna vulgaris*).

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Chrzanów: Dubie koło Krzeszowic około 300 m.

Odmiana bardzo rzadka. Posiada większe, nabrzmiałe i silnie pofałdowane lub złożone apotecja. Trzoneczki pokryte zielonawoszarawą warstwą korową. Plecha zielonawoszara.

185. *Baeomyces rufus* (Huds.) Rebert.

Na lessowej lub wapnistej ziemi; na szkarpach dróg lub na zboczach dolin, zwykle w miejscach eksponowanych na północ lub nieco cienistych. Niekiedy rośnie także na omszonych kamieniach we formie f. *rupestris* (Pers.) Harm.

Jura Południowa. 16 stan. Pow. Kraków: Zabierzów 280 m, Mników 260 m, Dol.

Brzoskwinki 275 m, Przeginia Duchowna 280 m, Rybna 270 m, Dol. Kluczwody 280 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobyłańska 360 m; pow. Chrzanów: Brodła 260 m, Dol. Czernki 370 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 290 m, Łazy Jawór 450 m, Dol. Bętkowska 370 m, Zerków 380 m, Ojców 380 m, Michałówka 400 m, Chełm koło Wolbromia 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Zdów 330 m.

Gatunek dość częsty. Był podany przez K. Filipowicza (1881) jako *Sphyridium byssoides*.

Cladonia (Hill.) Web.

Podrodzaj 1. *Pycnothelia* (Ach.) Vain.

186. *Cladonia papillaria* (Erhh.) Hoffm. [= *Pycnothelia papillaria* (Ehrh.) Duf.]

Na piaszczystej ziemi, zwykle między wrzosami (*Calluna vulgaris*).

Jura Północna. 3 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 430 m, Zdów 320 m; pow. Częstochowa: Olsztyn około 300—350 m.

Gatunek rzadki. Był podany przez F. Błońskiego (1890).

Podrodzaj 2. *Cenomyce* (Ach.) Th. Fr.

Sekeja 1. *Cocciferae* Del.

187. *Cladonia bacillaris* Nyl.

Na piaszczystej ziemi w widnych lasach sosnowych.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Bielany 240 m, Tyniec 230 m, Czernichów 240 m, Dol. Sanki 260 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 260 m, Tataruchy 300 m; pow. Olkusz: Rabsztyn 400 m, Wolbrom 400 m.

Jura Północna. 6 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 430 m, Karlin 390 m; pow. Myszków: Lutowiec 370 m, Niegowa 380 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 300 m, Biskupiec 330 m.

Gatunek rozproszony.

[*Cladonia bellidiflora* (Ach.) Schaer.

Gatunek podany błędnie przez W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) z Tenczynka. Najprawdopodobniej źle oznaczyli oni łuskowatą formę któregoś z pokrewnych gatunków. Mogłaby to być np. *Cl. macilenta* var. *squamigera* lub *Cl. floerkeana* f. *squamosissima*, czego jednak nie da się obecnie sprawdzić bez obejrzenia okazów. Prawdziwa *Cl. bellidiflora* jest gatunkiem wysokogórskim.]

188. *Cladonia coccifera* (L.) Schaer.

Na piaszczystej ziemi w widnym lasku sosnowym pomiędzy wrzosami (*Calluna vulgaris*).

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Chrzanów: Zwierzyniec koło Krzenowic.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Kajetanów koło Kroczyca 360 m.

Gatunek podany przez W. Jabłońskiego (1872) jako *Cl. cornucopioides*.

189. *Cladonia deformis* Hoffm.

Na piaszczystej ziemi w widnych i przewiewnych laskach sosnowych.

Jura Południowa. 12 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Czernichów 240 m, Prze-

ginia Duchowna 260 m; pow. Chrzanów: Tataruchy koło Tenczynka 300 m, Podłęże koło Okleśnej 270 m; pow. Olkusz: „Diabla Góra” koło Bukowna 370 m, Skalskie koło Olkusza 400 m, Rabsztyn 410 m, Gołaczewy 400 m, Klusze 320 m, Trzyciąż 390 m, Wolbrom 400 m.

Jura Północna. 7 stan. Pow. Zawiercie: Srubarnia 400 m, Ryczów 430 m, Karlin 390 m, Piaseczno 340 m, Podlesice 400 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 320 m, Biskupice 300 m.

Gatunek dość częsty.

190. *Cladonia digitata* Schaer.

Na ziemi, zwykle przy korzeniach drzew szpilkowych.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Olkusz: Ojców 380 m, Rabsztyn 410 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn 320 m.

191. *Cladonia incrassata* Flk.

Gatunek podany z Ojcowa przez K. Filipowicza (1881); dotychczas nie potwierdzony.

192. *Cladonia macilenta* (Hoffm.) Nyl.

Gatunek podany z Ojcowa przez K. Filipowicza (1881); dotychczas nie potwierdzony.

Sekcja 2. *Ochrophaeae* Vain.

193. *Cladonia alcicornis* (Lightf.) Fr. [= *Cl. foliacea* var. *alcicornis* (Lightf.) Schaer.]

Na piaszczystej ziemi w widnych lasach sosnowych lub na piaskach pomiędzy skałami wapiennymi.

Jura Południowa. 13 stan. Pow. Kraków: Bielany 230 m, Kryspinów 250 m, Czernichów 230 m, Tyniec 220 m, Ściejowice 220 m, Przeginia Duchowna 260 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 270 m, Kamyk 310 m, Sanka 370 m, Obora koło Zalasza 300 m; pow. Olkusz: Skalskie koło Olkusza 400 m, Chełm koło Wolbromia 400 m.

Jura Północna. 20 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 360 m; pow. Zawiercie: Srubarnia 400 m, Ryczów 430 m, Podzamecze 470 m, Karlin 390 m, Piaseczno 340 m, Podlesice 340 m, Morsko 340 m, Kroczyce 320 m, Jezioraki koło Krocyc 320 m, Rzędkowice 410 m, Zdów 330 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Czarny Kamień 370 m, Lutowiec 360 m, Gorzków 320 m, Ludwinów 370 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Przyłłowice 330 m, Olsztyn 300 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej, częsty na Jurze Północnej. Był podawany przez A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890).

194. *Cladonia botrytes* (Hag.) Willd.

Gatunek podany z Ojcowa przez K. Filipowicza (1881). Zbierałem go w okolicy Biskupiego Boru (pow. Chrzanów) na pniaku ściętej sosny, niestety okaz ten zaginął.

195. *Cladonia cariosa* (Ach.) Spreng.

Na piaszczystej ziemi w widnym lasku sosnowym.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Rabsztyn 400 m.

196. *Cladonia chlorophaea* (Flk.) Spreng.

Na ziemi lub na murszejących pniakach, zwykle w lasach liściastych, np. dębowych, grabowych itp.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Czernichów około 250 m; pow. Chrzanów: Tataruchy koło Tenczynka około 300 m; pow. Olkusz: Ojców 370 m, Pazurek 400 m, Wolbrom 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok około 340 m.

Gatunek pospolity (szczególnie na Jurze Północnej częstszy niżby wynikało z liczby podanych stanowisk). Był wymieniony przez A. Rehmana (1879) jako *Cl. fimbriata* var. *chlorophaea*.

197. *Cladonia cornuta* (L.) Schaer.

Na piaszczystej ziemi w widnych laskach sosnowych.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Czernichów 230 m; pow. Chrzanów: Tataruchy 300 m, Podłęże koło Okleśnej 260 m; pow. Olkusz: Gołaczewy 400 m, Wolbrom 400 m, Trzyciąż 390 m.

Jura Północna. 6 stan. Pow. Zawiercie: Srubarnia 400 m, Karlin 390 m, Piaseczno 350 m, Morsko 340 m, Kotowice 360 m.

198. *Cladonia cornutoradiata* (Coem.) Sandst.

Na piaszczystej ziemi w widnych laskach sosnowych, często też w murawach wśród skał wapiennych.

Jura Południowa. 15 stan. Pow. Kraków: Tyniec 250 m, Bielany 270 m, Mników 270 m, Przeginia Duchowna 280 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kluczwoły 290 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Tataruchy koło Tenczynka 300 m, Dol. Bętkowska 360 m; pow. Olkusz: Ojców 370 m, Michałówka 380 m, Gołaczewy 400 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Myszków: Mzurów 350 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m.

199. *Cladonia crispata* (Ach.) Flot.

Gatunek podany z Olsztyna koło Częstochowy przez F. Błońskiego (1890) jako *Cl. furcata-crispata*; dotychczas nie potwierdzony.

200. *Cladonia degenerans* (Flk.) Spreng.

Na piaszczystej ziemi w widnych lasach sosnowych.

Jura Południowa. 13 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Czernichów 240 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Sanka 370 m, Tataruchy 300 m; pow. Olkusz: Trzyciąż 390 m, Wolbrom 400 m, Gołaczewy 400 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m, Klucze 320 m, Ojców 390 m.

Jura Północna. 18 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 350 m, Srubarnia 400 m, Złożeniec 430 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m, Karlin 390 m, Piaseczno 340 m, Podlesice 340 m, Jeziorki koło Kroczyc 320 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 350 m, Lutowiec 360 m, Czarny Kamień 370 m, Niegowa 370 m, Gorzków 350 m, Ludwinów 340 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m, Olsztyn 330 m.

201. *Cladonia delicata* (Ehrh.) Flk.

Gatunek podany z Ojcowa przez A. Rehmana (1879) jako *Cl. squamosa* var. *delicata*; dotychczas nie potwierdzony.

202. *Cladonia fimbriata* (L.) Ach.

Na murszejących pniakach lub na lessowej ziemi na zboczach dolin.

Jura Południowa. 10 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Bielany 280 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m, Dol. Kluczwody 280 m, Dol. Kobylańska 360 m; pow. Chrzanów: Tataruchy 300 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Dol. Szklarki 380 m, Ojców 360 m, Michałówka 380 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 400 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 330 m, Blachownia około 260 m.

Gatunek różproszony. Był podawany przez H. Lojkę (1868), A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890).

203. *Cladonia furcata* (Huds.) Schrad.

Na piaszczystej, wapnistej lub lessowej ziemi; na słonecznych zboczach dolin i ostańców oraz po młodych lasach sosnowych; przeważnie występuje w odmianie var. *racemosa* (Hoffm.) Flk., częsty też w odmianie var. *palmacea* (Ach.) Vain.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Mników 260 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 260 m, Zabierzów 280 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m; pow. Chrzanów: Podłęże nad Wisłą koło Okleśnej 280 m, Dol. Raławki 380 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Dol. Szklarki 390 m, Ojców 380 m.

Jura Północna. 6 stan. Pow. Zawiercie: Srubarnia 400 m, Karlin 380 m, Kajetanów koło Kroczyc 360 m; pow. Myszków: Niegowa 350 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek znacznie pospolitszy niżby wynikało z ilości stanowisk. Był podawany przez F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881).

204. *Cladonia gracilis* (L.) Willd. var. *chordalis* Flk.

Na piaszczystej ziemi w widnych laskach sosnowych.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m; Czernichów 240 m; pow. Chrzanów: Tataruchy koło Tenczynka 300 m, Podłęże koło Okleśnej 250 m; pow. Olkusz: „Diabla Góra” koło Bukowna 370 m, Gołaczewy 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Gatunek podany przez W. Jabłońskiego (1872) jako *Cl. gracilis-vulgaris* i *Cl. gracilis-hybrida*.

205. *Cladonia ochrochlora* Flk.

Na murszejących pniakach lub u podstawy pni drzew, np. brzoź.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Chrzanów: Rudno koło Tenczynka 300 m; pow. Olkusz: Gołaczewy około 400 m.

206. *Cladonia pyxidata* (L.) Fr.

Na piaszczystej lub wapnistej ziemi w miejscach nasłonecznionych.

Jura Południowa. 14 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Czernichów 240 m, Przeginia Duchowna 260 m, Mników 270 m, Rybna 280 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kluczwody 300 m; pow. Chrzanów: Brodla 270 m, Nielepice 330 m, Dol. Raławki 360 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Ojców 370 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m.

Jura Północna. 6 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m; pow. Zawiercie: Karlin 390 m, Kroczyc 320 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok około 330 m, Olsztyn około 330 m, Blachownia około 250 m.

var. *pocillum* (Ach.) Flot. [= *Cladonia pocillum* (Ach.) Rich.]

Na ziemi i na mchach wśród skał wapiennych, zwykle w szczelinach i na półeczkach skalnych.

Jura Południowa. 42 stan. Pow. Kraków: Bielany 260 m, Czernichów 230 m, Podłęże koło Okleśnej 290 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Dol. Bolechowska 380 m, Zielonki 250 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Brodła 270 m, Filipowice 300 m; pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Łazy 470 m, Dol. Bętkowska 380 m, Ojców 340—410 m, Michałowka 380 m, Pazurek koło Rabsztyna 420 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 29 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 370 m, Smoleń 480 m, Dłużec 390 m, Krzywopłoty 430 m; pow. Zawiercie: Srubarnia 450 m, Podzamcze 490 m, Piaseczno 370 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Leśniów koło Zarek 340 m, Lutowiec 380 m, Ludwinów 400 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 340 m, Przemyłowice 330 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Gatunek, szczególnie jego odmiana, bardzo pospolity. Był podany przez F. Błońskiego (1890).

207. *Cladonia rangiformis* Hoffm.

Na wapnistej lub piaszczystej ziemi, pomiędzy wrzosami (*Calluna vulgaris*).

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Tyniec 250 m.

var. *pungens* (Ach.) Vain.

Odmiana wymieniona z Bielan przez A. Rehmana (1879) jako *Cl. pungens*.

208. *Cladonia squamosa* (Scop.) Hoffm.

Na piaszczystej ziemi w widnych laskach sosnowych.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Kajetanów koło Kroczyca 360 m.

Gatunek prawdopodobnie częstszy lecz przeoczany.

209. *Cladonia symphy carpia* Flk.

Na humusie lub wapnistej ziemi wśród mchów pomiędzy skałami wapienymi, zwykle w miejscach silnie nasłonecznionych razem z *Cl. pyxidata* var. *pocillum*.

Jura Południowa. 21 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Piekary 240 m, Bielany 270 m, Mników 280 m, Dol. Brzaskwinki 290 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowska 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Kamyk 320 m, Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 390 m, Dol. Bętkowska 340 m, Dol. Szklarki 390 m, Jerzmanowice 450 m, Ojców 390 m, Wielmoża 400 m, Pieskowa Skała 410 m, Sułoszowa 440 m, Michałowka 390 m, Pazurek 420 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Zawiercie: Piaseczno 350 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Gorzków 350 m; pow. Częstochowa: Przemyłowice 330 m.

Gatunek częsty. Zwykle występuje bez trzoneczków.

210. *Cladonia turgida* (Ehrh.) Hoffm.

Na piaszczystej ziemi w młodych i widnych laskach sosnowych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Wolbrom około 400 m.

Gatunek bardzo rzadki.

211. *Cladonia uncialis* (L.) Web.

Na piaszczystej ziemi w widnych, młodych laskach sosnowych.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Ściejowice 220 m, Czernichów 240 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 260 m, Tataruchy koło Tenczynka 300 m, Gołaczewy 400 m, Trzyciąż 390 m, Wolbrom 400 m; pow. Olkusz: Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Jura Północna. 11 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 350 m; pow. Zawiercie: Srubarnia 400 m, Ryczów 440 m, Piaseczno 350 m, Karlin 380 m, Podlesice 340 m, Morsko 340 m, Zdów 350 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Ludwinów 350 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 330 m.

Gatunek dość częsty.

212. *Cladonia verticillata* Hoffm.

Na piaszczystej lub lessowej ziemi w widnych lasach sosnowych, często także na zboczach dolin.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Czernichów 240 m, Brzostkwinia 280 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Michałowka 380 m, Trzyciąż 390 m, Wolbrom 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 430 m, Karlin 380 m; pow. Myszków: Czarny Kamień 370 m.

Podrodzaj 3. *Cladina* (Nyl.) Vain.

213. *Cladonia mitis* Sandst.

Na piaskach w widnych, młodych laskach sosnowych.

Jura Południowa. 12 stan. Pow. Kraków: Tyniec 250 m, Ściejowice 220 m, Czernichów 230 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 270 m, Tataruchy koło Tenczynka 300 m; pow. Olkusz: Pazurek 400 m, Rabsztyn 410 m, Skalskie koło Olkusza 400 m, Gołaczewy 400 m, Chełm koło Wolbromia 390 m, Wolbrom 400 m, Trzyciąż 390 m.

Jura Północna. 19 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 350 m, Krzywopłoty 380 m, Domaniewice 320 m, Złożeniec 430 m, Smoleń 440 m; pow. Zawiercie: Ryczów 430 m, Srubarnia 400 m, Karlin 370 m, Piaseczno 340 m, Morsko 340 m, Podlesice 360 m, Kroczyce 320 m, Zdów 350 m; pow. Myszków: Mirów 350 m, Lutowiec 360 m, Niegowa 340 m, Ludwinów 350 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m, Olsztyn 310 m.

Gatunek pospolity, częstszy od *Cl. rangiferina* i *Cl. sylvatica*.

214. *Cladonia rangiferina* (L.) Web., em. Vain.

Na piaszczystej ziemi w widnych lasach sosnowych, bardzo rzadko, np. w Ojcowie wśród skał wapiennych.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Czernichów 230 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 270 m, Tataruchy koło Tenczynka 300 m; pow. Olkusz: Ojców Dol. Saspowska 370 m, Pazurek 400 m, Gołaczewy 400 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Zawiercie: Ryczów 430 m, Podlesice 340 m; pow. Częstochowa: Olsztyn około 300 m, Częstochowa około 250 m.

Gatunek rozproszony.

215. *Cladonia sylvatica* (L.) Hoffm., em. Sandst.

Na piaszczystej ziemi w widnych i przewiewnych lasach sosnowych.

Jura Południowa. 9 stan. Pow. Kraków: Czernichów 230 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 260 m, Tataruchy koło Tenczynka 300 m; pow. Olkusz: Gołaczewy 390 m, Chełm koło Wolbromia 400 m, Trzyciąż 390 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Jura Północna. 10 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 350 m; pow. Zawiercie: Srubarnia 400 m, Ryczów 420 m, Karlin 370 m, Piaseczno 340 m, Podlesice 360 m; pow. Myszków: Lutowiec 360 m, Czarny Kamień 370 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Olsztyn 300 m.

Stereocaulon Schreb.

216. *Stereocaulon condensatum* Hoffm.

Na piaszczystej ziemi w widnych, młodych laskach sosnowych, zwykle razem z *Cladonia mitis* i *Cl. uncialis*.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 270 m; pow. Olkusz: Chełm koło Wolbromia około 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Kroczyce 320 m.

Gatunek rzadki na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

217. *Stereocaulon incrustatum* (Schaer.) Flk.

Na piaszczystej ziemi w widnych, młodych laskach sosnowych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Skalskie około 400 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 350 m; pow. Zawiercie: Srubarnia 400 m, Karlin 390 m.

Gatunek rzadki.

UMBILICARIACEAE

Umbilicaria Hoffm., em. Frey.

218. *Umbilicaria decussata* (Vill.) Frey, in Rabenh. Krypt. Fl., 9, 4/1, 1933, p. 410. [= *Umbilicaria reticulata* (Schaer.) Carest.]

Na krzemiennym kamieniu leżącym obok piaszczystej polnej drogi; pojedynczy okaz.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Kajetanów koło Kroczyce 370 m.

Gatunek bardzo rzadki, wysokogórski. Jego występowanie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na tak nieznacznej wysokości, jest zadziwiające. Normalnie rośnie on dopiero w piętrze turniowym, powyżej górnej granicy lasu (np. w Alpach, Tatrach). Jedyny okaz, jaki udało się znaleźć, jest mniejszy od okazów typowych i jakby „wymęczony”. Niemniej jest zgodny z eksykatem Rabenhorsta nr 424. Porównywałem go także ze skandynawskimi okazami z zielnika Prof. J. Motyki (Lublin).

ACAROSPORACEAE

Sarcogyne Flot.

219. *Sarcogyne pusilla* Anzi.

Na skałach wapienia jurajskiego w miejscach nasłonecznionych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Chrzanów: Tataruchy koło Tenczynka 330 m.

Gatunek bardzo rzadki. Plecha endolityczna, barwy podłoża. Apotecja liczne, zupełnie pogrążone w wapieniu, szerokości 0,3—0,4 mm. Po ich wypadnięciu pozostają w skale głębokie dołeczki. Krążek brunatny lub czerniawy, początkowo wklęsły, potem wypukły. Thecium wys. około 100—150 μ (czasem wyższe), jasne, górą brunatne, J + niebieskie. Hypotecjum jasne, grubości około 20—40 μ . Zarodniki 1-komórkowe, bardzo liczne, 5—9 $\times$ 2—3 μ .

220. *Sarcogyne pruinosa* (Sm.) Körb.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 21 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Skały Twardowskiego koło Krakowa 230 m, Kryspinów 240 m, Czernichów 220 m, Przeginia Duchowna 280 m, Dol. Brzaskwinki 280 m, Januszowice 290 m, Dol. Kluczwoły 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobyłańska 380 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Nielepice 340 m, Tata-ruchy koło Krzeszowic 330 m, Filipowice 310 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 380 m, Bębło 420 m, Łazy Jawór 490 m, Dol. Bętkowska 390 m, Ojców 370 m, Wielmoża 390 m, Piesko-wa Skała 400 m.

Jura Północna. 7 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 410 m, wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m; pow. Zawiercie: Ryczów 470 m, Zdów 350 m; pow. Myszków: Leśniów koło Żarek 340 m, Lutowiec 390 m, Mzurów 350 m.

Gatunek dość pospolity na terenie Jury Południowej, rozproszony na Ju-rze Północnej. Był podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881). Jest bardzo zmienny. Zbierałem następujące formy: f. *intermedia* (Körb) H. Magn., f. *nuda* (Nyl.) H. Magn., var. *macroloma* (Flk.) Magn., var. *deciptens* Mass.

[*Sarcogyne privigna* (Ach.) Anzi

Gatunek podany błędnie z Ojcowa (z wapieni) przez A. Rehmana (1879). Bez obej-rzenia oryginalnych okazów trudno osądzić, do jakiego gatunku one należały, jednakże wydaje się prawdopodobne, że Rehman zbierał którąś z licznych form gatunku poprzed-niego. Prawdziwa *S. privigna* jest gatunkiem rosnącym na skałach krzemianowych.]

[*Sarcogyne simplex* (Dav.) Nyl.

Gatunek podany błędnie z Ojcowa przez K. Filipowicza (1881). Podobnie jak poprzedni rośnie tylko na skałach krzemianowych.]

Acarospora Mass.

221. *Acarospora cervina* Mass.

Na cyplach lub w podszczytowych partiach urwistych, silnie nasłonecznio-nych skał wapienia jurajskiego, zwykle nielicznie w zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Tyniec rezerwat „Skołczanka” 250 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Łazy Jawór 500 m, Ojców 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn około 300—350 m.

Gatunek rzadki na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Pół-nocnej. Był podany przez F. Błońskiego (1890) jako *A. glaucocarpa* var.

rubricosa. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej występuje zwykle w stanie płonnym lub z niedorozwiniętymi apotecjami.

222. *Acarospora fuscata* (Nyl.) Arn.

Na kamieniach krzemiennych rozrzuconych wśród piasków i wapieni, na piaskowcach lub granitowych głazach polodowcowych, niekiedy na starych kamiennych (krzemianowych) kapliczkach.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Bolechowice 270 m, Dol. Kobylanka 360 m; pow. Olkusz; Raławice 400 m

Jura Północna. 4 stan. Pow. Zawiercie: Pedlesice 360 m, Zdów 330 m; pow. Myszków: Lutowiec 360 m, Ludwinów 350 m.

Gatunek w badanym obszarze rzadki.

223. *Acarospora glaucocarpa* (Wnbg.) Korb.

Na skałach wapiennych, zwykle na płaszczyznach pionowych, w miejscach ocienionych lub eksponowanych na północ, np. w zespole *Polyblastia papularis*-*Arthopyrenia conoidea* lub w zespole *Ionaspis epulotica*, tworzy także, jak się wydaje, własne — szczelinowe zbiorowisko.

Jura Południowa. 32 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Bielany 270 m, Piekary 240 m, Przeginia Duchowna 290 m, Rybna 300 m, Dol. Sanki 280 m, Mników 270 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kluczwody 300 m, Zielonki 240 m, Dol. Bolechowska 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 290 m, Brodła 270 m, Kamyk 330 m, Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Raławice 400 m, Dol. Szklarki 380 m, Łazy Jawór 450 m, Dol. Bętkowska 360 m, Bębło 430 m, Zelków 380 m, Wierzcho-
wie 390 m, Ojców 340—400 m, Wielmoża 390 m, Pieskowa Skała 400 m, Saspów 410 m, Michałowka 380 m, Sułoszowa 430 m, Pazurek 440 m, Rabsztyn 430 m, Klucze 400 m.

Jura Północna. 22 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 370 m, Złożeniec 430 m, Smoleń 480 m, wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m, Krzywopłoty 410 m; pow. Zawiercie: Ryczów 430 m, Srubarnia 450 m, Podzamcze 490 m, Karlin 400 m, Piaszczno 360 m, Podlesice 390 m, Rzędkowice 410 m, Kroczyce 330 m, Zdów 350 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 390 m, Mzurów 350 m, Niegowa 380 m, Gorzków 340 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Przemiłowice 330 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek pospolity na obszarze obu okręgów. Jest bardzo zmienny. Zbiierałem następujące formy: var. *typica* H. Magn. f. *caerulescens* (Vain.) H. Magn., f. *ostreata* (Anzi) Jatta, var. *sarcogynoides* (Vain.) H. Mang. f. *melaniza* (Nyl.) H. Mang.

224. *Acarospora macrospora* (Hepp) Bagl.

Na pionowych, nasłonecznionych, zwykle dość silnie spękanych skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 20 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Piekary 240 m, Ściejowice 230 m, Bielany 270 m, Kryspinów 240 m, Rybna 310 m, Dol. Kluczwody 360 m, Dol. Bolechowska 390 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Brodła 270 m, Ten-
czynek 310 m, Dubie 310 m; pow. Olkusz: Wierzcho-
wie 380 m, Dol. Bętkowska 380 m, Dol. Szklarki 400 m, Łazy Jawór 480 m, Ojców 380 m, Pieskowa Skała 410 m, Rabsztyn 430 m, Klucze 400 m.

Jura Północna. 10 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 420 m, wzgórze „Grodzisko”

koło Smolenia 450 m; pow. Zawiercie: 470 m, Kroczyce 320 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 380 m, Mzurów 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 330 m, Przemiłowice 330 m.

Gatunek częsty na terenie Jury Południowej, rozproszony na Jurze Północnej. Był podawany przez A. Rehmana (1879), F. Błońskiego (1890) jako *A. squamulosa* oraz przez H. Magnussona (1929).

225. *Acarospora silesiaca* H. Magn.

Na skałach melafirowych razem z *A. veronensis* i *Lecanora polytropa*.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Chrzanów: Podzamcze koło Tenczyńka 380 m.

Gatunek bardzo rzadki.

226. *Acarospora smaragdula* (Wnbg.) Th. Fr.

Gatunek podany z Krakowa z nagrobków cmentarnych przez A. Rehmana (1879); dotychczas nie potwierdzony.

227. *Acarospora veronensis* Mass.

Na skałach melafirowych lub polodowcowych głazach granitowych.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 250 m, Podzamcze koło Tenczyńka 380 m.

Gatunek rzadki.

PERTUSARIACEAE

Pertusaria DC.

228. *Pertusaria amara* (Ach.) Nyl.

Na korze starych drzew liściastych, np. buków, grabów, dębów, lip, kasztanowców itp.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Chrzanów: Tenczynek 280 m; pow. Olkusz: Ojców około 340—400 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m.

Gatunek w chwili obecnej dość rzadki na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

229. *Pertusaria* cfr. *coronata* (Ach.) Th. Fr.

Na korze starych buków i dębów.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Pazurek 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok około 340 m.

Gatunek rzadki. Okazy moje, podobnie jak wszystkie polskie okazy (wiadomość ustna od Prof. dra T. Sulmy i dra Z. Tobolewskiego), barwią się z Pd na czerwono, co odpowiadałoby pokrewnemu gatunkowi, *P. subdubia* Nyl., uważanemu przez C. F. E. Erichsena (1936) za rzadkość.

230. *Pertusaria discoidea* (Pers.) Malme.

Na korze drzew liściastych, np. buków, dębów, grabów itp.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Bielany 290 m, Dol. Kluczwody 300 m; pow. Chrzanów: Dol. Raclawki 380 m; pow. Olkusz: Ojców 370 m, Pazurek 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m.

231. *Pertusaria globulifera* (Turn.) Mass.

Na korze starych drzew liściastych, np. na dębach.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m.

232. *Pertusaria leioplaca* (Ach.) DC.

Na korze drzew liściastych, zwłaszcza na korze buków i grabów.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Mników 260 m, Dol. Sanki 260 m, Dol. Kluczwoły 270 m, Dol. Kobylańska 360 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Dol. Szklarki 380 m, Ojców 360 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m.

Gatunek dość częsty, lecz zwykle przeoczany ze względu na częste występowanie w stanie płonnym wśród podobnych, także płonnych, plech innych porostów skorupiatych (np. w Ojcowie).

233. *Pertusaria* cfr. *slesvicensis* Erichs.

Na korze starych dębów, zwykle u podstawy pni.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok około 340 m.

Gatunek bardzo rzadki. Dotychczas był znany tylko z północnych Niemiec. Podaję opis moich okazów: Plecha rozległa, silnie zgrubiała do około 2 mm, szara lub zielonkawoszara, K—, Cl—, KCl—, Pd—, złożona z dość gęsto skupionych, nieregularnie powyginanych brodawek nierównej wysokości, u podstawy często zwężonych, maczużkowatych lub kolumienkowatych; w smaku bardzo gorzka (podobnie jak *P. amara*). Brodawki są na wierzchołkach jaśniejsze i często rozerwane (przez rozerwania widoczna jest warstwa rdzeniowa), jednak nigdy nie wykształcają się na ich powierzchniach tarczko-wate soralia (jak u *P. amara*, *P. discoidea* czy *P. globulifera*). Rdzeniowa warstwa plechy K + po dłuższej chwili (nie zawsze) brudnoczerwona, KCl + jasno lub intensywnie czerwono-fioletowa, Cl—, Pd—. Apotecjów brak i to stanowi, jak się wydaje, jedyną różnicę w stosunku do typowych okazów z Niemiec.

Phlyctis (Wallr.) Flot.

234. *Phlyctis argena* (Ach.) Flot.

Na korze drzew liściastych, głównie na wierzbach, topolach, lipach, grabach itp.

Jura Południowa. 39 stan. Pow. Kraków: Bielany 240 m, Czernichów 230 m, Rybna 270 m, Brzoskwinia 270 m, Tyniec 220 m, Mników 250 m, Dol. Kobylańska 360 m, Dol. Kluczwoły 280 m, Modlnica 300 m, Januszowice 290 m; pow. Chrzanów: Filipowice 300 m, Dol. Raclawki 350 m, Czerna 350 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 380 m, Dol. Bętkowska 320 m, Wierzchowie 370 m, Biały Kościół 400 m, Ojców 350 m, Pieskowa Skała 370 m, Chełm koło Wolbromia 400 m, Pazurek 400 m, Michałówka 380 m (stanowiska podane są przykładowo).

Jura Północna. 6 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 370 m, Załęże 360 m, Krzywopłoty 380 m, Złożeniec 440 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m.

Gatunek pospolity. Wielu autorów zalicza rodzaj *Phlyctis* do rodziny *Lecanoraceae*.

Podrodzaj 1. *Aspicilia* (Stiz.) Ach.

235. *Lecanora calcarea* (L.) Smrft. sensu lato.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, najczęściej na płaszczyznach poziomych, np. w zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*, rzadziej na płaszczyznach pionowych, np. w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 36 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Kryspinów 240 m, Tyniec 230 m, Piekary 250 m, Przeginia Duchowna 280 m, Rybna 300 m, Mników 270 m, Dol. Brzostkinki 280 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 290 m, Brodła 270 m, Sanka 370 m, Kamyk 330 m, Nielepice 340 m, Tenczynek 310 m, Filipowice 300 m, Czerna 380 m, Dol. Raclawki 360 m, Dubie 300 m; pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Dol. Szklarki 390 m, Jerzmanowice 450 m, Łazy Jawór 480 m, Dol. Bętkowska 360 m, Zerków 380 m, Wierchowice 380 m, Bębło 430 m, Ojców 360 m, Wielmoża 390 m, Pieskowa Skała 400 m, Sułoszowa 430 m, Michałowska 390 m, Rabsztyn 430 m, Pazurek 415 m, Klucze 400 m.

Jura Północna. 19 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 410 m, Smoleń 480 m; pow. Zawiercie: Ryczów 470 m, Srubarnia 460 m, Podzamcze 490 m, Karlin 400 m, Piecki koło Kromolowa 420 m, Piaseczno 360 m, Podlesice 360 m, Kroczyce 330 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Lutowiec 380 m, Niegowa 380 m, Mzurów 350 m, Gorzków 370 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek pospolity. Zaliczyłem tutaj formy morfologicznie bardzo różnorodne. Na badanym obszarze zebrałem takich form około dwunastu. Zaliczenie ich do opisanych już jednostek jest w tej chwili utrudnione ze względu na brak monograficznego opracowania tej trudnej grupy.

236. *Lecanora contorta* (Hoffm.) Stnr.

Na nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w miejscach silnie spękanych lub wietrzejących, przeważnie na płaszczyznach poziomych.

Jura Południowa. 21 stan. Pow. Kraków Tyniec 240 m, Skały Twardowskiego koło Krakowa 230 m, Piekary 240 m, Bielany 270 m, Kryspinów 240 m, Mników 290 m, Dol. Brzostkinki 280 m, Rybna 300 m, Dol. Kluczwody 310 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 290 m, Kamyk 330 m, Tataruchy koło Tenczynka 330 m, Czerna 380 m, Dol. Raclawki 360 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 400 m, Dol. Bętkowska 370 m, Jerzmanowice 480 m, Ojców 360 m, Klucze 400 m.

Jura Północna. 11 stan. Pow. Olkusz: Ryczówek 370 m; pow. Zawiercie: Srubarnia 460 m, Piaseczno 360 m, Podlesice 380 m, Kroczyce 330 m, Zdów 350 m, pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 380 m, Niegowa 380 m, Mzurów 360 m; pow. Częstochowa: Przy-
miłowice 330 m.

Gatunek częsty na terenie Jury Południowej, rozproszony na Jurze Północnej. Był podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Aspicilia calcarea* var. *contorta*.

237. *Lecanora coronata* (Mass.) Jatta, Syll. Lich. Ital., 1900, p. 215, (non *L. coronata* Vain. vel Röhl.) [= *Lecanora coronuligera* A. Zahlbr., Catal. Lich. Univ., 5, 1928, p. 300.]

Na silnie nasłonecznionych, zwykle eksponowanych na południe skałach wapienia jurajskiego, najczęściej na płaszczyznach poziomych lub ukośnych.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 400 m, Ojców około 340—400 m, Sułoszowa 430 m.

Gatunek rzadki. Był podany przez K. Filipowicza (1881). Jest bardzo charakterystyczny dzięki wyniesionemu nad powierzchnię plechy brzegowi apotecjów, który przypomina koronę na skutek $\pm$ regularnego splekania.

238. *Lecanora gibbosa* (Ach.) Hyl. sensu lato.

Na krzemiennych kamieniach przydrożnych razem z *Rhizocarpon ambiguum*.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców około 340—410 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Zdów koło Kroczy 330 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej bardzo rzadki. Był podany z Ojcowa (ze skał wapiennych) przez A. Rehmana (1879). Okazy te należały zapewne do *L. calcarea* lub do *L. contorta*.

239. *Lecanora hoffmanii* (Ach.) Müll. Arg.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w partiach podszczytowych na prawie pionowych ściankach.

Jura Południowa. 12 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Piekary 230 m, Zielonki 240 m, Skały Twardowskiego koło Krakowa 230 m, Mników 270 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Zerków 380 m, Ojców 370 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Zawiercie: Piecki koło Kromolowa 420 m; pow. Myszków: Mirów 370 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej.

240. *Lecanora prevostii* (Duby) Th. Fr.

Gatunek podawany z Ojcowa (ze skał wapiennych) przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Hymenelia prevostii* lub *Hymenelia prevostii* f. *rosea*. Prawdopodobnie chodzi tu o inny gatunek, *Ionaspis epulotica*, który dawniej był częściowo zaliczany do *Lecanora prevostii* (np. pod nazwą *Hymenelia prevostii* var. *patellula*). *Ionaspis epulotica* rośnie w wielu miejscach w Ojcowie. Jej plecha (zresztą bardzo zmienna) często jest pokryta gęsto „chrysogonidiami”, dzięki czemu cała przybiera zabarwienie cieliste lub różowawe. Okazy moje posiadają gonidia typu *Trentepohlia*. Początkowo również zaliczałem je do *Lecanora prevostii*.

241. *Lecanora radiosa* (Hoffm.) Schaer., Enumer. Crit. Lich. Eurl., 1850, p. 61; A. Zahlbr., Catal. Lich. Univ., 5, 1928, p. 648; Poelt, Mitteil. Bot. Staat. München, 19—20, 1958, p. 445. [= *Lichen radiosus* Hoffm., Enumer. Lich., 1784, tabl. IV, fig. 5; = *Lecanora circinata* (Pers.) Ach., Lichenogr. Univers., 1810, p. 425; = *Lichen circinatus* Pers., Neue Ann. der Bot., 1794, p. 25.]

Na silnie nasłonecznionych skałach wapiennych, zwykle w zespole *Derma-*

toocarpon monstrosum-Buellia venusta na płaszczyznach poziomych lub ukośnych.

Jura Południowa. 40 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Tyniec 230 m, Przegonia Duchowna 300 m, Rybna 310 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Januszowice 310 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m, Dol. Kluczwody 360 m, Dol. Bolechowska 360 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 300 m, Brodła 280 m, Tenczynek 300 m, Nielepice 340 m, Czerna 400 m, Filipowice 310 m; pow. Olkusz: Bębło 440 m, Dol. Bętkowska 400 m, Jerzmanowice 460 m, Ojców 380 m, Wielmoża 400 m, Rabsztyn 440 m (stanowiska podane są przykładowo).

Jura Północna. 5 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 395 m, wzgórze „Grodzisko” koło Smolemia 450 m; pow. Zawiercie: Podzamcze 480 m, Kroczyce 320 m; pow. Częstochowa: Częstochowa około 250 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej i rzadki na Jurze Północnej. Był podany przez H. Lojkę (1868), A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890) jako *Placodium circinatum*. Wielu autorów zaliczało go do podrodzaju *Placodium*.

Podrodzaj 2. *Lecanora*

242. *Lecanora albescens* (Hoffm.) Flk.

Na pionowych skałach wapiennych, najobficiej w miejscach nieco ocienionych lub eksponowanych na północ, często w zespole *Candelaniella medians-Phyiscia nigricans*. Prócz tego rośnie na starych murach kamiennych i betonowych, albo rzadziej na drewnie.

Jura Południowa. 32 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Tyniec 230 m, Przegonia Duchowna 290 m, Mników 280 m, Dol. Brzoskwinki 270 m, Dol. Kobylańska 360 m, Dol. Kluczwody 300 m, Zielonki 250 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Brodła 270 m, Nielepice 330 m, Dol. Raclawki 350 m; pow. Olkusz: Jerzmanowice 450 m, Ojców 370 m, Sułoszowa 420 m, Michałowka 380 m, Pazurek 420 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 19 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 380 m, Smoleń 480 m; pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Podzamcze 480 m, Piaseczno 360 m, Rzędkowice 410 m, Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Leśniów koło Żarek 340 m, Mirów 370 m, Mzurów 350 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m, Przemiłowice 320 m, Olsztyn 340 m (stanowiska podane są przykładowo).

Gatunek bardzo pospolity. Był podany przez W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879). Cechuje go duża zmienność. Zbierałem następujące formy:

f. *lignicola* A. Zahlbr.

Na drewnie, np. w Piekarach.

f. *murorum* (Mass.) A. Zahlbr.

Na eksponowanych na północ wapieniach, np. w Mnikowie. Plecha spękana na areole. Apotecja małe, prawie zupełnie pogrążone w plesze.

f. *verrucosa* (Leight.) A. Zahlbr.

Na nasłonecznionych skałach wapiennych, np. w Dolinie Bętkowskiej 400 m, Ryczowie 480, Kroczycach 330 m. Plecha w postaci małych, rozrzuconych brodawek. Apotecja drobne, pogrążone w plesze.

var. *dissipata* (Nyl.) A. Zahlbr.

Na wapieniach. Plecha zanikająca. Apotecja rozrzucone na czarniawej, nieco proszkowatej plesze pierwotnej.

var. *ecrustacea* (Salw.) A. Zahlbr.

Na silnie nasłonecznionych, pionowych skałach wapiennych. Plecha zanikająca. Apotecja bardzo duże o silnie powyginanym i pozawijanym brzegu.

243. *Lecanora allophana* (Ach.) Röhl.

Na korze drzew liściastych, zwykle na wierzbach i topolach.

Jura Południowa. 26 stan. Pow. Kraków: Bielany 230 m, Tyniec 220 m, Piekary 230 m, Czernichów 230 m, Przeginia Narodowa 220 m, Rybna 250 m, Brzostkwinia 280 m, Cholerzyn 230 m, Dol. Kluczwody 280 m, Dol. Szklarki 370 m, Bolechowice 250 m, Kobylany 260 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 240 m, Tenczynek 270 m, Nielepice 300 m, Rudawa 240 m, Dubie 280 m; pow. Olkusz: Biały Kościół 410 m, Ojców 350 m, Pieskowa Skała 380 m, Michałówka 400 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m, Klucze 380 m, Chełm koło Wolbromia 400 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 370 m, Załęże 360 m, Ryczówek 370 m, Smoleń 460 m; pow. Myszków: Gorzków 320 m.

Gatunek pospolity. Był podany przez K. Filipowicza (1881) jako *L. subfusca* f. *parisiensis*.

244. *Lecanora atra* (Huds.) Ach.

Na krzemiennych głazach wśród piasków lub na piaskowcowych kapliczkach, nagrobkach itp.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Bolechowice 290 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Myszków: Lutowiec 360 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki.

245. *Lecanora carpinea* (L.) Vain.

Na korze drzew liściastych, głównie na grabach, wierzbach lub topolach,

Jura Południowa. 19 stan. Pow. Kraków: Bielany 240 m, Zabierzów 250 m, Mników 270 m, Dol. Sanki 270 m, Brzostkwinia 280 m, Brzezie koło Zabierzowa 260 m, Dol. Kluczwody 280 m, Bolechowice 290 m; pow. Chrzanów: Nielepice 300 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 370 m, Zelków 390 m, Łazy Jawór 400 m, Dol. Bętkowska 340 m, Szklary 390 m, Jerzmanowice 400 m, Ojców 350 m, Pieskowa Skała 370 m, Rabsztyn 400 m, Klucze 380 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Olkusz: Załęże 360 m, Smoleń 460 m; pow. Myszków: Gorzków 320 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m, Blachownia około 240 m.

Gatunek częsty. Był podawany przez K. Filipowicza (1881) i K. Błońskiego (1890) jako *L. pallida* var. *angulosa*.

[*Lecanora cenisia* Ach.

Gatunek podawany błędnie z Ojcowa ze skał wapiennych przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Zeora cenisia*. Prawdziwa *Lecanora cenisia* rośnie na skałach krzemianowych.]

246. *Lecanora chlarona* (Ach.) Nyl.

Na korze drzew liściastych, np. na bukach, jaworach, olchach, topolach, niekiedy na gałązkach trzmieliny (*Evonymus verrucosa*.)

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Zabierzów 250 m, Dol. Kluczwody 300 m; pow. Chrzanów: Dol. Raclawki 360 m; pow. Olkusz: Ojców 350 m, Sąsów 400 m, Michałówka 400 m, Pazurek 400 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m.

f. pinastri (Schaer.) Cromb. [= *Lecanora pinastri* (Schaer.) H. Magn.]
Na korze sosen.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Karlin koło Ogrodzieńca 390 m.

f. pulicaris (Ach.) Poelt.

Na starym drewnie.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Chrzanów: Dubie 290 m.

247. *Lecanora chlarotera* Nyl.

Na korze drzew liściastych, np. na lipach.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców Wąwóz Korytania 350 m.

248. *Lecanora conizaea* (Ach.) Nyl.

Na korze drzew szpilkowych lub liściastych, np. na sosnach, modrzewiach, lipach itp.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Bielany 260 m; pow. Chrzanów: Podzamecze koło Tenczynka 380 m; pow. Olkusz: Łazy Jawór około 400 m, Ojców 390 m.

Gatunek znacznie częstszy niżby wynikało z ilości stanowisk. Często występuje bez apotecjów.

249. *Lecanora crenulata* (Dick.) Hook.

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, zarówno w miejscach nasłonecznionych jak i ocienionych.

Jura Południowa. 27 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Piekary 230 m, Przegonia Duchowna 290 m, Rybna 280 m, Dol. Sanki 280 m, Mników 270 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kluczwody 310 m, Tomaszowice 300 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 390 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Kamyk 340 m, Nielepice 320 m, Dol. Raclawki 360 m, Dubie 300 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 390 m, Łazy 450 m, Dol. Bętkowska 360 m, Zerków 370 m, Wierzchowie 380 m, Ojców 340—410 m, Wielmoża 390 m, Pieskowa Skała 310 m, Sułoszowa 430 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 430 m.

Jura Północna. 24 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 395 m, Smoleń 480 m, Krzywopłoty 430 m, wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m; pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Podzamecze 490 m, Karlin 410 m, Piecki koło Kromołowa 420 m, Piaseczno 350 m, Rzędkowice 410 m, Srubarnia 450 m, Podlesice 380 m, Kroczyce 330 m, Zdów 350 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Czarny Kamień 375 m, Lutowiec 380 m, Niegowa 370 m, Mzurów 340 m, Gorzków 370 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Przemyłowice 330 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek bardzo pospolity. Był podawany przez H. Lojkę (1868), A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Lecanora caesiocalba*.

250. *Lecanora dispersa* (Pers.) Röhl.

Na skałach wapiennych we wszystkich zespołach.

Jura Południowa. 38 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Tyniec 230 m, Czernichów 230 m, Rybna 280 m, Mników 300 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 260 m, Dol. Bolechowicka 360 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Nielepice 340 m,

Tenczynek 300 m, Czerna 370 m; pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Jerzmanowice 450 m
Dol. Bętkowska 380 m, Bębło 430 m, Ojców 370 m, Pieskowa Skała 380 m, Michałówka
389 m, Rabsztyn 440 m, Klucze 400 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 26 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 420 m, Dłużec 390 m, Smoleń 480 m; pow. Zawiercie: Ryczów 450 m, Piecki koło Kromolowa 420 m, Rzędkowice 410 m, Piaseczno 350 m, Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Leśniów koło Żarek 340 m, Niegowa 370 m, Gorzków 380 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m, Olsztyn 350 m (stanowiska podane są przykładowo).

Gatunek bardzo pospolity. Był podany przez A. Rehmana (1879) jako *L. caesiocalba* var. *dispersa* lub jako *L. flotowiana*. Występuje w kilku formach.
f. *chaubardii* (Fr.) Vain.

Posiada apotecja o nagim krążku i karbowanym brzegu (forma najczęstsza).
f. *coniotropa* (Fr.) Arn.

Posiada apotecja o nagim krążku i brzegu niekarbowanym.
f. *pruinosa* Anzi.

Posiada krążek niebieskawo przyprószony, brzeg niekarbowany.

251. *Lecanora glabrata* (Ach.) Malme

Gatunek podany z Ojcowa z (kory drzew) przez K. Filipowicza (1881) pod nazwą
L. subfusca var. *glabrata*; dotychczas nie potwierdzony.

252. *Lecanora hageni* Ach.

Na starym drewnie i na korze przydrożnych drzew liściastych.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Brzeziny 250 m; pow. Olkusz: Białe Kościółki 400 m, Ojców około 350 m, Klucze 320 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn 320 m.

Gatunek obecnie dość rzadki. Był podany przez A. Rehmana (1879).

253. *Lecanora expallens* Ach.

Na korze sosny.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Skalskie około 400 m.

Gatunek rzadki, możliwe że przeoczony. Występuje zawsze bez apotecjów.
Plecha Cl + czerwona.

254. *Lecanora intumescens* (Rebent.) Malme

Gatunek podawany z Ojcowa przez A. Rehmana (1879) pod nazwą *L. intumescens* var. *glaucorufa*; dotychczas nie potwierdzony.

255. *Lecanora pallida* (Schreb.) Rabh.

Gatunek podawany z Modlnicy, Ojcowa i Częstochowy przez H. Lojkę (1868), A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881), i F. Błońskiego (1890) pod nazwą *L. pallida* - *sordidescens*; obecnie nie potwierdzony, prawdopodobnie wyginął. Oglądałem okazy zielnikowe A. Rehmana.

256. *Lecanora piniperda* Körb.

Na korze lub drewnie drzew szpilkowych, głównie na sosnach.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Modlnica 300 m; pow. Olkusz: Ojców 370 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Gatunek rzadki. Był podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879).

257. *Lecanora polytropa* (Ehrh.) Rabh.

Na głazach krzemianowych, np. na melafirach, piaskowcach, krzemieniach lub granitowych głazach polodowcowych.

Jura Południowa. 6 stan. Pow. Kraków: Przeginia Duchowna 240 m, Dol. Kobylańska 360 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 250 m, Podzamcze koło Tenczynka 380 m, Tenczynek 290 m; pow. Olkusz: Raclawice 400 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Zawiercie: Podlesice 340 m, Rzędkowice 400 m, Zdów 330 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Ludwinów 370 m.

Gatunek rozproszony.

258. *Lecanora saligna* (Schrad.) A. Zahlbr.

Na murszejącym pniaku.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m.

259. *Lecanora subrugosa* Nyl.

Na korze drzew liściastych, głównie na starych bukach.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Chrzanów: Dol. Raclawki 400 m; pow. Olkusz: Pieskowa Skała 370 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 390 m.

Gatunek rzadki.

260. *Lecanora symmicta* Ach.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) z Modlnicy jako *L. varia* var. *symmicta* lub *L. varia* var. *opochroea* f. *saepincola*; dotychczas nie potwierdzony.

261. *Lecanora umbrina* (Ehrh.) Röhl., f. *saxicola* (Flk.) A. Zahlbr.

Na krzemiennych głazach wśród piaszczystych pól.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Myszków: Lutowiec 350 m.

262. *Lecanora varia* (Ehrh.) Ach.

Na korze drzew liściastych i szpilkowych, na starych płotach i drewnie.

Jura Południowa. 29 stan. Pow. Kraków: Bielany 250 m, Kryspinów 240 m, Przegorzały 250 m, Tyniec 220 m, Piekary 230 m, Liszki 230 m, Chrosna 240 m, Czernichów 230 m, Modlnica 300 m, Tomaszowice 300 m, Przeginia Duchowna 270 m, Rybna 270 m, Dol. Brzozkwinki 280 m, Mników 260 m; pow. Chrzanów: Brodla 260 m, Tenczynek 290 m, Rudawa 250 m, Krzeszowice 260 m, Dubie 290 m; pow. Olkusz: Szklary 370 m, Raclawice 280 m, Jerzmanowice 400 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Łazy 400 m, Ojców 350 m, Pieskowa Skała 370 m, Sułoszowa 400 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m.

Jura Północna. 11 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 370 m, Domaniewice 320 m, Załęże 360 m, Krzywopłoty 370 m, Złożeniec 440 m, Smoleń 460 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m, Podlesice 340 m; pow. Myszków: Niegowa 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Olsztyn 300 m.

Gatunek bardzo pospolity.

Podrodzaj 3. *Placodium* (Pers.) Poelt

263. *Lecanora muralis* (Schreb.) Rabh. var. *muralis* (T).

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, rośnie

we wszystkich zespołach, najczęściej jednak na płaszczyznach poziomych.

Jura Południowa. 46 stan. Pow. Kraków: Bielany 260 m, Tyniec 230 m, Przegonia Duchowna 300 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Zielonki 250 m, Januszowice 300 m, Mników 280 m, Dol. Brzoskwinki 290 m, Dol. Kobylańska 380 m, Podskalany 300 m, Tomaszowice 300 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Nielepice 340 m, Obora koło Zalasza 350 m, Czerna 400 m; pow. Olkusz: Jerzmanowice 450 m, Dol. Bętkowska 380 m, Bębło 440 m, Ojców 380 m, Wielmoża 400 m, Pieskowa Skała 410 m, Michałowska 380 m, Pazurek 420 m, Klucze 400 m (stanowiska podane są przykładowo).

Jura Północna. 35 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 390 m, Krzywopłoty 400 m, Smoleń 480 m; pow. Zawiercie: Ryczów 470 m, Podzamcze 490 m, Rzędkowice 410 m, Piasieczno 360 m, Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Niegowa 380 m, Gorzków 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 320 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Gatunek bardzo pospolity. Był podany przez W. Jabłońskiego (1872) jako *Placodium saxicolum*.

264. *Lecanora pruinosa* Chaub.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego w zespole *Caloplaca murorum-Lecanora pruinosa* i w zespole *Lecania erysibe-Verrucaria policensis*.

Jura Południowa. 10 stan. Pow. Kraków: Mników 380 m, Dol. Sanki 270 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kluczwoły 310 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 390 m, Dol. Bętkowska 380 m, Łazy Jawór 480 m, Ojców 350—410 m.

Jura Północna. 6 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m; pow. Zawiercie: Podzamcze 470 m, Kajetanów 450 m, Kroczyce 340 m; pow. Myszków: Mzurów 350 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 340 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury południowej, rzadki na Jurze Północnej.

265. *Lecanora reuteri* Schaer.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego w zespole *Caloplaca murorum-Lecanora pruinosa*.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzoskwinki 275 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Szklarki 400 m, Wierzchowie 380 m, Ojców 370 m.

Gatunek rozproszony, rośnie tylko na terenie Jury Południowej.

266. *Lecanora* cfr. *urbana* Nyl., Bull. Soc. Bot. France, 13, 1866, p. 368; Poelt, Mitteil. Bot. Staats. Munchen, 19—20, 1958, p. 460.

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, również na starych murach.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Olkusz: Podlesie koło Smolenia 450 m.

Gatunek rzadki, możliwe że przeoczany. Od *L. albescens* (z którą rośnie na tych samych stanowiskach) różni się wykształceniem krótkich, ale wyraźnych łatek na obwodzie plechy. Gatunek wymagający dalszych badań.

Squamarina Poelt

[*Squamarina crassa* (Huds.) Poelt, Mitteil. Bot. Staats. München, 19—20, 1958, p. 544. [= *Lecanora crassa* (Huds.) Ach.]

Gatunek podawany najprawdopodobniej błędnie z Ojcowa i Olsztyna koło Częstochowy przez F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890) pod nazwą *Psoroma crassum*.]

267. *Squamarina lentigera* (Web.) Poelt, l. c. p. 536. [= *Lecanora lentigera* (Web.) Ach.]

Na silnie nasłonecznionych półeczkach skał wapiennych; na humusie lub na mchach.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Mników około 260—300 m (leg. A. Kozłowska), Dol. Bolechowicka 390 m.

Gatunek bardzo rzadki.

Ochrolechia Mass.

268. *Ochrolechia pallescens* (L.) Mass.

Gatunek podany z Ojcowa (z kory buków i grabów) przez F. Berdaua (1876) jako *Lecanora pallescens*; dotychczas nie potwierdzony.

269. *Ochrolechia parella* (L.) Mass., var. *tumidula* (Pers.) Arn.

Gatunek podany ze Złotego Potoku przez F. Błońskiego (1890) jako *O. pallescens-tumidula*; dotychczas nie potwierdzony.

Lecania Mass.

270. *Lecania erysibe* (Ach.) Mudd.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, często u podstawy, w zespole *Lecania erysibe-Verrucaria policensis*.

Jura Południowa. 28 stan. Pow. Kraków: Przegorzały 270 m, Bielany 260 m, Kryspinów 240 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Tyniec 220 m, Piekary 230 m, Przeginia Duchowna 280 m, Mników 280 m, Dol. Sanki 270 m, Rybna 290 m, Brzoskwinia 280 m, Dol. Kluczwoły 280 m, Dol. Bolechowicka 270 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Chrzanów: Brodla 270 m, Kamyk 330 m, Nielepice 340 m, Tenczynek 300 m, Dubie 300 m, Dol. Raclawki 350 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Szklarki 390 m, Łazy 490 m, Wierzchowie 390 m, Bębło 430 m, Ojców 340—400 m, Pieskowa Skała 430 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 420 m; pow. Zawiercie: Ryeczów 470 m, Zdów 350 m, pow. Myszków: Mzurów 350 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej.

271. *Lecania syringeae* (Ach.) Th. Fr.

Gatunek podany z Tomanowic przez W. Jabłońskiego (1872) jako *L. fuscella*; dotychczas nie potwierdzony.

Candelariella Müll. Arg.

272. *Candelariella aurella* (Hoffm.) A. Zahlbr.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapiennych, zwykle na płaszczyznach poziomych, w miejscach nieco splekanych.

Jura Południowa. 21 stan. Pow. Kraków: Tyniec 250 m, Piekary 230 m, Mników 270 m, Dol. Sanki 280 m, Dol. Brzostkiewicza 280 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 260 m, Dol. Kluczwody 310 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobyłańska 300 m; pow. Chrzanów: Kamyk 320 m, Nielepice 340 m, Dubie 300 m; pow. Olkusz: Dol. Szklarki 390 m, Dol. Bętkowska 360 m, Raclawice 400 m, Łazy Jawór 500 m, Bębło 440 m, Wierzchowice 390 m, Ojców 340—400 m, Pazurek 425 m, Michałowka 400 m,

Jura Północna. 22 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 395 m, Domaniewice 320 m, Krzywopłoty 430 m, Kąty koło Ryczówka 360 m, Złożeniec 450 m; pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Podzamecze 480 m, Karlin 390 m, Piecki koło Kromolowa 420 m, Rzędkowice 410 m, Piaseczno 370 m, Podlesice 400 m; pow. Myszków: Leśniów koło Żarek 340 m, Czarny Kamień 360 m, Niegowa 400 m, Mzurów 370 m, Gorzków 350 m, Ludwinów 400 m; pow. Częstochowa: Przemiłowice 330 m, Olsztyn 340 m, Złoty Potok 350 m.

Gatunek pospolity.

273. *Candelariella medians* (Nyl.) A. L. Sm. [= *Candelariella granulata* (Schaer.) A. Zahlbr. = *Caloplaca medians* (Nyl.) Flag.]

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, przeważnie na cypłach, w miejscach użyźnianych przez ptaki w zespole *Candelariella medians-Physcia nigricans*.

Jura Południowa. 18 stan. Pow. Kraków: Tyniec 250 m, Piekary 240 m, Mników 300 m, Dol. Sanki 280 m, Dol. Brzostkiewicza 290 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Dol. Kluczwody 350 m, Dol. Bolechowicka 390 m, Dol. Kobyłańska 400 m; pow. Chrzanów: Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Wierzchowice 390 m, Łazy 500 m, Bębło 440 m, Dol. Bętkowska 400 m, Jerzmanowice 460 m, Ojców 410 m, Pieskowa Skała 420 m, Sułoszowa 440 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Olkusz: Smoleń 440 m.

Gatunek częsty na terenie Jury Południowej, bardzo rzadki na Jurze Północnej. Jest gatunkiem nitrofilnym. W terenie łatwo go pomylić z *Caloplaca decipiens*. Posiada plechę rozetkową, około 0,5—3 cm szeroką, cytrynowożółtą lub szarawożółtawą, K—, w części środkowej ziarnistą i bardziej szarawą. Okazy moje zawsze bez apotecjów. Gatunek ten w ogóle owocuje rzadko.

274. *Candelariella vitellina* (Ehrh.) Müll. Arg.

Na kamieniach krzemianowych, np. na melafirach, krzemieniach, piaskowcach, granitowych głazach polodowcowych, niekiedy na starym drewnie, rzadziej na wapieniach.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Kraków 220 m, Podzamecze koło Tenczyńska 380 m, Piekary 240 m, Dol. Bolechowicka 280 m, Dol. Kobyłańska 360 m; pow. Chrzanów: Tenczynek 290 m, Podłęże koło Okleśnej 270 m; pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Ojców 370 m, Wielmoża 380 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Zawiercie: Podzamecze 470 m, Podlesice 360 m, Zdów 330 m; pow. Myszków: Ludwinów 390 m.

Gatunek częstszy, niżby to wynikało z wykazów stanowisk. Był podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Candelaria vitellina*.

275. *Candelariella xanthostigma* (Pers.) Lettau.

Na korze drzew liściastych, przeważnie na wierzbach i topolach.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Brzezie koło Zabierzowa 250 m, Dol. Kluczwody 280 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 240 m; pow. Olkusz: Ojców 350 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m.

Gatunek rzadki. Zwykle występuje w stanie płonnym i dlatego być może jest przeoczany. Był podany przez F. Błońskiego (1890) jako *Callopusia vitellinum-xanthostigma*.

PARMELIACEAE

Candelaria Mass.

276. *Candelaria concolor* (Dicks.) Stein.

Na korze drzew liściastych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Bolechowice 270 m.

Jura Północna. 1 stan. Częstochowa około 250 m.

Gatunek prawdopodobnie nie rzadki, lecz przeoczany. Był podany przez F. Błońskiego (1890).

Parmeliopsis Nyl.

277. *Parmeliopsis ambigua* (Wulf.) Nyl.

Na korze drzew liściastych i szpilkowych, np. na olchach, bukach, sosnach itp.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Chrzanów: Filipowice 310 m, Dubie 290 m; pow. Olkusz: Ojców 350 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m, Gołaczewy 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 370 m; pow. Myszków: Karlin 390 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m.

278. *Parmeliopsis aleurites* (Ach.) Lettau [= *P. pallescens* (Hoffm.) A. Zahlbr.]

Na korze drzew szpilkowych, zwykle na sosnach. Niekiedy również na gałązkach trzmieliny (*Evonymus verrucosa*), lub na starych płotach.

Jura Południowa. 15 stan. Pow. Kraków: Tyniec 250 m, Dol. Sanki 260 m, Dol. Brzoskwinki 270 m, Dol. Kluczwody 310 m, Dol. Bolechowicka 390 m, Dol. Kobylańska 360 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 260 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m, Dol. Szklarki 390 m, Ojców 370 m, Kolonia Chelmska 420 m, Wolbrom 400 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m, Skalskie koło Olkusza 395 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 360 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m; pow. Karlin; pow. Myszków: Czarny Kamień 370 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m.

Parmelia Ach.

Podrodzaj 1. *Hypogymnia* Nyl.

279. *Parmelia bitteriana* A. Zahlbr.

Na korze sosen razem z *P. physodes* i *P. tubulosa*.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 360 m; pow. Zawiercie: Karlin 390 m, Kroczyce 350 m.

280. *Parmelia physodes* (L.) Ach.

Na korze drzew liściastych i szpilkowych, na starych płotach, słomianych strzechach, niekiedy choć rzadko na mchach porastających skały wapienne.

Jura Południowa. Na wszystkich stanowiskach.

Jura Północna. Na wszystkich stanowiskach.

Jeden z najpospolitszych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nadrzecznych gatunków porostów. Występuje przeważnie w stanie płonnym. Okazy z apotecjami zbierałem w Ojcowie.

281. *Parmelia tubulosa* (Schaer.) Bitt.

Na korze drzew liściastych lub szpilkowych, zwykle na sosnach lub olchach i wierzbach.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Ojców 350 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 350 m; pow. Zawiercie: Karlin 390 m, Podlesice 360 m, Kroczyce 330 m.

Podrodzaj 2. *Menegazzia* (Mass.) Vain.

282. *Parmelia pertusa* (Schränk.) Schaer.

Gatunek podawany z Ojcowia i Pieskowej Skały przez F. Berdaua (1876) i A. Rehmana (1879) jako *Menegazzia terebrata*; ponownie nie odnaleziony. Oglądałem okazy zbierane przez A. Rehmana.

Podrodzaj 3. *Parmelia*

Sekcja 1. *Everniiformes* Hue

283. *Parmelia furfuracea* (L.) Ach.

Na korze sosen, na starych płotach drewnianych.

Jura Południowa. 12 stan. Pow. Kraków: Tyniec 220 m, Cholerzyn 230 m, Mników 260 m, Brzoskwinia 280 m, Tenczynek 280 m, Gacki koło Zabierzowa 300 m; pow. Olkusz: Ojców 350 m, Wolbrom 400 m, Kolonia Chełmska 400 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Zawiercie: Karlin 390 m, Kroczyce 320 m, pow. Myszków: Czarny Kamień 370 m.

Gatunek rozproszony. Był podawany przez W. Jabłońskiego (1872) i K. Filipowicza (1881) jako *Evernia furfuracea*.

Sekcja 2. *Melaenoparmelia* Hue

284. *Parmelia acetabulum* (Neck.) Duby

Na korze drzew liściastych, np. na wierzbach i dębach.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Bielany 230—320 m, Olszanica 330 m; pow. Olkusz: Ojców 350 m.

Gatunek obecnie rzadki. Był podany przez A. Rehmana (1879) jako *Imbricaria acetabulum*.

285. *Parmelia aspera* Mass. [= *P. aspidota* (Ach.) Poetsch; = *P. exasperata* (Ach.) De Not.]

Gatunek podawany z Tomaszowic przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Imbricaria aspera*; dotychczas nie potwierdzony.

286. *Parmelia exasperatula* Nyl.

Na korze drzew liściastych, głównie na wierzbach, kasztanowcach itp., bardzo rzadko na sosnach (rosnących obok dróg, np. na skraju lasów).

Jura Południowa. 26 stan. Pow. Kraków: Zabierzów 260 m, Tyniec 230 m, Rybna 260 m, Mników 260 m, Brzoskwinia 280 m, Dol. Kluczwoły 300 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 240 m, Brodla 260 m, Nielepice 320 m, Dubie 290 m, Tenczynek 280 m, Filipowice 270 m; pow. Olkusz: Racławice 380 m, Jerzmanowice 400 m, Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Kluczwoły 360 m, Wierzchowice 370 m, Ojców 350 m, Kolonia Chelmska 400 m, Wolbrom 400 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 8 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 370 m, Załęże 360 m, Krzywopłaty 370 m, Smoleń 460 m; pow. Zawiercie: Kroczyce 320 m, Podlesice 340 m; pow. Myszków: Gorzków 320 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m.

287. *Parmelia fuliginosa* (Wib.) Nyl.

Na korze drzew liściastych, głównie na wierzbach.

Jura Południowa. 14 stan. Pow. Kraków: Zabierzów 260 m, Bielany 240 m, Przegonia Duchowna 220 m, Rybna 240 m, Chrosna 300 m, Czułówek 240 m, Cholerzyn 220 m, Morawica 240 m, Dol. Sanki 260 m; pow. Chrzanów: Brodla 260 m, Podłęże koło Okleśnej 240 m, Zalas 250 m; pow. Olkusz: Ojców 350 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m.

288. *Parmelia olivacea* (L.) Ach.

Gatunek podawany z Częstochowy i ogólnie z okolic Krakowa przez K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890); dotychczas nie potwierdzony. Prawdopodobnie zaliczali oni do *P. olivacea* wszystkie gatunki rodzaju o brunatnym zabarwieniu plechy. Wolno tak przypuszczać, gdyż nie wymieniają w swych publikacjach tak pospolitych gatunków, jak: *P. exasperatula* i *P. fuliginosa*.

289. *Parmelia subaurifera* Nyl.

Na korze drzew liściastych, np. na grabach, bukach, olchach, dębach, niekiedy też na gałązkach tarniny (*Prunus spinosa*), trzmieliny (*Evonymus verrucosa*) i jałowców (*Juniperus communis*).

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Dol. Kluczwoły 300 m; pow. Chrzanów: Brodla 250 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 350 m, Dol. Szklarki 380 m, Ojców Dol. Saspowska i Dol. Prądnika (masowo) około 350 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok około 340 m.

Gatunek rzadki.

Sekcja 3. *Xanthoparmelia* (Vain.) Hue

290. *Parmelia conspersa* (Ehrh.) Ach.

Na kamieniach krzemianowych, np. na krzemieniach rozrzuconych wśród piasków.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Myszków: Lutowiec 360 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 300–350 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki. Był podawany przez F. Błońskiego (1890).

Sekcja 4. *Hypotrachyna* (Vain.) Hue

291. *Parmelia quercina* (Willd.) Vain.

Gatunek podawany z Modlnicy, Bielani i Ojcowa przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) pod nazwą *Imbricaria tiliacea*; dotychczas nie potwierdzony. Dziś bez obejrzania okazać w nie można stwierdzić, czy nie była to przypadkiem *P. scorteae*.

292. *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.

Na korze drzew liściastych, zwykle na olchach, topolach, brzozech, wierzbach, kasztanowcach, dębach, gruszach itp.

Jura Południowa. 14 stan. Pow. Kraków: Bielany 280 m, Las Wolski koło Krakowa 320 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Brzezie 250 m, Przegonia Narodowa 220 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 240 m, Tenczynek 280 m, Brodla 260 m, Zalas 290 m, Filipowice 340 m; pow. Olkusz: Ojców 350 m, Gołaczewy 400 m, Rabsztyn 400 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 380 m; pow. Częstochowa: Częstochowa około 250 m.

Gatunek dość częsty. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i F. Błońskiego (1890) jako *Imbricaria saxatilis* var. *leucochroa* lub jako *Parmelia saxatilis* var. *retiruga*.

293. *Parmelia sulcata* Tayl.

Na korze drzew liściastych, głównie na wierzbach lub olchach rosnących nad strumieniami i przy drogach.

Jura Południowa. 42 stan. Pow. Kraków: Bielany 240 m, Tyniec 230 m, Przegonia Narodowa 230 m, Mników 260 m, Zabierzów 270 m, Dol. Kluczwody 280 m, Tomaszowice 300 m; pow. Chrzanów: Brodla 260 m, Podłęże koło Okleśnej 240 m, Nielepice 310 m, Zalas 290 m, Czerna 360 m; pow. Olkusz: Wierzchowice 370 m, Jerzmanowice 390 m, Racławice 400 m, Ojców 350 m, Pazurek 400 m, Michałówka 370 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 12 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 380 m, Załęże 360 m, Krzywopłoty 370 m, Smoleń 460 m, Złożeniec 440 m; pow. Zawiercie: Podzamecze 400 m, Ryczów 440 m, Kroczyce 320 m; pow. Myszków: Niegowa 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m, Olsztyn 300 m, Częstochowa około 250 m.

Gatunek pospolity. Był podany przez F. Błońskiego (1890) jako *P. saxatilis* var. *sulcata*.

Sekcja 5. *Amphigymnia* Vain.

294. *Parmelia caperata* (L.) Ach.

Na korze drzew liściastych, np. na dębach, olchach itp.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Olkusz: Ojców Dol. Prądnika 390 m; pow. Chrzanów: Tenczynek 280 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok około 340 m.

Gatunek obecnie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki. Był podawany przez K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890).

295. „*Parmelia perlata*” Ach.

Gatunek podawany z Bielan i Ojcowa przez F. Berdaua (1876), A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Imbricaria perlata*. Nazwa *P. perlata* jest nazwą zbiorową, dzisiaj już nie używaną. Jest bardzo prawdopodobne, że była to *Parmelia cetrarioides*, która jest najpospolitszym gatunkiem z tej grupy. Gatunek dotychczas nie potwierdzony.

Cetraria Ach.

Sekcja 1. *Platysma* (Hoffm.) Körb.

296. *Cetraria chlorophylla* (Willd.) Vain.

Na korze drzew liściastych i szpilkowych, np. na brzozech, bukach, dębach sosnach itp.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Zabierzów 290 m; pow. Olkusz: Gołaczewy 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m, „Januszkowa Góra” koło Olkusza 440 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 380 m; pow. Zawiercie: Kroczyce 320 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m.

297. *Cetraria glauca* (L.) Ach.

Na korze drzew liściastych i szpilkowych, np. na dębach, bukach, brzozech, sosnach (wyjątkowo).

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Skała Kmita 380 m, Dol. Kluczwody 360 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Myszków: Czarny Kamień 370 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m.

298. *Cetraria pinastri* (Scop.) S. Gray.

Na korze drzew szpilkowych, np. na sosnach i świerkach, rzadziej na drzewach liściastych, np. na brzozech zwykle u podstawy pni.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Bielany około 310 m; pow. Chrzanów: Tataruchy koło Tenczyńka 330 m; pow. Olkusz: Skalskie koło Olkusza 400 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Zawiercie: Karlin 390 m, Kroczyce 330 m, Zdów 350 m, pow. Częstochowa: Blachownia i Częstochowa około 250 m.

Gatunek podawany przez H. Lojkę (1868), A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890).

299. *Cetraria saepincola* (Ehrh.) Körb.

Na gałązkach olch, brzoź lub sosen, często na starych płotach.

Jura Południowa. 4 stan. Pow. Kraków: Gacki koło Zabierzowa 300 m, Rybna 250 m; pow. Olkusz: Ojców 360 m, Skalskie koło Olkusza 400 m.

Gatunek znacznie częstszy niżby wynikało z ilości stanowisk. Był podany przez A. Rehmana (1879).

Sekcja 2. *Cetraria*

300. *Cetraria crispa* (Ach.) Nyl. [= *Cetraria tenuifolia* (Retz.) Howe jr.]

Na piaszczystej ziemi w widnych, młodych laskach sosnowych razem z *C. islandica*.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Olkusz: Trzyciąż 390 m, Gołaczewy 400 m, Skalskie 400 m.

Jura Północna. 9 stan. Pow. Zawiercie: Karlin 390 m, Piaseczno 350 m, Morsko 340 m, Podlesice 340 m, Kroczyce 350 m; pow. Myszków: Lutowiec 360 m; pow. Częstochowa: Przemyłowice 310 m, Olsztyn 300 m, Częstochowa około 250 m.

Gatunek podany przez F. Błońskiego (1890) pod nazwą, *C. islandica* var. *crispa*.

301. *Cetraria islandica* (L.) Ach.

Na piaszczystej ziemi, najczęściej w widnych lasach sosnowych. Niekiedy rośnie na szczyrych piaskach razem z *Cornicularia tenuissima*. Rzadko występuje w trawiastych murawach na skałach wapiennych.

Jura Południowa. 21 stan. Pow. Kraków: Bielany 240 m, Tyniec 230 m, Piekary 230 m, Ściejowice 240 m, Czernichów 230 m, Przeginia Duchowna 250 m, Kryspinów 250 m, Brzoskwinia 270 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Chrzanów: Zalas 300 m, Tata-ruchy 300 m, Tenczynek 280 m, Podłęże koło Okleśnej 250 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m, Ojców 400 m, Gołaczewy 400 m, Trzyciąż 400 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m, Klucze 380 m.

Jura Północna. 15 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 360 m, Załęże 360 m, Krzywopłoty 380 m, Ryczówek 380 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m, Podzamcze 450 m, Karlin 390 m, Piaseczno 350 m, Podlesice 340 m, Morsko 340 m, Kroczyce 320 m; pow. Myszków: Mirów 360 m, Niegowa 360 m, Lutowiec 360 m; pow. Częstochowa: Olsztyn około 300 m.

Gatunek bardzo pospolity.

USNEACEAE

Evernia Ach.

302. *Evernia divaricata* (L.) Ach. [= *Letharia divaricata* (L.) Hue]

Gatunek podany z Ojcowa (z gałęzi drzew) przez A. Rehmana (1879); dotychczas nie potwierdzony.

303. *Evernia prunastri* (L.) Ach.

Na korze drzew liściastych, często na wierzbach i topolach, niekiedy po starych płotach.

Jura Południowa. 19 stan. Pow. Kraków: Bielany 280 m, Mników 270 m, Dol. Sanki 260 m, Brzoskwinia 280 m, Dol. Kluczwoły 300 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Chrzanów: Tenczynek 280 m, Dubie 290 m, pow. Olkusz: Szklary 380 m, Raclawice 390 m, Dol. Bętkowska 350 m, Ojców 350 m, Gołaczewy 400 m, Pazurek 400 m, Rabsztyn 380 m, Sułoszowa 400 m, Klucze 370 m, Wielmoża 380 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: Załęże 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Częstochowa około 250 m.

Gatunek pospolity na terenie obu okręgów. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890).

Alectoria Ach.

[*Alectoria jubata* (L.) Ach.

Gatunek podawany błędnie z Podskalania i Ojcowa przez H. Lojkę (1868), A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) jako *Bryopogon jubatum*. Prawdziwa *A. jubata* występuje tylko w wysokich górach i nie schodzi poniżej dolnej granicy regla górnego (Motyka 1958 w rękopisie).]

304. *Alectoria positiva* (Gyeln.) Mot. (det. J. Motyka)

Na korze drzew np. na samotnie rosnących gruszech po miedzach polnych. Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Rabsztyn 420 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki. Plecha zwisająca, grubo nitkowata do nitkowato-krzaczkowatej, miedziano- lub oliwkobrunatna, rzadko o brodatym wygładzie. Gałązki grubości do 0,5 mm lub grubsze, bardzo nieregularne pokrzywione. Soralia podłużnie szczelinkowate. Plecha K—, KCl—, Cl—, Pd + początkowo żółta, po chwili czerwona.

[*Alectoria proluxa* (Ach.) Nyl.

Gatunek podany błędnie ze Złotego Potoku i Częstochowy przez F. Błońskiego (1890) jako *Bryopogon jubatum* var. *proluxum*. Prawdziwa *A. proluxa* rośnie wyłącznie w lasach górnoreglowych (J. Motyka 1958 w rękopisie).]

305. *Alectoria subcana* (Nyl.) Gyl. (det. J. Motyka)

Na korze drzew liściastych, np. na dębach, brzozech, olchach itp.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Dol. Kluczwody 360 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Olkusz: Smoleń 360 m; pow. Częstochowa: Dębowiec koło Biskupic 270 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki. Plecha zwisająca, kłaczkowata lub sztywna, szarobiaława, brunatnawa lub ruda, ślisma. Gałązki grubości około 0,3—0,5 mm, obłe lub dość wyraźnie zniekształcone. Soralia rozwinięte tylko na dorodnych okazach, brodawczkowate. Gatunek bardzo zmienny pod względem reakcji barwnych. Okazy moje K + żółte, Pd + żółte.

Cornicularia (Schreb.) Rebert.

306. *Cornicularia tenuissima* (Vain.) A. Zahlbr. [= *C. aculeata* (Schreb.) Ach.]

Na piaszczystej ziemi w lasach sosnowych; bardzo często rośnie na szczerych piaskach.

Jura Południowa. 13 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Piekary 230 m, Ściejowice 240 m, Czernichów 250 m, Dol. Sanki 270 m, Przeginia Narodowa 250 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 250 m, Tataruchy 300 m; pow. Olkusz: Trzyciąż 400 m, Gołaczewy 400 m, Pazurek 390 m, Rabsztyn 400 m, Skalskie koło Olkusza 400 m, Klucze 380 m.

Jura Północna. 19 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 360 m, Załęże 360 m, Krzywopłoty 370 m, Złożeniec 430 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m, Srubarnia 450 m, Podzamecze 460 m, Piaseczno 340 m, Podlesice 350 m, Kroczyce 320 m, Karlin 390 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 360 m, Czarny Kamień 370 m, Lutowiec 360 m, Gorzków 320 m, Ludwinów 350 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 300 m, Częstochowa około 250 m.

Gatunek pospolity. Był podawany przez K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890).

Ramalina Ach.

[*Ramalina calicaris* (L.) Röhl.

Gatunek podawany błędnie z Modlnicy przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879). Prawdziwa *R. calicaris* znana jest tylko ze Skandynawii (wiadomość od prof. dra J. Motyki).]

307. *Ramalina farinacea* (L.) Ach.

Na korze drzew liściastych, zwykle na wierzbach i topolach.

Jura Południowa. 10 stan. Pow. Kraków: Przeginia Narodowa 220 m, Brzoskwinia 280 m, Brzezie koło Zabierzowa 250 m, Dol. Kluczwoły 280 m, Bolechowice 270 m, Kobylany 300 m; pow. Chrzanów: Filipowice 340 m, Dubie 290 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Ojców 340 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok około 340 m.

Gatunek dość częsty. Był podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881). Występuje przeważnie we formie *f. luxurians* Berher.

308. *Ramalina fraxinea* (L.) Ach.

Gatunek podawany z Ojcowa, Bielan, Mnikowa, Modlnicy, Czernej i Częstochowy przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872), A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890) ponownie nie odnaleziony. Oglądałem okazy zbierane przez A. Rehmana, a należące do odmiany *var. ampliata* Ach. Do tej samej odmiany należą okazy eksykatu Elenkina nr 12 pochodzące z Ojcowa.

309. *Ramalina fastigiata* (Liljeb.) Ach. [= *R. populina* (Hoffm.) Vain.]

Na korze drzew liściastych, np. na topolach, wierzbach, grabach itp.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców 350 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki. Był podany przez A. Rehmana (1879) pod nazwą *R. calicaris var. fastigiata*,

310. *Ramalina intermedia* Del. (det. J. Motyka).

Na pionowych, zwykle ocienionych lub eksponowanych na półnec skałach wapienia jurajskiego, w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*.

Jura Południowa. 9 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzoskwinki 280 m, Dol. Kluczwoły 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Chrzanów: Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Łazy Jawór 480 m, Jerzmanowice 440 m, Ojców 390 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Olkusz: wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 460 m; pow. Zawiercie: Podzamcze 480 m, Karlin 400 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej. Łatwo go pomylić z *Ramalina pollinaria*, od której różni się między innymi grubo ziarnistymi solediami (u *R. pollinaria* soledia są mączyste).

311. *Ramalina obtusata* (Arn.) Bitter (det. J. Motyka)

Na korze drzew liściastych, np. na topolach, wierzbach itp.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Olkusz: Ojców 350 m.

Gatunek na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej bardzo rzadki. Pokrojem plechy zbliżony jest do *Ramalina baltica* Lettau. Oba gatunki przez wielu lichenologów są łączone razem pod jedną nazwą.

312. *Ramalina pollinaria* (Westr.) Ach.

Na korze drzew liściastych.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Modlnica 300 m; pow. Olkusz: Złoty Potok około 330 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m.

Gatunek obecnie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki. Zbierałem go w odmianie var. *humilis* Ach., która posiada drobną plechę.

Usnea G. H. Web., em. Ach.

[*Usnea barbata* (L.) Wigg., em. Mot.

Gatunek podany błędnie z Podskalania koło Modlnicy przez H. Lojkę (1868). Prawdziwa *U. barbata* znana jest tylko ze Skandynawii (J. Motyka 1936—38).]

313. *Usnea dasypoga* (Ach.) Röhl., em. Mot.

Na korze drzew, np. na dębach.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Dol. Kluczwody 370 m; pow. Olkusz: Ojców około 340—420 m.

Gatunek obecnie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej bardzo rzadki. Był podany przez K. Filipowicza (1881) jako *U. barbata* var. *dasypoga*.

314. *Usnea faginea* Mot.

Gatunek podany z Tomaszowic i Ojcowa przez J. Motykę na podstawie okazów H. Lojki i A. Rehmana; obecnie nie odnaleziony.

315. *Usnea florida* (L.) Wigg.

Gatunek podawany z Ojcowa, Złotego Potoku, Olsztyna, Blachowni i Częstochowy przez A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890) jako *U. barbata* var. *florida*; dotychczas nie odnaleziony. Od prof. dra J. Motyki uzyskałem wiadomość, że istnieje eksykat Elenkina nr 5 zawierający okazy tego gatunku zbierane w Ojcowie.

316. *Usnea glauca* Mot.

Gatunek podany z Ojcowa przez J. Motykę (1936—38) na podstawie okazów K. Filipowicza; obecnie już nie odnaleziony.

317. *Usnea hirta* (L.) Wigg., em. Mot.

Na korze drzew szpilkowych, np. na sosnach.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Podskalanie koło Modlnicy 300 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Dębowiec koło Biskupic 270 m.

Gatunek obecnie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki. Był podany przez H. Lojkę (1868) jako *U. barbata* var. *hirta*.

Protoblastenia (A. Zahlbr.) Steiner318. *Protoblastenia calva* (Dicks.) A. Zahlbr.

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w miejscach nasłonecznionych, w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzaskwinki 280 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 380 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Ojców 370 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Przemyłowie 330 m.

Gatunek rzadki na terenie Jury Południowej i bardzo rzadki na Jurze Północnej. Był podany przez K. Filipowicza (1884) jako *Biatora rupestris* var. *calva*. Istnieją pewne wątpliwości, czy rzeczywiście okazy moje należą do tego gatunku. Różnią się one nieco od okazów pienińskich i tatrzańskich. Z drugiej strony można się spodziewać u *Protoblastenia calva* podobnie dużej zmienności, jak u *P. rupestris* i *P. incrustans*. Okazy moje posiadają plechę cienką lub zanikającą, endolityczną, białą. Apotecja szer. około 0,6—1 1,5 mm, silnie uwypuklone, ceglastoczerwone.

319. *Protoblastenia incrustans* (DC.) Steiner.

Na pionowych, urwistych, gładkich i silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Mników 280 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Dol. Sanki 280 m, Dol. Brzaskwinki 280 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kluczwody 310 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Szklarki 400 m, Łazy Jawór 470 m, Ojców 380 m.

Gatunek rozproszony. Rośnie tylko na terenie Jury Południowej.

320. *Protoblastenia rupestris* (Scop.) Steiner.

Na pionowych skałach wapienia jurajskiego, najczęściej w miejscach nieco cienistych.

Jura Południowa. 40 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Tyniec 230 m, Rybna 300 m, Dol. Brzaskwinki 290 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kluczwody 300 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Brodła 260 m, Tenczynek 290 m, Kamyk 330 m, Filipowice 300 m, Dubie 290 m; pow. Olkusz: Jerzmanowice 440 m, Dol. Bętkowska 380 m, Łazy 490 m, Bębło 430 m, Ojców 380 m, Sułoszowa 400 m, Michałówka 390 m, Rabsztyn 420 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 17 stan. Pow. Olkusz: Domaniewice 320 m, Krzywopłoty 400 m, Żłożeniec 440 m, Smoleń 480 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m, Piecki koło Kromołowa 420 m, Piaseczno 350 m, Rzędkowice 410 m, Podlesice 350 m, Zdów 330 m, Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Mirów 380 m, Niegowa 380 m, Gorzków 350 m; pow. Częstochowa: Olsztyn: 340 m, Przemyłowie 330 m, Złoty Potok 350 m.

Gatunek bardzo pospolity. Był podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Biatora rupestris*.

Blastenia Mass.

321. *Blastenia ochracea* (Schaer.) Trevis. [= *Caloplaca ochracea* (Schaer.) Flag., = *Xantocarpia ochracea* (Schaer.) Mass.]

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Podskalany koło Modlnicy 300 m, Dol. Bolechowicka 360—390 m.

Gatunek bardzo rzadki. Był podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879). Okazy moje są identyczne z okazami eksykatu Rabenhorsta nr 437. Posiadają zarodniki 4-komórkowe (rzadko 2- lub 3-komórkowe), 12—15 × 5—8 μ .

Fulgensia Mass.

322. *Fulgensia bracteata* (Hoffm.) Räs.

Na humusie i szczątkach roślinnych w szczelinach skał wapiennych.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Przegorzały około 270 m.

Gatunek bardzo rzadki. Okazy moje nie posiadają apotecjów podobnie jak okazy z Pienin i Tatr.

Caloplaca Th. Fr.

Sekcja 1. *Caloplaca*

323. *Caloplaca arenaria* (Pers.) Müll. Arg. (det. dr. J. Poelt)

Na silnie nasłonecznionych, eksponowanych na południe skałach wapienia jurajskiego.

Jura Południowa. 1 stan. Pow. Kraków: Dol. Kobylańska 380 m (masowo).

Gatunek bardzo rzadki. Okazy moje nie posiadają apotecjów. Plecha niebieskawoszara lub ołowianoszara, K—, Cl—, pośrodku ziarnistobrodawkowata i soreumatycznie się rozsypująca, ku obwodowi cieńsza i złożona z prawie promienisto ułożonych areoli.

[*Caloplaca aurantiaca* (Ligthf.) Th. Fr.

Gatunek podany błędnie z Tomaszowie przez H. Lojkę (1868) i W. Jabłońskiego (1872). Za czasów Lojki pod nazwą *C. aurantiaca* rozumiano wiele różnych form uważanych dzisiaj za osobne gatunki. Jednym z nich jest, np. pospolita na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, *Caloplaca coronata*.]

324. *Caloplaca cerina* (Ehrh.) Th. Fr.

Gatunek podawany z Ojcowa z kory drzew przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881); obecnie nie odnaleziony. Oglądałem okazy A. Rehmana.

325. *Caloplaca chalybaea* (Fr.) Müll. Arg.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, najobficiej na płaszczyznach pionowych w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 40 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Tyniec 240 m, Skała

Kmity koło Zabierzowa 270 m, Przeginia Duchowna 290 m, Rybna 300 m, Mników 280 m, Dol. Kobylańska 370 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Podskalany 300 m, Januszowice 290 m; pow. Chrzanów: Nielepice 340 m, Dubie 300 m, Podłęże koło Okleśnej 280 m; pow. Olkusz: Raławice 400 m, Łazy Jawór 500 m, Bębło 440 m, Ojców 390 m, Michałówka 390 m, Sułoszowa 430 m, Pazurek 420 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 18 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 410 m, Kąty koło Ryczówka 360 m, Dłużec 395 m, Smoleń 485 m, Złożeniec 450 m; pow. Zawiercie: Podzamcze 480 m, Ryczów 450 m, Srubarnia 460 m, Karlin 400 m, Piaseczno 360 m, Podlesice 390 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 390 m, Mzurów 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 340 m, Przemiłowice 320 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek bardzo pospolity na terenie Jury Południowej, częsty na Jurze Północnej. Był podany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i K. Filipowicza (1881) jako *Pyrenodesmia chalybaea* lub *Callopisma chalybaeum*.

326. *Caloplaca citrina* (Hoffm.) Th. Fr.

Na skałach wapiennych zarówno w miejscach nasłonecznionych, jak i ocienionych, pionowych i poziomych, zwykle najobficiej w zespole *Candelariella medians-Physcia nigricans*. Rośnie również na zaprawie murarskiej, betonie, np. na słupkach kilometrowych itp.

Jura Południowa. 13 stan. Pow. Kraków: Tyniec 250 m, Mników 270 m, Dol. Brzaskwinki 280 m, Dol. Kluczwody 280 m, Dol. Bolechowicka 360 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 390 m, Bębło 410 m, Zelków 370 m, Łazy 470 m, Dol. Bętkowska 340 m, Ojców 350 m, Saspów 400 m, Pazurek 400 m.

Jura Północna. 26 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 390 m, Krzywopłoty 420 m, Smoleń 480 m; pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Srubarnia 450 m, Podzamcze 490 m, Rzędkowice 410 m, Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Lutowiec 400 m, Gorzków 380 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 330 m, Przemiłowice 320 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej i bardzo pospolity na Jurze Północnej. Jest bardzo zróżnicowany pod względem morfologicznym. Prawdopodobnie należą tu upodabniające się formy różnych gatunków, których właściwa przynależność systematyczna jest trudna do określenia i wymaga dopiero badań (według wiadomości listownej od dra J. Poelta — München).

327. *Caloplaca coronata* (Krph.) Stnr. [= *C. aurantiaca* var. *coronata* (Krph.) Jatta]

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, najczęściej w partiach podszczytowych na płaszczyznach poziomych w zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*.

Jura Południowa. 21 stan. Pow. Kraków: Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Przeginia Duchowna 300 m, Dol. Brzaskwinki 290 m, Mników 290 m, Dol. Sanki 300 m, Dol. Kluczwody 380 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 400 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Nielepice 340 m, Dubie 310 m; pow. Olkusz: Raławice 400 m, Szklary 400 m, Wierzchowie 400 m, Bębło 440 m, Dol. Bętkowska 390 m, Łazy Jawór 500 m, Jerzmanowice 450 m, Ojców 400 m, Pieskowa Skała 420 m, Sułoszowa 440 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej. Jeżeli występuje na Jurze Północnej, to jest tam bardzo rzadki. Okazy moje zawsze obficie owocują w przeciwieństwie do okazów pienińskich, które bardzo rzadko wykształcają apotecja.

328. *Caloplaca dolomiticola* (Hue) A. Zahlbr. [= *C. placidia* (Mass.) Stnr., = *C. velana* (Mass.) DR. (det. dr. J. Poelt)]

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego zarówno na płaszczynach pionowych, jak i poziomych, np. w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*, zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*, zespole *Caloplaca murorum-Lecanora pruinosa* itd.

Jura Południowa. 42 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Tyniec 240 m, Przegonia Duchowna 300 m, Mników 300 m, Dol. Brzozkinki 290 m, Dol. Kobyłańska 380 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Chrzanów: Brodła 270 m, Podłęże koło Okleśnej 290 m, Tataruchy koło Tenczyna 310 m, Nielepice 340 m, Czarna 400 m, Dubie 290 m; pow. Olkusz: Racławice 400 m, Jerzmanowice 460 m, Dol. Bętkowska 380 m, Łazy Jawór 500 m, Bębło 440 m, Ojców 370 m, Pieskowa Skała 390 m, Michałówka 380 m, Klucze 400 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 30 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 390 m, Krzywopłoty 430 m, Smoleń 480 m; pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Podzamcze 490 m, Karlin 400 m, Piaseczno 360 m, Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Mirów 380 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Mzurów 350 m, Ludwinów 400 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 340 m, Przymiłowice 320 m (stanowiska są wymienione przykładowo).

Gatunek bardzo pospolity na terenie obu okręgów. Posiada bardzo zmienną plechę. Jak pisze mi w liście dr. J. Poelt (München), jest to wynikiem tego, że różne części plechy są zżerane przez rozmaite gatunki owadów lub ślimaków (jedne zwierzęta żerują w warstwie korowej, inne uszkadzają warstwę gonidialną, rdzeniową, hymenium lub całe apotecja), a następnie „organa” te regenerują. W zależności od tego, który „organ” był nadgryzany i regenerował, najprzeróżniejsze mogą być postacie całej plechy. Istotnie prawie wszystkie moje okazy noszą ślady po owadach.

[*Caloplaca festiva* (Fr.) Zw.

Gatunek podawany błędnie ze skał wapiennych z Ojcowa przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Blastenia ferruginea* var. *saxicola* lub jako *Callopisma ferrugineum* var. *saxicolum*. Obaj autorzy mogli mieć na uwadze inny, wapieniolubny pospolity na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej gatunek, u którego krążki apotecjów są rdzawoczerwone. Posiada on plechę białawą, endolityczną. Jego przynależności systematycznej nie udało się na razie ustalić.]

329. *Caloplaca flavovirescens* (Wulf.) Dalla Torre et Sarnth.

Gatunek podawany przez A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890) jako *Callopisma aurantiacum* var. *flavovirescens* lub jako *Callopisma aurantiacum* f. *erythrella*. Prawdopodobnie zbierali obaj pospolitą na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, *Caloplaca dolomiticola*. Zresztą nie jest wykluczone, że i prawdziwa *C. flavovirescens* może być tu w przyszłości odnaleziona.

330. *Caloplaca lactea* (Mass.) Th. Fr.

Na skałach wapienia jurajskiego, zwykle w miejscach silnie nasłonecznionych, w partiach szczytowych i podszczytowych.

Jura Południowa. 24 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Piekary 230 m, Przeginia Duchowna 300 m, Rybna 290 m, Dol. Brzoskwinki 280 m, Mników 290 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Dol. Kluczwody 280 m, Dol. Bolechowiecka 380 m, Dol. Kobylańska 390 m; pow. Chrzanów: Dubie 300 m; pow. Olkusz: Wierzchowie 380 m, Bębło 440 m, Szklary 410 m, Dol. Bętkowska 380 m, Łazy Jawór 500 m, Jerzmanowice 460 m, Ojców 380 m, Pieskowa Skała 390 m, Wielmoża 390 m, Michałówka 390 m, Pazurek 320 m, Rabsztyn 340 m.

Jura Północna. 18 stan. Pow. Olkusz: Ryczówek 370 m, Smoleń 480 m, Złożeniec 460 m; pow. Zawiercie: Piecki koło Kromolowa 420 m, Rzędkowice 410 m, Podlesice 400 m, Zdów 360 m; pow. Myszków: Mirów 380 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Czarny Kamień 380 m, Lutowiec 400 m, Niegowa 390 m, Mzurów 380 m, Gorzków 350 m, Ludwinów 400 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Przymilowice 330 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek pospolity na terenie obu okręgów.

331. *Caloplaca lithophila* H. Magn.

Na kamieniach krzemianowych, np. na piaskowcach.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Dol. Kobylańska 340 m; pow. Chrzanów: Raclawice ok. 360 m.

332. *Caloplaca pyracea* (Ach.) Th. Fr.

Na korze drzew liściastych, np. na brzozach, wierzbach, wiśniach itp., często też na starym drewnie, np. na parkanach.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Cholerzyn 220 m, Modlnica 300 m, Podskalany 300 m, Dol. Kluczwody 380 m; pow. Olkusz: Biały Kościół 400 m, Ojców 350 m, Sułoszowa 420 m, Pieskowa Skała 370 m.

Jura Północna. 6 stan. Pow. Olkusz: Nowa Łąka koło Wolbromia 370 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m; pow. Myszków: Kotowice 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Janów 280 m, Olsztyn 300 m.

Gatunek rozproszony. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872), A. Rehmana (1879) i F. Błońskiego (1890) jako *Callopisma pyraceum* lub *Caloplaca luteoalba* Körb. (non Th. Fr. = *Candelariella luteoalba*)

var. cfr. *pyrithroma* (Ach.) Flag. (det. J. Poelt — München).

Na skałach wapiennych w miejscach nasłonecznionych, np. w zespole *Candelariella medians-Physcia nigricans*, zespole *Dermatocarpon monstrosus-Buellia venusta*, zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelniki* itp.

Jura Południowa. 14 stan. Pow. Kraków: Tyniec 350 m, Bielany 270 m, Kryspinów 250 m, Przeginia Duchowna 310 m, Skały Twardowskiego koło Krakowa 230 m, Dol. Kluczwody 380 m, Dol. Bolechowiecka 390 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 290 m, Obora koło Żalasa 350 m; pow. Olkusz: Łazy Jawór 500 m, Dol. Bętkowska 400 m, Raclawice 400 m, Ojców 340—410 m, Sępów 400 m, Pieskowa Skała 420 m.

Jura Północna. 22 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 395 m, Smoleń 485 m, Złożeniec 460 m; pow. Zawiercie: Podlesice 400 m, Podzamcze 470 m, Karlin 410 m, Piecki koło Kromolowa 420 m, Rzędkowice 420 m, Piaseczno 370 m, Kajetanów 460 m, Kroczyce 340 m, Zdów 350 m; pow. Myszków: Leśniów koło Żarek 340 m, Czarny Kamień 370 m, Lutowiec

390 m, Mzurów 380 m, Gorzków 320 m, Mirów 370 m, Ludwinów 400 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 350 m, Przyimiłowice 330 m.

Odmiana na terenie Jury Południowej częsta, na Jurze Północnej pospolita.

333. *Caloplaca stillicidiorum* (Vahl.) Lynge.

Na mchach i szczątkach roślinnych w szczelinach skał wapiennych, zwykle w miejscach silnie nasłonecznionych.

Jura Południowa. 32 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Bielany 270 m, Kryspinów 240 m, Piekary 240 m, Przeginia Duchowna 280 m, Rybna 290 m, Mników 290 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Dol. Brzostkiewicza 290 m, Dol. Kobyłańska 380 m, Dol. Bolechowicka 390 m, Dol. Kluczwody 300 m, Tomaszowice 300 m, Podskalany 300 m, Januszowice 300 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Nielepice 340 m, Dubie 300 m; pow. Olkusz: Żelków 380 m, Wierchowice 390 m, Racławice 400 m, Jerzmanowice 460 m, Szklary 410 m, Dol. Bętkowska 380 m, Łazy 500 m, Bębło 440 m, Sułoszowa 430 m, Pazurek 425 m, Rabsztyn 400 m, Klucze 400 m.

Jura Północna. 20 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłoty 420 m, Kąty koło Ryczówka 380 m, Smoleń 480 m, Złożeniec 450 m; pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Srubarnia 450 m, Karlin 410 m, Piecki koło Kromiowa 420 m, Piaseczno 360 m, Podlesice 400 m, Kroczyce 330 m, Zdów 360 m; pow. Myszków: Mirów 350 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Niegowa 390 m, Mzurów 350 m, Gorzków 380 m; pow. Częstochowa: Żłoty Potok 350 m, Olsztyn 340 m, Przyimiłowice 320 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej i częsty na terenie Jury Północnej. Był podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Caloplaca cerina* var. *stillicidiorum*.

334. *Caloplaca variabilis* (Pers.) Müll. Arg.

Na skałach wapiennych, zwykle w miejscach nasłonecznionych.

Jura Południowa. 26 stan. Pow. Kraków: Bielany 280 m, Kryspinów 250 m, Tyniec 240 m, Piekary 240 m, Przeginia Duchowna 290 m, Mników 280 m, Dol. Brzostkiewicza 280 m, Dol. Kluczwody 300 m, Podskalany 300 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobyłańska 390 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Obora koło Żalasa 340 m, Kamyk 330 m, Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Wierchowice 390 m, Dol. Bętkowska 370 m, Łazy 450 m, Bębło 430 m, Szklary 410 m, Racławice 400 m, Ojców 360 m, Pieskowa Skała 390 m, Sułoszowa 420 m, Michałowka 380 m, Rabsztyn 420 m.

Jura Północna. 17 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 390 m, Domaniewice 320 m, Krzywopłoty 420 m, Smoleń 470 m, Złożeniec 450 m; pow. Zawiercie: Ryczów 480 m, Piecki koło Kromiowa 420 m, Piaseczno 360 m, Podlesice 400 m, Zdów 360 m, Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Mirów 380 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Lutowiec 390 m, Niegowa 360 m; pow. Częstochowa: Żłoty Potok 350 m, Przyimiłowice 320 m.

Gatunek pospolity na terenach obu okręgów. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872), A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) jako *Pyrenodesmia variabilis*.

Sekcja 2. *Gusparrinia* (Torn.) Th. Fr.

335. *Caloplaca aurantia* (Pers.) Hellb.

Na pionowych, zwykle silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w partiach szczytowych i podszczytowych.

Jura Południowa. 21 stan. Pow. Kraków: Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m,

Tyniec 240 m, Dol. Brzoskwinki 270 m, Mników 280 m, Dol. Kluczwoły 300 m, Dol. Bolechowska 380 m; pow. Chrzanów: Kamyk 320 m, Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 380 m, Łazy 490 m, Dol. Szklarki 400 m, Raclawice 400 m, Ojców 380 m, Sułoszowa 430 m, Pieskowa Skała 410 m, Michałówka 390 m, Pazurek 410 m (masowo), Rabsztyn 445 m (masowo), „Januszkowa Góra” koło Olkusza 445 m (masowo), Klucze 400 m.

Jura Północna. 9 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 395 m (masowo), wzgórze „Grodzisko” koło Smolenia 450 m; pow. Zawiercie: Podzamcze 480 m, Ryczów 460 m, Podlesice 400 m, Kroczyce 330 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Lutowiec 390 m (masowo).

Gatunek częsty na terenie Jury Południowej, rozproszony na Jurze Północnej. Okazy moje prawie zawsze posiadają rozwinięte apotecja i zarodniki w przeciwieństwie do okazów pienińskich, które przeważnie nie owocują.

336. *Caloplaca cirrochroa* (Ach.) Th. Fr.

Na pionowych, zwykle silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, u podstawy w zespole *Lecania erysibe-Verrucaria policensis*, zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii* oraz w zespole *Caloplaca murorum-Lecanora pruinosa*.

Jura Południowa. 32 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Januszowice 290 m, Piekary 240 m, Mników 280 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Przegonia Duchowna 270 m, Dol. Bolechowska 370 m; pow. Chrzanów: Podłże koło Okleśnej 280 m, Nielepice 340 m, Dubie 290 m; pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Dol. Bętkowska 380 m, Wierchowice 380 m, Ojców 370 m, Pieskowa Skała 410 m, Sułoszowa 430 m, Michałówka 380 m, Rabsztyn 420 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 29 stan. Pow. Olkusz: Kąty koło Ryczówka 360 m, Smoleń 480 m, Złożeniec 440 m; pow. Zawiercie: Ryczów 460 m, Srubarnia 450 m, Podzamcze 490 m, Karlin 410 m, Piecki koło Kromiowa 420 m, Podlesice 400 m; pow. Myszków: Mirów 380 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Mzurów 350 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 340 m, Przyłłowice 320 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Gatunek pospolity na terenie obu okręgów. Był podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) jako *Amphiloma cirrochroa* lub jako *Gasparrinia cirrochroa*.

337. *Caloplaca decipiens* (Arn.) Jatta.

Na nasłonecznionych lub ocienionych skałach wapiennych, nierzadko też na betonie i starych murach.

Jura Południowa. 30 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Tyniec 250 m, Przegonia Duchowna 300 m, Mników 290 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 290 m, Dol. Bolechowska 380 m, Dol. Kluczwoły 300 m, Zielonki 250 m; pow. Chrzanów: Podłże koło Okleśnej 280 m, Nielepice 340 m, Dubie 300 m, pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Jerzmanowice 460 m, Dol. Bętkowska 380 m, Bębło 440 m, Ojców 380 m, Pazurek 420 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 22 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 390 m, Smoleń 480 m, Krzywopłoty 420 m, Złożeniec 440 m; pow. Zawiercie: Ryczów 470 m, Srubarnia 450 m, Podzamcze 490 m, Karlin 410 m, Rzędkowice 410 m, Piaseczno 360 m, Podlesice 400 m, Kroczyce 330 m, Zdów 360 m; pow. Myszków: Mirów 380 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Niegowa 380 m, Mzurów 350 m, Ludwinów 400 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 340 m, Przyłłowice 330 m.

Gatunek pospolity na terenie obu okręgów. Owocuje rzadko. Często zbierałem go we formie *f. compacta* (Malbr.) A. Zahlbr.

338. *Caloplaca murorum* (Hoffm.) Th. Fr.

Na pionowych skałach wapiennych, zwykle u ich podstawy zarówno w miejscach silnie nasłonecznionych, jak i cienistych.

Jura Południowa. 34 stan. Pow. Kraków: Tyniec 250 m, Mników 270 m, Przeginia Duchowna 280 m, Dol. Brzostkiewicza 280 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Dol. Bolechowska 370 m, Tomaszowice 300 m, Januszowice 290 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Tenczynek 290 m, Dubie 290 m; pow. Olkusz: Raławice 400 m, Jerzmanowice 450 m, Dol. Bętkowska 370 m, Bębło 440 m, Ojców 370 m, Michałowka 380 m, Pazurek 410 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 13 stan. Pow. Olkusz: Krzywopłaty 400 m, Dłużec 390 m, Smoleń 480 m; pow. Zawiercie: Podzamcze 480 m, Podlesie 380 m, Kroczyce 330 m, Zdów 340 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Leśniów koło Żarek 340 m, Lutowiec 380 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 360 m, Olsztyn 340 m, Przemyłowice 330 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej, rozproszony na Jurze Północnej. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872), A. Rehmana (1879), K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890) jako *Amphiloma murorum* lub *Gasparrinia murorum*. Posiada duży stopień zmienności. Zbierałem między innymi następujące formy (podaję za J. Poeltm):

f. discernenda (Nyl.) [= *Caloplaca discernenda* (Nyl.) A. Zahlbr.]

Posiada plechę zredukowaną do $\pm$ brodawkowatych łusek. Nielepice 340 m, Dol. Brzostkiewicza 280 m, Ojców 360 m;

f. pulvinata (Mass.) (det. J. Poelt)

Pieskowa Skała 380 m, Dol. Kluczwody 280 m;

f. tegularis (Ehrh.) [= *C. tegularis* (Ehrh.) Sandst.]

Posiada drobną plechę, szerokości około 0,5—1 cm. Krążki apotecjów małe, żywo pomarańczowoczerwone. Łatki różowawopomarańczowe, dość gęsto biało przyprószone. Dol. Kluczwody 350 m, Dol. Bętkowska 360 m, Ojców 360 m;

f. pusilla (Trev.)

Posiada plechę większą o szerszych apotecjach.

Niektórych form nie udało się zidentyfikować. Możliwe, że posiadane okazy należą do form: *f. aurantia*, *f. radiata*, *f. subcitrina*.

339. *Caloplaca xantholyta* Jatta.

Na pionowych, suchych, eksponowanych na północ lub ocienionych skałach wapienia jurajskiego; u podstawy w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*, zespole *Ionaspis epulotica* oraz w zespole *Polyblastia papularis-Arthopyrenia conoidea*.

Jura Południowa. 19 stan. Pow. Kraków: Skała Kmity koło Zabierzowa 260 m, Tyniec 230 m, Przeginia Duchowna 270 m, Rybna 270 m, Dol. Brzostkiewicza 270 m, Mników 270 m, Dol. Kluczwody 280 m, Dol. Bolechowska 360 m, Dol. Kobylańska 360 m; pow. Chrzanów: Brodla 260 m, Dol. Raławki 350 m, Kamyk 320 m; pow. Olkusz: Wierz-

chowcie 370 m, Dol. Bętkowska 360 m, Dol. Szklarki 380 m, Ojców 340—400 m, Wielmoża 380 m, Pieskowa Skała 370 m, Sułoszowa 430 m, Sępów 400 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Zawiercie: Podlesice 360 m; pow. Myszków: Mirów 360 m, Gorzków 370 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek dość częsty na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej. Występuje zawsze w stanie płonnym. Plecha skorupiasto-proszkowata, pomarańczowożółta lub jasnopomarańczowa (nigdy nie jest cytrynowożółta), K + czerwona, złożona z bardzo drobnych ziarenek, szerokości około 0,05 mm.

TELOSCHISTACEAE

Xanthoria Th. Fr.

340. *Xanthoria candelaria* Arn.

Na korze drzew liściastych, np. na brzozech, robiniach itp. Niekiedy rośnie też na skałach wapiennych, na cyplach użyźnianych przez ptaki, w zespole *Candelariella medians-Physcia nigricans*:

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Bolechowice 270 m; pow. Chrzanów: Bażaniarnia koło Tenczynka 270 m; pow. Olkusz: Łazy 500 m, Sułoszowa 440.

341. *Xanthoria elegans* (Link.) Th. Fr. [= *Caloplaca elegans* (Link.) Zw.]

Na skałach wapiennych, w miejscach silnie nasłonecznionych, niekiedy na warstwie mchów naskalnych, także na betonie, np. na słupkach kilometrowych.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Skały Twardowskiego koło Krakowa 230 m, Tyniec 240 m, Januszowice 280 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 260 m, Rudawa 250 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 380 m, Szklary 400 m, Ojców 390 m.

Gatunek rozproszony. Był podany przez A. Rehmana (1879) jako *Amphiloma elegans*.

342. *Xanthoria parietina* Th. Fr.

Na korze drzew liściastych, np. na wierzbach, topolach, kasztanowcach, jesionach, brzozech. Niekiedy rośnie na skałach wapiennych w miejscach nasłonecznionych, na betonowych przedmiotach, drewnianych parkanach itp.

Jura Południowa. 38 stan. Pow. Kraków: Bielany 230 m, Tyniec 230 m, Przegonia Narodowa 220 m, Brzostkwinia 280 m, Tomaszowice 300 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 250 m, Brodła 260 m, Filipowice 300 m; pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Wierchowice 370 m, Ojców 350 m, Sułoszowa 400 m, Trzyciąż 400 m, Gołaczewy 400 m, Rabsztyn 400 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 26 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 380 m, Smoleń 460 m, Krzywopłoty 370 m, Pilica 330 m; pow. Zawiercie: Ryczów 440 m, Podzamcze 460 m, Kotowice 360 m, Kroczyce 320 m; pow. Myszków: Mirów 360 m, Niegowa 360 m, Gorzków 320 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 330 m, Przemiłowice 320 m, Olsztyn 300 m, Janów 200 m, Częstochowa około 250 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Gatunek bardzo pospolity. Był podany przez F. Błońskiego (1890).

343. *Xanthoria polycarpa* (Ehrh.) Rieber

Na korze przydrożnych lub pojedynczo rosnących drzew liściastych.

Jura Południowa. 28 stan. Pow. Kraków: Bielany 240 m, Tyniec 230 m, Przegonia Narodowa 240 m, Dol. Kluczwody 280 m, Zielonki 240 m, Mników 260 m, Modnica 300 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 240 m, Nielepice 320 m; pow. Olkusz: Wierzchowice 370 m, Ojców 350 m, Michałówka 380 m, Gołaczewy 400 m, Rabsztyn 400 m. (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 11 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 380 m, Załęże 360 m, Smoleń 460 m, Złożeniec 450 m; pow. Zawiercie: Podlesice 340 m, Kroczyce 330 m, Piaseczno 350 m; pow. Myszków: Niegowa 360 m, Gorzków 320 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Olsztyn 300 m.

BUELLIACEAE

Buellia De Not.

Sekcja 1. *Buellia*

344. *Buellia disciformis* (Fr.) Mudd.

Gatunek podany z Modlnicy (z kory drzew) przez H. Lojkę (1868) jako *B. parasema*; dotychczas nie potwierdzony.

345. *Buellia punctata* (Hoffm.) Mass. [= *B. myriocarpa* (DC.) De Not.]

Na korze drzew liściastych, np. często na drzewach przydrożnych, na mchach lub szczątkach roślinnych w szczelinach skał wapiennych.

Jura Południowa. 34 stan. Pow. Kraków: Bielany 240 m, Tyniec 230 m, Przegonia Narodowa 240 m, Mników 260 m, Brzostkwinia 280 m, Dol. Kluczwody 280 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 240 m, Brodla 260 m, Nielepice 320 m, Tenczynek 280 m, Dubie 290 m; pow. Olkusz: Racławice 390 m, Jerzmanowice 400 m, Ojców 350 m, Michałówka 270 m, Chełm koło Wolbromia 400 m, Rabsztyn 400 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 18 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 380 m, Załęże 360 m, Krzywopłoty 370 m, Smoleń 460 m, Pilica 330 m, Złożeniec 440 m; pow. Zawiercie: Podzamcze 460 m, Ryczów 440 m, Kromolów 400 m, Kroczyce 320 m, Podlesice 340 m, Zdów 330 m; pow. Myszków: Niegowa 360 m, Żarki 330 m, Gorzków 320 m, Ludwinów 360 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 320 m, Olsztyn 300 m.

Gatunek bardzo pospolity. Był podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Buellia myriocarpa* lub *B. myriocarpa* var. *punctiformis*. Cechuje go duża zmienność. Zbierałem następujące formy:

f. *punctiformis* (Hoffm.) Hazsl.

f. *musciicola* (Hepp.) Körb.

Rośnie na mchach i szczątkach roślinnych; np. w Dol. Sanki 280 m, Dol. Brzostkwinia 270 m, Pieskowej Skale 420 m, Sułoszowej 440 m;

var. *chloropolia* (Fr.) Körb.

Najpospolitsza odmiana o zgrubiałej, ziarnistej plesze.

346. *Buellia alboatra* (Hoffm.) Branth. et Rostr.

Na pionowych, ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapienia jurajskiego, zwykle u podstawy w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Mników 270 m, Dol. Kluczwody 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Olkusz: Wierchowcie 380 m, Dol. Bętkowska 350 m, Ojców 360 m, Pieskowa Skała 390 m, Wielmoża 380 m.

Gatunek rozproszony. Około 25% zarodników posiada także przegrody podłużne.

347. *Buellia epipolia* (Ach.) Mont.

Na nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w partiach szczytowych i podszczytowych w zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Mników 290 m, Dol. Brzaskwinki 280 m, Dol. Kobylańska 380 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kluczwody 290 m; pow. Chrzanów: Dubie 300 m; pow. Olkusz: Szklary 400 m, Dol. Bętkowska 370 m, Wierchowcie 380 m, Bębło 440 m, Ojców 390 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Zawiercie: Podzamcze 480 m, pow. Myszków: Lutowiec 380 m; pow. Częstochowa: Przemiłowice 340 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek dość częsty na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej. Był podawany przez K. Filipowicza (1881) i F. Błońskiego (1890) jako *Diplotomma alboatrum* var. *epipolium*. Posiada zarodniki zawsze 4-komórkowe.

348. *Buellia venusta* (Körb.) Lettau (det. dr. J. Poelt).

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego w partiach szczytowych i podszczytowych, zwykle na płaszczyznach poziomych lub ukośnych w zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*.

Jura Południowa. 30 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Tyniec 250 m, Piekary 240 m, Przeginia Duchowna 300 m, Rybna 300 m, Dol. Sanki 280 m, Mników 290 m, Dol. Brzaskwinki 280 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Dol. Kluczwody 310 m, Podskalany 300 m, Zielonki 240 m, Dol. Kobylańska 380 m, Dol. Bolechowicka 370 m; pow. Chrzanów: Kamyk 340 m, Nielepice 320 m, Obora koło Zalasza 340 m, Duiabe 300 m; pow. Olkusz: Raclawice 400 m, Jerzmanowice 480 m, Szklary 400 m, Dol. Bętkowska 360 m, Łazy Jawór 490 m, Bębło 440 m, Wierchowcie 400 m, Zelków 380 m, Ojców 370 m, Pieskowa Skała 420 m, Wielmoża 390 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 3 stan. Pow. Zawiercie: Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Lutowiec 380 m; pow. Częstochowa: Olsztyn 340 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej, rzadki na Jurze Północnej. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) jako *Diplotomma venustum*. Liczne z moich okazów posiadają plechę reagującą barwnie z odczynnikami. Plecha (szczególnie warstwa rdzeniowa), K + żółta, po chwili czerwona Pd + pomarańczowa.

349. *Rinodina albana* Mass.

Gatunek podawany z Modlnicy (z kory drzew liściastych i prętów leszczyny) przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) jako *R. horiza* var. *albana* lub *R. sophodes-albana*. Wymieniony także przez H. Magnussona (1947); obecnie nie odnaleziony.

350. *Rinodina bischoffii* (Hepp) Ach.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle na płaszczyznach poziomych w zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*, niekiedy rośnie też w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 20 stan. Pow. Kraków: Tyniec 240 m, Mników 290 m, Dol. Sanki 280 m, Dol. Brzostkiewski 270 m, Dol. Kluczwody 300 m, Dol. Bolechowicka 380 m, Dol. Kobylańska 390 m, Piekary 240 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Wierzchowice 390 m, Jerzmanowice 470 m, Łazy 490 m, Bębło 440 m, Dol. Bętkowska 400 m, Dol. Szklarki 380 m, Ojców 340—410 m, Sąsów 420 m, Klucze 400 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Zawiercie: Podlesice 370 m, Kroczyce 330 m, Zdów 350 m; pow. Częstochowa: Przemyłowice 330 m, Olsztyn 340 m.

Gatunek częsty na terenie Jury Południowej, dość rzadki na Jurze Północnej. Był podawany przez A. Rehmana (1879) i K. Filipowicza (1881) w odmianie var. *protuberans*.

351. *Rinodina* cfr. *calcareo* (Hepp) Mass.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle na trudno dostępnych cyplach w zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*.

Jura Południowa. 5 stan. Pow. Kraków: Dol. Brzostkiewski 280 m, Sanka 280 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 380 m, Łazy 460 m, Ojców 340—410 m.

Gatunek rzadki, spotykany tylko na terenie Jury Południowej. Oznaczenie niepewne ze względu na brak dokładnej diagnozy lub okazu porównawczego.

[*Rinodina confragosa* (Ach.) Körb.

Gatunek podawany błędnie przez A. Rehmana (1879) ze skał wapiennych z Ojcowa. Prawdziwa *R. confragosa* rośnie wyłącznie na skałach krzemianowych. Rehman prawdopodobnie miał na myśli okazy gatunku poprzedniego.]

352. *Rinodina exigua* (Ach.) S. Gray.

Gatunek podawany z Modlnicy przez W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879); dotychczas nie potwierdzony.

353. *Rinodina immersa* Körb. [= *R. bischoffii* var. *immersa* Körb.]

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, w zespole *Rinodina immersa-Verrucaria gyelnikii*.

Jura Południowa. 19 stan. Pow. Kraków: Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Tyniec 240 m, Mników 270 m, Piekary 230 m, Dol. Brzostkiewski 280 m, Przeginia Duchowna 290 m, Dol. Sanki 280 m, Dol. Kluczwody 300 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 370 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Nielepice 340 m; pow. Olkusz: Wierz-

Ryc. 8. *Candelariella medians* (Nyl.) Flag., okaz z Doliny Bolechowickiej. Pow. $4\times$.
 Fig. 8. *Candelariella medians* (Nyl.) Flag. Specimen from Bolechowicka Valley, $4\times$.

Ryc. 9. *Buellia* cfr. *epipolia* (Ach.) Mont., okaz z Doliny Bolechowickiej. Pow. $4\times$.
 Fig. 9. *Buellia* cfr. *epipolia* (Ach.) Mont. Specimen from Bolechowicka Valley, $4\times$.

Ryc. 10. *Buellia venusta* (Körb.) Lettau: a) — okaz z Bębła, pow. $4\times$; b) — okaz z Ojcowa, pow. $4\times$.

Fig. 10. *Buellia venusta* (Körb). Lettau: a) — Specimen from Bębło $4\times$, b) — Specimen from Ojców, $4\times$.

chowcie 380 m, Dol. Bętkowska 360 m, Łazy 490 m, Szklary 400 m, Jerzmanowice 450 m, Ojców 340—400 m, Sułoszowa 430 m.

Gatunek częsty, spotykany tylko na terenie Jury Południowej. Plecha endolityczna, biaława do szarawej. Apotecja pogrążone w skałę, szerokości około 0,1—0,3 mm. Krążek płaski lub nieco wklęsły. Brzeg plechowy wcześniej zanika. Zarodniki 16—20 × 8—12 μ.

354. *Rinodina ocellata* (Ach.) Arn. [= *R. lecanorina* Mass.]

Na silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego, zwykle w partiach szczytowych i podszczytowych w zespole *Dermatocarpon monstrosum-Buellia venusta*.

Jura Południowa. 24 stan. Pow. Kraków: Zielonki 250 m, Januszowice 300 m, Tyniec 240 m, Piekary 250 m, Mników 290 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 280 m, Przegonia Duchowna 300 m, Dol. Brzoskwinki 290 m, Rybna 300 m, Dol. Kluczwoły 300 m, Podskalany koło Modlnicy 300 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobylańska 400 m; pow. Chrzanów: Kamyk 330 m, Nielepice 340 m, Dubie 290 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m, Łazy Jawór 490 m, Bębło 440 m, Wierzchowie 390 m, Dol. Szklarki 410 m, Ojców 370 m, Pieskowa Skała 420 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Częstochowa: Olsztyn 350 m.

Gatunek pospolity na terenie Jury Południowej, bardzo rzadki na Jurze Północnej. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872) i A. Rehmana (1879) jako *Rinodina lecanorina*.

355. *Rinodina pyrina* (Ach.) Arn.

Na korze drzew, np. na wierzbach, często na starym drewnie.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Cholerzyn 220 m, Białe Kościół 400 m.

Gatunek rzadki.

PHYSICIACEAE

Physcia (Ach.) Vain.

356. *Physcia ascendens* Bitter.

Na korze drzew liściastych, zwykle na drzewach przydrożnych. Najobficiej jednak rośnie wszędzie na skałach wapiennych.

Jura Południowa. Na wszystkich stanowiskach.

Jura Północna. Na wszystkich stanowiskach.

Gatunek bardzo pospolity. Był podawany przez H. Lojkę (1868) i A. Rehmana (1879) jako *Parmelia stellaris* var. *ascendens* oraz jako *Parmelia neglecta*.

357. *Physcia caesia* (Hoffm.) Hampe.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapiennych, zazwyczaj na płaszczyznach poziomych w zespole *Candelaniella medians-Physcia nigricans*.

Jura Południowa. 41 stan. Pow. Kraków: Bielany 270 m, Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m, Rybna 300 m, Mników 290 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Tomaszowice 300 m, Januszowice 290 m; pow. Chrzanów: Podłęże koło Okleśnej 280 m, Tenczynek 300 m, Nielepice 340 m, Czerna 370 m; pow. Olkusz: Jerzmanowice 460 m, Dol. Bętkow-

ska 380 m, Ojców 380 m, Michałówka 290 m, Rabsztyn 430 m, Klucze 400 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Jura Północna. 26 stan. Pow. Olkusz: Dłużec 390 m, Krzywopłoty 420 m, Smoleń 480 m, Złożeniec 440 m; pow. Zawiercie: Ryczów 480 m, Podzamcze 490 m, Piaseczno 360 m, Kroczyce 330 m; pow. Myszków: Mirów 370 m, Niegowa 390 m, Mzurów 350 m, Ludwinów 400 m; pow. Częstochowa: Złoty Potok 350 m, Olsztyn 340 m, Przemyłowice 320 m, Częstochowa 250 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Gatunek bardzo pospolity.

358. *Physcia dubia* (Hoffm.) Lettau, em. Lynge.

Na porfirach lub na korze drzew liściastych, u podstawy pni.

Jura Południowa. 2 stan. Pow. Kraków: Niegoszowice 240 m; pow. Chrzanów: Podzamcze koło Tenczyńska 380 m.

Jura Północna. 2 stan. Pow. Olkusz: Smoleń 460 m; pow. Myszków: Gorzków 320 m.

359. *Physcia grisea* (Lam.) A. Zahlbr.

Na korze drzew liściastych, np. na wierzbach, topolach, klonach itp. Niekiedy, choć bardzo rzadko, przechodzi na skały wapienne, np. w Łazach koło Jerzmanowic, gdzie rośnie w nitrofilnym zespole *Candelaniella medians-Physcia nigricans*.

Jura Południowa. 28 stan. Pow. Kraków: Tyniec 230 m, Mników 260 m, Brzozoskwinia 280 m, Bolechowice 300 m, Tomaszowice 300 m, Przeginia Narodowa 240 m; pow. Chrzanów: Nielepice 320 m, Dubie 290 m, Brodla 260 m, Podłęże koło Okleśnej 240 m; pow. Olkusz: Ojców 350 m, Pieskowa Skała 370 m, Biały Kościół 400 m, Pazurek 400 m (stanowiska wymienione są przykładowo).

Gatunek pospolity.

360. *Physcia nigricans* (Flk.) Stizenb, em. DR.

Na silnie nasłonecznionych skałach wapiennych, zwykle na płaszczyznach poziomych. Rośnie również (na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadko) na korze drzew przydrożnych, np. na wierzbach.

Jura Południowa. Na wszystkich stanowiskach.

Jura Północna. Na wszystkich stanowiskach.

Gatunek bardzo pospolity.

361. *Physcia orbicularis* (Neck.) Du Rietz.

Na korze przydrożnych drzew liściastych, oraz równie często na silnie nasłonecznionych skałach wapiennych.

Jura Południowa. Na wszystkich stanowiskach.

Jura Północna. Na wszystkich stanowiskach.

Gatunek bardzo pospolity. Był podany przez H. Lojkę (1868) jako *Parmelia obscura* var. *cyclozelis*.

362. *Physcia pulverulenta* (Schreb.) Sandst.

Na korze drzew liściastych, np. na topolach, wierzbach, jesionach itp.

Jura Południowa. 3 stan. Pow. Kraków: Brzozoskwinia 270 m; pow. Olkusz: Ojców 340 m, Pieskowa Skała 370 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Olkusz: Smoleń 460 m.

Gatunek obecnie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rzadki.

363. *Physcia stellaris* (L.) Nyl.

Na korze drzew przydrożnych, np. na topolach, wierzbach, brzo-
zach itp.

Jura Południowa. 8 stan. Pow. Kraków: Bielany 260 m, Brzeziny 250 m, Bolecho-
wice 270 m, Kobylany 300 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 340 m, Szklary 380 m, Biały
Kościół 400 m, Ojców 340 m.

Jura Północna. 5 stan. Pow. Zawiercie: Podlesice 340 m; pow. Myszków: Koto-
wice 360 m, Niegowa 360 m, Gorzków 320 m; pow. Częstochowa: Żłoty Potok 320 m.

364. *Physcia tenella* Bitter.

Na korze drzew liściastych, np. na wierzbach, topolach, kasztanowcach,
jesionach, robiniach itp.

Jura Południowa. Na wszystkich stanowiskach.

Jura Północna. Na wszystkich stanowiskach.

365. *Physcia tribacia* (Ach.) Nyl.

Na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapienia jurajskiego,
u podstawy w zespole *Caloplaca murorum*-*Lecanora pruinos*a. Często rośnie na
mchach naskalnych.

Jura Południowa. 11 stan. Pow. Kraków: Skała Kmity koło Zabierzowa 270 m,
Dol. Kluczwody 300 m, Dol. Bolechowicka 370 m, Dol. Kobyłańska 380 m, Dol. Brzo-
skwinki 280 m; pow. Chrzanów: Nielepice 340 m, Kamyk 330 m; pow. Olkusz: Dol. Bętkowska 370 m, Łazy Jawór 450 m, Ojców 370 m, Sułoszowa 430 m.

Jura Północna. 1 stan. Pow. Zawiercie: Zdów 340 m.

Gatunek rozproszony na terenie Jury Południowej, bardzo rzadki na Jurze
Północnej.

Anaptychia Körb.

366. *Anaptychia ciliaris* (L.) Körb.

Na korze drzew liściastych, np. na topolach, wierzbach, jesionach itp.
Rośnie też dość często na pionowych, silnie nasłonecznionych skałach wapie-
nia jurajskiego.

Jura Południowa. 7 stan. Pow. Kraków: Modlnica 300 m; pow. Olkusz: Dol.
Bętkowska 370 m, Łazy Jawór 490 m, Szklary 380 m, Jerzmanowice 450 m, Ojców 380 m;
pow. Chrzanów: Tenczynek 280 m.

Jura Północna. 4 stan. Pow. Olkusz: Smoleń 460 m, wzgórze „Grodzisko” koło
Smolenia 460 m; pow. Częstochowa: Żłoty Potok 340 m, Częstochowa około 250 m.

Gatunek obecnie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rozpro-
szony. Był podawany przez H. Lojkę (1868), W. Jabłońskiego (1872)
i F. Błońskiego (1890) jako *Physcia ciliaris*.

LICHENES IMPERFECTI

Lepraria Ach.

Lepraria aeruginosa (G. H. Web.) Sm.

Na ziemi, na mchach lub u podstawy pni drzew.

Lepraria candelaris (L.) Fr.

Na korze drzew, np. na dębach.

Lepraria chlorina Ach.

Na korze drzew, np. na sosnach.

Lepraria cfr. *crassissima* (Hue) Lettau

Na ocienionych lub eksponowanych na północ skałach wapiennych (zazwyczaj u podstawy pionowych ścian), najczęściej w zespole *Verrucaria velana-Caloplaca xantholyta*.

Gatunek bardzo pospolity na terenie obu okręgów. Dawniej np. przez Rehmana uważany był za *Crocynia membranacea*. Występuje w postaci rozległych, białawych lub szarych, proszkowatych plech.

Instytut Botaniki PAN

w Krakowie

SUMMARY

The lichen flora of the Kraków-Częstochowa Upland was rather cursorily studied in the last century by H. L o j k a (1868), W. J a b ł o ń s k i (1872), F. B e r d a u (1876), A. R e h m a n (1879), K. F i l i p o w i c z (1881), W. B o b e r s k i (1886), and F. B ł o ń s k i (1890). The number of lichen species reported from this region was 205. After 1890 far reaching irreversible changes have occurred in the lichen flora of the Upland. The changes were caused by extensive deforestation and the disappearance of many old natural forest stands. Of the species which have disappeared from the area the various epiphytes and earth lichens are the most numerous. Nevertheless, during the four years of this investigation, between 1955 and 1958, the present author found and identified 365 lichen species. Calciphil lichens are the most numerous among them. It has been impossible to find at present 77 lichen species — 45 epiphytes, 18 rock lichens, and 17 earth lichens — reported from this region in earlier investigations.

The following lichen species have been found for the first time in the Kraków-Częstochowa Upland: *Anema decipiens*, *Caloplaca arenaria*, *C. aurantia*, *C. coronata*, *C. xatholyta*, *Candelariella aurella*, *C. medians*, *Collema callopismum*, *Fugensia bracteata*, *Gyalecta geoica*, *G. ulmi* f. *musciicola*, *Ionaspis epulotica*, *Lecanactis stenhammari*, *Lecanora pruinosa*, *L. reuteri*, *Lecidea deceptoria*, *L. lurida*, *L. monticola*, *Lempholemma chalazanum*, *Opegrapha mougeotti*, *Physcia tribacia*, *Placythium subradiatum*, *Pl. tremniacum*, *Polyblastia bavarica*, *Porina byssophila*, *Ramalina intermedia*, *Rinodina immersa*, *Sagiolechia protuberans*, *Squamarina lentigera*, *Toninia aromatica*, *Verrucaria bagliettoaeformis*, *V. congregata*, *V. jatrana*, *V. gyelnikii*, *V. lecideoides*, *V. lettaui*, *V. minuta*, *V. nigrofusca*, *V. parmigerella*, *V. policensis*, and *V. velana*. A new previously unknown species has been discovered in the area, it is *Verrucaria polonica* (N o w a k 1959).

The author's very deep gratitude is due to all those who have helped him in the course of this work. Professor J. M o t y k a has identified species from the genera *Alectoria*, *Ramalina*, and *Usnea*, Doctor J. P o e l t from M ü n c h e n has identified some species from the genera *Caloplaca* and

Buellia, and Mr. S e r v í t from Czechoslovakia has supplied the literature on the *Verrucariaceae* family. Professor B. S z a f r a n and Doctor J. K o r n a ś have kindly helped the author by their valuable advice.

A general characteristic of the area

The Kraków-Częstochowa Upland lies in southern Poland and constitutes a distinct geo-botanical district (S z a f e r 1959). From South to North the Upland stretches over a distance of 90 kilometres between Cracow and Częstochowa. Its width from East to West ranges 15 to 25 kilometres. It is built mainly of Jurassic limestones. The other rock formations, such as Carboniferous limestones, conglomerates, porphyries, and melaphyres have little significance in the region. The beds of Jurassic limestone are about 120 m. thick and form a plateau, which in the East disappears under the cretaceous formations of the Miechów-Sandomierz Upland and in the West is divided from the Silesian Upland by a fault. To the South the Upland is limited by a tectonic trough and the Vistula which separate it from the Carpathian Mts. To the North a similar boundary is formed by the valley of the Warta River.

The Kraków-Częstochowa Upland is divided into two distinct geobotanical subdistricts: one in the south (the Southern Jura) and one in the north (Northern Jura). In the southern subdistrict the plateau is intersected by numerous deep narrow gorges and valleys of streams. The stretches between the gorges have a loess soil and are almost entirely utilized as farmland. Where numerous limestone rocks and steep walls project from the sides of the gorges and valleys the conditions are favourable for the growth of many mountain species. In this regard the southern part of the Upland resembles the Pieńin Mts. (T o b o l e w s k i 1958).

The relief and the habitat conditions in the northern part of the Upland are entirely different. The Jurassic plateau was here more strongly eroded and was subsequently covered by fluvioglacial sands. The limestone rocks do not line the streams, since there are hardly any streams in the area, but rise as remnants (monadnocks) above arid fields. The lichen communities developing on the monadnocks are characterized by a floristic poverty and complete absence in their composition of mountain species. The only species growing here are very common everywhere, e.g. *Lecanora muralis*, *L. albescentis*, *L. dispersa*, *L. crenulata*, *Physcia caesia*, *Ph. nigricans*, *Ph. orbicularis*, *Caloplaca decipiens*, *Protoblastenia rupestris* etc.

Brief review of lichen habitats

Epilithic communities of calciphil lichens are the best preserved of all the lichen communities in the area of the Kraków-Częstochowa Upland. On

the other hand, the most reduced are the epiphitic communities. The communities of rock-dwelling calciphil lichens were described in a separate report (Nowak 1960) and here only the other types of lichen communities are briefly discussed.

Silicate rocks occur in the Upland only as porphyries and melaphyres in the neighbourhood of Cracow (the southern Jura). Moreover, throughout the whole area of this geo-botanical district there are strewn in the fields many small boulders (granite, gneiss, quartzite, or flint) left there by the retreating glacier. The surfaces of these boulders are occupied by a very poor lichen flora. The only species growing on the stones are *Parmelia conspersa*, *Rhizocarpon ambiguum*, *Rh. excentricum*, *Candelariella vittelina*, *Lecanora atra*, *L. umbrina* f. *saxicola*, *Diploschistes scruposus*, *Lecanora muralis*, *L. polytropa*, *Lecidea crustulata*, *L. macrocarpa*, *L. coarctata*, and *Bacidia umbrina*.

The flora of the earth lichens in the area is also very scarce. These lichens grow on loess, sands, humus, and weathered lime rocks. Loess soils occur mainly in the southern part of the area. The species growing on this soil, e.g. on the sides of valleys and along the field roads, are as follows: *Baeomyces roseus*, *B. rufus*, *Cladonia verticillata*, *Cl. furcata*, *Cl. cornuto-radiata*, *Cl. fimbriata*, *Cl. pyxidata*, and *Peltigera erumpens*. The main species occurring on the extensive stretches of sand soil in the northern part of the area are the common fruticose lichens, e.g. *Cladonia mitis*, *Cl. silvatica*, *Cl. rangiferina*, *Cl. uncialis*, *Cl. gracilis*, *Cl. degenerans*, *Cl. cornuta*, *Cl. coccifera*, *Cl. bacillaris*, *Cl. squamosa*, *Cl. alpicornis*, *Cl. furcata*, *Cetraria islandica*, *C. crispa*, *Cornicularia tenuissima*, *Stereocaulon incrustatum*, and *S. condensatum*, as well as some few crustaceous species such as *Lecidea uliginosa* or *L. granulosa*. The flora growing on humus and waste soil is different. The lichen species developing in dry habitats exposed to sunlight are as follows: *Toninia coeruleonigricans*, *Endocarpon pusillum*, *E. pallidum*, *Toninia toninia*, *Dermatocarpon hepaticum*, *Lecidea decipiens*, *L. decapтория*, *Lempholemna chalazanum*, *Collema tenax*, *Squamarina lentigera*, *Fulgensia bracteata*, *Dermatocarpon cinereum*, *D. daedaleum*, *Diplischistes bryophilus*, *Cladonia pyxidata* var. *pocillum*, *Cl. symphyrcarpia*, *Leptogium lichenoides*, *Peltigera rufescens* f. *incusa*, and *P. aphtosa*. The species in shadowed and northern habitats are *Solorina saccata*, *Toninia lobulata*, *Gyalecta geoica*, and *Leptogium lichenoides*.

The lichen species growing on mosses and plant remains are very few: *Caloplaca stillicidiorum*, *Bacidia muscorum*, *B. lignaria*, *B. fusca*, *B. sabuletorum*, *Lecidea strobilifera*, *Buellia punctata* f. *muscicola*, and *Gyalecta ulmi* f. *muscicola*.

The following lichens have been collected from the bark of pine (*Pinus silvestris*), larch (*Larix* sp.) and spruce (*Picea excelsa*): *Lecidea scalaris*,

Lecanora conizaea, *Lecidea flexuosa*, *Parmeliophysodes*, *P. bitteriana*, *P. furfuracea*, *P. tubulosa*, *Parmeliopsis pallescens*, *P. ambigua*, *Lecanora piniperda*, *L. varia*, *L. chlarona*, f. *pinastri*, *Cetraria pinastri*, *C. chlorophylla*, and the always abundantly occurring species *Bacidia chlorococca*.

The lichens on the bark of beech (*Fagus silvatica*) and hornbeam (*Carpinus betulus*) growing in forests on the sides of the limestone valleys are as follows: *Graphis scripta*, *Pyrenula nitida*, *Lecanora varia*, *L. chlarona*, *L. carpinea*, *L. subrugosa*, *Parmeliopsis ambigua*, *Bacidia rosella*, *Pertusaria discoidea*, *P. amara*, *P. leioplaca*, *P. coronata*, *Phlyctis argena*, *Parmelia saxatilis*, *Opegrapha herpetica*, *O. lichenoides*, *Parmelia sulcata*, *Lecidea olivacea*, and *Parmelia physodes*.

The species growing on the bark of oak (*Quercus* sp.) are *Parmelia physodes*, *Cetraria glauca*, *Parmelia sulcata*, *Alectoria subcana*, *Parmelia caperata*, *P. saxatilis*, *P. subaurifera*, *Evernia prunastri*, *Parmeliopsis ambigua*, *Parmelia exasperatula*, *Lecanora carpinea*, *L. chlarona*, *Partusaria discoidea*, *P. amara*, *P. globulifera*, *P. coronata*, and *P. slesvicensis*.

On the alder (*Alnus glutinosa*) which grows mainly along the banks of streams, the one dominant lichen species is *Parmelia physodes*. Rare specimens of other species also found on these trees are *Cetraria glauca*, *Parmelia tubulosa*, *P. sulcata*, *Parmeliopsis ambigua*, and *Cetraria saepincola*.

Relatively the richest flora of epiphytic lichens is found on the bark of side-way (*Aesculus hippocastanum*, *Robinia pseudoacacia*, *Fraxinus excelsior*, *Populus* sp., and *Salix* sp.). Among these lichen species there are the following: *Physcia grisea*, *Ph. tenella*, *Ph. orbicularis*, *Ph. ascendens*, *Ph. pulverulenta*, *Ramalina farinacea*, *R. obtusata*, *R. fastigiata*, *Xantoria parietina*, *X. candelaria*, *X. polycarpa*, *Parmelia acetabulum*, *P. exasperatula*, *P. fuliginosa*, *P. sulcata*, *P. physodes*, *Phlyctis argena*, *Lecidea euphorea*, *Lecanora allophana*, *Anaptychia ciliaris*, *Bacidia incompta*, *B. rubella*, *Candelariella xanthostigma*, *Evernia prunastri*, *Lecanora carpinea*, *Caloplaca pyracea*, *Buellia punctata*, *Rinodina pyrina*, and *Lecanora varia*.

General remarks on the lichen flora of the Kraków-Częstochowa Upland

According to the data assembled so far the lichen flora of the Upland consist of 366 species. Epilithic species are the most numerous; their number is 162 or 45 per cent of the total number of the lichen species. The number of the epiphytic species is 122 or 33 per cent, and that of earth lichens 81 species or 22 per cent. Nearly a half of the whole lichen flora in the area, i.e. 45 per cent, is associated with the calcareous substratum.

There are far reaching similarities between the lichen flora, especially

the calciphil species of the Kraków-Częstochowa Upland and the lichen flora of the Pieniny Mts. (T o b o l e w s k i 1958). As many as 115 calciphil species occur in both these regions, 52 lichen species growing in the Kraków-Częstochowa Upland have not yet been found in the Pieniny Mts. and only 13 species of the latter region do not grow in the former (cf. lists on p. p. 14—15).

Among the calciphil lichens in the Kraków-Częstochowa Upland similar as in the Pieniny Mts. (T o b o l e w s k i 1958) the European mountain species are most numerous. Among them e.g. *Verrucaria gyelnikii*, *V. lecidoides*, *V. minuta*, *V. fatrana*, *Thelidium dionatense*, *Polyblastia amota*, *Dermatocarpon lachneum*, *Endocarpon pusillum*, *Anema decipiens*, *Synalissa symphorea*, *Thyrea pulvinata*, *Placythium subratiatum*, *Lecidea lurida*, *Toninia candida*, *Cladonia symphyrcarpia*, *Acarospora cervina*, *Caloplaca coronata*, *C. cirrochroa*, and *Rinodina ocellata*. Almost all these species are more common in southern Europe and gradually disappear to the north.

The mediterranean species (submediterranean species) are represented by *Dermatocarpon monstrosum*, *Lecidea deceptoria*, *L. testacea*, *Toninia toniniana*, *Lecanora coronata*, *L. pruinosa*, *Squamarina lentigera*, and *Blastenia ochracea*. In Poland all these lichens grow in places with a high insolation

The following species found in the Kraków-Częstochowa Upland occur both in the Arctic regions and high up in European mountains: *Bacidia muscorum*, *Dermatocarpon cinereum*, *D. daedaleum*, *Caloplaca stillicidiorum*, *Fulgensia bracteata*, *Lecidea atrofusca* and *Toninia lobulata*.

The following species are cosmopolitic: *Candelariella aurella*, *Diploschistes albissimus*, *Physcia caesia*, *Lecanora muralis*, and *Verrucaria nigrescens*.

The varied relief of the Upland is reflected by the distribution of lichen species. In the southern part of the area the microclimate of habitats is almost always more humid than the microclimate of habitats in the northern part and consequently the lichen flora in the south consists of a greater number of species. The reduction of the flora in the northern part of the area is illustrated by the list of calciphil species on p. 17—20.

The systematic list of species

The systematic list of species and their habitats occupies the greatest part of this report. The list has been compiled both from the author's own observations and from all the other reports on the lichen flora in the Kraków-Częstochowa Upland. The description in the report of each lichen species found in the area includes the following information: the character of the habitat, the number and the description of all the discovered localities, the frequency of the species in both parts of the area, and in some cases other additional

data. In the case of species which have been collected by the author himself also the names are given of the lichen communities (Nowak 1960) in which they occur most frequently.

In the case of the *Verrucariaceae* family the key is given for the identification of the species from this family growing in the Kraków-Częstochowa Upland.

*The Botanical Institute
Polish Academy of Sciences
Cracow*

LITERATURA

- Alborm O., 1952, A Key to the Sterile Corticolous Lichens occurring in South Sweden, Bot. Notiser, H. 3: 239—263, Lund.
- Anders J., 1928, Die Strauch- und Laubflechten Mitteleuropas, Jena, G. Fischer, s. 217.
- Arnold F., 1870, Lichenologische Ausflüge in Tirol, Verhandl. zool.—botan. Gesell. in Wien 20: 527—546, Wien.
- Berdau F., 1876, Liszajniki izsledowannyje do sich por w oblasti Warszawskiego Uczebnego Okruga z ukazaniem na morfologiju i fizjologiju liszajnikow, Warszawa.
- Błoński F., 1890, Wyniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych dokonanych w ciągu lata 1889 w obrębie pięciu powiatów Królestwa Polskiego, Pam. Fizjogr. 10: 1—64, Warszawa.
- Boberski W., 1886, Systematische übersicht der Flechten Galiziens Verhandl. zool.—botan. Gesell. in Wien 36: 1—44, Wien.
- Černohorský Z., Nádvořík J., Servít M., 1956, Klíč k určování lišejníků, ČSR, I díl, Praha, ČSAV.
- Christiansen M. S., 1955, A Study on the Morphology of a New Species of *Verrucaria*, Bot. Tidsskr. 52: 131—142, København.
- Degelius G., 1954, The Lichen Genus *Collema* in Europe, Symb. Bot. Uppsalienses 13(2): 1—499, Uppsala.
- Degelius G., 1956, The Lichen Flora on Calcareous Substrata in Souther and Central Nordland Norway, Acta Horti Gothoburgensis 20(2): 35—56, Göteborg.
- Erichsen C. F. E., 1936, *Pertusariaceae*, Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen—Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 9, Abt. V, Teil 1: 321—728, Leipzig.
- Erichsen C. F. E., 1957, Flechtenflora von Nordwestdeutschland, Stuttgart, Fischer.
- Filipowicz K., 1881, Spis mchów, wątrobowców i porostów z niektórych stanowisk Królestwa Polskiego, a mianowicie z Doliny Ojcowskiej i Bentkowskiej, okolic Warszawy, Łukowa, Puław i Brześcia Litewskiego, zebranych w latach 1887—1879, Pam. Fizjogr. 1: 258—267, Warszawa.
- Fries T. M., 1874, Lichenographia Scandinavica II, Upsaliae, F. Berling, s. 325—639.
- Frey E., 1933, *Cladoniaceae-Umbilicariaceae*, Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen—Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, 9; Abt. IV, Häft 1: 1—426, Leipzig.
- Galloe O., 1927—1954, Natural History of the Danisch Lichens I—IX, Copenhagen, E. Munksgaard.
- Gotkiewicz M., Szafer W., 1956, Ojcowski Park Narodowy, Wyd. popularno-naukowe Zakł. Ochrony Przyrody PAN, Nr 12, Kraków.
- Guillaumot M., 1951, Flore des Lichens de France et de Grande-Bretagne, Encyclopédie Biologique 42: 1—604, Paris—VI.

- Gyelnik V. K., 1940, *Lichinaceae-Pannariaceae*, Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen—Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, 9, Abt. II, Teil 2: 1—272, Leipzig.
- Hillmann J., 1935, *Teloschistaceae*, Ibidem, 9, Abt. VI, Lief. 1: 1—36, Leipzig.
- Hillmann J., 1936, *Parmeliaceae*, Ibidem, 9, Abt. V, Teil 3: 1—309, Leipzig.
- Hillmann J., Grumman V., 1957, Flechten, Kryptogamen—Flora der Mark Brandenburg VIII, Berlin—Nikolassee, Gebrüder Borntraeger.
- Jatta A., 1909—1911, Flora Italica Cryptogama pars III Lichenes, Rocca S. Casciano, L. Cappelli.
- Jabłoński W., 1872, Przyczynek do flory krajowej, Spraw. Kom. Fizjogr. 6: 73—76.
- Jelenkin A., 1901, Flora Ojcowskiej Doliny. Warszawa.
- Klement O., 1956, Prodröm der mitteleuropäischen Flechtengesellschaften, Feddes repert. spec. nov. reg. vegetabilis, Beiheft 135: 5—194, Berlin.
- Klement O., 1958, Die Stellung der Flechten in der Pflanzensoziologie, Vegetatio Acta Geobotanica 8(1): 43—56, Den Haag.
- Kofler L., 1956, Remarques sur les *Lecanora* corticoles du groupe *subfusca*, Revue bryol. et lichen. 25(1—2): 167—182, Paris.
- Kornaś J., 1950, Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Część I zespoły pół uprawnych, Acta Soc. Bot. Polon. 20(2): 362—443, Warszawa.
- Lettau G., 1912, Beiträge zur Lichenographie von Thüringen, Hedwigia, 52: 81—264, Dresden—N.
- Lettau G., 1940, Flechten aus Mitteleuropa I, II, III u. IV, Repertorium spec. nov. reg. vegetabilis. Beiheft 119, 1, 2, 3: 1—202, Berlin—Dahlem.
- Lettau G., 1957, Flechten aus Mitteleuropa XII, Feddes repert. spec. nov. regn. vegetabilis, 59: 192—257, Berlin.
- Lettau G., 1958, Flechten aus Mitteleuropa XIII, Ibidem, 61: 1—73, Berlin.
- Lynge B., 1935, *Physciaceae*, Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen—Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 9, Abt. VI, Lief. 1: 41—188, Leipzig.
- Lojka H., 1868, Spis porostów zebranych, Spraw. Kom. Fizjogr. 2: 67—69, Kraków.
- Łazarczyk L., 1914, Porosty polskie zebrane przez W. Jastrzębowskiego w latach 1827—1834, Ibidem, 48: 73—79, Kraków.
- Maas Gesteranus R. A., 1947, Revision of the Lichens of the Netherlands I *Parmeliaceae*, Blumea, 6: 1—199, Leiden.
- Maas Gesteranus R. A., 1952, Revision of the Lichens of the Netherlands II *Physciaceae*, Blumea, 7: 206—287, Leiden.
- Maas Gesteranus R. A., 1958, Notes on Dutch Lichens II, Blumea, Supplement IV: 178—187, Leiden.
- Magnusson A. H., 1929, A Monograph of the Genus *Acarospora*, Kungl. Svensk. Vet. Handling., 7(4): 1—400, Stockholm.
- Magnusson A. H., 1932, Beiträge zur Systematik der Flechtengruppe *Lecanora subfusca*, Acta Horti Gotoburgensis 7: 65—87, Göteborg.
- Magnusson A. H., 1933, A Monograph of the Lichen Genus *Ionaspis*, Ibidem, 8: 1—48, Göteborg.
- Magnusson A. H., 1935, *Acarosporaceae* und *Thelocarpaceae*, Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen—Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 9, Abt. V, Teil 1: 1—318, Leipzig.
- Magnusson A. H., 1946, Contribution to the Taxonomy of the *Lecidea goniophila* Group, Acta Horti Gotoburgensis, 16: 125—134, Göteborg.
- Magnusson A. H., 1947, Studies in non-Saxicolous Species of *Rinodina* mainly from Europe and Siberia Ibidem, 17: 191—338, Göteborg.

- Magnusson A. H., 1952 a, Lichens from Torne Lappmark, Arkiv för Botanik 2: 45—249, Stockholm.
- Magnusson A. H., 1952 b, Key to the Species of *Lecidea* in Scandinavia and Finland I Saxicolous Species, Svensk Bot. Tidskr. 46: 178—198, Uppsala.
- Magnusson A. H., 1952 c, Key to the Species of *Lecidea* in Scandinavia and Finland II non-Saxicolous Species, Ibidem 46: 313—323, Uppsala.
- Medwecka-Kornaś A., 1952, Zespoły leśne Jury Krakowskiej, Ochrona Przyrody, 20: 133—236, Kraków.
- Migula W., 1929—31, Kryptogamen — Flora von Deutschland, Deutsch-Österreich und der Schweiz IV Flechten, Teil 1 u. 2, Berlin-Lichterfelde, H. Bermühler, s. 1—527 i 1—868.
- Motyka J., 1924 a, Studia nad florą porostów tatrzańskich. Część I Porosty zebrane w Dolinie Kościeliskiej, Acta Soc. Bot, 2(1): 44—59, Warszawa.
- Motyka J., 1924 d, Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges II Teil. Die epilithischen Assoziationen der nitrophilen Flechten im polnische Teile des Westtatra, Bul. de l'Acad. Pol. d Sc. et d Lett. Ser. B: 835—850, Cracovie.
- Motyka J., 1926, Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges VI Teil. Studien über die epilithischen Flechtengesellschaften, Ibidem Ser. B: 189—227, Cracovie.
- Motyka J., 1927, Materiały do flory porostów Tatr. Część II, Spraw. Kom. Fizjogr. 61: 1—16, Kraków.
- Motyka J., 1936—38, Lichenum Generis *Usnea* studium monographicum. Pars systematica, Leopoli, s. 651.
- Motyka J., 1958 a, Rodzaj *Alectoria* Ach., podrodzaj *Bryopogon* (Link.) Th. Fr. w Europie środkowej opisy gatunków, Fragm. Flor. et Geobot. 3(2): 205—231, Kraków.
- Motyka J., 1960, Porosty (*Lichenes*) Tom V Część I — *Parmeliaceae*, Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i Ziemi Ościennych, s. 1—274, Warszawa.
- Motyka J., Porosty (*Lichenes*) Tom V Część II — *Usneaceae*, Flora Polska. Rośliny Zarodnikowe Polski i Ziemi Ościennych (rękopis).
- Nowak J., Porosty okręgu Jury Krakowskiej (południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej) (w rękopisie.)
- Nowak J., 1959, Nowy gatunek porostu z południowej Polski, *Verrucaria polonica* n. sp., Fragm. Flor. et Geobot., 5 (1): 155 — 163, Kraków.
- Nowak J., 1959 b, Stanowisko porostu *Umbilicaria decussata* (V i II.) Frey na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Ibidem, 5 (3): 471—482, Kraków.
- Nowak J., 1960, Naskalne zespoły porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ibidem 6(3): 323—392.
- Oksner A. M., 1956, Flora łyszczykiw Ukrainy I, Kyjiw, Akad. Nauk Ukrainjskoji RSR, s. 487.
- Poelt J., 1952, Die *Lecanora subfusca*-Gruppe in Süddeutschland, Ber. Bayer. Bot. Gesellschaft 29: 58—69, München.
- Poelt J., 1954, Die gelappten Arten der Flechtengattung *Caloplaca* in Europa, Mitt. der Bot. Staatssammlung München, 11: 11—31, München.
- Poelt J., 1955 a, Mitteleuropäische Flechten III. Schlüssel der Moos und organische Detritus bewohnenden alpinen und arktischen *Caloplaca*-Arten Europas, Ibidem 12, München.
- Poelt J., 1955 b, Die Gipfelvegetation und Flora des Wettersteingebirges, Feddes Repert. spec. nov. regn. vegetabilis 58: 157—179, Berlin.
- Redinger K., 1937—38, *Arthoniaceae*—*Graphidaceae*, Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen—Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 9, Abt. II, Teil 1: 1—404, Leipzig.

- Rehman A., 1879, Systematyczny przegląd porostów znalezionych dotąd w Galicji zachodniej, opracowany na podstawie własnych i cudzych spostrzeżeń, Spraw. Kom. Fizjogr. 13: 3—66, Kraków.
- Sandstede H., 1931, Die Gattung *Cladonia*, Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen—Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 9, Abt. IV, Häft. 2: 1—531, Leipzig.
- Servít M., 1939, *Lichenum sectionis Verrucaria sphinctrina* revisio critica, Beihefte z. Bot. Centralbl. 59: 113—168, Dresden.
- Servít M., 1946, The new Lichens of the *Pyrenocarpae*— Group I, *Studia Bot. Čech.* 7: 49—111, Praha.
- Servít M., 1947, Species novae generis lichenum *Verrucaria*, *Věstník Král. Česke Spol. Nauk* 10: 1—20, Praha.
- Servít M., 1948, The new Lichens of the *Pyrenocarpae*— Group II, *Studia Bot. Čech.* 9: 67—115, Praha.
- Servít M., 1949, Nové nebo méně známé druhy lišejníkové čeledi *Verrucariaceae* (Species *Verrucariacearum* Lichenes novae vel minus cognitae), *Sborník národn. Musea v Praze*, 5, 9, Bot. no 3: 1—51, Praha.
- Servít M., 1950 a, The new Lichens of the *Pyrenocarpae*— Group III, *Studia Bot. Čech.* 11: 1—35, Praha.
- Servít M., 1950 b, The new Lichens of the *Pyrenocarpae*— Group IV, *Ibidem*, 12: 1—44, Praha.
- Servít M., 1952, Neue und weniger bekannte Arten der Familien *Verrucariaceae* und *Dermatocarpaceae*, *Preslia*, 26: 347—390, Praha.
- Servít M., Československé Lišejníky čeledi *Verrucariaceae*, Praha, ČSAV.
- Smith A. L., 1911, A Monograph of the British Lichens II Part, London, British Museum.
- Smith A. L., 1918, A Monograph of the British Lichens I Part (second edition), London, British Museum.
- Sosnowski K., 1949, O „ostańcach” Jury Krakowsko-Wieluńskiej i ich ochronie, *Chrońmy Przyrodę ojczystą* Nr 1-2-3: 30—37, Kraków.
- Szafran B., 1955, Mchy Jury Krakowsko-Wieluńskiej z uwzględnieniem rezerwatów przyrody, *Ochrona Przyrody* 23: 213—254, Kraków.
- Szata roślinna Polski, 1959, opracowanie zbiorowe pod redakcją Władysława Szafera, Warszawa.
- Szatala Ö., 1957, Prodröm einer Flechtenflora des Irans, *Ann. histor. -nat. mus. nation. Hungarici*, 8 (seria nova): 101—154, Budapest.
- Tobolewski Z., 1954, Z badań nad florą porostów Pienin, *Fragm. Flor. et Geobotan.*, 1(2): 3—13, Kraków.
- Tobolewski Z., 1955 a, Porosty Gór Stołowych, *Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Komisji Biologicznej* 16(1): 1—98, Poznań.
- Tobolewski Z., 1955 b, Nowe i rzadkie gatunki we florze porostów Tatr polskich, *Ibidem* 17(1): 1—30, Poznań.
- Tobolewski Z., 1956, Materiały do flory porostów Tatr II, *Ibidem* 17,4: 1—30, Poznań.
- Tobolewski Z., 1958, Porosty Pienin, *Ibidem* 17(5): 1—124, Poznań.
- Vainio E. A., 1921, *Lichenographia Fennica I. Pyrenolichenes*; *Acta soc. pro Fauna et Flora Fennica* 49(2): 1—274, Helsingforsiae.
- Vainio E. A., 1922, *Lichenographia Fennica II, Baeomyceae et Lecideales*, *Ibidem* 53(1): 1—340, Helsingforsiae.
- Zahlbruckner A., 1922—1940, *Catalogus lichenum universalis I—X*, Leipzig, Berlin.
- Zahlbruckner A., 1926, *Lichenes* (Flechten), *Die Natürlichen Pflanzenfamilien: A. Engler und K. Prantl*, 8, Leipzig, W. Engellmann.

- Zaręczny S., 1953, Mapa geologiczna okolic Krakowa i Chrzanowa, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne.
- Zschacke H., 1927, Korsische Flechten, Verh. Bot. Ver. der Prov. Brandenburg, 69: 1—29
- Zschacke H., *Epigloeaceae*, *Verrucariaceae* und *Dermatocarpaceae*, Dr. L. Rabenhorsts Kryptogamen—Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 9 Abt. I, Teil 1: 44—695, Leipzig.
- Zurzycki J., 1950, Badania nad nadrzewnymi porostami Krakowa i okolicy, Materiały do fizjografii kraju nr 24, Kraków, PAU.
- Wiszniewski W., 1953, Atlas opadów atmosferycznych w Polsce 1891—1930, PIHM, Wydawnictwo Komunikacyjne, Warszawa.

SPIS TREŚCI

Wstęp	3
I. Ogólna charakterystyka terenu	4
II. Orientacyjny przegląd siedlisk i zbiorowisk porostów	8
III. Uwagi o florze porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej	13
IV. Systematyczny wykaz gatunków	21
Summary	117
Literatura	123