MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. XXIII, 1967

Zeszyt 2

DYGNA SOBOTKA

ROŚLINNOŚĆ STREFY ZARASTANIA
BEZODPŁYWOWYCH JEZIOR SUWALSZCZYZNY

*Vegetation of the Zone Subject to Overgrowth
in Endorheic Lakes of the Suwałki Region*

WARSZAWA

Wydano z zasiłku
Polskiej Akademii Nauk

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE — WARSZAWA 1967

Nakład 450 + 80 egz. Ark. wyd. 10,5. Ark. druk. 5,5 + tabele. Papier
ilustrac. III kl. 80 g. 70×100/16. Oddano do składu 19.X.66 r. Podp. do
druku we wrześniu 1967. Druk. ukończono w grudniu 1967.

Zam. 3492. T-84. Cena zł 32.—

Lub. Zakł. Graf. im. PKWN w Lublinie

WSTĘP

Małe, płytkie, bezodpływowe i bezodpływowe dystroficzne zbiorniki wodne Suwalszczyzny, położone w borze sosnowo-świerkowym nazywa miejscowa ludność sucharami. Badaniem objęto 21 sucharów leżących w niecce jezior Wigry i Krzywe Wigierskie na Pojezierzu Suwalskim.

Stan zbadania szaty roślinnej Suwalszczyzny jest na ogół bardzo słaby. Najczęściej są to wiadomości dotyczące roślinności przede wszystkim jeziora Wigry i jego okolic (Kulwiec 1902, 1904, Hryniewiecki 1922, 1923, Lityński i Hryniewiecki 1923). Roślinnością sucharów nie zajmowano się prawie zupełnie. Jedynie Rypowa (1927) zbierała glony w tych jeziorach. Znalazła ona w 5 sucharach (Wielki, Rzepiskowy, Dembowski, Wschodni i Zachodni) 160 gatunków glonów: 28 sinic, 18 zielenic, 5 okrzemek, 106 sprężnic i 1 krasnorost. W pracach Wiśniewskiego i Rejmentówny (1935) oraz Rejment-Grochowskiej, Mickiewiczowej i Sobotkowej (1962, 1963) podane są między innymi stanowiskami mszaki znalezione na terenach zabagnionych przy sucharach.

W przeciwieństwie do opracowań florystycznych, jeziora całej Suwalszczyzny są dobrze zbadane pod względem batymetrycznym i hydrochemicznym. W latach 1936 i 1937 Stangenberg opisał stosunki hydrochemiczne większości jezior Suwalszczyzny, w tym również i sucharów. Przeprowadził on również sondowania i wykreślił mapy batymetryczne tych jezior.

Zadaniem niniejszej pracy było zbadanie procesu zarastania sucharów. W tym celu starałam się poznać zbiorowiska i zespoły roślinne strefy zarastania, zbadać ich strukturę i kierunki rozwojowe. W trakcie wykonywania pracy szczególną uwagę zwróciłam na określenie, przynajmniej orientacyjne, warunków ekologicznych zbiorowisk wiążących się ściśle z różnicami w sposobie zarastania sucharów. Na podstawie wyróżnionych zbiorowisk i panujących tam stosunków ekologicznych próbowałam wyodrębnić pewne typy zarastania.

Obserwacje nad florą i zarastaniem sucharów suwalskich przeprowadzałam w latach 1960—1963.

Podane w pracy plany sucharów oparte są na materiałach znajdujących się w Zakładzie Jezior PAN w Warszawie oraz w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin UW.

Pragnę złożyć gorące podziękowanie Pani Docent Dr Irenie Rejment-Grochowskiej za cenne wskazówki i rady oraz stałe bardzo życzliwe interesowanie się moją pracą.

Dziękuję również Pani Prof. Dr A. Skirgiełło i Panu Prof. Dr St. Tołpie za życzliwe uwagi, Dr Z. Podbielkowskiemu i Dr T. Traczynskowi wdzięczna jestem za rady i pomoc przy zestawianiu tabel fitosocjologicznych.

METODY PRACY

Roślinność strefy zarastania badałam na wyznaczonych przez siebie profilach biegnących prostopadłe do brzegów jeziora, mierząc szerokość poszczególnych zbiorowisk.

W strefie zarastania każdego sucharu wykonałam 3—4 transekty pasowe położone z różnych stron jeziora, ciągnące się od jego brzegu (otwartego lustra wody) do gruntu mineralnego. Kierunek transektu ustalałam kompasem, a jego granice wyznaczałam taśmą pomiarową przymocowaną w 4 miejscach kołkami (ryc. 1). Szerokość transektu wynosiła najczęściej 1,5 m; długość jego była każdorazowo inna w zależności od szerokości strefy zarastania. Transekt dzieliłam na kwadraty

Ryc. 1. Wyznaczanie transektu pasowego na pomoście torfowcowym. Suchar I
Setting out of belt transect on the *Sphagnum* mat.; Suchar I.

o bokach 1,5 m; wykonywałam w skali 1 : 20 szkic rozmieszczenia roślinności na papierze milimetrowym.

Roślinność wodną zbierałam posługując się przywiązaną na sznurze kotwiczką zarzucaną z brzegu jeziora. Szerokość płatów roślin wodnych występującą tuż przy strefie kożucha mierzyłam wycechowaną, drewnianą tyczką ustawioną poziomo.

Wykonałam 20 pomiarów głębokości wody w sucharach przy pomocy torfowcowym oraz 20 pomiarów miąższości samego kożucha przy pomocy sztywnego, drewnianego pręta z podziałką. Pomiary miąższości kożucha robiłam wzdłuż linii prostej biegnącej prostopadle do brzegu jeziora w odległości 1/2, 2 i 4 m od otwartego lustra wody.

W badaniu struktury zbiorowisk roślinnych posługiwałam się metodą Braun-Blanqueta (1951). Powierzchnia zdjęcia fitosocjologicznego była różna, zależna od lokalnych warunków. Większość zdjęć wykonywałam na całych płatach, w przypadku większych płatów stosowałam kwadrat o boku 5 m. Ogółem wykonałam ponad 300 zdjęć, z czego 227 zestawiałam w tabelę korzystając przy tym z prac Tüxena (1937, 1955), Knappa (1948), Libberta (1932, 1940), Oberdorfera (1957), Matuszkiewicza (1952, 1962), Matuszkiewicz i Traczyków (1958), Kępczyńskiego (1960) i Dąbskiej (1961).

W r. 1962 przeprowadziłam wiercenia w obrębie dwóch sucharów (I, VI) przy pomocy świdra Hillera; wykonałam 4 profile, pobierając materiały do analizy szczątków makroskopowych co 25 cm. Ogółem pobrałam 55 próbek torfu.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SUCHARÓW

Położenie. Suchary, na których przeprowadzano badania, leżą na Pojezierzu Suwalskim. Cały obszar Pojezierza jest terenem świeżej akumulacji lodowcowej, położony jest bowiem w strefie objętej ostatnim zlodowaceniem czyli bałtyckim. Północna część zbudowana jest z osadów moreny czołowej (Pachucki 1954), południowo-wschodnia zaś z utworów fluwioglacjalnych tworzących obszerny sandr (Pietkiewicz 1928). Obszar położony na południowy zachód od jeziora Wigry jest pokryty materiałem moreny dennej (Wołosowicz 1926) składającej się z żółtej lub czerwonej gliny zwałowej z domieszką piasku oraz licznymi otoczakami wapiennymi i kredowymi.

Większość sucharów znajduje się w otoczeniu jezior Wigry i Krzywe Wigierskie (ryc. 2). W okolicach Krzywego Wigierskiego położone jest 7 sucharów, tzw. Huciańskich, oraz odległy około 1 km ósmy — Wądołek.

W otoczeniu jeziora Wigry, po jego zachodniej stronie, przy ujściu Czarnej Hańczy leży grupa Sucharów Dembowskich obejmująca trzy jeziora: Dembowskich, Zachodni i Wschodni, a w okolicy jeziora Mulicznego: suchar Wielki i suchar Rzepiskowy. Przy wschodnim brzegu Wigier, koło wsi Krusznik, znajdują się dwa jeziora: Stanowisko i Zie-

Ryc. 2. Rozmieszczenie zbadanych sucharów:
Distribution of the suchars investigated:

1 — Suchar I; 2 — Suchar II; 3 — Suchar III; 4 — Suchar IV; 5 — Suchar V (Dziegciarka); 6 — Suchar VI (Brzozowy Mszar); 7 — Suchar VII (Generalski); 8 — s. Wądołek; 9 — s. Dembowskich; 10 — s. Zachodni; 11 — s. Wschodni; 12 — s. Wielki; 13 — s. Rzepiskowy; 14 — s. Zielone Ślepe; 15 — s. Stanowisko; 16 — s. Wygorzele; 17 — s. Mozguć; 18 — s. Linowo; 19 — s. Drobny; 20 — s. Tłusty; 21 — s. Widny

lone Ślepe, zaś na wysokości wyspy Kamień — suchar Wygorzele. Na północnej stronie jeziora Wigry między tym ostatnim a Dowcieniem leży suchar Mozguć.

Z pozostałych jezior grupa trzech Sucharów Osińskich: Tłusty, Drobny i Widny, leży na północo-wschód od Suwałk w okolicy wsi Osinki, natomiast czwarty suchar: Linowo nieco dalej, koło przystanku Lipniak.

Większość badanych jezior otoczona jest borem sosnowo-świerkowym, tylko grupa Sucharów Osińskich i suchar Mozguć leżą wśród pól uprawnych.

Wszystkie zbadane suchary znajdują się w powiecie suwalskim w nadleśnictwach Wigry i Krasnopol.

Obszar, na którym występują badane jeziora, zalicza Szafer (1959) do krainy Pojezierza Mazurskiego, okręgu Suwalskiego. Polakowski (1963) natomiast umieszcza ten teren w krainie Pojezierza Mazurskiego, w okręgu giżycko-suwalskim, podokręgu wschodnim.

Genezą sucharów zajmował się przede wszystkim Stangenberg (1936), który w latach trzydziestych przeprowadzał pomiary i badał stosunki hydrochemiczne jezior Pojezierza Suwalskiego. Opierając się na pH, twardości wody przy dnie, maksymalnej głębokości i nasyceniu tlenem warstw naddennych w okresie stagnacji letniej wyróżnił on na Suwalszczyźnie 7 typów jezior: 1) oligotroficzne, 2) a — mezotroficzne, 3) b — mezotroficzne, 4) eutroficzne, 5) stawy, 6) jeziorka, 7) suchary.

Uważa on, że suchary o wodach odwapnionych, zakwaszonych, z bogatą zawartością humusu, są końcowym etapem starzenia się jezior bezodpływowych, otoczonych lasem. Autor ten stwierdza, że suchary powstały z jezior oligotroficznych, przekształconych w jeziora eutroficzne, które z kolei uległy stopniowo procesowi dystrofizacji.

Według Wiszniewskiego (1954) suchary mogą przechodzić tylko przez niektóre stadia poprzedzające dystrofizację, mogą też rozpocząć swą ewolucję od jezior oligotroficznych lub mezotroficznych.

Większość badanych sucharów leży bardzo blisko dwóch dużych jezior: Wigier i Krzywego Wigierskiego posiadających dobrze rozwiniętą linię brzegową, z licznymi zatokami, co nasuwa przypuszczenie, że niegdyś były one ich częścią składową. Przynależność niektórych sucharów do zbiorników macierzystych określa Stangenberg na podstawie hypsometrii terenu stwierdzając, że gdyby poziom wody Wigier i Krzywego podniósł się o 2 m, to 14 sucharów zostałoby zalanych wodami tych jezior. Wówczas to należałyby do Wigier suchary: Dembowskich, Wschodni, Zachodni, Rzepiskowy, Wygorzele, Zielone Ślepe, Stanowisko i Mozguć, a do Krzywego sześć sucharów Huciańskich (I—IV). Suchar VII natomiast zostałby zalany wodą jeziora Krzywego po podniesieniu jego poziomu o 4 m.

Trzy z pozostałych sucharów Wądołek, Wielki i Linowo, były i są jednostkami samodzielnymi, a trzy Suchary Osińskie: Tłusty, Drobnny, Widny, tworzyły niegdyś jedną całość. Sześć ostatnich sucharów powstało po okresie lodowcowym, niezależnie od dużych zbiorników wodnych, a mianowicie ze spływających wód i topnienia brył martwego lodu.

Morfologia. Suchary Suwalskie należą do jezior małych; przeciętna ich powierzchnia waha się w granicach 0,5—3 ha (tab. 2). Największym wśród zbadanych jest Suchar Wielki o powierzchni 8,97 ha, najmniejszy zaś Suchar VII o powierzchni 0,17 ha.

Przeważają tu formy owalne, wydłużone o słabo rozwiniętej linii brzegowej, jednak różniące się ukształtowaniem misy jeziornej.

Spotykamy suchary posiadające dość stromy stok misy jeziornej i wąską ławicę przybrzeżną (Wądołek, Suchar I, IV, V), jak również jeziora o stoku misy łagodnym i rozległych płycznach przybrzeżnych (Linowo, Stanowisko, Suchar VI, VII). Suchary ostatniego typu podlegają procesom szybszego zarastania.

Suchary należy zaliczyć do jezior płytkich. Przeciętna maksymalna głębokość znajduje się w granicach 3—6 m. Najgłębszym sucharem jest na danym terenie Wądołek o głębokości maks. 16 m, najpłytszym zaś Linowo o głębokości maks. 1,6.

Właściwości fizyczno-chemiczne. Suchary Suwalskie różnią się pod względem właściwości fizyczno-chemicznych wody zdecydowanie od innych jezior, jak to widać z wyników Stangenberga z lat 1934—36 (tab. 1)*. Charakteryzują się one wodą o barwie przeważnie brązowo-żółtej z dużą zawartością humusu, stosunkowo małą przezroczystością (około 2 m) i wysoką kwasowością.

Temperatura i natlenienie przydennych warstw wody są różne. W dużej mierze należy to tłumaczyć płytkością tych zbiorników i działaniem wiatru, który powoduje prawie ciągłe mieszanie wody warstw dennych z powierzchniowymi. Poza tym suchary posiadają dość duże ilości wolnego dwutlenku węgla, lecz ubogie są w wapń.

W ostatnich czterech kolumnach tabeli 1 podane są ilości fosforanów, azotanów, siarczanów i chlorków w powierzchniowych warstwach wody 15 sucharów w czasie cyrkulacji jesiennej z r. 1936 (Stangenberg 1937). Jak wynika z tych zestawień, suchary odznaczają się znikomą obecnością tych związków. Porównując średnie zawartości fosforanów i azotanów w 7 typach jezior suwalskich, co ilustruje poniższa tabelka, stwierdza się, że suchary odznaczają się wyjątkowym ubóstwem związków pokarmowych.

Typ jezior	PO ₄ mg/cbm	N(NO ₃) mg/cbm
oligotroficzne	10	30
a — mezotroficzne	90	430
b — mezotroficzne	55	95
eutroficzne	45	54
stawowe	60	60
jeziorka	130	140
suchary	3	30

* Wszystkie tabele umieszczono na końcu pracy.

Charakterystyka florystyczna. Suchary Suwalskie należą do jezior dystroficznych. Mają one dość bujnie rozwiniętą roślinność mszystą i naczyniową strefy zarastania, lecz ubogą w gatunki. W procesie zarastania bierze czynny udział zarówno roślinność mszysta, szczególnie torfowce, z których zbudowany jest pomost pływający na wodzie, jak i naczyniowa, reprezentowana przez związane z dnem rośliny wodne o liściach pływających, oczerety, turzyce i zarośla łozowe.

Rozmieszczenie roślinności jest w zbiornikach nierównomierne i zależy od bardzo wielu czynników, z których najważniejszymi są: wielkość jeziora, głębokość, charakter dna, stok niecki jeziornej, charakter brzegu, morfologia i roślinność terenów otaczających oraz wiążące się z tym czynniki mikroklimatu.

Ze względu na sposób zarastania można by Suchary Suwalskie podzielić na trzy grupy (tab. 2).

Do pierwszej należałoby zaliczyć te suchary, w których w procesie zarastania biorą udział przeważnie rośliny naczyniowe reprezentowane przez roślinność wodną o liściach pływających, oczerety, turzyce i zarośla łozowe. Należą tu suchary: Linowo, Widny, Mozguć i Wądołek.

Drugą grupę stanowiłyby suchary, w których procesie zarastania biorą udział oprócz wyżej wymienionych roślin również torfowce budujące pływający pomost. Grupa ta reprezentowana jest przez suchary: Stanowisko, Wygorzele, II, Dembowskich, Rzepiskowy, I, VI i Wielki.

Do trzeciej należałoby zaliczyć te zbiorniki, w których w procesie zarastania bierze udział nasuwający się od brzegu na wodę pomost torfowcowy. Jest to najliczniejsza grupa obejmująca 9 sucharów, a mianowicie: Zielone Ślepe, Wschodni, Zachodni, VII, Tłusty, Drobný, V, III i IV. Cztery ostatnie stanowiłyby czysty typ. W pozostałych pięciu oprócz pomostu torfowcowego rozwija się roślinność wodna o liściach pływających. Obecność tej ostatniej grupy roślin należy tłumaczyć ukształtowaniem stoku niecki jeziornej; z przebiegu izobat wynika mianowicie, że stok dna w pięciu pierwszych zbiornikach jest łagodny (ryc. 3B); w jego partiach przybrzeżnych występują rozległe płycizny, ciągnące się 15—20 m, co umożliwia i ułatwia osiedlanie się i rozwój roślinności wodnej o liściach pływających. Natomiast w czterech ostatnich sucharach stok niecki jeziornej jest raczej stromy (ryc. 3A), a przybrzeżna ławica opanowana jest przez pomost torfowcowy nasunięty od brzegu na wodę; tak wykształcony brzeg utrudnia osiedlanie się roślin.

W obrębie silnie uginającego się pomostu torfowcowego, pływającego, ale związanego z brzegiem, a zwanego na Lubelszczyźnie spleją (Fijałkowski 1960), na Pomorzu zaś płem (Czubiński 1948) dadzą się wydzielić trzy pasy (ryc. 4), ponadto czwarty wykształcony już poza nim.

Pierwszy pas wewnętrzny, tuż przy otwartym lustrze wody, o sze-

Rys. 3. Pasy roślinne strefy zarastania: A — w sucharach o stromym stoku niecki jeziornej, B — w sucharach o łagodnym stoku

I — pas z dominującą *Carex limosa*, II — pas z panującą *Rhynchospora alba*, III — mszar, V — roślinność wodna o liściach pływających

Plant belts of the zone subject to overgrowth: A — in lakes with steep slope of the basin, B — in lakes with mild slope. I — belt with predominant *Carex limosa*, II — belt with predominant *Rhynchospora alba*, III — belt of *Sphagnetum medii et rubelli*, V — aquatic vegetation with floating leaves

Ryc. 4. Rozmieszczenie pasów roślinnych na pomoście torfowcowym

I — pas z dominującą *Carex limosa*, II — pas z panującą *Rhynchospora alba*, III — mszar, IV — bór bagienny;

Distribution of plant belts on *Sphagnum* mat.

I — belt with predominant *Carex limosa*, II — belt with dominating *Rhynchospora alba*, III — belt of *Sphagnetum medii et rubelli*,
IV — swamp forest with pine

rokości 0,2—0,5, a sporadycznie 1 metra, zbudowany jest ze *Sphagnum apiculatum* z domieszką *Sph. obtusum* i rzadziej *Sph. cuspidatum*, z dużym udziałem *Carex limosa*, *C. lasiocarpa*, *Scheuchzeria palustris* oraz z pojedynczymi okazami *Lysimachia vulgaris* i *Peucedanum palustre*.

Drugi pas, o szerokości 1—4 m, pokryty jest nadal głównie przez *Sphagnum apiculatum* z niewielką ilością *Sph. magellanicum*; wśród nich rośnie *Rhynchospora alba*, *Drosera rotundifolia* i *D. anglica*, rzadziej *Scheuchzeria palustris*, *Menyanthes trifoliata* i *Comarum palustre*. Pas ten bywa również dość silnie nawodniony i łatwo ulega rozerwowaniu.

Trzeci pas różni się od poprzednich obfitym występowaniem *Sphagnum magellanicum*, niekiedy *Sph. rubellum*, brakiem przeważnie *Rhynchospora alba* i *Scheuchzeria palustris* oraz dość dużym udziałem *Andromeda polifolia*, *Oxycoccus quadripetalus*, *Drosera rotundifolia*, jak również pojawieniem się *Polytrichum strictum*, *Aulacomnium palustre*, *Eriophorum vaginatum* i pojedynczych okazów karłowatej sosny, silnie porośniętej porostami, a w pobliżu otaczającego boru bagiennego pojawia się *Vaccinium uliginosum* i *Ledum palustre*. Szerokość tego pasa wynosi 2 do 5, czasem 10 m, a nawet więcej.

Czwartym i ostatnim pasem wykształconym już na podłożu mineralnym częściowo zatorfionym bywa bór bagienno o niskich pniach sosen i świerków, często z licznie rosnącą brzozą omszoną. Dno tego lasu zasłane jest kobiercem *Sphagnum apiculatum*, *Sph. magellanicum* i *Sph. nemoreum*, pośród którego — w miarę oddalania się od lustra wody i zmniejszania się pokładu torfu — pojawiają się coraz liczniej gatunki miejsc suchszych, jak *Hylocomium splendens*, *Entodon schreberi*, *Dicranum undulatum* i *D. scoparium*. W pasie tym w warstwie runa dominuje *Vaccinium uliginosum* i *Ledum palustre* tworząc czasem rozległe łąny. Na obnażonych korzeniach sosen gromadnie rośnie *Dicranum flagellare*.

Granice między tymi pasami są w obrębie całej strefy zarastania często trudne do ustalenia. Odbywa się zazwyczaj wzajemne przenikanie gatunków w obrębie kontaktu pomiędzy pasami. Szczególnie trudno wyznaczyć granicę pomiędzy mszarem a borem bagiennym.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZBADANYCH SUCHARÓW

I. Suchary z udziałem roślinności torfowisk niskich

Suchar Linowo (154 m n.p.m.) leży w odległości 7—8 km na północo-wschód od Suwałk, w dolinie ciągnącej się od wsi Węgielnia-Bilwinowo w kierunku osady Lipniak. Dolina ta otoczona jest wzniesieniami morenowymi pokrytymi borem sosnowym z domieszką świerka. We wcześniejszych okresach cała dolina była jeziorem; obecnie suchar,

Ryc. 5. Wygląd jeziora przy wysokim stanie wody; Suchar Linowo
 Appearance of lake during high water level; Suchar Linowo.

o powierzchni 1,5 ha, jest zanikającym, naj płytszym zbiornikiem pośród opisywanych; jego maksymalna głębokość wynosi 1,6 m, przy czym można zaobserwować tu duże wahania poziomu wody (ryc. 5) wynoszące 0,5 m między okresem letnim a wiosennym czy jesiennym. Te wahania wody odbijają się na wykształceniu i bujności roślinności porastającej jezioro.

Na całej powierzchni sucharu rozwija się roślinność wodna, która tworzy niezbyt zwarte łany składające się z *Nuphar luteum*, *Nymphaea alba*, *Potamogeton natans* i rzadziej *Elodea canadensis*.

Na rozległych przybrzeżnych ławicach rozciągających się przy północnym i południowo-wschodnim brzegu jeziora rośnie *Glyceria fluitans* i *Heleocharis acicularis* wraz z *Sparganium simplex*, *Equisetum limosum* i *Calliergon cuspidatum*.

Wzdłuż brzegów jeziora wykształcone są zarośla łozowe, w których spotyka się w niewielkiej ilości *Salix pentandra* i pojedyncze drzewa *Salix alba*.

Przy południowo-wschodnim brzegu, na skraju wypasanej łąki występuje pas roślinności, w skład której wchodzi takie gatunki, jak *Carex lasiocarpa*, *C. fusca*, *Mentha aquatica*, *Molinia coerulea*, *Galium palustre*, *Ranunculus flammula*, *Trifolium pratense*, *Potentilla anserina*, a z mszaków *Calliergon cuspidatum* i *Climacium dendroides*.

W kierunku północno-zachodnim od brzegów sucharu Linowo rozciąga się podmokła kwaśna łąka turzycowa z dominującą *Carex rostrata*, wśród której spotyka się *Lysimachia thyrsiflora*, *Peucedanum palustre*, *Phragmites communis*, *Juncus conglomeratus*, *Equisetum limosum*, *Mentha aquatica*, a w partiach odleglejszych od jeziora — *Carex vesicaria*. Na dnie rosną mchy *Sphagnum cuspidatum*, *Drepanocladus revolvens* i *Calliergon cuspidatum*.

Suchar Linowo można uważać za zbiornik o daleko posuniętym procesie zarastania. Jest on pokryty niezbyt zwartą roślinnością wodną i błotną, której szybki i bujny rozwój utrudniony jest przez okresowe wahania poziomu wody. W okresie niskiego stanu wody, to znaczy w miesiącach letnich, całe płyty roślinności wodnej znajdują się w suchym bezwodnym środowisku.

Suchar Widny (158 m n.p.m.) o powierzchni 2,2 ha i głębokości maksymalnej 4,2 m wraz z dwoma innymi: Drobnym i Tłustym, z którymi kiedyś tworzył jedno wspólne jezioro, leży między osadami Szwajcaria a Osinki na północo-wschód od Suwałk i jest otoczony wzgórzami. Wzniesienia te w niedalekiej przeszłości były porośnięte lasem sosnowym, obecnie tu i ówdzie znajdują się jego znikome szczątki, natomiast wkoło rozciągają się pola uprawne.

Suchar Widny należy do zbiorników o mało posuniętym procesie zarastania; porośnięte są tylko przybrzeżne partie jeziora, zaś środkowa część pozbawiona jest zupełnie roślin.

Roślinność wodna o liściach pływających wykształca się odcinkami wzdłuż brzegów w postaci niezbyt szerokiego pasa. W skład jej wchodzi *Nuphar luteum*, *Nymphaea alba*, *Elodea canadensis* i *Chara sp.*

Północne i południowe brzegi jeziora porastają oczerety, wśród których najliczniej spotyka się *Phragmites communis*, rzadziej zaś *Equisetum limosum*. Ten ostatni gatunek w kilku miejscach na zamulonej ławicy przybrzeżnej tworzy prawie czyste skupienia.

Wzdłuż zachodniego brzegu rosną krzewy *Salix cinerea* z domieszką *Alnus glutinosa* i *Frangula alnus*. Udział *Alnus glutinosa* zwiększa się w kierunku północnym, w rezultacie czego wykształca się na północnej stronie bardzo podtopiony płat zarośli olszy czarnej. Pomiedzy krzewami olszy i łozy występują *Solanum dulcamara*, *Thelypteris palustris*, *Carex rostrata*, *Calla palustris*, *Menyanthes trifoliata* i inne. Z mszaków licznie rosną tu torfowce *Sphagnum squarrosum*, *Sph. palustre* i *Sph. apiculatum* oraz z innych mchów *Climacium dendroides* i *Calliergon cuspidatum*.

Poza pasem oczeretów rozciąga się łąka pastwiskowa na południowej, a miejscami i na wschodniej stronie jeziora, która dochodzi do samego lustra wody.

Ryc. 6. Skupienia *Menyanthes trifoliata* w wodzie; brzeg wschodni sucharu Mozguć

Agglomerations of *Menyanthes trifoliata* in the water; eastern shore of Suchar Mozguć.

Suchar Mozguć (133 m n.p.m.), o powierzchni 4,83 ha i głębokości maksymalnej 5,2 m, jest położony koło wsi Magdalenowo, między jeziorami Wigry a Dowcieniem. Jest on otoczony wzgórzami pokrytymi polami uprawnymi.

Jezioro to należy do zbiorników o słabo zaawansowanym procesie zarastania; hamując na ten proces wpływa duża (o kształcie zbliżonym do kwadratu) powierzchnia jeziora, stosunkowo znaczna głębokość, otwarta przestrzeń (brak lasów) i bliskość wsi.

Roślinność wodna, reprezentowana przez *Nymphaea alba* oraz *Elodea canadensis* rozwija się w strefie przybrzeżnej i na małych powierzchniach.

Również słabo wykształcona jest roślinność oczeretowa występująca zaledwie w kilku płatach na wschodnim brzegu jeziora. Najliczniej rośnie *Phragmites communis*, w mniejszej ilości *Typha latifolia*, *Equisetum limosum*, *Acorus calamus* i *Menyanthes trifoliata*. Wśród nich występuje *Calliergon cuspidatum* i *Sphagnum palustre*.

Poza tym rozwijają się zbiorowiska, które można uważać za początkowe stadium ekspansji roślin od brzegu, złożone głównie z bylin kłaczowych, takich jak *Comarum palustre*, *Menyanthes trifoliata* i *Calla*

palustris. Kłęcza tych roślin pooplatywane są przez darnie *Sphagnum palustre* (Ryc. 6).

W dalszej fazie rozwojowej tych zbiorowisk zjawiają się tam: *Carex lasiocarpa*, *C. fusca* i *C. rostrata*, a darnie mszyste stają się bardziej zbite. Zbiorowiska o takim składzie występują przy wschodnim brzegu suchara Mozguc.

Wzdłuż północnego i częściowo na wschodnim oraz południowym brzegu sucharu wykształcają się gęste zarośla łozowe tworząc niezbyt szeroki pas. Oprócz *Salix cinerea* w warstwie krzewów rośnie *S. pentandra*, *Frangula alnus* i *Alnus glutinosa*. W warstwie runa występuje licznie *Carex rostrata*, *C. canescens*, *Juncus conglomeratus*, *Agrostis canina*; w mniejszej ilości *Solanum dulcamara*, *Lycopus europaeus*, *Thelypteris palustris*, *Galium palustre* i inne. Na dnie znajduje się *Lysimachia nummularia*, z mszaków *Sphagnum squarrosum*, *Sph. apiculatum* i *Calliergon cuspidatum*.

Na południowo-zachodniej stronie jeziora występuje dość dobrze wykształcony płat olsu, o charakterystycznej kępiastej strukturze, wielkości 300 m². Rośliny runa są tu ułożone mozaikowo. W obniżeniach między kępami, gdzie gleba jest silnie nawodniona w ciągu całego okresu wegetatywnego, skupiają się rośliny szuwarowe i błotne, jak *Carex pseudocyperus*, *C. rostrata*, *Juncus conglomeratus*, *Calla palustris* oraz mchy: *Sphagnum squarrosum*, *Sph. palustre*, *Sph. apiculatum* i *Climacium dendroides*. Na kępach natomiast panują krzewy *Frangula alnus*, *Salix cinerea*, *Ribes nigrum* i gatunki, które chętnie osiedlają się na miejscach suchszych, a z mchów — *Dicranum scoparium*, *Entodon schreberi* i inne.

Wądołek wyniesiony 160 m n.p.m. najgłębszy suchar pośród badanych (głębokość maksymalna 16 m), o powierzchni 1,00 ha, o bardzo stromym stoku misy jeziornej, leży 300 m na północ od rzeki Kamionki. Otoczony jest dość wysokim wzniesieniem (różnica między lustrem wody a szczytem wzgórz wynosi około 12 m) pokrytym borem sosnowym z dużym udziałem leszczyny w podszyciu.

Pomost torfowcowy wykształcony fragmentarycznie wzdłuż zachodniego i północnego brzegu jest bardzo wąski, od 1 do 2 m szerokości, luźnej konstrukcji, zbudowany ze *Sphagnum apiculatum* z dużą ilością *Carex limosa*, *C. rostrata*, *Menyanthes trifoliata*, *Comarum palustre* i *Calla palustris*. Jest to właściwie pas przede wszystkim z *Carex limosa*.

Odcinki na południowym brzegu sucharu porośnięte są roślinnością złożoną z *Comarum palustre*, *Menyanthes trifoliata* i *Calla palustris*, których kłęcza oplecione są darniami *Sphagnum apiculatum*. W niektórych miejscach oprócz wyżej wymienionych roślin występuje *Carex lasiocarpa*, *Peucedanum palustre* i *Sphagnum palustre*.

Na północno-zachodnim i na wschodnim brzegu jeziora rozciągają się płaty krzewów łoży, które przenikają do mokrych zarośli olszy otacza-

jących z tej strony suchar. W runie tych zbiorowisk można spotkać *Solanum dulcamara*, *Thelypteris palustris*, *Lycopus europaeus*, *Juncus conglomeratus*, *Sphagnum squarrosum*, *Climacium dendroides*, *Calliergon cuspidatum* i inne.

II. Suchary z udziałem roślinności torfowisk niskich, przejściowych i wysokich

Suchar Stanowisko znajduje się wraz z sucharem Zielone Ślepe, od którego oddalony jest o 300 m, w pasie zatorfienia ciągnącym się na południowo-wschodniej stronie Wigier między wsiami Krusznik a Zakąty. Położony jest 133 m n.p.m., a powierzchnia jego wynosi 1,85 ha, a głębokość maksymalna 5,7 m.

Przybrzeżna strefa zarastania w sucharze Stanowisko jest słabo rozwinięta, przeciętnie wynosi 2—3, a rzadko 5 m.

Roślinność wodna składająca się z dużej ilości *Nymphaea alba*, mniejszej *Nuphar luteum* i *Potamogeton natans*, oraz z *P. perfoliatus*, *Elodea canadensis* i *Chara* sp. zajmuje przybrzeżne płycizny tworząc przerywany pas wkoło jeziora.

W kierunku brzegu tuż za tym pasem rozwija się odcinkami pomost torfowcowy 1—2 m szerokości, zbudowany z lepiej lub mniej zbitych darni *Sphagnum apiculatum* i *Sph. magellanicum*, wśród których rośnie *Carex lasiocarpa*, *C. fusca*, *C. canescens*, *Equisetum limosum*, *Juncus conglomeratus*, *Comarum palustre*, *Menyanthes trifoliata* i *Calla palustris*. Pomiedzy tą roślinnością na południowo-zachodnim brzegu sucharu występuje *Scorpidium scorpioides* w mniejszej ilości na ple, natomiast licznie w wodzie tworząc z *Chara* sp. małe płyty.

W innych partiach przybrzeżnych, szczególnie na północnej stronie jeziora, rozwijają się skupienia roślin kłaczowych — *Comarum palustre*, *Menyanthes trifoliata* i *Calla palustris*.

Oczerety, w skład których wchodzi *Typha latifolia*, *T. angustifolia*, *Phragmites communis*, *Sphagnum apiculatum* i *Sph. palustre*, tworzą niewielki płat na południowo-wschodnim brzegu jeziora.

Wzdłuż zachodniej strony masowo rosną krzewy *Salix cinerea* z domieszką *S. pentandra*, *Frangula alnus* i *Alnus glutinosa*. W runie oprócz *Lycopus europaeus* i *Solanum dulcamara* występuje *Carex lasiocarpa*, *Agrostis canina*, *Galium palustre*, *Sphagnum apiculatum* i *Sph. squarrosum*. Ku północy zarośla łoży przechodzą w mszar, który ciągnie się w kierunku jeziora Zielone Ślepe.

Brzeg wschodni porośnięty jest borem bagiennym, w którym dużą rolę odgrywa *Betula pubescens*.

Na południowej stronie rozciąga się łąka pastwiskowa, natomiast w wodzie jeziora występuje dość rozległy płat *Equisetum limosum*.

Suchar Wygorzele (133 m n.p.m.) posiada kształt wydłużony z południowego wschodu na północny zachód i zajmuje powierzchnię 2,06 ha, a jego maksymalna głębokość wynosi 4 m. Leży on w dużym kompleksie leśnym, na północ od wsi Czerwony Krzyż i w odległości 800 m od wschodniego niskiego brzegu Wigier. W przeszłości tworzył z Wigrami jedną całość, lecz wskutek obniżenia się wód powstało oddzielne jezioro.

Od strony wschodniej do samego brzegu dochodzi wysokopienny las sosnowy, który porasta całe wzgórze wznoszące się 5 m nad poziom wody w jeziorze. Od zachodu suchar otoczony jest 30-letnim dość wilgotnym sosnowym zagajnikiem. Natomiast od północno-zachodu i południowo-wschodu rozciąga się bór bagienny o niskich drzewach ze znacznym udziałem *Ledum palustre* i *Vaccinium uliginosum* w podszyciu, na dnie zaś z dużą ilością *Sphagnum apiculatum* i *Sph. magellanicum*.

Roślinność wodna o liściach pływających złożona z *Nymphaea alba* i *Nuphar luteum* zajmuje dość znaczną powierzchnię tworząc pas wokół jeziora oraz rozległe płyty w miejscach płytszych.

Pomost torfowcowy rozwinięty jest najlepiej na południowo-wschodnim i północno-zachodnim brzegu, gdzie osiąga 6 m szerokości, a najsłabiej ze strony wschodniej. W pasie zewnętrznym sąsiadującym z lustrem wody występuje w dużej ilości *Carex lasiocarpa*, *C. gracilis*, pojedynczo *C. limosa*, *C. fusca* i *C. rostrata* oraz *Sphagnum apiculatum*. Następnie wykształca się pas mszaru, który przechodzi w bór na bagnie.

Wzdłuż południowo-wschodniej strony, gdzie wysokopienny las rośnie nad samym brzegiem sucharu, występuje licznie *Menyanthes trifoliata* i *Comarum palustre* oraz w niewielkiej ilości *Lysimachia vulgaris* i *Peucedanum palustre*. Pośród tych roślin rosną darnie *Sphagnum cuspidatum*.

Suchar Dembowski o powierzchni 3,59 ha i głębokości maksymalnej 8,5 m leży w odległości 350 m od zatoki Hańczańskiej jeziora Wigry. Teren ten silnie obniżony w stosunku do otaczających wzgórz morenowych, pokrytych drzewostanem sosnowym z dużym udziałem świerka, stanowił niegdyś zatokę dawnego jeziora Wigry. W niecce tej, oprócz sucharu Dembowski, znajdują się dwa mniejsze suchary: Wschodni i Zachodni, położone bliżej zatoki Hańczańskiej.

Roślinność wodna o liściach pływających tworzy przerywany pierścień wokół jeziora. Partie bliższe pomostu torfowcowego zajmuje *Nymphaea alba* i *Nuphar luteum*, głębiej wkracza *Potamogeton natans*.

Pomost torfowcowy ze względu na duży rozmiar jeziora oraz niewielki pas zabagnienia, z czym wiąże się bliskość gruntu mineralnego, jest słabo rozwinięty.

Na północnym i północno-wschodnim brzegu wykształca się pas z *Carex limosa*, następnie pas *Rhynchospora alba*, który przechodzi w bór bagienny porastający całą nieckę Sucharów Dembowski.

Wzdłuż pozostałych brzegów występują wśród *Sphagnum apiculatum* rośliny kłaczowe — *Comarum palustre* i *Menyanthes trifoliata*, pojedyncze okazy *Lysimachia vulgaris*, *L. thyrsiflora* i *Peucedanum palustre*, tworzące wczesne stadium zarastania. W innych miejscach rośnie oprócz wyżej wymienionych roślin *Carex lasiocarpa*, która swoim systemem kłaczowym utrwała luźne darnie torfowców; *Carex limosa* zaś wkracza dopiero na pomost wykształcony i większych rozmiarów. Występowanie we wczesnych fazach rozwojowych pomostu torfowcowego *Carex lasiocarpa*, a w późniejszym okresie dominację *C. limosa*, należałoby tłumaczyć warunkami wodnymi i żyznością podłoża. Przy brzegach mineralnych spływające wody deszczowe, jak również zsuwający się humus z otaczających wzgórz, niosą ze sobą niewątpliwie dość bogaty materiał odżywczy, co powoduje eutrofizację przybrzeżnych partii jeziora. Przy brzegach o szerokim pasie zabagnienia, gdzie podłoże wykazuje dużą kwasowość i jest skąpożyźne, chętniej osiedla się *Carex limosa* niż *C. lasiocarpa*. Poza tym *C. lasiocarpa* jest turzycą znoszącą silne podtopienie a nawet zalanie; wkracza zwykle tam, gdzie na powierzchni torfowców stoi woda. Jest ona niewątpliwie dobrym wskaźnikiem nieznacznej eutrofizacji podłoża i silnego nawodnienia.

Suchar Dembowski należy do grupy o mało zaawansowanym procesie zarastania wskutek dość dużej powierzchni oraz słabo rozwiniętej linii brzegowej, jak również posiadania na dużych odcinkach brzegów mineralnych.

Suchar Rzepiskowy (132 m n.p.m.) o powierzchni 1,09 ha i o głębokości maksymalnej 6 m leży między Sucharem Wielkim a zatoką Słupiańską jeziora Wigry, wśród wzgórz morenowych porośniętych borem sosnowym z domieszką świerka.

Roślinność wodna o liściach pływających rozwija się w przybrzeżnych płyciznach na północnej i południowej stronie jeziora.

Pomost torfowcowy, lepiej wykształcony na północy, otacza cały suchar. Na południowym i południowo-zachodnim brzegu wśród darni *Sphagnum apiculatum* rośnie licznie *Carex lasiocarpa*, *Menyanthes trifoliata*, pojedynczo *Carex limosa*, *Rhynchospora alba*, *Oxycoccus quadripetalus* i *Andromeda polifolia*. Wzdłuż północnego brzegu zaś darnie *Sphagnum apiculatum* i licznie występującego tu *Sph. magellanicum* są bardzo zwarte, pomost torfowcowy posiada znaczną grubość, a w pasie sąsiadującym z wodą rośnie *Rhynchospora alba*. W miarę oddalania się od lustra wody zmniejsza się udział *Rhynchospora alba* i wykształca się mszar, który przechodzi w bór na bagnie.

Na południowej stronie jeziora występują krzewy *Alnus glutinosa*, *Salix cinerea* i *Betula pubescens*. W runie spotyka się *Sphagnum squarrosum*, *Menyanthes trifoliata*, *Solanum dulcamara*, *Thelypteris palustris* i inne.

Suchar I (144 m n.p.m.) leży na skraju lasu sosnowego obok zabudowań gajówki w Krzywym, otoczony wzniesieniem wysokości 154 m n.p.m., o różnicy w stosunku do poziomu wody w jeziorze 10 m. Powierzchnia jego wynosi 1,04 ha, a głębokość maksymalna 4,5 m.

Roślinność wodna o liściach pływających jest w Sucharze I słabo rozwinięta i składa się wyłącznie z *Nuphar luteum*, który tworzy niewielkie skupienia tuż przed kożuchem torfowcowym, rosnąc na 1—1,5 m głębokości. Jedynie w części wschodniej, gdzie jezioro tworzy jakby zatokę i jest spłycone, gatunek ten wchodzi głębiej na otwartą przestrzeń wodną i wykształca rozleglejsze płyty.

Pomost torfowcowy rozwija się tu dobrze i ciągnie się wzdłuż całego brzegu, tylko zachodnia strona jeziora, położona najbliżej zabudowań gajowego, jest na pewnych odcinkach pozbawiona pomostu. W części południowej i we wschodniej zatoce jeziora pływający pomost torfowcowy osiąga szerokość 15, a nawet 20 m, grubość jego w odległości 5—8 m od otwartego lustra wody wynosi 2—2,5 m. Zazwyczaj pod nim znajduje się warstwa wody sięgająca 1—1,5 m głębokości. Roślinność na kożuchu torfowcowym, zbudowanym głównie w partiach silnie nawodnionych przez *Sphagnum apiculatum*, a w odleglejszych przez *Sph. magellanicum*, wykazuje charakterystyczną strefowość. W pasie z *Rhynchospora alba* licznie występuje *Drosera anglica* i *Scheuchzeria palustris*.

Od strony południowej i południowo-wschodniej jeziora rośnie bór bagienny tworząc pas 20—50 m, natomiast przeciwne brzegi porośnięte są krzewiastymi zaroślami *Alnus glutinosa* i *Betula pubescens*.

Suchar II (144 m n.p.m.) o powierzchni 2,7 ha i głębokości maksymalnej 11 m leży w pobliżu jeziora Czarne przy Krzywym, w tym samym kompleksie leśnym co Suchar I, w odległości 200—500 m od niego i należy na tym obszarze do największych i najgłębszych zbiorników.

Strefa zatorfienia jest przy Sucharze II niewielka, wysokopienny las, ściślej bór sosnowy, rośnie przeważnie przy samych brzegach jeziora; jedynie na wschodzie ciągnie się większe zabagnienie i z tej strony wykształca się lepiej roślinność strefy zarastania.

Sąsiedztwo atrakcyjnego jeziora Krzywego wiąże się z silnym wyniszczeniem strefy zarastania przez człowieka, również bliskość brzegu mineralnego, duża, prawie kolistą powierzchnia jeziora i słabo rozwinięta, regularna linia brzegowa powodują, że roślinność tej strefy jest bardzo słabo wykształcona, można więc obserwować tu jedynie wczesne stadia zarastania.

Roślinność wodna o liściach pływających na Sucharze II prawie nie występuje, z wyjątkiem południowego brzegu jeziora, przy którym znajduje się niewielki płat utworzony z *Nuphar luteum*.

Kożuch torfowcowy wykształcony na wschodnim brzegu jeziora, gdzie osiąga 5 m szerokości, składa się z pasa *Carex limosa* oraz pasa porośniętego przez *Rhynchospora alba*, w którym brak jest *Scheuchzeria palu-*

stris, a w małej ilości występuje *Drosera rotundifolia* oraz sporadycznie *D. anglica*. Następnym pasem jest bór bagienny z dużą domieszką świerka i licznym występowaniem *Vaccinium uliginosum* i *Ledum palustre* w podszyciu.

Na pozostałych brzegach Sucharu II rosną zbiorowiska złożone głównie z roślin kłaczowych, jak *Menyanthes trifoliata*, *Comarum palustre* i *Calla palustris* wraz ze *Sphagnum palustre* f. *squarrosulum*, *Sph. apiculatum*. Torfowce tworzą między bylinami luźną „watę”. Zbiorowisko to można uważać za jedno z początkowych faz zarastania. Na niektórych odcinkach brzegu, oprócz wymienionych wyżej roślin, licznie występuje *Carex lasiocarpa*, darnie torfowców zaś, głównie *Sphagnum apiculatum*, są bardziej zbite, jednak nadal łatwo ulegają rozerwaniu. Tak zbudowane zbiorowisko należałoby uważać na następne stadium w procesie tworzenia pomostu torfowcowego.

Suchar VI o powierzchni 0,32 ha i głębokości maksymalnej 3 m leży na południe od rzeki Kamionki i jest jednym z najbardziej zarośniętych jezior.

Roślinność wodna o liściach pływających, dzięki łagodnemu ukształtowaniu dna i rozległym pływaczom, które nie przekraczają 2 m głębokości, pokrywa prawie całą powierzchnię zbiornika. W przybrzeżnej strefie tuż obok pomostu torfowcowego występuje *Nuphar luteum* i *Nymphaea alba*, natomiast głębsze partie jeziora zajmuje *Potamogeton natans*.

Kożuch torfowcowy jest najlepiej wykształcony na południowo-wschodnim oraz północnym brzegu jeziora i jest dość twardy, osiągając na niektórych odcinkach 9—10 m szerokości. Pas z *Carex limosa* oraz następny pas z *Rhynchospora alba*, w którym występuje nielicznie *Scheuchzeria palustris*, jest stosunkowo wąski, natomiast dużą powierzchnię, około 6 m szerokości zajmuje strefa mszaru z pojedynczymi okazami karłowatej sosny, która przechodzi w ciemny bór bagienny z licznym udziałem świerka. W runie jego na południowej stronie jeziora rośnie sporadycznie *Empetrum nigrum*.

Wzdłuż północno-zachodniego brzegu sucharu wykształca się niewielki płat zubożałej roślinności oczeretowej. W skład jej wchodzi: *Phragmites communis*, rzadko *Typha latifolia* i *T. angustifolia* oraz *Carex rostrata*; na dnie panuje *Sphagnum squarrosulum* wraz z *Calliergon stramineum* oraz kłaczowe byliny *Calla palustris*, *Menyanthes trifoliata* i *Comarum palustre*. Te trzy ostatnie gatunki tworzą w sąsiedztwie czyste płaty w towarzystwie *Sphagnum apiculatum*.

Suchar Wielki (135 m n.p.m.) posiada silnie wydłużony kształt i rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód. Otoczony

Ryc. 7. Słabo wykształcony pomost torfowcowy występujący wzdłuż północnego brzegu Sucharu Wielkiego

Weakly developed *Sphagnum* mat. occurring along northern shore of S. Wielki.

jest z północy i południa wzgórzami morenowymi wznoszącymi się 4 m nad poziom wody w jeziorze. Powierzchnia jego wynosi 8,97 ha, a głębokość maksymalna 9,6 m, jest to największy zbiornik ze wszystkich sucharów. Suchar Wielki leży w kompleksie leśnym w odległości 400 m na wschód od jeziora Mulicznego koło Wigier.

Roślinność wodna o liściach pływających rozwija się na płycznach położonych we wschodniej i północno-zachodniej części jeziora oraz wzdłuż ławic przybrzeżnych obok pomostu torfowcowego. Składa się z *Nymphaea alba* i *Nuphar luteum*.

Na brzegu zachodnim i na północno-zachodnim krańcu sucharu znajdują się niewielkie płyty roślin oczeretowych zbudowane z licznie rosnącej tu *Phragmites communis*, sporadycznie *Typha latifolia* i *Schoenoplectus lacustris* oraz z *Sphagnum palustre* i *Calliergon cuspidatum*.

Pomost torfowcowy wykształcony jest w przybrzeżnych partiach całego jeziora, nie występuje jedynie na zachodnim oraz odcinkami na południowym brzegu. Najlepiej rozwinięty jest wzdłuż południowo-wschodniego brzegu, gdzie występują jego charakterystyczne pasy, a mianowicie: *Carex limosa*, *Rhynchospora alba*, mszar i ostatni utworzony z drzewo-

stanu złożonego z *Betula pubescens*, *Alnus glutinosa*, *Pinus silvestris* i *Picea excelsa*. Na dnie tego lasu znajduje się oprócz płatów *Sphagnum apiculatum* i *Sph. palustre* spora ilość gatunków borowych, jak *Dicranum undulatum*, *D. scoparium*, *Hylocomium splendens* i *Ptilium crista castrensis*.

Na innych odcinkach na pomoście torfowcowym można wyróżnić pas z *Carex limosa* i pas z *Rhynchospora alba*. Wzdłuż północnego brzegu, wśród *Carex limosa* spotyka się rzadki tu gatunek mchu — *Scorpidium scorpioides*.

Suchar Wielki należy do jezior o średnio zaawansowanym procesie zarastania; strefa zarastania, jak również pas zatorfienia wkoło jeziora, są nieduże (Ryc. 7), jedynie na wschodniej i zachodniej stronie jest lepiej wykształcony pomost torfowcowy i większe płyty silnie podmokłe, porośnięte olsem.

III. Suchary z udziałem roślinności torfowisk przejściowych i wysokich

Suchar Zielone Ślepe (133 m n.p.m.) o powierzchni 0,47 ha z *Carex limosa* i pas z *Rhynchospora alba*. Wzdłuż północnego brzegu, Wigier między wsią Krusznik a Zakąty, w odległości 200 m od znajdującego się tu drugiego sucharu Stanowisko. Od strony południowo-wschodniej ciągnie się wzgórze morenowe, wznoszące się 4 m nad poziom wody w jeziorze, porośnięte suchym lasem sosnowym.

Roślinność wodna o liściach pływających, składająca się z *Nuphar luteum* i *Nymphaea alba*, tworzy dość szeroki pierścień (3—4 m) obok kożucha torfowcowego. Zajmuje również większą powierzchnię w południowo-wschodniej części jeziora, gdzie występują rozległe płycizny.

Pomost torfowcowy, złożony z pasa *Carex limosa* oraz następnego z *Rhynchospora alba*, przechodzi w mszar otaczający jezioro.

Suchary Wschodni i Zachodni (133 m n.p.m.), o powierzchni 1,14 ha i 1,25 ha i maksymalnej głębokości 4,2 i 3 m, wydłużone w kierunku równoleżnikowym leżą w pobliżu zatoki Hańczańskiej w odległości 100 m od Wigier. Teren, na którym znajdują się obydwa jeziora, jest zabagniony, szczególnie w kierunku jeziora Wigry, otoczony od zachodu i wschodu wzgórzami morenowymi porośniętymi borem sosnowym z dużą domieszką świerka.

Odległość między sucharami wynosi około 150 m.

Roślinność wodna o liściach pływających składająca się z *Nuphar luteum* i *Nymphaea alba* tworzy niewielkie płyty obok kożucha torfowcowego.

Pomost torfowcowy zajmujący przybrzeżne partie jeziora rozwinięty

jest silniej w kierunku równoleżnikowym osiągając 10 m szerokości, natomiast od północy i południa jest węższy do 4—6 m. Poza pasem z *Carex limosa* wykształca się pas z *Rhynchospora alba*, w którym na pewnych odcinkach występuje masowo *Sphagnum magellanicum*, *Oxycoccus quadripetalus* i *Andromeda polifolia*, pojawia się *Ledum palustre* i *Calluna vulgaris* — cała grupa gatunków z mszaru. W tych miejscach zazwyczaj kożuch torfowcowy jest mocno zbudowany, ciągnie się do 2 m w głąb lub nawet osiąga dno zbiornika. Następuje tu zanik fazy dolinkowej, a kształtowanie się fazy kępkowej mszaru. Należałoby przypuszczać, że rozwój pomostu torfowcowego odbywa się nierównomiernie i niejednocześnie. Przejście jednego pasa w drugi, jak w tym przypadku przemiana fazy *Rhynchospora alba* w mszar, nie zbiega się równocześnie z przemianą pasa *Carex limosa* w pas *Rhynchospora alba*, jak również nie następuje zdobycie nowego terenu (pokrycie wolnego lustra wody pomostem torfowcowym) — przedłużenie pomostu torfowcowego. Następuje tu zakłócenie układu pasowego, za pasem *Carex limosa* pojawia się mszar.

Pas typowego mszaru o szerokości 10 m ciągnie się wzdłuż południowych brzegów obydwóch sucharów, węższy jest znacznie z przeciwnej strony, a najszerszy między jeziorami. Bór bagienny 10—20 m szeroki na stronie północnej, na południowo-zachodniej zaś i południowo-wschodniej węższy, przechodzi w las sosnowy rosnący na wzniesieniach. Jedynie w podmokłej dolinie między sucharami ciągnie się głębiej w kierunku południowym, gdzie znajduje się trzecie jezioro — suchar Dembowskiich.

Na północno-wschodnim brzegu sucharu Zachodniego w kierunku Wigier występuje silne zabagnienie; masowo rośnie tutaj *Carex limosa* i rzadziej *C. rostrata* w kobiercu *Sphagnum apiculatum*.

Suchary Drobny i Tłusty (144 m n.p.m.) o powierzchni 0,51 i 0,72 ha i głębokości maksymalnej 6,4 i około 5 m znajdują się w terenie pagórkowatym pokrytym polami uprawnymi, w odległości 5 km na północ-wschód od Suwałk koło wsi Osinki.

Roślinność wodna o liściach pływających występuje tylko na sucharze Tłustym tworząc przerywany pierścień o szerokości 3 m. Licznie reprezentowany jest tu *Nuphar luteum*, *Potamogeton natans*, w mniejszej ilości *Nymphaea alba* i *Elodea canadensis*, sporadycznie zaś *Potamogeton perfoliatus* i *P. obtusifolius*.

Pomost torfowcowy dobrze wykształcony składa się przeważnie z pasa *Carex limosa*, w którym na wschodnim brzegu suchara Tłustego występuje licznie *Scorpidium scorpioides*. Następnie wykształca się pas z *Rhynchospora alba* przechodzący w mszar otaczający obydwa jeziora.

Mszar charakteryzuje się strukturą kępiastą, na kępach rośnie karłowata sosna. Z mchów występują: *Sphagnum magellanicum* z domieszką *Sph. rubellum*, *Hylocomium splendens* i *Entodon schreberi*; w dolinkach przeważa *Sphagnum apiculatum*; pojedynczo spotkać można *Sph. papil-*

Ryc. 8. Dobrze rozwinięty pomost torfowcowy z licznymi zatokami i półwyspami;
Suchar III

Well developed *Sphagnum* mat. with numerous bays and peninsulas; Suchar III.

losum. Poza tym występuje tu *Drosera rotundifolia*, *Equisetum limosum*, *Eriophorum angustifolium*, *Andromeda polifolia*, *Potentilla erecta* i *Oxy-coccus quadripetalus*, wśród której trafiają się pojedyncze okazy *O. microcarpus*. Cały mszar jest dość wilgotny; w miarę oddalania się od lustra wody staje się coraz suchszy, a na krańcach, tuż przy gruncie mineralnym, jest zupełnie przesuszony.

Suchary III i IV, położone we wspólnym, silnie zatorfionym zagłębieniu, są jeziorami niewielkimi o powierzchni 0,38 ha i 1,16 ha i o maksymalnej głębokości 5 i 7 m.

Suchar III znajduje się bliżej jeziora Czarnego przy Krzywym, a w odległości 300 m na wschód od niego rozciąga się Suchar IV. Należy przypuszczać, że w przeszłości obydwa jeziora stanowiły jeden zbiornik. Postępujący proces zarastania rozdzielił je tworząc dwa osobne jeziora otoczone dzisiaj rosnącym na torfie borem bagiennym.

Roślinności wodnej o liściach pływających w żadnym z tych sucharów nie spotyka się.

Pomost torfowcowy rozwinięty jest tutaj klasycznie, osiąga on znaczną szerokość 15—20, a czasem i więcej metrów, tworzy liczne zatoki, półwyspy i pływające wyspy (Ryc. 8). Poszczególne jego pasy zarastania wy-

kształcone są dobrze, począwszy od pasa z *Carex limosa* poprzez pas z *Rhynchospora alba*, gdzie rośnie *Scheuchzeria palustris* i *Drosera anglica*, oraz pas mszaru ciągnący się w niektórych miejscach na szerokości 15—20 m, aż do boru bagiennego, w którym rzadko rośnie *Empetrum nigrum*.

Suchar V (145 m n.p.m.) z całej grupy Sucharów Huciańskich najbardziej wysunięty na wschód od jeziora Czarnego przy Krzywem, jest silnie wydłużony w kierunku równoleżnikowym i przewężony w środkowej części. Powierzchnia jego wynosi 0,49 ha, głębokość maksymalna 6 m.

Roślinność wodna o liściach pływających nie wykształca się, ponieważ stok dna niecki jeziornej jest stromy, a płytsze partie przybrzeżne opanowane są przez kożuch torfowcowy, natomiast dalej od brzegu jeziora znajduje się znaczna głębokość, na której rośliny wodne o liściach pływających już nie rosną.

Pomost torfowcowy najszerszy na wschodnim i zachodnim brzegu, tworzący liczne zatoki i półwyspy, jest jednakowo dobrze rozwinięty wzdłuż całej linii brzegowej i poprzez pas z *Carex limosa* oraz pas z *Rhynchospora alba*, który charakteryzuje się obecnością rzadziej tu występującej *Scheuchzeria palustris* i brakiem *Drosera anglica*, przechodzi w mszar otaczający jezioro.

Mszar, porośnięty skarłłą sosną z dużą domieszką brzozy omszonej, pokryty jest zwartym kobiercem *Sphagnum apiculatum* i *Sph. magellanicum* o strukturze kępkowej. Na kępkach można spotkać oprócz *Sph. rubellum*, *Sph. fuscum*, *Polytrichum strictum*, rzadziej — *Dicranum undulatum* i *Entodon schreberi*. Z roślin naczyniowych kępki porasta *Oxycoccus quadripetalus*, na ich stokach znajduje się *Andromeda polifolia* i *Drosera rotundifolia*. W warstwie krzewów spotyka się *Vaccinium uliginosum* i *Ledum palustre*. Na odsłoniętym, nagim torfie występują tu torfowiskowe gatunki wątrobowców: *Mylia anomala*, *Cephalozia connivens* oraz leśny *Bazzania trilobata*, jak również *Lophozia marchica* wpłataną w darnie torfowców. Cały mszar jest silnie nawodniony, szczególnie wiosną i deszczowym latem, kiedy bywa pokryty 30 cm warstwą wody. Na skraju mineralnym mszar fragmentarycznie przechodzi w bór bagienny, co wiąże się ze zwiększeniem udziału gatunków borowych, jak *Entodon schreberi*, *Dicranum scoparium* i *Hylocomium splendens*, oraz z masowym występowaniem *Ledum palustre* i *Vaccinium uliginosum*.

Suchar VII o powierzchni 0,17 ha i maksymalnej głębokości 3 m, najmniejsze jeziorko ze wszystkich zbadanych, leży w odległości 150 m od lewego brzegu rzeki Kamionki.

Roślinność wodna o liściach pływających, złożona jedynie z *Nuphar luteum* i *Nymphaea alba*, otacza szerokim pasem całe jezioro i tworzy

liczne płyty w odleglejszych spłyconych jego partiach, gdzie głębokość nie przekracza 2 m.

Pomost torfowcowy pokrywa przybrzeżne partie jeziora wykształcając pas z *Carex limosa*, następny z *Rhynchospora alba*, który przechodzi w rozległy mszar o powierzchni 0,30 ha.

Mszar porośnięty jest drzewostanem sosnowym o małym zwarciu z dużym udziałem brzozy omszonej i sporadycznie świerka. Skarlałe drzewa o nieregularnej, słabo rozwiniętej koronie, pokryte masowo porostami, osiągają przeciętnie 3—5 m wysokości, jedynie na krańcach mszaru są wyższe i lepiej rozwinięte. Dno mszaru posiada strukturę kępkową. Kępki buduje *Sphagnum magellanicum* wraz ze *Sph. nemoreum*, *Polytrichum strictum* i rzadko *Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens*, *Dicranum undulatum*, jak również *Oxycoccus quadripetalus*, *Andromeda polifolia*, *Ledum palustre* i *Vaccinium uliginosum*. W dolinkach panuje *Sph. apiculatum* i *Eriophorum vaginatum*. W miarę oddalania się od jeziora zwiększa się w runie udział mchów borowych, a zmniejsza pokrycie torfowców; mszar przekształcił się fragmentami w bór bagienny.

Suchar VII należy niewątpliwie do zbiorników o daleko posuniętym procesie zarastania. Silnie spłycone na całej powierzchni dno z jednej strony proteguje rozwój roślinności wodnej o liściach pływających, z drugiej zaś strony roślinność sprzyja dalszemu spłycaaniu się zbiornika. Dobrze wykształcony pomost torfowcowy i niewielkie rozmiary jeziora przyczyniają się do szybszego procesu zarastania. Można powiedzieć, że z grupy sucharów, w których kożuch torfowcowy odgrywa najbardziej decydującą rolę w procesie zarastania, proces ten najsilniej jest zaawansowany na Sucharze VII.

ZBIOROWISKA ROŚLINNE SUCHARÓW SUWAŁSKICH

Na obszarze sucharów suwańskich wydzielono 8 zespołów roślinnych oraz 5 zbiorowisk o randze fitosocjologicznej bliżej nie określonej. Systematyka ich przedstawia się następująco:

Klasa *Potametea* Tx. et Presing 1942

Rząd *Potametalia* W. Koch 1926

Związek *Nymphaeion* Oberdorfer 1957

Zespół *Myriophyllo-Nupharetum* W. Koch 1926

Klasa *Phragmitetea* Tx. et Presing 1942

Rząd *Phragmitetalia* W. Koch 1926

Związek *Phragmition* W. Koch 1926

Zespół *Scripo-Phragmitetum* W. Koch 1926

Związek *Magnocaricion* W. Koch 1926

Zespół *Caricetum inflato-vesicariae* W. Koch 1926

- Klasa *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Nordh. 1936
 Rząd *Scheuchzerietalia palustris* Nordh. 1936
 Związek *Rhynchosporion albae* W. Koch 1926
 Zespół *Caricetum limosae* Br.-Bl. 1921
 Wariant „ „ „ z *Thynchospora alba*
- Klasa *Oxycocco-Sphagnetum* Br.-Bl. et Tx. 1943
 Rząd *Ledetalia palustris* Nordh. 1936
 (*Sphagnetalia fusci* Tx. 1953)
 Związek *Sphagnion fusci* Br.-Bl. 1920
 Zespół *Sphagnetum medii et rubelli* Schwick 1940
 Wariant „ „ „ z *Rhynchospora alba*
- Klasa *Alnetum glutinosae* Br.-Bl. et Tx. 1943
 Rząd *Alnetalia glutinosae* Tx. 1937
 Związek *Alnion glutinosae* (Malc. 1929) Meijer-Dr. 1936
 Zespół *Salici-Franguletum* Malc. 1929 Tx. 1937
 Zespół *Carici elongatae-Alnetum* W. Koch 1926
- Klasa *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. 1939
 Rząd *Vaccinio-Piceetalia* Br.-Bl. 1939
 Związek *Dicrano-Pinion* Lidb. 1933
 Zespół *Vaccinio uliginosi-Pinetum* Kleist 1929

Ponadto wyróżniono:

Zbiorowisko *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre*

Zbiorowisko *Carex lasiocarpa*

Skupienia *Glyceria fluitans-Heleocharis acicularis*

Skupienia *Equisetum limosum*

Skupienia *Sphagnum cuspidatum*

W tabelach fitosocjologicznych, oprócz powierzchni zdjęcia, pokrycia i liczby gatunków, podano: szerokość pasa zarastania, czyli szerokość występowania danego zbiorowiska i odległość jego od lustra wody, czyli odległość od wolnego lustra wody do miejsca, w którym dane zbiorowisko zaczyna występować.

Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 1926

Omawiany zespół, właściwy eutroficznym wodom, rozwija się w sucharach najczęściej w postaci przerywanego pierścienia o szerokości 2—3 m przy głębokościach 1—2,5 m. Jedynie w sucharach VI i VII oraz sucharze Linowie tworzy większe i mniejsze płyty, zajmujące znaczną część powierzchni jeziora. Brak jest zupełnie tego zbiorowiska w sucharach: III, IV i V.

Zespół ten jest na badanym terenie ubogi w gatunki. Płyty wykształcone w większości jezior złożone są głównie z jednego lub dwóch gatun-

ków charakterystycznych (*Nymphaea alba*, *Nuphar luteum*); tylko w sucharach Linowo, Stanowisko, Widnym i Tłustym są bogatsze w gatunki, bardziej typowe oraz posiadają dwuwarstwową budowę. Można tu wyróżnić następujące warstwy: a) warstwę złożoną z pływających liści i kwiatów *Nymphaea alba*, *Nuphar luteum*, *Potamogeton natans* i *Polygonum amphibium* oraz b) warstwę utworzoną z roślin zanurzonych jak *Elodea canadensis*, *Myriophyllum spicatum* i *Potamogeton perfoliatus*. Warstwa zanurzonej roślinności jest jednak tutaj słabo reprezentowana zarówno gatunkowo, jak i ilościowo.

Strukturę fitosocjologiczną zespołu przedstawia następujące zestawienie:

n = 22

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Potametea</i>	11	72	80,9	29,8	24
towarzyszące	8	17	19,1	9,6	2
	19	89	100,0		

Z gatunków charakterystycznych występują *Nuphar luteum* i *Nymphaea alba*, obydwa w V klasie stałości, osiągając również największe pokrycie. Licznie reprezentowany jest *Potamogeton natans* (III klasa stałości).

Inne gatunki klasy *Potametea* występują sporadycznie i w małej ilości.

W obrębie zespołu *Myriophyllo-Nupharetum* można wyróżnić fację z *Potamogeton natans* (zdjęcia 14—22 tab. 3), która rozwija się w miejscach głębszych, schodząc do 3—3,5 m głębokości (ryc. 9). Tworzy ona niekiedy czyste, jednogatunkowe płyty położone w centralnych partiach jezior (Suchar VI, suchar Dembowskich).

Zespół *Myriophyllo-Nupharetum*, typowy dla eutroficznych wód, nie znajduje w omawianych zbiornikach dystroficznych o wodach głodowych dostatecznie dogodnych warunków rozwojowych. Nie odgrywa on na ogół dużej roli w spływaniu sucharów i w niewielkim stopniu przyczynia się do ich zarastania.

Zespół ten spotyka się dość często w całej Polsce w płytkich zbiornikach wód stojących lub wolno płynących. Literatura botaniczna podaje opisy tego zbiorowiska z Pojezierza Mazurskiego (Steffen 1931), z południowej Polski (Nowiński 1930), z jezior Skępskich (Kępczyński 1960), z Pojezierza Sierakowskiego (Dąmbaska 1961), jak również z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Fijałkowski 1960). Omawiana przez tych autorów asocjacja jest dobrze wykształcona i różnicowana oraz bogata w gatunki, występuje w wodach żyznych, o dużej

Ryc. 9. Zespół *Myriophyllo-Nupharetum*. W głębi facja z *Potamogeton natans*;
Suchar VI

Myriophyllo-Nupharetum association. At the back facies with *Potamogeton natans*;
Suchar VI.

miąższości osadów dennych. Zarówno Fijałkowski, jak i Dąbbska wspominają, że w jeziorach wykazujących pewne tendencje dystroficzne zespół *Myriophyllo-Nupharetum* jest słabo wykształcony lub występuje tylko jako skupienia poszczególnych gatunków charakterystycznych (najczęściej *Nuphar luteum*, *Nymphaea alba*), a same rośliny są mniej okazałe i dorodne.

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926

Zespół *Scirpo-Phragmitetum* występuje na omawianym terenie w pięciu sucharach: Widnym, Stanowisku, IV, Mozguć oraz Wielkim i jest pod względem florystycznym ubogi w gatunki. Rozwija się fragmentarycznie najczęściej na brzegach mineralnych, gdzie ławica przybrzeżna nie jest pokryta pomostem torfowcowym, w wodach płytkich, na głębokości 0,5—1 m.

Stosunki fitosocjologiczne zespołu obrazuje tabela:

n = 7

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Phragmitetea</i>	10	28	40	40	16
<i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	5	14	20	40	8
towarzyszące	13	28	40	30,8	12,3
	28	70	100		

Jak z powyższego zestawienia wynika, wartość systematyczna grupy *Phragmitetea* wynosi $D = 15,3$; zdecydowanie przewyższa ona każdą z pozostałych wartości systematycznych grup syngenetycznych, co posłużyło do zaklasyfikowania tego zbiorowiska. Gatunki charakterystyczne są nielicznie reprezentowane, przede wszystkim przez *Typha latifolia*, która osiąga IV stopień stałości. Największy współczynnik pokrycia i najwyższą klasę posiada *Phragmites communis*, która nadaje pewien aspekt zbiorowisku. Pozostałe natomiast rośliny z klasy *Phragmitetea* nie występują licznie. Grupa *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* jest reprezentowana przez rośliny kłaczowe *Comarum palustre*, *Menyanthes trifoliata* oraz *Calla palustris*, które nie odgrywają w zespole większej roli.

W warstwie mszystej rozwiniętej dość dobrze występuje 7 gatunków mchów, co stanowi 25% ogólnej liczby roślin. Najliczniej występują torfowce *Sphagnum palustre* i *Sph. apiculatum*. Duży udział posiada również *Calliergon cuspidatum*.

Omawiany zespół nie odgrywa na badanym terenie poważnej roli w procesie zarastania sucharów, a to na skutek porastania zbyt małych powierzchni, jak również nie sprzyjających warunków rozwojowych (brak brzegów mineralnych, dobrze rozwiniętej ławicy przybrzeżnej nie porośniętej pomostem torfowcowym oraz dość niskiego odczynu $pH = 4,7-6,6$).

Scripo-Phragmitetum jest zespołem roślinnym jezior eutroficznych, szeroko rozprzestrzenionym na terenie Polski i Europy Środkowej (Nowiński 1930; Steffen 1931; Kobendza 1948; Passarge 1955; Kępczyński 1960; Dąmbaska 1961); w dużej mierze przyczynia się on do zarastania zbiorników wodnych. Obok zbiorowisk typowych, składających się z mieszaniny gatunków charakterystycznych, występuje tu szereg wariantów i facji wyróżniających się dominacją jednego gatunku.

Zbiorowisko z sucharów suwalskich jest bardzo zbliżone do facji z *Phragmites communis* opisanej przez Dąmbaską (1961) z Pojezierza Sierakowskiego; tak jak tamto odznacza się ogólnym zubożeniem florystycznym.

Zespół *Caricetum inflato-vesicariae* występuje jedynie na jeziorze Linowo. Rozciąga się on na dość znacznej powierzchni (około 2,5 ha) na pn.-zach. brzegu jeziora wzdłuż doliny w kierunku wsi Węgielnia.

Rozwija się na glebie zatorfionej, podmokłej i bagiennej, gdzie woda w lecie znajduje się tuż pod powierzchnią na głębokości około 5 cm, a w okresie jesieni, zimy i wiosny, na skutek opadów atmosferycznych i roztopów, poziom jej podnosi się do 40—50 cm ponad powierzchnię gruntu.

Strukturę fitosocjologiczną roślinności przedstawia zestawienie:

n = 4

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Phragmitetea</i>	11	30	42,3	62,5	26 5
<i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	9	17	23,9	47,2	11,3
towarzyszące	16	24	33,8		
	36	71	100,0	40	13,5

Rozpatrywany zespół odznacza się dominowaniem gatunków charakterystycznych dla klasy *Phragmitetea*, decydujących o jego przynależności fitosocjologicznej. Grupa ta liczy ogółem 11 gatunków, co stanowi 31% całej listy florystycznej.

Gatunkiem zdecydowanie panującym w zespole jest *Carex rostrata*. Turzyca ta osiąga tu największy współczynnik pokrycia tworząc w partiach bardziej odległych od jeziora czyste łąny bez udziału *Carex vesicaria* i *Lysimachia thyrsiflora*. Drugi gatunek charakterystyczny, *Carex vesicaria*, występuje wprawdzie w IV stopniu stałości, ale nie rośnie nigdzie licznie, podobnie jak i *Lysimachia thyrsiflora*. Uderzający jest brak w zdjęciach *Carex pseudocyperus* uważany nieraz również za gatunek charakterystyczny (L i b b e r t 1937). Dość znaczną rolę odgrywają w zespole gatunki klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, a przede wszystkim *Comarum palustre* występujące we wszystkich zdjęciach. Z grupy gatunków towarzyszących spotykane są często krzewy *Salix cinerea*.

Dobrze rozwinięta jest też warstwa mszysta, zbudowana głównie z *Calliergon cuspidatum*, *Drepanocladus aduncus* i *Sphagnum cuspidatum*. Dwa pierwsze gatunki występują na całym terenie opisywanego zbiorowiska, natomiast *Sphagnum cuspidatum* osiedla się w miejscach bardziej wilgotnych, gdzie woda utrzymuje się na powierzchni w miesiącach letnich.

Pokrycie zasiedlonej powierzchni omawianego zbiorowiska wynosi 90—100%, odczyn pH 6,5—7,5.

Zespół *Caricetum inflato-vesicariae* jest dość szeroko rozpowszechniony w środkowej Europie (K n a p p 1948, T ü x e n 1937), jak również

i w Polsce, zwłaszcza na obrzeżeniach zarastających jezior i w zabagnionych dolinach rzek (Sinicyńska 1936; Kępczyński 1960; Dąbbska 1961).

Salici—Franguletum (Malc. 1929) Tx. 1937

Zespół *Salici-Franguletum* jest wykształcony na 6 jeziorach; największą powierzchnię zajmuje na sucharze I oraz sucharach Linowo i Mozguć, gdzie prawie dokoła otaczają jeziora, mniejszą na zachodnim brzegu sucharu Widnego, fragmentarycznie występuje na sucharach: Wielkim, Stanowisku i Wądołku. Rozwija się on na podłożu torfowym silnie podmokłym, a nawet przez większą część sezonu zatopionym.

Salici-Franguletum jest zespołem zaroślowym, gdzie warstwa drzew jest słabo reprezentowana przez *Alnus glutinosa* i *Betula pubescens*, natomiast dobrze jest wykształcona i bujna warstwa krzewów złożona głównie z *Salix cinerea*. W formie domieszki występuje *Salix pentandra* i *Frangula alnus*. W runie dużą rolę posiadają rośliny miejsc mokrych, jak: *Menyanthes trifoliata*, *Calla palustris*, *Carex lasiocarpa* i *C. stricta*.

Kobierzec mszysty jest reprezentowany przez 17 gatunków mszaków, co stanowi 27% sumarycznej listy florystycznej. Najliczniej rośnie *Sphagnum apiculatum*, *Sph. squarrosum*, *Climacium dendroides* i *Caliergon cuspidatum* pokrywając masowo glebę.

Stosunki fitosocjologiczne zespołu przedstawia następująca tabelka:

n = 9

Grupa gatunków	S	Σg	G	S	D
<i>Alnetea glutinosae</i>	6	38	19,5	70,4	13,7
<i>Phragmitetea</i>	9	21	10,8	25,9	2,8
<i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	9	35	18,0	43,2	8,0
<i>Molinietalia</i>	8	29	14,9	40,3	6,0
towarzyszące	28	72	36,8	28,6	10,5
	60	195	100,0		

Tabela ta wykazuje przede wszystkim niejednorodność zespołu. Oprócz rosnącej w dużym zwarcio łązy (*Salix cinerea*) występuje tu 5 innych gatunków charakterystycznych klasy *Alnetea glutinosae*, które zdecydowały o przynależności systematycznej zespołu. Znaczny udział posiadają gatunki klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, natomiast mniejszy rośliny klasy *Phragmitetea* i rzędu *Molinietalia*.

Omówiony zespół jest niewątpliwie podobny do *Salicetum cinereae* (Kobędzka 1930) z Puszczy Kampinoskiej, a także do torfowisk łozowych z Polesia opisanych przez Kulczyńskiego (1940) i do zbiorowisk wyróżnionych przez Matuszkiewicza (1952) z Białowieżskiego Parku Narodowego i Denisiuka (1963) z Podlasia.

Zespół olsu spotykany jest na omawianym terenie na podmokłym, silnie wilgotnym podłożu na sucharach: I, Wielkim, Rzepiskowym, Widnym, Wądołku i Mozguć. Zajmuje on stosunkowo nieduże powierzchnie. Najbardziej typowo wykształcone są płaty tego zespołu nad sucharem Mozguć, które charakteryzują się budową kępiastą. Na kępach skupiają się drzewa i krzewy oraz rośliny z rzędu *Vaccinio-Piceetalia*. Obniżenia między kępami, gdzie gleba jest nadmiernie wilgotna, opanowują gatunki rzędów *Phragmitetalia*, *Molinietalia* i *Scheuchzerietalia palustris*. Drzewostan składa się głównie z *Alnus glutinosa* oraz *Betula pubescens*. W warstwie krzewów dużą rolę odgrywa tu *Frangula alnus*, *Ribes nigrum* i *Salix cinerea*. Ten ostatni gatunek, rosnący tu w wilgotnych obniżeniach między kępami, nie osiąga nigdzie tak dużego zwarcia, jak w zaroślach łożowych.

Na pozostałych sucharach zbiorowisko to nie jest tak typowo zbudowane; *Alnus glutinosa* rośnie raczej w postaci krzewiastej, drzewostan natomiast budują pojedyncze okazy *Betula pubescens*, *Picea excelsa* i *Pinus silvestris*. Struktura kępkowa jest słabo zaznaczona.

Stosunki fitosocjologiczne zespołu *Carici elongatae-Alnetum* przedstawia poniższa tabela:

n = 8

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Alnetalia glutinosae</i>	6	34	16,5	70,8	11,7
<i>Phragmitetalia</i>	9	18	8,8	28,1	2,5
<i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	14	37	18	33	5,9
<i>Molinietalia</i>	6	17	8,3	35,4	2,9
<i>Vaccinio-Piceetea</i>	12	36	17,6	37,5	6,6
towarzyszące	25	63	30,8	30,3	9,3
	72	205	100,0		

Z zestawienia tego wynika, że gatunki charakterystyczne dla rzędu *Alnetalia glutinosae* zajmują pozycję czołową i przewyższają pozostałe grupy syngenetyczne, co wskazuje, że dany zespół został dobrze wyodrębniony.

Dużą rolę posiadają również gatunki rzędów *Phragmitetalia*, *Molinietalia* i klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* rosnące w miejscach silnie wilgotnych. Na siedliskach mniej nawodnionych w zdjęciach 1, 2 (tab. 7) występują obok gatunków właściwych dla olsu liczne rośliny z klasy *Vaccinio-Piceetea*. Zdjęcia te odznaczają się charakterem przejściowym.

Z gatunków charakterystycznych dla olsu proponowanych przez Matuszkiewicza i Traczyków (1958) występuje tu *Solanum dul-*

camara (IV klasa stałości), *Sphagnum squarrosum* (V stopień stałości) oraz *Ribes nigrum* (II klasa stałości). Zaliczenie przez tych autorów *Frangula alnus* do gatunków charakterystycznych budzi pewne zastrzeżenie; opierając się na innych autorach (Oberdorfer 1957, Fijałkowski 1960) zaliczyłam powyższy gatunek do grupy gatunków towarzyszących.

Warstwę mszystą reprezentują w omawianym zespole 23 gatunki, co stanowi 32% całej listy florystycznej. Najobficiej występują torfowce, a mianowicie *Sphagnum squarrosum*, gatunek charakterystyczny dla klasy *Alnetalia glutinosae*, *Sph. palustre* i *Sph. apiculatum*; znajdują one dogodne warunki rozwojowe na wilgotnym podłożu między kępami. Na osuszonych kępach osiedlają się chętniej gatunki borowe, jak *Entodon schreberi*, *Dicranum scoparium*, *D. undulatum*, *Hylocomium splendens* i inne gatunki miejsc suchszych, które występują raczej w ilościach niewielkich.

Ols jest zespołem, który pierwotnie znacznie szerzej był rozpowszechniony w całej Polsce. Obecnie wskutek sztucznego osuszania wielu terenów, dobrze wykształcony ols spotyka się rzadziej. Występuje on raczej w postaci skrawków, fragmentów w lokalnych zagłębieniach terenu, na brzegach jezior i w dolinach rzek (Kobendza 1930; Matuszkiewicz 1952; Krotoska 1953; Denisiuk 1963).

Zbiorowisko *Menyanthes trifoliata*—*Comarum palustre*

Zbiorowisko *Menyanthes trifoliata*—*Comarum palustre* rozwija się odcinkami wzdłuż brzegów sucharów: II, Dembowskich, Wielkiego, Widelnego, Wądołka, Stanowiska, Wygorzele i Mozguć oraz występuje fragmentarycznie nad Sucharem I i VI. Wykształca się ono zazwyczaj przy brzegach mineralnych, jak również w tych miejscach, gdzie pomost torfowcowy został uszkodzony.

Strukturę fitytosocjologiczną roślinności przedstawia zamieszczona tabela:

n = 12

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Scheuchzeria-Caricetea fuscae</i>	4	31	39,2	64,4	26,6
<i>Potametalia</i>	3	8	10,1	22,2	2,2
<i>Phragmitetalia</i>	3	11	13,9	30,6	4,3
<i>Molinietalia</i>	2	8	10,1	33,3	3,4
<i>Ledetalia palustris</i>	1	1	1,4	8,3	0,1
<i>Alnetalia glutinosae</i>	1	5	6,3	41,7	2,6
towarzyszące	3	15	19,0	41,7	7,9
	17	79	100,0

Ryc. 10. Zbiorowisko *Menyanthes trifoliata*-*Comarum palustre*; Suchar VI.
Menyanthes trifoliata-*Comarum palustre* community; Suchar VI.

W skład tego zbiorowiska wchodzi rośliny z 6 jednostek fitytosocjologicznych. Gatunki charakterystyczne klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* zajmują pozycję czołową i zdecydowanie dominują nad pozostałymi grupami, które nie odgrywają większej roli. Gatunkiem nadającym aspekt jest *Menyanthes trifoliata* (ryc. 10) przy dużym udziale *Comarum palustre* oraz mniejszym *Calla palustris*. W niektórych zdjęciach (1, 6, 10, tab. 8) występuje w przewadze *Comarum palustre*.

Duże znaczenie posiadają również mszaki, przede wszystkim *Sphagnum palustre*, *Sph. apiculatum* i *Calliergon cuspidatum*.

W procesie zarastania zbiorowisko to bierze bardzo czynny udział i jest początkowym stadium zarastania sucharów od brzegu. W pierwszym etapie występują tylko same rośliny kłaczowe, które wykazują wielką zdolność ekspansji i utrwalania terenu. Następnie pojawiają się mszaki, obecność których nadaje kierunek dalszemu rozwojowi zbiorowiska.

Występowanie w omawianym zbiorowisku *Sphagnum palustre* i *Calliergon cuspidatum* (zdjęcia 1—8, tab. 8) wykazuje, że dalszy rozwój roślinności przebiegać będzie raczej w kierunku oczeretów, za czym przemawiałaby obecność *Carex rostrata* i *Phragmites communis*.

Natomiast obecność *Sphagnum apiculatum* i *Sph. cuspidatum* (zdjęcia 9—12, tab. 8) sprawia wrażenie, że jest to zbiorowisko wyjściowe, budujące pomost torfowcowy.

Zbiorowisko *Carex lasiocarpa*

Zbiorowisko *Carex lasiocarpa* zajmuje dość znaczną powierzchnię w przybrzeżnych partiach sucharów dembowskich, Wądołek, Mozguć, II, Linowo i Stanowisko, fragmentarycznie zaś rozwija się nad jeziorami I, IV, Rzepiskowym i Wygorzele.

Najlepiej wykształca się na brzegach o gruncie mineralnym lub w niewielkiej odległości od niego, w sąsiedztwie wzgórz morenowych. Obecność podłoża mineralnego i wzgórz morenowych przyczynia się przez zsuwanie się ściółki leśnej oraz spływanie wody do lekkiej eutrofizacji bardzo głodowego siedliska sucharów. Najczęściej występuje to zbiorowisko w postaci płatów w wodzie do głębokości 0,4 m wraz z dużą ilością *Menyanthes trifoliata*, *Comarum palustre* i z luźną „watą” darni torfowców *Sphagnum apiculatum* i *Sph. palustre*. Zagęszczanie się darni *Sph. apiculatum* powoduje wykształcenie pomostu torfowcowego; następuje zwiększenie kwasowości podłoża, pojawia się wtedy *Carex limosa*, która stopniowo wypiera *Carex lasiocarpa*.

Stosunki fitosocjologiczne omawianego zbiorowiska ilustruje poniżej zamieszczona tabela:

n = 17

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Scheuchzerietalia palustris</i>	4	25	10,7	36,8	3,9
<i>Caricetalia fuscae</i>	5	20	8,6	41,2	23,5
<i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	8	51	21,9	37,5	33,2
<i>Phragmitetea</i>	12	26	11,1	12,2	2,0
<i>Molinio-Arrhenatheretea</i>	13	29	12,4	13,1	8,2
<i>Oxycocco-Sphagnetes</i>	5	20	8,6	23,5	1,4
<i>Alnetes glutinosae</i>	3	10	4,3	19,6	1,6
<i>Vaccinio-Piceetea</i>	5	8	3,5	9,4	2,0
towarzyszące	16	44	18,9	17,3	0,8
	71	233	100,0		0,3

Z powyższego zestawienia wynika, że grupa gatunków klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* zdecydowanie przewyższa inne grupy syngenezy, które nie mają większego znaczenia. Poza tym można powiedzieć, że zbiorowisko to wykazuje duże tendencje rozwojowe w kierunku zbiorowisk z rzędu *Scheuchzerietalia palustris*.

Gatunkiem dominującym jest *Carex lasiocarpa* (ryc. 11). Duży udział posiadają również *Menyanthes trifoliata*, *Comarum palustre* i *Calla pa-*

Ryc. 11. Roślinność przybrzeżna złożona z *Carex lasiocarpa* i *Peucedanum palustre*; Suchar II

Littoral vegetation consisting of *Carex lasiocarpa* and *Peucedanum palustre*; Suchar II.

lustris, wśród których rosną torfowce *Sphagnum apiculatum* (V klasa stałości) i *Sph. palustre* (III klasa stałości), zaś w zdjęciach 7, 8 (tab. 9) duże znaczenie ma *Calliergon cuspidatum*.

W zbiorowisku tym można wyróżnić dwa stadia.

Stadium wcześniejsze (zdjęcia 1—6, tab. 9) charakteryzuje się masowym występowaniem *Menyanthes trifoliata*, *Comarum palustre*, *Calla palustris* oraz *Sphagnum apiculatum*.

Stadium późniejsze (zdjęcia 9—17, tab. 9) różni się od poprzedniego obecnością *Sphagnum apiculatum* i występowaniem gatunków z klasy *Oxycocco-Sphagneteta*.

Poza tym wyodrębniają się w tabeli 9 dwa zdjęcia (7, 8), w których występuje w znacznej ilości *Calliergon cuspidatum* i duża grupa roślin z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*.

Zbiorowisko *Carex lasiocarpa* przyczynia się znacznie do zarastania sucharów, a to dzięki obecności gatunków kłączowych i mszaków. W procesie powstawania pomostu torfowcowego jest po zbiorowisku *Menyanthes trifoliata*-*Comarum palustre* następnym ogniwem powodując szybsze zestalanie się i utrwalanie kożucha pływającego.

Omawiane zbiorowisko, a szczególnie jego faza późniejsza, jest podobne do torfowiska przejściowego *Carex lasiocarpa-Sphagna cuspidata* opisanego przez Kulczyńskiego (1940), które według tego autora tworzy przejście to torfowisk wysokich.

Caricetum limosae Br.-Bl. 1921

Caricetum limosae jest podstawowym zespołem budującym wraz z *Sphagnetum medii et rubelli* pomost torfowcowy na sucharach omawianego terenu. Lepiej lub gorzej wykształcone płaty tego zespołu spotyka się prawie na wszystkich sucharach.

Zespół ten wykształca się w dwóch wariantach: typowym występującym w miejscach silnie nawodnionych oraz w wariantcie z *Rhynchospora alba* — w miejscach nieco suchszych.

1. Wariant typowy rozwija się prawie na wszystkich jeziorach opisywanego terenu, tworząc wąski (0,2—1 m), przerywany pas wzdłuż większych odcinków brzegu. Z jednej strony graniczy z lustrem wody, lub ze zubożałym zespołem *Myriophyllo-Nupharetum*, z drugiej zaś przechodzi ku brzegowi jeziora w wariant z *Rhynchospora alba*.

Caricetum limosae zajmuje najbardziej krańcowe położenie na ple, a mianowicie miejsca silnie nawodnione i podtopione.

Zbiorowisko to zbudowane jest z dwóch zasadniczych pięter: z dolnej, emersyjnej warstwy mchów i z górnej warstwy bylin, w skład których wchodzi również wyłącznie rośliny emersyjne. Dominującym gatunkiem w tym zbiorowisku jest *Carex limosa* występująca miejscami w równych ilościach z *Carex lasiocarpa*, gdzie indziej zaś ze znaczną ilością *Menyanthes trifoliata* lub *Comarum palustre*. Drugi gatunek charakterystyczny zespołu *Scheuchzeria palustris* spotyka się rzadziej (w 14 zdjęciach) i to w niewielkiej ilości. Dość poważną rolę odgrywają również: *Peucedanum palustre* z klasy *Phragmitetea* osiągające V stopień stałości, *Oxycoccus quadripetalus*, *Andromeda polifolia* z klasy *Oxycocco-Sphagnetetea* i z roślin towarzyszących *Lysimachia vulgaris*.

Krzewy występują na terenie omawianego zbiorowiska bardzo rzadko; są to małe okazy *Salix cinerea* i *Alnus glutinosa*.

Warstwę mszystą budują głównie torfowce, przede wszystkim *Sphagnum apiculatum* (V klasa stałości) często w towarzystwie *Sph. magellanicum* oraz hydrofilnych gatunków *Sph. cuspidatum* i *Sph. obtusum*. Te dwa ostatnie gatunki występują jednak zaledwie w kilku zdjęciach. Dość często natomiast spotyka się *Calliergon stramineum*. Inne gatunki mszaków jak *Sphagnum papillosum*, *Scorpidium scorpioides*, *Cladopodiella fluitans* rosną sporadycznie.

Stosunki fitosocjologiczne w rozpatrywanym zespole przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

n = 43

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Scheuchzeria-Caricetea fuscae</i>	15	218	51,3	33,8	17,3
<i>Phragmitetea</i>	6	57	13,4	22	3,0
<i>Oxycocco-Sphagnetea</i>	5	61	14,3	28,3	5,0
towarzyszące	14	89	21,0	17,1	4,0
	40	425	100,0		

Zespół *Caricetum limosae* należy w Polsce do dość rozpowszechnionych zbiorowisk roślinnych; wykształca się zazwyczaj na małych, zatorfionych, dystroficznych jeziorach. Znane są jego opisy z Pomorza (Steffen 1931; Czubiński 1937; Polakowski 1963), z Polesia Lubelskiego (Fijałkowski 1960); również z całej Europy Środkowej (Tüxen 1937; Oberdorfer 1957).

Asocjacja *Caricetum limosae* sucharów suwalskich wykazuje częściowo pewne podobieństwo pod względem florystycznym do zespołu opisanego przez Fijałkowskiego (1960) na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Zbiorowisko roślin u Fijałkowskiego jest jednak znacznie bogatsze florystycznie: zawiera ono 67 gatunków, podczas gdy na sucharach 40. Tworzy ono wokół jezior pierścień bardzo szeroki, od kilku do kilkuset metrów; występują na nim rzadko zarośla złożone z *Pinus silvestris*, *Betula verrucosa*, *B. pubescens* i *Salix cinerea*.

2. Wariant z *Rhynchospora alba* jest w opracowanym terenie wykształcony przy brzegach wszystkich jezior, z wyjątkiem sucharu Lino-wo, natomiast przy brzegu sucharu Mozguć rozwija się fragmentarycznie, tworząc kilka niewielkich płątów.

Wariant ten rozwija się w postaci nieregularnego pierścienia różnej szerokości (od 1—7 metrów) na pływającym pomoście torfowcowym; graniczy zwykle z *Caricetum limosae typicum*, po którym następuje. Zajmuje on jednak miejsca mniej wilgotne niż *Caricetum limosae typicum*, pojawiając się na pomoście torfowcowym wtedy, gdy nastąpi wypiętrzenie na kilka lub kilkanaście centymetrów ponad powierzchnię wody.

Omawiany wariant odznacza się panowaniem gatunków klasy *Scheuchzeria-Caricetea fuscae*, co decyduje o przynależności fitosocjologicznej zespołu. Z gatunków charakterystycznych zespołu występuje *Scheuchzeria palustris* (IV klasa stałości) oraz w niewielkiej ilości *Carex limosa* (II klasa stałości). Zdecydowanie panuje i nadaje aspekt *Rhynchospora alba*, która osiąga tu największy współczynnik pokrycia i najwyższą klasę stałości. Niektóre zdjęcia odznaczają się znacznym

Ryc. 12. *Drosera anglica* w zespole *Caricetum limosae* wariant z *Rhynchospora alba*; Suchar III

Drosera anglica in *Caricetum limosae* association, variant with *Rhynchospora alba*; Suchar III.

udziałem *Menyanthes trifoliata* lub *Comarum palustre*. Dość znaczną rolę odgrywają gatunki charakterystyczne klasy *Oxycocco-Sphagnetea*, przede wszystkim *Andromeda polifolia*, *Drosera rotundifolia* i *Oxycoccus quadripetalus* występujące w najwyższej klasie stałości.

Warstwa krzewów jest w omawianym wariantcie słabo reprezentowana, bardzo rzadko rosną tutaj pojedyncze okazy sosny, świerka, brzozy omszonej i łoży do 1—1,5 m wysokości.

Strukturę fitosocjologiczną przedstawia następująca tabela:

n = 35

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	16	205	46,6	36,6	17,1
<i>Phragmitetea</i>	5	21	4,8	12	0,6
<i>Oxycocco-Sphagnetea</i>	9	134	30,4	42	12,7
<i>Vaccinio-Piceetea</i>	6	23	5,2	11	0,6
towarzyszące	9	57	13,0	16,3	2,1
	45	440	100,0		

Kobierzec mszysty tworzą głównie torfowce, zwłaszcza *Sphagnum apiculatum* z domieszką *Sph. magellanicum*. Wśród darni torfowców występuje często *Calliergon stramineum* oraz spotykany bywa wątrobowiec *Cladopodiella fluitans*, natomiast udział pozostałych gatunków mszaków jest niewielki.

W opisywanym wariacie można wyróżnić fację z *Drosera anglica* (ryc. 12), która występuje w płatach bardziej nawodnionych i dominuje wtedy zdecydowanie nad *Drosera rotundifolia*. Ta ostatnia rośnie na krańcach płatów, na przejściu do *Sphagnetum medii et rubelli*.

Sphagnetum medii et rubelli Schwick. (1933) 1940

Zespół *Sphagnetum medii et rubelli* jest rozwinięty u większości sucharów omawianego terenu. Jest on tu zróżnicowany. Oprócz typowego zespołu, który zajmuje dużą powierzchnię, występuje na pomoście torfowcowym w miejscach silnie uwilgotnionych jego wariant z *Rhynchospora alba*.

1. Wariant ten występuje na niewielkich odcinkach dobrze wykształconego pomostu torfowcowego na sucharach: III, IV, VII, Wielkim, Rzepiskowym, Zachodnim, Wschodnim i Drobnym w sąsiedztwie *Cari-cetum limosae typicum*.

Rozwija się on na ple wtedy, gdy pomost torfowcowy osiągnie dość znaczną grubość i zostanie na kilkanaście centymetrów wypiętrzony ponad powierzchnię wody, co powoduje przesuszenie jego górnych warstw. W takich warunkach chętnie osiedla się i masowo występuje *Sphagnum magellanicum*, a wraz z nim pojawiają się gatunki klasy *Oxycocco-Sphagnetea*. Dalsze osuszanie się podłoża powoduje zanik *Rhynchospora alba*, zbiorowisko przekształca się w typowy zespół *Sphagnetum medii et rubelli*.

Stosunki fitosocjologiczne omawianego wariantu przedstawia następujące zestawienie:

n=12

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Oxycocco-Sphagnetea</i>	9	61	42,1	56,5	23,8
<i>Scheuchzerio-Caricetca fuscae</i>	10	39	26,9	32,5	8,7
<i>Vaccinio-Piceetca</i>	3	18	12,4	50,0	7,2
towarzyszące	12	27	18,6	18,3	3,5
	34	145	100,0		

Analizując tę tabelę widzimy, że na czoło wszystkich jednostek wysuwa się grupa gatunków klasy *Oxycocco-Sphagnetea* licząca 9 gatunków, z których aż 4 posiada V stopień stałości. Wskutek tego wartość

Ryc. 13. Roślinność zespołu *Sphagnetum medii et rubelli* wariant z *Rhynchospora alba*; Suchar Wielki

Vegetation of *Sphagnetum medii et rubelli* association, variant with *Rhynchospora alba*; Suchar Wielki.

systematyczna tej grupy jest bardzo wysoka i wielokrotnie przewyższa podobne wartości każdej z pozostałych grup. Również rośliny klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* mają duże znaczenie, a przede wszystkim *Rhynchospora alba* występująca w V klasie stałości i nadająca pewien aspekt całemu zbiorowisku.

Warstwa krzewów jest w omawianej asocjacji bardzo słabo reprezentowana przez pojedyncze rachityczne okazy sosny i świerka do 1 m, rzadziej do 2 m wysokości.

Runo budują torfowce — *Sphagnum magellanicum* i *Sph. apiculatum* tworząc mozaikę. Wśród nich rośnie *Oxycoccus quadripetalus*, *Andromeda polifolia*, *Drosera rotundifolia*, *Eriophorum vaginatum* oraz gatunki klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*—*Scheuchzeria palustris*, *Comarum palustre*, *Menyanthes trifoliata* i *Calliergon stramineum* (ryc. 13).

2. W a r i a n t t y p o w y zespołu *Sphagnetum medii et rubelli* występuje u większości jezior omawianego terenu. Tworzy przeważnie przerywany wąski pas (3—6—7 m) wzdłuż większych odcinków brzegu poza pasem *Caricetum limosae*. Duże płyty tego zespołu spotyka się nad Sucharami V, VII, między jeziorami Tłustym a Drobnym w grupie sucharów Dembowskich, natomiast brak go nad Linowem i Mozguciem.

Sphagnetum medii et rubelli typicum rozwija się fragmentarycznie na pomoście torfowcowym, a mianowicie w tych jego miejscach, gdzie

Ryc. 14. Bezdrzewny zespół *Sphagnetum medii* et *rubelli* na pomoście torfowcowym;
Suchar IV
Treeless *Sphagnetum medii* et *rubelli* association on *Sphagnum* mat.;
Suchar IV.

osiąga on znaczną grubość (2 do 3 m) oraz jest silnie zwarty i zespolony. Omawiany zespół zajmuje teren mniej wilgotny niż jego wariant z *Rhynchospora alba*, jednak wszystkie płyty są dość dobrze nawodnione, a nawet w obrębie Suchara V podtopione wodą.

Kwasota gleby w warstwie powierzchniowej wynosi pH 3,5—4,5.

Płyty występujące na ple są raczej bezdrzewne (ryc. 14); rosną tu tylko pojedyncze okazy karłowatej sosny i świerka. Natomiast teren, gdzie zespół zajmuje większą powierzchnię (Suchar V, VII, Drobnny, Tłusty), porasta bardzo rzadki, niski drzewostan sosnowy o pniach pokrytych silnie porostami, koronie nieregularnej i słabo rozwiniętej, o przeciętnej wysokości 5—7 m, czasem 12, a nawet 15 m. Prócz sosny występuje świerk i brzoza omszona; udział tego ostatniego gatunku jest znaczniejszy w Sucharach V i VII.

Podszycie jest również słabo rozwinięte, składa się głównie z *Vaccinium uliginosum* i *Ledum palustre*.

Runo w zespole ma charakter wybitnie mszysty, o bardzo słabej strukturze kępkowej. Budowa kępkowa uwydatnia się nieco lepiej jedynie nad Sucharami V, Tłustym oraz w obrębie sucharów Dembowskich. Szczyty kęp buduje tu przede wszystkim *Sphagnum magellanicum*

wspólnie z rzadziej występującymi *Sph. rubellum* i *Sph. fuscum* oraz *Polytrichum strictum*, *Oxycoccus quadripetalus*, *Ledum palustre* i *Vaccinium uliginosum*.

Obramowanie kęp tworzy głównie *Sphagnum magellanicum* wraz z rzadszym *Sph. nemoreum*, *Andromeda polifolia*, *Drosera rotundifolia*. Dolinki zajmuje *Sphagnum apiculatum*, czasem *Carex rostrata* i *Rhynchospora alba*. Na pozostałych płatach, gdzie budowa kępkowa nie uwydatnia się zupełnie, w pokrywie mszystej dominuje *Sphagnum magellanicum* wraz ze *Sph. apiculatum* tworząc mozaikę.

W porównaniu z zespołem *Caricetum limosae* wariant z *Rhynchospora alba* udział gatunkowy mszaków znacznie powiększył się (z 15 do 26 gatunków w *Sphagnetum medii* et *rubelli typicum*). Poza tym pojawiły się oprócz gatunków wybitnie wysokotorfowiskowych, gatunki charakterystyczne dla borów jak *Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens* i inne. Szczególnie uwydatnia się to w peryferycznych częściach płatów, gdzie zwiększa się również udział *Vaccinium myrtillus*. Zmiany te dowodzą, że zespół wykazuje tendencje rozwojowe w kierunku *Vaccinio uliginosi-Pinetum*.

Strukturę stosunków fitosocjologicznych obrazuje tabela

n = 30

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Oxycocco-Sphagnetea</i>	14	209	45,2	53,6	24,2
<i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	15	43	9,3	10,2	1,0
<i>Vaccinio-Piceetea</i>	11	135	29,2	40,9	11,9
towarzyszące	15	75	16,3	14,7	2,4
	55	462	100,0		

Jak widać, w składzie florystycznym zespołu decydujące znaczenie posiadają gatunki klasy *Oxycocco-Sphagnetea*. Najwyższą stałość osiąga wśród nich *Sphagnum magellanicum*, *Drosera rotundifolia*, *Oxycoccus quadripetalus* i *Andromeda polifolia*. Z grupy gatunków należących do klasy *Vaccinio-Piceetea* w V stopniu stałości występuje *Pinus silvestris* oraz duże znaczenie ma *Ledum palustre*. Z gatunków towarzyszących dominuje *Sphagnum apiculatum*, który wraz ze *Sph. magellanicum* pokrywa całą powierzchnię zespołu.

W obrębie zespołu można wyróżnić fację ze *Sphagnum rubellum* (zdjęcia 22—30, tab. 13). Facja ta wykształca się tam, gdzie zespół tworzy większe płaty, jak również tam, gdzie uwydatnia się choć słabo struktura kępkowa (Suchar V). Charakteryzuje się obecnością *Sphagnum rubellum* oraz częstszym występowaniem mchów należących do rzędu *Bryales*.

Sphagnetum medii et *rubelli* jest zespołem o stosunkowo szerokim rozmieszczeniu w Polsce jak również w Europie Środkowej. Z Polski

podawany był dotychczas z Pomorza Zachodniego (Czubiński 1950), z Pojezierza Mazurskiego (Polakowski 1962), z Puszczy Białowieskiej (Matuszkiewicz 1952), z okolic Warszawy (Kleistówna 1929) i z Borów Nowotarskich (Staszkiewicz 1957).

Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929

Zespół *Vaccinio uliginosi-Pinetum* wykształcony jest na badanym terenie na brzegu wszystkich jezior, brak go jedynie na sucharach Linowo i Mozguć.

Otacza on poszczególne jeziorka przeważnie niezbyt szerokim pasem granicząc zazwyczaj z jednej strony z mineralnym podłożem, z drugiej zaś ze *Sphagnetum medii et rubelli*.

Podłożem sprzyjającym jego rozwojowi jest warstwa torfu o różnej grubości pokładu (od 2 m do 15 cm) i o kwasowości pH 4—4,5. W płatach graniczących z zespołem *Sphagnetum medii et rubelli* wilgotność podłoża jest większa, natomiast w pobliżu gruntu mineralnego płyty są przesuszone. Układ tych stosunków wodnych znajduje odbicie w składzie florystycznym poszczególnych płatów zespołu.

Warstwę drzew tworzą *Pinus silvestris* i *Picea excelsa* z udziałem *Betula pubescens*. Podszycie jest przede wszystkim zbudowane z *Vaccinium uliginosum* i *Ledum palustre* z podrostem sosny i świerka, a oprócz tego występuje sporadycznie *Quercus robur*, *Frangula alnus* i *Sorbus aucuparia*. *Vaccinium uliginosum* i *Ledum palustre*, gatunki charakterystyczne zespołu, występują w V stopniu stałości. Dużą rolę odgrywają również *Vaccinium myrtillus* i *V. vitis idaea*, a udział ich zwiększa się szczególnie w płatach sąsiadujących z gruntem mineralnym.

Warstwa mszysta jest w zespole *Vaccinio uliginosi-Pinetum* dobrze rozwinięta; masowo w niej występują torfowce zwłaszcza *Sphagnum magellanicum* i *Sph. apiculatum*. Mchy z rzędu *Bryales* są również dobrze reprezentowane przez takie gatunki jak *Dicranum undulatum*, *Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens* występujące w najwyższej klasie stałości. W ogóle liczba gatunków mszaków jest w tym zespole znaczna, wynosi 40, co stanowi 58% całej listy florystycznej.

Strukturę fitosocjologiczną roślinności obrazuje tabelka:

n = 21

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Vaccinio-Piceetea</i>	16	228	49,4	67,9	33,5
<i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	7	14	3,0	9,5	0,3
<i>Oxycocco-Sphagnetea</i>	11	106	23,0	45,9	11,6
towarzyszące	34	114	24,6	16,0	3,9
	68	462	100,0		

Jak wynika z tabelki, w składzie florystycznym zespołu decydujące znaczenie mają gatunki klasy *Vaccinio-Piceetea*. Znaczną również rolę odgrywają gatunki klasy *Oxycocco-Sphagnetea*. Poza *Sphagnum magellanicum* (V klasa stałości) wysoką stałość osiągają *Oxycoccus quadripetalus*, *Eriophorum vaginatum* i *Polytrichum strictum* (IV stopień stałości). Gatunki charakterystyczne grupy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* występują sporadycznie i w niewielkiej ilości.

Vaccinio uliginosi-Pinetum jest zespołem, który kończy sukcesję przebiegającą w strefie zarastania sucharów suwalskich. Omawiany zespół jest szeroko rozpowszechniony.

Na bogatym w jeziora i torfowiska obszarze Pojezierza Mazurskiego omawiany zespół jest szeroko rozpowszechniony (P o l a k o w s k i 1963; Steffen 1931), natomiast na pozostałych terenach Polski spotyka się go stosunkowo rzadko, a to wskutek zmeliorowania i osuszenia znacznej przestrzeni naszego kraju. Niemniej literatura botaniczna podaje opisy tej asocjacji z Borów Nowotarskich (S t a s z k i e w i c z 1962), z okolic Warszawy (K l e i s t ó w n a 1929), z Puszczy Kampinoskiej (K o b e n d z a 1930) i z Pomorza Wschodniego (P o l a k o w s k i 1961, 1962). Bory bagienne na Pobrzeżu Zachodniokaszubskim scharakteryzował W o j t e r s k i (1963), a J a s n o w s k i (1962) opisał leśne zespoły bagienne na Pomorzu Szczecińskim.

Wyniki dotychczasowych badań nad borami bagiennymi Europy Środkowej podsumował M a t u s z k i e w i c z (1962), opierając się na 195 zdjęciach wykonanych przez 15 autorów we wschodniej części Europy Środkowej oraz w Europie Wschodniej.

Skupienia *Glyceria fluitans-Heleocharis acicularis*

Na wschodnim i północnym brzegu sucharu Linowo w miejscach płytkich (do 0,4 m głębokości) lub w lecie przy niskim stanie wody odsłoniętych, występują skupienia *Glyceria fluitans-Heleocharis acicularis*.

Rozwijają się one na podłożu mulistym lub piaszczysto-mulistym.

Roślinność tego zbiorowiska wykazuje wyraźną przynależność do rzędu *Phragmitetalia*, co ilustruje poniższe zestawienie:

n = 2

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Litorelletalia</i>	1	2	11,8	100	11,8
<i>Potametalia</i>	2	3	17,6	75	13,2
<i>Phragmitetalia</i>	6	9	52,9	64,3	34,0
<i>Molinietalia</i>	1	1	5,9	50	3,0
towarzyszące	2	2	11,8	50	5,9
	12	17	100,0		

Gatunkami dominującymi są *Glyceria fluitans* z rzędu *Phragmitetalia* i *Heleocharis acicularis* z rzędu *Litorelletalia*, które osiągają najwyższy współczynnik pokrycia. Poza nimi dość licznie rosną *Potamogeton natans*, *Heleocharis palustris* i *Sparganium simplex*.

Mszaki reprezentuje tylko jeden gatunek *Calliergon cuspidatum*.

Zbiorowisko to odgrywa znaczną rolę przy utrwalaniu dna oraz przyczynia się do szybszego zarastania przybrzeżnych partii zbiornika.

Skupienia *Equisetum limosum*

Skupienia *Equisetum limosum* występują na płytkiej (0,1—0,5 m głębokości), zamulonej ławicy przybrzeżnej w postaci niezbyt rozległych płatów nad sucharami Widnym i Stanowisko.

Struktura tego zbiorowiska jest bardzo prosta. Gatunkiem dominującym i nadającym aspekt jest *Equisetum limosum*. Poza skrzypem bagiennym dość licznie rośnie *Menyanthes trifoliata*. Inne natomiast gatunki wchodzi jedynie sporadycznie.

Stosunki fitosocjologiczne przedstawia tabelka:

n = 2

Grupa gatunków	Z	Σg	G	S	D
<i>Potametalia</i>	1	1	12,5	50	6,3
<i>Phragmitetalia</i>	2	3	37,5	75	28,1
<i>Scheuchzeria-Caricetea fuscae</i>	1	2	25,0	100	25,0
<i>Molinietalia</i>	1	2	25,0	100	25,0
	5	8	100,0		

Skupienia *Equisetum limosum* odgrywają poważną rolę w procesie zarastania, szczególnie w sucharach położonych na otwartej przestrzeni, otoczonych łakami i uprawnymi polami. Na płaskich, płytkich i zamulowanych brzegach tych sucharów jest to pionierskie zbiorowisko, które umacnia dno zbiornika i przygotowuje siedlisko dla innych roślin. Z tego stadium rozwija się przeważnie zbiorowisko złożone z *Menyanthes trifoliata* i *Comarum palustre* lub typowy zespół *Scirpo-Phragmitetum*.

Skupienia *Sphagnum cuspidatum*

Luźne darnie *Sphagnum cuspidatum* zauważono tylko w trzech jeziorach, a mianowicie w Sucharze III, Wygorzele i w Sucharze Wielkim.

Występują one w wodzie tuż obok pła zbudowanego z torfowców i turzyc, tworząc niezbyt rozległe płaty. Skupienia złożone przeważnie z jednogatunkowych darni *Sphagnum cuspidatum* (ryc. 15), jedynie w Su-

Ryc. 15. Wypiętrzające się z wody darnie *Sphagnum cuspidatum* obok pomostu torfowcowego; Suchar III

Sphagnum cuspidatum sod emerging from water beside *Sphagnum* mat.;
Suchar III.

charze III występują z nieznaczną domieszką *Utricularia vulgaris*; początkowo luźne, później bardziej zwarte, wypiętrzają się nieco ponad powierzchnię wody. Stanowią one stadium inicjalne w procesie zarastania i przyczyniają się znacznie do rozrastania pływającego pomostu torfowcowego, tworząc dogodne podłoże, na którym mogą osiedlać się rośliny naczyniowe.

Darnie *Sphagnum cuspidatum* pojawiają się okresowo. Podczas cztero-letniej obserwacji nad procesem zarastania badanych jezior pojawiły się one dopiero w ostatnim roku, tworząc do 5 m² rozległe pojedyncze płyty.

Podobne stadium ze *Sphagnum cuspidatum* opisał Podbielkowski (1960) w dołach potorfowych z okolic Warszawy; również Tüxen (1958) podaje to stadium z północnych Niemiec. Podbielkowski twierdzi, że zbiorowisko to rozrasta się bardzo szybko, pokrywa znaczne przestrzenie, a w chwili wypiętrzania się nad powierzchnię wody jest zasiedlane przez rośliny naczyniowe. Tüxen uważa, że trudno ustalić długość trwania takiego zbiorowiska. W pewnym stadium zagęszczenia darni torfowca następuje równowaga między liczbą nowo wytworzonych okazów torfowca a liczbą obumarłych; w rezultacie więc nie powstaje większe zwarcie darni.

Wydaje się, że długość trwania wypiętrzonych darni *Sphagnum cuspidatum* zależy w dużej mierze od sąsiadujących roślin. W sąsiedztwie roślin kłaczowych i rozłogowych, które wykazują dużą zdolność przetrwania luźnych darni torfowca, następuje szybsza przemiana jednogatunkowego skupienia *Sphagnum cuspidatum* w zbiorowisko wielogatunkowe, jak również szybsze jego zestalanie się.

RÓŻNICE I PODOBIENSTWA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH SUCHARÓW SUWALSKICH

Podstawą do charakterystyki florystyczno-fitosocjologicznej zbiorowisk roślinnych w sucharach suwalskich były gatunki charakterystyczne oraz wyróżniające.

W tabeli 18 zestawiono w układzie sukcesyjnym wszystkie gatunki występujące w II i wyższych klasach stałości. Liczbą rzymską oznaczono stopień stałości. Jedynie w tym przypadku, gdy tabela zespołu obejmuje mniej niż 5 zdjęć, podano cyfrą arabską liczbę wystąpień danego gatunku w tabeli, zamiast klasy stałości. Obok stopnia stałości podano w cyfrach arabskich współczynnik pokrycia. Przy gatunkach charakterystycznych i wyróżniających zbiorowiska klasę stałości i współczynnik pokrycia oznaczono tłustym drukiem.

Zbiorowiska roślinne zestawione w tabeli można podzielić na dwie grupy siedliskowe.

Do pierwszej grupy należą zespoły wykształcające się na podłożu zasobniejszym zazwyczaj w sole mineralne, ogólnie mówiąc zbiorowiska związane z torfowiskami niskimi. Są to zbiorowiska wodne, szuwarowe, zarośla łozowe i olsy.

Drugą grupę tworzą zespoły rosnące na podłożu torfowcowym, ogólnie związane z torfowiskami wysokimi. Jest to zespół dolinkowy i kępkowy mszaru oraz bór bagienny. Duży wpływ na wykształcenie i rozmieszczenie tych zbiorowisk wywiera grubość pokładu torfu oraz stosunki wodne. W związku z tym zespoły roślinne wykazują duże wzajemne powiązanie florystyczne nawet w obrębie gatunków charakterystycznych.

W obrębie pierwszej grupy największe pokrewieństwo florystyczne wykazują zarośla łozowe i olsy. Gatunki charakterystyczne związku *Alnion glutinosae* występują mniej więcej w tych samych stosunkach w obu zbiorowiskach. Jedynie *Salix cinerea* wykazuje większe przywiązanie do zarośli łozowych, występuje tu masowo i posiada wysoki współczynnik pokrycia. W olsie zaś wysoką liczebność i najwyższy stopień stałości osiągają *Alnus glutinosa* i *Betula pubescens*, można więc te dwa gatunki uważać za lokalnie wyróżniające zespół.

Myriophyllo-Nupharetum wyróżnia się zdecydowanie od innych zbiorowisk.

rowisk masowym występowaniem *Nymphaea alba* i *Nuphar luteum*, gatunków charakterystycznych dla zespołu, które wprowadzie przenikają Nielicznie i do innych asocjacji, jednak w tym zbiorowisku osiągają najwyższą liczebność i stopień stałości.

Podobnie w *Scirpo-Phragmitetum*, *Typha latifolia* i *Phragmites communis* występują najliczniej wyodrębniając tę asocjację.

Zespół *Caricetum inflato-vesicariae* różni się od innych zbiorowisk wyłączną obecnością *Carex vesicaria*, jak również masowym występowaniem *Carex rostrata*.

Zbiorowiska drugiej grupy omawianej tabeli wykazują dość duże wzajemne powiązanie, które podkreśla obecność wspólnych gatunków wysokotorfowiskowych.

W obrębie zespołu *Caricetum limosae* oprócz grupy roślin wysokotorfowiskowych duże znaczenie wykazuje *Carex limosa*, która w wariancie typowym występuje z dużą stałością i liczebnością, natomiast w wariancie z *Rhynchospora alba* traci na znaczeniu.

Sphagnetum medii et *rubelli* wariant z *Rhynchospora alba* nawiązuje przez występowanie *Rhynchospora alba* (V klasa stałości i duży współczynnik pokrycia) i *Scheuchzeria palustris* do wariantu z *Rhynchospora alba* zespołu *Caricetum limosae*. Z drugiej strony *Sphagnetum medii* et *rubelli* typicum posiada wiele wspólnych gatunków z *Vaccinio uliginosi-Pinetum*. Niemniej bór bagienny wyodrębnia się obecnością gatunków borowych oraz masowym występowaniem *Ledum palustre* i *Vaccinium uliginosum*, gatunków charakterystycznych dla tego zbiorowiska, osiągających tu najwyższy stopień stałości i dużą liczebność.

W tabeli 18 wyróżniają się jeszcze dwa zbiorowiska, a mianowicie *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre* i *Carex lasiocarpa*. Są to asocjacje nawiązujące z jednej strony do zbiorowisk wysokotorfowiskowych, z drugiej zaś do niskotorfowiskowych. Gatunkami wyróżniającymi dla jednego z nich jest *Carex lasiocarpa*, która występuje z wysokim współczynnikiem pokrycia. Asocjacja ta wykazuje duże powiązania florystyczne z *Caricetum limosae*.

Dla drugiego zbiorowiska wyróżniającymi gatunkami są: *Menyanthes trifoliata* i *Comarum palustre* osiągające w tej asocjacji najwyższą liczebność i stopień stałości.

W miarę, jak przekształca się roślinność w poszczególnych zbiorowiskach, zmienia się również stosunek liczby gatunków mszaków do całej listy florystycznej. Zmiany te przedstawia ryc. 16a i b.

W pierwszej grupie (ryc. 16a) widać, że od zespołu *Myriophyllo-Nupharetum* pozbawionego prawie zupełnie mchów (6%) następuje stopniowy wzrost liczby gatunków mszaków, które osiągają swe maksimum w olsie (32%). Jedynie w zespole *Caricetum inflato-vesicariae* występuje mała ilość mszaków (11%), co uwidoczniło się w przebiegu krzywej.

W grupie drugiej (ryc. 16b; umieszczono na wykresie również zbioro-

Ryc. 16. Procentowy udział liczby gatunków mszaków (—) i roślin naczyniowych (---) w poszczególnych zbiorowiskach roślinnych
a — zbiorowiska związane z torfowiskami niskimi, b — zbiorowiska związane z pomostem torfowcowym

Percentual contribution of various bryophyte species (—) and vascular plants (---) in the particular plant communities.

Communities associated: a — with low peat-bogs, b — with *Sphagnum* mat.

1 — *Myriophyllo-Nupharetum*, 2 — *Scirpo-Phragmitetum*, 3 — *Caricetum inflato-vesicariae*, 4 — *Salici-Franguletum*, 5 — *Carici elongatae-Alnetum*, 6 — zb. *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre*, 7 — zb. *Carex lasiocarpa*, 8 — *Caricetum limosae*, 9 — *Caricetum limosae* wariant z (variant with) *Rhynchospora alba*, 10 — *Sphagnetum medii et rubelli* wariant z (variant with) *Rhynchospora alba*, 11 — *Sphagnetum medii et rubelli*, 12 — *Vaccinio uliginosi-Pinetum*

wiska *Carex lasiocarpa* i *Menyanthes trifolia-Comarum palustre*) stosunki te układają się bardziej prawidłowo. Mszaki wykazują tendencję zwyżkową i osiągają maksimum w borze bagiennym (55%), przewyższając liczbę gatunków roślin naczyniowych.

Ryciny 17a i 17b obrazują natomiast wzajemne stosunki mszaków i roślin naczyniowych przy zasiedlaniu powierzchni w poszczególnych zbiorowiskach. W obrębie pierwszej grupy zbiorowisk (ryc. 17a) największą powierzchnię (41%) zajmują mszaki w zespole *Salici — Franguletum*, jednak nie przewyższają powierzchni porośniętej przez rośliny naczyniowe. W olsie widać wyraźnie zmniejszenie się udziału mszaków w zasiedlaniu powierzchni. Podobnie wyglądają stosunki w obrębie grupy drugiej (ryc. 17b); tu również w zbiorowiskach leśnych (bór bagieny) następuje zmniejszenie udziału mszaków w pokrywaniu powierzchni na korzyść roślin naczyniowych.

Ryc. 17. Procentowy udział mszaków (—) i roślin naczyniowych (---) w zasiedlaniu powierzchni w poszczególnych zbiorowiskach roślinnych
a — zbiorowiska związane z torfowiskami niskimi, b — zbiorowiska związane z pomostem torfowcowym

Percentual share of bryophytes (—) and vascular plants (---) in settlement on the area of the particular plant communities.

a — communities associated with low peat-bogs, b — communities associated with *Sphagnum* mat.
1 — *Myriophyllo-Nupharetum*, 2 — *Scirpo-Phragmitetum*, 3 — *Caricetum inflato-vesicariae*, 4 — *Salici-Franguletum*, 5 — *Carici elongatae-Alnetum*, 6 — zb. *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre* (community), 7 — zb. *Carex lasiocarpa* (community), 8 — *Caricetum limosae*, 9 — *Caricetum limosae* wariant z (variant with) *Rhynchospora alba*, 10 — *Sphagnetum medii et rubelli* wariant z (variant with) *Rhynchospora alba*, 11 — *Sphagnetum medii et rubelli*, 12 — *Vaccinio uliginosi-Pinetum*

Maksymalną powierzchnię zajmują mszaki (66% i 67%) w *Sphagnetum medii et rubelli*, natomiast w wariantcie z *Rhynchospora alba* zespołu *Caricetum limosae* obydwa komponenty (mszaki i rośliny naczyniowe) porastają powierzchnię w jednakowym stosunku.

Analizując diagramy (ryc. 18) rozkładu klas stałości mszaków w poszczególnych zespołach, ogólnie można powiedzieć, że najwyższe wartości osiągają gatunki występujące sporadycznie, w pierwszym stopniu stałości. Szczególnie uwydatnia się to w zbiorowiskach wysokotorfowiskowych i w leśnych, gdzie liczba gatunków występujących w II i wyższych klasach nie przekracza 30—40%, natomiast liczba gatunków rosnących sporadycznie jest bardzo duża, osiągając w niektórych asocjacjach 70, a nawet więcej procent.

W zbiorowiskach *Scirpo-Phragmitetum*, *Caricetum inflato-vesicariae*

Ryc. 18. Rozkład klas stałości mszaków w poszczególnych zbiorowiskach roślinnych
 Distribution of constancy of bryoptytes in the particular plant communities.
 1 — *Myriophyllo-Nupharetum*, 2 — *Scirpo-Phragmitetum*, 3 — *Caricetum inflato-vesicariae*,
 4 — *Salici-Franguletum*, 5 — *Carici elongatae-Alnetum*, 6 — zb. *Menyanthes trifoliata-Comarum*
palustre (community), 7 — zb. *Carex lasiocarpa* (community), 8 — *Caricetum limosae* wariant
 z (variant with) *Rhynchospora alba*, 10 — *Sphagnetum medii et rubelli* wariant z (variant with)
Rhynchospora alba, 11 — *Sphagnetum medii et rubelli*, 12 — *Vaccinio uliginosi-Pinetum*

i *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre* rozkład klas stałości gatunków mszaków jest bardziej wyrównany, liczne są gatunki występujące masowo i rzadko.

KIERUNKI SUKCESJI

Z zestawienia zbiorowisk wyróżnionych w strefie zarastania sucharów (tab. 18) wynika, że ogólny kierunek zmian roślinności przebiega od zbiorowisk wodnych, poprzez oczerety lub zbiorowiska wysokich torfowisk, do zbiorowisk lądowych, leśnych. Pierwsze z nich związane są z dnem zbiornika, drugie — z dnem lub stanowią pokład roślinny leżący na wodzie, trzecie obejmują strefę związaną z gruntem mineralnym, poza obecnym zbiornikiem wodnym.

Jednakże w poszczególnych przypadkach obserwować można duże różnice, dlatego procesy sukcesyjne zostaną przedstawione w każdej grupie sucharów osobno.

W procesie zarastania tej grupy sucharów, do której zaliczono Linowo, Widny, Mozguć i Wądołek, małe znaczenie mają mchy, zdecydowanie większą rolę odgrywają natomiast rośliny naczyniowe. One w pierwszych stadiach osiedlają się na spłyconych przybrzeżnych ławicach i opanowują teren, dopiero w późniejszych fazach rozwojowych pojawiają się w większej ilości mchy.

Pierwszym zespołem wchodzącym najgłębiej, przyczyniającym się do spłyconienia zbiornika oraz przygotowującym grunt dla innych zbiorowisk, jest zespół *Myriophyllo-Nupharetum*. Na głębokości od 0,7 m lub mniejszych zbiorowisko roślin wodnych jest wypierane przez zespół *Scirpo-Phragmitetum* lub skupienia *Equisetum limosum*; tak dzieje się w sucharze Widnym. W miejscach płytszych, około 0,5 m głębokości, w zespół *Myriophyllo-Nupharetum* wnikają rośliny ze zbiorowiska *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre*, odznaczające się dość dużym dynamizmem.

Następnym ogniwem w sukcesji jest zbiorowisko *Carex lasiocarpa* zajmujące najpłytsze miejsca, na krawędzi wody i brzegu. Asocjacja ta, w której występują mchy, jak *Calliergon cuspidatum*, *Climacium dendroides*, bardzo często sąsiaduje z zespołem *Salici-Franguletum*, który zajmuje siedliska wilgotne o dużych wahaniami wody. Zbiorowisko zarośli łozowych rozwija się nad tymi sucharami na dość rozległych powierzchniach, otaczając poszczególne zbiorniki. W licznych przypadkach *Salici-Franguletum* jest ostatnim ogniwem sukcesyjnym, niekiedy zaś jego płaty wnikają w *Carici elongatae-Alnetum* lub w *Caricetum inflato-vesicariae*. Ten ostatni zespół zajmuje znaczne obszary nad sucharem Linowo, w strefie wód zalewowych.

W zbiorowiskach zarośli łozowych i olsie duży udział w pokrywaniu powierzchni posiadają mchy zarówno z rzędu *Bryales*, jak i ze *Sphagnales*.

Suchary z udziałem roślinności torfowisk niskich, przejściowych i wysokich

Do tej grupy zbiorników należą suchary: Stanowisko, Wygorzele, Suchar II, Dembowskich, Rzepiskowy, Suchar I, Suchar VI i Wielki.

Zbiorowiskiem inicjalnym jest tu *Myriophyllo-Nupharetum*, które zajmuje płycizny w środkowych partiach sucharów oraz pas na ławicach przybrzeżnych. Szereg sukcesyjny ulega tutaj rozgałęzieniu.

W pierwszym przypadku następnym ogniwem sukcesji jest zespół *Scirpo-Phragmitetum*, który przechodzi w zarośla łozowe lub w olsy o charakterze krzewiastym. Zbiorowiska te zajmują brzegi zabagnione i sąsiadują przeważnie z borem bagiennym. Ulegają więc w dalszym swoim rozwoju zatorfieniu i przekształcają się w bór na bagnie.

W drugim przypadku płaty zespołu *Myriophyllo-Nupharetum* graniczą ze zbiorowiskami: *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre* i *Carex lasiocarpa*. Obydwa te zbiorowiska są inicjalnymi, związanymi bezpośrednio z wodą, stadiami rozwoju pomostu torfowcowego. Wcześniejszą fazą jest *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre*, następną zaś *Carex lasiocarpa*. Dopiero potem wkraczają typowe zespoły pomostu torfowcowego — najpierw *Caricetum limosae*, dalej *Sphagnetum medii et rubelli* i jako ostatnie ogniwo sukcesji *Vaccinio uliginosi-Pinetum*.

Oczerety, zarośla łozowe i olsy reprezentowane są w tej grupie sucharów przez nieliczne i niewielkie płaty. Zespoły zaś występujące na pomoście torfowcowym — *Caricetum limosae*, *Sphagnetum medii et rubelli* i poza pomostem *Vaccinio uliginosi-Pinetum* — zajmują duże powierzchnie ciągnące się wzdłuż brzegów jezior i szerokim do 10 m pasem pokrywają zwierciadło wody. Zbiorowiska tworzące pływający pomost odgrywają zasadniczą rolę w zachodzących tu procesach zarastania. W związku z tym można przypuszczać, że brzegi sucharów należące do tej grupy, zostaną całkowicie opanowane przez zespoły pomostu torfowcowego.

Suchary z udziałem roślinności torfowisk przejściowych i wysokich

Należą tutaj następujące suchary: Zielone Ślepe, Wschodni, Zachodni, Suchar VII, Tłusty, Drobný, Suchar V, Suchar III i IV.

W tej grupie sucharów decydującą rolę w szeregu sukcesyjnym odgrywają zbiorowiska z dużym udziałem mchów; zarówno ich udział, jak i wzrastająca liczebność gatunków, powoduje przekształcenie się jednego zespołu w drugi.

Stadium inicjalnym są skupienia darni *Sphagnum cuspidatum*, tworzące luźną pływającą „watę”, która stopniowo staje się bardziej zwarta i wypiętrza się nad poziom wody. Pomiedzy pływające darnie mszyste wnikają byliny kłaczowe, np. *Carex lasiocarpa*, czy też *C. limosa*, utrwalając je. Wykształca się zespół *Caricetum limosae*.

W dalszym rozwoju pomostu torfowcowego ogromną rolę odgrywa *Sphagnum apiculatum*, które powoduje przyrost miąższości oraz powolne wypiętrzanie się luźnego kożucha. Równocześnie korzystając z siedliska silnie nawodnionego, osiedla się tutaj *Rhynchospora alba*. W ten sposób zespół *Caricetum limosae* przekształca się w wariant z *Rhynchospora alba*. Pomost torfowcowy rozrasta się, wynosi się ponad poziom wody, osiąga znaczną miąższość, pojawia się *Sphagnum magellanicum*, które stopniowo opanowuje coraz większą powierzchnię, wzrasta udział gatunków klasy *Oxycocco-Sphagnetum*, wytwarza się nowy zespół *Sphagnetum medii et rubelli* (ryc. 19) lub jego wariant z *Rhynchospora alba*.

Ryc. 19. Transekt pasowy przedstawiający układ przestrzenny i następstwo zespołów roślinnych na pomoście torfowcowym; brzeg wschodni Sucharu IV
 Belt transection presenting the spacial arrangement and succession of the plant associations on the *Sphagnum* mat.; eastern shore of Suchar IV.

0—0,25 m *Caricetum limosae*, 0,25—2 m *Caricetum limosae* variant z (variant with) *Rhynchospora alba*, 2—4,5 m *Sphagnetum medii et rubelli*, 4,5—6 m *Vaccinio uliginosi-Pinetum*

Ryc. 20. Schematy ilustrujące sposoby zarastania
a — powierzchniowy, b — od dna

Diagrams illustrating the process of overgrowth.

a — along the surface; b — from the bottom

Ryc. 21. Schematy ilustrujące rozrastanie się pomostu torfowcowego
a — przez nasuwanie się na lustro wody, b — przez rozsuwanie

Diagrams illustrating the process of extension of the *Sphagnum* mat.:

a — by creeping onto the water table, b — by extension

Obniżenie się poziomu wody gruntowej oraz wypiętrzanie się kęp *Sphagnum magellanicum* i *Polytrichum strictum* wywołuje przesuszenie górnych warstw podłoża i sprzyja osiedlaniu się sosny. Równocześnie występują elementy borowe, *Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens*, których ilość i liczebność gatunków wzrasta w miarę oddalania się od wolnej powierzchni wody. Mszar przekształca się w bór bagienny — *Vaccinio uliginosi*-*Pinetum*, który jest tutaj ostatnim ogniwem sukcesji.

W niektórych jeziorach omawianej grupy sucharów występuje ponadto zespół *Myriophyllo-Nupharetum*; jest to zbiorowisko bardzo słabo związane z przebiegającą tu sukcesją. Wykształca się raczej jako oddzielna jednostka, która niewątpliwie odgrywa dużą rolę w płytkich zbiornikach (Suchar VII) przyspieszając proces ich zarastania.

PROCES ZARASTANIA

Suchary suwalskie znajdują się w różnym stopniu zarastania. W pewnych przypadkach można zaobserwować początkowe fazy — osiedlanie się roślin, w innych przypadkach — już daleko posunięty proces zarastania.

Ryc. 22. Stosunek szerokości pomostu torfowcowego do jego miąższości w poszczególnych sucharach

1 — s. Wielki, brzeg północny; 2 — s. Wschodni, brzeg północny; 3 — Suchar I, brzeg południowy. 4 — s. Wielki, brzeg północno-wschodni; 5 — s. Zachodni, brzeg południowo-wschodni; 6 — Suchar IV, brzeg północny; 7 — s. Rzepiskowy, brzeg północny; 8 — s. Zachodni, brzeg południowy

Ratio of width of the *Sphagnum* mat. to its thickness in the particular lakes

1 — s. Wielki, northern shore; 2 — s. Wschodni, northern shore; 3 — Suchar I, southern shore; 4 — s. Wielki, north-eastern shore; 5 — s. Zachodni, south-eastern shore; 6 — Suchar IV, northern shore; 7 — s. Rzepiskowy, northern shore; 8 — s. Zachodni, southern shore

Proces opanowywania przez rośliny wolnej powierzchni wody może odbywać się równocześnie w kilku miejscach zbiornika wodnego. Ośrodkami ekspansji roślin są w sucharach przede wszystkim brzegi jeziora, następnie dno zbiornika oraz wyspy pływające.

Brzeg jeziora wykazuje największą aktywność w procesie zarastania sucharów suwalskich. Kierunek ekspansji roślin przebiega tu od brzegu ku środkowi jeziora.

W zależności od inwazji roślin można wyróżnić 2 typy zarastania.

1. Zarastanie powierzchniowe. Rośliny biorące udział w tym sposobie zarastania atakują powierzchnię wody (ryc. 20b). Najbardziej aktywnymi są rośliny kłaczowe i rozłogowe, które mogą pływać po powierzchni wody. Należą tu takie gatunki, jak: *Menyanthes trifolia*, *Comarum palustre*, *Calla palustris*, które mogą tworzyć w początkowych stadiach czyste skupienia jednogatunkowe; w okresie dalszego rozwoju osiedlają się inne gatunki roślin naczyniowych (ryc. 23) i mchy. Darniki *Sphagnum cuspidatum* lub *Sph. obtusum*, a następnie *Sphagnum apiculatum* oplatają wieloletnie pędy roślin i zestalają je. Na takie pły-

Ryc. 23. Skupienia wielogatunkowe, przykład zarastania powierzchniowego, stadium późniejsze; Suchar Wygorzele

Multispecific agglomerations, example of surface overgrowth, later stage; Suchar Wygorzele.

wające darnie wkraczają rośliny kępkowe — *Eriophorum vaginatum*, *Carex Hudsonii* oraz inne gatunki turzyc (*Carex lasiocarpa*, *C. fusca*). Poza nimi osiedlają się tu: *Rhynchospora alba*, *Scheuchzeria palustris*, a w miejscach bardziej utrwalonych przedstawiciele rodziny *Ericaceae*, *Andromeda polifolia* i *Oxycoccus quadripetalus*, jak również *Drosera rotundifolia*. W rezultacie wykształca się różnej szerokości, silnie uginający się pomost torfowcowy pływający po powierzchni wody, który osiąga największą miąższość i twardość przy brzegu, dalej jest coraz cieńszy i mniej zwarty. Wymiary jego na poszczególnych sucharach są niejednakowe. W niektórych zbiornikach posiada on 10, a nawet więcej metrów szerokości przy stosunkowo nieznacznej grubości (Wschodni, Wielki). W innych sucharach przy niewielkiej szerokości przypada znaczna grubość (Zachodni). Wykres (ryc. 22) ilustruje na przykładach pomiarów wykonanych w 6 sucharach stosunek miąższości pomostu torfowcowego do jego szerokości (odległość od lustra wody do gruntu mineralnego).

Pomost torfowcowy, czyli „kożuch”, nasunięty od brzegu na lustro wody w sucharach suwalskich jest jednym z najważniejszych ośrodków

Ryc. 24. *Andromeda polifolia* wkraczająca z pomostu torfowcowego w wodę;
Suchar IV

Andromeda polifolia advancing from the *Sphagnum* mat. into the water; Suchar IV.

ekspansji roślin. Jego dynamika jest decydującym czynnikiem w procesie opanowywania wolnej przestrzeni wodnej i przede wszystkim sprzyja zarastaniu zbiornika.

Rozwój pomostu torfowcowego może przebiegać w dwojaki sposób:

A. Przez postępowe narastanie, tj. nasuwanie się pomostu torfowcowego na lustro wody (ryc. 21a). Proces ten zachodzi wtedy, gdy rośliny biorące udział w rozrastaniu „kożucha” działają na powierzchnię wody. Należą tu rośliny o rozłogach i kłaczach utrzymujące się na powierzchni wody oraz mchy. Stadium inicjalne stanowią najczęściej darnie *Sphagnum cuspidatum*, tworzące luźną lub bardziej zbitą „watę” pływającą tuż pod powierzchnią wody lub nieco wynurzona (ryc. 15). Rośliny kłaczowe i rozłogowe z krawędzi pła, jak *Carex limosa*, *C. lasiocarpa*, *Lysimachia vulgaris*, *Comarum palustre*, *Menyanthes trifoliata* przerastają darnie torfowca i utrwala je. W prociesie tym bierze niekiedy również udział *Andromeda polifolia*, której łukowato wygięte gałązki wchodzi w wodę na odległość do 50 cm (ryc. 24). Na tak zestalonych pływających darniach osiedlają się inne gatunki torfowców, najpierw *Sphagnum apiculatum*, a następnie, kiedy grubość pomostu zwiększa się i wypiętrza

Ryc. 25. Pływająca wyspa torfowcowa; Suchar IV

Floating *Sphagnum* island; Suchar IV.

ponad poziom powierzchni wody w jeziorze, pojawia się *Sph. magellanicum* oraz inne mszaki i rośliny naczyniowe.

B. Przez rozsuwanie (rozpychanie) pomostu torfowcowego i powolne przesuwanie wolnej jego krawędzi na lustro wody (ryc. 21b). Proces ten zachodzi wtedy, gdy rośliny biorące udział w zarastaniu działają w warstwie runa. Warstwa runa na pomoście zbudowana jest przede wszystkim z mchów torfowców, które odznaczają się olbrzymią liczebnością osobników i wielką zdolnością rozrodczą. Z jednego splątka rozwija się kilka, a czasem kilkanaście gametofitów. Te rozrastają się bardzo szybko, tworzą liczne rozgałęzienia, zagęszczając darnie, a nawet rozsuwając je. Osiedlające się w runie mszystym byliny (*Menyanthes trifoliata*, *Comarum palustre*, *Calla palustris*) odznaczają się często rozgałęzionymi, dość rozległymi, grubymi kłaczami. Kłacza rosną w zależności od gatunków od kilku do kilkunastu centymetrów rocznie, powodują rozpychanie, a czasem nawet, szczególnie w wypadku, gdy pomost torfowcowy jest cienki, rozerwanie jego i utworzenie wyspy. Podobnie działają rośliny kępowe: osobniki początkowo pojedyncze szybko rozrastają się tworząc zwartą kępę, która powoduje rozsadzanie darni torfowców. Poza tym systemy korzeniowe drzew, krzewów i krzewinek, a także

Ryc. 26. Pływająca wyspa torfowiskowa porośnięta karłowatymi sosnami; Suchar Wielki

Floating *Sphagnum* island overgrown with dwarf pines; Suchar Wielki.

roślin zielnych z jednej strony utrwalają, z drugiej zaś strony powodują rozsuwanie podłoża.

Obydwa wyżej omawiane sposoby rozrastania pła przebiegają równocześnie.

Wyspy pływające, czyli małe fragmenty pomostu torfowcowego, powstałe najczęściej przez jego rozerwanie, albo w sposób naturalny, np. wskutek działania wiatru, lub rozrastania się pomostu, albo sztuczny, spowodowany działalnością człowieka, mogą stać się również ośrodkami ekspansji roślin. Proces rozrastania się pływającej wyspy (ryc. 25) przebiega zupełnie podobnie do rozwoju pomostu torfowcowego. Na skraju wyspy rozwijają się rośliny kłaczowe i rozłogowe, wykazujące dużą aktywność w zdobywaniu nowych terenów; są to przeważnie turzyce *Carex limosa* i *C. lasiocarpa* oraz *Rhynchospora alba*. Ta ostatnia występuje również i w następnym pasie. W części środkowej wyspy spotyka się elementy mszaru. Znajduje się tam w dużej ilości *Sphagnum magellanicum*, spora ilość *Polytrichum strictum*, a nawet małe skarłate sosienki (ryc. 26). Długość „życia” wyspy bywa różna. Unoszona przez wiatr może zostać zepchnięta do brzegu i pomału zrasta się z nim lub po pewnym czasie opada na dno.

Ryc. 27. *Menyanthes trifoliata* i *Equisetum limosum* w wodzie, na ławicy przybrzeżnej, przykład zarastania od dołu; Suchar Mozguć

Menyanthes trifoliata and *Equisetum limosum* in the water on a coastal bank, example of overgrowth from bottom; Suchar Mozguć.

Na omawianym terenie spotykałam wyspy przeważnie na tych sucharach, gdzie pomost torfowcowy jest dobrze rozwinięty, z licznymi zatkami i półwyspami (Suchary III, IV, V, VII, Tłusty).

2. Zarastanie od dna, w którym biorą udział rośliny wyrastające z dna zbiornika lub czołgające się po nim. Ekspansja rozpoczyna się przede wszystkim od gatunków występujących na brzegu jeziora, roślin o kłęczach rosnących dość głęboko w dnie zbiornika jak *Phragmites communis*, *Equisetum limosum*, jak również innych bylin kłęczowych i rozłogowych. Występuje tu wiele gatunków spotykanych w poprzednim sposobie zarastania, a więc *Menyanthes trifoliata* (ryc. 27), *Comarum palustre*, *Carex lasiocarpa*, *C. rostrata*, *Lysimachia thyrsiflora* i *L. vulgaris*. Poza tym niekiedy bierze udział w tym procesie *Salix cinerea*, której zginające się łukowato i zanurzone w wodzie pędy łatwo się zakorzeniają. Rozwój tego typu zarastania jest dość ograniczony warunkami morfologicznymi jeziora; wykształcać się on może tylko w przybrzeżnych płytkich wodach, maksymalnie do 1,2 m głębokości. Osiedlanie się mszaków, a przede wszystkim torfowców powoduje w dalszym rozwoju tego sposobu zarastania wykształcanie się pomostu torfowcowego.

W sucharach suwalskich można zaobserwować obydwa sposoby zarastania. Zarastanie drugim sposobem jest rzadziej spotykane, odbywa się ono na brzegach mineralnych, lub w miejscach, gdzie pomost torfowcowy został zniszczony (Suchar II, Stanowisko, Wądołek).

Dno zbiornika może stać się ośrodkiem ekspansji roślin w jeziorach silnie spłyconych oraz w przybrzeżnych ławicach, gdzie głębokość jest nieznaczna. W sucharach suwalskich ten sposób zarastania jest na ogół mało intensywny. Bierze w nim udział grupa roślin wodnych o liściach pływających, która rozwija się w partiach przybrzeżnych tworząc przerwany pas wkoło jeziora. W sucharach płytkich lub posiadających rozległe płycizny, spowodowane przez opadające szczątki organiczne (Suchar VI, VII, Linowo), rośliny te odgrywają większą rolę. Z jednej strony płytkie dno proteguje rozwój tych roślin, z drugiej zaś rośliny przyczyniają się do dalszego spływania zbiornika.

Wymienione wyżej sposoby inwazji roślin w związku z głębokością zbiorników, ich kształtem, rozwojem linii brzegowej i przybrzeżnych ławic, przebiegają z niejednakowym dynamizmem w poszczególnych sucharach. Suchary znajdują się więc w różnych stadiach zarastania.

Do najbardziej zarośniętych można zaliczyć Linowo, Suchar VI i Suchar VII. Suchary VI i VII są jeziorami silnie spłyconymi przez opadające na dno szczątki organiczne i są porośnięte w centralnych partiach dość rozległymi płatami roślinności wodnej o liściach pływających. W związku z tym należy przypuszczać, że proces zarastania przez roślinność pomostu torfowcowego będzie tu postępował dość szybko. W sucharze Linowo natomiast, proces zarastania przebiega odmiennie, roślinność wodna pokrywa w znacznym stopniu cały zbiornik, a duże wahania poziomu wody przyczyniają się do jego wysychania i dalszego spływania.

Najslabiej zarośniętymi są suchary: Widny, Mozguć, Wądołek, Suchar II i Stanowisko. Suchary te charakteryzują się dość dużą powierzchnią jeziora, kształtem zbliżonym do koła, a więc krótką linią brzegową, oraz znaczną głębokością i stromym stokiem niecki jeziornej. Wszystkie wymienione czynniki mają wpływ na wolniejszy proces zarastania.

STRATYGRAFIA

W celu porównania roślinności panującej we wczesnych okresach zarastania sucharów z roślinnością biorącą obecnie udział w procesach zarastania, przeprowadziłam na południowym brzegu Sucharu I i północno-zachodniego Sucharu VI orientacyjne wiercenia. Przy brzegu każdego z tych jezior zrobiłam w strefie zarastania po dwa wiercenia wzdłuż linii biegnącej prostopadle do brzegu: pierwsze w odległości 5 m od wolnego lustra wody w zespole *Caricetum limosae* wariant z *Rhynchospora alba*, drugie w odległości 10 m na pograniczu mszaru i boru bagienneho.

Ryc. 28. Rozmieszczenie zbiorowisk
Distribution of plants com-

1 — Suchar I, 2 — Suchar II, 3 — Suchar III, 4 — Suchar IV, 5 — Suchar V, 6 — Suchar VI,
7 — Suchar VII, 8 — s. Wędołek

roślinnych na sucharach 1—8
munities on the lakes 1—8.

Zbiorowiska (Communities): a — *Myriophyllo-Nupharetum*, b — *Scirpo-Phragmitetum*, d — *Salici-Fraguletum*, e — *Carici elongatae-Alnetum*, f — *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre*, g — *Carex lasiocarpa*, h — *Caricetum limosae*, i — *Caricetum limosae* variant z (variant with) *Rhynchospora alba*, j — *Sphagnetum medii et rubelli*, k — *Vaccinio uliginosi Pinetum*, n — *Sphagnum cuspidatum*

(Patrz legenda na luźnej wkladce) (See on the legend)

Ryc. 29. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych na sucharach 9—14

Distribution of plant communities on the lakes 9—14:

9 — s. Dembowskich, 10 — s. Zachodni, 11 — s. Wschodni, 12 — s. Stanowisko, 13 — s. Wygorzele, 14 — s. Mozguc

Zborowiska (Communities): a — *Myriophyllo-Nupharetum*, b — *Scirpo-Phragmietetum*, d — *Salici-Franguletum*, e — *Carici elongatae-Alnetum*, f — *Caricetum limosae*, i — *Caricetum limosae* variant z (variant with) *Rhynchospora alba*, j — *Sphagnetum medii et rubelli*, k — *Vaccinio uliginosi-Pineum*, m — *Equisetum limosum*, n — *Sphagnum cuspidatum*

Patrz legenda na luźnej wkladce (See on the legend)

Ryc. 30. Rozmieszczenie zbiorowisk
Distribution of plant com-

15 — s. Wielki, 16 — s. Rzepiskowy, 17 — s. Zielone Ślepe, 18 — s. Linowo, 19 — s. Drobny,
20 — s. Tłusty, 21 — s. Widny

Zbiorowiska (Communities): a — *Myriophyllo-Nupharetum*, b — *Scirpo-Phragmitetum*,
c — *Caricetum inflato-vesicariae*, d — *Salici-Franguletum*, e — *Carici elongatae-Alnetum*,
f — *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre*, g — *Carex lasiocarpa*, h — *Caricetum limosae*,
i — *Caricetum limosae* variant z (variant with) *Rhynchospora alba*, j — *Sphagnetum medii*
et *rubelli*, k — *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, l — *Glyceria fluitans-Heleocharis acicularis*, m —
Equisetum limosum, n — *Sphagnum cuspidatum*

Patrz legenda na luźnej wkładce (See on the legend)

Suchar I — brzeg południowy

A₁ Wiercenie wykonane w odległości 5 m od lustra wody:

- 0—200 cm — torf sfagnowy bardzo słabo rozłożony (*Sphagnum magellanicum*, *Sph. apiculatum* z niewielką ilością *Eriophorum vaginatum*, *Scheuchzeria palustris*, *Andromeda polifolia*, *Carex limosa* i *C. lasiocarpa*, *Pinus silvestris*).
- 200—300 cm — soczewka wody.
- 300—325 cm — torf sfagnowy silnie rozwodniony, bardzo słabo rozłożony ze śladami gytii.
- 325—375 cm — torf sfagnowy o niewielkim stopniu rozkładu ze śladami gytii i drewna sosnowego
- 375—425 cm — torf sfagnowy średnio rozłożony z kawałkami drewna sosny i śladami gytii, zapiaszczenie.
- 425 cm — piasek i żwir.

A₂ Profil zrobiony w odległości 10 m od lustra wody.

- 0—150 cm — torf sfagnowy o bardzo niskim stopniu rozkładu.
 - 150—200 cm — torf sfagnowy trochę rozłożony.
 - 200—275 cm — torf sfagnowy o średnim stopniu rozkładu ze szczątkami sosny.
 - 275—300 cm — torf sfagnowy z dość dużym udziałem wełnianki.
- W spągu piasek ze żwirem.

Suchar VI brzeg północno-zachodni

B₁ Sondowanie w odległości 5 m od lustra wody.

- 0—125 cm — torf sfagnowy bardzo słabo rozłożony.
- 125—200 cm — torf sfagnowy o niskim stopniu rozkładu z dość licznymi szczątkami sosny.
- 200—225 cm — torf sfagnowo-wełniankowy średnio rozłożony.
- 225—350 cm — torf sfagnowo-sosnowy dobrze rozłożony.
- 350—400 cm — torf mszysty z dużym udziałem *Drepanocladus aduncus* i niewielkiej ilości *Calliergon giganteum*.
- 400 cm — piasek.

B₂ Profil zrobiony w odległości 10 m od lustra wody.

- 0—50 cm — torf sfagnowy o bardzo słabym stopniu rozkładu.
- 50—100 cm — torf wełniankowo-sfagnowy słabo rozłożony.
- 100—150 cm — torf sfagnowo-sosnowy z dość dużym udziałem *Eriophorum vaginatum* i *Scheuchzeria palustris*.
- 150—200 cm — torf sfagnowo-wełniankowy z licznymi szczątkami sosny, średnio rozłożony.
- 200—300 cm — torf sosnowo-sfagnowy dobrze rozłożony z licznym udziałem *Scheuchzeria palustris* i *Eriophorum vaginatum*.
- 300—350 cm — torf mszysty, dobrze rozłożony, licznie *Scheuchzeria palustris*, *Carex lasiocarpa*, *C. limosa*.

W pracy Ołtuszewskiego (1937) znajdują się opisy wierceń wykonanych przez autora przy dwóch sucharach suwalskich. Jedno z nich przeprowadzono na północno-zachodnim brzegu Sucharu przy jez. Krzywe (stanowisko bliżej nie określone).

C. Układ warstw w tym profilu przedstawia się następująco:

- 0—175 cm — torf sfagnowo-wełniankowy słabo rozłożony.
- 175—410 cm — torf sfagnowy średnio rozłożony.

- 410—550 cm — torf sfagnowy dobrze rozłożony, zawierający gałązki i igły sosny.
550—600 cm — torf mszysty dobrze rozłożony.
600—645 cm — torf turzycowy.
645—650 cm — warstwa łu a dalej drobnoziarnisty piasek.

Drugie sondowanie wykonał Ołtuszewski przy północnym brzegu Sucharu Dembowskich.

D. Budowa profilu jest następująca:

- 0—60 cm — torf sfagnowy, słabo rozłożony.
60—280 cm — torf mieszany (przejściowy) dobrze rozłożony. Szczątki torfowców, wełnianki, kora i drewno sosny.
280—295 cm — łu wapnisty z muszelkami mięczaków.
295—297 cm — torf turzycowy, silnie rozłożony, sporo torfowców.
297—440 cm — gytia trochę spiaszczona ze szczątkami muszelek mięczaków i okrzemkami.

Analizując te profile można ogólnie powiedzieć, że w obrębie grupy sucharów koło Krzywego, tzw. huciańskich, układ warstw jest mniej więcej jednakowy. Natomiast profil z suchara Dembowskich różni się od pozostałych obecnością dużego pokładu gytii oraz wkładki łu wapnisteo na głębokości 280—295 cm.

To ostatnie zjawisko tłumaczył Ołtuszewski w ten sposób, że spłycone przez osadzanie się na dnie gytii jezioro zaczęło zarastać turzycami i roślinnością bagienną; wytworzyła się w poziomie 295—297 cienka warstewka torfu turzycowego. Nastąpił później zalew, torf został pokryty łem, a po opadnięciu wody, powstało torfowisko o charakterze przejściowym z domieszką torfowców. Dopiero na poziomie 60 cm występują w przewodzie torfowce z licznym udziałem wełnianki.

Z profilów B₁, B₂, C wynika, że w pierwszym okresie zarastania tych sucharów i tworzenia się torfu największy udział miały turzycy i mchy z rzędu *Bryales*. Na podstawie ogólnej analizy szczątków makroskopowych tych pokładów (B₁, B₂) można się przekonać, że najliczniej występowały wówczas gatunki *Carex lasiocarpa*, *C. limosa*, *Scheuchzeria palustris*, *Drepanocladus aduncus*, *Calliergon giganteum* i w niewielkiej ilości torfowce *Sphagnum magellanicum* i *Sph. apiculatum*. W następnych, wcześniejszych, młodszych okresach wzrosła liczebność torfowców i gatunków wysokotorfowiskowych.

Wynik analizy warstw profilu A₂ wykazuje, że tu w procesie zarastania od początku brały udział torfowce.

Profil A₁ jest o tyle ciekawy, że wykonany został na pomoście torfowcowym miąższości 2 m, zbudowany jest on przede wszystkim z torfowców, natomiast na dnie jeziora, poniżej warstwy wody, utworzył się znaczny pokład 1,25 m torfu powstały z odpadających fragmentów kożucha.

Jak widać z powyższego przeglądu, w procesie zarastania w poprzednich okresach brały udział niektóre gatunki roślin, które i dzisiaj na tym terenie występują. Ówczesne warunki siedliskowe zbiorowisk roślinnych na sucharach zbliżone były być może do dzisiejszych.

1. Badaniami objęto 21 sucharów leżących w niecce jezior Wigry i Krzywe Wigierskie na Pojezierzu Suwalskim. Należą one do zbiorników płytkich, bezodpływowych i bezodpływowych, o niewielkiej powierzchni, których wody odznaczają się małą przezroczystością, dużą zawartością humusu i wolnego dwutlenku węgla, wysoką kwasowością, ubóstwem wapnia, fosforanów i azotanów. Są to jeziora dystroficzne, otoczone są borem sosnowo-świerkowym oprócz 4, które leżą wśród pól uprawnych.

2. Roślinność strefy zarastania sucharów zaklasyfikowałam do 8 zespołów, 2 wariantów, 2 zbiorowisk i 3 skupień roślinnych.

3. Zespoły *Myriophyllo-Nupharetum*, *Scirpo-Phragmitetum*, *Caricetum inflato-vesicariae*, *Salici-Franguletum* i *Carici elongatae-Alnetum* występują fragmentarycznie, na niewielkim obszarze i w małych płatach. Zespoły te charakteryzują się ogólnie małą liczbą gatunków, małym zróżnicowaniem fitosocjologicznym i stosunkowo niedużym udziałem mszaków. W procesach zarastania nie odgrywają większej roli.

4. Zbiorowiska *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre* i *Carex lasiocarpa* wykształcają się przy brzegach mineralnych lub przy wąskiej strefie zatorfienia. Odznaczają się dużym dynamizmem i są inicjalnymi zbiorowiskami opanowującymi lustro wody od brzegu. Stadium wcześniejsze stanowi zbiorowisko *Menyanthes trifoliata-Comarum palustre*, stadium późniejsze zbiorowisko *Carex lasiocarpa*, w którym duży udział mają torfowce.

5. *Caricetum limosae* i jego wariant z *Rhynchospora alba*, *Sphagnetum medii* et *rubelli* wraz z wariantem z *Rhynchospora alba* są zespołami występującymi na pomoście torfowcowym pływającym po wodzie, ale związanymi z brzegiem; *Vaccinio uliginosi-Pinetum* występuje natomiast poza pomostem. Zespoły te wykształcają się najczęściej w postaci współśrodkowych pasów. Pas wewnętrzny, tuż przy otwartym lustrze wody, najwilgotniejszy zajmuje *Caricetum limosae*; następny, mniej wilgotny — jego wariant z *Rhynchospora alba*; dalszy pas — *Sphagnetum medii* et *rubelli* i ostatni pas — *Vaccinio uliginosi-Pinetum*. Zbiorowiska te zajmują dużą powierzchnię na badanych sucharach oraz odgrywają decydującą rolę w zarastaniu tych zbiorników.

6. Skupienia *Glyceria fluitans-Heleocharis acicularis* i *Equisetum limosum* rozwijają się sporadycznie na płytkich zamulonych ławicach przybrzeżnych i przygotowują grunt dla innych zbiorowisk. Darnie zaś *Sphagnum cuspidatum* wytwarzają pływające płyty przed pomostem torfowcowym i są inicjalnymi stadiami rozrastającego się kożucha.

7. Kierunki zmian zbiorowisk roślinnych w strefie zarastania sucharów suwalskich przebiegają ogólnie od zbiorowisk wodnych, złożonych z roślin o liściach pływających, poprzez oczerety z *Phragmites communis*

lub zbiorowiska wysokotorfowiskowe występujące na pomoście torfowcowym do zbiorowisk łądowych leśnych.

8. Na podstawie udziału odrębnych zbiorowisk w procesach zarastania poszczególnych zbiorników można wyróżnić 3 grupy sucharów:

a. Suchary (Linowo, Widny, Mozguć i Wądołek), w których procesie zarastania biorą udział na ogół zbiorowiska związane z torfowiskami niskimi (*Myriophyllo-Nupharetum*, *Scirpo-Phragmitetum*, *Salici-Franguletum* i *Carici elongatae-Alnetum*). Zbiorniki te są w małym stopniu zarośnięte i można przypuszczać, że w miarę wzbogacania się wód w substancje odżywcze zmieniają się one w zbiorniki eutroficzne.

b. Suchary (Stanowisko, Wygorzele, II, Dembowskich, Rzepiskowy, I, VI i Wielki), w których procesie zarastania, oprócz zbiorowisk związanych z torfowiskami niskimi, biorą udział również zespoły wysokotorfowiskowe — budujące pływający pomost torfowcowy (*Caricetum limosae*, *Sphagnetum medii et rubelli* i *Vaccinio uliginosi-Pinetum*). Oczerety, zarośla łożowe i olsy reprezentowane są w tej grupie sucharów przez nieznaczne i niewielkie płyty, natomiast zespoły występujące na pomoście torfowcowym zajmują duże powierzchnie ciągnąc się wzdłuż brzegów jezior; należy przypuszczać, że brzegi tych sucharów zostaną opanowane przez zespoły pomostu torfowcowego.

c. Suchary (Zielone Ślepe, Wschodni, Zachodni, Tłusty, Drobný, III, IV, V i VII), w których procesie zarastania biorą udział tylko zespoły torfowisk wysokich występujące na pomoście torfowcowym (*Caricetum limosae*, *Sphagnetum medii et rubelli* i *Vaccinio uliginosi-Pinetum*).

9. Suchary suwalskie znajdują się w różnych stadiach zarastania. Rozmieszczenie roślinności w zbiornikach jest nierównomierne i zależy od wielu czynników.

Duża powierzchnia jeziora, krótka linia brzegowa, znaczna głębokość zbiornika, stromy stok niecki jeziornej, brzeg mineralny i otoczenie pól uprawnych wpływają hamując na proces zarastania, podczas gdy dobrze rozwinięta linia brzegowa, mała powierzchnia jeziora, łagodny stok niecki jeziornej, zatorfiony brzeg i otoczenie boru sosnowego są czynnikami sprzyjającymi temu procesowi.

10. Proces zarastania poszczególnych sucharów może odbywać się równocześnie w kilku miejscach zbiornika. Ośrodkami ekspansji roślinnej są obecnie: brzeg jeziora, pomost torfowcowy, wyspy pływające i dno zbiornika.

11. Rozwój pomostu torfowcowego przebiega: a) przez postępowe narastanie, czyli nasuwanie się pływającego „kożucha” na lustro wody, b) przez rozsuwanie, tj. rozpychanie pomostu torfowcowego i powolne przesuwanie jego wolnej krawędzi na zwierciadło wody.

12. Do najbardziej zarośniętych zbiorników można zaliczyć suchary Linowo, Suchar VI, Suchar VII o około 50% zarośniętej powierzchni; do

najslabiej zarośniętych — suchary Mozguć, Widny, Wądołek, Suchar II i Stanowisko o powierzchni zarośniętej poniżej 20%.

13. Flora roślin wyższych strefy zarastania sucharów suwalskich wynosi ogółem 201 gatunków, w tym 86 mszaków (15 torfowców, 48 mchów z rzędu *Bryales* i 23 wątrobowce) i 115 roślin naczyniowych.

WYKAZ GATUNKÓW

Załączona lista obejmuje stanowiska wszystkich gatunków mszaków i roślin naczyniowych znalezionych w strefie zarastania sucharów suwalskich.

MUSCI

- Sphagnum contortum* Schulz — Drobny, Tłusty, Dembowskich.
Sphagnum palustre L. — Suchar I, II, Mozguć, Widny, Wądołek, Wielki, Stanowisko, Dembowskich.
f. squarrosulum (Bryol. germ.) Russ. — Suchar II, Mozguć i Wielki.
Sphagnum centrale C. J. [= *Sph. palustre* var. *subbicolor* Hampe] — Suchar I.
Sphagnum papillosum Lindb. [= *Sph. palustre* var. *papillosum* Schimp.] — Zachodni, Tłusty, Drobny.
Sphagnum magellanicum Brid. [= *Sph. medium* Limpr.] — na wszystkich sucharach.
Sphagnum teres (Schimp) Ångstr. — Tłusty i Drobny.
Sphagnum squarrosum Pers. — Suchar I, Mozguć, Widny, Wądołek, Wielki, Rzepiskowy, Stanowisko.
Sphagnum fimbriatum Wils. — Wądołek.
Sphagnum robustum Röhl. [= *Sph. Russowii* Warnst.; *Sph. Girgensohnii* Russ. subsp. *robustum* (Röhl.) Szafran] — S. Dembowskich.
Sphagnum rubellum Wils. — Suchar I, III, IV, V, Wielki, Drobny i Tłusty.
Sphagnum fuscum Klinggr. [= *Sph. rubellum* subsp. *fuscum* (Klinggr.) Szafran] — Suchar II, III, IV, V, Wielki, Dembowskich.
Sphagnum nemoreum Scop. [= *Sph. acutifolium* Ehrh.] — Suchar I, III, IV, V, VII, Drobny, Tłusty, Wschodni, Zachodni i Wielki.
Sphagnum apiculatum Lindb. [= *Sph. recurvum* Pal. Beauv.] — na wszystkich sucharach.
Sphagnum cuspidatum Ehrh. — Suchar: II, III, IV, V, Wielki, Wygorzele Linowo.
Sphagnum obtusum Warnst. — Wielki, Dembowskich, Drobny, Tłusty, Wądołek.
Georgia pellucida Rab. — Suchar III, V, Dembowskich, Mozguć, Wielki.
Catharinea undulata (L.) Web. et Mohr. — Mozguć.
Polytrichum strictum Banks — na wszystkich sucharach.

- Polytrichum commune* L. — Suchar I, Dembowski, Wielki, Mozguć.
Fissidens adiantoides (L.) Hedw. — Suchar IV i VI.
Ceratodon purpureus (L.) Brid. — Wielki, Dembowski i Suchar II.
Dicranodontium denudatum (Brid.) Hag. — Suchar II i VI.
Dicranum flagellare Hedw. — Suchar: III, IV, V, VI, VII, Dembowski.
Dicranum montanum Hedw. — Suchar II, VI i Dembowski.
Dicranum scoparium (L.) Hedw. — na wszystkich sucharach.
Dicranum undulatum Ehrh. — na wszystkich sucharach.
Dicranum bonjeani De Not. — Wielki.
Leucobryum glaucum (L.) Schimp. — Suchar I, VI, Wielki, Wygorzele, Dembowski.
Funaria hygrometrica (L.) Sibth. — Zielone Ślepe, Wielki.
Pohlia nutans (Schreb.) Lindb. — Suchar: III, IV, V, Wygorzele i Dembowski.
Bryum ventricosum Dicks. — Stanowisko.
Bryum bimum Dicks. — Suchar II i IV.
Mnium punctatum (Schreb.) Hedw. — Wądołek.
Mnium cuspidatum (L., Schreb.) Leyss. — Mozguć.
Mnium undulatum Weis — Linowo, Mozguć i Widny.
Mnium affine Bland. — Linowo i Wielki.
Mnium seligeri Milde. — Linowo, Mozguć, Widny, Wielki, Rzepiskowy.
Mnium hornum L. — Suchar VI.
Aulacomnium palustre Schwägr. — Suchar: II, III, IV, V, Wschodni, Tłusty, Zielone Ślepe, Stanowisko, Dembowski.
Climacium dendroides (L.) Web. et Mohr — Suchar I, Linowo, Mozguć, Wielki, Wądołek i Stanowisko.
Thuidium delicatulum (L.) Mitt. — Mozguć.
Thuidium philibertii Limpr. — Widny i Mozguć.
Campylium stellatum (Hedw.) Lang. et C. J. — Mozguć.
Amblystegium serpens (L.) Br. eur. var. *juratzkanum* R. du Bysson (A. *juratzkanum* Schimp.) — Dembowski.
Drepanocladus revolvens (Sm.) Mnkm. f. *gracilescens*. — Linowo.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Mnkm. var. *polycarpa* Mnkm. — Suchar II.
Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. — Wielki.
Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. f. *submersa* Mnkm. — Dembowski.
Calliargon cuspidatum (Hedw.) Kindb. — Suchar: I, II, Linowo, Stanowisko, Wielki, Mozguć, Wądołek i Rzepiskowy.
Calliargon giganteum (Schimp.) Kindb. — Mozguć, Wielki, Rzepiskowy.
Calliargon cordifolium (Hedw.) Kindb. — Suchar II, IV i Dembowski.
Calliargon stramineum Kindb. — na wszystkich sucharach.
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. — Wielki, Tłusty, Stanowisko.
Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) Br. eur. — Wielki.

- Eurhynchium zetterstedtii* Stoerm. — Mozguć.
Entodon schreberi (Willd.) Mnk. — na wszystkich sucharach.
Plagiothecium laetum Br. eur. — Dembowskich.
Plagiothecium roeseanum (Hampe) Br. eur. — Wielki.
Dolichotheca seligeri (Brid.) Lske. — Wielki, Mozguć.
Ptilium crista castrensis (Hedw.) De Not. — Suchar: I, VI, VII, Wielki, Rzepiskowy, Dembowskich.
Hylacomium splendens (Hedw.) Br. eur. — na wszystkich sucharach.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. — Suchar I.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. — Linowo, Mozguć, Widny i Wielki.

H e p a t i c a e

- Marchantia polymorpha* L. — Wielki, Mozguć.
Preissia quadrata (Scop.) Nees. — Tłusty.
Riccia fluitans L. — Mozguć.
Riccardia pinquis (L.) S. F. Gray. — Suchar VI, Stanowisko.
Riccardia latifrons Lindb. — Dembowskich, Suchar VI.
Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe. — Suchar III i IV, Mozguć, Wielki.
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. — Suchar IV, VI, Dembowskich.
Lophocolea bidentata (L.) Dum. — Dembowskich, Zielone Ślepe.
Lophocolea heterophylla (Schrad) Dum. — Suchar: I, III, IV, Wądołek, Widny, Mozguć, Dembowskich, Wielki.
Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda — Mozguć, Wielki, Suchar III.
Lophozia marchica (Nees.) Steph. — Suchar V.
Mylia anomala (Hook.) Gray — Zielone Ślepe, Suchar IV, V.
Plagiochila asplenioides Dum. — Suchar VI, Dembowskich, Wądołek.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. — Suchar I, II, V, Dembowskich, Zielone Ślepe, Widny, Wądołek.
Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindb. — Suchar IV i V.
Cephalozia connivens (Dicks.) Spruce — Suchar II, III, IV, V, Wielki, Zielone Ślepe.
Cladopodiella fluitans (Nees.) Buch. — Suchar I, III, Zachodni i Drobny.
Odontoschisma denudatum (Mart.) Dum. — Suchar IV, V, Zielone Ślepe.
Lepidozia reptans (L.) Dum. — Suchar IV, VII, Wielki, Dembowskich, Zachodni, Zielone Ślepe.
Bazzania trilobata (L.) Lindb. — Suchar IV, Dembowskich, Zielone Ślepe.
Calypogeia mülleriána (Schiffn.) K. Müll. — Dembowskich.
Calypogeia neesiana (Mass. et Car.) K. Müll. — Zachodni i Dembowskich.
Calypogeia meylanii Buch. — Suchar IV i V.

Filicinae

- Athyrium filix-femina* (L.) Roth. — Suchar: Wielki, Widny i Mozguć.
Thelypteris palustris Schott (*Dryopteris thelypteris* (L.) A. Gray) —
Suchar: Wielki, Mozguć, Linowo, Widny i Wądołek.
Dryopteris spinulosa (Müll.) O. Kuntze — Suchar I, Wielki, Widny, Wą-
dołek, Rzepiskowy.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn — Suchar I.

Equisetinae

- Equisetum limosum* L. — Suchar: Stanowisko, Widny, Tłusty, Drobny.

Lycopodiinae

- Lycopodium annotinum* L. — Suchar I, II, VI, Wielki, Dembowskich.

Gymnospermae

- Picea excelsa* (Lam.) Lk. — na wszystkich sucharach.
Pinus silvestris L. — wszystkie suchary.

ANGIOSPERMAE

Dicotyledones

- Betula pubescens* Ehrh. — Suchar: I, V, VII, Wielki, Rzepiskowy, Moz-
guć, Widny, Wądołek.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. — Mozguć, Wielki, Rzepiskowy, Widny
i Wądołek.
Quercus robur L. — wszystkie suchary.
Salix pentandra L. — Linowo.
Salix alba L. — Linowo.
Salix cinerea L. — wszystkie suchary.
Urtica dioica L. — Wielki, Widny, Linowo, Mozguć, Stanowisko.
Polygonum amphibium L. — Linowo.
Viscaria vulgaris Röhl. — Tłusty, Drobny, Wschodni.
Ranunculus lingua L. — Wielki.
Ranunculus flammula L. — Linowo, Stanowisko, Mozguć, Widny, Rze-
piskowy, Wądołek i Wielki.
Ranunculus repens L. — Linowo, Widny, Mozguć, Stanowisko.
Ranunculus acer L. — Linowo, Widny, Mozguć, Stanowisko.
Thalictrum lucidum L. — Linowo.

- Nyphaea alba* L. — Suchar: VI, VII, Dembowskich, Zachodni, Wschodni, Rzepiskowy, Wielki, Zielone Ślepe, Wygorzele, Mozguć, Stanowisko, Linowo, Tłusty i Widny.
- Nuphar luteum* (L.) Sm. — Suchar: I, II, VI, VII, Dembowskich, Wschodni, Zachodni, Rzepiskowy, Wielki, Zielone Ślepe, Wygorzele, Stanowisko, Linowo, Tłusty, Widny.
- Cardamine pratensis* L. — Linowo, Wielki, Widny i Stanowisko.
- Drosera rotundifolia* L. — na wszystkich sucharach.
- Drosera anglica* Huds. — Suchar I, II, IV, Tłusty, Drobnny.
- Viola palustris* L. — Wielki, Tłusty, Drobnny.
- Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. — Stanowisko.
- Comarum palustre* L. — na brzegach wszystkich sucharów.
- Potentilla erecta* (L.) Hampe — Tłusty, Drobnny.
- Potentilla anserina* L. — Widny, Linowo, Mozguć i Stanowisko.
- Geum rivale* L. — Suchar I, Mozguć.
- Trifolium pratense* L. — Linowo, Mozguć, Widny.
- Lythrum salicaria* L. — wszystkie suchary.
- Epilobium palustre* L. — na wszystkich sucharach.
- Myriophyllum spicatum* L. — Stanowisko.
- Oxalis acetosella* L. — Wielki.
- Frangula alnus* Mill. — Linowo, Mozguć, Wielki, Widny, Wądołek, Stanowisko.
- Cicuta virosa* L. — Widny, Mozguć, Stanowisko.
- Peucedanum palustre* (L.) Moench — na wszystkich sucharach.
- Hottonia palustris* L. — Linowo.
- Lysimachia nummularia* L. — Linowo, Mozguć, Stanowisko i Widny.
- Lysimachia vulgaris* L. — na wszystkich sucharach.
- Lysimachia thyrsoflora* L. — na wszystkich sucharach.
- Trientalis europaea* L. — Suchar: I, VI, Rzepiskowy.
- Vaccinium myrtillus* L. — na wszystkich sucharach.
- Vaccinium uliginosum* L. — na wszystkich jeziorach.
- Vaccinium vitis-idaea* L. — na wszystkich sucharach.
- Oxycoccus quadripetalus* Gilib. — na wszystkich sucharach.
- Oxycoccus microcarpus* Turcz. — Suchar III, Drobnny i Tłusty.
- Ledum palustre* L. — na wszystkich sucharach.
- Andromeda polifolia* L. — na wszystkich sucharach.
- Calluna vulgaris* (L.) Salisb. — na wszystkich sucharach.
- Empetrum nigrum* L. — Suchar III i VI.
- Myosotis palustris* (L.) Nathorst — Linowo, Mozguć, Widny i Stanowisko.
- Solanum dulcamara* L. — Suchar I, Wielki, Stanowisko i Mozguć.
- Alectorolophus glaber* (Lam.) Beck — Linowo.
- Utricularia vulgaris* L. — Suchar: III, VII, Dembowskich, Wschodni, Tłusty, Mozguć, Widny.
- Scutellaria galericulata* L. — Linowo.

- Prunella vulgaris* L. — Linowo, Stanowisko.
Lycopus europaeus L. — na brzegach wszystkich sucharów.
Mentha aquatica L. — Linowo, Stanowisko, Mozguć, Widny, Wądołek.
Plantago maior L. — Linowo, Mozguć, Stanowisko, Widny.
Plantago lanceolata L. — Linowo, Mozguć, Widny, Stanowisko.
Menyanthes trifoliata L. — na wszystkich sucharach.
Galium uliginosum L. — na brzegach wszystkich jezior.
Bidens cornuus L. — Widny, Mozguć, Stanowisko i Linowo.

MONOCOTYLEDONES

- Alisma plantago-aquatica* L. — Mozguć.
Hydrocharis morsus-ranae L. — Linowo.
Elodea canadensis Rich. — Stanowisko, Linowo, Mozguć, Tłusty i Widny.
Scheuchzeria palustris L. — Suchar: I, III, IV, V, VII, Wielki, Dembowskich.
Potamogeton natans L. — Suchar: VI, VII, Dembowskich, Tłusty, Stanowisko i Linowo.
Potamogeton perfoliatus L. — Tłusty i Stanowisko.
Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch — Tłusty.
Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schm. — Wielki.
Juncus effusus L. — Suchar II i Wielki.
Juncus conglomeratus L. — Suchar II, VI, Mozguć, Wygorzele, Wielki, Tłusty, Drobny, Zielone Ślepe, Wądołek, Linowo, Stanowisko.
Juncus articulatus L. — Linowo.
Eriophorum vaginatum L. — na wszystkich sucharach.
Eriophorum angustifolium Honck. — na wszystkich sucharach.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla — Wielki.
Heleocharis acicularis (L.) R. et Sch. — Linowo.
Heleocharis palustris (L.) R. et Sch. — Linowo.
Rhynchospora alba (L.) Vahl. — na wszystkich sucharach.
Carex canescens L. — na wszystkich sucharach.
Carex stellulata Good. — na wszystkich sucharach.
Carex Hudsonii Bennet — na wszystkich jeziorach.
Carex gracilis Curt. — Wygorzele.
Carex fusca Bell. et All. — na wszystkich sucharach.
Carex panicea L. — Stanowisko, Tłusty.
Carex limosa L. — na wszystkich sucharach.
Carex pseudocyperus L. — Mozguć.
Carex flava L. — Stanowisko i Mozguć.
Carex rostrata Stokes — Linowo.
Carex vesicaria L. — Linowo.
Carex lasiocarpa Ehrh. — na wszystkich sucharach.

Carex hirta L. — Mozguć.

Phleum pratense L. — Stanowisko.

Agrostis canina L. — Linowo, Mozguć, Stanowisko, Widny, Rzepiskowy, Wądołek.

Deschampsia caespitosa (L.) P. B. — Suchar II i Wądołek.

Phragmites communis Trin. — Wielki, Mozguć, Widny, Stanowisko, Linowo.

Molinia coerulea (L.) Moench. — Suchar: I, II, III, VII, Rzepiskowy, Wygorzele, Stanowisko, Dembowski i Rzepiskowy

Poa palustris L. — Wielki i Widny.

Glyceria fluitans (L.) R. Br. — Linowo.

Acorus calamus L. — Suchar I, Mozguć, Stanowisko.

Calla palustris L. — na brzegach wszystkich sucharów.

Sparganium simplex Huds. — Linowo.

Typha latifolia L. — Suchar VI, Wielki, Mozguć, Widny i Stanowisko.

Typha angustifolia L. — Wielki, Widny, Stanowisko.

Zakład Systematyki i Geografii Roślin
Uniwersytetu Warszawskiego

SUMMARY

In the Suwalki lakeland, in the basin comprising the lakes Wigry and Krzywe Wigierskie, there are 21 small dystrophic water bodies called „suchars”. These small lakes have neither inflow nor outflow, their surface area and depth vary from 0.17 to 8.97 ha and 1.6 to 16.0 m, respectively. The water is hardly transparent with a high humus and carbon dioxide content and high acidity; the content of calcium, phosphates and nitrates is low (table 1). These water bodies are situated in a hilly terrain of morainal origin, four of them are surrounded by cultivated fields and the remaining ones by pine forest comprising a high percentage of spruce.

The aim of the present study was: 1) to analyze the process of overgrowing the water bodies, 2) to identify the plant communities involved and establish their structure, ecology and succession.

The vegetation in the zone of overgrowth was investigated by the method of belt and linear transection. In each water body three to four belt transections were made reaching from the water table to the mineral soil. The direction of the transection was determined by means of a compass and its boundary by a measuring tape attached at four points. The transection was 1.5 m wide and the length depended on the dimensions of the zone of overgrowth. The transection was divided into 1.5-m squares and a sketch of the vegetation was drawn (fig. 1) on millimeter paper. Moreover the thickness of the floating *Sphagnum* „mat” and the depth of the water at its edge were measured.

The 227 phytosociological records taken according to Braun-Blanquet are presented in 15 tables. Analysis of these pictures allowed to distinguish eight plant associations and five communities (see table 19). They may be classified into

three groups with distinctly different floristic composition, succession and ecological conditions.

1. *Myriophyllo-Nupharetum*, *Scirpo-Phragmitetum*, *Caricetum inflato-vesicariae*, *Salici-Franguletum*, *Carici elongatae-Alnetum*. These communities develop in eutrophic waters; in the dystrophic suchars they develop only fragmentarily forming small patches. They are characterized by a small number of species and a poor phytosociological differentiation. They play no major role in the processes of overgrowth of water bodies.

2. Communities specific of dystrophic lakes. They are well developed and dominate in the processes of overgrowth. These communities are distributed in the form of concentric zones surrounding the lake. The first most humid zone at the water's edge is occupied by *Caricetum limosae*; the second somewhat less humid is a variant of the former with *Rhynchospora alba*; the third zone consists of *Sphagnetum medii et rubelli*. The above named communities form a kind of floating sphagnum mat attached to the bank. Beyond this mat, on mineral partly peat soils, the association *Vaccinio uliginosi-Pinetum* occurs.

3. The communities *Menyanthes trifoliata*—*Comarum palustre* and *Carex lasiocarpa*. They form a transition between communities of more fertile habitats on the one side and those building the *Sphagnum* mat on the other. They generally develop near mineral soil banks or along a narrow zone of peat. They are characterized by a strong dynamism and constitute the initial stages of invasion of the water sheet from the bank.

The lines of development of the vegetation in the zone of overgrowth of these lakes occur generally in succession from aquatic and sodden soil communities through less humid communities to land and forest ones.

According to the different plant communities the dystrophic water bodies may be classified into three groups (table 2):

I. Water bodies subject to overgrowing by the associations: *Myriophyllo-Nupharetum*, *Scirpo-Phragmitetum*, *Salici-Franguletum*, *Carici elongatae-Alnetum*. These small lakes are overgrown only in a low extent.

II. Water bodies in which, besides the above mentioned communities also the associations building the *Sphagnum* mat contribute to the overgrowth: *Caricetum limosae*, *Sphagnetum medii et rubelli* and *Vaccinio uliginosi-Pinetum*.

III. Water bodies overgrown exclusively by associations forming the *Sphagnum* mat; *Caricetum limosae*, *Sphagnetum medii et rubelli*, *Vaccinio uliginosi-Pinetum*.

The Suwalki suchars exhibit various stages of overgrowth. The distribution of the vegetation in them is irregular and depends on various factors. A large surface area of the lake, a short coast line, a considerable deepness, a steep slope of the lake basin, a mineral bank, surrounding crop fields exert an inhibitory effect on the processes of overgrowth. On the contrary, a well developed border line, a small surface, a mild slope of the lake basin, and a peaty bank are factors favourable to this process. The overgrowth of lakes occurs simultaneously from the littoral, from the bottom and from the floating tufts of *Sphagnum* detached from the mat. The most active process is the overgrowth from the littoral to which the *Sphagnum* mat contributes.

Department of Plant Systematics and Plant Geography,
The University, Warsaw

- Braun-Blanquet J., 1951, Pflanzensoziologie, Wien.
- Czubiński Z., 1948, Stosunki florystyczne południowo-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego, Pozn. Tow. Przyj. Nauk Kom. Biol., 11:297—361, Poznań.
- Czubiński Z., 1950, Z zagadnień geobotanicznych Pomorza, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 2(4):439—658, Poznań.
- Czubiński Z., Switalska H., 1937, Torfowiska mszarne Wielkopolski, Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr., 7:38—56, Poznań.
- Dąbwska I., 1961, Roślinne zbiorowiska jeziorne okolic Sierakowa i Międzycho-
du, Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Prace Kom. Biolog. 23(4):1—114, Poznań.
- Denisiuk Z., 1963, Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej,
Pozn. Tow. Przyj. Nauk Kom. Biolog. 27(2):1—129, Poznań.
- Dixon H. N., 1954, The student's Handbook of British Mosses, 1—582, London.
- Fijałkowski D., 1960, Szata roślinna jezior Łęczyńsko-Włodawskich i przy-
legających do nich torfowisk, Ann. UMCS, Sect. B, 14:131—206, Lublin.
- Hryniewiecki B., 1922, O zasięgu *Cladium mariscus* R. Br. na ziemiach pol-
skich i w krajach ościennych, Kosmos, 47, Lwów.
- Hryniewiecki B., 1923, Roślinność okolic jeziora Wigierskiego, Ochr. Przyr.
4:21—26, Kraków.
- Hryniewiecki B., Lityński A., 1923, Plan utworzenia rezerwatu na jezio-
rze Wigierskim, Och. Przyr. 4:18—21, Kraków.
- Jasnowski M., 1962, Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego,
Szczec. Tow. Nauk. Wyd. Nauk Przyr.-Roln., 10, Szczecin.
- Kępczyński K., 1960, Zespoły roślinne Jezior Skępskich i otaczających je łąk,
Studia Soc. Sc. Torun., 6:1—244, Toruń.
- Kleistówna K., 1929, Badania nad zespołami roślinności torfowisk obszaru
wyspowego prawego brzegu Wisły pod Warszawą, Rozpr. Wyd. Mat. Przyr.
P.A.U., 69(5): 1—46, Warszawa.
- Knapp R., 1948, 1949, Einführung im Pflanzensoziologie, 1, 2, 3, Stuttgart.
- Kobendza R., 1930, Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej, Planta
Polonica 2, Warszawa.
- Kobendza R., 1948, Kilka zespołów bagiennych w Dojlidach Dolnych pod Bia-
łymstokiem, Acta Soc. Bot. Pol., 19(1):1—24, Warszawa.
- Krotoska T., 1953, Zespoły leśne Parku Natury w Promnie pod Poznaniem,
Pozn. Tow. Przyj. Nauk Kom. Biolog., 14(3):1—51, Poznań.
- Kulczyński St., 1939—1940, Torfowiska Polesia 1, 2, Kraków.
- Kulwiec K., 1902, Notatki z wycieczki do Wigier, Wszechświat, 21:321, 344, 362.
- Lepniewa S. G., 1950, Żyzń w ozierach, Żyzń priesnych wod, 3, Moskwa, Le-
ningrad.
- Libbert W., 1932—1933, Die Vegetationseinheiten der neumärkischen Staubecken-
landschaft unter Berücksichtigung der angrenzenden Landschaften, Verh.
d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, 1(2):10—93; 299—348, Berlin-Dahlem.
- Libbert W., 1940, Die Pflanzengesellschaften der Halbinsel Darss, Feddes, Rep.
Spec. Nov. Reg. Veg., 114:1—95, Berlin-Dahlem.
- Matuszkiewicz W., 1952, Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego,
Ann. UMCS, Sect. C, 6:1—218, Lublin.
- Matuszkiewicz W., Traczyk H., Traczyk T., 1958, Materiały do fito-
socjologicznej systematyki zespołów olsowych w Polsce, Acta Soc. Bot. Pol.,
27(1):21—44, Warszawa.
- Matuszkiewicz W., 1962, Zur Systematik der Kiefernwälder des mittel- und
osteuropäischen Flachlandes., Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 9, 145—186,
Stolzenau/Weser.

- Mönkemeyer W., 1927, *Die Laubmoose Europas*, 1—960, Leipzig.
- Nowiński M., 1930, Roślinność i znaczenie dla rolnictwa torfowisk niskich z okolic ujścia Wisłoka do Sanu, w południowo-wschodniej części dawnej puszczy Sandomierskiej, *Prace Rol. Leśne* 3:1—89, Kraków.
- Oberdorfer E., 1957, *Süddeutsche Pflanzengesellschaften*, *Pflanzensoziologie*, 10, Jena.
- Ołtuszewski W., 1937, *Historia lasów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w świetle analizy pyłkowej*, *Pozn. Tow. Przyj. Nauk Seria B* 8(4):1—65, Poznań.
- Pachucki Cz., 1952, O przebiegu moren czołowych ostatniego zlodowacenia północno-wschodniej Polski i terenów sąsiednich. Z badań czwartorzędowych w Polsce, 1:599—625, Warszawa.
- Passarge H., 1955, *Die Pflanzengesellschaften der Wiesenlandschaft des Lüb-benauer Spreewaldes*, *Feddes Rep. Spec. Nov. Reg. Veg.* 135:194—231, Berlin.
- Pietkiewicz St., 1928, Pojezierze Suwalszczyzny Zachodniej, *Przegląd Geogr.* 8, 12:168—222, Warszawa.
- Podbielkowski Z., 1960, Zarastanie dolów potorfowych, *Monogr. Bot. P.A.U.*, 69(5):1—46, Warszawa.
- Polakowski B., 1963, Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego, *Zesz. Nauk. WSR* 15(1):1—167, Olsztyn.
- Polakowski B., Młynek T., 1962, Zespoły roślinne rezerwatu torfowiskowego „Gązwa”, *Zesz. Nauk. WSR* 14(3):317—329, Olsztyn.
- Rejment-Grochowska Ir., Mickiewicz J., 1962, Materiały do flory mszaków Suwalszczyzny, *Fragm. Flor. et Geobot.* 8(1):3—22, Kraków.
- Rejment-Grochowska Ir., Mickiewicz J., Sobotka D., 1963, Materiały do flory mszaków Suwalszczyzny, cz. II, *Fragm. Flor. et Geobot.* 9(2):257—274, Kraków.
- Ryppowa H., 1927, Glony jeziorzek torfowcowych tzw. sucharów w okolicach Wigier, *Arch. Hydrob. i Ryb.* 2, 1/2:41—64, Suwałki.
- Schwickerath M., 1944, *Das Hohe Venn und seine Randgebiete*, *Pflanzensoziologie*, 6, Jena.
- Siniżynówna Z., 1936, Zespoły roślinne torfowisk pod Nieświeżem, *Prace Tow. Przyj. Nauk w Wilnie* 10:1—60, Wilno.
- Stangenberg M., 1936, Szkic limnologiczny na tle stosunków hydrochemicznych Pojezierza Suwalskiego, *Inst. Bad. Leś. Rozpr. i Spraw. A*, 19:7—85, Warszawa.
- Stangenberg M., 1937, Charakterystyka limnologiczna jezior grupy Kleszczowieckiej i Hańczańskiej na Pojezierzu Suwalszczyzny, *Inst. Bad. Leśn. Rozpr. i Spraw. A*, 23:5—17, Warszawa.
- Stangenberg M., 1937, Materiały do znajomości przebiegu cyrkulacji wiosennej w jeziorach Suwalszczyzny, *Inst. Bad. Leśn. Rozpr. i Spraw. A*, 24:5—14, Warszawa.
- Stangenberg M., 1937, Fosforany, azotany, siarczany i chlorki jezior Wigierskich w czasie cyrkulacji jesiennej, *Inst. Bad. Leśn. Rozpr. i Spraw. A*, 25:5—19, Warszawa.
- Staszkievicz J., 1957, Zespoły sosnowe Borów Nowotarskich, *Fragm. Flor. et Geob.* 3(2):105—129, Kraków.
- Steffen H., 1931, *Vegetationskunde von Ostpreussen*, 1—385, Jena.
- Szafer W. (red.) 1959, *Szata roślinna Polski*, 1, 2, Warszawa.
- Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1953, *Rośliny Polskie*, Warszawa.
- Szafran B., 1957, 1961, *Flora Polska*, Mchy, 1, 2, Warszawa.
- Tüxen R., 1937, *Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands*, *Mitt. d. flor.-soziol. Arbeitsgem. in Niedersachs.*, 3, Hannover.

- Tüxen R., 1955, Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften, Mitt. d. flor. soc. Arbeitsgem., N. F. 5.
- Tüxen R., 1958, Pflanzengesellschaften oligotropher Heidettümpel Nordwestdeutschlands, Veröff. d. Geobot. Inst. Rübel 33:207—231, Zürich.
- Warsntorf C., 1958, Sphagnologia Universalis, Sphagnales-Sphagnaceae, Das Pflanzenreich 51, Weinheim/Bergstr.
- Wiśniewski T., Rejment Ir., 1935, Das montane Element in Lebermoosflora des Seengebietes von Suwałki, Bull. de l'Ac. Pol. d. Sc. et d. Lettr. ser. B:11—31, Kraków.
- Wiszniewski J., 1953, 1954, Uwagi w sprawie typologii jezior polskich. Pol. Arch. Hydrob. 1.
- Wojterski T., 1963, Bory bagienne na Pobrzeżu Zachodniokaszubskim, Bad. Fizjogr. n. Pol. Zach. Pozn.Tow. Przyj. Nauk Kom. Fizjogr. 12:139—191, Poznań.
- Wołosowicz S., 1926, Morena denna tzw. „transgresji wigierskiej” i jej znaczenie w budowie dyluwium Pojezierza Suwalskiego, Spraw. FIG 3(3—4):434—465, Warszawa.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	175
METODY PRACY	176
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SUCHARÓW	177
Położenie... Geneza... Morfologia... Właściwości fizyczno-chemiczne... Charakterystyka florystyczna...	
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZBADANYCH SUCHARÓW	184
Suchary z udziałem roślinności torfowisk niskich	184
Suchary z udziałem roślinności torfowisk niskich, przejściowych i wysokich	189
Suchary z udziałem roślinności torfowisk przejściowych i wysokich	195
ZBIOROWISKA ROŚLINNE SUCHARÓW SUWALSKICH	199
<i>Myriophyllo-Nupharetum</i>	200
<i>Scirpo-Phragmitetum</i>	202
<i>Caricetum inflato-vesicariae</i>	204
<i>Salici-Franguletum</i>	205
<i>Carici elongatae-Alnetum</i>	206
Zbiorowiska <i>Menyanthes trifoliata-Comarum palustre</i>	207
Zbiorowisko <i>Carex lasiocarpa</i>	209
<i>Caricetum limosae</i>	211
<i>Sphagnetum medii et rubelli</i>	214
<i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i>	218
Skupienia <i>Glyceria fluitans-Heleocharis acicularis</i>	219
Skupienia <i>Equisetum limosum</i>	220
Skupienia <i>Sphagnum cuspidatum</i>	220
Różnice i podobieństwa zbiorowisk roślinnych sucharów suwalskich	222
KIERUNKI SUKCESJI	226
Suchary z udziałem roślinności torfowisk niskich	227
Suchary z udziałem roślinności torfowisk niskich, przejściowych i wysokich	227
Suchary z udziałem roślinności torfowisk przejściowych i wysokich	228
PROCES ZARASTANIA	230
Zarastanie powierzchniowe... Zarastanie od dna...	236
STRATYGRAFIA	237
ZESTAWIENIE WYNIKÓW	246
WYKAZ GATUNKÓW	248
SUMMARY	254
LITERATURA	256

Tabela 1 Table 1

Dane fizyczno-chemiczne
Physico-chemical data

Nr No	Nazwa suchara Name of lake	Rozwój linii brzogo- wej Develop- ment of shore line	Przezro- czystość Transpar- ency m	pH VII 1934	pH 1963	t°	O ₂ %	CO ₂ mg/l	Twar- dość wzgl. CaO mg/l	PO ₄ mg/l	N/NO ₃ / mg/l	SO ₄ mg/l	Cl mg/l
1	Suchar I	1,27	3,0	6,2	6,5	22,0	80,6	4,0	6,0	0	0,01	2,1	0
2	Suchar II	1,07	4,1	5,7	6,8	5,9	15,1	11,0	6,8	0	0,01	4,0	0
3	Suchar III	1,21	1,1	4,7	5,0	7,5	0,0	38,0	5,5	0	0,03	5,5	1,0
4	Suchar IV	1,28	2,2	5,7	6,0	10,5	7,9	13,0	5,5	0,015	0,02	1,9	1,0
5	Suchar V	1,66	2,2	5,7	5,9	11,4	3,6	24,0	8,2				
6	Suchar VI	1,14	3,0	5,6	6,8	19,0	9,4		6,8	0,03	0,08	5,4	0
7	Suchar VII	1,14	2,2	5,6	6	22,1	74,1	6,2	5,5	0	0,045	1,1	0
8	Wądołek	1,09	2,5	6,3	6,5	4,5	0,0	28,7	13,7				
9	Dembowakich	1,19	3,2	5,7	6,2	15,2	2,5	2,5	6,8	0	0,015	6,0	0
10	Zachodni	1,25	1,8	5,7	6,3	18,4	100,7	2,5	4,1	0	0,01	7,5	0
11	Wschodni	1,20	1,8	5,7	6,3	20,5	96,7	1,0	2,7	0	0,03	10,2	0
12	Suchar Wielki	2,11	3,9	5,8	6	8,9	6,8	18,5	8,6	0	0,01	2,9	1,0
13	Suchar Rzepiskowy	1,06	2,6	6,2	6	23,3	103,7	1,0	5,4	0	0,04	7,5	0
14	Zielone Ślepe	1,11	1,8	5,7	5,7	9,7	9,5	15,5	8,2	0,006	0,04		0
15	Stanowiako	1,12	2,3	6,4	6,9	17,5	15,3	9,5	24,6	0,002	0,04	10,2	1,5
16	Wygórzele	1,23	2,0	6,0	6,2	21,4	123,4	1,0	8,2	0	0,04	2,0	1,0
17	Mozguć	1,16	1,2	5,8	6,5	17,7	42,9	8,5	6,8	0	0,035	2,0	
18	Lincwo	1,33	do dna	6,6	6,8	22,5	100,2	3,0	16,4				
19	Drobry	1,15	2,5	6,5	6	16,0	2,0	16,5	21,9				
20	Thusty	1,12		6,4	6	22,7	96,1	3,0	19,2				
21	Widny	1,04	2,7	6,4	6,3	19,2	78,7	4,0	21,9				

t° C, O₂ %, CO₂ mg/l, Ca O mg/l - w warstwie przydennej z okresu letniego 1934 r./Stangenberg 1936/
- in the bottom layer in the summer period of 1934PO₄, N/NO₃/, SO₄, Cl - w wodzie powierzchniowej z dn. 20 i 21.XI. 1936 r. /Stangenberg 1937/
- in the surface water on Nov. 20 and 21, 1936.

Tabela - 2 - Table 2 <

Występowanie zespołów i zbiorowisk roślinnych w poszczególnych sucharach
Occurrence of plant associations and communities in the particular lakes

Nr kolejny Successive number	Nr stanowiąca No of lake	Nazwa sucharu Name of lake	Część zarosnięta Part of overgrowth	Powierzchnia jeziora Surface of lake	Głębokość maks. Depth max	1 Myriophyllo-Nupharetum	2 Scirpo-Phragmitetum	3 Caricetum inflato-vesicariae	4 Saliceto-Pranguletum	5 Carici elongatae-Alnetum	6 Mertensianthes trifoliata - Comarum palustre	7 Carex lasiocarpa	8 Caricetum limosae typicum	9 Caricetum limosae w. z Rynchospora alba	10 Sphagnetum medii et rubelli w. z Rynchospora alba	11 Sphagnetum medii et rubelli typicum	12 Vaccinio uliginosi-Pinetum	13 Glyceria fluitans - -Haleocharis palustris	14 Equisetum limosum	15 Sphagnum cuspidatum	Grupy sucharów Groups of lakes
1	18	Linowo	42	1,49	1,6	X		X	X			X									
2	21	Widny	19	2,20	4,2	X	X		X	X	X							X			
3	17	Mozgud	10	4,83	5,2	X	X		X	X	X	X		X				X			I
4	8	Wądołek	12	1,00	16,0				X	X	X	X	X								
5	15	Stanowisko	15	1,85	5,7	X	X		X		X	X				X		X			
6	16	Wygorzele	21	2,06	4,0	X					X	X				X					
7	2	Suchar II	14	2,7	11,0	X					X	X	X	X		X	X				
8	9	Suchar Dembowski	20	3,59	8,5	X					X	X	X	X		X	X				
9	13	Rzepiskowy	15	1,09	6,0	X				X		X		X		X	X				II
10	1	Suchar I	33	1,04	4,5	X				X	X	X	X			X	X				
11	6	Suchar VI	46	0,32	3,0	X	X				X	X	X	X		X	X				
12	12	Suchar Wielki	20	8,97	9,6	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			X	
13	14	Zielone Ślepe	23	0,47	5,5	X							X	X		X					
14	11	Wschodni	25	1,14	4,2	X							X	X	X	X	X				
15	10	Zachodni	25	1,25	3	X							X	X	X	X	X				
16	7	Suchar VII	55	0,17	3	X							X	X	X	X	X				
17	20	Thusty	29	0,72	5	X							X	X	X	X					
18	19	Drobny	31	0,51	6,4								X	X	X	X					
19	5	Suchar V	35	0,49	6								X	X	X	X	X				
20	3	Suchar III	29	0,38	5,0								X	X	X	X	X				
21	4	Suchar IV	24	1,16	7,0							X	X	X	X	X	X			X	

Tabela- 3 - Table 3

Myriophyllo - Nupharotum W. Koch 1926

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Nazwa sucharu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	I S	I SW	II S	Zach. S	Rzep. N	Z.Śl. W	W-ki SE	W-ki E	W-ki W	Wyg. E	Wsch. S	Wsch. W	Wsch. S	VI NW	VI N	VI E	VII E	Demb. E	Demb. W	Thust. S	Stan. S	Ldn. E		
Data Date	6.7.63		7.7.63	11.7.61	15.7.61	10.7.63	12.7.61	13.7.61	12.7.61	10.7.63	14.7.61	10.7.63	21.7.61		9.7.63			10.7.61		12.7.63	10.7.63	12.7.63		
Powierzchnia zdjęcia m ² Surface of record m ²	25	4	6	10	10	10	25	20	25	25	10	10	10	25	10	10	15	25	25	25	25	25		
Szerokość pasa zarastania m Width of the overgrowing belt m	15	2	1,5	2	2	2	10	4	5	10	1,5	5	3		3	2		5	6	5	8	10		
Pokrycie % Cover %	50	60	50	80	70	60	70	60	80	80	50	90	60	80	80	90	50	80	70	70	60	70		
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	1	1	1	2	2	2	2	3	6	4	3	6	7	1	4	3	4	4	4	8	8	8		
Gatunki charakterystyczne zespołu /Species characteristic of association/ Nuphar luteum Nymphaea alba	3	3	2	3 1	+ 3	2 +	3 2	2 2	2 1	3 2	1 2	2-3	+		+	1-2 3	2 2	1 3	1 2	3 +	+	3 1	V V	1673 1602
Gatunki charakterystyczne związku /Species characteristic of the alliance/ Nymphaeion Utricularia vulgaris																	+		+	+			II	3
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Potamogetalia i klasy /and of the class/ Potamogeton Potamogeton natans Elodea canadensis Chara sp.														4	1	1	+	2	4	2 +	1 1 1-2	2 +	III II I	875 25 51
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/ Equisetum limosum Phragmites communis Menyanthes trifoliata Typha angustifolia								1	1	+		1-2 +	2 2		+		+			1	1	+	II I I I	70 102 51 24

Gatunki sporadyczne;
/Sporadic species/

charakterystyczne związku /characteristic of the alliance/ Nymphaeion: Hydrocharis morsus - ranae 22; Polygonum amphibium f. natans 22;
 charakterystyczne rzędu i klasy /characteristic of the order and of the class/ Potamogeton: Myriophyllum spicatum 21; Potamogeton perfoliatus 20,21; Potamogeton
 towarzyszące /accompanying/: Comarum palustre 8; Juncus conglomeratus 9; Lysimachia vulgaris 9; Sphagnum cuspidatum 10;

Scirpo - Phragmitetum W. Koch 1926

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	5	6	7	Stażość Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
Nazwa sucharu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	Widn. S	Stan. S	VI T	Mozg. S	Mozg. N	W-ki T	W-ki T		
Data Date	12.7.63	18.7.62	9.7.63	8.7.63		12.7.61	13.7.61		
Powierzchnia zdjęcia m2 Surface of record m2	6	4	6	6	4	4	8		
Szerokość pasa zarastania m2 Width of the overgrowing belt m2	3	2	3	3	2	3	4		
Pokrycie % Cover %	70	80	100	80	70	80	90		
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	11	8	11	8	10	8	13		
Gatunki charakterystyczne zespołu /Species characteristic of association/									
<i>Typha latifolia</i>		2	1	1	1		4	IV	466
<i>Schoenoplectus lacustris</i>							1	I	71
Gatunki charakterystyczne związku /Species characteristic of the alliance/ Phragmition									
<i>Phragmites communis</i>	2-3	1	1	2	1-2	3	2	V	1741
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Phragmitetalia i klasy /and of the class/ Phragmitetea									
<i>Carex rostrata</i>	+	+1	+	+		+	+	IV	44
<i>Peucedanum palustre</i>				+	+1	+	+	III	43
<i>Calliergon giganteum</i>				+			+	II	3
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Scheuchzerio-Caricetea fuscae									
<i>Cocculus palustre</i>			1-2		+	+	2	III	410
<i>Mentha trifoliata</i>			2		1		+	III	323
<i>Calla palustris</i>			1-2			+	1	III	231
<i>Epilobium palustre</i>	+		+					II	3
<i>Calliergon stramineum</i>			+		+			II	3
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/									
<i>Salix cinerea</i> b		1	+					III	74
<i>Nymphaea alba</i>		+			1		+	III	74
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+			+		+	+	III	6
<i>Juncus conglomeratus</i>					+1		+	II	40
<i>Utricularia vulgaris</i>	+	+						II	3
<i>Sphagnum palustre</i>		+1			+	2	2	III	540
<i>Calliergon cuspidatum</i>	+			+1	+	1		III	111
<i>Sphagnum apiculatum</i>		1-2					1	II	131

Gatunki spora/yczne
/Sporadic species/:

charakterystyczne związku /characteristic of the alliance/ Phragmition, rzędu /of the order/ Phragmitetalia i klasy /and of the class/ Phragmitetea; *Acorus calamus* 4; *Equisetum limosum* 3; *Lysimachia thyrsiflora* 3; *Typha angustifolia* 2; towarzyszące /accompanying/; *Chara* sp. 3; *Elodea canadensis* 3; *Lythrum salicaria* 3; *Sphagnum obtusum* 6; *Sph. squarrosum* 2;

Tabela - 5 - table 5

Caricetum inflato-vesicariae W. Koch 1926

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	Statość bezwzględna
Nazwa sucharu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	Lin. N	Lin. NW	Lin. NW	Lin. NE	
Data Date	16. 7. 62		12. 7. 63		
Powierzchnia zdjęcia m ² Surface of record m ²	25	25	25	20	
Pokrycie % Cover %	90	85	100	95	
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	18	16	23	16	
Gatunki charakterystyczne zespołu /Species characteristic of association					
Carex rostrata	3-4	3	4	3	
Carex vesicaria	1	1		1-2	
Lysimachia thyrsiflora	+	+	+		
Gatunki charakterystyczne związku /Species characteristic of the alliance/ Magnocaricion					
Peucedanum palustre	+1	+	+	+	
Galium palustre	+		+		
Gatunek wyróżniający związek /Species differential of the alliance/					
Lysimachia vulgaris	+	+	+	+	
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Phragmitetalia I klasy /and of the class/ Phragmitetea					
Equisetum limosum		+	+	+1	
Phragmites communis	1			2	
Heleocharis palustris		+	+		
Glyceria fluitans	+		r		
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Scheuchzerio-Caricetea fuscae					
Comarum palustre	+	+	1	+	
Menyanthes trifoliata		1		+	
Drepanocladus revolvens	1	1	+1	2	
Sphagnum cuspidatum	1	+		+	
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/					
Salix cinerea b	+1		+	+	
Thelypteris palustris	+		+	+	
Juncus conglomeratus	+	+			
Myosotis palustris		+	+		
Calliergon cuspidatum	1	2	2	1	

Gatunki sporadyczne: charakterystyczne związku /characteristic of the alliance/
/Sporadic species/ Magnocaricion: Carex gracilis 2; Scutellaria galericulata 1;
characterystyczne klasy /characteristic of the class/
Scheuchzerio-Caricetea fuscae: Agrostis canina 3; Carex lasiocarpa 4; Epilobium palustre 3; Juncus articulatus 3; Ranunculus flammula 3;
towarzyszące /accompanying/: Alectorolophus glaber 3; Cardamine pratensis 2; Hottonia palustris 4; Lythrum salicaria 3; Mentha aquatica 1; Molinia coerules 1; Potentilla anserina 3; Solanum dulcamara 3; Thalictrum lucidum 3; Urtica seligeri 4;

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	5	6	7	8	Stalosc Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
Nazwa stawu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	I W	W-ki SE	W-ki W	Reep. S	Widn. NW	Wąd. N	Mozy. NW	Mozy. W		
Data Date	19.7. 60	11.7. 63	13.7. 61	15.7. 61	21.7. 61	25.7. 61	8.7.63			
Powierzchnia zdjęcia m2 Surface of record m2	25	25	30	25	50	25	50	50		
Pokrycie warstwy mchy i runa % Cover of moss and herb layer %	50	60	80	80	80	70	60	80		
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	31	30	33	17	19	22	30	23		
Gatunki charakterystyczne dla zespołu i rzędu /Species characteristic of association and of the order/										
Alnetalia glutinosae										
<i>Solix cinerea</i> b	1	+	+	+1	1	1	+	+	V	226
<i>Solanum dulcamara</i>		+	+		+1	+	+1	+	IV	73
<i>Thelypteris palustris</i>	+		+	1	+	+	+		IV	66
<i>Isoetes europaeus</i>		+			+	+1	+		III	38
<i>Ribes nigrum</i>					+	+	1		II	65
<i>Sphagnum squarrosum</i>	1-2	1		+	2	1	1	1-2	V	609
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/										
Phragmitetalia										
<i>Carex rostrata</i>	+	+					2		II	221
<i>Scutellaria galericulata</i>	+			+			+		II	4
<i>Peucedanum palustre</i>	+				+		+		II	4
<i>Cycuta virosa</i>			+				+	+	II	4
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/										
Scheuchzeria-Caricetea fuscae										
<i>Mentha trifoliata</i>	+		+	2			1-2	1	IV	424
<i>Agrostis canina</i>			+	+		2	+	1-2	IV	362
<i>Comarum palustre</i>	+		1	+		+	1	+	IV	192
<i>Calla palustris</i>			+		1-2		1-2		II	201
<i>Carex stellulata</i>		+	1			+			II	65
<i>Eriophorum angustifolium</i>	+				+1	+			II	36
<i>Carex lasiocarpa</i>	+		+	+					II	4
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/										
Molinietalia										
<i>Lasiumachia vulgaris</i>	+		+		+		+		III	5
<i>Juncus conglomeratus</i>						+1	1	1-2	II	236
<i>Climacium dendroides</i>	+1	+	1				1	1-2	IV	301
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/										
Vaccinio-Piceetea										
<i>Betula pubescens</i> a	2	1-2		2		1	1	1	V	960
b	1	1		+	+	+	1	+		
c		+				+				
<i>Picea excelsa</i> a	1	1		1		+			IV	223
b	+	+	+	+		+1				
<i>Pinus silvestris</i> a	+	+					+		III	6
b	+							+		
<i>Lycopodium annotinum</i>	+	+		+				+	II	4
<i>Entodon Schreberi</i>	+			+				+	III	5
<i>Dicranum scoparium</i>		+				+		+	II	4
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/										
<i>Alnus glutinosa</i> a	+		+		+		2-3	2	V	1739
b	1	1	2-3	+1	2	1-2	+	2		
c							+			
<i>Prunella alnus</i> b	+			+		+	+	+	IV	6
<i>Dryopteris spinulosa</i>	+		+		1	+	+		III	66
<i>Ranunculus repens</i>		+	+				+		II	4
<i>Sphagnum apiculatum</i>		+			1	1	1	2	IV	400
<i>Calliergon cuspidatum</i>		+	+		+		+	+	IV	5
<i>Sphagnum palustre</i>		2	3				1	1	III	812
<i>Lophocolea heterophylla</i>	+				+			+	III	5
<i>Polytrichum commune</i>	+	1	1						II	126
<i>Cephalozia bicuspidata</i>	+				+	+			II	4
<i>Mnium seligeri</i>			+		+		+		II	4

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

charakterystyczne rzędu /characteristic of the order/ Phragmitetalia: *Carex pseudocyperus* 5,7; *Galium palustre* 4; *Ranunculus lingua* 3; *Typha latifolia* 3,6; *Calliergon giganteum* 3;

charakterystyczne rzędu /characteristic of the order/ Molinietales: *Deschampsia caespitosa* 6; *Juncus effusus* 2,3; *Lythrum salicaria* 6,8;

charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Scheuchzeria-Caricetea fuscae: *Carex fusca* 3; *C. canescens* 1; *Epilobium palustre* 1,2; *Ranunculus flammula* 2,3; *Viola palustris* 2; *Calliergon stramineum* 3; *Sphagnum cuspidatum* 7;

charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Vaccinio-Piceetea: *Sorbus aucuparia* 7; *Vaccinium myrtillus* 1,2; *V. uliginosum* 1; *V. vitis-idaea* 1,2; *Dicranum undulatum* 7,8; *Hylacomium splendens* 1,3;

towarzyszące /accompanying/: *Athyrium filix-femina* 3; *Geum rivale* 1; *Majanthemum bifolium* 2; *Oxalis acetosella* 2; *Poa palustris* 2; *Urtica dioica* 3,4; *Dropanolobus uncinatus* 3; *Marchantia polymorpha* 2; *Mnium affine* 2; *M. cuspidatum* 8; *Plagiothecium roseum* 3; *Ptilium pulcherrimum* 3; *Rhytidadelphus triquetrus* 1; *Sphagnum fimbriatum* 6;

Tabela - 6 - Table 6

Salici -Franguletum /Malc. 1929/ Tr. 1937

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Stałość Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
Nazwa sucharu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	Stan. W	Lin. NE	Lin. W	Mozg. W	Mozg. N	Widn. W	Wqd. E	W-ki S	W-ki N		
Data Date	9.7.63	16.7.62	8.7.63	10.7.62	12.7.63	23.7.61	12.7.61	13.7.61			
Powierzchnia zdjęcia m2 Surface of record m2	25	25	25	50	25	25	25	25	25		
Szerokość pasa zarastania m Width of the overgrowing belt m		2	3		3	10	10				
Pokrycie % Cover %	100	90	70	100	90	70	75	80	80		
Liczba gatunków w zdjęciu Number of species in the record	24	19	20	25	19	24	23	22	18		
Gatunki charakterystyczne zespołu, związku /Species characteristic of association, of the alliance/											
Alnion glutinosae i rzędu /and of the order/ Alnetalia glutinosae											
Salix cinerea b	3-4	3-4	3	2	3-4	2	1-2	2	2-3	V	3124
Salix pentandra b	1	+	+	+1	+					II	87
Lycopus europaeus	+	+	+	+	+	+		+		V	8
Solanum dulcamara	+	+		+		+1	r	+	+	IV	34
Thelypteris palustris			+			+	+	+		II	4
Sphagnum squarrosum	1			1-2	+	+1	1	2	+	IV	460
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Phragmitetea											
Carex rostrata			+1	1-2	1	+		1		III	278
Galium palustre	+	+		+					+	III	6
Cicuta virosa	+			+		+				II	3
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Scheuchzerio-Caricetea fuscae											
Menyanthes trifoliata	1				1	1	+	+	+	IV	170
Comarum palustre	1			+		+	+	+	1	IV	116
Carex lasiocarpa	1	+1			+		+1	+		III	118
Calla palustris	+			1	+1			+1		III	142
Ranunculus flammula		+	+1	+			+			III	33
Agrostis canina	2		+	1					+	III	252
Carex canescens				+1			+	+		II	32
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Molinietales											
Lysimachia vulgaris		+	+		+		+	+1	+	IV	36
Lythrum salicaria		+	+	+		+				III	4
Juncus conglomeratus	+			1				+		II	58
Cardamine pratensis			+			+		+		II	3
Climacium dendroideum		1	2		+1		1		1	III	380
		+1				+	+		+	III	34
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/											
Frangula alnus b	+1			+	1	1	+	1		IV	199
Alnus glutinosa a	+			+						III	6
Betula pubescens a	1				+	+				II	60
Urtica dioica b	+				+	+		+	+	III	4
Athyrium filix femina					+	+		+	+	III	4
Potentilla anserina		+	1-2		+					II	193
Ranunculus repens		+1	+					+		II	32
Monarda aquatica		+			+	+				II	3
Calliergon cuspidatum		2	1-2	1	3	+	1	+	1	V	904
Sphagnum apiculatum	4			3	1	1-2		1	2	IV	1544
Mnium seligeri		+				+	+		+	III	4
Sphagnum palustre						+	1-2	+		II	138
Mnium undulatum		+				+	+			II	3

Gatunki sporadyczne: charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Phragmitetea: *Acorus calamus* 1; *Carex Hudsonii* 1; *Equisetum limosum* 3,4; *Olyceria fluitans* 3; *Pseudanum palustre* 1,9; *Typha latifolia* 1,6;
 charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Scheuchzerio-Caricetea fuscae: *Carex fusca* 4,7; *Calliergon stramineum* 4;
 charakterystyczne rzędu /characteristic of the order/ Molinietales: *Pilipendula ulmaria* 1; *Myosotis palustris* 4,6;
 towarzyszące /accompanying/: *Carex hirta* 3; *Hydrocharis morsus-ranae* 4; *Lysimachia nummularia* 3,5; *Pinus silvestris* b 1; *Ranunculus acer* 2; *Salix alba* a 2,3; *Trifolium pratense* 3,9; *Lepidozia reptans* 8; *Lophocolea heterophylla* 7; *Mnium affine* 2; *M. punctatum* 7; *Plagiochila asplenoides* 7; *Ptilidium pulcherrimum* 7; *Riccia fluitans f. terrestris* 4; *Sphagnum fimbriatum* 7;

Tabela - 8 - Table 8

Zbiorowisko *Menyanthes trifoliata* - *Comarum palustre*

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Nazwa sucharu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	Widn. S	Kozg. H	II W	Demb. SW	Stan. SA	W-ki K	W-ki NK	Mozg. E	Wyg. S	I S	Nad. S	VI NW		
Data. Date	21.7 61	15.7 62	21.7 60	10.7 61	10.7 62	12.7.61		15.7 62	18.7 62	19.7 60	25.7 61	26.7 60		
Powierzchnia zdjęcia m2 Surface of record m2	2	4	4	2	3	4	5	6	4	10	3	5		
Szerokość pasa zarastania m Width of the overgrowing belt m	1	2	2	1	1,5	2	2,5	3	2	5	1,5	2,5		
Pokrycie warstwy masyjnej i runa % Cover of moss and herb layer %	80	80	80	75	75	70	80	90	90	90	90	90		
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	5	6	6	6	8	9	7	7	6	7	6	7		
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Scheuchzerio-Caricetea fuscae														
<i>Menyanthes trifoliata</i>	1-2	2	3	2	2	1	1	3	3-4	2	1-2	3	V	2201
<i>Comarum palustre</i>	1-2	1	1	1	+1	2	1	1-2	1	2-3	1	1-2	V	925
<i>Calla palustris</i>			1		1		1	1			+1		III	355
<i>Sphagnum cuspidatum</i>									+	+			I	2
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Potamogetalia														
<i>Nymphaea alba</i>						+	+	+	+			+	III	27
<i>Elodea canadensis</i>					+								I	1
<i>Ruphar luteum</i>						+							I	1
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Phragmitetalia														
<i>Peucedanum palustre</i>		+	+	+1	+		+		+		+		III	28
<i>Carex rostrata</i>								1				+	II	44
<i>Phragmites communis</i>						1							I	42
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Molinietalia														
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+1			+	+	+	+		+1			+	III	49
<i>Juncus conglomeratus</i>						+							I	1
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Ledetalia palustris														
<i>Eriophorum vaginatum</i>										+1			I	23
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Alnetalia glutinosae														
<i>Salix cinerea</i>	+	+						+		+		+	III	4
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/														
<i>Sphagnum palustre</i>	1		2	1-2	1	1							III	509
<i>f. squarrosum</i>		2												
<i>Calliergon cuspidatum</i>			1	1-2			1	+		+	+		III	138
<i>Sphagnum apiculatum</i>					1					2	2	2-3	II	560

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Nazwa suchara, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	Demb. S	Demb. S	Wąd. SE	Wąd. E	II W	II N	Iln. E	Stan S	Stan SW	Stan SW	Prep. N	Prep. E	Kys. N	Kys. E	IV SW	Demb. NE	I SE		
Data Date	10.7.61		25.7 61		23.7.61		16.7 62	10.7.63			15.7.61		18.7.62		23.7. 60	10.7. 61	10.7. 60		
Powierzchnia zdjęcia m2 Surface of record m2	5	3	5	10	2	5	3	5	3	25	3	3	3	2	5	6	10		
Szerokość pasa zarostu m Width of the overgrowing belt m	2	1,5	2	5	1	2	1	2	1,5		1,5	1,5	1	0,5	2	3	5		
Pokrycie % Cover %	100	75	100	100	80	100	80	100	90	100	100	100	90	100	100	100	90		
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	8	10	8	11	13	17	15	32	16	18	10	12	11	12	13	16	14		
Gatunki charakterystyczne związku /Species characteristic of the alliance/ Caricion lasiocarpa i rzędu /and of the order/ Scheuchzerietalia palustris																			
Carex lasiocarpa	3	3	1	1-2	2-3	2	1	2	2	3	1-2	1	3	2	1	1-2	3	V	1990
Carex limosa											+		1	1				I	59
Rhynchospora alba										+		+			+			I	2
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Caricetalia fuscae																			
Carex fusca				+		1	+1	1		+		+	+	+		+		III	78
Agrostis canina				+		+		+1	+	2		+		+				II	121
Carex canescens						+		+						+				I	2
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Scheuchzerio- Caricetea fuscae																			
Menyanthes trifoliata	2-3	1	3-4	2	+	1		1	1	1	2	+	+	1	3	1-2	3	V	1340
Comarum palustre		+	1	1		+		+		1-2				1-2	+	1	1	III	251
Eriophorum angustifolium				+	+			+		1		+			+	1	+	III	62
Calla palustris					2	2		+	+	+								II	208
Calliergon stramineum	+	+	+	+			+				1		1	+1			1	III	107
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Phragmitetea																			
Peucedanum palustre	1		+	+	+	+	+				+				+	+		III	34
Lysimachia thyrisiflora	+						+										+	I	2
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Molinio-Arrhenatheretea																			
Lysimachia vulgaris		+	+	+	+	+	+			+			+		+			III	5
Molinia coerulescens						+	+						1	+1				II	46
Juncus conglomeratus				+				+						+				I	2
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Oxycoeco-Sphagnetes																			
Oxycoecus quadrifolius						+			+	+1	+	+	+	+	+		+	III	49
Andromeda polifolia											+		1	+1	+			II	46
Urtica rotundifolia									+	+		+			+			I	2
Sphagnum magellanicum									2			1			1	1		I	191
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Alnetea glutinosae																			
Salix cinerea b					+	+		+	+	+							+	II	4
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Vaccinio-Piceetea																			
Betula pubescens b								+		+							+	I	2
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/																			
Sphagnum apiculatum	1		2-3	2	1	1			2	4	3-4	4-5	3	4	2	2	3	V	2640
Sphagnum palustre	2	2	1	1														III	544
f. squarrosum					1-2	3													
Calliergon cuspidatum							2-3	2	1			+			1	1		II	351
Gatunki sporadyczne; /Sporadic species/	charakterystyczne rzędu /characteristic of the order/ Scheuchzerietalia palustris; Sphagnum cuspidatum 15, 17;																		
	charakterystyczne rzędu /characteristic of the order/ Caricetalia fuscae; Carex stellulata 13; Ranunculus flammula 7,8;																		
	charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Scheuchzerio-Caricetea fuscae; Carex flava 8; Drepanocladus fluitans f. submersa 16; Scorpidium scorpioides 9;																		
	charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Phragmitetea; Acorus calamus 10, 17; Alisma plantago aquatica 8; Carex gracilis 11; C. Hudsonii 9, 10; C. rostrata 14; Equisetum limosum 11; Galium palustre 7,8; Scutellaria galericulata 8; Typha latifolia 10; Calliergon giganteum 2, 12;																		
	charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Molinio-Arrhenatheretea; Carex panicea 8; Cardamine pratensis 8; Deschampsia caespitosa 5; Juncus effusus 5,6; Ixthrum salicaria 7, 17; Plantago lanceolata 8; Prunella vulgaris 8; Ranunculus acer 8; Trifolium pratense 7,8; Clinacium dendroideum 7,8;																		
	charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Oxycoeco-Sphagnetes; Polytrichum strictum 5;																		
	charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Alnetea glutinosae; Dryopteris thelypteris 2,6; Lycopodium europaeum 2,8;																		
	charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Vaccinio-Piceetea; Ledum palustre 11; Vaccinium uliginosum 9,10; Diarrhena scoparium 5; D. undulatum 9;																		
	towarzyszące /accompanying/: Alnus glutinosa 1; Elders cornus 8; Prunella alnus c 17; Mentha aquatica 7,8; Nymphaea alba 9,12; Rheum pratense 8; Plantago maior 8; Potentilla anserina 7,8; Erythronium ventricosum 8,9; Drepanocladus aduncus f. polycarpa 6; Miliu celigeri 11; Sphagnum obtusum 2,9; Bazzania trilobata 1;																		

Gatunki sporadyczne: charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Scheuchzeria-Caricetea fuscae; Carex canescens 31,42; Drepanocladus revolvens 38,40;
 charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Phragmitetia: Equisetum limosum 39,40; Phragmites communis 23;
 charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Oxyccocco-Sphagnetes: Sphagnum papillosum 40;
 towarzyszące /accompanying/ Alnus glutinosa 1,2; Elodea canadensis 39; Lycopodium europaeum 1; Potamogeton natans 39; P. obtusifolium 39; Calliergon cuspidatum 22; Cladopodium fluitans 1,6;

Caricetum limosae Br.-Bl. 1921 variant s *Rhynchospora alba*

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Nazwa sucharu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	II SE	III NW	V NW	V SW	VI E	VII W	VII N	W-ki S	W-ki W	W-ki E	W-ki N	Rzep. W	Demb. NW	Demb. N	Demb. SW	Zach. S	Zach. W	Zach. N	Wsch. W	Wsch. E	Mozg. SW	Z. Sl. SE	Z. Sl. W	I S	I SW	II E	IV N	IV S	Tlust. NE	Tlust. NW	Tlust. SE	Drob. NE	Drob. N	Drob. NW				
Data Date	21.7.60	24.7.60	25.7.60	26.7.60	27.7.60	27.7.60	20.7.63	12.7.61				15.7.61	17.7.61			11.7.61			14.7.61		8.7.63	17.7.62	10.7.63	19.7.60	21.7.60	21.7.60	21.7.61			21.7.61								
Powierzchnia zdjęcia m ² Surface of record m ²	6	7	7	4	2	1,5	3	7,5	11	3	9	5	5	6	5	5	3	6	2,5	5	6	5	4,5	3	4	3	4	7	6	4	2	3	15	6	10			
Szerokość pasa zarastania m Width of the overgrowing belt m	4	4,5	4,5	2,5	1,5	1	2	5	7	2	6	2	2	4	3	3	1,5	4	1,5	3	+	3	3	2	2,5	2	2,5	5	4	1,5	1	1,5	7	4	5			
Odległość od lustra wody m Distance from surface of the water	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	1	0,5	0,5	0,7	1		0,5		0,5	1		0,2	1	0,5			1	0,5	0,5	1	0,5		1	0,5	0,5	0,5							
Pokrycie % Cover %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	9	9	15	13	10	11	10	15	16	14	13	9	13	9	14	13	10	15	11	12	11	16	12	15	11	8	12	10	11	17	12	11	21	13	19			
Gatunki charakterystyczne zespołu Species characteristic of association/ <i>Scheuchzeria palustris</i> <i>Carex limosa</i>		+1	+1	2	+	1	+	+	1	+	1		+	+		1		+	+	1	+		+	+												IV II	141 60	
Gatunki wyróżniające Differential species/ <i>Rhynchospora alba</i>	1-2	2-3	3	3-4	1	2	3-4	+1	2	+1	2-3	1-2	1-2	1	2-3	1-2	3	1	1	2	3-4	2	1-2	3	1	2	3	4	3-4	1	1	1-2	3	1-2	3	V	2223	
Gatunki charakterystyczne rzędu Species characteristic of the order/ <i>Scheuchzeria palustris</i> <i>Drosera anglica</i> <i>Carex lasiocarpa</i>			1	1		+										+		1		+					2	1	+1	+	+	+1	+1	+	1	+	2	II II	153 123	
Gatunki charakterystyczne klasy Species characteristic of the class/ <i>Scheuchzeria-Caricetea fuscae</i> <i>Menyanthes trifoliata</i> <i>Comarum palustre</i> <i>Carex fusca</i> <i>Eriophorum angustifolium</i> <i>Calla palustris</i> <i>Calliergon atramineum</i>	1		+	+	+		+	+	3	3	+		2	1	1	1	1	+	+	3		+	+1	+		3											IV IV III II IV	611 154 113 61 60 182
Gatunki charakterystyczne klasy Species characteristic of the class/ <i>Oxyccocco-Sphagnetes</i> <i>Oxyccoccus quadripetalus</i> <i>Andromeda polifolia</i> <i>Drosera rotundifolia</i> <i>Eriophorum vaginatum</i> <i>Sphagnum magellanicum</i> <i>Sphagnum papillosum</i> <i>Sphagnum nemoreum</i>	1	1	1	+	1	2	1-2	2	1	1	1-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	+														V V V II III I	305 272 149 2 945 1 1
Gatunki towarzyszące Accompanying species/ <i>Pinus silvestris</i> b <i>Salix cinerea</i> b <i>Betula pubescens</i> b <i>Carex rostrata</i> <i>Peucedanum palustre</i> <i>Lysimachia vulgaris</i> <i>Ledum palustre</i> <i>Equisetum limosum</i> <i>Sphagnum apiculatum</i> <i>" obtusum</i> <i>Cladopodiella fluitans</i>							r	+	+	+			+	+																							II I I I II II I I I	2 1 1 165 30 44 15 1 5960 15 1
Gatunki sporadyczne Sporadic species/ charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ towardsyżące /accompanying/	<i>Scheuchzeria-Caricetea fuscae</i> : <i>Carex flava</i> 15; <i>Juncus articulatus</i> 33; <i>Drepanocladus revolvens</i> 31,34; <i>Sphagnum teres</i> 30,31; <i>Oxyccocco-Sphagnetes</i> : <i>Aulacomnium palustre</i> 33; <i>Polytrichum strictum</i> 9,33; <i>Alnus glutinosa</i> 26; <i>Epilobium palustre</i> 30,33; <i>Galium palustre</i> 15; <i>Lysimachia thyrsiflora</i> 18,35; <i>Picea excelsa</i> 8; <i>Vaccinium uliginosum</i> 22; <i>Viscaria vulgaris</i> 30,35; <i>Hylocomium splendens</i> 15; <i>Polytrichum commune</i> 22; <i>Sphagnum palustre</i> f. <i>Squarrosum</i> 8;																																					

Tabela - 12 - Table 12

Sphagnetum medii et rubelli Schwab. 1940 variant 2 Rhynchospora alba

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Nazwa suchara, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	III S	III N	IV W	VII S	W-ki SE	W-ki E	Rzep. E	Zach. E	Wsch. S	Wsch. SE	Wsch. N	Drob. S		
Data Date	24.7.60		21.7 60	27.7 60	12.7 61	13.7 61	15.7 61	11.7 61		14.7.61		21.7 61		
Powierzchnia zdjęcia m2 Surface of record m2	4	5	5	2,5	9	4	5	2,5	5	4	4	8		
Szerokość pasa zarastania m Width of the overgrowing belt m	2,5	3	3	1,5	6	2,5	2	1,5	3	2,5	2,5	4		
Odległość od lustra wody Distance from surface of the water	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	1	0,3	0,5	0,2				
Pokrycie % Cover %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	16	10	12	11	20	9	8	10	15	10	10	14		
Gatunki charakterystyczne zespołu /Species characteristic of the association/														
Sphagnum magellanicum	2-3	3	2	3	2-3	2	2-3	2	2-3	2-3	2-3	1-2	V	2103
Gatunki wyróżniające /Differential species/														
Rhynchospora alba	2-3	1	2	2	1	1	1	1	1-2	1	1	2-3	V	1130
Gatunki charakterystyczne związku /Species characteristic of the alliance/ Sphagnion fusci i rzędu /and of the order/ Ledetalia palustris														
Oxycoccus quadripetalus	1	1	1	1	2	1	+1	2	1-2	1-2	1	+	V	752
Andromeda polifolia	+		+	1	+	+	1	+	1	1	+	1	V	214
Eriophorum vaginatum	+	+1	+	1		+		1	1		+		IV	192
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Oxycocco-Sphagnetum														
Brossera rotundifolia	+	+1	1	+	+	r	+	+	r	r	+	+	V	70
Polytrichum strictum	+				+						+	+	II	3
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Scheuchzerio-Caricetea fuscae														
Scheuchzeria palustris	1	+	+	+		+						+	III	46
Comarum palustre	+	+1			+								II	25
Menyanthes trifoliata	+				+			+					II	3
Carex lasiocarpa	+		+									+	II	3
Calliergon stramineum	+		+		1	+			+				III	46
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/														
Pinus silvestris a										+			IV	6
b	r	+	+	+	+			+	+				II	3
Picea excelsa b					+			+	1	+1	+		III	68
Ledum palustre			+	+	+			+						
Sphagnum apiculatum	2	2	3	2-3	2	2	2-3	3	2-3	2-3	2	3-4	V	2671

Gatunki sporadyczne: charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Oxycocco-Sphagnetum: Aulacomnium palustre 9;
/Sporadic species/ Sphagnum papillosum 12; Sphagnum nemareum 1;

charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Scheuchzerio-Caricetea fuscae:
Calla palustris 5; Carex limosa 9, 10; C. fusca 4; Eriophorum angustifolium 12;

towarzyszące /accompanying/: Carex rostrata 5, 11; Calluna vulgaris 2; Equisetum limosum 12; Galium
palustre 5; Iysirachia vulgaris, 5, 12; Feucedanum palustre 9; Salix cinerea 5;
Viscaria vulgaris 9; Cladopodiella fluitans 1, 12; Lophocolea heterophylla 5;
; Sph. palustre 5;

Tabela 15 — Table 15
Skupienia *Glyceria fluitans* — *Heleocharis acicularis*

Nr zdjęcia No. of record	1	2		
Nazwa sucharu Name of lake	Lin. N	Lin. E		
Data Date	12.7.63	16.7.62		
Powierzchnia zdjęcia m ² Surface of record m ²	25	25		
Pokrycie % Cover %	80	90		
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	8	9	Stalność bezwzględna Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Littorelletalia				
<i>Heleocharis acicularis</i>	2	2—3	2	2225
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Potametalia				
<i>Potamogeton natans</i>	+ 1	+	2	240
<i>Polygonum amphibium</i>	+		1	5
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Phragmitetalia				
<i>Glyceria fluitans</i>	3	2—3	2	3235
<i>Heleocharis palustris</i>	1	+	2	253
<i>Sparganium simplex</i>	+ 1		1	135
<i>Equisetum limosum</i>	+		1	5
<i>Plantago alisma-aquatica</i>	+		1	5
<i>Peucedanum palustre</i>		+	1	5
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Molinietalia				
<i>Lysimachia vulgaris</i>		+	1	5
Gatunki towarzyszące (Accompanying species)				
<i>Myosotis palustris</i>		+	1	5
<i>Calliergon cuspidatum</i>		1	1	250

Tabela — 17 — Table 17
Skupienia Sphagnum cuspidatum

Nr zdjęcia No. of record Nazwa suchardu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record Data Date Powierzchnia zdjęcia m² Surface of record m² Pokrycie % Cover % Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	1 Wyg. E 10.7 63 5 80 1	2 W-ki S 11.7.63 2 60 1	3 III N 7.7.63 5 90 2	Stalność bezwzględna Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Scheuchzeria palustris Sphagnum cuspidatum Gatunki towarzyszące (Accompanying species) Utricularia vulgaris	 3—4	 3	 4 +1	 3 1	 4973 90

Tabela — 16 — Table 16
Skupienia *Equisetum limosum*

Nr zdjęcia No. of record Nazwa sucharu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record Data Date Powierzchnia zdjęcia m² Surface of record m² Pokrycie % Cover % Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	1 Widn. S 21.7.61 10 60 6	2 Stan SW 17.7.62 10 60 4	Stalność bezwzględna Constancy	Współczynnik pokrycia Coefficient of cover
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species of characteristic of the order) Potame- talia Elodea canadensis		+	1	5
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Phragmi- tetalia Equisetum limosum Carex rostrata	3	2—3 +	2 1	3235 5
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class) Scheuchze- rio-Caricetea fuscae Menyanthes trifoliata	+	1	2	255
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Molinie- talia Lysimachia vulgaris	+	+	2	10

No. of record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Stalosc Constancy	Wspolczynnik pokrycia Coefficient of cover	
Name of lake, localization of record	I S	I S	IV N	IV E	VI SE	VII E	VII SE	W-ki NE	Rzep. W	Zach. S	Zach. N	Zach. E	Wach. SE	Wach. W	Drob. W	Trust. NE	Trust. E	Z.Sl. SE	Z.Sl. W	Stan. W	Wyg. W	I S	III S	III E	V NW	V SW	W-ki E	Drob. N	Drob. S	Trust. S			
Date	19.7.60		23.7.60		26.7.60	27.7.60	20.7.61	12.7.61	15.7.61	11.7.61			14.7.61		21.7.61		12.7.61	17.7.61	10.7.61	6.7.61	10.7.61	19.7.61	24.7.61		25.7.61		12.7.61	21.7.61					
Surface of record m ²	25	25	8	16	25	25	25	16	15	25	16	25	25	25	25	25	25	15	25	25	25	25	25	16	25	25	25	16	25	8			
Width of the overgrowing belt m	7	6	2	4	6	25	10	4	3	12	4	12	6	10	6	15	15	3	7		10	6	15	4	10	10	6	4	10	2			
Distance from surface of the water	3	3	5	1	1,5	3	3	3	2	3	2	3	3	4	5	6	2	3	3		6	2,5	3	1	5	3		4	4	2,5			
Cover of moss and herb layer %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Number of species in the record	11	14	18	14	13	17	15	10	11	19	12	13	15	16	13	16	21	21	11	14	16	11	22	18	20	17	14	15	16	18			
Species characteristic of association/																																	
Sphagnum magellanicum	3	3	3-4	3	3	3	3	3	2	3-4	2-3	3	4	3-4	2	3	3	2-3	3	3	3	3	3-4	2-3	4	3	2	2-3	4	1-2	V	3531	
Sphagnum rubellum																																	
Species characteristic of the alliance/ Sphagnion fusci i rzędu /and of the order/ Ledetalia palustris																																	
Eriophorum vaginatum	2	1	1	1	+	1	+1	2	+	1	2	2	1	+	+	+	+	+1	1	+1	1-2	3	1	1	+	1	+	+	+	+	V	591	
Oxycoccus quadripetalus	2-3	+	1	1	1	2	+	+	+	1	1	2	1	+	1	1	+	+	1	+	1	1	1	1-2	+	1	+	+	+	+	V	557	
Andromeda polifolia	1	r	+	1	+	1	+1	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+	1	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	V	178	
Oxycoccus microcarpus																																I	1
Sphagnum fuscum																																II	36
Sphagnum nomoreum						1																										II	20
Cephalozia connivens																																I	1
Species characteristic of the class/ Oxycocco-Sphagnetes																																	
Drosera rotundifolia																																V	122
Polytrichum strictum																																V	181
Aulacomnium palustre						1	+1	1	+	1	+	+	1	+	+	+	+	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	20
Sphagnum papillosum																																I	1
Species characteristic of the alliance/ Dicrano-Pinion i rzędu /and of the order/ Vaccinio-Piceetalia																																	
Pinus sylvestris	a					1-2	1							1	+	+	1	+	+	1	1	+	1	1	+	+					V	317	
Picea excelsa	b					1	1-2							+	+	+	1	+	+	1	1	+	+	1	1	+	+	r	r				
Isodon palustre																																II	21
Vaccinium uliginosum																																IV	386
Myrtillus																																III	265
Dicranum uliculatum																																III	21
Species characteristic of the class/ Vaccinio-Piceetalia																																II	3
Betula pubescens	a																															II	96
Entodon Schreberi	b					1-2																										II	36
Hylocomium splendens																																I	2
Dicranum scoparium																																I	1
Accompanying species/																																	
Calluna vulgaris																																III	51
Menyanthes trifoliata																																I	192
Rhynchospora alba																																I	18
Carex canescens																																I	10
Carex fusca																																I	2
Cyperus palustre																																I	1
Sphagnum apiculatum	2		2	2-3	2	2	2	1	3-4	2	2-3	2-3	2	2	3	2	2	2	1-2	2	1-2	2	1	1	1-2	2	2	2	1	3	V	1721	
Calliergon stramineum																																	
Lepidozia reptans																																II	20
Species characteristic of the class/ Oxycocco-Sphagnetes: Sphagnum robustum 10;																																I	1
Species characteristic of the alliance /Dicrano-Pinion i rzędu /and of the order/ Vaccinio-Piceetalia: Vaccinium vitis idaea 12. 13;																																	
accompanying/: Calla palustris 18; Carex panicea 17; C. rostrata 2.16; Cortellulata 17; Epilobium palustre 16; Eriophorum angustifolium, 29;																																	
Equisetum limosum 17, 28; Juncus conglomeratus 18; Potentilla erecta 17; Salix cinerea 19; Scheuchzeria palustris 10,28; Viola palustris 17; Campanula stellata 17; Cephalozia bicuspidata 18,25; Dicranum Bonjeani 8; Drepanocladus revolvens f. gracilescens 17; Lophocolea bidentata 18; Isobrya monophylla 25; M-1																																	

Equisetum limosum 17, 28; Juncus conglomeratus 18; Potentilla erecta 17;
Salix cinerea 19; Scheuchzeria palustris 10, 28; Viola palustris 17;
Campanula stellata 17; Cephalozia bicuspidata 18, 25; Dicranum Bonjeani 8;
Drepanocladus revolvens f. gracilescens 17; Lophocolea bidentata 18;
Lophozia marehica 25; Mylia anomala 18, 25; Prelesia quadrata 17; Sphagnum
cuspidatum 23

Tabela - 14 - Table 14

Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929

Nr zdjęcia No. of record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Nazwa sucharu, lokalizacja zdjęć Name of lake, localization of record	I E	I S	I S	II E	III N	III S	III W	IV W	IV S	IV WS	V S	VI WS	VII W	Demb. E	Demb. NW	Wach. W	Zach. N	W-ki S	Rzep. W	Rzep. N	Wyg. WN		
Data Date	19.7.60			20.7 60	24.7.60			23.7.60			25.7 60	26.7 60	27.6 60		11.7.61		14.7.61	12.7 61	15.7.61		17.7 62		
Powierzchnia zdjęcia m2 Surface of record m2	25	25	25	16	16	25	25	16	15	25	25	25	25	16	25	25	25	16	16	15	25		
Szerokość pasa zarastania m Width of the overgrowing belt m	6	15	11	4	4	10	7	4	7	5	8	5	5	4		10	10	4	5	3,5			
Odległość od lustra wody m Distance from surface of the water	9	10	9	4	5	20	7	5	1	5	7	4	10	3	3	3	6	5	1	1,5	10		
Pokrycie warstwy mszystej i runa % Cover of moss and herb layer %	80	60	70	60	80	90	100	80	70	80	100	60	100	70	100	90	70	60	60	90	80		
Ilość gatunków w zdjęciu Number of species in the record	20	17	22	23	19	29	26	18	23	18	27	31	21	30	28	20	16	17	18	18	19		
Gatunki charakterystyczne zespołu /Species characteristic of association/																							
Vaccinium uliginosum	3	3	3	1	1-2	3	2	2-3	2	3	1-2	1-2	1-2	1	3	2	+	1	1-2	1	2-3	V	1892
Ledum palustre	+	1-2	2	1	3	1-2	2	1-2	+	1	2	1	2	+	2	2-3	1-2	+	+	1	2	V	1119
Gatunki charakterystyczne związku /Species characteristic of the alliance/ Dicrano - Pinion																							
Pinus silvestris a	2	2-3	1-2	1	2	1-2	1	+	+	1	1-2	1	2-3	2	2-3	2	1	1	1	1-2	2	V	1291
b	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
c	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Picea excelsa a	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	+	+	+	+	+	+	1	+	+	V	193
b	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
c	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Dicranum undulatum	+	+	1	+1	+	1	+	+	1-2	+	+	+	+	+	2	+	2	+	1	+	+	V	311
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Vaccinio-Piceetalia																							
Vaccinium myrtillus	1	1	1	2	+1	1	1	1	1	1	+	1	+	+1	+	2	+	+1	2	1-2	1	V	502
" vitis idaea	+	+	+	+	1	+	+	+	+1	1	1	+	1	1	1	1	+	+	+	1	+	V	208
Trientalis europaea	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Lycopodium annotinum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Ptyllum crista castrensis	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	4
Leucobryum glaucum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	3
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Vaccinio-Piceetea																							
Betula pubescens a	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	2	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	V	142
b	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
c	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Sorbus aucuparia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Entodon Schreberi	+	1	2	+1	1-2	1	+	+	+	1-2	+	+	1-2	1	2	+1	+	+	2	1	2	V	618
Rhacomitrium splendens	1	+1	+	+	+1	1	2	+	+	2	+1	+	2	1-2	2	1	+	+	+	1	+1	V	537
Dicranum scoparium	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Gatunki charakterystyczne rzędu /Species characteristic of the order/ Ledetalia palustris i klasy /and of the class/ Oxycoeco-Sphagnetes																							
Eriophorum vaginatum	+	+	1	+	+	+	+	1	+	+	1-2	+	1	+	+	1	1	+	+	+	1-2	IV	229
Oxycoeco quadripetalus	+	+	+	+	+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1-2	+	+	+	+	+	IV	214
Andromeda polifolia	+	+	+	1	+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+	IV	64
Drosera rotundifolia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	3
Sphagnum magellanicum	2	1	2	2	1	1-2	2	2	2-3	1	1	2	1	1	1	2-3	1	1-2	1	2	2	V	1247
Polytrichum strictum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+1	+	IV	43
Aulacomnium palustre	+	+	+	+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	39
Sphagnum fuscum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	3
Cephalozia connivens	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/																							
Calluna vulgaris	+	+	+	1	+	+	1-2	+	+	+	1-2	+	+	+	+	1-2	+	+	+	+	+	II	186
Molinia caerulea	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	II	74
Eriophorum angustifolium	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	+	+	+	+	+	I	108
Carex fusca	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	84
Betula nigrum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	49
Carex stellulata	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Quercus robur c	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Sphagnum apiculatum	1	1	1	1	1-2	1	1	1-2	2	2	2	2-3	1	1	2	1-2	1	1-2	2	1-2	1	V	796
" nemoreum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	132
" palustre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	79
f. squarrosum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1-2	+	+	+		
Dicranum flagellare	+	+	+	+	+	+	+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+1	+	+	+	+	+	II	28
Lepidozia reptans	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	4
Polytrichum commune	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	3
Lophocolea heterophylla	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Cephalozia bicuspidata	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Georgia pellucida	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Pohlia nutans	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2
Calliergon cuspidatum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	2

Gatunki sporadyczne: charakterystyczne klasy /characteristic of the class/ Oxycoeco-Sphagnetes; Sphagnum robustum 15;
/Sporadic species/ towarzyszące /accompanying/; Carex canescens 1; C. flava 15; C. rostrata 4; Comarum palustre 18;
Frangula alnus 1,12; Juncus conglomeratus 6,21; Phragmites communis 6; Pteridium aquilinum 1; Salix cinerea 13;
Razania trilobata 9,14; Bryum bimum 4; Calliergon stramineum 14; Calypogeia seylandi 11, 15; C. neesiana 17; Dicranum montanum 6,16;
Elepharostoma trichophyllum 10, 12; Dicranodontium denudatum 4,12; Placidium adiantoides 12; Mniun hornum 12; Plagiocchia
asplenoides 12, 14; Ptilidium pulcherrimum 7,9; Riccardia piquis 12; Rhatifrons 12, 14; Sphagnum centrale 3;

Porównanie składu florystycznego zespołów i zbiorowisk roślinnych
Sucharów Suwalskich
Comparison of the floristic composition of the plant associations and communities

Jednostka systematyczna Systematic unit	1 Myriophyllo- -Nuphar etum	2 Scirpo- -Phragmito- -tum	3 Caricetum inflato- vesicariae	4 Salici -Prangula- -tum	5 Carici elongatae -Alnetum	6 Meryanthes trifoliata- Comarum palustre	7 Carex lasiocarpa	8 Caricetum typicum	9 linosae variant z Rhynchospora alba	10 Sphagnetum medii et rubelli variant z Rhynchos- pora alba	11 typicum	12 Vaccinio uliginosi- -Pinetum
Ilość zdjęć Number of records	22	7	4	9	8	12	17	43	35	12	30	21
Ilość gatunków: Bryophyta Number of species	1	7	4	17	23	4	10	11	14	10	25	37
pozostałe Coriophyta /remaining/ Pozost./total/	18 19	21 28	32 36	43 60	49 72	13 17	52 70	29 40	31 45	24 34	30 55	31 60
Nuphar luteum	V 1673					I 1		I				
Potamogeton natans	III 875											
Nymphaea alba	V 1602	III 74				III 27	I	I				
Elodea canadensis	II 25	I				I 1		I				
Utricularia vulgaris	II 3	II 3						I				
Phragmites communis	I 102	V 1741	2 563			I 42		I				I
Zypha latifolia		IV 466		I	I 3							
Calliergon giganteum		II 3			I							
Carex vesicaria			3 530									
Glyceria fluitans			2 3	I								
Najas palustris			2 5	I								
Melecocharia palustris			2 5									
Salix petandra				II 87								
Mytiladelpheus squarrosus				III 34								
Salix cinerea		III 74	3 73	V 3124	V 226	III 4	II 4	I 1	I	I	I	I
Alnus glutinosa				III 6	III 1735							
Dryopteris spinulosa					II 126							
Polytrichum commune				IV 34	IV 73							
Solanum dulcamara			1	III 252	IV 362		II 121					
Agrostis canina			1	II 3	III 66							
Thelypteris palustris			3 8	III 6	I							
Galium palustre			2 5	III 4	II 4							
Mnium seligeri			1	III 33	I							
Ranunculus flammula			1	III 4	I							
Igthrum salicaria			1	III 4	II 4							
Scutellaria galericulata			1	IV 199	IV 6							I
Prangula alnus				III 380	IV 301							
Climacium dendroides				V 8	III 38			I				
Lycopodium europaeus				IV 460	IV 686							
Sphagnum squarrosum				II 3	II 4							
Cycuta virosa				III 4	I							
Athyrium filix-femina				III 4	I							
Urtica dioica				I	III 5							I 2
Lophocolea heterophylla				II 32	II 4							
Ranunculus repens				II 32	I							
Carex canescens				II 60	V 960		I 2	I			I 10	I 142
Betula pubescens							I 2		I		II 96	V
Carex lasiocarpa			1	III 118	II 4		V 1990	V 1069	II 123	II 3		
Eriophorum angustifolium					II 36		III 62	I	II 59		I	I 108
Carex fusca				I	I 3		III 78	I 25	III 113	I	I 2	I 84
Carex limosa							I 59	V 2032	II 60	I		
Drosera anglica							I 2	I 23	II 153			
Rhynchospora alba								III 170	V 2223	V 1130		
Scheuchzeria palustris								II 10	IV 141	III 46		
Oxycoocus quadripetalus							III 49	III 38	V 505	V 752	V 537	IV 214
Andromeda polifolia							II 46	II 26	V 272	V 214	V 174	IV 64
Drosera rotundifolia							I 2	II 25	V 149	V 70	V 182	II 3
Eriophorum vaginatum								II 2	IV 192	V 591	IV 229	
Sphagnum magellanicum							I 191	II 156	III 94	V 2183	V 5531	V 1247
Polytrichum strictum									I	II 3	V 181	IV 43
Pinus silvestris				I	III 6				II 2	IV 6	V 317	V 1291
Picea excelsa					IV 220				I	II 3	II 21	V 193
Aulacomnium palustre									I	I	II 20	II 39
Calluna vulgaris										I	III 51	II 186
Sphagnum nemoreum									I	I	II 20	II 132
Cephalozia conrivens											I 1	I 3
Sphagnum fuscum											II 36	II 3
Sphagnum rubellum											II 135	
Ledum palustre									I 15	III 68	IV 386	V 1119
Vaccinium uliginosum											III 265	V 1992
Vaccinium myrtillus											III 21	V 582
Vaccinium vitis-idaea											I	V 208
Entodon schreberi					III 5							V 610
Dicranum unguiculatum					I						II 3	V 311
Hylacomium splendens					I				I		I 2	V 537
Ptilium crista castrensis												II 4
Leucobryum glaucum												II 3
Dicranum flagellare												II 28
Comarum palustre	I 51	III 410	4 133	IV 116	IV 192	V 925	III 251	III 286	IV 154	II 25	I 1	I
Meryanthes trifoliata		III 323	2 125	IV 170	IV 424	V 2201	V 1340	III 473	IV 611	II 3	I 192	
Lychnachia vulgaris		III 6	4 10	IV 36	III 5	III 49	III 5	II 26	I			
Juncus conglomeratus		II 40	2 5	II 58	II 236	I 1						
Calliergon cuspidatum		III 111	4 1125	V 904	IV 5	III 136	II 351	I				I 2
Pseudodanum palustre		III 43	4 75		II 4	III 28	III 34	V 8	II 30	I		
Carex rostrata		IV 44	4 4643	III 278	II 221	II 44	I	II 36	II 165	I		I
Calla palustris		III 231		III 112	II 261	III 355	II 208	I 12	I 61	I		
Sphagnum palustre		III 540		II 138	III 812	III 509	III 544	I	I	I		II 79
Calliergon stramineum		II 3		I	I		III 107	III 59	IV 182	III 46	II 20	I
Sphagnum spiculatum		II 131		IV 1544	IV 408	II 560	V 2640	V 3034	V 5966	V 2671	V 1721	V 796