MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. XXV, 1968

TADEUSZ GŁAZEK

ROŚLINNOŚĆ KSEROTERMICZNA
WYŻYNY SANDOMIERSKIEJ
I PRZEDGÓRZA IŁŻECKIEGO

*The Xerothermic vegetation of the Sandomierz Upland
and the Iłża Forehills*

WARSZAWA

Wydano z zasilku
Polskiej Akademii Nauk

ADRES REDAKCJI — ADRESSE DE LA RÉDACTION
WARSZAWA, AL. UJAZDOWSKIE 4

304/p

Państwowe Wydawnictwo Naukowe — Warszawa, Miodowa 10

Nakł. 380+80. Ark. wyd. 18, ark. druk. 2,5, + 17 wkładek.

Papier druk, sat. kl. III, 80 g, 70×100.

Oddano do składania we wrześniu 1967. Podpisano do druku
w sierpniu 1968. Druk ukończono we wrześniu 1968.

Zam. 3386.

N-39

Cena zł 56,—

Lubelskie Zakłady Graficzne — Lublin, Unicka 4

WSTĘP

Wyżyna Sandomierska i Przedgórze Ilżeckie charakteryzują się stosunkowo dużym bogactwem reliktowych stanowisk zbiorowisk stepowych i kserotermicznych. Pomimo to, te dwa subregiony były słabiej poznane w stosunku do południowej części Wyżyny Małopolskiej, Wyżyny Lubelskiej, Wielkopolski i Pomorza.

Pierwsze informacje mówiące o występowaniu roślinności stepowej i kserotermicznej na badanym terenie odnoszą się do XIX w. H e m p e l (1885) w pracy „Spis roślin jawnokwiatowych dziko rosnących w Słupi Nadbrzeżnej” wymienia między innymi *Cerasus fruticosa* i *Linum flavum*. Następnie Waga we „Florze Polskiej” podaje Sandomierz jako miejsce występowania *Cerasus fruticosa* (por. Ł a p c z y ń s k i 1887). Pod względem florystycznym Sandomierz i Góry Pieprzowe zostały opracowane przez Ł a p c z y ń s k i e g o (1887).

Właściwe badania na tym terenie nad roślinnością stepową i kserotermiczną zapoczątkował D z i u b a ł t o w s k i (1922 b, 1923, 1925). W pracach swoich omawia zagadnienie ochrony reliktowych zbiorowisk kserotermicznych i ich ekologię, a następnie wykonuje szereg zdjęć fitosocjologicznych, które zestawia w tabele ze zdjęciami fitosocjologicznymi z Pińczowskiego i wyodrębnia dwa zespoły: *Stipetum capillatae* i *Prunetum fruticosae*.

K o z ł o w s k a (1925), prowadząc badania na Wyżynie Małopolskiej — od Sandomierza do Krakowa — nad występowaniem podgatunków i odmian *Festuca ovina* w zbiorowiskach roślin stepowych, nie podaje dla Wyżyny Sandomierskiej zdjęć fitosocjologicznych, ani też spisu roślin.

Dotychczas nikt w zbiorowiskach kserotermicznych badanego terenu, poza D z i u b a ł t o w s k i m, nie prowadził badań fitosocjologicznych. Podejmowano natomiast badania florystyczne.

W 1954 roku J a r o s z wymienia trzy stanowiska roślin chronionych projektując dla nich rezerваты. K u c (1959) opracował Wyżynę Sandomierską pod względem briologicznym. W wykazie systematycznym mchów podaje gatunki kserotermiczne. W ostatnich latach G o s t y ń s k a (1963) przeprowadziła inwentaryzację stanowisk wiśni karłowatej, a G ł a z e k (1960 i 1964) inwentaryzację wiśni karłowatej i ostnicy włosowatej, podając jednocześnie dla poszczególnych płatów gatunki przewodnie.

Według Szafera (1959) okręg Sandomiersko-Opatowski stosunkowo dobrze został zbadany pod względem florystycznym, lecz dotychczas nie przeprowadzono w nim badań geobotanicznych.

Z powyższych danych wynika, że piśmiennictwo odnoszące się do opisywanego terenu jest bardzo ubogie.

Opracowując więc roślinność kserotermiczną Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Ilżyckiego postawiłem sobie następujące zadanie:

1. Gruntowne poznanie zbiorowisk kserotermicznych badanego terenu.

2. Rozszerzenie wiedzy o tego rodzaju zbiorowiskach, ich powiązaniu z podłożem oraz o ich dynamice i sukcesji.

3. Zabezpieczenie w rezerwach przyrody najlepiej zachowanych fragmentów reliktowych zbiorowisk kserotermicznych i gatunków chronionych.

4. Zwrócenie uwagi na wielką wartość zarośli wiśni karłowatej w walce z intensywną erozją wodną na obszarze lessowym.

Pracę wykonałem pod opieką nieodżałowanej pamięci Profesora Doktora Zygmunta Czubińskiego, który nie szczędził mi cennych rad zarówno podczas badań terenowych, jak i w toku wykonywania pracy. Korzystałem także z Jego księgozbiorów. Pragnę serdecznie podziękować Panu Doc. Dr. F. Celińskiemu za przejrzenie list fitosocjologicznych, cenne wskazówki przy ich ostatecznym opracowaniu, za liczne rady podczas badań terenowych i za wypożyczenie mi wielu publikacji. Składałem także podziękowanie Docentom: Dr. Z. Tobolewskiemu za oznaczenie porostów, Dr. S. Lisowskiemu za sprawdzenie i oznaczenie kilkunastu gatunków mchów, a Dr. W. Żukowskiemu za sprawdzenie i oznaczenie krytycznych gatunków roślin naczyniowych. Dziękuję również Panu Doc. Dr. M. Jasnowskiemu za udostępnienie mi jego własnej literatury.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU

1. Obszar i granice

Obszar objęty badaniami fitosocjologicznymi nad roślinnością kserotermiczną leży w granicach trzech powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i lipskiego. Jego naturalną granicę wyznaczają: od wschodu dolina Wisły na odcinku od Koprzywnicy aż po Solec Sandomierski, od północy dolina Krępanki i szosa prowadząca z Lipska do Ilży, od południa i częściowo od południowego zachodu dolina Koprzywianki. Zachodnią granicę przyjęto dowolnie; przebiega ona mniej więcej w postaci linii prostej od Iwanisk poprzez Waśniów do Ilży.

Ogólna powierzchnia obszaru podana w wyżej wymienionych granicach wynosi 1152 km². Na tak ogromnej powierzchni badania prowa-

dzono głównie w dolinach rzecznych: Wisły, Koprzywianki, Gorzyczanki, Opatówki i Kamiennej oraz parowów i wąwozów mających przeważnie ujście do dolin wspomnianych rzek. Poszukiwania prowadzono w wąwozach, parowach, w wykopach dróg i na zboczach leżących poza zasięgiem podanych dolin rzek.

2. Położenie, geologia, hydrologia i rzeźba

Badany teren wchodzi w skład dwóch subregionów: Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Ilżeckiego *, należących do regionu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Pomiedzy wspomnianymi subregionami zaznaczają się wyraźne różnice krajobrazowe, więc ich charakterystykę podano oddzielnie.

Wyżyna Sandomierska (Opatowska) jako odrębna jednostka Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej (Lencewicz 1957; Lencewicz i Kondracki 1959) została wydzielona jako osobny region florystyczny, pod nazwą Okręgu Sandomiersko-Opatowskiego (Szafer 1959). Rozpościera się ona na wschód od Gór Świętokrzyskich po dolinę Wisły. Obszar wyżyny od południa sąsiaduje z Niecką Nidziańską, a od północy z Przedgórzem Ilżeckim. Naturalne granice wyżyny od północy, wschodu i południa zaznaczają progi uskokowe, a od zachodu obniżanie się Gór Świętokrzyskich i słabo zaznaczający się układ pasmowy (Klimaszewski 1946). Na krawędziach uskokowych stykają się różne utwory geologiczne (Książkiewicz 1953; Lencewicz 1957), stanowiące zarazem granice gleb lessowych, piasków, mad oraz rędzin.

Rzeźba wyżyny jest urozmaicona i bardzo interesująca. Jest ona zbudowana z silnie pofałdowanych skał paleozoicznych i utworów mioceńskich, które według Klimaszewskiego (1946) zostały ścięte wspólną powierzchnią zrównania. Stare formacje geologiczne zostały przykryte utworami plejstoceńskimi, wśród których główną rolę w krajobrazie odgrywa less. Powłoka lessowa dochodzi tu do 30 m (Klimaszewski 1946; Lencewicz i Kondracki 1959) i zajmuje rozległą przestrzeń.

Powierzchnia wyżyny ma charakter lekko falistej równiny, wzniesionej od 300 m n.p.m. na zachodnich jej krańcach, łagodnie opada w kierunku wschodnim i pod Sandomierzem osiąga wysokość około 200 m n.p.m. Wschodni kraniec wyżyny opada stromą krawędzią w dolinę Wisły. Krawędź ta utworzona jest głównie z osadów lessowych,

* Ten subregion wyodrębnił Kondracki (1959) z Przedgórza Radomskiego, które podzielono na Równinę Radomską zaliczoną do Niziny Mazowieckiej i Przedgórze Ilżeckie wchodzące w skład Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej.

spod których miejscami wyłaniają się utwory kambryjskie, jurajskie, kredowe i miocenyjskie.

Szczególnie malowniczo w krajobrazie zaznacza się urwista krawędź wyżyny, wzniesiona około 90 m nad dno doliny Wisły. Leży ona około 1,5 km na północny wschód od Sandomierza. Ten niewielki skrawek krawędzi został nazwany Górą Pieprzowymi (Pieprzówkami). W Górach Pieprzowych na silnie zerodowanych zboczach spod pokrywy lessowej wyłaniają się środkowokambryjskie łupki, które są mocno sprasowane i swoim wyglądem przypominają złoża węgla brunatnego.

Ze względu na odrębne właściwości florystyczne, edaficzne i mikroklimatyczne Szafer (1959) wydzielił Góry Pieprzowe jako osobny podokręg florystyczny. Za osobliwość florystyczną uważa on *Achillea setacea*, który rośnie tu w płatach podzespołu *Stipetum capillatae bothriochloetosum* oraz endemiczny gatunek *Rosa Wagae* (Piotrowski 1897). Godny uwagi jest również płat zarośli z *Cerasus fruticosa*, który rośnie na płytkiej zwietrzelinie łupków środkowokambryjskich. Chociaż odczyn zwietrzliny jest kwaśny ($\text{pH} = 5$), wiśnia jednak kwitnie i obficie owocuje rozmnażając się głównie przez odrośla korzeniowe.

Nieco łagodniej opada wyżyna w dolinę Wisły od Gór Pieprzowych na północ aż do Zawichostu. Na jej stromych krawędziach, ostro ściętych ku przełomowej dolinie Wisły, wykształciły się płaty stepu ostnicowego i inne fragmenty muraw kserotermicznych oraz zarośla z *Cerasus fruticosa* i *Corylus avellana*. Poza Zawichostem Wisła przedziera się przez wyżynę kredową, której silnie zerodowane zbocza z daleka dają znać o sobie swoją białością. Krawędzie te przeważnie porośnięte są przez zarośla z *Corylus avellana*, *Rosa rubiginosa* i *Cerasus fruticosa*.

Pozornie jednolita powierzchnia krajobrazu o okrągłych i płaskich pagórkach lessowych pocięta jest dolinami rzek, parowami, jarami i wąskimi a krętymi, o stromych ścianach wąwozami. Powstawanie takich wąwozów można zauważyć na całej wyżynie, a w szczególności w dorzeczu Opatówki pomiędzy Dacharzewem a Chwałkami, pod Sandomierzem, w pobliżu Zawichostu i pod Ostrowcem. Less łatwiej ulega różnym czynnikom niszczącym, a przede wszystkim erozji wodnej. Pod wpływem ulewnych deszczów, a nawet niewielkich, lecz ciągłych opadów atmosferycznych powstają tu wyrwy, szczeliny, jamy, które w stosunkowo krótkim czasie przekształcają się w rozległe, mocno rozczłonkowane malownicze wąwozy.

Nieco szerszego opisu wymaga sieć rzeczna badanego terenu z uwagi na liczne siedliska roślinności stepowej i kserotermicznej.

Sieć rzeczna Wyżyny Sandomierskiej jest uboga; nie ma tu również większych zbiorników wodnych. Główne rzeki, które przepływają przez wyżynę, to: Koprzywianka, Gorzyczanka, Opatówka i częściowo Kamienna. Doliny Koprzywianki, Gorzyczanki i Opatówki są wąskie i głę-

Fot. 1. Krajobraz Wyżyny Sandomierskiej pocięty przez silnie rozgałęzione wąwozy, w których skupia się roślinność kserotermiczna

Landscape of the Sandomierz Upland cut by branched gorges covered by the xerothermic vegetation

Fot. 2. Południowe skłony przełomowej doliny Opatówki pomiędzy Kicharami a Dwikozami. Liczne stanowiska roślin stepowych i kserotermicznych

Southern slopes of the Opatówka valley breaking through between Kichary and Dwikozy. Numerous sites with steppe and xerothermic plants

bokie; charakteryzują krajobraz wyżynny. Natomiast Kamienna charakteryzuje się stosunkowo głęboką i szeroką doliną.

Koprzywianka wypływa z północnego stoku gniazda Wesołówki (Góry Świętokrzyskie) i obiera kierunek południowo-wschodni, podpływa pod Klimontów i nagle skręca na południowy zachód. Po krótkim przebiegu łączy się z Wiązownicą i znów obiera kierunek pierwotny wpadając do Wisły na wschód od Koprzywnicy. W górnym i środkowym jej biegu dolina jest wąska i głęboko wcięta w wylesione wzgórza. Na odcinku od Klimontowa do Królewic rzeka płynie w głębokim parowie o charakterze przełomu przez wzgórza Nawodzicko-Gieraszkowskie. Na stromych zboczach lessowych doliny Koprzywianki, w pobliżu Klimontowa, spotykamy zarośla *Cerasus fruticosa* i *Corylus avellana*. W dalszym biegu dolina Koprzywianki rozszerza się i jest już częściowo podmokła oraz pocięta rowami. Dolny bieg rzeki poniżej Koprzywnicy przepływa po tarasach rozległej doliny Wisły. Obszar dolnego odcinka Koprzywianki leży już w granicach Niecki Nidziańskiej. W niektórych wąwozach lessowych i na zboczach doliny Koprzywianki obnażają się utwory dolnokambryjskie — kwarcyty i łupki.

Niewielką rzeką, jaka przepływa przez Wyżynę Sandomierską, jest Gorzyczanka. Posiada wiele dopływów, które tak samo jak główne koryto rzeki przedzierają się wśród głębokich wąwozów lessowych. Rzeka wpada do Wisły powyżej Sandomierza. Poziom wody w rzece jest niski, a nawet podczas upalnych letnich miesięcy prawie całkowicie wysycha. Jedynie większe opady deszczu utrzymują wyższy poziom wody w korycie rzeki. Wtedy woda jest żółta, mocno zanieczyszczona pyłem lessowym.

Przez środek wyżyny przepływa Opatówka, która bierze początek ze wschodnich stoków Pasma Jeleniowskiego (Góry Świętokrzyskie) i wzniesień położonych na zachód od Opatowa. W początkowym swoim biegu wykorzystuje uskoki, a następnie płynie w depresji peryferycznej wypełnionej osadami miocenu (Lencewicz 1957; Lencewicz i Kondracki 1959); jest wąska i silnie wcięta w pokrywę lessową. W środkowym biegu dolina Opatówki znacznie się poszerza i jest nawet podmokła. Na kilka kilometrów przed ujściem rzeki do Wisły (na odcinku Międzygórz—Dwikozy), na jej stromych brzegach wypiętrzają się spod pokrywy lessowej zlepierce drobnoziarnistego wapienia mioceńskiego. Przed Dwikozami dolina Opatówki jest bardzo wąska, a rzeka z trudem przedziera się pomiędzy utworami mioceńskimi. Na południowych zboczach doliny, począwszy od Łukawy aż do Słupczy, znajdują się dobrze zachowane fragmenty stepu ostnicowego, płaty muraw kserotermicznych z *Adonis vernalis*, *Pulsatilla pratensis* var. *nigricans* i *Linosyris vulgaris* oraz zarośla z *Cerasus fruticosa*.

Największą rzeką w badanym terenie jest Kamienna. Źródła jej leżą

na wysokości około 280 m n.p.m. pod Odrowążem w pobliżu źródeł Czarnej — prawego dopływu Pilicy — i Jabłownicy, dopływu Radomki. Dolina Kamiennej jest szeroka i głęboka. W połowie drogi pomiędzy Skarżyskiem a Wąchockiem zmienia swój bieg i płynie w kierunku południowo-zachodnim; przepływa przez Wąchock, Wierzbnik, Ostrowiec aż po Ćmielów. Ten odcinek doliny stanowi granicę krajobrazową oddzielającą Wyżynę Sandomierską od Przedgórza Ilżeckiego. Od Ćmielowa Kamienna wykorzystuje zagłębienie uskoku i płynie w kierunku północnym. Począwszy od Ćmielowa aż po Bałtów dolina rzeki zwęża się. Na jej stromej lessowej krawędzi w Podgrodziu rosną liczne gatunki kserotermiczne, między innymi *Adonis vernalis*, *Anemone sylvestris*, *Carex supina* i *Cerasus fruticosa*. W Bałtowie Kamienna tworzy malowniczy przełom, skręca w kierunku północno-wschodnim i wpada do Wisły na wysokości 130 m n.p.m. Na krawędziach doliny Kamiennej, na odsłoniętych utworach kredowych w Bałtowie, we wsi Okół i w Pęt-kowicach oraz w Zęborzynie spotykamy zarośla z *Cerasus fruticosa* i *Corylus avellana*. Odcinek Kamiennej od Ćmielowa do jej ujścia leży już na terytorium Przedgórza Ilżeckiego.

Wyżłobione w grubym płaszczu lessowym głębokie doliny rzeczne są zupełnie suche, tylko w okresie wiosennym płyną tam niewielkie strumyki. W innych porach roku opady atmosferyczne wsiąkają w głębokie szczeliny i wyrwy znajdujące się w lessie. Według Lencwicza (1957) istnieje tu podobny odpływ wody, jaki spotykamy na terenach krasowych. Duży odpływ wód i naturalny drenaż w postaci bardzo licznych wąwozów i jarów oraz podłoże zasobne w CaCO_3 stwarzają dogodne warunki do osiedlenia się kalcofilnej roślinności kserotermicznej, bądź też stepowej, która niegdyś zajmowała duże powierzchnie na Wyźnie Sandomierskiej. Dziś spotykamy ją tylko na stanowiskach niedostępnych dla rolnika.

Drugim subregionem jest Przedgórze Ilżeckie. Od południa sąsiaduje on z Wyżyną Sandomierską, od której oddziela go wyraźnie zaznaczająca się w krajobrazie granica doliny Kamiennej i zwarty zasięg pokryw lessowej. Wschodnia granica prowadzi wzdłuż stromej krawędzi doliny Wisły, którą budują utwory kredowe. Od północy Przedgórze Ilżeckie przechodzi w Równinę Radomską należącą już do Niziny Mazowieckiej.

Cały ten obszar pokrywają utwory zlodowacenia środkowopolskiego. Przez ten subregion przebiega również granica tego zlodowacenia wyznaczona przez Samsonowicza. Stacjonujący tu lodowiec pozostawił po sobie ślady w postaci pagórków żwirowych, stosunkowo dobrze zachowanych ozów ciągnących się od Cegielni do Tarłowa oraz piaszków. Piaski zasypały obszar położony na północ od Kamiennej pomiędzy Starachowicami, Ostrowcem, Ilżą a Bałtowem. Spod zasypiania dylu-

wialnego wychodzą skały kredowe i jurajskie (S a m s o n o w i c z 1931). Pomiędzy Solcem Sandomierskim, Iłżą a ujściem Kamiennej leży płat lessu. Jest to pozostałość dawnej pokrywy, która została osadzona podczas nasuwania się lodów (L e n c e w i c z 1957). Piaszczyste nieurodzajne tereny porośnięte są przez lasy sosnowe.

Przez Przedgórze Iłżeckie przechodzą dwa okręgi geobotaniczne, wyznaczone przez S z a f e r a (1959): wschodnia część okręgu Koneckiego i południowo-wschodnia część okręgu Radomsko-Kozienickiego.

3. Stosunki klimatyczne

Obok stosunków edaficznych najważniejszym czynnikiem decydującym o występowaniu roślinności kserotermicznej jest klimat. Badany teren leży w zasięgu radomskiej dzielnicy klimatycznej wyznaczonej przez G u m i ń s k i e g o (1948). Dzielnica ta jest znacznie cieplejsza od dzielnicy lubelskiej i dzielnicy wschodniej podlaskiej (L e n c e w i c z i K o n d r a c k i 1959).

Charakterystykę stosunków klimatycznych oparto na podstawie danych z Atlasu opadów atmosferycznych w Polsce za lata 1891—1930 zestawionych przez W i s z n i e w s k i e g o (1953) oraz nowszych danych uzyskanych z Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego w Warszawie.

Średnie roczne opady dla badanego terenu za okres od 1891—1930 wynosiły od 545 do 595 mm. Najwyższe opady notuje stacja w Denkowie koło Ostrowca — 595 mm. Najniższe opady ma Solec nad Wisłą (545 mm) leżący na północno-wschodnim krańcu badanego terenu. Maksimum opadów przypada na lipiec. Duże opady występują również w czerwcu i sierpniu. W okresie wegetacyjnym (maj — lipiec) ilość opadów wynosi średnio 218 mm. Najuboższymi w opady miesiącami są: luty, styczeń i marzec, pomiędzy którymi istnieją minimalne różnice ilościowe. Nieco bogatszymi w opady są listopad i grudzień. Stosunkowo korzystnie przedstawiają się opady w kwietniu, które mają decydujący wpływ na początkowy okres wegetacyjny roślin.

Poniżej podaję tabelę 1, która ilustruje rozkład opadów w ciągu roku*.

Z danych, jakie uzyskano po roku 1947, a pochodzących z trzech stacji opadowych: dwóch nowozałożonych (Sandomierz i Tarłów) oraz jednej istniejącej już dawniej (Solec nad Wisłą), która wznowiła swoje systematyczne obserwacje od 1948 r., wynika, że średnie roczne opady są niższe o 41 mm, niższe są również o 29 mm opady dla okresu wegetacyjnego (maj — lipiec) w stosunku do obserwacji długoletnich pocho-

* Tabele 6, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 40, 42 znajdują się pod opaską na III str. okładki.

Tabela 1 — Table 1

Srednie opady na Wyżynie Sandomierskiej i na Przedgórzu Iłżeckim
Mean precipitations on the Sandomierz Upland and the Iłża Forehills

Nazwa stacji Meteorological station	Wysokość n.p.m. Altitude a.s.l.	Szerok. Geogr. Latitude	Dł. Geogr. Longitude	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Year	Okr. weget. Veget. season
Solec n. Wisłą /Sandomierski/	163	51° 08'	21° 46'	28	27	28	37	47	72	89	70	42	37	33	35	545	208
Denków	176	50° 56'	21° 26'	26	24	29	48	56	79	99	79	48	39	35	33	595	234
K. Ostrowca	217	50° 50'	21° 28'	25	24	28	45	52	73	89	73	46	39	36	30	560	214
Podole	265	50° 52'	21° 07'	25	27	28	45	51	73	93	73	42	36	36	31	560	217
Słupia Stara				26	25	28	44	54	76	92	76	44	38	35	32	565	218
Srednio - Average																	

Tabela 2 — Table 2

Srednie opady od 1948 r.
Mean precipitation from 1948

Nazwa stacji Meteorological station	Wysokość n.p.m. Altitude a.s.l.	Szerok. Geogr. Latitude	Dł. Geogr. Longitude	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XI	XII	Rok Year	Okr. weget. Veget. season	Uwagi Remarks
Solec n. Wisłą	127	51° 8'	21° 46'	34	30	28	33	43	58	72	62	33	32	34	487	173	Srednia z po- miarów 12 lat
Sandomierz	200 207	50° 41'	21° 44' 30'	30	30	33	35	56	65	79	69	52	37	47	592	200	Srednia z po- miarów 11 lat
Tarłów		51° 0'	21° 42'	31	29	25	33	43	68	84	59	38	35	39	512	195	Srednia z po- miarów 10 lat
Srednio - Average				32	30	29	34	47	64	78	63	41	31	40	524	189

Fot. 3. Charakterystyczne powstawanie wąwozów na wylesionych zboczach doliny
Wisły między Dębniem a Solcem Sandomierskim
Characteristic development of gorges on slopes of the Vistula valley deprived
of forest between Dębno and Solec Sandomierski

Fot. 4. Charakterystyczne nawisy wiśni karłowatej *Cerasus fruticosa* (Pall.) Wo-
ronow, na słonecznych, pionowych ścianach wąwozów lessowych, przez które
wiodą drogi polne
Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow hanging over the vertical walls of sunny loess
ravines

Tabela 3 - Table 3
Średnie miesięczne i roczne temperatury oraz temperatury okresu wegetacyjnego za lata 1948 - 1958
Mean monthly and annual temperature and the mean temperature of the vegetation period in the years 1948 - 1958

Nazwa stacji Meteorological station	Wysokość n.p.m. Altitude a.s.l.	Szerok. Geogr. Latitude	Dł. Geogr. Longitude	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Year	Okres weget. Veget. season
Sandomierz	200 207	50° 41'	21° 44' 30"	-2,9	-2,8	4,7	8,8	13,5	17,0	18,4	17,0	13,4	10,0	2,9	-0,2	8,2	16,3

Tabela 4 - Table 4
Średnie miesięczne i roczne temperatury oraz średnie temperatury okresu wegetacyjnego za lata 1891 - 1930
/Wiszniewski, Guminski, Bartnicki 1949/
Mean monthly and annual temperature and the mean temperature of the vegetation period in the years 1891-1930
/Wiszniewski, Guminski, Bartnicki 1949/

Nazwa stacji Meteorological station	Wysokość n.p.m. Altitude a.s.l.	Szerok. Geogr. Latitude	Dł. Geogr. Longitude	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Year	Okres weget. Veget. season
Kielce	276	50° 52'	20° 30'	-3,5	-2,2	1,7	7,7	13,0	16,5	18,0	16,8	13,3	7,8	2,2	-1,7	7,5	15,8
Rytwiany	178	50° 32'	21° 13'	-3,0	-2,0	2,0	7,4	15,4	16,3	18,3	16,7	12,8	8,0	2,7	-1,2	7,6	16,0

dających z lat 1891—1930. Minimalne są również różnice w rozkładzie średnich wartości dla niektórych miesięcy. Ze względu na krótkotrwałość obserwacji (10—12 lat) dane te mogą mieć jedynie wartość orientacyjną co do opadów badanego obszaru. Na ogół wykazują one wyraźne podobieństwa do cytowanych wyżej średnich długoletnich dla Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Powyższe dane wskazują na to, że opady roczne nie przekraczają 600 mm. Tabela 2 podaje średnie opady roczne oraz średnie wartości dla okresu wegetacyjnego, jakie uzyskano w stacjach od roku 1948.

Warunki termiczne przedstawiono w oparciu o obserwacje jednej stacji, która zresztą notuje te dane dopiero od kilkunastu lat. Będą więc mniej dokładne, a przedstawione cyfry mogą mieć wartość orientacyjną.

Średnia roczna temperatura dochodzi tu do $8,2^{\circ}\text{C}$, a średnia lipca $18,4^{\circ}\text{C}$. Najchłodniejszym miesiącem w roku jest styczeń, średnia roczna z okresu 11-lecia wynosi tu $-2,9^{\circ}\text{C}$. Pod tym względem stacja Sandomierz notuje wyższe średnie temperatury stycznia, lipca i roku w stosunku do stacji Rytwiany (leżącej na obszarze Niecki Nidziańskiej, położonej około 23 km na południowy wschód od południowego krańca Wyżyny Sandomierskiej) oraz stacji Kielce (leżącej w odległości 36 km na zachód od zachodnich krańców Wyżyny Sandomierskiej). Różnice te przedstawiają tabele 3 i 4.

Średnia temperatura okresu wegetacyjnego (maj — lipiec) wynosi około $16,3^{\circ}$.

Średnie miesięczne maksima za okres 1948—1958 dla lipca wynoszą $30,8^{\circ}$, a dla stycznia $6,8^{\circ}$. Natomiast średnie miesięczne minima również za ten okres wynoszą dla lipca 9° , a dla stycznia $-16,2^{\circ}$. Największa rozpiętość wahań temperatury przypada na miesiące: maj, czerwiec, wrzesień i lipiec. Wahaniami temperatur dla innych miesięcy są niższe. Wśród skrajnych temperatur, jakie zanotowano w ciągu ostatnich lat, maksimum przypadło na lipiec 1957 r. ($+35,4^{\circ}\text{C}$), a minimum na luty 1956 r. ($-28,6^{\circ}\text{C}$).

Stosunkowo wysoka amplituda roczna jedenastolecia wynosząca około $21,3^{\circ}$ oraz wysokie amplitudy pomiędzy maksimum a minimum wskazują na to, że obszar posiada rysy klimatu kontynentalnego. Stosunki klimatyczne Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego nie układają się jednolicie. Dużym odchyleniem od ogólnego makroklimatu podlega klimat stromych zboczy, wąwozów i krawędzi dolin rzecznych o wystawie południowej lub zbliżonej do niej. Mikroklimat tych zboczy jest na wskroś klimatem kontynentalnym.

Bardzo interesujące są pod tym względem wyniki badań lokalnego klimatu okolic Dwikóz opracowanego przez Kozłowską-Szczęsną (1957). Chociaż badania te były krótkotrwałe (od 5 lipca do 15 sierpnia

1954 r.), to jednak wykazały wyraźny wpływ rzeźby terenu na temperaturę, wilgotność powietrza i wiatr.

W obniżeniach terenu i dolinach rzecznych temperatury minimalne i maksymalne są niższe w stosunku do miejsc wyżej położonych. Na przykład w ujściowej części doliny Opatówki różnice temperatury minimalnej dnia 7.VIII.1954 r. między dnem doliny, a sąsiednimi wzniesieniami dochodziły do 4°C , maksymalne od $0,5^{\circ}$ do $0,9^{\circ}\text{C}$. Natomiast w dolinie potoku Rzeczycy, u ujścia jej do doliny Wisły, w dniu 16.VII.1954 r. temperatura minimalna osiągnęła niższe wartości od $1,2^{\circ}$ do $5,2^{\circ}\text{C}$ w stosunku do górnego poziomu wyżyny lessowej, a maksymalna od $0,5^{\circ}$ do $0,6^{\circ}\text{C}$. Także w niektórych dniach u stóp zboczy i u wylotu wąwozów notowano niższe temperatury minimalne, związane w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych z zaleganiem lub spływem zimnego powietrza po pochyłościach terenu.

Skrajne temperatury maksymalne na różnych stanowiskach obserwacyjnych osiągały wartość od $+26,3^{\circ}$ do $31,9^{\circ}\text{C}$. Najwyższą temperaturę maksymalną ($+31,9^{\circ}\text{C}$) zanotowano dnia 7.VIII.1954 r. na wyżynie lessowej ($h = 209$ m) rozciętej doliną Opatówki. Miejsce to charakteryzowało się ekspozycją południową i było osłonięte od strony północnej.

Średnia wilgotność względna wykazuje większe amplitudy dobowe na wzniesieniach w porównaniu z obniżeniami terenu; różnice w pewnych godzinach mogą przekraczać 40%.

Temperatury powietrza na wysokości 1 m na zboczach o ekspozycji południowej i północnej nie wykazują istotnych różnic. Różnice odnoszą się tylko do temperatury gruntu i przyziemnych warstw powietrza. Tylko w dni słoneczne zbocza o ekspozycji południowej w porównaniu z północnymi wykazują wyższe temperatury maksymalne.

Nawet na niewielkiej przestrzeni roślinność spotyka odrębne warunki mikroklimatyczne. Już Dziubałtowski (1923) zwrócił na to uwagę. W celu potwierdzenia swoich przypuszczeń wykonał on szereg pomiarów temperatury, wilgotności powietrza i gleby. Obserwacje przeprowadził na wzniesionym stoku doliny Wisły między Sandomierzem a Górami Pieprzowymi. Do tego celu wybrał cztery punkty: jeden znajdował się w miejscu darniowym, drugi na zboczu o nachyleniu $39^{\circ}10'$ o wystawie południowo-zachodniej, trzeci na szczycie zbocza na polu obsadzonym ziemniakami, a czwarty znajdował się na zboczu o wystawie północno-zachodniej. Najbardziej skrajne temperatury zaznaczały się pomiędzy zboczem o wystawie południowo-zachodniej i północno-zachodniej. Również zbocza o wystawie południowo-zachodniej wykazują wyższy niedosyt wilgotności w stosunku do zboczy o wystawie północno-zachodniej.

Na podkreślenie zasługują obserwacje Dziubałtowskiego dotyczące zanikania pokrywy śnieżnej w pierwszych początkach wiosny i najwcześniejszego zakwitania pewnych gatunków stepowych. Z koń-

cem marca, gdy na zboczach północnych leży jeszcze śnieg, na południowym zakwitają *Adonis vernalis*, *Potentilla arenaria* i inne gatunki.

Liczba dni mroźnych jest mniejsza niż 50, a dni z przymrozkami od 115 do 117. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 60 dni. Okres wegetacyjny trwa 210 dni. Powyższe dane charakteryzują dzielnicę radoską (Lencewicz i Kondracki 1959).

4. Stosunki glebowe

W ostatnich latach ukazała się praca Strzemskiego omawiająca gleby województwa kieleckiego. Praca ta, a przede wszystkim mapa gleb województwa kieleckiego posłużyły mi do ogólnego scharakteryzowania gleb Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Ilżeckiego.

Gleby badanego obszaru cechuje duża mozaikowość. Ten ich mozaikowy charakter związany jest przede wszystkim z podłożem skalnym, z którego wykształciły się gleby, w mniejszym stopniu zaś z ukształtowaniem rzeźby terenu.

Strzemski (1957) wyróżnia tu: 1) gleby wykształcone z utworów glacialnych i fluwioglacjalnych z przewagą gleb lekkich, zwłaszcza piasków, nad glebami średnimi i ciężkimi; 2) gleby wytworzone z utworów glacialnych i fluwioglacjalnych wykazujące przewagę gleb ciężkich i średnich; 3) gleby powstałe z lessów; 4) rędziny trzeciorzędowe i kredowe skompleksowane przeważnie z piaskami plejstocеныskimi i 5) gleby aluwialne.

Przeglądając mapę gleb badanego terenu stwierdzamy, że dominującą rolę w kształtowaniu się ich odegrał less. Tworzy on dwa olbrzymie płaty; pierwszy znajduje się na Przedgórzu Ilżeckim, drugi na Wyżynie Sandomierskiej. Płat lessu Przedgórze Ilżeckiego wciną się klinem od ujścia rzeki Kamiennej i od Solca Sandomierskiego w kierunku zachodnim aż po Ilżę. Nosi on nazwę ilżeckiego klina lessowego. Jest to less płytki o charakterze ostańcowym, zachowanym na płaskich wycinkach powierzchni wododziałowej (Radłowska 1960).

Płat lessu Wyżyny Sandomierskiej — jeden z największych w całym województwie kieleckim — pokrywa grubą powłoką południowo-wschodni masuw paleozoiczny Gór Świętokrzyskich tworząc wysoką równinę. Z lessu wykształcił się tu główny typ gleb lessowych.

Lessy Wyżyny Sandomierskiej nazywane są lessami opatowsko-sandomierskimi. Poza glebami lessowymi ze skały lessowej wykształciły się zdegradowane czarnoziemy nalessowe. Są to jedne z bardziej urodzajnych gleb w Polsce. To też wzgórza lessowe już od najdawniejszych czasów zostały wykorzystane dla celów rolniczych.

Zdegradowane czarnoziemy nalessowe w postaci większych płatów spotykamy pomiędzy Opatowem, Klimontowem i Sandomierzem, w od-

Ryc. 1. Mapa gleb Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórze Iłżeckiego (wg Strzemskiego 1954)

Map of soils of Sandomierz Upland and Iłża Forehills (after Strzemski)

ległości około 4 km na północny wschód od Opatowa pomiędzy Balbinowem, Gierczycami, Sobótką Szlachecką, Przybysłowicami, Mikułowicami, Wszechświętem i Podolem, w okolicach Waśniowa i około 7 km na wschód od Bodzentyna.

Zwarty kompleks lessów opatowsko-sandomierskich rozciąga się szerokim, około 30 km, pasem pomiędzy Koprzywnicą poprzez Sandomierz aż do Zawichostu w kierunku północno-zachodnim wzdłuż koryta rzeki Opatówki i dociera w postaci płytkich i poroździelanych płatów w okolicy Kielc i Suchedniowa.

Na południowej i południowo-zachodniej granicy zwartej pokrywy lessowej rozwinęły się smugi deluwii lessowych, które tworzą bardzo zawiłą i mało ostrą granicę lessów. Less tworzy tu płaty w postaci półwyspów np. płat nad doliną Koprzywianką, czy też rozczłonkowany płat lessowy pod Iwaniskami. Stosunkowo duży płat o długości około 20 km tworzy wyspę położoną na zachód od rzeki Koprzywianki. Znajduje on najwyższe punkty pasemka Wygiełzowskiego. Niewielki płat lessu spotykany pod Łoniowem, otoczony jest licznymi deluwiami. Łoniowski płat lessu najdalej wysuwa się na południe.

Od północnej granicy zwartej pokrywy lessowej leżą liczne odizolowane wysepki płatów lessowych. Większy płat lessu ciągnie się na północnym strzeni około 8 km od urwistej krawędzi doliny Kamiennej na odcinku od Skały do Smykowa na wschód, gdzie kończy się w odległości około 1 km od Ożarowa. Silnie zniszczony płat lessu ciągnie się od Czyżowa do Zawichostu przez Linów aż do Lasocina. Poza tym spotykamy jeszcze kilka drobnych płatów na zboczach Kamiennej pod Bałtowem. Według Samsonowicza (1924) odizolowane wysepki płatów lessowych: Łoniowa na południu oraz okolic Ożarowa na północy i okolic Lasocina na północnym wschodzie łączyły się z głównym obszarem lessowym.

Lessy opatowsko-sandomierskie i gleby wykształcone z nich były przedmiotem różnorodnych badań (Dylik 1954; Jahn 1956; Lenciewicz 1955; Miklaszewski 1913; Pierzchałko 1954; Samsonowicz 1924; Strzemski 1954). Badania Dylika, Jahna, Pierzchałko ograniczyły się do szeregu odkrywek z okolic Ostrowca i Sandomierza w celu ustalenia poglądu na zagadnienie genezy lessów w Polsce. Ich stroną glebotwórczą zajmowali się Lenciewicz, Miklaszewski i Strzemski.

Obserwacje poczynione na lessach stromych ścian wawozów, zboczy bądź też jarów oraz na profilach glebowych wykonanych przeze mnie w terenie dały jasny obraz, że nie zachodzi tu proces iluwialny. Na odkrywkach, obrywach czy też profilach glebowych można odczytać dwa wyraźnie oddzielające się poziomy w skale lessowej; poziom gleby o różnej miąższości (zależnie od nachylenia terenu), o barwie ciemnożółtej poprzez popielatą do prawie czarnej i poziom skały o miąższości od kilkudziesięciu cm do kilku metrów, zabarwiony na kolor jasnożółty.

W skale lessowej spotykano liczne konkracje CaCO_3 . Najwięcej marglistych utworów CaCO_3 znajdowano na głębokości od 60—110 cm. Prawie we wszystkich odkrywkach lessowych zauważono, że less wykazuje łupliwość pionową i poprzedzielany jest białą siatką kapilar, co szczególnie uwidacznia się na świeżych odkrywkach. Na podstawie składu mechanicznego i budowy makroskopowej ten rodzaj skały trzeba zaliczyć według Dylika (1954), Musierowicza (1958) i innych do lessów typowych.

O różnej miąższości gleby lessowej decyduje nachylenie terenu. W miejscach o większym stopniu nachylenia gleba podlega ciągłemu zmywaniu. Jeżeli się temu nie przeciwdziała, podlegają rozmywaniu, zmywaniu i osuwaniu przez wody powstałe z opadów deszczu lub topniejącego śniegu także głębsze utwory pyłowe. Częstki lessu przeniesione przez wody w miejsca niższe pozostawiane są w postaci namywów (deluwiiów). Bardzo intensywne procesy erozyjne przebiegają zwłaszcza tam, gdzie nie ma zwartej i trwałej pokrywy roślinnej. Wobec niestałości skały lessowej powstaje tu krajobraz bardzo rozczłonkowany przez liczne wąwozy i jary, z których sterczą ostańce lessowe.

Liczne słoneczne wąwozy, jary, strome zbocza wzniesień i parowów stały się ostoją dla roślinności stepowej.

Na niewielkich powierzchniach spod pokrywy plejstoczeńskiej wylaniają się utwory starszych formacji geologicznych. Ze skał zasobnych w CaCO_3 wykształciły się rędziny. Ten rodzaj gleb rozprzestrzenia się na północ od swartego płata lessów opatowsko-sandomierskich pomiędzy uskokową doliną rzeki Kamiennej oraz jej ujściem, a doliną Wisły. Rędziny na tym niewielkim obszarze mają charakter wyspowy i poprzedzielane są luźnymi i gliniastymi piaskami, glebami wykształconymi z glin lub ilów zarówno o poziomach powierzchniowych lżejszych, pyłowych, jak i o niepyłowych. Rędziny tego wycinka obszaru jako gleby urodzajne zajęte są pod uprawy polowe.

Na lewej stromej krawędzi doliny Wisły i w licznych parowach, które tworzą odgałęzienia doliny, ciągnie się zwarty wąski pas płytkich rędzin wykształconych z margli kredowych. Rozprzestrzeniają się od Lasocina aż poza Solec Sandomierski. Są to gleby w początkowych stadiach rozwoju o bardzo słabo wykształconym profilu i barwie zupełnie białej. Tylko w miejscach mniej pochyłych przyjmują barwę szarą, a nawet czarną. Rędzina o barwie ciemnej w okresie opadów atmosferycznych jest zupełnie lepka. Natomiast w upalne słoneczne dni szybko wysycha i przyjmuje strukturę ziarnisto-orzechową.

Płytkie rędziny na stromych i urwistych krawędziach doliny Wisły opanowane zostały przez zarośla z *Peucedano-Coryletum*, niewielkie płyty zespołu *Prunetum fruticosae* i inną roślinność stepową lub kserotermiczną.

W dolinie Opatówki i niektórych parowach biegnących prostopadle do doliny rzeki pomiędzy Dobrocicami a Dwikozami spotykamy odkrywki w postaci utworów mioceńskich. Z tych utworów wykształciły się małeńkie pasemka rędziny trzeciorzędowej. Płytką rędziną trzeciorzędową nie przedstawia większej wartości dla rolnika ze względu na małą wydajność; jest to gleba wybitnie sucha i zupełnie luźna. Te małeńkie skrawki gleby pozostawione przez rolnika jako nieużytki opano-

wane zostały przez płyty stepu ostnicowego, bądź też inną roślinność stepową.

We wsi Żurawniki w dorzeczu Opatówki na małym pasemku dolomitów dewońskich wytworzyła się bardzo płytka gleba typu rędziny. Na glebie tej występuje podzespół *Stipetum capillatae bothriochloetosum*.

Drobne płyty rędzin kredowych spotykamy jeszcze w okolicy Łagowa.

W obniżeniach terenowych oraz dolinach rzek zalegają mady i piaski aluwialne. Rozciągają się szerokim pasem w dolinie Wisły, w dolinie Kamiennej począwszy od Brodów Ilżeckich aż po ujście rzeki i w dolinie Opatówki na odcinku Międzygórz—Kichary. W innych obniżeniach terenowych np. w okolicach Ożarowa oraz w dolinie Krępianki spotykamy gleby mułowo-błotne.

Na pozostałej części badanego obszaru i na terenach sąsiadujących z nim rozprzestrzeniają się gleby, które głównie wykształciły się z utworów glacialnych. Obszary te prawie w całości pokrywają luźne i słabo gliniaste piaski, piaski gliniaste (szczyrki) i gleby wytworzone z glin lub ilów o różnej zawartości części spławialnych.

Obszary gleb piaszczystych słabo urodzajnych i gleby nie nadające się pod uprawy polowe zajęte zostały pod lasy. Większe kompleksy leśne rozprzestrzeniają się pomiędzy Ostrowcem, Ćmielowem, Bałtowem, Ilżą a Starachowicami i noszą nazwę lasów Ćmielowsko-Starachowickich. Natomiast mniejsze partie lasów zachowały się na południowych krańcach badanego terenu pomiędzy Nawodzicami, Bogorią, Staszowem a Rachowem.

Obszary lessowe są zupełnie wylesione. Jedynie małe partie zachowały się w okolicach Bodzechowa, Sadowia i Kleczanowa. Na niedostępnych zboczach i wąwozach rosną jeszcze małe zagajniki.

We wszystkich zespołach z roślinnością kserotermiczną przeprowadzono badania glebowe i wyniki tych badań podano przy charakterystyce poszczególnych zespołów. Poza tymi zbiorowiskami badań glebowych nie prowadzono.

Rozmieszczenie opisanych wyżej typów gleb badanego terenu obrazuje załączona mapka (ryc. 1) opracowana przez zespół pracowników IUNG w Puławach pod kierunkiem Strzemińskiego (1954); nie uwzględniono na niej rędzin o powierzchni mniejszej od 1 ha.

5. Wpływ człowieka na przekształcenie szaty roślinnej

Działalność człowieka związana z przeobrażeniem szaty roślinnej badanego terenu datuje się już od czasów przedhistorycznych. Liczne ślady i szczątki kultury prehistorycznej jak naczynia, broń kamienna, ozdoby i szkielety ludzi, znaleziono m. in. na cmentarzysku we wsi Złota, w Sam-

borcu, Gorzyczanach, Nowym Darominie, na Górze Gawroniec-Pałyga w Ćmielowie, Jukowicach i Mierzanowicach pochodzą z młodszej epoki kamiennej (neolitu). Opisali je w latach 1924—1936 Antoniewicz, Żurowski, Salewicz, Podkowińska, Krysiak, Krzak, Kowalczyk, Miśkiewicz, Rauhut, Podkowińska i Wtorek*.

Powyższe dane wyraźnie wskazują na to, że Wyżyna Sandomierska o urodzajnych glebach lessowych dość licznie zamieszkała była przez człowieka w neolicie.

Według Kozłowskiego (1924, por. Kozłowska 1959) wyżyny lessowe nie były prawdopodobnie pokryte zwartym lasem, gdyż były wolne od plemion myśliwskich, które trzymały się terenów leśnych i piaszczystych. Szata roślinna miała tu charakter parkowy. Rosły rozrzucone płyty prześwietlonych gajów, gęste zarośla leszczyny i zarośla z wiśnią karłowatą. Przestrzenie wolne od lasów, o skłonach wystawionych do słońca, porastała roślinność stepowa.

Obszary lessowe o takim charakterze roślinności stopniowo opanowywane były przez przybyszów z południa. Były to plemiona pastersko-rolnicze. Plemiona te przyprowadziły ze sobą zwierzęta domowe oraz przyniosły ziarna zbóż. Zamieszkiwały one w jamach (ziemiankach) wykopanych przez siebie w skale lessowej. Budowle wznoszono w pobliżu rzek.

O życiu tych plemion mówią nam ślady osad rolniczo-pasterskich we wsi Złota pod Sandomierzem i na górze Gawroniec-Pałyga w Ćmielowie.

Różnorodny materiał ceramiczny pochodzący z czterech epok: neolitu, przełomu brązu i halsztatu, okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza, odkryty w osadzie w Mierzanowicach pow. Opatów, wyraźnie mówi o ciągłości osadnictwa na urodzajnych glebach lessowych (Miśkiewicz 1959).

Obszary lessowe już od najdawniejszych czasów zostały zamienione na pola uprawne. Ziemia Sandomierska już od dawna słynie z uprawy pszenicy i buraka cukrowego. Buraki cukrowe przerabia się w miejscowych cukrowniach (Częstocice, Włostów), a warzywa w Fabryce Przetworów Owocowych w Dwikozach. Ta ostatnia fabryka w wielkim stopniu zaważyła na zmniejszaniu się powierzchni roślinności kserotermicznej. Dobrze wykształcone zarośla z wisienką stepową rozwijające się na stromych krawędziach doliny Wisły karczują się, a na ich miejscu wprowadza się czarną porzeczkę. Natomiast zbocza mniej strome,

* Por. Wiadomości Archeologiczne t. IX, XVII—XIX i XXVI, Archeologia Polski t. II i III, Sprawozd. Archeol. t. V, IX, XI i XV i inne wydawnictwa.

dotychczas zajęte przez płaty muraw kserotermicznych, zamienia się na poletka pod uprawy pomidorów.

Wyżyna Sandomierska należy do obszarów wybitnie rolniczych, natomiast Przedgórze Ilżeckie do rolniczo-leśnych. Z danych Strzeńskiego (1954) wynika, że zaledwie 13% ogólnej powierzchni powiatu sandomierskiego przypada na las, a w powiecie opatowskim 19%. Są to przeważnie niewielkie zagajniki, o czym już była mowa na innym miejscu. Lesistość Przedgórza Ilżeckiego wynosi 25% ogólnej powierzchni.

Niski procent lesistości Wyżyny Sandomierskiej powoduje tu wielką drożyznę drewna na budowę i opał. Chłopi, aby zdobyć nieco drewna na opał obsadzają strome zbocza akacją, bądź też klonem jesionolistnym. Z biegiem czasu ocienione płaty muraw kserotermicznych lub płaty z wiśnią stepową ustępują miejsca gatunkom mezofilnym. Z drugiej strony przez karczowanie małych zagajników oraz zarośli chłopi protegują niekiedy zbiorowiska muraw kserotermicznych.

W ostatnich latach na Ziemi Sandomierskiej rozwija się dość intensywnie budownictwo wiejskie, które potrzebuje do budowy olbrzymich ilości żwiru i piasku. W tym celu eksploatuje się żwirowiec mioceniński w dolinie Opatówki, nawet w miejscach, w których zachowały się relikto-
we płaty z roślinnością stepową. Liczne kopalnie żwirowca i stałe powiększanie się dołów poeksploatacyjnych zmniejszają płaty roślin reliktowych lub powodują ich zniekształcenia.

II. METODYKA PRACY

1. Uwagi ogólne

Badania terenowe nad roślinnością kserotermiczną Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Ilżeckiego przeprowadzone zostały w latach 1959—1963. W pierwszym roku ograniczono się przede wszystkim do poszukiwań i inwentaryzacji najlepiej zachowanych płatów muraw i zarośli. W następnych latach bowiem obok poszukiwań nowych płatów prowadzono badania fitosocjologiczne i glebowe. W ciągu pięciu lat wykonano około 350 zdjęć fitosocjologicznych, z których 189 wykorzystano i zestawiono w tabelę. Przy wykonywaniu zdjęć fitosocjologicznych stosowano ogólnie przyjętą metodę Braun-Blanquet'a. Zdjęcia wykonano w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu, lecz prawie wszystkie zdjęcia umieszczone w tabelach pochodzą z dwóch ostatnich miesięcy, tj. lipca i sierpnia. Zestawienie w tabelach zdjęć oparto na najnowszych pracach fitosocjologicznych. Tabele zawierają krótką charakterystykę topograficzno-ekologiczną każdego zdjęcia i skład florystyczny zespołu. Wszystkie gatunki o I stopniu stałości charakterystyczne dla związku, rzędu,

klasy i z grupy towarzyszących zaliczono do gatunków sporadycznych i wyliczono je pod kolumnami odpowiednich jednostek.

Wzorując się na pracach Celińskiego i Filipka (1958), Pawłowskiego, Pawłowskiej, Zarzyckiego (1960) oraz Matuszkiewicza (1962), użyto dla niektórych zespołów nazw w formie skróconej (np. zamiast *Koelerieto-Festucetum sulcatae* podano *Koelerio-Fustucetum sulcatae*, zamiast *Coryleto-Peucedanetum cervariae* wprowadzono *Peucedano-Coryletum* itp.).

Dla porównania udziału grup gatunków charakterystycznych w poszczególnych jednostkach fitosocjologicznych w opisanych zbiorowiskach wyliczono wartość systematyczną tych grup metodą Tüxena i Ellenberga (1937). Najwyższe wartości, jakie uzyskano podczas wyliczeń, stały się matematycznym sprawdzianem w kwestiach spornych dotyczących systematyki zbiorowisk.

Równocześnie z badaniami fitosocjologicznymi prowadzono badania glebowe, które polegały na oznaczeniu w terenie wartości pH przy pomocy odczynnika Helliga i opisie morfologii profili. W sumie wykonano 27 profili glebowych, z których próbki pobrano do analiz laboratoryjnych i kilkanaście dokrywek glebowych, w których badania przeprowadzono na miejscu. W próbkach pobranych z różnych warstw genetycznych gleby oznaczono: skład mechaniczny — metodą areometryczną Cassagrande w modyfikacji Prószyńskiego, zawartość CaCO_3 — metodą Scheiblera, pH czynne i pH wymienne — potencjometrycznie przy zastosowaniu elektrody szklanej i kalomelowej. Zawartość materii organicznej ustalono manganometrycznie — metodą Iszczereka-Rolłowa w modyfikacji dublańskiej.

Wszystkie analizy laboratoryjne wykonano w Katedrze Gleboznawstwa WSR w Szczecinie.

2. Uwagi dotyczące przyjętej systematyki zespołów

Zbiorowiska kserotermiczne na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórze Ilzeckiego wchodzi w skład dwóch klas: *Festuco-Brometea* i *Quercu-Fagetea*.

W systematyce zespołów i jednostek wyższych w obrębie klasy *Festuco-Brometea* przyjęto klasyczną koncepcję Braun-Blanqueta 1936, Braun-Blanqueta i Tüxena 1943 i Kliki 1931 opublikowaną w „Szacie roślinnej Polski” (tom I, str. 282—283). W zbiorowiskach zaroślowych z klasy *Quercu-Fagetea* poczyniono pewne zmiany w porównaniu z podanymi w powyższym dziele jednostkami systematycznymi tej klasy. Przyjęto natomiast koncepcję Tüxena (1952) odnoszącą się do rzędu *Prunetalia*, a tym samym i systematyki zespołu *Prunetum fruticosae*. Koncepcję tę popiera Matuszkiewicz (1962).

Poniżej podaję wykaz systematyczny zespołów:

Klasa: *Festuco-Brometea* Br. - Bl. et Tx. 1943

Rząd: *Festucetalia vallesiacae* Br. - Bl. et Tx. 1943

Związek: *Festucion vallesiacae* Br. - Bl. 1936 (Klika 1931)

Zespół: *Stipetum capillatae* S. Dziub. 1925

Podzespół: *Stipetum capillatae bothriochloetosum* S. Dziub. 1925

Zespół: *Koelerio-Festucetum sulcatae* J. Kornaś 1952

Podzespół: *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae subass. nova*

Zespół: *Asteri-Linetum flavae* ass. nova

Zbiorowisko: *Festuca duriuscula-Potentilla arenaria*

Zbiorowisko: *Carex humilis-Thesium linophyllon*

Zbiorowisko: *Brachypodium pinnatum*

Rząd: *Brometalia erecti* Br. - Bl. 1936

Zespół: *Scabioso-Teucrietum* ass. nova

Klasa: *Querco-Fagetea* Br. - Bl. et Vlieger 1937

Rząd: *Prunetalia* R. Tx. 1952

Zespół: *Prunetum fruticosae* S. Dziub. 1925

Zespół: *Peucedano-Coryletum* A. Kozł. 1925 em. A. Medwecka-Kornaś 1952

Zbiorowisko: *Prunus spinosa*

Zbiorowisko: *Berberis vulgaris* — *Rosa rubiginosa*

Zbiorowisko: *Juniperus communis*

III. CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH

1. *Stipetum capillatae* S. Dziub. 1925

a. Występowanie w terenie i ekologia

Roślinność budująca zespół *Stipetum capillatae* posiada duże wymagania termiczne i świetlne, znosi ona nawet długotrwałą suchość gleby zachowując wszystkie przejawy życia. Toteż płaty stepu ostnicowego na badanym terenie wykształciły się na otwartych słonecznych, suchych, stromych, a nawet urwistych krawędziach dolin rzecznych Wisły i Opakówki oraz na ścianach parowów i wąwozów mających przeważnie ujście do dolin rzecznych oraz na stokach zwróconych do słońca.

Płaty tego zespołu przekładają ekspozycję południową, południowo-wschodnią i południowo-zachodnią (patrz ryc. 12 a na str. 104). Spośród 19 zdjęć fitosocjologicznych włączonych do listy florystycznej 11 posiada

wystawę południową, 5 południowo-wschodnią, 3 zaś południowo-zachodnią. Z przytoczonych liczb wynika, że ekspozycja zbliżona do południowej jest uzależniona przede wszystkim od kierunku biegu wąwozów, parowów bądź też dolin rzecznych, a nie od wymagań samych roślin wchodzących w skład zespołu. Nachylenie miejsc objętych przez roślinność zespołu *Stipetum capillatae* waha się w dość dużych granicach: od 20 do 60°. 84% płatów, w których wykonano zdjęcia fitosocjologiczne, wykształciło się na miejscach o nachyleniu od 40 do 50°. Pozostałe na terenie o nachyleniu 20, 30 i 60°.

Ze względu na duże nachylenie siedlisk zespołu i wielki niedosyt wody w glebie, stanowiska te nie mogą być w pełni wykorzystane rolniczo, więc są nieużytkami. Jedynie w niektórych płatach w okresie wiosennym prowadzi się wypas bydła, a nawet wykasza się trawy.

Najbogatsze fragmenty stepu ostnicowego zachowały się na urwistej krawędzi doliny Wisły w Kamieniu Plebańskim koło Sandomierza, na Panieńskiej Górze koło Dwikóz, w Winiarkach i Winiarach koło Zawichostu, w dolinie Opatówki pomiędzy Kicharami a Bykowcem, na zboczu lessowym, tuż przy boisku sportowym w Dwikozach i w rezerwacie w Gorzyczanach. Specyficzny mikroklimat siedliska zespołu w większości przypadków pozwala gatunkom kserotermicznym znieść konkurencję krzewów, zwłaszcza wiśni karłowatej, w związku z czym utrzymuje się on jako zbiorowisko trwałe.

Gleby, na których rozwinęły się płaty zespołu *Stipetum capillatae*, nie są jednolite. Występują tu gleby lessowe i bardzo płytkie gleby typu rędziny. W obrębie rędzin wydzielono rędziny wytworzone z drobnoziarnistego żwirowca miocénskiego i rędziny powstałe ze zwietrzliny dolomitów dewońskich.

Dla dokładnej charakterystyki siedliska zespołu wykonano cztery profile glebowe, z których próbki pobrano do analizy mechanicznej i chemicznej oraz wykopano kilka dołów, w których przeprowadzono obserwacje na miejscu. W większej liczbie odkrywek glebowych, jak i w profilach glebowych, próbowano szukać odpowiedzi na pytanie, czy odmienne podłoże skalne pociąga za sobą zróżnicowanie roślinności, jakie istnieje w badanym terenie w obrębie płatów *Stipetum capillatae*, tym bardziej, że dotychczas badań glebowych nie prowadzono w płatach *Stipetum capillatae* wykształconych na lessach (Medwecka-Kornaś 1959).

Pobrane do analiz profile glebowe pochodzą z rozmaitego podłoża skalnego. Profile 7 i 14 wykonano w płatach o podłożu lessowym, 18 w płacie na podłożu zwartej skały (dolomity dewońskie), a profil 17 w płacie o podłożu żwirowca wapienia miocénskiego.

Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 5, a schematy tych profili ilustruje ryc. 2.

Tabela 5 - Table 5
Wyniki analiz glebowych /Results of soil analyses/

Numer profilu No. of profile	Głębokość poziomu w cm Depth of horizon in cm	Części szkielet. w % Skeletal parts in %	Części ziemiaste Earth parts				Zawartość CaCO ₃ w % Content of CaCO ₃ in %	pH czynne pH active	pH w KCl in KCl	Zawartość materii organicznej Content of organic matter
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm	0,02 mm				
14	0 - 30	-	7	13	47	33	-	8,0	7,8	2,9
	30 - 40	-	9	9	48	34	0,18	8,15	7,7	1,55
	40 - 102	-	10	15	34	26	-	8,15	7,7	-
7	0 - 15	-	5	19	44	32	4,69	8,3	8,1	1,45
	15 - 55	-	0	4	51	45	3,75	8,5	8,1	-
	55 - 80	-	22	12	35	31	1,36	8,7	8,2	-
	80 - 140	-	8	16	40	36	0,42	8,7	8,0	-
	140 - 160	-	14	13	31	42	0,42	8,7	8,4	-
18	0 - 25	5,12	44	12	20	24	8,79	7,9	7,5	1,39
	25 - 35	27,6	49	14	17	20	16,73	8,1	7,8	-
17	0 - 15	31,0	80	8	8	4	17,92	8,4	8,1	2,47

Profil 14 charakteryzuje się stosunkowo dużą miąższością poziomu próchnicznego (30 cm) o zawartości 2,9% materii organicznej i wylugowaniem CaCO_3 z poziomu próchnicznego oraz poziomu skały macierzystej. Tylko w poziomie przejściowym (30—40 cm) stwierdzono 0,18% CaCO_3 .

Ryc. 2. Profile glebowe zespołu *Stipetum capillatae*

1 — luźne resztki suchych roślin murawowych; 2 a — poziom próchniczny, 2 b — poziom przejściowy; 3 — korzenie; 4 — bezwęglanowa skała lessowa; 5 — węglanowa skała lessowa; 6 — żwirowiec mioceni; 7 — konkretce z CaCO_3 ; 8 — zwietrzelina wapienia dolomitycznego; 9 — odłamki i bloki wapienia dolomitycznego

Soil profiles of the association *Stipetum capillatae*

1 — loose debris of dry sward plants; 2 a — humus horizon, 2 b — intermediate horizon; 3 — roots; 4 — calcium carbonate-free loess; 5 — loess with carbonate calcium; 6 — Miocene gravelstone; 7 — CaCO_3 concretions; 8 — weathered dolomitic lime; 9 — dolomitic lime blocks and debris

Na podstawie składu mechanicznego i właściwości chemicznych, glebę tego profilu zaliczono do gleb brunatnych niecałkowitych, nawapienych (żwirowiec mioceni) wytworzonych z lessów.

Gleba profilu 7, podobnie jak profilu 14, należy do gleb brunatnych wytworzonych z lessu, ale całkowitych. Posiada mniej miąższy poziom próchniczny i niższą zawartość materii organicznej (1,45%). W całym profilu występuje CaCO_3 , którego procentowa zawartość stopniowo maleje (4,69—0,42%) idąc od poziomu próchnicznego.

Glebę profilu 18 określono jako rędzinę wytworzoną z wapienia

dolomitycznego, będącą w początkowym stadium rozwoju. W poziomie próchnicznym posiada niską zawartość materii organicznej (1,39%).

Na podstawie bardzo dużej zawartości CaCO_3 (90%) w skale macierzystej, glebę profilu 17 określono jako rędzinę początkowego stadium rozwoju, wytworzoną ze żwirowca miocenckiego. W stosunku do rędziny profilu 18 wykazuje niemal podwójną zawartość materii organicznej (2,47%).

b. Struktura i skład florystyczny zespołu

Roślinność budująca zespół *Stipetum capillatae* układa się w dwóch warstwach. Warstwę najwyższą tworzą przeważnie trawy: *Stipa capillata*, *S. Joannis*, *Poa pratensis* var. *angustifolia*, *Bothriochloa ischaemum* i nieliczne zioła, jak *Falcaria vulgaris*, *Centaurea rhenana*, *Salvia pratensis* i inne. Natomiast w warstwie niższej rosną głównie: *Koeleria gracilis*, *Festuca sulcata*, *Medicago falcata*, *Potentilla arenaria*, *Alyssum montanum*, *Thymus Marschallianus*, *Euphorbia cyparissias* i wiele innych, które występują pojedynczo obok kępiastych traw. W niektórych płatach również spotkać można pojedyncze skarłale krzewy, które nie przerastają warstwy ziół.

Zwarcie w płatach jest dość duże i wynosi od 75—95%; średnie pokrywanie osiąga 86,5%. Stosunkowo duże zwarcie roślinności naczyniowej nie stwarza dogodnych warunków dla rozwoju mchów. Spotykamy tu tylko pojedyncze okazy lub małe skupienia, których pokrycie w płatach nie przekracza 5%, a w dużej liczbie zdjęć w ogóle ich nie znaleziono.

Step ostnicowy jest zbiorowiskiem na ogół monotonnym. Pomimo to da się tu wyróżnić pewne zróżnicowanie fenologiczne roślinności, które decyduje o zmianach wyglądu zespołu. Wczesną wiosną na tle żywej zieleni traw rozwijają swoje żółte kwiaty *Potentilla arenaria* i *Alyssum montanum* nadając zespołowi aspekt wczesnowiosenny. W połowie maja zaczyna zakwitać *Salvia pratensis* i *Medicago falcata*; one to nieznacznie zmieniają wygląd zbiorowiska. W okresie letnim kwitną pozostałe rośliny, których mało efektowne kwiaty są maskowane przez stosunkowo wysokie i gęste kępy ostnicy włosowatej. Tylko ona sama podczas kwitnienia swoimi rozwianymi na wietrze wiechami urozmaica zbiorowisko. Pod koniec lipca i w sierpniu, kiedy przekwitły już pozostałe rośliny, murawa z ostnicą włosowatą wygląda zupełnie szaro.

Stipetum capillatae pod względem florystycznym nie jest zbiorowiskiem jednolitym. Chociaż różnice w składzie roślinności w poszczególnych płatach są niewielkie, to jednak różnice w fizjonomii są wyraźne.

Już Dziubałowski (1925) przytaczając zdjęcia fitosocjologiczne z okolic Sandomierza zwrócił uwagę, że w płatach *Stipetum capillatae*,

Fot. 5. Fragment płatu *Stipetum capillatae* w dolinie Opatówki
 Fragment of *Stipetum capillatae* patch in the Opatówka valley

rozwijających się na miejscach wydeptanych przez pasące się bydło, gatunkiem panującym jest *Bothriochloa ischaemum*. Znosi ona gorsze warunki fizyczne gleby. Poza wydeptywaniem, drugim czynnikiem jest częste wypalanie traw z ostnicą włosowatą. Ogień trawi nie tylko same źdźbła, ale przy sprzyjających warunkach atmosferycznych także niszczy doszczętnie pochwy, a nawet korzenie. W mniejszym stopniu narażona jest na ogień *Bothriochloa ischaemum*, bowiem wytwarza rozłogi korzeniowe i nie tworzy kęp. Opanowuje ona te miejsca i staje się gatunkiem dominującym w płatach. Tego rodzaju płaty obserwowano na krawędzi doliny Opatówki, pomiędzy Kicharami a Dwikozami.

Wszystkie płaty z *Bothriochloa ischaemum* Dziubałtowski (1925) wydzielił w odrębny podzespół *Stipetum capillatae andropogonetosum*. Na badanym terenie stwierdzono dość często występowanie tego rodzaju płatów z *Bothriochloa ischaemum*. Idąc za Dziubałtowskim wszystkie zdjęcia pochodzące z tych płatów wydzielono w odrębny podzespół *Stipetum capillatae bothriochloetosum*. Tak więc w obrębie zespołu *Stipetum capillatae* wyodrębniono podzespół typowy i podzespół *Stipetum capillatae bothriochloetosum*. Obydwa podzespoły różnią się w zasadzie dwoma gatunkami roślin: *Bothriochloa ischaemum* i *Achillea setacea*.

Gatunkami charakterystycznymi dla zespołu są: *Stipa capillata*,

S. Joannis i *Alyssum montanum*. Najlepiej charakteryzuje zespół *Stipa capillata*, osiąga V stopień stałości i najwyższy współczynnik pokrycia. W niektórych płatach rośnie łąnowo. Wiernym gatunkiem dla zespołu jest *Alyssum montanum*. W podzespole typowym osiąga V stopień stałości, a w *bothriochloetosum* III stopień stałości przy stosunkowo niskim współczynniku pokrycia. *Stipa Joannis* została stwierdzona tylko w jednym płacie w obrębie podzespołu typowego.

Gatunkami wyróżniającymi podzespół *Stipetum capillatae bothriochloetosum* od podzespołu typowego są: *Bothriochloa ischaemum*, która osiąga V stopień stałości i wysoki współczynnik pokrycia oraz *Achillea setacea*; występuje w III stopniu stałości i ma duży współczynnik pokrycia.

Achillea setacea uważana jest za gatunek rzadki (Medwecka-Kornaś 1959); Szafer uważa go za osobliwość florystyczną podokręgu Gór Pieprzowych pod Sandomierzem, bo tu ma jedyne stanowisko w Pasie Wyżyn Środkowych. Poza tym znane są stanowiska z Dolnego Śląska (Szafer 1959). W ostatnich latach wykryli kilkanaście stanowisk Fijałkowski i Izdebski (1957) w dolinie Bugu na zboczach lessowych w Czumowie—Gródku koło Hrubieszowa oraz Izdebski (1958) w Dobużku koło Łaszczowa na Wyżynie Lubelskiej. Fijałkowski i Izdebski (l.c.) wydzielili zdjęcia z *Achillea setacea* w osobny podzespół *Prunetum fruticosae achilletesum setaceae*, a Izdebski (l.c.) zaliczył płaty z tym gatunkiem do zespołu *Festuca sulcata-Carex humilis*, jako z gatunkiem charakterystycznym dla związku *Festucion vallesiaceae*. Na badanym terenie spotykano go w obrębie podzespołu *Stipetum capillatae bothriochloetosum* na stromej krawędzi doliny Wisły od Samborca aż do Zawichostu.

Liczba gatunków wchodząca w skład podzespołu typowego jest stosunkowo niska. Na ogólną liczbę 65 gatunków 9 gatunków występuje w V—IV stopniu stałości, 16 osiąga III stopień, a 8 II i I stopień stałości. Razem wszystkich gatunków występujących od V—I stopnia stałości jest 33. Pozostałe to gatunki sporadyczne.

Nieco wyższą liczbę gatunków posiada podzespół *Stipetum capillatae bothriochloetosum* bo 101. W rozbiciu na poszczególne stopnie stałości przedstawia się to następująco: stopnie stałości od V do IV osiąga 9 gatunków, III — 14, a od II do I — 20, razem 43 gatunki. Inne występują sporadycznie. O ustabilizowaniu się zespołu świadczy niska liczba gatunków towarzyszących: w podzespole typowym 3 gatunki, a w *Stipetum capillatae bothriochloetosum* 14. Ten niewielki udział gatunków z grupy towarzyszących uwarunkowany jest również skrajnymi warunkami mikroklimatycznymi siedliska. Skład florystyczny zespołu *Stipetum capillatae* przedstawia tabela 6.

c. Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych podzespołu typowego

- 1, 2, 3 (100, 101, 102) *. Zbocza doliny Opatówki pomiędzy Kicharami a Bykowcem.
- 4 (108) Południowe zbocze Panieńskiej Góry koło Dwikóz.
- 5, 6 (109, 110) Południowo-wschodnie zbocze Panieńskiej Góry k. Dwikóz.
- 7 (111) Stroma krawędź dol. Wisły pomiędzy Podgórzem a Zawichostem.

Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych
podzespołu *Stipetum capillatae bothriochloetosum*

- 8 (103) Zbocze dol. Opatówki ok. 50 m na wschód od ostatniego gospodarstwa ze wsi Kichary od strony Bykowca.
- 9 (104) 30 m na wschód od poprzedniego.
- 10 (120) Na dolomitach przy drodze polnej z Żurawik do Lipnika.
- 11 (89) Stroma krawędź dol. Wisły na terenie Kamienia Plebańskiego k. Sandomierza.
- 12 (98) Stroma krawędź dol. Wisły w pn. części wsi Wniarki.
- 13, 14 (114, 115) Zbocze dol. Opatówki pomiędzy Kicharami a Bykowcem w pobliżu odkrywki mioceńskiej.
- 15 (76) Urwista krawędź dol. Wisły w Górach Pieprzowych k. Sandomierza.
- 16 (77) Obok stanowiska 9.
- 17 (78) Stroma krawędź dol. Wisły w pn. części wsi Winiarki.
- 18 (81) 30 m na wschód od stanowiska 11.
- 19 (71) 25 m na wschód od poprzedniego.

Opis profili glebowych

Profil 14 ze zdjęcia 103 wykonanego 17.VIII.1962 r. na stromej krawędzi doliny Opatówki w pobliżu Kichar. Gł. profilu ok. 102 cm. Zasięg korzeni do 100 cm.

- A₀ pokruszone, suche szczątki obumarłych traw, głównie ostnicy włosowatej.
- A₁ 0—30 cm, gleba ciemnopopielata próchniczna z licznymi korzeniami, zwłaszcza traw; od 30—40 cm warstwa przejściowa jaśniejsza od poprzedniej, mniej zasobna w próchnicę, z niewielkimi konkrecjami CaCO₃.
- C od 40—102 cm, skała lessowa, jasnożółta z liczną białą siatką przestworów. Na tej głębokości spotkać można nieliczne korzenie roślin wieloletnich. Poniżej lessu zalega kilkumetrowa warstwa drobnoziarnistego zlepieńca wapienia mioceńskiego.

Profil 7 ze zdjęcia 71 wykonanego 2.VII.1962 r. na urwistej krawędzi dol. Wisły w Kamieniu Plebańskim k. Sandomierza. Głębokość profilu 160 cm. Pojedyncze korzenie na głębokości 108 cm.

- A₀ ślady obumarłych roślin. Duże nachylenie stanowiska (60°) nie pozwala na akumulację próchnicy. Szczątki roślin zanim zdążą się rozłożyć zostają splukane przez opady atmosferyczne.
- A₁ 0—15 cm. Gleba jasnopopielata z niewielką ilością próchnicy.
- C od 15—160 cm. Od 15—55 cm less jasnożółty z cienkimi poprzecznymi, białymi smugami, z małymi konkrecjami CaCO₃. Od 80—140 cm less o barwie ciemnożółtej bez warstwowań z liczną siatką przestworów. Od 140—160 cm less ciemnoczerwony ze śladami ilu.

* Liczby przed nawiasem oznaczają kolejne numery zdjęć zespołu, liczby w nawiasach — ogólny numer zdjęć.

Profil 18 ze zdjęcia 120 wykonanego 26.VIII.1962 r. w Żurawnikach na zboczu o nachyleniu 40°. Głębokość profilu 35 cm.

A₀ obumarłe szczątki roślin, zwłaszcza wokół odłamków skalnych i w niewielkich zagłębieniach.

A₁ 0—35 cm. Od 0—25 cm gleba żółtoszara z licznymi, drobnymi odławkami skalnymi powstałymi ze zwietrzliny skały macierzystej. Od 25—35 cm barwa gleby nie ulega zmianie, lecz o wyższym procencie odłamków skalnych.

C zwarta skała, wapień dolomityczny. Na zimno słabo burzy w 10% HCl.

Profil 17 ze zdjęcia 115 wykonanego 23.VIII.1962 r. na krawędzi dol. Opakówki w Górach Wysokich. Gleba w początkowych stadiach rozwoju o głębokości 15 cm.

A₀ dość liczne pokruszone szczątki roślin zmieszane ze żwirem miocenijskim.

A₁ 0—15 cm gleba jasnoszara, sypka.

C żwir miocenijski. W skład żwiru wchodzi 90% CaCO₃ i 10% piasku.

d. *Stipetum capillatae* a zbiorowiska pokrewne

Zbiorowiska z panującym gatunkiem *Stipa capillata* opisywane były kilkakrotnie przez wielu fitosocjologów z różnych regionów Polski. Występują one również na terytorium państw sąsiadujących z Polską.

Z Polski po raz pierwszy wyodrębnił i opisał to zbiorowisko pod nazwą *Stipetum capillatae* Dziubałtowski (1925) na podstawie zdjęć z okolic Sandomierza i doliny Nidy. W następnych latach ponownie opracowała go Kozłowska (1926, 1928) z południowej części Wyżyny Małopolskiej. Pokrewne zbiorowisko ze Skorocic opisała Medwecka-Kornaś (1959), które określiła jako zespół *Sisymbrio-Stipetum*. W obrębie zespołu *Stipetum capillatae* Dziubałtowski wydziela podzespół typowy i podzespół *Stipetum capillatae andropogonetosum*.

W najbliższym sąsiedztwie Wyżyny Małopolskiej zespół ten występuje na stromych zboczach lessowych i kredowych w okolicy Kazimierza nad Wisłą, skąd opisał go Sławiński (1952). Ostatnie badania nad roślinnością kserotermiczną na Wyżynie Lubelskiej, prowadzone przez Fijałkowskiego i Izdebskiego nie przyniosły nam nowych informacji o występowaniu tego zespołu. Zubożałe stanowisko ostnicy włosowatej znane jest jeszcze ze zboczy wzgórz na północ od Kazimierza nad Wisłą (Z. Czubiński — informacja ustna). Z dotychczasowych badań wynikałoby, że zasięg tego zespołu nie jest stosunkowo duży.

Zespół *Stipetum capillatae* opisywany przeze mnie z Wyżyny Sandomierskiej jest bardzo podobny do zespołu opracowanego przez Dziubałtowskiego (1925). (Część zdjęć zamieszczonych przez Dziubałtowskiego pochodzi z okolic Sandomierza).

W obydwu zbiorowiskach wyodrębniono podzespół typowy i *Stipe-*

tum capillatae bothriochloetosum. Pomimo daleko idącego podobieństwa uwidaczniają się pewne niewielkie różnice. Przede wszystkim dotyczą one *Poa bulbosa* var. *vivipara*, gatunku który w płatach muraw ksero-termicznych Wyżyny Sandomierskiej nie występuje; *Scorzonera purpurea* i *Hieracium echiioides*, które Dziubałowski zalicza do gatunków charakterystycznych dla zespołu, odgrywają tu zupełnie inną rolę. Pierwszy z nich występuje w grupie gatunków sporadycznych niemal we wszystkich murawach, drugi raczej jest przywiązany do zespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae*. W obrębie wyższych jednostek nie stwierdzono na badanym terenie *Oxytropis pilosa* (gatunku, który przechodzi do muraw zastępczych), *Scabiosa canescens* i innych. Przeciwnie, *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla*, *Anthemis tinctoria* i *Bromus inermis* nie występują na liście Dziubałowskiego.

Daleko idące różnice zaznaczają się pomiędzy moim *Stipetum capillatae* a *Sisymbrio-Stipetum* Medweckiej-Kornaś. Poza *Poa bulbosa* var. *vivipara* nie występują również *Festuca valesiaca*, *Veronica praecox*, *Euphrasia tatarica*, *Gypsophila fastigiata*, *Arabis auriculata*, *Medicago minima* i *Sisymbrium polymorphum*. Spośród gatunków należących do wyższych jednostek nie rośnie tutaj *Ornithogalum Gussonei* i *Astragalus danicus*. Odwrotnie — do *Sisymbrio-Stipetum* nie wchodzi: *Bothriochloa ischaemum*, *Achillea setacea*, *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla*, *Salvia pratensis*, *Poa pratensis* var. *angustifolia* i inne.

Różnice te nie tylko dotyczą ilościowego składu gatunków, lecz także fizjonomii zespołów. Że płaty stepu ostnicowego odmiennie się wykształcają na lessach niż na podłożu gipsowym, zwrócili już uwagę Dziubałowski (1925) i Kozłowska (1928).

Z listy gatunków, które zestawiała Kozłowska (1926) z Raclawic pod nazwą *Stipetum capillatae*, wynika, że takie gatunki jak: *Festuca valesiaca*, *Agropyron trichophorum*, *Astragalus danicus*, *Asparagus officinalis*, które zalicza do gatunków charakterystycznych zespołu, nie występują w *Stipetum capillatae* Wyżyny Sandomierskiej. Natomiast zbiorowisko opisane przez Sławińskiego (1952) z okolic Kazimierza nad Wisłą posiada gatunki, które wiążą go z *Sisymbrio-Stipetum* (*Poa bulbosa* var. *vivipara*, *Festuca valesiaca*) oraz gatunki (*Alyssum montanum*, *Stipa Joannis*, *Achillea setacea*), które charakteryzują *Stipetum capillatae* Wyżyny Sandomierskiej.

Poza Wyżyną Małopolską i Wyżyną Lubelską *Stipetum capillatae* występuje w północnej Polsce w przełomowych dolinach Odry i Wisły oraz na opadających na południe zboczach pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i jest najlepiej zachowanym zespołem pontyjskim (Czubicki 1950). Na podstawie badań, nad murawami kserotermicznymi w dolinach Odry, Warty i Płonej, Libbert (1933) wyodrębnił zespół *Stipa capillata-Potentilla arenaria*. Ponownie zespół ten opracowali Celiń-

ski i Filipek (1958), na podstawie zdjęć z leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad dolną Odrą. Libbert (1933) wyróżnia w obrębie *Stipa capillata*-*Potentilla arenaria* [= *Potentillo-Stipetum*, por. Celiński i Filipek 1958] 4 facje: 1) z *Brachypodium pinnatum*, 2) typową ze *Stipa capillata*, 3) z *Linosyris vulgaris* i 4) ze *Stipa pennata*. Celiński i Filipek (1958) w *Potentillo-Stipetum* z Bielinka wyodrębniają dwa warianty: typowy i wariant z *Linosyris vulgaris*. Według tych autorów płaty muraw kserotermicznych z Bielinka wchodzi w skład dwóch facji zespołu Libberta (1933) to jest: *Linosyris vulgaris* i *Stipa pennata*. Gatunkami charakterystycznymi dla zespołu *Potentillo-Stipetum* są: *Stipa pulcherrima*, *Anthericum liliago*, *Stipa capillata*, *Alyssum montanum*, *Oxytropis pilosa* i *Pleurochaete squarrosa*. Spośród wymienionych gatunków zaledwie dwa z nich to jest *Stipa capillata* i *Alyssum montanum* charakteryzują zespół *Stipetum capillatae* Wyżyny Sandomierskiej i pod tym względem zbiorowiska te wyraźnie różnią się od siebie. Natomiast *Oxytropis pilosa*, który charakteryzuje *Potentillo-Stipetum*, i gatunki wyróżniające wariant z *Linosyris vulgaris* (*Linosyris vulgaris*, *Carex humilis*, *Filipendula hexapetala*), wchodzi na Wyżynie Sandomierskiej do innych płatów z roślinnością kserotermiczną.

Tabela 7 przedstawia obraz składu florystycznego jednostek wyróżnionych w obrębie zespołu *Stipetum capillatae*, *Sisymbrio-Stipetum* i *Potentillo-Stipetum*, opracowanych z terenu Polski.

Z Brandenburgii zespół *Stipetum capillatae* opisany został niedawno przez Krauscha (1961). W obrębie tego zespołu wyróżnił on dwa podzespoły: *Helichrysum arenarium* i typowy, a w każdym z nich jeszcze jednostki niższe w randze wariantów: *Koeleria glauca* i *Adonis vernalis*. Duża zmienność i skład florystyczny zespołu *Stipetum capillatae* z Brandenburgii różni go już wyraźnie od *Stipetum capillatae* Wyżyny Sandomierskiej. Gatunkami łączącymi te dwa zbiorowiska są tylko dwie trawy: *Stipa capillata* i *S. Joannis*.

2. *Koelerio-Festucetum sulcatae* J. Kornaś 1952

a. Występowanie w terenie i podział zespołu

Zbiorowisko roślinne, w którym panują dwa gatunki traw: *Festuca sulcata* i *Koeleria gracilis*, występuje dość często na badanym terenie, lecz zajmuje stosunkowo niewielkie powierzchnie. Płaty tej asocjacji wykształcają się na siedliskach suchych i silnie nasłonecznionych, głównie na krawędziach dolin rzecznych, stokach zboczy i na terenach lessowych objętych intensywną erozją wodną. Miejsca te posiadają ekspozycję południową, południowo-wschodnią i znaczną wysokość względną.

Tabela 9 — Table 9

Wyniki analiz glebowych (Results of soil analyses)

Nr profilu No. of profile	Głębokość poziomu w cm Depth of horizon in cm	Części szkie- letowe w % Skeleton parts in %	Części ziemiste Earth parts				pH czynne pH active	pH w KCl pH in KCl	Zawartość materii organicznej Content of organic matter
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm	<0,02 mm			
12	0-31	—	17	64	7	12	8,2	7,5	2,90
	42-54	—	13	56	23	8	8,5	8,3	—
	80-90	—	7	67	16	10	8,3	8,2	—
3	0-26	—	6	51	10	33	8,2	7,9	2,76
	26-31	—	18	33	16	33	8,4	8,2	0,88
16	0,23	—	63	9	9	19	8,5	8,0	1,41
25	0-15	—	18	10	36	36	8,5	8,3	1,70
	15-29	—	41	5	20	34	8,7	8,4	—

Siedliska opanowane przez opisywany zespół nie są jednakowe. Da się tu wyróżnić miejsca wybitnie suche i nieco wilgotniejsze od nich. Te nieznaczne różnice siedliskowe pociągają za sobą zmienność florystyczną. Na podstawie składu florystycznego i wyżej przedstawionych różnic siedliskowych wydzielono w obrębie zespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae* dwa podzespoły: typowy i *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae*. Charakterystykę podzespołów przedstawiono oddzielnie.

b. Charakterystyka florystyczna zespołu

Gatunkami charakterystycznymi dla zespołu są na badanym terenie: *Festuca sulcata*, *Thymus Marschallianus*, *Koeleria gracilis*, *Asperula cynanchica* i *Phleum Boehmeri*. Gatunki te rosną również w innych zespołach i zbiorowiskach murawowych oraz zaroślonych. Chociaż osiągały stosunkowo duży współczynnik pokrycia, to jednak nigdy w tych zbiorowiskach nie są gatunkami panującymi. Optimum rozwoju przechodzą w *Koelerio-Festucetum sulcatae*. Skład florystyczny zespołu obrazuje tabela 8.

A. *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae* subass. nova

a. Występowanie w terenie i ekologia

Płaty tego podzespołu występują na badanym terenie tylko na Wyżynie Sandomierskiej i skupiają się głównie we wschodniej części wyżyny. Małe fragmenty opisywanej murawy rozwijają się na stokach środkowej i ujściowej doliny Opatówki, na krawędzi doliny Wisły stanowiącej wschodnią granicę wyżyny lessowej, na stokach wzniesień, ścianach wąwozów, parowów oraz na lessowych stokach usypiskowych. Nachylenie siedlisk jest różne i waha się od 15 do 45°. Miejsca te pomimo południowej i południowo-wschodniej wystawy i dużego nachylenia terenu w niektórych płatach są nieznacznie wilgotniejsze od siedlisk podzespołu typowego, posiadają bowiem mniejszą wysokość względną bądź też łagodniejszy spadek terenu.

Stosunki glebowe przedstawiono na podstawie analiz próbek pobranych z czterech profili glebowych (tab. 9, ryc. 3).

Analizy mechaniczne i chemiczne próbek profilu 12 oraz sam wygląd odkrywki pozwalają na zaliczenie tej gleby do gleb brunatnych wytworzonych z lessu. Duża miąższość poziomu próchnicznego oraz zawartość 2,90% materii organicznej związana jest z niewielkim spadkiem terenu (20°). W całym profilu glebowym znajduje się CaCO_3 . We wszystkich poziomach profilu 12 odczyn próbek jest zasadowy.

Gleby w płatach 58, 119 i 175 są bardzo płytkie. Głębokość profili waha się od 23 do 31 cm. Próbki pobrane z nich do analiz chemicznych wykazują odczyn zasadowy i dużą zawartość CaCO_3 . Natomiast zawartość materii organicznej w poszczególnych profilach wynosi od 1,41 do

Ryc. 3. Profile glebowe podzespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae*

4 — węglanowa skała lessowa; 5 — drobnopziarnisty żwirowiec mioceński. Inne oznaczenia jak na ryc. 2

Soil profiles of the subassociation *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae*

4 — loess with calcium carbonate; 5 — Miocene fine-grained gravelstone. Other ciphers explained on fig 2

2,76%. Pod względem składu mechanicznego gleby te różnią się znacznie. Gleby płatu 58 i 175 należą do bardzo płytkich gleb lessowych niecałkowitych nawapiennych (żwirowiec mioceński), a gleba w zdjęciu 119 jest bardzo płytką rędziną trzeciorzędową będącą w początkowych stadiach rozwoju.

b. Struktura i skład florystyczny podzespołu

Roślinność podzespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae* osiąga zwykle pełne zwarcie. Tylko w czterech płatach stwierdzono od 5 do 20% wolnej powierzchni pozbawionej roślinności.

Opisywany podzespół charakteryzuje się bardzo niską roślinnością,

jedynie kwiatostany dwóch gatunków traw: *Agropyron intermedium*, *Bothriochloa ischaemum* i trzech bylin: *Artemisia campestris*, *Centaurea scabiosa* i *C. rhenana* przekraczają wysokość 30 cm. Pojedynczo rosnące krzewy: *Berberis vulgaris*, *Cerasus fruticosa* i *Rosa rubiginosa* występują w postaci siewek lub bardzo skarłałych roślin. Udział mchów w tym podzespole jest niewielki; tylko w trzech płatach pokrywanie ich dochodzi od 30—40%, w sześciu następnych 5%, a w pozostałych brak ich zupełnie.

Podzespół ten buduje 39 gatunków roślin naczyniowych o V—II stopniu stałości, 3 gatunków mchów o IV—II stopniu stałości i 44 gatunki występujące sporadycznie. Razem podzespół liczy 86 gatunków.

W podzespole *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae* występuje kilka gatunków, które wzbogacają tę jednostkę, a zarazem wyróżniają ją w stosunku do podzespołu typowego. Są to: *Achillea millefolium* ssp. *pannonica*, *Odontites lutea*, *Hieracium echiioides*, *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla*, *Campanula sibirica* i *Pulsatilla pratensis* var. *nigricans*.

Opisywana subasocjacja wykazuje zmienny układ roślinności. W trzech płatach tego podzespołu rosną dodatkowo dwa gatunki roślin: *Linum catharticum* i *Agropyron intermedium*, które w zdjęciu 177 są nawet gatunkami panującymi. Płaty te wydzielono do niższej jednostki systematycznej w randze wariantu. Wydzielenie takie jest tym bardziej uzasadnione, że płaty te rozwijają się na miejscach nieznacznie suchszych w stosunku do pozostałych płatów tego podzespołu.

c. Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych podzespołu

- 1 (94) Na lessowych stokach usypiskowych, położonych w południowo-zachodniej części wąwozów tuż przy granicy dzielącej grunty wsi Radoszki od gruntów wsi Wieprzki.
- 2 (96) Zbocze dol. Wisły w Podgórzu obok zarośli z *Cerasus fruticosa*.
- 3 (112) Ściany krótkich wąwozów lessowych położone w odległości ok. 0,5 km na wschód od wsi Ocinek.
- 4 (113) Kilkadziesiąt m na południe od stanowiska 112.
- 5 (58) Zbocze dol. Opatówki położone ok. 150 m na zachód od gospodarstwa ob. Miśkiewicz ze wsi Bykowiec.
- 6 (116) Zbocze dol. Opatówki na gruntach wsi Góry Wysockie tuż przy drodze polnej z Kichar do Dwikóz.
- 7 (117) Kilkanaście m na wschód od stanowiska 116.
- 8 (118) Zbocze lessowe u wylotu rozległego wąwozu otwartego do dol. Opatówki, położone w części wschodniej wsi Kichary tuż przy drodze do Dwikóz.
- 9 (119) Zbocze wzniesienia w północno-wschodniej części wsi Gałkowice Ocinek.
- 10 (175) Zbocze wąwozu położonego w polu tuż za budynkami ob. Mendzelewskiego ze wsi Gałkowice Ocinek.
- 11, 12 (176, 177) Na zboczach wąwozu ok. 150 m na północ od gospodarstwa ob. W. Tarkowskiego, ze wsi Gałkowice Ocinek.

Profil 12 wykonano 13.VIII.1962 r. w zdjęciu 96 na krawędzi dol. Wisły, nachylenie 20°, wystawa południowa. Głębokość profilu 160 cm.

A₀ ślady dobrze rozłożonych roślin.

A₁' 0—31 cm poziom próchniczny jasnopopielaty o strukturze gruzelkowej prze-rośnięty korzeniami.

A₁'' 31—42 cm poziom mineralno-próchniczny żółty z jasnopopielatymi smugami bez śladu wymywania.

C 42—160 cm skała lessowa.

Profil 3 wykonano 18.VII.1961 r. w zdjęciu 58 na zboczu dol. Opatówki o nachyleniu 45°, wystawa południowa. Głębokość profilu 31 cm.

A₀ drobne resztki obumarłych części roślin.

A₁' 0—26 cm poziom próchniczny ciemnopopielaty.

A₁'' 26—31 cm poziom mineralno-próchniczny jasnopopielaty zmieszany ze żwirowcem mioceńskim, w który przechodzi.

Profil 16 wykonano 23.VIII.1962 r. w zdjęciu 119 na zboczu wzniesienia, nachylenie 40°, wystawa południowa. Profil niezróżnicowany o głębokości 23 cm.

A₀ ślady obumarłych części roślin.

A₁ 0—25 cm gleba w początkowych stadiach rozwoju sypka, jasna, sucha prze-rośnięta krzewami.

C od 23 cm skała; drobnoziarnisty żwirowiec mioceński.

Profil 25 wykonano 8.VIII.1963 r. w zdjęciu 175 na zboczu wąwozu o nachyleniu 40°, wystawa południowa i południowo-wschodnia. Głębokość profilu 29 cm.

A₀ niemal zupełny brak śladów obumarłych szczątków roślin.

A₁' 0—15 cm poziom próchniczny ciemnopopielaty o strukturze gruzelkowej.

A₁'' 15—29 cm poziom jasnopopielaty częściowo zmieszany ze żwirowcem mioceńskim, w który przechodzi.

B. *Koelerio-Festucetum sulcatae* podzespół typowy

a. Występowanie w terenie i ekologia

Fragmenty murawy podzespołu typowego występują na całym badanym terenie, ale najczęściej spotyka się je na Wyżynie Sandomierskiej, na terenach objętych intensywną erozją wodną (Lenarczyce, Radoszki, Wieprzki). Płaty te rozwijają się szczególnie na grzbietach przegród ostańców lessowych o kształcie trapezów, które oddzielają od siebie strome i bardzo głębokie bruzdy denudacyjne i na stożkach usypiskowych powstałych z walących się ostańców lessowych. Miejsca te są wybitnie suche na skutek silnego odwodnienia terenu przez bruzdy denudacyjne i szczeliny. Poza tym leżą niejednokrotnie około 20 m ponad dnem doliny głównego parowu, posiadają ekspozycję południową i bardzo duże nachylenie.

Stosunki glebowe scharakteryzowano przy pomocy jednego profilu wykonanego w płacie 32 (ryc. 4). W innych trzech płatach natomiast wykonano tylko doły orientacyjne i zbadano w nich odczyn próbek przy pomocy pH-metru Helliga. Z uwagi na wygląd odkrywek podobny do profilu 1, zbliżony odczyn oraz ten sam rodzaj skały, z której wytworzyła się gleba, próbek z tych dołów nie zabrano do analiz laboratoryjnych.

Skład mechaniczny i wyniki analiz chemicznych próbek profilu 1 (tab. 10) wskazują na to, że gleba płatu 32 należy do gleb brunatnych,

Ryc. 4. Profil glebowy podzespołu
Koelerio-Festucetum sulcatae typicum
4 — węglanowa skała lessowa; 6 — kon-
krecje CaCO_3 . Inne oznaczenia jak na ryc. 2

Soil profile of the subassociation
Koelerio-Festucetum sulcatae typicum
4 — loess containing calcium carbonate;
5 — CaCO_3 concretions. Other ciphers
explained on fig. 2

wytworzonych z lessu. Ze względu na duże nachylenie terenu (45°) akumulacja próchnicy jest bardzo niska. Podczas większych opadów atmosferycznych obumarłe szczątki roślin splukiwane są z tych miejsc. Z tych względów zawartość materii organicznej wynosi tu zaledwie 1,01%. Badania odczynu gleby w terenie (przy pomocy pH-metru Hellinga) wskazywały na odczyn obojętny poziomu od 0—60 cm. Natomiast pomiary kwasoty wymiennej w KCl wykazały odczyn słabo kwaśny, $\text{pH} = 6$. Nieznaczne zakwaszenie związane jest z wylugowaniem CaCO_3 z górnego poziomu. W pozostałej części profilu, gdzie spotkano skupienia CaCO_3 w postaci marglistych lalkowatych utworów, odczyn jest zasadowy. Największe skupienia CaCO_3 występują na głębokości od 60—70 cm (4,58%) oraz na głębokości od 119—132 cm.

Struktura płatów podzespołu typowego jest bardzo zbliżona do podzespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae*. Nieco tylko odmienny wygląd mają pojedynczo rosnące krzewy *Juniperus communis*, których wzrost nie przekracza 40 cm; ponadto *Festuca sulcata* we wszystkich płatach posiada większe pokrycie.

Opisywany podzespół, podobnie jak *Stipetum capillatae* jest zbiorowiskiem ubogim pod względem florystycznym. Buduje go 29 gatunków o V—II stopniu stałości w tym 1 gatunek mchu o III stopniu stałości. Łącznie z gatunkami sporadycznymi zawiera on 57 gatunków.

c. Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych

- 13 (29) Na grzbiecie ostańca lessowego rozdzielonego głębokimi bruzdami denudacyjnymi, ok. 0,5 km na północ od wsi Wieprzki.
- 14 (30) Sciana wąwozu lessowego — obok młodych form denudacyjnych — na gruntach wsi Wieprzki.
- 15 (31) Stroma ściana ostańca lessowego na gruntach wsi Radoszki, ok. 150 m na zachód od figury u wylotu wąwozu, przez który biegnie droga polna z Radoszek do Chwałek.
- 16, 17 (32, 33) Zbocza ostańców lessowych obok stanowiska 29.
- 18 (36) Na grzbiecie ostańca lessowego w wąwozach lessowych na gruntach wsi Lenarczyce obok wieży triangulacyjnej.
- 19 (47) Grzbiet ostańca lessowego na terenie zachodnich wąwozów położonych na gruntach wsi Radoszki.
- 20 (48) Około 20 m na zachód od stanowiska 47.

Opis profili glebowych

Profil 1 wykonano w płacie 32 na zboczu ostańca lessowego. Ekspozycja południowa, nachylenie 45°. Głębokość profilu 160 cm.

A₀ Minimalne ślady dobrze rozłożonych roślin.

A₁' 0—12 cm poziom próchniczny jasnopopielaty, zupełnie suchy o strukturze gruzelkowatej, silnie ukorzeniony.

A₁'' 12—27 cm poziom mineralno-próchniczny, jasnopopielaty z niewielkimi rdzawymi plamkami związków żelaza bez śladu wymywania.

C 27—160 cm skała lessowa jasnożółta, z gęstą siatką przestworów. W warstwie skały na gł. od 60—70 cm i na gł. 119—132 cm występują konkracje CaCO₃ w postaci malutkich laleczek wielkości ziarn fasoli.

C. *Koelerio-Festucetum sulcatae* a zbiorowiska pokrewne

Zespół *Koelerio-Festucetum sulcatae* wyróżniony został przez Kornasia w 1952 r. na podstawie jednego płatu rozwijającego się na płytkiej glebie na wapieniach w Bielanych, w okolicy Krakowa. Przy opisie zespołu autor ogranicza się tylko do podania charakterystyki topograficzno-ekologicznej i przytoczenia składu florystycznego. W liście

Tabela 10 - Table 10
Wyniki analiz glebowych /Results soil of analyses /

Nr profilu No. of profile	Głębokość poziomu Depth of horizon in cm	Części szkiele- towe w % Skeleton parts in %	Części ziemiste Earth parts			Zawartość CaCO ₃ w % Content of CaCO ₃ in %	pH czynne pH active	pH w KCl pH in KCl	Zawartość materii organicznej Content of organic matter
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm				
1	0-12	-	10	56	19	15	6,3	6,0	1,01
	12-27	-	7	57	18	18	6,2	5,9	0,84
	42-70	-	14	48	20	18	7,9	7,4	-
	150-160	-	8	60	10	22	8,0	7,6	-

Tabela 11 - Table 11
Wyniki analiz glebowych / Results soil of analyses /

Nr profilu No. of profile	Głębokość poziomu Depth of horizon in cm	Części szkiele- towe w % Skeleton parts in %	Części ziemiste Earth parts			Zawartość CaCO ₃ w % Content of CaCO ₃ in %	pH czynne pH active	pH w KCl pH in KCl	Zawartość materii organicznej Content of organic matter
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm				
22	0-15	2,2	54	12	16	18	8,0	7,7	1,70
	28-87	-	86	7	3	4	8,3	7,8	-
24	0-14	-	79	9	8	4	8,5	8,2	2,01

florystycznej podano 7 gatunków roślin, które charakteryzują zespół lokalnie. Są to: *Festuca sulcata*, *Koeleria gracilis*, *Phleum Boehmeri*, *Asperula cynanchica*, *Centaurea scabiosa*, *Thymus glabrescens* i *Carex caryophylla*.

Podobne zbiorowisko z panujących gatunkami traw *Festuca sulcata*, i *Koeleria gracilis* badała w rezerwacie stepowym „Skorocicie” k. Buska Medwecka-Kornaś. Płaty roślinności tego zbiorowiska zajmują wybitnie suche siedliska na podłożu skalnym. Poza Skorocicami zbiorowisko to występuje również w Choteleckich Górach na poziomo leżących warstwach skał gipsowych (Medwecka-Kornaś 1959).

Zespół *Koelerio-Festucetum sulcatae* opracowany przeze mnie z Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Ilżeckiego wykazuje wyraźne podobieństwo pod względem struktury składu florystycznego, a nawet zajmowanych siedlisk do zbiorowisk roślinnych z okolic Krakowa i Skorocic.

We wszystkich listach florystycznych zdecydowanie panującymi gatunkami są dwie trawy: *Festuca sulcata* i *Koeleria gracilis*. Natomiast *Thymus glabrescens* i *Carex caryophylla*, gatunki uważane przez Kornasia za lokalnie charakterystyczne zespołu, do moich zdjęć w ogóle nie wchodzi. Ten ostatni gatunek występuje w bardziej mezofilnych zbiorowiskach murawowych, wykształconych na stokach o skłonach zbliżonych do północnych.

Gatunki charakterystyczne zespołu: *Festuca sulcata*, *Thymus Marischallianus*, *Koeleria gracilis*, *Asperula cynanchica* i *Phleum Boehmeri* rosną w *Stipetum capillatae* i w *Brachypodium pinnatum*. Chociaż osiągają duży współczynnik pokrycia to jednak nigdy w tych płatach nie panują. Trudno też łączyć murawę z panującymi gatunkami traw: *Festuca sulcata* i *Koeleria gracilis* ze *Stipetum capillatae* lub uważać ją za zubożałą odmianę tej asocjacji. Zbiorowisko to wykazuje również zupełnie inną strukturę i skład florystyczny.

Dotychczasowe dane o występowaniu *Koelerio-Festucetum sulcatae* odnoszą się tylko do Wyżyny Małopolskiej; przypuszczalnie występuje ono również na lessach Wyżyny Lubelskiej. Podobnie jak u nas, zajmuje niewielkie powierzchnie i być może nie zwraca na siebie uwagi fitosocjologów.

3. Zbiorowisko z *Festuca duriuscula*-*Potentilla arenaria*

a. Występowanie w terenie i ekologia

Na bardzo małych powierzchniach luźnych gleb piaszczystych, rzadziej spiaszczonych lessach i płytkiej rędzinie trzecieorzędowej rozwija się zbiorowisko roślinne, w którym panuje *Festuca duriuscula* var. tra-

chryphylla. Miejsca te są otwarte, charakteryzują się dużym spadkiem terenu wahającym się od 15 do 40° i ekspozycją południową, południowo-wschodnią oraz południowo-zachodnią. Płaty tego rodzaju spotykamy na krawędziach dolin rzecznych: Kamiennej, Opatówki i Wisły oraz na stokach parowów, przeważnie w otoczeniu płatów zespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae*.

Ryc. 5. Profile glebowe zbiorowiska *Festuca duriuscula-Potentilla arenaria*

1 a — poziom próchniczny, 1 b — poziom przejściowy; 2 — korzenie; 3 — luźny, drobny piasek; 4 — drobnoziarnisty żwirowiec mioceński; 5 — margiel kredowy

Soil profiles of the community *Festuca duriuscula-Potentilla arenaria*

1 a — humus horizon, 1 b — intermediate horizon; 2 — roots; 3 — loose, fine-grained sand; 4 — small-grained Miocene gravel; 5 — Cretaceous marl

Gleby badanego zbiorowiska występują zwykle w postaci małych oczek rozrzuconych wśród innych typów gleb, bądź też są pozostałością zmytych ze zboczy gleb piaskowych, pod którymi spoczywa margiel kredowy.

Bliższą charakterystykę siedliska przedstawiono w oparciu o 3 odkrytki glebowe, w których badania przeprowadzono na miejscu, a następnie z dwóch pobrano próbki do analiz mechanicznych i chemicznych (ryc. 5, tab. 11).

Gleby omawianego zbiorowiska posiadają odczyn zasadowy. Kwasowość czynna w poziomach mineralno-próchnicznych osiąga wartość od 8,0—8,5 pH, a kwasowość wymienna od 7,7 do 8,2 pH. Zawartość CaCO_3 w profilu 22 wynosi od 1,27% w poziomie mineralno-próchnicznym, a 0,46% w poziomie dolnym. Nieco wyższa zawartość CaCO_3 w poziomie mineralno-próchnicznym spowodowana jest domieszką okruchów margli kredowych. W profilu 24 zawartość CaCO_3 wynosi 16,52%.

Pod względem składu mechanicznego gleby te możemy określić jako luźne gleby piaskowe.

Zawartość materii organicznej w profilach glebowych jest niska (waha się od 1,70 w profilu 22 do 2,01% w profilu 24). Ta niska zawartość materii organicznej w tego rodzaju glebach według Musierowicza (1958) spowodowana jest szybkim spalaniem się w nich substancji organicznych.

Czynnikiem siedliskowym decydującym o życiu i rozwoju płatów *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla*-*Potentilla arenaria* jest luźna, przewiewna gleba piaskowa z zawartością CaCO_3 .

b. Struktura i skład florystyczny

Zbiorowisko *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla*-*Potentilla arenaria* charakteryzuje się wielkim ubóstwem florystycznym i pod tym względem dorównuje podzespołowi typowemu *Koelerio-Festucetum sulcatae*. Panująca kępiasta trawa *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla* o kserotermicznej budowie skupia wokół siebie pozostałą część flory. Pomędzy rozrośniętymi kępkami trawy widnieją wolne miejsca od roślinności. Powierzchnia ich przede wszystkim zależy od pokrycia *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla*. W niektórych płatach wolne powierzchnie stopniowo opanowywane są przez liczne rozgałęziające się i zakorzeniające się kłacza *Potentilla arenaria* i rozłogi *Hieracium pilosella*. Poza głównym gatunkiem kostrzewy szczeciniastej obficie rośnie *Potentilla arenaria*, *Artemisia campestris*, *Euphorbia cyparissias*, a z mchów *Abietinella abietina*. Inne gatunki występują skąpo lub bardzo skąpo.

Tabela 12 - Table 12
Liczba gatunków w poszczególnych stopniach stałości
Number of species in the particular constancy grades

Powierzchnia Surface Stażość Constancy	15 - 25 m ²		
	rośliny naczyn. mascular plants	mchy mosses	razem total
V 81 - 100 %	4	.	4
VI 61 - 80 %	5	.	5
III 41 - 60 %	8	1	9
II 21 - 40 %	10	2	12
V - II 100 - 21 %	27	3	30
I 1 - 20 %	38	4	42
V - I 100 - 1 %	65	7	72

Pomimo ubóstwa florystycznego struktura zbiorowiska charakteryzuje się warstwowym ułożeniem roślinności. Najwyższą warstwę, około 20—30 cm tworzą: *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla*, *Artemisia campestris*, *Salvia pratensis* i *Centaurea rhenana*. Średnią warstwę tworzą pozostałe gatunki. Wiele z nich w innych pokrewnych zbiorowiskach murawowych charakteryzuje się wyższym wzrostem. Warstwę najniższą — przyziemną tworzą mchy, których jest bardzo mało i trzy z nich (*Abietinella abietina*, *Ceratodon purpureus* i *Tortula ruralis*) w pięciu płatach osiągają zaledwie od 5 do 25% pokrycia.

W skład zbiorowiska wchodzi ogółem 72 gatunków roślin. Ponad 56%

gatunków występuje sporadycznie, a 30 osiąga od V—II stopnia stałości. Większość gatunków (18) należy do rzędu *Festucetalia vallesiacae* i klasy *Festuca-Brometea*. Gatunków towarzyszących o V—II stopniu stałości jest 12. Wszystkie cechuje słaba ilościowość.

Rozdział gatunków na 5 stopni (klas) stałości (tab. 12) przedstawia w tym zbiorowisku obraz dla asocjacji o jednolitym składzie florystycznym. Najniższa liczba gatunków jest o V stopniu stałości.

Pomimo jednolitego składu roślinności w płatach, zbiorowisko to nie ma dobrych gatunków charakterystycznych. Gatunki, które można uznać za charakterystyczne dla tej asocjacji, są: *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla* i *Tunica prolifera*. Pierwszy z nich osiąga tu najwyższy współczynnik pokrycia (3449). Rośnie również w *Stipetum capillatae* i *Koelerio-Festucetum sulcatae* i osiąga w obydwóch zespołach duży współczynnik pokrycia. Wiernym gatunkiem dla opisywanego zbiorowiska jest *Tunica prolifera*; osiąga ona IV stopień stałości przy niskim współczynniku pokrycia (7). Z tych względów zbiorowiska tego tymczasowo nie wydzielono jako osobnej asocjacji. Pogląd na te zbiorowiska ilustruje tabela 13.

c. Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych zbiorowiska

- 1 (129) Na krawędzi dol. Opatówki w odległości ok. 30 m na wschód od gospodarstwa ob. Leszczyńskiego mieszkańca wsi Kichary.
- 2 (124) Na krawędzi dol. Kamiennej w Pętkowicach obok zarośli z *Corylus avellana*.
- 3, 4, 5, 6, (159, 160, 161, 162). Piaszczyste ściany wąwozów, na północ od wsi Biedrzychów, w pobliżu zwartych zarośli z *Juniperus communis*.
- 7 (167) Piaszczysty stok krawędzi dol. Wisły, ok. 300 m na północ od wsi Nowe obok *Asteri-Linetum flavae* i zbiorowiska z *Carex humilis*-*Thesium linophyllum*.
- 8 (168) Kilka metrów na wschód od stanowiska 1.

Opis profili glebowych

Profil glebowy 22 wykonano w zdjęciu 160, 4.VIII.1963 r. na zboczu wąwozu w Biedrzychowie; ekspozycja S, nachylenie terenu 35°. Głębokość profilu 87 cm.

A₀ zupełny brak szczątków roślin.

A'₁ 0—15 cm poziom mineralno-próchniczny, popielaty, luźny.

A''₁ 15—28 cm poziom mineralno-próchniczny, nieco jaśniejszy od poprzedniego z pojedynczymi odłamkami margla kredowego. Odłamki skalne zostały przeniesione z wyżej położonego erodującego zbocza zbudowanego z margli kredowych i zakopane racicami bydła i owiec pasących się w okresie wiosny i lata. W poziomie tym nie zauważono śladów bielnicowania.

C 28—87 drobnutki piasek o barwie jasnożółtej, pod którym leżą bloki margla.

Profil glebowy 24 wykonano w płacie zdjęcia 168, 8.VIII.1963 r. na krawędzi dol. Opatówki w Kicharach. Ekspozycja SSE, nachylenie 25°. Gleba w początkowym stadium rozwoju. Miąższość profilu 14 cm.

- A₁ 0—14 cm jasnopopielaty, luźny, tworzący się poziom mineralno-próchniczny, przechodzący w skałę macierzystą.
 C żwirowiec mioceniński. Odczyn tworzącej się gleby i skały macierzystej jest zasadowy.

4. Zbiorowisko inicjalne z *Poa compressa*

Na zboczu wąwozu o nachyleniu około 40°, na którym poprzez zarozanie usunięto pokrywę roślinności kserotermicznej by wprowadzić kultury polowe, rozwija się zbiorowisko inicjalne z *Poa compressa*. Zbiorowisko to charakteryzuje się bardzo niskim wzrostem darni i niemal pełnym pokryciem gleby. Pomimo, że najważniejszą rolę w tym zbioro-

Tabela 14 - Table 14
 Zbiorowisko inicjalne z *Poa compressa*
 Initial community with *Poa compressa*

Nr zdjęcia /No. of relevé/	178
Data /Date/	8.VIII.1963r.
Miejscowość /Locality/	Gańkowice Ocín
Wystawa /Exposure/	SSW
Nachylenie w° /Degree of inclination/	40
Pokrycie warstwy ziół "c" /Cover of herbaceous layer "c"/	75
Pokrycie warstwy mchów "d" /Cover of moss layer "d"/	25
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of relevé in m ² /	20
Liczba gatunków w zdjęciu /Number of species in the relevé/	26 ^a
Gatunek panujący /Dominant species/ <i>Poa compressa</i>	3.3
Gatunki charakterystyczne związku /Species characteristic of the alliance/ <i>Festucio vallesiaceae</i> i rzędu /and the order/ <i>Festucetalia vallesiaceae</i>	
<i>Achillea millefolium</i> ssp. <i>pannoica</i>	+
<i>Anthemis tinctoria</i>	+
<i>Potentilla anserina</i>	2.2
<i>Pulsatilla pratensis</i> var. <i>nigricans</i>	+
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	+
<i>Thymus Marschallianus</i>	2.2
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ <i>Festuco - Brometea</i> :	
<i>Anthyllis vulneraria</i> var. <i>polyphylla</i>	+
<i>Artemisia campestris</i>	+
<i>Asperula cynanchica</i>	+
<i>Centaurea rhodantha</i>	r
<i>Centaurea scabiosa</i>	+
<i>Coronilla varia</i>	+
<i>Euphorbia cyparissias</i>	+
<i>Pimpinella saxifraga</i>	+
<i>Ranunculus bulbosus</i>	+
<i>Seseli annuum</i>	+
<i>Veronica spicata</i>	+
<i>Viola rupestris</i>	+
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/:	
<i>Agropyron repens</i>	+
<i>Camptothecium lutescens</i> d	2.1
<i>Hieracium pilosella</i>	2.2
<i>Hypericum perforatum</i>	r
<i>Melilotus albus</i>	+
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Polygala vulgaris</i>	+

wisku odgrywa *Poa compressa*, to jednak obok niej najliczniej pojawiają się gatunki z rzędu *Festucion vallesiaceae* i klasy *Festuco-Brometea*, które wkraczą z pobliskich płatów *Koelerio-Festucetum sulcatae*. Z grupy gatunków towarzyszących największe pokrywanie mają: *Camptothecium lutescens* i *Hieracium pilosella*.

Brak w opisywanym płacie *Tussilago farfara* różni go od analogicznych zbiorowisk inicjalnych, opisywanych przez Sławińskiego (1952), z okolicy Kazimierza nad Wisłą pod nazwą zespołu *Tussilago farfara-Poa compressa* i od zbiorowiska pod tą samą nazwą, opisywanego przez Celińskiego i Filipka (1958), z terenu rezerwatu w Biełlinku nad Odrą. Skład florystyczny zbiorowiska przedstawia tabela 14.

5. Zbiorowisko z *Brachypodium pinnatum*

a. Występowanie w terenie i ekologia

Roślinność murawy o charakterze łąkowym, w której bezwzględnie panuje *Brachypodium pinnatum*, przywiązana jest do lessów i margli kredowych. Zbiorowisko to występuje przede wszystkim wzdłuż krawędzi dolin rzecznych: Gorzyczanki, Opatówki i Wisły oraz na zboczach parowów i wąwozów wciętych w lessach i marglach kredowych.

Najlepsze fragmenty obserwowano na zboczach parowów i wąwozów otwartych do doliny dolnego biegu Opatówki pomiędzy Gałkowicami Ocin a Dwikozami i na lessowych krawędziach doliny Wisły w Podgórzu koło Zawichostu.

Płaty wykształcone na krawędziach doliny Wisły zbudowanych z margli kredowych są bardzo częste, lecz zajmują stosunkowo małe powierzchnie i są zniekształcone wypasem, lub też przysypywane rumoszem skalnym. Z tych względów zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w tych płatach jako mniej pewne nie włączono do listy florystycznej.

Płaty zbiorowiska z *Brachypodium pinnatum* rozwijają się na zboczach o różnych ekspozycjach: wschodniej, południowo-wschodniej, południowej, południowo-zachodniej, zachodniej, a nawet północnej. Najwięcej płatów spotkać można na miejscach o wystawie południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. Płaty z ekspozycją południową są dosyć rzadkie; siedliska te charakteryzują się łagodnym spadkiem terenu, a wysokość względna tych zboczy nie przekracza 7 m. Istnieje również wielka rozpiętość w nachyleniu terenu (10—45°). Zwykle roślinność tego zbiorowiska zarasta miejsca o nachyleniu od 30—35°.

Siedliska o bardziej łagodnym spadku są przeważnie zajęte pod uprawy polowe, a na bardziej strome zbocza wkracza to zbiorowisko wtedy, gdy urozmaicają je pewne terasy lub nieznaczne nisze, które

Tabela 15 - Table 15
Wyniki analiz glebowych /Results of soil analyses/

Nr profilu No. of profile	Głębokość poziomu Depth of horizon in cm	Części szkiele- towe w % Skeletal parts in %	Części ziemiaste Earth parts				Zawartość CaCO ₃ w % Content of CaCO ₃ in %	pH czynne pH active	pH w KCl pH in KCl	Zawartość materii organicz- nej Content of organic matter
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm	0,02 mm				
8	0-25	-	7	14	42	27	7,50	8,4	8,2	4,20
	25-40	-	9	15	42	34	6,14	8,3	8,1	-
	50-80	-	5	5	55	35	7,25	8,4	8,0	-
9	0-28	-	11	23	35	31	2,57	7,6	7,1	3,76
	28-39	-	7	24	40	29	3,21	8,0	7,8	-
	50-75	-	6	17	43	34	4,58	8,2	8,0	-

charakteryzują się większą akumulacją poziomą próchnicznego, a poza tym są nieco wilgotniejsze.

Ponad 70% zdjęć fitosocjologicznych wykonano na stokach o nachyleniu od 30—35°; w takich warunkach płaty z *Brachypodium pinnatum* na badanym terenie rozwijają się najlepiej.

Gleby zajęte przez roślinność omawianego zbiorowiska cechuje dobrze rozwinięty poziom próchniczny. Dla oceny stosunków edaficznych, badaniami glebowymi objęto płaty roślinności wykształcone na podłożu

Ryc. 6. Profile glebowe zbiorowiska *Brachypodium pinnatum*

4 — węglanowa skała lessowa; 5 — nacieki i konkrety CaCO_3 . Inne oznaczenia jak na ryc. 2

Soil profiles of the community *Brachypodium pinnatum*

4 — loess containing calcium carbonate; 5 — CaCO_3 infiltrations and concretions. Other ciphers explained on fig. 2

lessowym. Ogółem wykonano 2 profile glebowe, z których wyniki analiz zestawiono w tabeli 15, a schematy tych profili ilustruje rycina 6.

W przedstawionych profilach miąższość poziomu próchnicznego jest znacznie większa w porównaniu z analogicznym poziomów profili pochodzących ze zdjęć *Stipetum capillatae*, *Koelerio-Festucetum sulcatae* czy zbiorowiska *Festuca duriuscula*-*Potentilla arenaria*. Barwa tego poziomu jest również ciemniejsza, a zawartość materii organicznej wynosi od 3,76 w profilu 9 do 4,20% w profilu 8. Tak więc udział materii organicznej jest większy w porównaniu z wyżej podanymi zespołami murawowymi (por. str. 26, 35, 42).

Odczyn próbek pobranych do analiz z poszczególnych poziomów genetycznych jest zasadowy, wartość kwasoty czynnej wynosi od 7,6—8,4 pH, a wymiennej od 7,1—8,2 pH. Alkaliczny odczyn gleb badanego zbiorowiska związany jest ze znaczną zawartością w profilu CaCO_3 .

Gleby wytworzone z lessów ze zdjęcia 79 i 83 swą budową i cechami morfologicznymi, składem mechanicznym i właściwościami chemicznymi zbliżają się do czarnoziemów właściwych.

Żyzne próchniczne czarnoziemy właściwe pod zwartą pokrywą roślinności dobrze magazynują wodę. Dlatego też w płatach *Brachypodium pinnatum* panują lepsze stosunki wodne, które decydują o wykształceniu bujnej wielogatunkowej roślinności tego zbiorowiska.

b. Struktura i skład florystyczny

Omawiane zbiorowisko występuje w postaci zwartych i jednolitych płatów zarówno na Wyżynie Sandomierskiej, jak i na Przedgórzu Iłżeckim. We wszystkich załączonych zdjęciach zwarcie roślinności osiąga zwykle 100%, a *Brachypodium pinnatum* pokrywa od 50 do 75% całej powierzchni (tab. 16). Fizjonomią zbiorowisko przypomina łąkę kośną. Nawet niektóre płaty koszone są raz w roku. Dają one niezły pokos siana.

Pełne zwarcie roślinności, jasnozielone sztywne liście i żdźbła zaopatrzone w długie kłosa *Brachypodium pinnatum* wyraźnie odróżniają to zbiorowisko pod względem fizjonomicznym od innych pokrewnych muraw.

W układzie pionowym roślinności wyróżniamy 4 warstwy: warstwę krzewów, dwie warstwy zielone wyższą i niższą i warstwę mchów. Warstwa krzewów jest zaznaczona fragmentarycznie, tylko w zdjęciach od 52 do 55 zwarcie ich wynosi od 20—30%. Warstwa zielona wyższa dochodzi do wysokości 80 cm, tworzą ją przede wszystkim kwiatostany *Brachypodium pinnatum*, *Salvia pratensis*, *Centaurea scabiosa*, *C. rhennana*, *Phleum Boehmeri*, *Falcaria vulgaris*, *Filipendula hexapetala*, *Stachys recta* i inne. Główna masa roślinności skupia się w niższej warstwie zielonej, która osiąga około 30 cm. Warstwa mszysta rozwija się fragmentarycznie, właściwie w skład jej wchodzi tylko dwa gatunki: *Abietinella abietina* i *Camptothecium lutescens*.

W obrębie muraw kserotermicznych badanego terenu zbiorowisko z *Brachypodium pinnatum* jest najbogatsze pod względem florystycznym. Buduje go 148 gatunków, ale 57 osiąga od V—II stopnia stałości. Dużą przewagę posiadają gatunki sporadyczne; jest ich 91 gatunków. Przeciętna liczba gatunków na jedno zdjęcie wynosi 33.

W skład zbiorowiska wchodzi roślinność dwóch klas: *Festuco-Brometea* i *Querco-Fagetea*. Udział gatunków leśnych jest niewielki, tylko

Fot. 6. Kwitnące okazy storczyka kukawki (*Orchis militaris* L.) w płacie zbiorowiska z *Brachypodium pinnatum*

Flowering specimens of *Orchis militaris* L. in a patch of the community with *Brachypodium pinnatum*

w zdjęciach od 52—55 są one liczniejsze. Liczba gatunków charakterystycznych dla klasy *Festuco-Brometea* jest najwyższa. Gatunki wschodnie i kontynentalne rzędu *Festucetalia vallesiaceae* są bardzo słabo reprezentowane. Na 16 gatunków 7 osiąga od IV—II stopnia stałości przy niskim współczynniku pokrycia. Poza tym gatunki te wykazują osłabioną żywotność, mniej obficie kwitną i owocują, a pędy ich w wyniku ocienienia są wyższe i wiotkie.

Najważniejszą rolę w budowie zbiorowiska odgrywają: *Brachypodium pinnatum* (stałość 100% przy współczynniku pokrycia 5416), *Salvia pratensis* (stałość 80%, współcz. pokrycia 602), *Festuca sulcata* (stałość 66%,

współcz. pokrycia 432), *Medicago falcata* (stałość 66%, współczynnik pokrycia 235), *Galium verum* (stałość 80%, współcz. pokrycia 40) i *Phleum Boehmeri* (stałość 66%, współcz. pokrycia 169).

Rozdział gatunków według stopni stałości przedstawia tabela 17. Pomimo bardzo niskiej liczby gatunków o V stopniu (1 gatunek) i bardzo wysokiej o I stopniu (sporadycznych 91 gatunków) zbiorowisko to przedstawia dość jednolity obraz, nie wykazując żadnej zmienności.

Tabela 17 - Table 17
Liczba gatunków w poszczególnych stopniach stałości
Number of species in the particular constancy grades

Stażność Constancy	Powierzchnia Surface	25 - 100 m ²		
		rośliny naczyn. Vascular plants	mchy i porosty mosses and lichenes	razem total
V	81 - 100 %	1	.	1
IV	61 - 80 %	8	.	8
III	41 - 60 %	10	.	11
II	21 - 40 %	36	1	37
V-II	100 - 20 %	55	2	57
I	1 - 20 %	81	10	91
V-I	100 - 1 %	136	12	148

Na 15 zdjęć fitosocjologicznych tworzących tabelę zaledwie tylko *Brachypodium pinnatum* jest gatunkiem charakterystycznym dla tego zbiorowiska. Słabo zaznaczająca się odrębność w stosunku do innych muraw nie pozwala wydzielić tego zbiorowiska na omawianym terenie w randze asocjacji.

c. Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych

- 1, 2 (49, 50) Ściany wąwozów lessowych na gruntach wsi Góry Wyżokie, w odległości ok; 0,5 km na północ od Opatówki.
- 3 (56) Krawędź dol. Opatówki pomiędzy Kicharami a Bykowcem.
- 4 (79) Zbocze wąwozu-lessowego na terenie gruntów wsi Gałkowice Ocina, tuż za budynkami ob. Tarkowskiego.
- 5 (82) Krawędź dol. Wisły w Podgórzu, w odległości ok. 1 km na południe od Zawichostu.
- 6 (90) Zbocze lessowe, ok. 0,5 km na północ od wsi Jankowice.
- 7 (83) Około 50 m na północ od stanowiska 82, obok zarośli z *Cerasus fruticosa*.
- 8 (84) Ściany wąwozów lessowych w polu ob. Leszczyńskiego z Kichar, ok. 1 km na północ od budynków gospodarczych.
- 9 (51) Obok stanowiska 49 i 50.
- 10 (57) Zbocze Panieńskiej Góry k. Dwikóz.
- 11 (80) Kilka metrów na północ od stanowiska 4.
- 12, 13, 14, 15 (52—55) Ściany wąwozów lessowych obok stanowisk 49 i 50.

Profil 8 wykonano w płacie zdjęcia 79 w dniu 6.VII.1962, na zboczu parowu o nachyleniu 35°, wystawie SE, położonym na gruntach wsi Gałkowice Ocín. Głębokość profilu 150 cm.

A₀ luźne szczątki obumarłych roślin.

A₁' 0—25 cm poziom próchniczny ciemny, o strukturze gruzelkowatej, z licznymi korytarzykami dżdżownic. Pod zwartym kobiercem roślinności gleba wilgotna przerośnięta korzeniami roślin.

A₁'' 25—40 cm poziom mineralno-próchniczny, jasnopopielaty, bez śladów wymywania. Na głębokości ok. 37 cm zauważono 3 małe konkrecje CaCO₃.

C 40—150 cm skała lessowa jasnożółta z białą siatką kapilarów. Na 65 i 98 cm wykryto skupienia CaCO₃ w postaci ziarn i małych laleczek. Pojedyncze korzenie roślin spotykano na głębokości 86 cm.

Profil 9 pochodzi z płatu zdjęcia 83 i wykonany został 7.VII.1962 r. na krawędzi dol. Wisły pomiędzy Podgórzem a Zawichostem. Ekspozycja SE, nachylenie 30°. Głębokość profilu 150 cm.

A₀ ślady dobrze rozłożonych roślin zmieszanych z popiołem pochodzącym z wypalania obumarłych pędów w okresie wiosennym.

A₁' 0—28 cm poziom próchniczny ciemny. Struktura gleby gruzelkowata, wilgotna przerośnięta korzeniami roślin; pojedyncze korytarze dżdżownic.

A₁'' 28—39 cm poziom przejściowy, popielaty z ciemniejszymi smugami.

C 39—150 jasnożółta skała lessowa o konsystencji pylastej z liczną siatką kapilarów i pojedynczymi rdzawymi plamami związków żelaza. Na głębokości 73 cm spotkano margliste utwory w postaci ziarn fasoli.

d. Zbiorowisko z *Brachypodium pinnatum* a zbiorowiska pokrewne

Zbiorowisko roślinne pod nazwą *Brachypodium pinnatum* i *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla* na podstawie 4 zdjęć opisała K o z ł o w s k a (1926) z Wyżyny Małopolskiej. Autorka uważa to zbiorowisko za ogniwo przejściowe pomiędzy zespołem *Galeopsis ladanum* i *Linaria vulgaris* a *Inuletum ensifoliae*.

Pomimo panowania w zdjęciach *Brachypodium pinnatum* zbiorowisko to pod względem ubóstwa składu florystycznego (29 gatunków) i struktury nawiązuje do płatów zbiorowiska *Festuca duriuscula*-*Potentilla arenaria* z Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Ilżeckiego.

Płaty zbiorowiska *Brachypodium pinnatum* opisanego w niniejszej pracy najbardziej są zbliżone do *Thalictro-Salvietum* wyodrębnionego przez M e d w e c k ą - K o r n a ś (1959) z rezerwatu stepowego „Skorocice” koło Buska. Obydwa zbiorowiska cechuje duże bogactwo florystyczne i szereg gatunków wspólnych o takiej samej lub przybliżonej stałości. Z 10 gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla *Thalictro-Salvietum* 7 występuje w płatach *Brachypodium pinnatum* z tym, że 4 wyróżniające osiągają IV i II stopień stałości, a trzy pozostałe jako charakterystyczne zespołu występują tu tylko sporadycznie.

Mniejszą stałość pewnych gatunków względnie ich brak (z rzędu *Festucetalia vallesiacae* i klasy *Festuco-Brometea*) można tłumaczyć dużym zwarcim *Brachypodium pinnatum*. W *Thalictro-Salvietum* na 6 zdjęć *Brachypodium pinnatum* występuje tylko dwukrotnie.

Obok podobieństwa florystycznego istnieją podobne warunki ekologiczne: łagodny spadek terenu, mniejsza zależność wykształcenia się płatów od ekspozycji, większa akumulacja poziomu próchnicznego w glebie. Mimo tak daleko idącego podobieństwa naszych płatów nie można uznać za zespół *Thalictro-Salvietum*.

Gatunki wymienione przez Medwecką-Kornasiową za charakterystyczne i wyróżniające dla *Thalictro-Salvietum* spełniają zupełnie inną rolę na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim.

Bardzo interesujący jest płat roślinności ze zbocza doliny Wisły pomiędzy Chełmnem i Płutowem (Medwecka-Kornaś l.c.) jako zbiorowisko analogiczne do *Thalictro-Salvietum*. Porównując płat murawy znad dolnej Wisły z płatami *Brachypodium pinnatum* badanego terenu widzimy identyczny skład roślinności. Na 26 gatunków ze związku *Festucion vallesiacae*, rzędu *Festucetalia vallesiacae* i klasy *Festuco-Brometea* 22 gatunki występują w naszych płatach. Poza tym *Brachypodium pinnatum*, *Festuca sulcata*, *Phleum Boehmeri*, *Medicago falcata*, *Salvia pratensis* i inne podobnie jak u nas są gatunkami panującymi.

Gatunki wybitnie stepowe znad dolnej Wisły mające duże pokrycie, np. *Adonis vernalis* (3.2) i *Oxytropis pilosa* (1.2) w naszych płatach występują sporadycznie, a *Carex supina* i *Stipa Joannis* u nas do tego rodzaju zbiorowisk nie wchodzi. Tak więc płat roślinności znad dolnej Wisły jest bardzo zbliżonym płatem do zbiorowiska z *Brachypodium pinnatum* z Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego.

Z terenu Pomorza Zachodniego analogiczne zbiorowisko opisał Libbert (1933) w randze podzespołu z *Brachypodium pinnatum* w obrębie zespołu *Stipa capillata*-*Potentilla arenaria*. Lista Libberta jest nieco uboższa w gatunki charakterystyczne dla związku *Festucion vallesiacae* i rzędu *Festucetalia vallesiacae*. Natomiast w obrębie jednostek wyższych jest bardzo podobna do *Thalictro-Salvietum* i płatów *Brachypodium pinnatum* badanego terenu. Płaty Libberta i nasze wykazują bardziej mezofilny charakter w stosunku do *Thalictro-Salvietum*. Poza tym w budowie tych zbiorowisk biorą udział krzewy: *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Juniperus communis* i inne.

Pewne podobieństwo wykazują nasze płaty do *Thalictro-Salvietum* ostatnio opracowanego przez Staniewską (1961) z okolic Poznania. Staniewska wyróżnia w obrębie tego zespołu trzy warianty: a) z *Potentilla arenaria*, b) z *Brachypodium pinnatum* i c) wariant zubożały.

W wariantcie z *Brachypodium pinnatum*, podobnie jak na naszym

terenie panującym gatunkiem jest kłosownica pieprzysta, a szereg innych gatunków z klasy *Festuco-Brometea* wykazuje wiele cech wspólnych. Inne warianty różnią się już znacznie.

Porównując listy florystyczne zespołu *Thalictro-Salvietum* z analogicznymi zbiorowiskami murawowymi z różnych regionów Polski z płacami z *Brachypodium pinnatum* zauważamy wiele gatunków wspólnych, charakteryzujących się dużą stałością i pokrywaniem, ale gatunki te wykazują dużą skalę ekologiczną; spotykamy je również w zbiorowiskach zaroślowych (tabela 18).

Niewątpliwie płaty z *Brachypodium pinnatum* trzeba uznać za zbiorowisko przejściowe od *Stipetum capillatae* lub *Keolerio-Festucetum sulcatae* do zbiorowisk zaroślowych. Wskazują na to sporadycznie występujące gatunki stepowe: *Adonis vernalis*, *Agropyron intermedium*, *Hieracium Bauhini*, *Oxytropis pilosa*, *Thesium linophyllum* i pojawienie się krzewów z rzędu *Prunetalia*: *Berberis vulgaris*, *Cerasus fruticosa*, *Prunus spinosa* i *Rhamnus cathartica*. Takie samo zdanie można wyrazić o płacie roślinności ze zbocza doliny Wisły pomiędzy Chełmem i Płutowem oraz o płatach podzespołu *Brachypodium pinnatum* Libberta (l.c.) z Pomorza Zachodniego i o wariantcie z *Brachypodium pinnatum* w obrębie *Thalictro-Salvietum* opisanym przez Stanięską (l.c.). O takim kierunku sukcesji świadczyłyby również warunki ekologiczne. Na siedliskach o mniejszym nachyleniu przy ekspozycji zbliżonej do południowej panują mniej skrajne warunki mikroklimatyczne i gdy na miejscach tych pod wpływem roślinności stepowej wykształci się znaczny poziom próchniczny, wkraczają bardziej mezofilne gatunki z *Thalictro-Salvietum*, czy też ze zbiorowiska *Brachypodium pinnatum*.

W świetle dotychczasowych badań *Thalictro-Salvietum* należałoby uznać za zbiorowisko zastępcze. Wymienione przez Medvecką-Kornasiową gatunki charakterystyczne i wyróżniające dla tego zespołu mogą mieć tylko znaczenie lokalne. Na badanym terenie wchodzi one do niemal wszystkich muraw kserotermicznych i zbiorowisk zaroślowych. Na Wyżynie Lubelskiej gatunki te występują w bardziej kserotermicznych murawach opisanych pod nazwą zbiorowiska *Agropyron intermedium* i zespołu *Festuca vallesiaca-Erysimum crepidifolium* przez Izdebskiego (1958) z Rudnika k. Lublina i Dobużka k. Łaszczowa.

Zbiorowiska z *Brachypodium pinnatum* badanego terenu nie można również zaliczyć do zespołu *Adonido-Brachypodietum pinnati* opisanego przez Krauscha (1961) z Brandenburgii. Autor ten wydzielił 3 podzespoły w obrębie tego zespołu: z *Calamintha acinos*, typowy i z *Arrhenatheretum elatius*. Zespół ten charakteryzuje w oparciu o 28 gatunków, które w większej części należą do klasy *Festuco-Brometea* i są pospolite na całym badanym terenie. Inne natomiast są składnikami naszych zespołów. Występowanie w *Adonido-Brachypodietum pinnati* gatunków

z rzędu *Festucetalia vallesiaca*, związku *Festucion vallesiaca*, z rzędu *Brometalia erecti* oraz rzędu *Quercetalia pubescentis-sessiliflorae* i pojawienie się krzewów z rzędu *Prunetalia* podkreśla przejściowy charakter tego zespołu.

6. *Scabioso-Teucrietum* ass. nova

a. Występowanie w terenie i ekologia

Scabioso-Teucrietum jest zbiorowiskiem wtórnym. Płaty jego rozwijają się na zboczach kredowych, na których przed kilkudziesięciu laty wycięto las mieszany lub zarośla z *Peucedano-Coryletum*. Jeszcze do dziś spotykamy pojedyncze pnie ściętych drzew oraz bardzo rzadko rozrzucone sosny o wysokości od 5 do 9 m, których wiek wynosi około 55 lat. Według informacji miejscowej ludności las wycięto w 1914 r. W skład jego wchodził: dąb, grab, wiąz i sosna pospolita.

Po wycięciu lasu nastąpiło częściowe splukanie poziomu próchnicznego ze zboczy przez opady atmosferyczne i obnażanie skały macierzystej. Na miejscach o dużym spadku takie zjawisko możemy obserwować i dziś, gdzie cienka warstewka gleby wraz z mchami splukiwana jest na teren niżej położony. Miejsca te charakteryzują się bardziej ruchomym podłożem i dużym udziałem odłamków skalnych leżących na powierzchni. Są to siedliska prawie nagie lub tylko z rzadka pokryte roślinnością zielną.

Stoki o mniejszym spadku (18—35°) cechuje zwięzłość podłoża i duża akumulacja próchnicy w profilu glebowym. Siedliska te zajęte zostały przez płaty *Scabioso-Teucrietum*, które wykształcają się dość jednolicie.

Występowanie opisywanego zbiorowiska ogranicza się głównie do zbocza kredowego ciągnącego się na przestrzeni ok. 1,5 km na południe od Lasocina do szosy prowadzącej z Ożarowa do Annopola i stoku kredowego położonego na terenie wsi Kolonia Linów koło Lasocina. Stok ten w większej części porośnięty jest przez zarośla *Peucedano-Coryletum* i mały zagajnik dębowy. Na podlegających stałej erozji zboczach kredowych dolin rzecznych: Wisły (na odcinku Dębno — Solec Sandomierski) i Kamiennej (na odcinku Pętkowice — Czekarzowice) spotykamy płaty inicjalne tego zbiorowiska.

Scabioso-Teucrietum przywiązane jest do siedlisk ciepłych, suchych, charakteryzujących się znacznym spadkiem terenu, ekspozycją południową i południowo-zachodnią oraz podłożem zasobnym w węglan wapnia (ryc. 7).

Opisywane zbiorowisko rozwija się na glebach silnie próchnicznych węglanowych. Z uwagi na jeden typ gleby stosunki glebowe scharakteryzowano na przykładzie dwóch profili glebowych. Obydwa profile glebowe można przedstawić schematem A₁-A/C-C.

Zawartość materii organicznej w obu profilach jest wyższa w stosunku do tego samego typu gleb zajętych przez płaty *Brachypodium pinnatum* i *Asteri-Linetum*. W profilu 26 wynosi ona od 5,39—8,70%, a w profilu 21 równa się 5,02%. Niższa zawartość materii organicznej w profilu 21 związana jest z większym spadkiem terenu.

Odczyn wszystkich próbek glebowych jest zasadowy. Kwasowość czynna w poziomie próchnicznym obu profili wynosi od 7,3—8,5 pH, a przy wymiennej od 6,9—8,1 pH. W poziomach niższych zarówno kwasowość czynna, jak i wymienna jest wyższa. Liczne odłamki skalne w poziomie próchnicznym, jak i pokruszona skała macierzysta w niż-

Ryc. 7. Profile glebowe zespołu *Scabioso-Teucrietum*

1 — resztki suchych roślin murawowych; 2 — ciemny poziom próchniczny zmieszany ze zwietrzeliną margli kredowych; 3 — korzenie; 4 — odłamki i bloki skalne margli kredowych

Soil profiles of the association *Scabioso-Teucrietum*

1 — debris of dry sward plants; 2 — dark horizon of humus mixed with weathered Cretaceous marl; 3 — roots; 4 — Cretaceous marl debris and blocks

szym poziomie decyduje o bardzo dużej zawartości węglanu wapnia, która wynosi od 33,66—44,31%. Szczegółowe wyniki analiz mechanicznych i chemicznych przedstawia tabela 19, a schematy profili rycina 7.

Glebę wykształconą z margli kredowych z dużą zawartością materii organicznej określono jako rędzinę czarnoziemną. Na podstawie miąższości i materiału szkieletowego zaliczono ją do rędzin czarnoziemnych średnio głębokich i średnio szkieletowych.

Pod względem składu mechanicznego w opisywanych profilach glebowych zarysowują się wyraźne różnice. W profilu 26 występuje duży procent piasku (28—57%); jest on wynikiem akumulacji powietrznej (na przeciwnym stoku zalegają lekkie gleby piaszczyste). Ten rodzaj gleby należy do rędzin mieszanych. Natomiast w profilu 21 domieszka obcego materiału jest niższa, wynosi od 7—24%, ale zawiera on od 56 do 71% części spławialnych. Ten profil glebowy o powyżej przedstawionym składzie mechanicznym charakteryzuje rędziny ciężkie.

Czynnikiem siedliskowym warunkującym rozwój i egzystencję *Scabioso-Teucrietum* jest silnie próchniczna gleba przy bardzo wysokiej zawartości CaCO_3 w całym profilu glebowym.

Tabela 19 - Table 19
Wyniki analiz glebowych /Results of soil analyses/

Nr profilu No of profile	Głębokość w cm Depth of horizon in cm	Części szkiele- towe w % Skeleton parts in %	Części ziemiaste Earth parts				Zawartość CaCO ₃ w % Content of CaCO ₃ in %	pH czynne pH active	pH w KCl pH in KCl	Zawartość materii organicz- nej Content of organic matter
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm.	0,02 mm				
26	0-29	25,8	28	15	24	33	42,20	7,3	6,9	8,70
	29-39	48,0	57	17	14	12	44,31	7,7	7,6	5,39
21	0-15	30,2	7	9	13	71	33,66	8,5	8,1	5,02
	15-47	57,7	24	7	13	56	35,63	8,3	7,9	-

Opisywana asocjacja jest zbiorowiskiem bezzaroślowym. Występujące pojedynczo lub sporadycznie krzewy są niskie, nie przerastają warstwy zielnej i nie odgrywają większej roli w budowie zbiorowiska. Poza tym są one niszczone przez obgryzanie kory z pędów przez liczne stada królików gnieźdzących się tu w szczelinach skalnych lub w pobliskim lasu sosnowym.

W pionowym układzie roślinności można wyróżnić trzy warstwy: dwie warstwy roślinności zielnej i warstwę mchów. Warstwa mszysta jest tu najlepiej wykształcona spośród wszystkich muraw kserotermicznych badanego terenu. Pokrycie jej w poszczególnych zdjęciach waha się od 10 do 60%. Główna masa roślinności zielnej nie przekracza 15 cm i buduje warstwę średnią. Najwyższą warstwę zaznaczają kwiatostany nielicznych roślin zielnych, np.: *Scabiosa columbaria*, *Anthericum ra-*

Tabela 21 - Table 21
Liczba gatunków w poszczególnych stopniach stałości
Number of species in the particular constancy grades

Stałość Constancy	Powierzchnia Surface	20 - 64 m ²		
		rośliny naczyn. vascular plants	mchy mosses	Razem total
V	81 - 100 %	7	.	7
IV	61 - 80 %	6	2	8
III	41 - 60 %	18	.	18
II	21 - 40 %	17	2	19
V-II	100 - 21 %	48	4	52
I	1 - 20 %	41	2	43
V -I	100 - 1 %	89	6	95

mosum, *Poa Pratensis* var. *angustifolia*, *Salvia pratensis*, *S. verticillata*, i krzewy: *Berberis vulgaris*, *Cornus sanguinea*, *Rhamnus cathartica*, *Rosa canina*, *Rosa rubiginosa*, *Rosa spinosissima*, *Rosa tomentosa* i *Juniperus communis*. Wzrost tej warstwy nie przekracza 40 cm. Pokrycie roślinności naczyniowej waha się od 65 do 90%.

Skład florystyczny *Scabioso-Teucrietum* jest bogatszy w stosunku do zespołów murawowych przedstawionych poprzednio. Pod tym względem jedynie przewyższa go zbiorowisko z *Brachypodium pinnatum*. Na ogólną sumę 95 gatunków 52 osiąga V—II stopień stałości. Z tego 21 gatunków o V—II stopniu stałości występuje w grupie gatunków towarzyszących. Pozostałe należą do dwóch klas: *Festuco-Brometea* i *Quercus-Fagetea*. Udział gatunków leśnych jest niewielki, podkreślają one bardziej mezofilny charakter tego zbiorowiska. Liczba mchów jest niska, 4 z nich osiąga od IV—II stopnia stałości. Na podkreślenie zasługuje

fakt, że dwa gatunki mchów: *Rhytidiadelphus triquetrus* i *Thuidium Philliberti* przywiązane do stanowisk wilgotniejszych podkreślają mniej skrajne warunki siedliskowe tego zbiorowiska.

Pod względem kombinacji gatunków opisywane zbiorowisko wyraźnie odróżnia się od zbiorowisk murawowych badanego terenu i wyodrębniam go jako osobny zespół *Scabioso-Teucrietum*. Gatunkami charakterystycznymi zespołu są *Teucrium chmaedrys* (stałość 100%, współczynnik pokrycia 3290) i *Scabiosa columbaria* (stałość 100%, współczynnik pokrycia 1437). Gatunkiem wyróżniającym dla *Scabioso-Teucrietum* jest *Viola collina*; przy V stopniu stałości osiąga tu najwyższy współczynnik pokrycia (1518) spośród zbiorowisk murawowych i zaroślowych. Skład florystyczny zespołu przedstawia tabela 20.

Średnia liczba gatunków w zdjęciu wynosi ponad 25. W poszczególnych zdjęciach liczba ta waha się od 27 do 47. Najbogatsze w gatunki są płaty wykształcone na siedliskach charakteryzujących się wysoką zawartością materii organicznej w profilu glebowym (zdj. 37—39).

Rozdział gatunków na 5 stopni stałości przedstawia tabela 21. Cyfry w niej zawarte przedstawiają obraz typowy dla zespołu o jednolitym składzie florystycznym. Najwięcej jest tu gatunków sporadycznych, tzn. o I stopniu stałości, na drugim miejscu stoją gatunki o II stopniu stałości, dalej na trzecim gatunki o III stopniu stałości. Najmniej jest gatunków od V—IV stopnia stałości (razem jest ich 15).

Aby określić stanowisko systematyczne zespołu, zastosowałem według wzoru Tüxena i Ellenberga (1937) obliczenia wartości systematycznej dla poszczególnych grup syngenetycznych. Z wyliczeń tych wynika, że łączna wartość systematyczna grupy z klasy *Festuco-Brometea* jest ponad 3-krotnie wyższa od łącznej wartości systematycznej grupy obu rzędów: *Prunetalia* i *Quercetalia pubescentis* wchodzących w obręb klasy *Querco-Fagetea*.

Grupy syngenetyczne gatunków Syngenetic group	Liczba gatunków Number of spe- cies Z	Udział Contribu- tion G	Stałość Constancy S	Wartość systema- tyczna Systematic value D
<i>Festucetalia vallesiaca</i>	7	6,7	30,9	2,17
<i>Brometalia erecti</i>	2 35	6,26 40,8	100 40	6,26 17,5
<i>Festuco-Brometea</i>	26	31,3	38,4	12,01
<i>Prunetalia</i>	7	3,91	17,8	0,69
<i>Quercetalia pubescentis</i>	10 17	10,9 11,7	35 43,2	3,81 5,05
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/	43	41,5	31,6	13,11

Wysoką wartość systematyczną osiąga grupa gatunków z rzędu *Brometalia erecti*. Jest ona niemal 3-krotnie wyższa od wartości systematycznej grupy z rzędu *Festucetalia vallesiaca* i nieznacznie wyższa od

obu rzędów *Quercus-Fagetea*. Przedstawione w tabeli wskaźniki wartości systematycznej poszczególnych grup syngenetycznych, budujących zespół *Scabioso-Teucrietum*, uzasadniają zaliczenie opisywanej asocjacji do rzędu *Brometalia erecti*, klasy *Festuco-Brometea*.

Poza badanym terenem płaty tego zespołu występują również na Wyżynie Lubelskiej koło Kazimierza, na południe od schroniska (Celiński — informacja ustna).

c. Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych

- 1, 2, 3 (130, 131, 132) Zbocze kredowe przy gospodarstwie P. Kuśmirczyka ze wsi Kolonia Linów.
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (140—147 i 176) Zbocze kredowe ciągnące się od Lasocina do szosy prowadzącej z Ożarowa do Annopola. Zbocza te porośnięte są z rzadka sosną pospolitą.

Opis profili glebowych

Profil 26 wykonano w płacie zdjęcia 130 dn. 28.VII.1963 r. na stoku o nachyleniu 20°, przy ekspozycji SWW, w miejscowości Kolonia Linów. Głębokość profilu 45 cm.

A₀ — Dość liczne szczątki obumarłych roślin.

A'₁ 0—29 cm poziom próchniczny barwy czarnej ze znacznym udziałem odłamków skalnych. W powierzchniowej warstwie, tj. do głębokości ok. 4 cm gleba przesuszona o strukturze orzechowej.

A'' 29—39 cm poziom próchniczny ciemnoszary z większym udziałem odłamków skalnych. Gleba wilgotna przerośnięta korzeniami roślin.

A/C 39—45 cm pokruszone bloki skalne margli kredowych, pomiędzy którymi spotykamy szczeliny z naciekami poziomu próchnicznego, o barwie ciemnoszarej i pojedyncze korzenie roślin.

C Zwarta skała, margiel kredowy.

Profil 21 wykonano w płacie zdjęcia 141, dn. 2.VIII.1963 r. na stoku o nachyleniu 35°, przy wystawie SSW, w odległości ok. 2 km od Lasocina. Głębokość profilu 47 cm.

A₀ Szczątki roślin, przeważnie wokół odłamków skalnych.

A₁ 0—15 cm poziom próchniczny, ciemnoszary z licznymi odłamkami skalnymi z przewagą na powierzchni. Zewnętrzna powierzchnia gleby sucha, podobnie jak w profilu 26 wykazuje strukturę ziarnisto-orzechową. Głębiej gleba wilgotna poprzerastana korzeniami roślin.

A/C 15—47 cm poziom przejściowy, silnie szkieletowaty. Większość odłamków skalnych osiąga średnicę 10 cm. Pomiędzy pokruszoną skałą szare nacieki próchnicy.

C Poniżej 47 cm bloki skalne — margiel kredowy.

7. Zespół *Asteri-Linetum flavae* ass. nova

a. Występowanie w terenie i ekologia

Płaty zbiorowiska *Asteri-Linetum flavae* rozwijają się na silnie zero-dowanych zboczach wąwozów oraz stromej krawędzi doliny Wisły zbu-

lowanych z margli kredowych. Zajmuje ono niewielkie powierzchnie, najczęściej pomiędzy małymi zupełnie luźnymi płatami zarośli. W skład płatów zaroślowych wchodzi: *Prunus spinosa*, *Rosa rubiginosa*, *Berberis vulgaris*, *Crataegus monogyna*, *Cornus sanguinea*, *Rhamnus cathartica*, *Juniperus communis* i *Cerasus fruticosa*.

Zbiorowisko to spotykamy tu tylko na zboczach o ekspozycji południowej na podłożu stosunkowo luźnym. Nachylenie miejsc opanowanych przez roślinność tego zbiorowiska waha się od 15—45° (ryc. 12d, str. 104).

Ryc. 8. Profil glebowy zespołu *Asteri-Linetum flavae*

1 — zwietrzelina margli kredowych; 2 — odłamki i bloki skalne margli kredowych; 3 — korzenie

Soil profile of the association *Asteri-Linetum flavae*

1 — Weathered Cretaceous marl; 2 — Cretaceous marl debris and blocks; 3 — roots

Występowanie *Asteri-Linetum flavae* ogranicza się na badanym terenie jedynie do dwóch stanowisk: wąwozu położonego tuż za ostatnim gospodarstwem należącym do wsi Sadkowice od strony Solca oraz małego wąwozu i stromej krawędzi doliny Wisły w niewielkiej odległości na północ od wsi Nowe. Najbardziej typowe fragmenty tej murawy zachowały się w Sadkowicach.

Charakterystykę stosunków glebowych powyższego zbiorowiska przedstawiono na podstawie jednego profilu glebowego, gdyż na drugim stanowisku podłoże było podobne i jednakowo zaawansowany proces glebotwórczy.

Profil glebowy 20 jest bardzo płytki i kamienisty. Już na głębokości 30 cm występuje zwarte podłoże skalne — margiel kredowy (analiza chemiczna wykazała, że w skład skały wchodzi: 90% CaCO_3 i 10% ilu). Na powierzchni gleby spotykamy liczne odłamki skalne, przeważnie o średnicy od 3 do 5 cm. W poziomie próchnicznym, który jest tu płytki i wynosi zaledwie 15 cm, części szkieletowych jest stosunkowo dużo, bo około 23%. Na głębokości od 15—30 cm udział materiału szkieletowego bardzo wzrasta i dochodzi do 59%. W profilu glebowym wyróżniamy trzy poziomy: A_1 , A/C i C.

Poziom próchniczny (A_1) dochodzi do 15 cm głębokości. Jest zupełnie biały, chociaż zawiera 3,17% substancji organicznych. Rozdrobniony CaCO_3 pod wpływem czynników glebotwórczych maskuje znaczny udział substancji organicznych w glebie. Poziom przejściowy (A/C) o miąższości od 15—30 cm o barwie białej z nieco ciemniejszymi zaciekami poziomu próchnicznego. Poziom C: skała macierzysta — margiel kredowy w postaci dużych bloków skalnych.

Pobrane do analizy chemicznej próbki glebowe wykazują bardzo wy-

Tabela 22 - Table 22
Wyniki analiz glebowych /Results of soil analyses/

Nr profilu No. of profile	Głębokość poziomu Depth of horizon cm	Części szkie- letowe Skele- ten parts %	Części ziemiaste - Earth parts			Zawartość CaCO ₃ Content of CaCO ₃ %	pH czyłne pH active	pH w KCl pH in KCl	Zawartość materii organicznej Content of organic matter
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm				
20	0-15	23	38	22	24	21,15	8,2	7,8	3,17
	15-30	59	28	21	25	42,26	8,4	7,9	-

soki procent zawartości CaCO_3 , od 21,15 do 42,26%. Odczyn poziomu próchnicznego wynosi $\text{pH} = 8,2$, a przejściowego jest nieco wyższy i wynosi $\text{pH} = 8,4$. Tak więc ten rodzaj gleby jest silnie alkaliczny. Na podstawie analiz badaną glebę możemy określić jako białą, czystą rędzinę szkieletową.

Załączona rycina 8 przedstawia schematyczny obraz badanego profilu, a tabela 22 wyniki analiz poszczególnych próbek glebowych.

b. Struktura i skład florystyczny

Asteri-Linetum flavae zbudowane jest w zasadzie z dwóch warstw: warstwy zielonej i pojedynczo występujących krzewów. Ruchome podłoże i proces erozyjny gleby nie wpływa dodatnio na wykształcenie się warstwy mchów. Większą rolę odgrywają tu: *Camptothecium lutescens* i *Ceratodon purpureus*, których pokrycie w poszczególnych płatach waha się od 5—10%. Udział krzewów w tym zbiorowisku również jest niewielki. Mamy tu wprowadzić kilka gatunków krzewów, które rosną pojedynczo, lecz są one skarłale; pędy ich są przeważnie powyginane w różne strony lub leżą na podłożu skalnym. Wysokość ich na ogół nie przekracza 1 m. Krzewy są stosunkowo płytko ukorzenione, nawet spotyka się obnażony system korzeniowy, który wraz z pędami podziemnymi pełza po podłożu skalnym. Niektóre krzewy wykazują osłabioną żywotność, przejawiającą się przede wszystkim w przedwczesnym zrzućaniu znacznej części liści i owoców. Przypuszczalnie jest to związane z małą zawartością wody. Na przykład już w środku lata, podczas ciepłych dni lipcowych *Crataegus monogyna* pozbywa się części swoich liści.

Warstwa zielna, która decyduje o budowie zbiorowiska, nie osiąga nigdy pełnego zwarcia. Pokrywanie w poszczególnych płatach waha się od 45 do 70% i uzależnione jest od nachylenia zboczy i związanego z nim natężenia procesu erozyjnego gleby.

Pod względem florystycznym opisywane zbiorowisko *Asteri-Linetum flavae* jest stosunkowo ubogie. W skład niego wchodzi, sumie 52 gatunki. Z tej liczby zaledwie 28 gatunków występuje z większym stopniem stałości (V—III), a 24 gatunki należą do grupy sporadycznych. Stosunkowo mała liczba gatunków wchodząca w skład zespołu związana jest z luźnym skalistym podłożem wapiennym. Obraz tego zespołu przedstawia tabela 23.

O dość jednolitym składzie florystycznym omawianego zbiorowiska mówi nam tabela 24, w której dokonano rozdziału gatunków na stopnie stałości w poszczególnych grupach syngenetycznych.

Spółród 28 gatunków opisywanego zbiorowiska osiagających wyższy stopień stałości 15 gatunków przypada na klasę *Festuco-Brometea*. Posiadają one jednocześnie najwyższy współczynnik pokrycia. Sześć ga-

tunków reprezentuje klasa *Querco-Fagetea* przy małym współczynniku pokrycia. Z gatunków towarzyszących 7 osiąga od V—III stopnia stałości, przy stosunkowo niewielkim współczynniku pokrycia.

Panującymi gatunkami w tym zbiorowisku są: *Aster amellus*, posiadający najwyższy współczynnik pokrycia (1571) i V stopień stałości i *Linum flavum* osiągający współczynnik pokrycia 857 i V stopień stałości. Największe przywiązanie do wyżej opisywanego zbiorowiska wykazuje *Linum flavum*, które z reguły związane jest ze szkieletową, luźną glebą wapienną. Wyjątkowo roślinę tę można spotkać na badanym terenie na otwartych, osypujących się zboczach lessowych. Ruchome podłoże umożliwia zasypywanie rozsianych nasion i ułatwia ich kiełkowanie. Większą skalę wyżycia posiada *Aster amellus*, ale nigdzie nie spotykamy tak dobrze wykształconych i tak obficie kwitnących roślin, jak w wyżej wymienionym zbiorowisku.

Tabela 24 - Table 24

Rozkład stopni stałości w poszczególnych grupach syngenetycznych zespołu *Asteri - Linetum flavae*
Grades of constancy in the particular syngenetic groups of the association *Asteri - Linetum flavae*

Stopień stałości Constancy grades	V	IV	III	Razem Total
Grupy syngenetyczne Syngenetic groups				
<i>Festucetalia vallesiacae</i>	4	—	1	5
<i>Festuco-Brometea</i>	2	1	7	10
<i>Querco - Fagetaea</i>	3	1	2	6
Towarzyszące /Accompanying/	2	2	3	7
Liczba gatunków w poszczególnych stopniach stałości Number of species in the particular constancy grades	11	4	13	28

Zbiorowisko *Asteri-Linetum flavae* wyraźnie wyodrębnia się pod względem socjologicznym od innych muraw kserotermicznych badanego obszaru i należałoby go uznać za osobną asociację. Gatunkami charakterystycznymi zespołu są: *Aster amellus*, *Linum flavum* i *Hieracium Bauhini*, a gatunkami wyróżniającymi są: *Peucedanum cervaria* i *Cytisus nigricans*. *Hieracium Bauhini* osiąga V stopień stałości przy współczynniku pokrycia równym 78, natomiast *Peucedanum cervaria* V stopień stałości przy współczynniku pokrycia równym 8 i *Cytisus nigricans* IV stopień stałości przy współczynniku pokrycia równym 7. Spośród gatunków rzędu *Festucetalia vallesiacae* V stopień uzyskują *Salvia verticillata* i *Scabiosa ochroleuca*. Natomiast z gatunków klasy *Festuco-Brometea* największą stałość w zespole wykazuje *Anthericum ramosum* (V) i *Medicago falcata* (IV). Do badanego zespołu przenikają również liczne gatunki zaroślowe, spośród których najwyższą stałość i współczynnik pokrycia wykazuje *Anemone sylvestris* (V stopień stałości przy

Fot. 7. Aspekt letni zespołu *Asteri-Linetum flavae*
Summer aspect of the association *Asteri-Linetum flavae*

współczynnika pokrycia 396) i *Berberis vulgaris* (V stopień przy współczynnika pokrycia bardzo niskim, równym 7).

Zespół *Asteri-Linetum flavae* w ciągu okresu wegetacyjnego zmienia wielokrotnie swoją barwę i pod tym względem jest najbardziej efektywnym zbiorowiskiem murawowym badanego terenu. Chociaż dokładnie fenologii zespołu nie badano, mimo to uchwycono główne aspekty związane z masowym zakwitaniem pewnych gatunków. Najwcześniej kwitną krzewy *Prunus spinosa* i *Cerasus fruticosa*, ale one występują pojedynczo i niewiele zmieniają wygląd zespołu. Nieco później wyraźnie już ożywiają zespół duże kwiaty *Anemone sylvestris* nadając mu główny aspekt wiosenny. Najpiękniejszy jest aspekt wczesnoletni, kiedy kwitnie już większość gatunków roślin, lecz trzy z nich: *Linum flavum*, *Athericum ramosum* i *Salvia verticillata* decydują o barwie zespołu. Od dość licznych kwitnących kęp *Linum flavum* zespół przyjmuje barwę żółtą, na tle której widnieją niepozorne białe kwiaty *Athericum ramosum*; niebieskofioletowe kwiaty *Salvia verticillata*. W drugiej dekadzie lipca następuje ponowne ożywienie barw zespołu; masowo zakwita *Aster umellus*. Od pięknych kwiatów astra zespół przyjmuje intensywną barwę fioletową. W tym czasie kwitnie tu jeszcze *Scabiosa ochroleuca*, lecz jej kwiaty na tle fioletowej barwy ledwie są widoczne. Pod koniec drugiej dekady sierpnia płaty omawianego zespołu zabarwiają się na szary kolor jesienny.

8. Zbiorowisko z *Carex humilis*-*Thesium linophyllum*

a. Występowanie i ekologia

Na zboczach małego wąwozu o wylocie do doliny Wisły, zbudowanego z margli kredowych rozwija się jedyny płat roślinności kserotermicznej, jaki znaleziono na badanym terenie, z udziałem *Carex humilis* i *Thesium*

Tabela 25 - Table 25
Zbiorowisko z *Carex humilis* - *Thesium linophyllum*
Community with *Carex humilis* - *Thesium linophyllum*

Nr zdjęcia /No. of relevé/	169
Data /Date/	5.VIII.1963
Miejscowość /Locality/	Nowe
Wystawa /Exposure/	SSE
Nachylenie w° /Degree of inclination/	30
Pokrycie warstwy ziół "c" /Cover of herbaceous layer "c"/	80
Pokrycie warstwy mchów "d" /Cover of moss layer "d"/	20
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of relevé in m ² /	25
Liczba gatunków w zdjęciu /Number of species in the relevé/	35
Gatunki panujące /Dominant species/	
<i>Carex humilis</i>	3.2
<i>Thesium linophyllum</i>	2.2
Gatunki charakterystyczne związku /Species characteristic of alliance/	
Festucion vallesiaceae	
i rzędu /and the order/	
Festucetalia vallesiaceae:	
<i>Achillea millefolium</i> ssp. <i>pannonica</i>	1.1
<i>Agropyron intermedium</i>	+
<i>Anthemis tinctoria</i>	+
<i>Campanula sibirica</i>	+
<i>Hieracium Bauhini</i>	+
<i>Potentilla arenaria</i>	+
<i>Salvia verticillata</i>	+
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	+
Gatunki charakterystyczne dla klasy /Species characteristic of the class/	
Festuco - Brometea:	
<i>Anthericum ramosum</i>	1.1
<i>Aster amellus</i>	+
<i>Brachypodium pinnatum</i>	+
<i>Centaurea scabiosa</i>	+
<i>Echium vulgare</i>	+
<i>Erigeron acer</i>	+
<i>Euphorbia cyparissias</i>	1.1
<i>Salvia pratensis</i>	+
<i>Teucrium chamaedrys</i>	+
<i>Verbascum lychnitis</i>	+
<i>Veronica spicata</i>	+
<i>Abietinella abietina</i> d	2.2
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/	
<i>Berberis vulgaris</i> b	r
<i>Convolvulus arvensis</i>	r
<i>Dipsacus pilosus</i>	r
<i>Erigeron canadensis</i>	+
<i>Helianthemum ovatum</i>	+
<i>Hieracium pilosella</i>	+
<i>Hypericum perforatum</i>	+
<i>Leontodon hispidus</i>	+
<i>Peucedanum cervaria</i>	r
<i>Picris hieracioides</i>	+
<i>Rosa rubiginosa</i> c	r
<i>Sedum acre</i>	+

linophyllum. Ten interesujący płat zajmuje miejsce wybitnie suche, słoneczne i osłonięte od wiatrów przez zarośla z *Berberis vulgaris*, *Crataegus monogyna*, *Evonymus verrucosa*, *Prunus spinosa* i *Rosa canina*.

Zboczne wąwozu charakteryzuje się łagodnym spadkiem (30°), ekspozycją południową i południowo-zachodnią. Glebą jest tu płytka rędzina kredowa, znajdująca się w początkowym stadium rozwoju, na powierzchni której leżą liczne odłamki skalne. W porównaniu z glebą rozwijającego się obok *Asteri-Linetum flavae*, wykazuje nieco większą akumulację próchnicy i nie posiada ruchomego podłoża.

b. Struktura i skład florystyczny

Struktura zbiorowiska charakteryzuje się niemal pełnym pokryciem roślinności w zdjęciu i panowaniem dwóch kępiastych gatunków roślin: *Carex humilis* i *Thesium linophyllum*. Obydwa gatunki pokrywają ponad 60% powierzchni. Pozostałą część skąpej roślinności tworzą gatunki z rzędu *Festucetalia vallesiacae* i klasy *Festuco-Brometea*. Udział gatunków towarzyszących jest również bardzo niski. Kępkowy układ roślinności i żółtozielony kolor liści *Carex humilis* oraz oliwkowozielony *Thesium linophyllum* dobrze odcina to zbiorowisko od innych muraw wyróżnionych w badanym terenie.

Otwarty teren i panowanie dwóch gatunków roślin wyraźnie wskazują na pionierski charakter tego zbiorowiska. Skład florystyczny zbiorowiska obrazuje tabela 25.

Pod względem zajmowanego siedliska, jak i kombinacji gatunków płat ten nieznacznie nawiązuje do zespołu *Carex humilis* i *Inula ensifolia*, opisanego w 1957 r. przez Fijałkowskiego i Izdebskiego, oraz płatów wykształconych na rędzinach kredowych na zboczach doliny Huczwy, opisanych przez Izdebskiego (1958) pod nazwą zespołu *Festuca sulcata-Carex humilis*. Opisany płat roślinności jest uboższy w gatunki w porównaniu do płatów rozwijających się na Wyżynie Lubelskiej.

9. *Prunetum fruticosae* S. Dziub. 1925

a. Występowanie w terenie i ekologia

Prunetum fruticosae należy na badanym terenie do najbardziej rozpowszechnionych zbiorowisk zaroślowych. Tak wielkie bogactwo płatów z *Cerasus fruticosa* związane jest z charakterystycznymi formami geomorfologicznymi terenu, którymi są: głębokie, wcięte parowy, wąwozy, jary, słupy ostańców lessowych, wkopy dróg polnych i strome stoki dolin rzecznych. Licznie rozpowszechnione formy te o ciepłych, słonecznych

i suchych stanowiskach opanowane zostały przez kserotermiczny zespół *Prunetum fruticosae*. Rozwija się on jeszcze na szerokich miedzach, okrajkach pól przyległych do wąwozów bądź parowów i na obrzeżeniach małych zagajników.

Stanowiska te charakteryzują się pełną insolacją, zazwyczaj usytuowane są w terenie na stokach o bardzo dużym spadku, a ekspozycja ich

Ryc. 9. Profile glebowe zespołu *Prunetum fruticosae*

1 — luźne resztki roślin; 2 a — poziom próchniczny, 2 b — poziom przejściowy; 3 — węglanowa skała lessowa; 4 — konkretcje CaCO_3 ; 5 — korzenie; 6 — zwietrzelina margli kredowych; 7 — odłamki i bloki skalne margli kredowych

Soil profiles of the association *Prunetum fruticosae*

1 — loose plant debris; 2 a — humus horizon, 2 b — intermediate horizon; 3 — loess containing calcium carbonate; 4 — CaCO_3 concretions; 5 — roots; 6 — weathered Cretaceous marl; 7 — Cretaceous marl debris and blocks

jest przeważnie południowa, południowo-wschodnia, południowo-zachodnia, rzadko wschodnia i zachodnia (ryc. 12 e na str. 104).

Omawiany zespół wykształca się na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórze Ilżeckim przede wszystkim na podłożu zasobnym w CaCO_3 , np. na kredzie, zwirowcu miocenijskim, lessie, ale nie jest to regułą. Obserwowałem doskonale rozwinięte i obficie owocujące krzewy wiśni karłowatej, rosnące na wietrzejących iłolupkach w Górach Pieprzowych pod Sandomierzem, których odczyn jest kwaśny ($\text{pH} = 5$).

Płaty tego zespołu rozrzucone są niemal po całym badanym terenie, lecz nigdzie nie rozwijają się tak typowo i nie zajmują tak dużych powierzchni, jak na podłożu lessowym. Szczególnie wielkie bogactwo tych

Tabela 26 - Table 26
Wyniki analiz glebowych /Results of soil analyses/

Numer profilu No. of profile	Głębokość poziomu w cm Depth of horizon in cm	Części szkiele- towe Skeleten parts %	Części ziemiste - Earth parts				Zawartość CaCO ₃ Content of CaCO ₃ %	pH czymne active pH	pH w KCl pH in KCl	Zawartość materii organicz- nej Content of organic matter
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm	0,02 mm				
2	0- 27	-	10	12	5/4	24	-	7,6	7,1	1,34
	30- 50	-	10	5	55	30	-	7,9	7,6	-
	80-110	-	13	14	40	33	2,75	8,0	7,8	-
4	0- 21	-	8	17	46	29	-	7,9	7,6	1,80
	21- 43	-	7	19	48	26	1,10	7,7	7,6	-
	60- 80	-	1	21	49	29	1,48	7,5	7,4	-
5	0- 20	-	6	12	51	31	-	7,7	7,5	2,20
	20- 35	-	4	20	43	33	0,85	7,8	7,7	-
	70- 90	-	5	17	50	28	2,83	8,0	7,7	-
6	0- 23	26	37	13	24	26	21,13	8,3	7,9	3,01
	23- 35	57	29	21	23	27	42,17	8,5	8,0	-

płatów spotykamy w dolinie Opatówki i w przyległych do niej parowach, wąwozach i jarach oraz na krawędziach doliny Wisły, pomiędzy Samborcem a Zawichostem jak również w parowach oraz jarach lessowych w okolicy Ostrowca. Na podłożu kredowym i żwirowcu miocенskim zarośla wiśni karłowatej zajmują stosunkowo małe powierzchnie, zwłaszcza na tych stanowiskach, które posiadają duży spadek terenu i są objęte erozją wodną. Duża liczba płatów na podłożu kredowym jest zniszczona przez obsuwu skalne.

Wiadomości na temat występowania wiśni karłowatej na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Ilżeckim spotykamy w różnych publikacjach botanicznych dotyczących tego terenu, jak i w pracach ogólnych np. Hempla (1885), Łapczyńskiego (1887), Dziubałtowskiego (1922, 1925), Jarosza (1951), Gostyńskiej (1963) i Głazka (1960 i 1964).

Prunetum fruticosae rozwija się na glebach powstałych z lessu, margli kredowych i żwirowca miocенskiego. Na podłożu lessowym i kredowym w sumie wykonano 4 profile glebowe, których schematy obrazuje rycina 9, a skład mechaniczny i chemiczny tabela 26.

Gleby profilu 2, 4 i 5 zaliczono na podstawie składu mechanicznego do typowych gleb brunatnych — lessowych, wylugowanych z CaCO_3 w poziomach próchnicznych, a nawet w głębszych poziomach, podobnie jak w profilu 2. Odczyn próbek we wszystkich profilach jest zasadowy. Węglan wapnia w profilu 2 występuje dopiero na głębokości 80 cm i osiąga wartość 2,75%. W pozostałych profilach stwierdzony został w poziomach przejściowych. Zawartość CaCO_3 w profilu 4 wynosi od 1,10—1,48%, a w profilu 5 od 0,85—2,83%. Zawartość materii organicznej w poziomach próchnicznych badanych profili jest niska i wynosi od 1,34 do 2,20%. Niską zawartość materii organicznej można tłumaczyć tym, że część drobnych, luźno ułożonych szczątek roślin spłukiwana jest przez wody opadowe.

Wszystkie poziomy profilu 6 charakteryzują się bardzo dużą zawartością CaCO_3 (od 21,13—42,17%) i odczynem zasadowym (pH czynne wynosi od 8,3—8,5). Pomimo zupełnie białej barwy poziomu próchnicznego zawartość materii organicznej jest stosunkowo duża (3,01%). Gleba tego profilu należy do płytkich, czystych, białych rędzin szkieletowych.

b. Struktura i skład florystyczny

Prunetum fruticosae jest zbiorowiskiem zaroślowym o słabo wyodrębnionych warstwach roślinności. Budują go wprawdzie trzy warstwy: warstwa krzewów, warstwa ziół i warstwa mchów, lecz w niektórych płatach krzewy wiśni karłowatej nieznacznie tylko przerastają warstwę zielną. Wszystkie warstwy roślinności w zdjęciach pokrywają glebę od 90—100%. Warstwa krzewów osiąga wysokość od 70—110 cm, bardzo rzadko jest wyższa. Jest ona niemal jednogatunkowa, utworzona przede wszystkim z *Cerasus fruticosa*, która w pewnych płatach osiąga 100% zwarcia. Obok niej minimalną domieszkę stanowią inne krzewy. Są to: *Berberis vulgaris*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna*, *Juniperus*

communis, *Prunus spinosa*, *Rhamnus cathartica*, *Rosa canina*, *Rosa rubiginosa* i *Frangula alnus*. Zdarza się, że nad warstwą krzewów sterczą pojedyncze drzewa: *Malus sylvestris* i *Pirus communis*. Zwarcie krzewów w poszczególnych płatach *Prunetum fruticosae* waha się od 15—100%. Związane jest to przede wszystkim ze stadiami sukcesyjnymi zespołu.

Warstwa zielna, która niemal we wszystkich zdjęciach jest bardzo dobrze wykształcona, posiada duży udział gatunków z rzędu *Festucetalia vallesiacae* i klasy *Festuco-Brometea*. Małe zwarcie krzewów w niektórych płatach, bądź też bardzo niski ich wzrost nie ocienia na tyle warstwę zielnej, aby z płatów zespołu *Prunetum fruticosae* wypadły gatunki, które rosną w pełnym nasłonecznieniu. Pod osłoną warstwy zielnej, której pokrywanie wynosi od 70—100% warstwa mszysta jest znikoma.

Płaty zarośli z *Cerasus fruticosa* tworzą na badanym terenie zbiorowisko będące w różnych stadiach rozwojowych. Występują tu płaty *Prunetum fruticosae* z bardzo dużym współczynnikiem pokrycia gatunków murawowych i stosunkowo niskim zwarcie samych krzewów, co wskazuje na charakter przejściowy tych płatów. Wszystkie zdjęcia tego typu włączono do jednej tabeli 27 jako zespołu *Prunetum fruticosae* z udziałem gatunków murawowych. Płaty zarośli, w których zwarcie krzewów wynosi od 70—100%, włączone do drugiej tabeli (nr 28) *Prunetum fruticosae* będącego w optymalnej fazie rozwoju.

Pod względem florystycznym *Prunetum fruticosae* z udziałem gatunków murawowych jest bogatsze od *Prunetum fruticosae* w optymalnej fazie rozwoju. W skład zespołu skompleksowanego przez gatunki murawowe wchodzi 159 gatunków. Z tej liczby 69 osiąga od II—V stopnia stałości. Natomiast zespół osiągający optimum swojego rozwoju buduje 132 gatunki, z czego 50 gatunków uzyskuje od V—II stopnia stałości. Zubożenie *Prunetum fruticosae* w optymalnej fazie rozwoju dotyczy 2 gatunków z rzędu *Prunetalia*, 1 gatunku z rzędu *Quercetalia pubescentis*, 2 gatunków z klasy *Quercu-Fagetea* oraz kilkunastu gatunków przede wszystkim z grupy towarzyszących i występujących sporadycznie.

Gatunków charakterystycznych dla zespołu jest bardzo mało. Są nimi *Cerasus fruticosa* (która w *Prunetum fruticosae* z udziałem gatunków murawowych osiąga V stopień stałości przy współczynniku pokrycia 1269, a w *Prunetum fruticosae* w optymalnej fazie rozwoju również V stopień stałości przy współczynniku pokrycia 5050) i *Anemone sylvestris* (który w pierwszym zbiorowisku posiada IV stopień stałości i współczynnik pokrycia 698, a w drugim II stopień stałości i współczynnik pokrycia równy 23).

Gatunków z wyższych jednostek systematycznych, jak rzędu *Prunetalia*, *Quercetalia pubescentis* i klasy *Quercu-Fagetea*, jest bardzo

mało. W zespole z udziałem gatunków murawowych jest 12 gatunków o V—II stopniu stałości i 8 gatunków o I stopniu stałości (sporadycznych). Jeszcze mniej gatunków z powyższych jednostek występuje w zespole osiagającym optimum swojego rozwoju. Jest ich 15, a tylko 6 osiąga od IV do II stopnia stałości.

Stosunki stałości w zespole z udziałem gatunków murawowych i w optymalnej fazie rozwoju przedstawia tabela 29.

c. Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych

Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych *Prunetum fruticosae* z udziałem gatunków murawowych

- 1 (10) Zbocza krótkich wąwozów lessowych (przyległych do południowo-zachodniej drogi polnej ze wsi Radoszki do wsi Wieprzki) stanowiących północno-zachodnie odgałęzienie i rozczłonkowanie wąwozów położonych na gruntach wsi Radoszki i Wieprzki.
- 2 (11) 20 m na wschód od stanowiska 10.
- 3 (18) Zbocza krótkich wąwozów lessowych stanowiących południowo-zachodnie odgałęzienie rozczłonkowanych wąwozów lessowych na gruntach wsi Radoszki i Wieprzki.
- 4 (13) 15 m na wschód od stanowiska 11.
- 5 (61) Zbocza ostańców lessowych położonych na wschód od drogi polnej ze wsi Radoszki do wsi Chwałki.
- 6 (6) Zbocza małego parowu lessowego przy małym zagajniku położonym ok. 0,5 km na wschód od stanowiska 61.
- 7 (7) 30 m na północny wschód od stanowiska 6.
- 8, 9, 10, 11, 12 (19, 21, 22, 23, 24) Zbocza krótkich wąwozów lessowych przyległych do południowych krańców pól ornych wsi Radoszki.
- 13, 14, 15, 16 (25, 26, 27, 28) Zbocza krótkich wąwozów stanowiące odgałęzienie głównego wąwozu położonego na północ od wsi Wieprzki.
- 17 (39) Zbocza parowu lessowego ok. 1,5 km na północ od wsi Lenarczyce.
- 18 (45) Zbocza parowu lessowego położonego ok. 250 m na zachód od drogi bitej z Ożarowa do Sandomierza.
- 19 (46) Strome zbocze wąwozu lessowego ok. 50 m od stanowiska 45.
- 20 (69) Stroma krawędź dol. Wisły w Słupi Nadbrzeżnej.
- 21 (70) Zbocze parowu kredowego na terenie wsi Biedrzychów.
- 22 (63) W dołach obok małego zagajnika przyległego do drogi polnej z Malic Kościelnych do Żurawnik.
- 23 (64) Zbocze parowu lessowego położonego na zachód od figury znajdującej się ok. 900 m na południe od wsi Radoszki, u wylotu wąwozu, przez który biegnie droga polna z Radoszek do Chwałek.
- 24 (65) 20 m na zachód od stanowiska 64.

Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych *Prunetum fruticosae*
w optymalnej fazie rozwoju

- 1 (68) Zbocze wąwozu lessowego obok stanowiska 10 *Prunetum fruticosae* z udziałem gatunków murawowych.

Tabela 29 - Table 29
 Rozkład stopni stałości w poszczególnych Grupach syngenetycznych zespół.
 Range of constancy grades in particular syngenetic groups of the association

Zespół Association	Prunetum fruticosae											
	z udziałem gatunków murawowych comprising sward species						w optymalnej fazie rozwoju in optimum development phase					
	V	IV	III	II	I	razem total	V	IV	III	II	I	razem total
Grupy syngenetyczne Syngenetic Groups												
Stopnie stałości Constancy Grades												
Prunetalia	1	1	1	3	2	8	1	1	1	1	2	6
Quercetalia pubescentis	.	2	2	4	3	11	.	.	1	3	6	10
Quercetalia pubescentis	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	1	1
Quercetalia pubescentis	.	1	3	2	6	12	.	1	.	6	2	9
Pestucetalia vallesiacae	1	4	8	13	17	43	.	5	3	14	20	42
Pestuco - Brometea	.	3	9	11	59	82	.	2	3	8	51	64
Towarzyszące /Accompanying/												
Ogółem gatunków w poszczególnych stopniach stałości Total of species in the particular constancy grades	2	11	23	33	90	159	1	9	8	32	82	132

- 2 (66) Wąwóz lessowy w drodze odległy ok. 50 m na północ od Żurawnik.
- 3 (67) Zbocze jaru lessowego w pobliżu gospodarstwa ob. Krasuli ze wsi Malice Kościelne. Jar przylega do małego zagajnika liściastego.
- 4 (17) Zbocze wąwozu lessowego o przebiegu równoległym do granicy dzielącej grunty wsi Radoszki od gruntów wsi Wieprzki. Obok stanowiska 68.
- 5 (2) Wąwóz lessowy w drodze położony ok. 100 m na południowy zachód od wsi Zagrody.
- 6 (3) Zbocze parowu lessowego na gruntach Komornej, 0,5 km na północny wschód od wsi.
- 7 (1) Obrzeżenie lasku liściastego z domieszką sosny pospolitej, na północ od wsi Rożki.
- 8 (8) Wąwóz lessowy, 800 m na południe od wsi Czernin.
- 9 (40) Zbocza parowów i wąwozów lessowych, ok. 1,5 km na północ od Lenarczyc.
- 10 (62) Łagodna krawędź dol. Wisły pomiędzy Podgórzem a Zawichostem.
- 11, 12, 13, 14 (18, 34, 35, 16) Zbocza krótkich wąwozów lessowych o przebiegu prostopadłym do długiego wąwozu, w którym biegnie granica dzieląca grunty wsi Radoszki od gruntów wsi Wieprzki od strony Dacharzowa.
- 15 (43) Zbocza parowu lessowego na gruntach wsi Wysiadłów, w pobliżu drogi z Ożarowa do Sandomierza.
- 16 (44) 40 m na zachód od stanowiska 43.
- 17 (9) Na terenie wsi Walentów, tuż przy drodze bitej.
- 18 (42) Zbocze dol. Wisły na północ od Pawłowic.
- 19 (41) Kilkadziesiąt m na północny wschód od stanowiska 43.
- 20 (37) Zbocza parowu lessowego, ok. 1,5 km na północ od Lenarczyc.
- 21, 22 (14, 15) Następne dwa zbocza krótkich wąwozów lessowych, ok. 50 m na zachód od stanowiska 16.
- 23 (38) Zbocze małego parowu na gruntach Radoszek od strony Wysiadłowa.
- 24 (4) We wschodniej, końcowej części parowu lessowego na gruntach wsi Komorna, ok. 0,5 km na południowy wschód od wsi.
- 25 (5) 100 m na południowy wschód od stanowiska 4.

Opis profili glebowych

Profil 2 wykonano w płacie zdjęcia 17 z dnia 16.VII.1961 r., na zboczu wąwozu lessowego w Radoszkach. Głębokość profilu 150 cm. Pojedyncze korzenie wiśni karłowatej spotykano na głębokości 150 cm.

A_0 Luźne drobne szczątki roślin zielnych i zeschnięte liście wiśni karłowatej.

A'_1 0—27 cm poziom próchniczny szary, skład mechaniczny pyłowy, słabo gruzelkowy.

A''_1 27—50 cm poziom ciemnożółty z jasnymi smugami i ceglastymi plamami od wytrąceń związków żelaza. Na głębokości ok. 40 cm znaleziono dwa małe ziarna $CaCO_3$. W poziomie tym rozwija się główna masa korzeni roślin krzewiastych.

C 50—150 cm jasnożółta skała lessowa z siatką białych kapilarów oraz ciemno-ceglastymi plamami związków żelaza. Na głębokości od 80—145 cm pojedyncze kongregacje $CaCO_3$ z większym nasileniem od 120—135 cm.

Profil 4 pochodzi ze zdjęcia 62 wykonanego dnia 20.VII.1961 r. na zboczu wąwozu lessowego w Podgórzu, otwartego do doliny Wisły. Głębokość profilu 150 cm. Pojedyncze korzenie osiągają głębokość 150 cm.

A_0 Zeschnięte liście wiśni karłowatej i drobne, luźno ułożone szczątki roślin zielnych.

A'_1 0—21 cm poziom próchniczny ciemnopopielaty, skład mechaniczny pyłowy, pulchny, słabo gruzelkowy.

- A'' 21—48 cm poziom przejściowy ciemnożółty, przerośnięty korzeniami krzewów.
- C 48—160 cm jasnożółta skała lessowa z dobrze zaznaczającą się siatką kapilarów i licznymi ziarnami CaCO_3 , przeważnie na głębokości od 65—93 cm.
- Profil 5 wykonano w zdjęciu 66 z dnia 21.VII.1961 r. na zboczu wąwozu lessowego w Żurawnikach, przez który prowadzi droga polna. Głębokość profilu 150 cm. Zasięg korzeni do 120 cm.
- A₀ Drobne, luźno ułożone szczątki roślin zielnych.
- A'₁ 0—20 cm poziom próchniczny, ciemnoszary, skład mechaniczny pyłowy, struktura gruzelkowata, układ pulchny.
- A'' 20—35 cm poziom przejściowy, ciemnożółty z szarymi smugami.
- C 35—150 cm jasnożółta skała lessowa z białą siatką kapilar. W skale macierzystej na głębokości od 60 do 150 cm spotykano margliste utwory w postaci ziarn i laseczek.
- Profil 6 pochodzi ze zdjęcia 70 wykonanego na zboczu parowu kredowego położonego na terenie wsi Biedrzychów. Głębokość profilu 35 cm.
- A₁ 0—23 cm poziom próchniczny biały, słabo zestalony, z dużym udziałem odłamków skalnych.
- A/C 23—35 cm poziom przejściowy, o białej barwie materiału zwietrzelinowego. Pomiędzy większymi odłamekami skalnymi ciemne zacieki. Materiał szkieletowy w tym poziomie wynosi ponad 57%. Średnica elementów szkieletowych dochodzi do 15 cm.
- C poniżej 35 cm skała macierzysta; margiel kredowy w postaci dużych bloków skalnych.

d. *Prunetum fruticosae* a zbiorowiska pokrewne

Kserotermiczny zespół zarośli z *Cerasus fruticosa* z Wyżyny Małopolski pierwszy opisał Dziubałtowski (1925) pod nazwą *Prunetum fruticosae*. Charakterystykę zespołu oparł na 10 zdjęciach fitosocjologicznych pochodzących głównie z Wyżyny Sandomierskiej. Za gatunki charakterystyczne dla zespołu uważał: *Cerasus fruticosa*, *Asperula tinctoria*, *Brachypodium pinnatum*, *Stachys recta*, *Anemone sylvestris*, *Agropyron intermedium* i *Seseli annuum*. W zdjęciach Dziubałtowskiego uderza absolutny brak krzewów poza jedyną wiśnią karłowatą. W całej liście florystycznej znajdujemy jeszcze 2 gatunki zaroślowo-leśne: *Anemone sylvestris* i *Calamintha vulgaris*. Pozostałą część flory tworzą gatunki ze związku *Festucion vallesiaceae*, rzędu *Festucetalia vallesiaceae* i klasy *Festuco-Brometea*.

W 1952 r. zespół *Prunetum fruticosae* został opracowany przez W. Sławińskiego z okolic Kazimierza nad Wisłą.

Poza Kazimierzem nad Wisłą na obszarze Wyżyny Lubelskiej zespół ten badali Fijałkowski i Izdebski (1957) opisując zbiorowiska stepowe na Wyżynie Lubelskiej. W obrębie tego zespołu wydzielają oni zespół typowy *Prunetum fruticosae* z udziałem gatunków leśnych i następnie dwie jednostki niższe w randze podzespołów: *Prunetum fruticosae cytisetosum albae* i *Prunetum fruticosae achilletesum setaceae*.

Fot. 8. Zwarte płyty zarośli wiśni karłowatej — *Cerasus fruticosa* (Pall.) Woronow, na południowych ścianach wąwozów lessowych w Radoszkach
 Compact patches of *Cerasus fruticosa* (Pall.) Woronow brushwood on southern slopes of loess ravines in Radoszki

Każda z tych jednostek scharakteryzowana jest na podstawie kilkunastu zdjęć.

Z załączonych zdjęć fitosocjologicznych wynika, że płyty tego zespołu zawierają liczne gatunki murawowe. Wszystkie płyty tego zbiorowiska charakteryzują się bardzo niską stałością wiśni karłowatej. Tylko w *Prunetum fruticosae* z udziałem gatunków leśnych wiśnia karłowata osiąga III stopień stałości, a w zespole typowym i w *Prunetum fruticosae cytisetosum albae* II stopień stałości. Natomiast w podzespole *Prunetum fruticosae achilletesum setaceae* gatunek ten w ogóle nie został wymieniony.

Wydzielenie jednostki systematycznej w randze podzespołu *Prunetum fruticosae achilletesum setaceae* na podstawie 13 zdjęć, w którym nie występuje *Cerasus fruticosa*, a *Anemone sylvestris* jako gatunek charakterystyczny zespołu osiąga I stopień stałości jest ujęciem niewłaściwym. Największą stałością w tym zbiorowisku legitymują się gatunki ze związku *Festucion vallesiacae*, rzędu *Festucetalia vallesiacae* i klasy *Festuco-Brometea* np.: *Achillea setacea* (IV stopień stałości), *Verbascum phoeniceum* (IV stopień stałości), *Achillea millofolium* ssp.

pannonica (III stopień stałości), *Anthemis tinctoria* (III stopień stałości) i *Galium verum*, *Koeleria gracilis* i *Salvia pratensis* (IV i V stopień stałości). Z tych też względów płatów tego zbiorowiska absolutnie nie można włączać do zbiorowisk zaroślowych; przez *Koeleria gracilis*, *Achillea millefolium* ssp. *pannonica*, *Agropyron intermedium*, *Asperula cynanchica* i *Campanula sibirica* oraz inne gatunki nawiązują one do zespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae* z Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Ilżeckiego.

Prunetum fruticosae z badanego terenu wykazuje pod względem fizjonomii składu florystycznego wyraźne podobieństwo do *Prunetum fruticosae* z udziałem gatunków leśnych z Wyżyny Lubelskiej opisanego przez Fijałkowskiego i Izdebskiego (l.c.) oraz do *Prunetum fruticosae* Dziubałtowskiego (l.c.) z Wyżyny Małopolskiej.

Na podstawie dotychczas opublikowanych tabel fitosocjologicznych i badań własnych można uznać, że tylko dwa gatunki dobrze charakteryzują ten zespół. Są to: *Cerasus fruticosa* i *Anemone sylvestris*. *Asperula tinctoria*, wymieniana przez Dziubałtowskiego (l.c.) jako gatunek charakterystyczny zespołu na Wyżynie Lubelskiej oraz na Wyżynie Sandomierskiej na Przedgórzu Ilżeckim nie została znaleziona w zaroślach wiśni karłowatej. Można uznać ją za gatunek lokalnie charakterystyczny. Pozostałe gatunki, jak *Brachypodium pinnatum*, *Stachys recta*, *Agropyron intermedium* i *Seseli annuum*, podawane przez Dziubałtowskiego (l.c.), Fijałkowskiego i Izdebskiego (l.c.) jako gatunki charakterystyczne zespołu, optimum swojego rozwoju znajdują w zbiorowiskach murawowych. Tworzą bardzo często lany na badanym terenie, np. *Brachypodium pinnatum*. Izdebski (1958) opisując zbiorowiska z roślinnością kserotermiczną w Rudniku koło Lublina i Dubużku koło Łaszczowa wydziela płaty roślinności, w których dominuje *Agropyron intermedium*, jako osobne zbiorowisko murawowe. Wskazuje na to również tabela 30.

Prunetum fruticosae znane jest również nad dolną Wisłą; według Dziubałtowskiego (1934) wykazuje ono pewne podobieństwo do *Prunetum fruticosae* z Wyżyny Małopolski.

Czubiński (1950) w pracy pt. „Zagadnienia geobotaniczne Pomorza” wymienia gatunki, które skupiają się w typowych zespołach zaroślowych; są to: *Cerasus fruticosa*, *Anemone sylvestris*, *Peucedanum cervaria*, *Prunella grandiflora*, *Campanula bononiensis*, *Linosyris vulgaris* i *Inula hirta*. Zarośla te poprzez *Cerasus fruticosa*, *Anemone sylvestris* i *Prunella grandiflora* nawiązują do *Prunetum fruticosae* badanego terenu.

Tak Dziubałtowski (1925) jak i Kozłowska (1928) nie zajmowali się przynależnością systematyczną opisanych przez siebie ze-

Fot. 9. Jednogatunkowe zarośla wiśni karłowatej — *Cerasus fruticosa* (Pall.) Woronow, na kwaśnych iłolupkach środkowokambryjskich, w Górach Pieprzowych pod Sandomierzem

Brushwood of *Cerasus fruticosa* (Pall.) Woronow on acidic Middle Cambrian shales in the Pieprzowe Mts near Sandomierz

spółów: *Prunetum fruticosae* i *Prunus fruticosa*-*Peucedanum cervaria*. Natomiast Sławiński (1952) idąc za Soó (1930) zalicza zespół *Prunetum fruticosae* do związku *Prunion spinosae*. Klika (1953) umieszcza go w związku *Quercion pubescentis* i podzwiązku *Prunion spinosae*. Fijałkowski i Izdebski (l.c.) przyjęli koncepcję Kliki i zaliczyli zespół *Prunetum fruticosae* do związku *Quercion pubescentis-sessiliflorae*, rzędu *Quercetalia pubescentis* i klasy *Querco-Fagetea*.

Tüxen (1952) łączy zarośla z *Cerasus fruticosa* rozwijające się wśród muraw kserotermicznych, zarośla na skrajach lasów oraz zarośla z tarniną, głógami i różami w jeden rząd *Prunetalia*. Włączenie zarośli kserotermicznych zespołu *Prunetum fruticosae* do rzędu *Prunetalia* wydaje się trafniejsze niż ujęcie Kliki.

Omawiany zespół obejmuje swoim zasięgiem Wyżynę Lubelską i Wyżynę Małopolską. Występuje np. koło Ojcowa i Częstochowy, w Miechowskim, Sandomierskim, Opatowskim i w powiecie lipskim. Na północ od Solca Sandomierskiego w dolinie Wisły znane są stanowiska wiśni karłowatej w Kazimierzu Dolnym, koło Zakroczymia i Modlina, w oko-

licy Torunia, Świecia, Chełmna, Bydgoszczy i Inowrocławia oraz w Borach Tucholskich. Oderwane stanowiska wysunięte najdalej na północny zachód znajdują się w Bielinku nad Odrą.

Dokładną lokalizację stanowisk *Cerasus fruticosa* wyspy kujawsko-pomorskiej przedstawia mapka punktowa w pracy Czubińskiego (l.c.). Zasięg geograficzny wiśni karłowatej na całym terytorium Polski obrazuje mapa Szafera (1959) i mapa punktowa M. Gostyńskiej (1963) uzupełniona o nowo odkryte stanowiska. Zarośla wiśni karłowatej występują na obszarze od Syberii i Kaukazu po Niemcy Środkowe, wschodni skraj Alp i Bałkan Północny. Rośnie ona w Austrii, Czechach i na Morawach.

e. Wiek wiśni karłowatej i jej znaczenie gospodarcze

Poza badaniami fitosocjologicznymi w zespole tym wybierano najgrubsze okazy wiśni karłowatej i ścinano je na wysokości około 15 cm, a następnie mierzono średnicę pędu i odczytywano przy pomocy lupy wiek krzewów. Najgrubsze typowe okazy wiśni karłowatej, jakie znaleziono na badanym terenie, osiągały średnicę pędu około 3,5 cm i wiek około 16 lat, a wzrost ich dochodził do wysokości 2,5 m. Rosły one u stóp zbocza lessowego. Natomiast u krzewów rosnących na zboczach parowów, wąwozów i krawędziach dolin rzecznych o znacznych wysokościach względnych, najgrubsze pędy dochodziły do średnicy około 2,5 cm, a wiek ich wynosił około 12 lat. Charakteryzują się one również niższym wzrostem, który waha się od 70—110 cm.

Znaczenie gospodarcze wiśni karłowatej przede wszystkim polega na tym, że bardzo licznymi odroślami korzeniowymi, jakie wytwarza, chroni ona pola uprawne (szczególnie w obszarze lessowym), strome zbocza, parowy i wąwozy przed erozją wodną. Po wycięciu krzewów rosnących na okrajkach pól przylegających do parowów lub wąwozów, pola orne zamieniają się w głębokie jary lub wąwozy. Takie zjawisko można obserwować na terenie gruntów we wsi Radoszki w powiecie Sandomierskim. Niektórzy gospodarze kosztem małego skrawka ziemi zajmowanego przez wiśnię karłowatą chcieli powiększyć areał swojego gospodarstwa, a obecnie nie mogą uchronić pola ornego przed intensywną erozją wodną. Poza tym gęste zarośla wiśni karłowatej na zupełnie wylesionym obszarze Wyżyny Sandomierskiej tworzą naturalne miejsce gniazdowania i schronienia dla ptaków, sprzymierzeńców naszych upraw w walce ze szkodnikami. Podobnie jak inne gatunki wiśni jest ona rośliną miododajną. Dojrzałe owoce są jadalne, choć niezbyt smaczne.

Tabela 31 - Table 31
Wyniki analiz glebowych / Results of soil analyses /

Nr profilu No. of Profile	Głębokość Poziomu horizon cm	Części szkie- letowe Skeletal parts %	Części ziemiaste - Earth parts				Zawartość CaCO ₃ Content of CaCO ₃ %	pH czynne pH active	pH w KCl pH in KCl	Zawartość materii organicznej Content of organic matter,
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm	0,02 mm				
19	0,5-25	-	7	12	49	32	-	7,6	7,1	2,34
	25-32	-	8	10	51	31	-	8,0	7,8	-
	60-80	-	5	13	49	33	1,73	8,0	7,9	-
	80-100	-	6	16	48	30	1,85	8,3	7,9	-
24	0-35	21,7	27	16	25	22	19,3	7,8	7,6	4,79
	35-52	51,3	48	17	15	20	38,2	8,0	7,7	-

10. Zbiorowisko z *Prunus spinosa*

a. Występowanie w terenie i ekologia

Zarośla tarniny zajmują na badanym terenie podobne stanowiska co płaty zespołu *Prunetum fruticosae*. Część z nich jest dalszymi ogniwami sukcesyjnymi *Prunetum fruticosae*. Rozwijają się one na krawędziach dolin rzecznych: Gorzyczanki, Kamiennej, Opatówki i Wisły, na zbo-

Ryc. 10. Profile glebowe zbiorowiska z *Prunus spinosa*. Oznaczenia jak na ryc. 9

Soil profiles of the community *Prunus spinosa*. Ciphers explained on fig 9

czach parowów i wąwozów oraz na szerszych miedzach w postaci bardzo wąskich pasków. Miejsca te charakteryzują się znacznym spadkiem terenu (od 10–40°) i ekspozycją południową, południowo-wschodnią i południowo-zachodnią. Wysokość względna tych stanowisk waha się od 2–40 m.

Płaty zarośli z *Prunus spinosa* są o wiele rzadsze od innych zbiorowisk zaroślowych wyodrębnionych na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim. Być może są one częściej wycinane przez rolników na opał lub jako materiał do grodzenia płotów i na paliki do pomidorów.

Znane mi płaty zarośli tarniny rozwijają się na glebach wytworzonych z lessów i margli kredowych. W dwóch płatach tego zbiorowiska wykształconych na odmiennym podłożu wykonano dwa profile, na podstawie których scharakteryzowane zostały stosunki glebowe. Wyniki analiz tych profili przedstawia tabela 31, a ich schematy ryc. 10.

Głębę profilu 19 ze zdjęcia 123 zaliczono do gleb brunatnych lessowych, częściowo wylugowanych z CaCO_3 . Dopiero na głębokości 60 cm

pojawia się poziom węglanowy. Zawartość CaCO_3 w pozostałej części profilu wynosi od 1,73—1,85% i pod tym względem wykazuje podobieństwo do gleb lessowych zajętych przez płaty *Prunetum fruticosae*. Odczyn próbek w całym profilu jest zasadowy. Zawartość materii organicznej w poziomie próchnicznym wynosi 2,34% i jest ona znacznie wyższa w stosunku do tego typu gleb pod płatami zarośli z *Cerasus fruticosa*.

Profil 24, ze zdjęcia 170, należy do średnio głębokich, szkieletowych rędzin czarnoziemnych. Duża zawartość CaCO_3 (19,3—38,2%) wpływa na zasadowy odczyn wszystkich poziomów genetycznych. Zawartość materii organicznej w tym profilu jest również duża i wynosi 4,79%.

b. Struktura i skład florystyczny

Płaty zarośli z *Prunus spinosa* już na pierwszy rzut oka swoim charakterystycznym wyglądem różnią się od płatów zarośli zespołu *Prunetum fruticosae* (z którymi zazwyczaj rosną w sąsiedztwie lub wkraczają w nie) i od *Peucedano-Coryletum*. Od pierwszych są o wiele wyż-

Fot. 10. *Prunetum fruticosae* w optymalnej fazie rozwoju na ścianach ostańców lessowych w Radoszkach

Prunetum fruticosae in its optimal phase of development on the walls of loess monadnocks in Radoszki

sze, niejednokrotnie bardziej zwarte, a nawet zbite, trudne do przebycia, od drugih są niższe; gdy dorównują wzrostem, warstwa krzewów jest niemal jednogatunkowa.

Struktura zbiorowiska nie jest na badanym terenie jednolita; zależy ona w dużym stopniu od położenia zbiorowisk murawowych i zarośli z *Cerasus fruticosa*, zwarcia krzewów i ich wysokości. Na glebach lessowych, przy pełnym zwarciu krzewów warstwa zielna jest bardzo słabo rozwinięta. Spotykamy w niej zazwyczaj pojedyncze i przypadkowe gatunki. Natomiast przy mniejszym zwarciu i wzroście krzewów, które obserwujemy na podłożu margli kredowych, warstwa ta rozwija się stosunkowo dobrze. Poważną rolę odgrywają tu gatunki z klasy *Festuco-Brometea* np.: *Salvia pratensis*, *Festuca sulcata*, *Medicago falcata* i *Brachypodium pinnatum*. Gatunki te wskazują na charakter przejściowy tych płątów od zbiorowisk murawowych do zarośli. Większa część zdjęć załączonych w tabeli 32 daje obraz raczej zbiorowiska trwałego. Warstwa mchów w stosunku do *Prunetum fruticosae* wykształca się dobrze, w zależności od płatu osiągają różne stopnie pokrycia (5—60%). Spośród mchów najważniejszą rolę odgrywają: *Camptothecium lutescens*, *Mnium affine*, *Thuidium Philibertii*, bardzo delikatne darninki *Camphylium chrysophyllum* i *Eurynchium swartzii*. Warstwę krzewów buduje 16 gatunków, z których główną rolę spełniają: *Prunus spinosa*, *Berberis vulgaris*, *Rosa canina*, *Rhamnus cartharica* i *Cornus sanguinea*. Zwarcie krzewów waha się od 45—100%, a ich wzrost od 1,5—4 m.

Tabela 33 - Table 33
Liczba gatunków w poszczególnych stopniach stałości
Number of species in the particular constancy grades

Powierzchnia Surface	Stałość Constancy	50 - 100 m ²		
		rośliny naczyniowe vascular plants	mchy i porosty mosses and lichenes	razem total
V	81 - 100 %	2	1	3
IV	61 - 80 %	6	.	6
III	41 - 60 %	17	3	20
II	21 - 40 %	11	1	12
II-V	21 - 100 %	36	5	41
I	1 - 20 %	74	9	83
I-V	1 - 100 %	110	14	124

Pomimo stosunkowo dużego udziału gatunków w tym zbiorowisku (124), niska jest liczba gatunków o V—II stopniu stałości (41). Wchodzą one w skład rzędów: *Prunetalia* (6, o V i II stopniu stałości), *Quercetalia pubescentis* i klasy *Querco-Fagetea* (5, o V—II stopniu stałości), oraz *Festucetalia vallesiacae* i klasy *Festuco-Brometea* (15, o V i II stopniu stałości (tabela 33).

c. Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych

Zdjęcia zestawione w tabeli wykonane zostały w następujących stanowiskach:

- 1 (121) Północno-wschodnia część rozczłonkowanych wąwozów położonych w odległości ok. 200 m na południe od Gór Wysokich.
- 2 (122) Zbocze parowu lessowego, ok. 75 m na północ od boiska sportowego w Dwikożach.
- 3 (123) Zbocza wąwozu lessowego stanowiącego wschodnie odgałęzienie licznie rozczłonkowanych wąwozów położonych na gruntach Radoszki i Wieprzki w odległości ok. 1,5 km na pd.-zachód od Radoszek.
- 4 (125) Zbocza wzniesienia kredowego nad bitą drogą z Ożarowa do Annopola tuż za budynkami należącymi do Kolonii Dębno.
- 5 (126) Na tym samym zboczu, lecz nieco dalej na wschód od stanowiska 125.
- 6 (192) W zachodniej części rozczłonkowanych wąwozów lessowych położonych około 2 km na południe od Wysiadłowa.
- 7 (193) 50 m na zachód od stanowiska 192.
- 8 (170) Zbocza stromej krawędzi dol. Wisły ok. 200 m na północ od Wesołówki.
- 9 (171) 30 m na północ od stanowiska 170.

Opis profili glebowych

Profil glebowy 19 wykonano w zdjęciu 123 z dnia 19.V.1963 r. na stromym zboczu wąwozu lessowego położonego około 1,5 km na południowy wschód od wsi Radoszki. Głębokość profilu 140 cm. Głębokość pojedynczych korzeni do 140 cm.

A₀ sucha, ciemnobrunatna, drobna około 0,5 cm warstewka ściółki.

A' 0,5—25 cm poziom próchniczny o barwie ciemnoszarej, struktura gruzełkowata, przejście do następnego poziomu niewielkimi zaciekami.

A'' 25—32 cm poziom przejściowy. Zacieki poziomu próchnicznego barwy jasnoszarej, poprzedzielane skałą macierzystą.

C 32—150 cm jasnożółta skała lessowa. Na głębokości od 80—135 cm pojedyncze konkretne CaCO₃ w postaci ziarn fasoli. Poza CaCO₃ w całym poziomie skały lessowej występuje biała siatka przestworów włosowatych.

Profil glebowy 24 wykonano w zdjęciu 170 z dnia 7.VIII.1963 r. na stromiej krawędzi doliny Wisły w niewielkiej odległości na północ od wsi Wesołówka. Głębokość profilu 52 cm. Zasięg korzeni do 52 cm.

A₁ 0—35 cm poziom próchniczny czarny o strukturze gruzełkowatej z drobnymi odłamekami skalnymi.

A/C 35—52 cm poziom przejściowy o barwie ciemnoszarej. Pomiedzy większymi odłamekami skalnymi czarne nacieki poziomu próchnicznego.

C poniżej 52 cm skała macierzysta — margiel kredowy w postaci spękanych bloków skalnych.

d. Stanowisko systematyczne i stosunek do zbiorowisk pokrewnych

Zarośla z tarniną, głógami, różami i innymi krzewami, które rozwijają się na obrzeżeniach lasów lub na miedzach śródpolnych, Tüxen (1952) wyodrębnia w osobny zespół *Prunus spinosa-Carpinus betulus*. Za gatunki tej asociacji uważa gatunki wyróżniające („Trennarten”), które zazwyczaj należą do grupy towarzyszących. Są to: *Urtica dioica*, *Carpinus betulus*, *Galium aparine*, *Poa nemoralis*, *Glechoma hederacea*,

Chaerophyllum temulum i *Dactylis glomerata*. Wspomniany autor określa również pozycję systematyczną tego zespołu. Zalicza go do związku *Rubion substanticum* i rzędu *Prunetalia spinosae*. Idąc za Tüxenem, a następnie za polskimi fytosocjologami: Celińskim i Filipkiem (1958), Falińskim, Hrynkiewiczem-Sudnikiem i Fabiszewskim (1963) zaliczyłem zarośla z *Prunus spinosa* do rzędu *Prunetalia*.

Mapka w pracy Tüxena (l.c.) obrazująca rozmieszczenie zbiorowisk zaroślowych w Europie wskazuje na to, że zespół ten obejmuje swoim zasięgiem również Polskę. Występuje on u nas w dwóch podzespółach: z *Rubus caesius* i ze *Stellaria holostea*.

Zbiorowisko zaroślowe o składzie florystycznym podobnym do zespołu Tüxena po raz pierwszy opisali w Polsce Celiński i Filippek (1958) na podstawie dwóch zdjęć fytosocjologicznych z leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. Autorzy zidentyfikowali zdjęcia z podzespołem z *Rubus caesius*.

Faliński, Hrynkiewicz-Sudnik i Fabiszewski (1963) opisali śródpolne zarośla z tarniną, głogami i różami z terenu Równiny Kutnowskiej w randze zespołu *Prunus spinosa-Carpinus betulus*. Jednocześnie wprowadzili dla tego zespołu nazwę regionalną „czyżnie”. W obrębie tego zespołu wyróżnili oni dwa podzespoły: *Prunus spinosa-Carpinus betulus stellarietosum* i podzespół typowy. W podzespole typowym wydzielili jeszcze dwie niższe jednostki w stopniu wariantów: wariant z *Evonymus europaea* i wariant typowy.

Porównując płaty zarośli tarniny Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego z tabelami opublikowanymi z pozostałego obszaru Polski dostrzegamy kilka gatunków wspólnych dla tych zbiorowisk; są to: *Glechoma hederecea*, *Poa nemoralis* (gat. wyr. dla zespołu), *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Cornus sanguinea* i *Rhamnus cathartica* (gat. char. dla rzędu *Prunetalia*). Pomimo że skład florystyczny jest zbliżony, to jednak w „czyżniach” kutnowskich nie występują gatunki z rzędu *Quercetalia pubescentis*, a w ich miejsce wchodzi gatunki ze związku *Carpinion* należącego do rzędu *Fagetalia*. Poza tym w płatach z Bielinka, podobnie jak w naszych, spotykamy cały szereg gatunków murawowych z klasy *Festuco-Brometea*. Gatunki murawowe wskazują, że zbiorowisko to powstało drogą sukcesji od muraw kserotermicznych, bądź też (jak to jest na badanym terenie) z zarośli wiśni karłowatej. Natomiast „czyżnie” kutnowskie według Falińskiego, Hrynkiewicza-Sudnika i Fabiszewskiego (1963) wywodzą się od lasu liściastego z klasy *Quercu-Fagetea* i rzędu *Fagetalia*. Zupełnie inna geneza, a następnie odmienne siedlisko najwyraźniej wpłynęły na ujawniające się różnice pomiędzy zaroślami śródpolnymi na Równinie Kutnowskiej, a zaroślami Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego.

11. Zbiorowisko luźnych zarośli z *Berberis vulgaris*-*Rosa rubiginosa*

a. Występowanie w terenie i ekologia

Wzdłuż stromych zboczy lewej krawędzi doliny Wisły, na odcinku od Biedrzychowa aż po Solec Sandomierski, na zupełnie ruchomym podłożu margli kredowych rozwija się zbiorowisko luźnych zarośli z *Berberis vulgaris*-*Rosa rubiginosa*. W miejscach o utrwalonym podłożu przechodzi ono w płaty *Peucedano-Coryletum*.

Wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne wykonano przy ekspozycji wschodniej i południowo-wschodniej na stromej krawędzi doliny Wisły położonej w północnej części wsi Biedrzychów i na północ od Sulejowa. Miejsca te charakteryzują się dużym spadkiem terenu (30—40°) i objęte są erozją wodną.

Rozdrobniony margiel kredowy wraz z jego zwietrzeliną przesuwają się podczas większych opadów atmosferycznych po zboczu i niszczy po drodze roślinność zielną. Jedynie miejsca opanowane przez krzewy w mniejszym stopniu narażone są na erozję, ale i one nie są całkowicie od niej wolne. Z tych też względów roślinność skupia się w małe płaty, pomiędzy którymi bieleją zupełnie wolne od niej miejsca.

Glebę tego zbiorowiska zaliczono na podstawie dwóch dołów orientacyjnych (zdjęcia 164, 172) do płytkich, silnie szkieletowych, białych rędzin kredowych. Szczegółowe wyniki badań tego typu gleby podano w opisie zespołów: *Asteri-Linetum flavae* i *Prunetum fruticosae*.

b. Struktura i skład florystyczny

Zarośla z *Berberis vulgaris* i *Rosa rubiginosa* nie tworzą pełnego pokrycia w płatach. Pozostaje to niewątpliwie w związku z pionierskim charakterem tego zbiorowiska.

Struktura zbiorowiska jest bardzo prosta. W pionowym układzie roślinności znajdujemy trzy warstwy: krzewów, ziół i mchów. Warstwa krzewów, na którą przede wszystkim składają się: *Berberis vulgaris*, *Rosa rubiginosa*, *R. canina* i *Prunus spinosa*, jest zupełnie luźna. Krzewy są przeważnie karłowate i rzadko tylko osiągają wysokość 1,5 m. Zwarcie w tej warstwie nie przekracza 40%. Pod krzewami i wokół nich rozwija się głównie roślinność kwietnej murawy, ale w niektórych płatach obok niej pojawiają się gatunki leśne ze związku i rzędu *Quercetalia pubescentis*. Chociaż pod względem ilościowym udział pewnych gatunków jest mały, to jednak swoimi barwnymi kwiatami niemal w ciągu całego okresu wegetacyjnego nadają malowniczą barwę zbiorowisku. Pokrycie warstwy ziół waha się od 30—50%. Ruchome podłoże

Fot. 11. Ciepłe, luźne zarośla z *Berberis vulgaris* i *Rosa rubiginosa* na podłożu wapiennym w okolicy Biedrzychowa nad Wisłą

Warm loose brushwood with *Berberis vulgaris* and *Rosa rubiginosa* on calcareous substratum in the environs of Biedrzychów

skalne nie wpływa dodatnio na rozwój mchów, toteż warstwa ta rozwija się stosunkowo słabo. Budują ją: *Abietinella abietina*, *Camptothecium lutescens* i sporadycznie występujące *Rhytidiadelphus triquetrus* i *Thuidium Philibertii*.

Pod względem składu florystycznego omawiane zbiorowisko zbliża się do zespołu *Peucedano-Coryletum*, a na miejscach o utrwalonym podłożu — jak już wspomniano — nawet w nie przechodzi. W zupełnie luźnych płatach zarośli spotykają się gatunki dwóch klas: *Festuco-Brometea* i *Querco-Fagetea*. U gatunków obydwu klas nie zauważono osłabionej żywotności.

Pomimo pionierskiego charakteru tych płatów na ogólną liczbę 107 gatunków 57 osiąga V i II stopień stałości, razem z mchami 60. Zdecydowaną przewagę posiadają gatunki z klasy *Festuco-Brometea*. Liczba gatunków w zdjęciu waha się od 34 do 51, a przeciętnie na jedno zdjęcie przypadają 44 gatunki.

Bardzo wysoka liczba gatunków (32) o V i IV stopniu stałości wskazuje na jednolity skład roślinności w tym zbiorowisku.

Pogląd na to zbiorowisko potwierdza tabela nr 34.

- 1, 2, 3 (163, 164, 165) Stroma krawędź dol. Wisły, w północnej części wsi Biedrzychów.
 4, 5, 6 (172, 173, 174) Stroma krawędź dol. Wisły pomiędzy Sulejowem a Dorotką.
 7, 8 (177, 178) Stroma krawędź dol. Wisły, ok. 20 m na północ od stanowiska 165.

12. Zespół *Coryleto-Peucedanetum cervariae* Kozł. 1925
 em. Medwecka-Kornaś 1952

[= *Peucedano-Coryletum*]

a. Występowanie w terenie i ekologia

Zespół *Peucedano-Coryletum*, pomimo udziału w nim kilku gatunków drzew, jest zbiorowiskiem wybitnie zaroślowym.

Występowanie jego na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim ogranicza się do stromych krawędzi dolin rzecznych: Gorzyczanki, Kamiennej i Wisły oraz parowów i wąwozów, przeważnie połączonych z dolinami wspomnianych już rzek, jak również parowów i wąwozów położonych w bliskim sąsiedztwie dolin rzecznych Koprzywianki i Opatówki.

Tabela 35 - Table 35
 Liczba gatunków w poszczególnych stopniach stałości
 Number of species in the particular constancy grades

Powierzchnia Surface		50 - 150 m ²		
		Rośliny naczyniowe vascular plants	mchy mosses	razem total
Stażość Constancy				
V	81 - 100 %	7	-	7
IV	61 - 80 %	25	2	27
III	41 - 60 %	11	-	11
II	21 - 40 %	14	+	15
II-V	21 - 100 %	57	3	60
I	1 - 20 %	45	2	47
I-V	1 - 100 %	102	5	107

Zajmuje on miejsca nasłonecznione, zaciszne i wysoko położone od dna dolin. Unika natomiast stanowisk silnie zerodowanych, o ruchomym podłożu, jak np. w dolinie Kamiennej, Wisły i położonych w pobliżu dna dolin rzecznych, gdzie gromadzi się zimne powietrze. Jedyne przypadki notujemy w Winiarkach koło Zawichostu, gdzie bardzo duży płat zespołu *Peucedano-Coryletum* schodzi po stromym zboczu i niemal przylega do dna rozległej doliny Wisły.

Zarośla opisywanego zespołu rozwijają się na stanowiskach o ekspozycji wschodniej, południowo-wschodniej, południowej i południowo-zachodniej. Na badanym terenie przeważa wystawa południowo-wschodnia, co jest konsekwencją ogólnego biegu wąwozów, parowów i dolin

rzecznych. Nachylenie tych miejsc waha się od 25—45° (ryc. 12 f na str. 104).

Największe bogactwo płatów zarośli *Peucedano-Coryletum* wykształca się na zboczach licznych parowów, otwartych do doliny Wisły i na jej lewej krawędzi pomiędzy Słupczą koło Zawichostu a Solcem Sandomierskim. Omawiany zespół rozprzestrzenia się w postaci węższych lub szerszych pasów ciągnących się wzdłuż doliny Wisły. Górne partie tych zarośli graniczą z polami uprawnymi, które są nieco wyżej położone od samych zarośli i osłaniają je przed wiatrami, a dolne przechodzą w zupełnie luźne zarośla z *Berberis vulgaris*-*Rosa rubiginosa* lub zbiorowiska murawowe całkowicie zniekształcone wypasem. Bardzo często wspomniane pasy zarośli poprzedzielane są płatami muraw ksero-termicznych.

Podobny pas zarośli rozwija się na stromej krawędzi doliny Kamiennej, pomiędzy Skarbką a Pętkowicami. Zespół ten osłonięty jest od północnych wiatrów ścianą lasu mieszanego z przewagą sosny pospolitej, do którego przylega.

Zupełnie już zubożałe płaty zarośli *Peucedano-Coryletum* rozwijają się na zboczach parowów i wąwozów lessowych połączonych z doliną Koprzywianki, np. w Zagajach koło Klimontowa, czy też w parowach i wąwozach biegnących do ujściowej części doliny Opatówki. Natomiast rozległy płat zespołu w dolinie Gorzyczanki, pomiędzy Byszowem a Przybysławicami koło Klimontowa, jest już zbiorowiskiem wtórnym. Powstał on bowiem na miejscu wyciętego przed kilkudziesięcioma laty lasu liściastego.

Omawiany zespół wykształca się na glebach wytworzonych z margli kredowych, lessów i luźnych piasków. Ze wszystkich tych typów gleb pobrano próbki do analiz laboratoryjnych pochodzące z 4 profili glebowych (tab. 36, ryc. 11).

Profile te nie wykazują procesu bielnicowania.

Pod względem składu mechanicznego, chemicznego oraz pochodzenia zaliczono omawiane gleby do następujących typów:

glebę z profilu 11 do płytkich czarnoziemnych ciężkich rędzin właściwych,

glebę z profilu 10 do gleb lessowych przeławicowanych (deluwia lessowe) i wylugowanych z CaCO_3 w całym profilu glebowym,

glebę z profilu 13 do gleb brunatnych gliniastych i napiaskowych wylugowanych,

glebę z profilu 15 do gleb czarnoziemnych lessowych z akumulacją CaCO_3 w całym profilu glebowym.

Pomiary dokonane przy pomocy aparatu Scheiblera nie wykazały w profilach 10 i 13 zawartości CaCO_3 . Mimo to odczyn próbek pobranych z poszczególnych poziomów tych profili jest zasadowy. Natomiast

Tabela 36 - Table 36
Wyniki analiz glebowych /Results of soil analyses/

Numer No. of profile	Głębokość poziomu w cm Depth of horizon in cm	Części szkieletu w % Skeleton parts in %	Części ziemiaste - Earth parts				Zawartość CaCO ₃ w % Content of CaCO ₃ in %	pH czynne pH active	pH KCl pH in KCl	Zawartość materii organicznej Content of organic matter
			1-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,02 mm	0,02 mm				
11	0-15	17	43	16	6	35	28,08	8,2	7,8	6,71
	15-25	72	32	16	15	36	42,20	8,2	8,0	-
	25-30	80	26	13	14	43	44,31	8,3	8,2	-
12	0-16	4,2	8	15	30	47	-	7,9	7,6	3,30
	16-50	-	11	13	24	52	-	8,0	7,7	-
	50-104	-	18	7	19	56	-	7,3	6,5	-
13	0-24	-	50	10	16	24	-	8,2	7,2	1,64
	24-40	0,6	46	13	23	21	-	8,3	7,5	1,39
	40-45	2,1	42	10	20	28	-	8,3	6,1	-
15	45-150	-	79	4	12	5	-	8,4	8,1	-
	1-34	-	29	18	24	29	2,56	7,9	7,5	4,21
	34-54	3,7	12	12	24	47	6,40	8,0	7,4	-
15	54-104	5,0	26	11	20	43	9,38	8,3	7,9	-
	104-150	4,2	25	9	20	46	9,81	8,6	8,0	-

Ryc. 11. Profile glebowe zespołu *Peucedano-Coryletum*

1 a — ściółka luźna, 1 b — ściółka zwarta; 2 — ciemny poziom próchniczny zmieszany ze zwierzeliną margli kredowych; 3 a — poziom próchniczny, 3 b — poziom przejściowy; 4 — korzenie; 5 — odłamki i bloki skalne margli kredowych; 6 a — bezwęglanowa skała lessowa; 6 b — bezwęglanowy less z warstewkami ilu; 7 — luźny, drobny piasek; 8 — węglanowa skała; 9 — nacieki i konkrecje CaCO_3

Soil profiles of the association *Peucedano-Coryletum*

1 a — loose litter, 1 b — compact litter; 2 — dark horizon of humus mixed with weathered Cretaceous marl; 3 a — humus horizon, 3 b — intermediate horizon; 4 — roots; 5 — Cretaceous marl debris and blocks; 6 a — carbonate-free loess, 6 b — carbonate-free loess with thin clay strata; 7 — loose, fine-grained sand; 8 — calcium carbonate rock; 9 — CaCO_3 inclusions and concretions

w profilach 11 i 15 zawartość CaCO_3 waha się od 2,56—28,08% w poziomach mineralno-próchnicznych, a w pozostałych poziomach od 6,40—44,31%. Zawartość materii organicznej jest niska; wynosi ona 1,64% w glebie piaskowej, a w pozostałych od 3,30—6,71%. Najwyższą zawartość materii organicznej (6,71%) posiada gleba profilu 11.

b. Struktura i skład florystyczny

Peucedano-Coryletum to wielowarstwowe zbiorowisko zaroślowe o charakterze kserotermicznym. Wyróżniamy w nim 3 wyraźnie oddzielające się od siebie warstwy: krzewów, ziół i mchów. Udział drzew jest bardzo mały. Spotykamy tu: *Pirus communis*, *Quercus robur*, *Populus alba*, *Populus tremula*, *Betula verrucosa*, *Pinus silvestris*, *Acer negundo*, *Sorbus aucuparia* i *Tilia cordata*. Występują one przeważnie sporadycznie, a wzrostem osiągają zaledwie pułap krzewów. Tylko pojedyncze egzemplarze dębu, gruszy i osiki wznoszą się ponad warstwę krzewów.

Z tych też względów trudno wyżej wspomniane drzewa wyodrębnić jako osobną warstwę.

Warstwę krzewów tworzy 28 gatunków, spośród których największą rolę odgrywają: *Berberis vulgaris*, *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana*, *Evonymus verrucosa*, *Juniperus communis*, *Lonicera xylosteum*, *Prunus spinosa*, *Rhamnus cathartica*, *Rosa canina*, *R. rubiginosa*, *Crataegus monogyna* i *Ulmus campestris* var. *suberosa*; poza tym dochodzą tu jeszcze wyżej podane gatunki drzew.

Wysokość jak i zwarcie krzewów w różnych płatach podlegają dużym wahaniom. Szczególnie obserwujemy to na płytkich rędzinach kredowych wzdłuż lewej krawędzi doliny Wisły. Nawet na powierzchni jednego płatu zauważa się różne zwarcie krzewów. Przeważnie krzewy tworzą mniej lub więcej zwarte kępy o wysokości od 2—3 m. Wolne powierzchnie pomiędzy kępami krzewów, a nawet luki pomiędzy pojedynczymi okazami na skutek małego zwarcia zajmuje roślinność zielna. Ma ona układ mozaikowy. Obok gatunków leśnych, które skupiają się wokół krzewów, rosną gatunki z murawy kserotermicznej. Struktura tych płatów jest bardzo podobna do struktury płatów *Peucedano-Coryletum* z Jury Krakowskiej wykształconych na bardzo płytkich lessach, pod którymi występuje skała wapienna (M e d w e c k a - K o r n a ś 1952).

Fot. 12. Zarośla *Peucedano-Coryletum* na krawędzi doliny Kamiennej pod Pętkowicami

Peucedano-Coryletum brushwood on the edge of the Kamienna valley near Pętkowice

W płatach wykształconych na głębszych rędzinach i glebach lessowych krzewy są o wiele wyższe (4—6 m) i osiągają niemal pełne zwarcie (75—100%). Warstwa zielna w tych płatach jest słabo rozwinięta. W skład jej wchodzi główne gatunki leśne, gatunki zaś murawowe przy pełnym zwarciu krzewów w ogóle nie występują lub udział ich jest nikły.

Warstwa najniższa we wszystkich płatach wykształca się mniej więcej jednakowo. Tworzą ją: *Rhytidiadelphus triquetrus*, *Camptothecium lutescens*, *Thuidium Philibertii* i inne. Pokrycie w tej warstwie waha się od 5—40%.

Peucedano-Coryletum charakteryzuje się wielkim bogactwem flory. Występuje tu 95 gatunków roślin naczyniowych o V—II stopniu stałości i 12 gatunków mchów. Po doliczeniu gatunków sporadycznych otrzymujemy liczbę 217 gatunków, bez mchów i wątrobowców 196. Liczba gatunków w poszczególnych płatach wykazuje bardzo dużą rozpiętość wahań (od 32—73). Stosunkowo duża liczba gatunków w kilku zdjęciach spowodowana jest licznym udziałem gatunków sporadycznych. Przy pełnym zwarciu krzewów liczba ta wyraźnie maleje. Średnio na jedno zdjęcie opisywanego zespołu przypada ponad 47 gatunków. Pod względem systematycznym gatunki te należą do dwóch klas: *Querco-Fagetea* i *Festuco-Brometea*.

Pomimo że *Peucedano-Coryletum* nie posiada gatunków charakterystycznych w znaczeniu ogólnym, lecz tylko w znaczeniu lokalnym, Medwecka-Kornaś (1952) wyodrębnia go jako osobną asocjację. Idąc za wspomnianą autorką szereg gatunków, które są charakterystyczne dla rzędu *Quercetalia pubescentis* i związku *Quercion pubescentis-sessiliflorae*, uznano również za charakterystyczne dla zespołu. Są to: *Clematis recta*, *Peucedanum cervaria*, *Viola collina*, *Fragaria viridis*, *Calamintha vulgaris*, *Anemone sylvestris*, *Vincetoxicum officinale*, *Primula officinalis* var. *canescens*, *Cytisus nigricans*, *Digitalis grandiflora*; dodatkowo wymieniono jeszcze: *Lithospermum officinale* i *Cimicifuga europaea* jako gatunki lokalnie charakterystyczne.

Płaty opisywanego zespołu wykazują pewną zmienność, która jest ściśle związana ze stosunkami glebowymi. Uszeregowanie zdjęć w tabeli w zależności od stosunków edaficznych pozwoliło na uchwycenie różnic w obrębie zespołu. Na tej podstawie wydzielono 3 warianty: typowy, z *Cornus sanguinea* i zubożały. Wariant typowy wykształca się na płytkich, czarnoziemnych, ciężkich rędzinach kredowych, wariant z *Cornus sanguinea* na głębszych, czarnoziemnych rędzinach kredowych, a wariant zubożały na glebach lessowych i na piaskach gliniastych.

Różnice pomiędzy wariantem typowym a wariantem z *Cornus sanguinea* są dosyć duże zarówno w fizjonomii, jak i w składzie florystycznym. Płaty wariantu z *Cornus sanguinea* osiągają pełne zwarcie krzewów. Brak w nim *Clematis recta*, *Peucedanum cervaria*, *Lithospermum*

officinale i *Anemone sylvestris*, tj. gatunków charakterystycznych dla zespołu i rzędu *Quercetalia pubescentis* oraz kilku krzewów z rzędu *Prunetalia*: *Crataegus monogyna*, *Rosa canina*, *R. rubiginosa*, *Rhamnus cathartica*, *Evonymus verrucosa* i *Prunus spinosa*. *Cornus sanguinea* osiąga tu 80% zwarcia. Poza tym występują: *Cypripedium calceolus*, *Hieracium murorum*, *Melica nutans*, *Rubus saxatilis* i *Senecio auran-tiacus*, które różnią go od wariantu typowego.

Tabela 38 - Table 38
Liczba gatunków w poszczególnych stopniach stałości
Number of species in the particular constancy grades

Zespół /Association/ Wariant /Variant/ Powierzchnia Surface Stażność Constancy	Peucedano - Coryletum					
	typowy /typicum/			zubożały /pauperizet/		
	100 - 200 m ²			100 - 200 m ²		
	rośliny naczyniowe vascular plants	mchy i porosty mosses and lichens	razem total	rośliny naczyniowe vascular plants	mchy mosses	razem total
V 81 - 100 %	9	1	10	2	1	3
IV 61 - 80 %	13	1	14	7	-	7
III 41 - 60 %	31	2	33	22	4	26
II 21 - 40 %	25	4	29	26	2	28
II-V 21 - 100 %	78	8	86	57	7	64
I 1 - 20 %	68	9	77	81	11	92
I - V 1 - 100 %	146	17	163	138	18	156

Na wariacie tym wycisnęła piętno działalność gospodarcza czło-wieka. Co kilkanaście lat wycina się wszystkie krzewy w tych płatach. Oczyszczony w ten sposób teren opanowywany jest przez derenia świd-wę, który rozmnaża się przez liczne odrośla i staje się gatunkiem panu-jącym. Tworzy on zwarte zarośla, trudne do przebycia.

W wariacie zubożałym nie występuje *Clematis recta*, *Peucedanum cervaria* i *Lithospermum officinale*, ale szereg gatunków z rzędu *Quer-cetalia pubescentis* i rzędu *Prunetalia* osiąga mniejsze stopnie stałości w porównaniu z wariantem typowym. Natomiast 100% stałości i naj-wyższy współczynnik pokrycia (3588) posiada *Corylus avellana*. Na sku-tek dużego zwarcia krzewów pojawia się kilka gatunków charaktery-stycznych dla rzędu *Fagetalia*, np.: *Asarum europaeum*, *Brachypodium silvaticum*, *Anemone nemorosa*, *Daphne mezereum*, *Hepatica nobilis* i inne.

W niektórych płatach wariantu zubożalego widoczne są również ślady działalności gospodarczej człowieka. Tylko płaty wariantu typowego mają pierwotny charakter i one jedynie mogą być brane pod uwagę przy porównywaniu tej asocjacji z pokrewnymi zbiorowiskami wyróż-nionymi na obszarze Polski.

Pogląd na to zbiorowisko daje tabela 37, rozdział gatunków na stop-

nie stałości tabela 38. W tabeli tej nie uwzględniono jedynie stopni stałości dla wariantu z *Cornus sanguinea*; przyczyną tego jest mała liczba zdjęć (3).

c. Stanowisko zdjęć fitosocjologicznych

Zdjęcia fitosocjologiczne zestawione w tabeli pochodzą z następujących stanowisk:

1. Wariant typowy

Wszystkie płaty wariantu typowego wykształciły się na płytkiej rędzinie kredowej wytworzonej z margli kredowych.

- 1 (86) Stroma krawędź dol. Wisły, ok. 400 m na południe od Kolonii Cieszyce Górnej. Zarośla wykształcają się na najwyższych położonych miejscach na krawędzi; w zaroślach mniej zwartych w okresie wiosny wypasa się bydło.
- 2 (87) Około 100 m na południe od poprzedniego.
- 3 (88) Urwista krawędź dol. Wisły przy małym wąwozie kredowym ok. 0,5 km na południe od Słupi Nadbrzeżnej.
- 4 (72) Łagodne zbocze małego parowu kredowego otwartego do dol. Wisły, w pobliżu Dorotki.
- 5, 6 (73, 74) Najwyższe partie stromej krawędzi dol. Wisły pomiędzy Dorotką a Sulejowem.
- 7 (75) Zbocza parowu kredowego 50 m na zachód od stanowiska 72.
- 8 (91) Zbocza dużego parowu kredowego położonego kilka metrów na zachód od środkowej części wsi Biedrzyków.
- 9 (105) Górne i środkowe partie krawędzi dol. Wisły, 300 m na południe od Dorotki.
- 10 (106) Stroma krawędź dol. Wisły około 1 km na południe od Dorotki.

2. Wariant z *Cornus sanguinea*

- 11, 12, 13 (127, 128, 133) Wszystkie zdjęcia tego wariantu wykonano na zboczu małego parowu kredowego, położonego przy budynkach ob. Piotra Kuźmierczyka, mieszkańca wsi Kolonia Linów.

3. Wariant zubożały

Tylko w jednym płacie stwierdzono podłoże piaszczyste, natomiast w pozostałych podłoże lessowe.

- 14 (85) Południowe, łagodne zbocza dol. Gorzyczanki pomiędzy Byszowem a Przybysławicami.
- 15 (92) Zbocza małego parowu lessowego, ok. 200 m na południe od gospodarstwa położonego przy drodze bitej pomiędzy Kicharami a Bykowcem, obok dużej kopalni żwiru.
- 16 (93) Zbocza wąwozów lessowych ok. 60 m na południowy zachód od wsi Zagaje koło Klimontowa.
- 17 (95) 100 m na zachód od stanowiska 93.
- 18 (97) Górne partie stromej krawędzi dol. Wisły, ok. 1,5 km na północ od Trójcy koło Zawichostu. Podłoże piaszczyste.
- 19 (99) Zbocze lessowe na gruntach wsi Jankowice, ok. 0,5 km na północny wschód od wsi.

- 20 (107) Górne partie stromej zbocza dol. Wisły ok. 100 m na południe od wsi Winiarki.
- 21 (191) 40 m na południe od poprzedniego.
- 22 (192) Środkowa część zbocza w niewielkiej odległości od stanowiska 107.
- 23 (193) Zbocza rozczłonkowanych wąwozów lessowych, ok. 50 m na południe od Gór Wysokich.
- 24 (194) Zbocza małego parowu lessowego otwartego do dol. Opatówki. Obok boiska sportowego we wsi Dwikozy.

Opis profili glebowych

Profil glebowy 11 wykonano w płacie zdjęcia 88 dnia 1.VIII.1962 r. na stromej krawędzi doliny Wisły w odległości około 0,5 km na południe od wsi Słupia Nadbrzeżna. Głębokość profilu 30 cm.

A₀ — dobrze rozłożona ściółka o miąższości około 0,5 cm.

A₁ 0,5—15 cm poziom próchniczny czarny o strukturze gruzełkowej z drobnymi odłamekami skały macierzystej, bardzo silnie ukorzeniony z licznymi dżdżownicami.

A/C 15—25 cm poziom przejściowy o barwie nieco jaśniejszej od poprzedniego z bardzo dużym udziałem odłamków skalnych o średnicy od 3—5 cm.

C — poniżej 30 cm skała macierzysta — margiel kredowy — w postaci luźnych bloków skalnych, pomiędzy którymi znajdują się zacieki poziomu próchnicznego. Na obrywach skalnych, położonych w niewielkiej odległości od wykonanego profilu, głębokość zacieków dochodzi do 50 cm. W szczelinach między blokami skalnymi spotyka się dość liczne korzenie krzewów.

Profil glebowy 10 pochodzi z płatu zdjęcia 85 wykonanego w dniu 9.VII.1962 r. na łagodnym stoku doliny Gorzyczanki pomiędzy Byszowem a Przybysławicami. Głębokość profilu 104 cm.

A₀ — luźna dobrze rozłożna ściółka o miąższości 3—4 mm, utworzona z obumarłych roślin zielnych i opadłych liści krzewów.

A₁ 0—16 cm poziom próchniczny ciemnopopielaty zwięzły, przerośnięty korzeniami roślin. W poziomie tym napotkano kilka grubych ziarn kwarcu.

C 16—150 cm skała lessowa o barwie żółtej. Na głębokości od 16—50 cm less z warstewkami iłu o ułożeniu poziomym bez śladu wmycia, od 50—150 cm less zmieszany z tłustym ilem o barwie żółtej.

Profil glebowy 13 wykonano w płacie zdjęcia 97 z 13.VIII.1962 r. na stromej krawędzi doliny Wisły w pobliżu Trójcy koło Zawichostu. Głębokość profilu 150 cm. Głębokość korzeni 150 cm.

A₀ — zupełny brak ściółki, która być może jest splukiwana przez opady atmosferyczne.

A₁ 0—40 cm poziom mineralno-próchniczny utworzony z drobnego piasku o barwie popielatej.

C 40—150 cm skała macierzysta — luźny drobny piasek. Na głębokości od 40—150 cm nie stwierdzono wyraźnego zróżnicowania profilu glebowego. Jedynie tuż pod poziomem mineralno-próchnicznym na głębokości od 40—45 cm występuje jasna warstewka piasku o odczynie zasadowym, pod którą znajduje się warstwa piasku żółtego.

Profil glebowy 15 pochodzi z płatu zdjęcia 107 wykonanego 18.VIII.1962 r. na stromej krawędzi doliny Wisły w Winiarkach koło Zawichostu. Głębokość profilu 150 cm. Zasięg korzeni 150 cm.

A₀ — dobrze rozłożona ściółka o miąższości 1 cm.

- A₁ 1—34 cm poziom mineralno-próchniczny ciemny, pulchny, przerośnięty korzeniami roślin.
- A₂ 34—54 cm poziom ciemnożółty przechodzący w skałę macierzystą z małymi grudkami margla i naciekami CaCO₃.
- C 54—150 skała lessowa ciemnożółta. Na głębokości od 54—104 cm less żółty z białymi naciekami CaCO₃ i licznymi konkrecjami w postaci laleczek i ziarn pieprzu. Od 104—150 cm less żółty, tłusty z pojedynczymi ziarnami CaCO₃.

d. *Peucedano-Coryletum* a zbiorowiska pokrewne

Już Kozłowska (1925) prowadząc badania nad zmiennością kostrzewy owczej w związku z sukcesją zespołów stepowych na Wyżynie Małopolskiej zwróciła uwagę na zarośla leszczyny i wyodrębniła je po raz pierwszy na terenie Polski jako osobną asocjację. Opisała ją pod nazwą *Corylus avellana-Peucedanum cervaria*. Zestawione w jej tabeli zdjęcia fitosocjologiczne pochodzą z Miechowskiego i Jury Krakowskiej.

W tabeli tej wymienia ona kilka gatunków jako charakterystycznych dla zespołu. Są to: *Peucedanum cervaria*, *Trifolium alpestre*, *Anemone sylvestris*, *Cytisus ruthenicus*, *Geranium sanguineum*, *Chrysanthemum corymbosum*, *Inula hirta*, *Laserpitium latifolium*, *Aquilegia vulgaris*, *Trifolium rubens*, *Festuca duriuscula* var. *trachyphylla* i *Carex Michelli*.

Trzy lata później (1928) ta sama autorka opisuje ponownie ten zespół z Wyżyny Małopolskiej, ale już pod inną nazwą: *Prunus fruticosa-Peucedanum cervaria*. Płaty tego zbiorowiska należą do *Peucedano-Coryletum* (Medwecka-Kornaś 1952). Zdjęcia Kozłowskiej zawierają liczne gatunki murawowe z *Inuletum ensifoliae* i gatunki leśne, toteż uważa go ona za zespół przejściowy między stepem a lasem.

Kilkanaście lat temu ponownie badała ten zespół w pasmie Jury Krakowsko-Wieluńskiej Medwecka-Kornaś (1952). Poza szczegółowym opisem przywróciła pierwotną nazwę zespołu, a następnie określiła pozycję systematyczną, zaliczając go do związku *Quercion pubescentis*.

Przy porównaniu 10 zdjęć Medweckiej-Kornaś z Jury Krakowsko-Wieluńskiej z 10 zdjęciami wariantu typowego z Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Ilżeckiego uderza podobieństwo struktury, fizjonomii i zajmowanych siedlisk (wszystkie płaty wykształciły się na płytkich rędzinach lub na bardzo płytkich glebach lessowych, pod którymi na głębokości od 20—30 cm spoczywa skała wapienna), natomiast w składzie florystycznym pomimo wspólnych grup gatunków istnieją grupy gatunków wykluczających się (patrz tabela 39). Do gatunków wspólnych, charakterystycznych dla zespołu, związku i rzędu *Quercetalia pubescentis* należą: *Calamintha vulgaris*, *Peucedanum cer-*

varia, *Trifolium alpestre*, *Lathyrus niger*, *Primula officinalis*, *Melittis melissophyllum*, *Potentilla alba*, *Anemone sylvestris*, *Vincetoxicum officinale*, *Viola collina*, *Fragaria viridis* i *Clematis recta*. Z gatunków nie stwierdzonych na badanym terenie, a wchodzących w skład zespołu, związku i rzędu Jury Krakowsko-Wieluńskiej należą *Chrysanthemum corymbosum*, *Cytisus ruthenicus*, *Inula hirta* *, *Laserpitium latifolium* **, *Trifolium rubens* i *Veronica teucrium*. Miejsce ich zajmują: *Cimicifuga europaea*, *Lithospermum officinale* i *Cytisus nigricans*. Na dalsze podobieństwa i różnice wskazuje tabela 39.

Nasze płaty w porównaniu z płatami Jury Krakowsko-Wieluńskiej cechuje większy udział krzewów z rzędu *Prunetalia* i gatunków murawowych z klasy *Festuco-Brometea*, ponadto brak jest w nich drzew, jak: *Carpinus betulus* i *Fagus sylvatica*. Być może na te różnice w składzie florystycznym wpływa las, z którym płaty zespołu *Peucedano-Coryletum* Jury Krakowsko-Wieluńskiej graniczą.

Omawiany zespół znany jest również z terytorium Lubelszczyzny. Opisał go Fijałkowski (1959) z Łubian koło Zamościa. Rozwija się tak samo jak na Wyżynie Małopolskiej na rędzinach kredowych. Podobnie jak na badanym terenie, runo wykazuje charakter mozaikowy: obok gatunków leśnych rosną gatunki murawowe. Poprzez *Anemone sylvestris*, *Calamintha vulgaris*, *Cytisus nigricans*, *Peucedanum cervaria* i *Trifolium alpestre* nawiązuje do naszego, a *Carex montana*, *Cytisus ruthenicus*, *Trifolium rubens* i *Viola hirta* łączą go z *Peucedano-Coryletum* z Miechowskiego i Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Na Wyżynie Lubelskiej występuje on jeszcze w Wolinie koło Chełma i w Bogdance Starej koło Wojsławic (Fijałkowski 1961). Przypuszczalnie rozwija się on jeszcze na prawej krawędzi doliny Wisły, zbudowanej z margli kredowych, od Annapola aż po Kamień.

Z dotychczasowych badań nad *Peucedano-Coryletum* wynika, że wyodrębnienie przez Kozłowską tego rodzaju zarośli jako osobnej asocjacji i wydzielenie gatunków charakterystycznych było bardzo trafne.

13. Zbiorowisko z *Juniperus communis*

a. Występowanie w terenie i ekologia

Juniperus communis stanowi domieszke wielu zbiorowisk kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Tworzy on również płaty zarośli, w których bezwzględnie panuje. Płaty te wyraż-

* Na badanym terenie występuje rzadko w murawach kserotermicznych.

** Stwierdzony tylko na dwóch stanowiskach: pod osłoną małych sosenek, odległych około 20 m od 88 zdjęcia płatu *Peucedano-Coryletum* i w zniekształconym płacie z *Corylus avellana* w Szurach.

nie różnią się od innych zbiorowisk zaroślowych. Zdjęcia wykonane w tych płatach włączono do jednej tabeli i uznano za odrębne zbiorowisko.

Zarośla tego typu rozprzestrzeniają się przede wszystkim na terenach objętych wypasem. Większe skupienia zarośli z jałowcem pospolitym spotykamy na krawędziach ujściowej części doliny Opatówki, na zboczach rozczłonkowanych wąwozów i pagórków lessowych, należących do wsi Radoszki i Wieprzki, na krawędziach doliny Wisły, na odcinku od Dębna aż po Solec Sandomierski i na zboczach parowów otwartych do niej. Nigdzie jednak nie rozwijają się tak jednolicie, jak na zboczach rozległego parowu leżącego na terenie gruntów wsi Biedrzychów, tuż za ostatnimi budynkami mieszkalnymi od strony wsi Nowe.

Wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne włączone do tabeli 40 pochodzą z tego stanowiska, które zajmuje kilka ha powierzchni.

Miejsca opanowane przez zbiorowisko z *Juniperus communis* charakteryzują się łagodnym spadkiem ($10-30^\circ$), ekspozycją wschodnią, południowo-wschodnią, południowo-zachodnią, północno-wschodnią, północno-zachodnią i północną.

Zdjęcia zestawione w tabeli 40 wykonano przy ekspozycji wschodniej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej, gdyż przy tego rodzaju ekspozycji zbiorowisko to wykształca się najlepiej.

Zbiorowisko z *Juniperus communis* rozwija się na bardzo płytkich luźnych glebach piaskowych, pod którymi na głębokości od 25 do 75 cm spoczywa margiel kredowy, lub na szkieletowych rędzinach wytworzonych z margli kredowych oraz na rędzinach kredowych z dużą domieszką luźnego piasku i na lessach.

Laboratoryjnych badań glebowych w tym zbiorowisku nie prowadzono, ograniczono się jedynie do wykopania 4 orientacyjnych dołów glebowych, w których zbadano miąższość poziomu mineralno-próchnicznego i dokonano pomiarów odczynu próbek z różnych poziomów genetycznych.

Miąższość poziomu mineralno-próchnicznego waha się w poszczególnych dołach od 15—25 cm; charakteryzuje się on ciemnobrunatną barwą oraz odczynem obojętnym ($\text{pH} = 7$). W głębszych poziomach odczyn próbek jest zasadowy ($\text{pH} = 8$).

b. Struktura i skład florystyczny

W budowie pionowej zbiorowiska pastwiskowego z *Juniperus communis* wyróżnić można 4 warstwy: dwie warstwy krzewów: wyższą i niższą, warstwę zielną i warstwę mchów. Wyższa warstwa krzewów osiąga wzrost od 2—3 m, niższa natomiast od 0,5—1 m. Gatunkami budującymi

warstwę krzewów są: *Juniperus communis*, *Berberis vulgaris*, *Rosa canina*, *R. glauca*, *R. rubiginosa*, *R. spinosissima*, *Prunus spinosa* i *Rhamnus cathartica*. Niektóre krzewy liściaste są wyższe od jałowca pospolitego. Nad warstwą krzewów sterczą pojedyncze okazy sosny pospolitej, których wysokość waha się od 5 do 8 m. Same krzewy tworzą mniej lub bardziej zwarte kępy zarośli, zwykle poprzedzielane ścieżkami wydeptanymi przez pasące się tu bydło. Zwarcie krzewów w poszczególnych płatach waha się od 40—70%.

Roślinność naczyniowa budująca warstwę zielną skupia się przede wszystkim w miejscach charakteryzujących się mniejszym zwarciem krzewów i w pobliżu ścieżek; tylko gatunki leśne lub znoszące znaczne ocienienie wegetują pod zwartą osłoną krzewów. Pokrycie warstwy zielnej wynosi od 30—80%. Pod okapem krzewów skupiają się kępy mchów poprzątkane z rzadka roślinami naczyniowymi. Do głównych gatunków wchodzących w skład warstwy najniższej należą: *Abietinella abietina*, *Camptothecium lutescens*, *Thuidium Philibertii* i *Rhytidiadelphus triquetrus*. Pokrycie w warstwie mchów waha się od 25 do 60%.

Tabela 41 - Table 41
Liczba gatunków w poszczególnych stopniach stałości
Number of species in the particular constancy grades

Stażość Constancy	Powierzchnia Surface	50 - 150 m ²		
		Rośliny naczyniowe vascular plants	mchy i porosty mosses and lichens	razem total
V	81 - 100 %	14	2	16
IV	61 - 80 %	8	.	8
III	41 - 60 %	18	1	19
II	21 - 40 %	12	1	13
I-II-V	21 - 100 %	52	4	56
I	1 - 20 %	40	12	52
I-V	1 - 100 %	102	16	108

W 11 zdjęciach fitysocjologicznych, które włączono do tabeli, zanotowano 108 gatunków, bez mchów i porostów 92. Tylko 52 gatunki roślin naczyniowych osiąga V i II stopień stałości, razem z mchami 56. Liczba gatunków w poszczególnych zdjęciach waha się od 32—47.

W budowie zbiorowiska biorą udział gatunki z rzędu *Prunetalia*, *Quercetalia pubescentis* i klasy *Querco-Fagetea*; tworzą one najmniej liczną grupę. Jest ich razem 19 gatunków; 11 osiąga V i II stopień stałości. Gatunki murawowe z rzędu *Festucetalia vallesiacae* i klasy *Festuco-Brometea* pomimo znacznej przewagi pod względem liczebności gatunków nad gatunkami z klasy *Querco-Fagetea* (na 30 gatunków, 22 osiąga V i II stopień stałości) wykazują osłabioną żywotność. Przeważnie słabo kwitną i owocują. Wprawdzie kilka gatunków z tej klasy osiąga V stopień stałości, dwa tylko jednak: *Teucrium chamaedrys* i *Thymus pulegioides* posiadają stosunkowo duży współczynnik pokrycia. Udział ga-

tunków z grupy towarzyszących jest najwyższy. Zanotowano tu 52 gatunki, z których 23 osiąga V i II stopień stałości. Spośród gatunków tej grupy najwyższą stałością cechują się: *Juniperus communis*, *Camptothecium lutescens*, *Origanum vulgare*, *Linum catharticum*, *Plantago lanceolata*, *Sedum acre* i *Thuidium Philibertii*. One właśnie wywierają wyraźny wpływ na fizjonomię każdej warstwy zbiorowiska.

Stosunki stałości gatunków przedstawione w tabeli 41 charakteryzują zbiorowisko o jednolitym składzie florystycznym. Najniższa liczba gatunków (8) występuje w IV stopniu stałości. Liczba gatunków o V, III i II stopniu stałości jest mniej więcej wyrównana.

c. Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych

Wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne zamieszczone w tabeli nr 40 wykonano na zboczach rozległego parowu otwartego do doliny Wisły, położonego kilka metrów na północ od wsi Biedrzychów.

IV. SUKCESJA ROŚLINNOŚCI ZESPOŁÓW KSEROTERMICZNYCH

Prześledzenie sukcesji roślinności na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Ilżeckim nie jest łatwe. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu, zmienność podłoża, ostro odcinające się od siebie płaty roślinności i działalność człowieka sprawiają, że istnieje stosunkowo mała liczba płatów wskazujących na powiązanie poszczególnych zbiorowisk pomiędzy sobą.

Na badanym terenie nie obserwujemy jakiegось jednego, wspólnego, wyjściowego ogniwa sukcesyjnego dla wyróżnionych zespołów muraw kserotermicznych. Są one różne, co związane jest niewątpliwie z odmiennymi czynnikami decydującymi o przebiegu rozwoju szaty roślinnej opisanego terenu. Tymi czynnikami są: podłoże, zawartość próchnicy i CaCO_3 w glebie, ekspozycja, nachylenie, mikroklimat, wysokość względna i działalność gospodarcza człowieka.

Na otwartych zboczach i obsuwach lessowych początkowym ogniwem sukcesji do następnych zespołów roślinności kserotermicznej jest *Stipetum capillatae*. Zespół ten w skrajnych warunkach kserotermicznych utrzymuje się jako zbiorowisko trwałe. W wypadku pogarszania się właściwości fizycznych gleby na skutek udeptywania jej przez pasące się bydło lub wypalenie łąnów ostnicy włosowatej przechodzi on w podzespół *Stipetum capillatae bothriochloetosum*.

Podzespół ten przechodzi w *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitesum*. Natomiast podzespół typowy *Stipetum capillatae* na skłonach południowych o bardziej utrwalonym podłożu przekształca się w *Koelerio-Festucetum sulcatae typicum*.

Przy skłonach zbliżonych do południowych lub nawet południowych,

Ryc. 12. Ekspozycja płatów niektórych zespołów:

Exposure of patches of some associations:

a — *Stipetum capillatae*; *b* — *Koelerio-Festucetum*; *c* — *Scabioso-Teucrietum*; *d* — *Asteri-Linetum flavae*; *e* — *Prunetum fruticosae*; *f* — *Peucedano-Coryletum*

Tabela 43 - Table 43

Przejście od *Stipetum capillatae* do *Prunetum fruticosae*
 Transition from *Stipetum capillatae* to *Prunetum fruticosae*

Nr zdjęcia /No. of relevé/	1	2
Data /Date/	19.V.1963	8.VIII.1963
Miejscowość /Locality/	Dwikozy	Gorzyczany
Ekspozycja /Exposure/	S	S
Nachylenie w ° /Inclination in °/	30	20
Pokrycie warstwy ziół "c" /Cover of herbaceous layer "c"/	95	80
Pokrycie warstwy mchów "d" /Cover of the moss layer "d"/	-	20
Powierzchnia plątów w m ² /Surface of patches in m /	120	80
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of the releve in m ² /	40	50
Liczba gatunków w zdjęciu /No. of species in releve/	22	25
Gatunki charakterystyczne dla zespołu /Species characteristic of the association/ <i>Stipetum capillatae</i> :		
<i>Stipa capillata</i>	3.3	2.2
Gatunki charakterystyczne związku /Species characteristic of the alliance/ <i>Festuca ovina</i> i rzędu /and the order/ <i>Festucetalia ovinae</i> :		
<i>Achillea setacea</i>	1.1	.
<i>Adonis vernalis</i>	+	.
<i>Agropyron intermedium</i>	+	.
<i>Campanula sibirica</i>	.	+
<i>Carex praecox</i>	1.1	.
<i>Hieracium echinoides</i>	.	+
<i>Potentilla anserina</i>	1.1	1.1
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	1.1	+
<i>Thymus marschallianus</i>	1.1	1.1
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ <i>Festuco-Brometea</i> :		
<i>Artemisia campestris</i>	+	+
<i>Asperula cynanchica</i>	.	+
<i>Calamintha acinos</i>	+	.
<i>Centaurea rhodantha</i>	+	.
<i>Coronilla varia</i>	.	+
<i>Dianthus carthusianorum</i>	+	+
<i>Euphorbia cyparissias</i>	+	.
<i>Falcaria vulgaris</i>	.	.
<i>Festuca sulcata</i>	2.2	.
<i>Galium verum</i>	+	1.1
<i>Koeleria gracilis</i>	1.1	.
<i>Medicago falcata</i>	1.1	1.1
<i>Poa pratensis</i> var. <i>angustifolia</i>	1.1	.
<i>Salvia pratensis</i>	+	+
<i>Stachys recta</i>	1.1	.
<i>Verbascum lichnitis</i>	+	.
<i>Veronica spicata</i>	.	1.1
<i>Abietinella abietina</i> d	.	1.1
Gatunki charakterystyczne dla rzędu /Species characteristic of the order/ <i>Prunetalia</i> :		
<i>Cerasus fruticosa</i>	2.2	3.2
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/		
<i>Helichrysum arenarium</i>	.	+
<i>Hieracium umbellatum</i>	.	+
<i>Erigeron annuus</i>	.	+
<i>Meibomia officinalis</i>	.	+
<i>Camptothecium lutescens</i> d	.	2.2

lecz przy małym nachyleniu i większej akumulacji próchnicy, płaty zespołu *Stipetum capillatae* i zespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae* opanowywane są przez składniki *Brachypodium pinnatum*. Zbiorowisko to w przypadku wstrzymania czynności gospodarczych, jak wypasania, a także i koszenia trawy, stanowi ogniwo przejściowe od wyżej wspom-

nianych muraw kserotermicznych do zarośli z rzędu *Prunetalia*. Dowodzą tego zdjęcia od 52—55 tabeli 16.

Płaty zespołów: *Stipetum capillatae* i *Koelerio-Festucetum sulcatae* żyjące w mniej skrajnych warunkach mikroklimatycznych, które kształtują się w zależności od wysokości względnej na podłożu lessowym, stosunkowo szybko przechodzą w zarośla wiśni karłowatej. Na taki kierunek sukcesji wskazują dwa zdjęcia fitosocjologiczne, wykonane w płatach znajdujących się na przejściu od *Stipetum capillatae* do *Prunetum fruticosae* (tab. 43).

Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych tabeli 43

1. Zbocze lessowe przy boisku sportowym w Dwikozach.
2. Zbocze lessowe krótkiego wąwozu na terenie rezerwatu w Gorzyczanach.

Dość rzadko na świeżych wilgotniejszych obsuwach u stóp wąwozów lessowych rozwija się zbiorowisko inicjalne z *Tussilago farfara*, które również staje się ogniwem wyjściowym dla zespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae*. Poniżej przytaczam jedno orientacyjne zdjęcie fitosocjologiczne, które zostało wykonane 25.VII.1963 r. w zachodniej części rozczłonkowanych wąwozów lessowych położonych na gruntach wsi Wysiadłów (od strony Radoszek) na obsuwie lessowym o nachyleniu 25°, przy ekspozycji E i SE. Powierzchnia płatu około 25 m², pokrycie roślinności około 30%.

Tabela 44 - Table 44
Inicjalne zbiorowisko z *Tussilago farfara*
Initial community with *Tussilago farfara*

Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ Festuco-Brometes :		
Asperula cynanchica	+	<i>Festuca sulcata</i> +
Calamintha acinos	+	<i>Galium verum</i> +
Campanula glomerata	+	<i>Medicago falcata</i> +
Campanula sibirica	+	<i>Pimpinella saxifraga</i> +
Centaurea scabiosa	+	<i>Plantago media</i> +
Coronilla varia	r	<i>Potentilla arenaria</i> r
Euphorbia cyparissias	+	<i>Seseli annuum</i> +
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/		
Achillea millefolium	+	<i>Origanum vulgare</i> +
Carduus acanthoides	+	<i>Picris hieracioides</i> +
Equisetum arvense	+	<i>Rubus caesius</i> r
Festuca rubra	+	<i>Sonchus oleraceus</i> +
Hieracium umbellatum	+	<i>Trifolium pratense</i> +
Hypericum perforatum	+	<i>Tussilago farfara</i> 2.2
Linaria vulgaris	+	<i>Veronica chamaedrya</i> +
Linum catharticum	+	<i>Vicia cracca</i> +
Medicago lupulina	+	<i>Camptothecium lutescens</i> +
Mentha sylvestris	+	<i>Ceratodon purpureus</i> +

Możliwe jest również bezpośrednie osiedlanie się zespołu *Prunetum fruticosae* na otwartych stromych krawędziach wąwozów lessowych i ich obsuwach. Zjawisko to obserwujemy również na otwartych marglach kredowych, lecz jest ono bardzo rzadkie.

Рис. 13. Schemat przebiegu sukcesji zbiorowisk kserotermicznych na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Ilżeckim
Scheme of succession of the xerothermic communities on the Sandomierz Highland and Ilża Forehills

Tabela 45 - Table 45

Inicjalne zbiorowisko z *Salvia verticillata* - *Teucrium chamaedrys*
Initial community with *Salvia verticillata* - *Teucrium chamaedrys*

Nr zdjęcia /No. of relevé/	1	2
Data /Date/	1.VIII.1962	17.VIII.1962
Miejscowość /Locality/	Stupia	Wesołówka
Wystawa /Exposure/	Nadb. SE	SE
Nachylenie w ° /Inclination in °/	40	45
Pokrycie warstwy "c" /Cover of layer "c"/	40	50
Pokrycie warstwy mchów "d" /Cover of moss layer "d"/	10	5
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of the relevé in m ² /	70	60
Liczba gatunków w zdjęciu /No. of species in relevé/	32	33
<hr/>		
Gatunki charakterystyczne dla rzędu /Species characteristic of the order/ <i>Festucetalia vallesiacae</i> i rzędu /and order/ <i>Brometalia erecti</i> *		
<i>Anthemis tinctoria</i>	+	+
<i>Campanula sibirica</i>	+	+
<i>Salvia verticillata</i>	2.2	2.2
x <i>Teucrium chamaedrys</i>	1.2	1.1
Gatunki charakterystyczne klasy /Species characteristic of the class/ <i>Festuco - Brometea</i> :		
<i>Allium oleraceum</i>	+	+
<i>Anthericum ramosum</i>	.	+
<i>Anthyllis vulneraria</i> var. <i>polyphylla</i>	+	+
<i>Arabis hirsuta</i>	+	+
<i>Aster amellus</i>	+	1.1
<i>Coronilla varia</i>	.	+
<i>Erigeron acer</i>	.	+
<i>Eryngium planum</i>	.	+
<i>Medicago falcata</i>	1.1	+
<i>Pimpinella saxifraga</i>	.	+
<i>Poa pratensis</i> var. <i>angustifolia</i>	+	+
<i>Ranunculus bulbosus</i>	+	+
<i>Sanguisorba minor</i>	1.1	1.1
<i>Stachys recta</i>	.	1.1
<i>Abietinella abietina</i> d	1.1	1.1
Gatunki charakterystyczne dla rzędu /Species characteristic of the order/ <i>Prunetalia</i> :		
<i>Berberis vulgaris</i>	+	+
<i>Rosa canina</i> c	r	.
<i>Rosa rubiginosa</i> c	+	+
Gatunki charakterystyczne dla związku /Species characteristic of the alliance/ <i>Quercion pubescentis - sessiliflorae</i> i rzędu /and the order/ <i>Quercetalia pubescentis</i> :		
<i>Anemone silvestris</i>	.	+
<i>Peucedanum cervaria</i>	1.1	.
<i>Viola collina</i>	+	.
Gatunki towarzyszące /Accompanying species/ :		
<i>Agropyron repens</i>	+	.
<i>Convolvulus arvensis</i>	.	.
<i>Daucus carota</i>	+	+
<i>Diploxys muralis</i>	.	+
<i>Echium vulgare</i>	+	+
<i>Festuca rubra</i>	+	+
<i>Frangula alnus</i> c	+	+
<i>Galium mollugo</i>	r	+
<i>Galeopsis angustifolium</i>	+	+
<i>Hieracium pilosella</i>	+	+
<i>Hieracium umbellatum</i>	.	+
<i>Juniperus communis</i> c	+	+
<i>Linaria minor</i>	+	+
<i>Linum catharticum</i>	.	+
<i>Medicago lupulina</i>	+	+
<i>Origanum vulgare</i>	+	+
<i>Pastinaca sativa</i>	.	+
<i>Picris hieracioides</i>	.	+
<i>Silene inflata</i>	.	+
<i>Vicia cracca</i>	.	+
<i>Camptothecium lutescens</i> d	1.1	+
<i>Ceratodon purpureus</i> d	+	+
<i>Barbula gracilis</i> d	.	+

Na glebach piaszczystych lub spiaszczonych lessach rozwija się zbiorowisko z *Festuca duriuscula*-*Potentilla arenaria* (por. tabela 13); być może, jest ono również jednym z ogniw zdążających do zespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae*.

Nieco już inaczej przebiega sukcesja roślinności na marglach kredowych, odsłoniętych zboczach i na krawędziach dolin Kamiennej i Wisły. Na takich siedliskach mogą się rozwijać płaty zbiorowiska inicjalnego z *Salvia verticillata*-*Teucrium chamaedrys* (tabela 45), zbiorowisko z *Carex humilis*-*Thesium linophyllum* i płaty zespołu *Asterii-Linetum flavae*. Pierwszy typ zbiorowiska jest dość częsty. Rozwija się ono na rumoszu margli kredowych. Zbiorowisko to, gdy zdobędzie stanowiska poleśne lub pozaroślowe o znacznej akumulacji poziomego próchnicznego, przemienia się w zespół *Scabioso-Teucrietum*, bądź też przy nieco lepszym uwilgotnieniu gleby rozwija się w zbiorowisko z *Brachypodium pinnatum*. Dwa ostatnie, tj. zbiorowisko z *Carex humilis*-*Thesium linophyllum* i zespół *Asteri-Linetum flavae* należą do bardzo rzadkich zbiorowisk reliktowych; zajmują siedliska wybitnie suche i ciepłe.

Ogniwo sukcesyjne muraw kserotermicznych wykształconych na lessach zamyka zespół *Prunetum fruticosae*, który w następnym etapie przechodzi w zbiorowisko z *Prunus spinosa*, bądź też bezpośrednio w wariant zubożały *Peucedano-Coryletum*. Natomiast murawy kserotermiczne, które zdobyły margle kredowe, w bardzo powolnym tempie (np. *Scabioso-Teucrietum* i *Asteri-Linetum flavae*) rozwijają się w zupełnie luźne zarośla z *Berberis vulgaris*-*Rosa rubiginosa*, a za pośrednictwem ich w wariant typowy *Peucedano-Coryletum*. W wypadku ingerencji człowieka (co jakiś czas całkowite wycinanie krzewów) przemieniają się w wariant z *Cornus sanguinea*.

Luźne zarośla z *Berberis vulgaris*-*Rosa rubiginosa* przy skłonach północnych lub zbliżonych do południowych na zboczach o łagodnym spadku, na których wypasa się bydło, przechodzą w zarośla z *Juniperus communis*.

Teoretyczny przebieg sukcesji zespołów kserotermicznych na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim obrazuje ryc. 13.

Stanowiska zdjęć fitosocjologicznych tabeli 45

1. Zerodowane zbocza stromej krawędzi doliny Wisły położone w odległości około 0,5 km na południe od wsi Słupia Nadbrzeżna.
2. Zerodowane zbocze stromej krawędzi doliny Wisły położone na północ od wsi Wesołówka.

1. Uwagi ogólne

Zagadnienie dotyczące ochrony najlepiej zachowanych fragmentów zbiorowisk z roślinnością stepową na Wyżynie Sandomierskiej poruszane było już przed 46 laty przez Dziubałtowskiego (1922). Píše on o ocaleniu roślinności stepowej na wysokiej krawędzi doliny Wisły, położonej na wschód od Sandomierza — łącznie z Górami Pieprzowymi — o zabezpieczeniu przed zniszczeniem dużego kompleksu roślinności stepowej rozwijającej się na wzgórzach lessowych położonych na północ od Dwikóz, na lewym brzegu doliny Opatówki i na prawym wysokim brzegu Kamiennej między Skalą a Smykowem.

Problem ochrony roślinności stepowej i kserotermicznej ponownie podjął Jarosz (1954), projektując trzy rezerваты: 1) na Panieńskiej Górze koło Dwikóz dla ochrony zespołu roślinności stepowej ze *Stipa capillata* i *S. Joannis*, 2) rezerwat położony w wąwozie lessowym, przez który biegnie droga w górę od kościoła w Dwikozach do Gór Wysokich dla zachowania *Cerasus fruticosa* oraz 3) rezerwat w Górach Pieprzowych, chroniący płaty *Stipetum capillatae* i *Prunetum fruticosae*. Z tych trzech rezerwatów Szafer (1959) wymienia dla okręgu Sandomiersko-Opatowskiego tylko dwa: rezerwat Panieńska Góra koło Dwikóz i Góry Pieprzowe koło Sandomierza. Pomimo że w pracach naukowych figurują one oficjalnie jako rezerваты, to jednak do obecnej chwili nie zostały jeszcze prawnie zatwierdzone, a roślinność — podobnie jak na innych stanowiskach — jest mocno dewastowana.

Roślinność kserotermiczną na Wyżynie Sandomierskiej zabezpieczono dotychczas tylko w jednym rezerwacie, a m. w Gorzyczanach (pow. sandomierski). Rezerwat chroni płaty roślinności stepowej ze *Stipa capillata* i płaty zarośli z *Cerasus fruticosa*.

Badania fitosocjologiczne nad roślinnością kserotermiczną Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego przeprowadzone przeze mnie w czasie kilku okresów wegetacyjnych pozwoliły mi na zidentyfikowanie szeregu placówek roślin chronionych, znanych dawniej, i wykrycie ich nowych stanowisk nie podawanych z tego terenu. Należą do nich:

<i>Adonis vernalis</i>	<i>Lilium martagon</i>
<i>Anemone sylvestris</i>	<i>Orchis militaris</i>
<i>Aquilegia vulgaris</i>	<i>Orchis morio</i>
<i>Cerasus fruticosa</i>	<i>Pulsatilla pratensis</i>
<i>Cypripedium calceolus</i>	<i>Pulsatilla pratensis</i> var. <i>nigricans</i>
<i>Daphne mezereum</i>	<i>Stipa capillata</i>
<i>Gentiana cruciata</i>	<i>Stipa Joannis</i>
<i>Hedera helix</i>	

Dwa gatunki, tj. *Anemone sylvestris* i *Cerasus fruticosa*, trzeba uznać za pospolite ze względu na dużą liczbę stanowisk.

Fot. 13. Kwitnące okazy lnu żółtego (*Linum flavum* L.) w projektowanym rezerwacie „Sadkowiec”

Flowering specimens of *Linum flavum* L. in the planned reservation in Sadkowiec

Wykryto również fragmenty muraw i zarośli o bardzo interesującym składzie florystycznym i socjologicznym, niewątpliwie zasługujące na ochronę.

Na badanym terenie istnieje nieświadome niszczenie reliktowych zbiorowisk muraw i zarośli. Dowodem tego może być bardzo szybko postępujący proces dewastacji roślin na prawym, wysokim i stromym zboczu doliny Kamiennej między Skałą a Smykowem. Na tym stanowisku rosły przed 46 laty (S. Dziubałtowski 1922) bogate fragmenty roślinności stepowej ze *Stipa capillata*, *S. pennata* (prawdopodobnie *S. Joannis*) i *Adonis vernalis*. Interesującą roślinność stepową całkowicie zniszczono wypasem; tylko u stóp wypiętrzających się jurajskich skałek wapiennych w Podgrodziu znaleziono niewiele okazów *Adonis vernalis*. Gatunek ten w niedługim czasie podzieli los poprzednich, gdyż kwiaty jego są zrywane przez mieszkańców okolicznych wsi. Przykład ten najwyraźniej wskazuje, że najcenniejsze placówki, jakie się zachowały z rzadkimi roślinami (np. fragmenty reliktowych zbiorowisk czy nawet dosyć częste płaty zarośli z *Cerasus fruticosa*, które są charakterystyczne dla krajobrazu lessowego Wyżyny Sandomierskiej), trzeba zawczasu ochronić przed zniszczeniem tworząc dla nich rezerваты przyrody.

2. Rezerwaty przyrody

Poniżej przedstawiono projekty utworzenia nowych rezerwatów na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim, oparte na własnych obserwacjach terenowych, i ocenę dwóch dawniej zaprojektowanych rezerwatów, a jeszcze nie zatwierdzonych (rezerwat Panieńska Góra k. Dwikóz i Pieprzowe Góry k. Sandomierza).

1. Rezerwat „Sadkowie k. Solca Sandomierskiego” z reliktowymi płatami zespołu *Asteri-Linetum flavae*. Projektowany obiekt leży na północnym krańcu wsi Sadkowie, koło Solca Sandomierskiego, w odległości 20 m na zachód od ostatniego gospodarstwa zlokalizowanego tuż przy dolinie Wisły. Obejmuje on mały wąwóz zbudowany z margli kredowych, otwarty do doliny Wisły. Ochroną należałoby objąć roślinność wykształconą na południowym skłonie wąwozu o powierzchni około 0,4 ha.

Zbocze to porośnięte jest niskimi i zupełnie luźno rozmieszczonymi krzewami: *Berberis vulgaris*, *Rosa canina*, *R. rubiginosa*, *R. spinosissima*, *Crataegus monogyna*, *C. curvisepala*, *Cornus sanguinea* i *Juniperus communis*. Pomiędzy krzewami na słabo utrwalonym podłożu rozkruszonych margli kredowych rozwija się jedna z najpiękniejszych muraw kserotermicznych. Głównymi składnikami tej murawy są pontyjskie gatunki: *Aster amellus* i *Linum flavum* oraz szereg innych roślin kserotermicznych, jak: *Peucedanum cervaria*, *Campanula sibirica*, *Scabiosa ochroleuca*, *Hieracium Bauhini*, *Anthemis tinctoria* i inne.

W zachodniej części rezerwatu rośnie niewielki płąt *Cerasus fruticosa*, która tu osiąga wysokość około 40 cm, obficie kwitnie i owocuje.

Roślinność projektowanego rezerwatu znajduje się w bardzo dobrym stanie, gdyż właściciel tego nieużytku tylko sporadycznie wypasa bydło w okresie wiosennym.

Wydzielenie tego niewielkiego skrawka ziemi spod gospodarki człowieka pozwoli na bliższe zapoznanie się z reliktowym zespołem *Asteri-Linetum flavae* i zabezpieczy przed zniszczeniem jedno z najpiękniejszych (z sześciu istniejących na badanym terenie) stanowisk lnu złocistego.

Granice projektowanego rezerwatu od zachodu i północy wyznaczają pola uprawne, natomiast od wschodu krawędź doliny Wisły i budynki gospodarcze. Południową granicę wyznacza dno wąwozu (ryc. 14).

2. Rezerwat „Linów k. Lasocina” dla ochrony obuwika pospolitego (*Cypripedium calceolus*). Wschodnie zbocza, położone przy drodze polnej prowadzącej od wsi Szczurów do szosy biegnącej z Ożarowa do Annopola są interesujące pod względem florystycznym. Szczególnie bardzo dużą wartość przedstawia odcinek zbocza położony obok budynków Piotra

Ryc. 14. Projektowany rezerwat „Sadkowiec k. Solca Sandomierskiego” z relik-
towymi płatami zespołu *Asteri-Linetum flavae*

1 — rezerwat, 2 — granice rezerwatu

Projected reservation „Sadkowiec” with relict patches of the assoc. *Asteri-Linetum flavae*

1 — reservation, 2 — reservation borders

Ryc. 15. Położenie rezerwatu „Linów” k. Lasocina
Situation of the reservation „Linów” near Lasocin

Fot. 14. Obuwik pospolity (*Cypripedium calceolus* L.) w projektowanym rezerwacie „Linów” koło Lasocina

Cypripedium calceolus L. in the planned reservation near Lasocin

Kuśmierczyka mieszkańca wsi Kolonii Linów pow. Sandomierz. Zbocze to jest zbudowane z margli kredowych i porośnięte przez płaty zarośli wariantu z *Cornus sanguinea* zespołu *Peucedano-Coryletum*. Wśród gęstych zarośli z *Cornus sanguinea* rośnie jedno z największych skupień *Cypripedium calceolus*. Na powierzchni około 0,5 ha znaleziono ponad 200 okazów tej pięknej i rzadkiej w naszym kraju rośliny chronionej. Wszystkie niemal okazy w czasie obserwacji kwitły i owocowały, tylko zaledwie kilka znajdowało się w stanie płonnym. Z innych gatunków chronionych występują tu: *Aquilegia vulgaris*, *Daphne mezereum*, *Linum martagon*, *Convallaria maialis* i *Primula officinalis* var. *canescens*.

W wyniku poczynionych obserwacji stwierdzić należy, że obuwik pospolity występuje najliczniej w miejscach o mniejszym zwarcu krzewów. Może się on utrzymać tu długo przy częściowej ingerencji człowieka polegającej na przecinaniu co kilka lat zarośli derenia świdwy.

Do projektowanego rezerwatu należałoby również przyłączyć wąski płat murawy kserotermicznej zespołu *Scabioso-Teucrietum*, przyległy do zachodnich części zarośli; posiada bowiem dużą wartość dla prześledzenia sukcesji zbiorowisk.

Granicę rezerwatu stanowiłyby od północy około 45-letni zagajnik dębowy, od wschodu pole uprawne, od południa luźny pas krzewów,

a od zachodu droga polna. Powierzchnia rezerwatu w tak wyznaczonych granicach wynosiłaby około 0,85 ha (ryc. 15).

3. Rezerwat „Panieńska Góra” koło Dwikóz. Rezerwat Panieńska Góra został zaprojektowany dawniej dla ochrony fragmentu zespołu stepowego ze *Stipa capillata* i *S. Joannis*. Choć rośliność zachodniej części południowego skłonu rezerwatu jest poważnie zniekształcona zalesianiem, wypasem i koszeniem trawy, większa część zbocza przedstawia jeszcze dużą wartość naukową. Rozwijają się tu bowiem typowo wykształcone płaty zespołu *Stipetum capillatae* (patrz zdjęcia fitosocjolo-

Ryc. 16. Położenie rezerwatu „Dwikózy” i rezerwatu „Panieńska Góra” k. Dwikóz
Situation on the reservations „Dwikózy” and „Panieńska Góra” near Dwikózy

giczne 108, 109 i 110 tabeli 6). Dużą osobliwością rezerwatu jest *Stipa Joannis*, która rośnie tu na południowym skłonie i liczy około 300 kęp. Już od szeregu lat gatunek ten nie rozmnaża się generatywnie, gdyż jego piękne kwiatostany zrywane są na bukiety przez właścicieli Panieńskiej Góry, mieszkańców wsi Dwikózy i Słupczy oraz przygodnych turystów. Poważnym niebezpieczeństwem dla ostnicy Jana jest nowo założona kąpielnia żwiru obok płatu *Stipa Joannis*. Rośliność rezerwatu w okresie letnim trawiona jest przez pożary wzniecane przez przejeżdżające pociągi.

Od zachodniej strony południowego skłonu zbocza do płatów *Stipetum capillata* wkracza *Brachypodium pinnatum* i *Cerasus fruticosa*.

Jeżeli się nie przystąpi do najszybszego zatwierdzenia rezerwatu

Fot. 15. Dorodne okazy miłka wiosennego (*Adonis vernalis* L.) w projektowanym rezerwacie „Dwikozy”

Adonis vernalis L. in the planned reservation in Dwikozy

i do postawienia tablicy orientacyjnej informującej o wartości obiektu oraz tablic ostrzegawczych przed niebezpieczeństwem wzniesienia pożaru przez maszynistów, w krótkim czasie zniknie z tego subregionu jedyny płat reliktovej trawy — ostnicy Jana.

4. Rezerwat „Dwikozy” na południowych skłonach krawędzi doliny Opatówki przy boisku sportowym. Lessowe zbocza doliny Opatówki o ekspozycji południowej, położone obok boiska sportowego na terenie wsi Dwikozy, porośnięte są przez stosunkowo duży kompleks roślinności stepowej. Występują tu fragmenty zespołów: *Stipetum capillatae*, *Koelerio-Festucetum sulcatae* i przejściowe płaty od *Stipetum cappillatae* do *Prunetum fruticosae*. Największą wartość przedstawia duże skupisko *Adonis vernalis*. Rośnie on masowo przede wszystkim na bardziej połogich miejscach zachodniej części zboczy obok zarośli z *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Crataegus monogyna* i in. Okazy miłka wiosennego są dorodne, obficie kwitną i owocują. Obok największego skupiska *Adonis vernalis* rośnie tu bardzo rzadki, ciepłolubny gatunek *Rosa gallica*. Zajmuje on powierzchnię około 50 m². Róża francuska rozmnaża się tu głównie wegetatywnie, gdyż jej piękne, o silnym zapachu kwiaty są zrywane przez dzieci pasące bydło. Z innych gatunków kserotermicznych na uwagę zasługują: *Inula hirta*, *Achillea setacea*, *Scorzonera pur-*

purea, *Thesium linophyllum*, *Odontites lutea*, *Campanula sibirica* i *Orobanche vulgaris*.

Spośród wymienionych gatunków najbardziej narażony jest na wyginięcie *Adonis vernalis*, który ze względu na właściwości trujące nie jest zjadany przez pasące się bydło i dzięki temu w łatwy sposób zdobywa teren. Rolnicy chcąc uchronić przed ocienieniem przez miłka wio-

Ryc. 17. Projektowany rezerwat „Zbocza przełomowej doliny Opatówki” pomiędzy Kicharami a Bykowcem

1 — rezerwat, 2 — granice rezerwatu, 3 — wąwozy

Projected reservation on the slopes of the Opatówka valley between Kichary and Bykowiec

1 — reservation, 2 — reservation borders, 3 — ravines

sennego gatunki traw stanowiące pożywienie dla wypasanego bydła, wyrrywają lub wykopują z korzeniami całe rośliny. Na pewnych odcinkach zboczy przyległych do pól odnośnych właścicieli miłek wiosenny został w wyżej podany sposób niemal całkowicie wytępiony. Oczywiście, niszczone jest też przez zieleń.

Utworzenie projektowanego rezerwatu na pow. około 2 ha ochroni przed zniszczeniem stosunkowo dobrze zachowane fragmenty zespołów stepowych i rzadkie gatunki roślin.

Projektowany rezerwat (ryc. 16) w górnych partiach zboczy otoczony jest przez pola uprawne, w dolnych natomiast przylega do boiska sportowego. Po zatwierdzeniu rezerwatu należy oczyścić zbocza z niewielkich kęp zarośli.

5. Rezerwat „Zbocza przełomowej doliny Opatówki” pomiędzy Kicharami a Bykowcem. Zbocza lewej krawędzi doliny Opatówki, zbudowane ze żwiru i miocenu i lessu, o ekspozycji południowej, stwarzają dogodne warunki do osiedlenia się roślinności stepowej i kserotermicznej. Toteż występują tu fragmenty typowo wykształconego stepu ostnicowego *Stipetum capillatae*, płaty *Stipetum capillatae bothriochloetosum*, płaty *Koelerio-Festucetum sulcatae* i płaty zbiorowiska *Festuca duriuscula-Potentilla arenaria*.

Ryc. 18. Położenie projektowanego rezerwatu „Gałkowice Ocín”

1 — rezerwat, 2 — granice rezerwatu

Situation of the projected reservation „Gałkowice-Ocín”

1 — reservation, 2 — reservation borders

Z uwagi na masowe występowanie *Pulsatilla pratensis* var. *nigricans* projektowany rezerwat — pomimo dużego zniszczenia roślinności przez intensywny wypas — zasługuje na wydzielenie spod gospodarki człowieka. Sprawa ta jest tym bardziej niecierpiąca zwłoki, że na terenie wytypowanym do ochrony zakładane są kopalnie żwiru, które w poważnym stopniu przyczyniają się do zniszczenia fragmentów wyżej wspomnianych zbiorowisk.

Powierzchnia projektowanego obiektu wynosi około 3 ha. Granice rezerwatu zaznaczono na mapce (ryc. 17).

6. Rezerwat „Gałkowice Ocín”. Godny ochrony jest również mały płat murawy kserotermicznej o pow. około 0,5 ha, położony na zboczach małego wąwozu otwartego do doliny Opatówki we wsi Gałkowice Ocín, tuż za budynkami gospodarczymi ob. Mendzelewskiego, właściciela tego terenu. W murawie kserotermicznej zniszczonej wypasem rośnie dość licznie *Adonis vernalis* (nazywany przez mieszkańców tej wsi „bałonia-mi”), który skupia się przede wszystkim na zboczu o skłonie południowo-wschodnim, tworząc dorodne kępy, obficie kwitnąc i owocując. Z innych roślin chronionych rośnie tu *Cerasus fruticosa* tworząc mały płat bardzo niskich zarośli oraz *Pulsatilla pratensis* var. *nigricans*. Spośród gatunków kserotermicznych rosną jeszcze: *Inula hirta*, *Bothriochloa ischaemum*, *Odontites lutea*, *Linum catharticum*, *Prunella grandiflora*, *Scabiosa ochroleuca* i wiele innych.

Ryc. 19. Położenie projektowanego rezerwatu „Granicznik” w Radoszkach
 Situation of the planned reservation „Granicznik” in Radoszki

Na uwagę zasługuje również mały fragment murawy kserotermicznej należący do wariantu z *Linosyris vulgaris* podzespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae*.

Z chwilą zatwierdzenia rezerwatu należy oczyścić południowo-wschodnie zbocze z pojedynczo rosnących wierzb i klonu jesionolistnego. Położenie rezerwatu oraz jego granice przedstawia mapka ryc. 18.

7. Rezerwat „Granicznik” w Radoszkach. Projektowany rezerwat o powierzchni około 4 ha leży na terenie rozczłonkowanych wąwozów lessowych (nazywanym przez miejscową ludność „Granicznik”) na południowo-zachodnich krańcach gruntów wsi Radoszki i północno-zachodnich krańcach gruntów wsi Wieprzki.

Rezerwat chroniłby fragment krajobrazu lessowego pociętego przez bardzo liczne jary i wąwozy, powstałe na skutek intensywnej erozji wodnej. Ponad dnem wąwozów sterczą bardzo liczne ostańce lessowe, stożki usypiskowe mające różnorodne kształty.

Obok zupełnie świeżych spotykamy też starsze formy geomorfologiczne, porośnięte zwłaszcza przez zarośla *Cerasus fruticosa*. W mniej zwartych płatach zarośli wiśni karłowatej, bądź też w murawie rośnie bardzo licznie *Anemone sylvestris*, *Prunella grandiflora*, *Scabiosa ochroleuca* i wiele innych gatunków kserotermicznych. Znalezione tu również rzadsze gatunki chronione, jak *Cypripedium calceolus*, *Orchis morio*,

Ryc. 20. Projektowany rezerwat „Kamień Plebański” k. Sandomierza
1 — rezerwat, 2 — granice rezerwatu

Planned reservation called „Kamień Plebański” near Sandomierz
1 — reservation, 2 — reservation borders

Ryc. 21. Rezerwat „Góry Pieprzowe” koło Sandomierza
1 — najcenniejsze płyty roślinności kserotermicznej

Reservation „Góry Pieprzowe” near Sandomierz
1 — most valuable fragments of xerothermic vegetation

Gentiana cruciata i *Pulsatilla pratensis* var. *nigricans*. Wartość tego terenu podnosi jeszcze *Linum flavum*, który tworzy pojedyncze kępki na osypujących się ścianach jarów i wąwozów. Ponadto żyją tu jeszcze chronione (wielokrotnie spotykane) gatunki zwierząt, jak zaskroniec (*Natrix natrix*), żabka rzekotka (*Hyla arborea*) i szereg motyli.

Teren ten przedstawia również dużą wartość dla przesiedlenia sukcesji roślinności. Niestety, ten niewątpliwie bardzo interesujący pod każdym względem obiekt jest coraz to bardziej dewastowany nie tylko wy-

Ryc. 22. Położenie projektowanego rezerwatu „Doły Parsety” we wsi Świrna koło Ostrowca

Situation of the projected reservation „Doły Parsety” at the village Świrna near Ostrowiec

pasem, lecz także wycinaniem i wypalaniem krzewów wiśni karłowatej. Położenie rezerwatu przedstawia mapka ryc. 19.

8. Rezerwat „Kamień Plebański” k. Sandomierza na stromej krawędzi doliny Wisły. Stroma krawędź doliny Wisły o wystawie południowej, położona we wsi Kamień Plebański koło Sandomierza, w obrębie pola właścicieli: Korony i Statucha, to bardzo interesujące stanowisko roślinności stepowej, zasługujące ze wszech miar na ochronę. Na zboczu niedostępnym dla zwierząt i człowieka zachował się jeden z najpiękniejszych płatów zespołu *Stipetum capillatae*.

Z interesujących gatunków poza ostnicą włosowatą rosną tu: *Agropyron intermedium*, bardzo licznie *Achillea setacea*, *Odontites lutea* (tylko

w zachodniej części zbocza), *Bothriochloa ischaemum*, *Hieracium echinoides*, *Campanula sibirica* i wiele innych gatunków.

Powierzchnia płatu stepu ostnicowego na zboczu wynosi około 2 ha, lecz projektowany rezerwat powinien objąć ochroną tylko najlepiej wykształcony płat o pow. 1,5 ha. Granice rezerwatu zaznaczono na mapce (ryc. 20).

9. Rezerwat „Góry Pieprzowe” koło Sandomierza. Roślinność rezerwatu jest zniszczona wypasem i intensywnie działającą tu erozją wodną. Tylko na niektórych odcinkach urwistej krawędzi doliny Wisły zachowały się nieduże płaty *Stipetum capillatae* i płaty podzespołu *Stipetum capillatae bothriochloetosum*. Podobnie jak w Kamieniu Plebańskim w fragmentach stepu ostnicowego występuje bardzo licznie *Achillea setacea*. *Cerasus fruticosa* podawana w różnych publikacjach tworzy tu niewielkie płaty zniszczone erozją wodną. Bardzo interesujący jest płat wiśni karłowatej, o którym już autor wspomniał w innym miejscu, a który zdobywa sobie nowe siedlisko na kwaśnych iłóupkach. Zupełnie luźne jednogatunkowe zarośla wiśni karłowatej rozwijające się na iłóupkach nie wykazywały osłabionej żywotności w stosunku do tych, które rosną nieco wyżej na podłożu lessowym. Chociaż wiśnia karłowata na iłóupkach obficie owocuje, to jednak teren zdobywa odroślami koleniowymi.

Na Górach Pieprzowych rosną według S z a f e r a (1959) liczne interesujące gatunki róż, między innymi endemiczny gatunek *Rosa Wagae*. Róże tworzące zarośla na iłóupkach nie były badane przez autora.

Góry Pieprzowe to obiekt bardzo interesujący pod względem morfologicznym, geologicznym (jako wychodnia najstarszych u nas utworów środkowokambryjskich) i wreszcie florystycznym: są tu fragmenty stepu ostnicowego, zarośla wiśni karłowatej na iłóupkach mające dużą wartość naukową i duże skupisko wielu gatunków róż. Toteż sprawa zatwierdzenia rezerwatu ciągnąca się od szeregu lat powinna być jak najszybciej pomyślnie załatwiona. Położenie rezerwatu przedstawia ryc. 21.

10. Rezerwat „Doły Parsety” we wsi Świrna. Projektowany rezerwat leży na północny zachód od środkowej części wsi Świrna w powiecie opatowskim, na terenie małego wąwozu lessowego nazwanego przez mieszkańców wsi „Dołami Parsety”. Zajmuje on powierzchnię około 1 ha. Na południowo-wschodnich skłonach w wylotowej części i na południowo-zachodnich w środkowej i końcowej części wąwozu na powierzchni około 0,5 ha rozwija się zespół *Prunetum fruticosae*. Płaty tego zespołu są typowo wykształcone i dobrze zachowane. W północnej części obiektu rośnie nieduży płat wiśni kwaśnej (*Cerasus acida*). Poza tymi dwoma gatunkami wiśni rosną tu: *Cimicifuga europaea*, *Aster amellus*, *Prunella*

Ryc. 23. Mapa rozmieszczenia rezerwatów roślinności kserotermicznej na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Ilżeckim: ● — rezerваты nowo projektowane, ◐ — dawniej projektowane (jeszcze nie zatwierdzone), ○ — zatwierdzone

Map showing distribution of the xerothermic flora reservations on Sandomierz Highland and Ilża Forehills: ● — reservations planned by the writer, ◐ — formerly planned reservations (not approved), ○ — approved reservations

1 — Sadkowiec, 2 — Linów, 3 — Paniańska Góra, 4 — Dwikozy, 5 — zbocza przełomowej doliny Opatówki, między Kicharami a Bykowcem (slopes of the break-through valley of Opatówka between Kichary and Bykowiec), 6 — Gałkowice Ocin, 7 — Granicznik, 8 — Kamień Plebański, 9 — Góry Pieprzowe (Mts), 10 — Doły Parsety, 11 — Gorzyczany, 12 — Częstków, 13 — Grzegorzewice

grandiflora, *Stachys recta*, *Campanula sibirica*, *Brachypodium pinnatum*, *Hieracium echinoides*, *Anemone sylvestris* i wiele innych.

Zatwierdzenie tego obiektu w formie rezerwatu ochroni przed zniszczeniem reliktowy gatunek wiśni karłowatej, a sam rezerwat (ryc. 22), położony w pobliżu Ostrowca, może odegrać dużą rolę dydaktyczną i wychowawczą.

Z zaprojektowanych rezerwatów dwa tylko znajdują się na obszarze Przedgórza Iłżeckiego, pozostałe na Wyżynie Sandomierskiej. Niektóre rezerваты leżą blisko siebie, ale każdy z nich przedstawia niepowtarzalny skrawek reliktovej roślinności wraz ze specyficznym siedliskiem. Niezatwierdzenie choć jednego z zaproponowanych rezerwatów byłoby niepowetowaną stratą dla nauki. Rolnictwu nie przyniosą te rezerваты żadnych strat, gdyż są to nieużytki; najczęściej wypasa się na nich bydło, które znajduje bardzo marne pożywienie.

Rozmieszczenie rezerwatów na badanym terenie ilustruje mapka ryc. 23.

VI. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

1. Na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim wyróżniono 6 dobrze wykształconych zespołów, a mianowicie: 4 murawowe (w czym nowe 2 zespoły i 1 podzespół) oraz 2 zespoły zaroślowe, ponadto 4 zbiorowiska murawowe i 3 zaroślowe.

2. *Stipetum capillatae* Dziub. (1925) występuje tylko na obszarze Wyżyny Sandomierskiej. Na Przedgórzu Iłżeckim nie rośnie. Ten reliktowy zespół rozwija się na suchych glebach wytworzonych z lessów, żwirowca mioceńskiego i wapienia dolomitycznego. Na badanym terenie asocjacja ta zróżnicowana jest na dwa podzespoły: typowy i *Stipetum capillatae bothriochloetosum*. Zróżnicowanie to jest związane z pogarszaniem się warunków fizycznych gleby na skutek udeptywania miejsc przez pasące się bydło i częste wypalanie traw z ostnicą włosowatą. Gatunkami różniącymi *Stipetum capillatae bothriochloetosum* od typowego są: *Bothriochloa ischaemum* i *Achillea setacea*. Występowanie tego zespołu ogranicza się przede wszystkim do krawędzi doliny Wisły i wąwozów mających ujście do niej na odcinku Gorzyczany—Zawichost i doliny Opatówki od Kichar do Dwikóz.

3. *Koelerio-Festucetum sulcatae* J. Kornaś (1952) nie posiada na badanym terenie dobrych gatunków charakteryzujących go w sensie lokalnym (por. tabela nr 42). Zajmuje on suche i silnie nasłonecznione miejsca zwłaszcza na terenach lessowych, objętych intensywną erozją wodną oraz na zboczach dolin rzecznych. Zespół ten zróżnicowany jest na dwa podzespoły: *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae* i typowy. Siedliska wybitnie suche opanowane zostały przez płaty pod-

zespołu typowego. Natomiast na nieznacznie wilgotniejszych miejscach lub o mniejszej wysokości względnej bądź łagodniejszym spadku terenu osiedliła się roślinność podzespołu *Koelerio-Festucetum sulcatae odontotetosum luteae*. W podzespole tym wyróżniono wariant z *Linosyris vulgaris* cechujący się występowaniem *Agropyron intermedium* i *Linosyris vulgaris* i nieco suchszym podłożem w stosunku do pozostałych płatów tego podzespołu.

4. *Scabioso-Teucrietum* ass. nova należy do rzędu *Brometalia erecti*, który charakteryzuje murawy kserotermiczne zachodniej części Europy Środkowej. Jest to asocjacja wtórna.. Wykształciła się ona na suchych, słonecznych siedliskach poleśnych, na rędzinie czarnoziemnej wytworzonej z margli kredowych. Jednostka ta wyraźnie wyodrębniła się lokalnie pod względem socjologicznym.

5. *Asteri-Linetum flavae* ass. nova — reliktowy zespół pontyjski. Jego występowanie związane jest z najcieplejszymi siedliskami. Rozwija się on na szkieletowej, słabo zestalonej glebie wapiennej typu rędziny będącej w początkowym stadium rozwoju. Jest to jeden z najrzadszych a zarazem najpiękniejszych zespołów murawowych na badanym terenie. Płaty tego zespołu położone są tylko w obrębie Przedgórza Iłżeckiego.

6. *Prunetum fruticosae* S. Dziub (1925) opanowało zbocza lessowe, wąwozy, jary, parowy, krawędzie dolin rzecznych, wkopy dróg, miedze, okrajki pól i obrzeża lasków. Na Wyżynie Sandomierskiej tworzy nawet lokalnie zwarty zasięg, natomiast na Przedgórzu Iłżeckim jest znacznie rzadsze. Rozwija się na bardzo różnorodnym podłożu: lessach, żwirowcu mioceńskim, marglach kredowych, a nawet w bardzo zubożałej formie na kwaśnych iłolupkach w Górach Pieprzowych. Płaty zarośli *Prunetum fruticosae* znajdują się na różnym etapie rozwoju. Toteż zdjęcia tego zespołu zestawiono w dwie oddzielne tabele fitosocjologiczne (patrz tabela nr 27 i 28): *Prunetum fruticosae* z udziałem gatunków murawowych i *Prunetum fruticosae* w optymalnej fazie rozwoju.

7. Zespół *Peucedano-Coryletum* A. Kozłowska (1925) em. A. Medwecka-Kornaś (1952) w zależności od stosunków edaficznych i działalności gospodarczej człowieka wykształcił się na badanym terenie w trzech wariantach: a) typowym, b) z *Cornus sanguinea* i c) zubożałym. Wariant typowy wykształca się na podłożu wapiennym, na słonecznych zboczach doliny Kamiennej i Wisły. Płaty tego wariantu mają charakter mozaikowy. W przypadku wycinania krzewów w płatach wariantu typowego zwiększa się rola derenia świdwy i pojawiają się gatunki takie jak: *Cypripedium calceolus*, *Hieracium murorum*, *Melica nutans*, *Rubus saxatilis* i *Senecio aurantiacus*. Na głębokich glebach lessowych powstają zwarte i wysokie zarośla wariantu zubożałego.

8. Zbiorowiska murawowe, których nie dało się zaszereżować do zespołów, rozwijają się na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim

w zależności od typu gleby, jej uwilgotnienia i akumulacji poziomu próchnicznego.

Zbiorowisko z *Festuca duriuscula*-*Potentilla arenaria* występuje na luźnych, suchych, przepuszczalnych glebach piaszkowych, bardzo rzadko na spiaszczonych lessach lub bardzo płytkiej rędzinie trzeciorzędowej w otoczeniu innych muraw kserotermicznych.

Zbiorowisko z *Brachypodium pinnatum* przywiązane jest do gleb wytworzonych z lessu i margli kredowych, cechujących się dużą zawartością materii organicznej i stosunkowo dużą akumulacją poziomu próchnicznego w profilu glebowym, a także glebą wilgotniejszą niż gleby innych muraw kserotermicznych.

Zbiorowisko *Carex humilis*-*Thesium linophyllum* wykształcone jest fragmentarycznie na zestalonym szkieletowym podłożu margli kredowych w jednym tylko miejscu (Nowe), osłoniętym przed działaniem wiatrów.

9. Poza wymienionymi zespołami zarośli kserotermicznych znaczną rolę odgrywają na badanym terenie również zbiorowiska zaroślowe: a) z *Prunus spinosa*, b) *Berberis vulgaris*-*Rosa rubiginosa* i c) *Juniperus communis*.

10. O przebiegu sukcesji roślinności kserotermicznej na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim decyduje wiele czynników: podłoże, zawartość próchnicy i CaCO_3 w glebie, ekspozycja, nachylenie, mikroklimat, wysokość względna i działalność gospodarcza człowieka. Końcowym etapem tych różnych wyjściowych ogniw sukcesyjnych (na badanym terenie) są zarośla z *Prunus spinosa*, zarośla zespołu *Peucedano-Coryletum* bądź też zbiorowisko z *Juniperus communis* powstałe na skutek wypasania. Schemat przebiegu sukcesji przedstawia ryc. 13.

11. W budowie zbiorowisk kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego poważną rolę odgrywają gatunki elementu eurazjatyckiego i pontyjsko-pannońskiego, bowiem charakteryzują one takie zespoły, jak *Stipetum capillatae*, *Koelerio-Festucetum sulcatae*, *Asteri-Linetum flavae* i *Prunetum fruticosae* bądź też związki i rzędy.

12. Przedstawiono projekt utworzenia na badanym terenie 8 rezerwatów (ryc. 23) mających na celu ochronę bardzo cennych fragmentów reliktowych zespołów muraw i zarośli kserotermicznych oraz dla ochrony pewnych bardzo rzadkich gatunków. Opisano również aktualny stan roślinności w dwóch dalszych rezerwach, zaprojektowanych dawniej.

separate phytosociological tables (nos. 27 and 28): *Prunetum fruticosae* comprising sward species and *Prunetum fruticosae* in the stage of its optimal development.

6. *Peucedano-Coryletum* Kozł. 1925 em. Medwecka-Kornaś 1952, in dependence on the edaphic relations and the economic activity of man, has developed on the territory studied in three variants: a) typical, b) with *Cornus sanguinea* and c) with a reduced composition. The typical variant develops on a calcareous substratum on sunny slopes of the Kamienna and Vistula valleys. Patches of this variant are of mosaic character. If the shrubs are cut out in the patches of the typical variant, the contribution of *Cornus sanguinea* increases and species such as *Cypripedium calceolus*, *Hieracium murorum*, *Melica nutans*, *Rubus saxatilis* and *Senecio aurantiacus* appear. On deep loess soils, compact high brushwood of the poorer variant is formed.

7. Sward communities which cannot be classified to any association develop on the Sandomierz Upland and the Iłża Forehills in dependence on the type of soil, its moisture and the accumulation of the humus level:

a) the community with *Festuca duriuscula*-*Potentilla arenaria* occurs on loose permeable sandy soils, very rarely on sandy loesses of very shallow Tertiary rendzina among other xerothermic swards;

b) the community with *Brachypodium pinnatum* is associated with soils formed from loess and Cretaceous marls, which are characterized by a high organic matter content, a relatively high accumulation of the humus level in the soil profile and a more moist soil as compared with the other xerothermic swards;

c) the community with *Carex humilis*-*Thesium linophyllum* is fragmentarily developed on a solidified skeletal substratum of Cretaceous marls only in one place (Nowe) protected from the action of winds.

8. Apart from the above mentioned associations of xerothermic brushwood, also the following brushwood communities play an important role here: a) with *Prunus spinosa*, b) with *Berberis vulgaris* and *Rosa rubiginosa* and c) with *Juniperus communis*.

Succession in the xerothermic plant communities

The course of succession of the xerothermic vegetation on the Sandomierz Upland and Iłża Forehills is dependent on various factors: the substratum, the humus and CaCO_3 content in the soil, exposure, slope, microclimate, relative altitude and the economic activity of man. The final stage of these different initial forms liable to succession is the brushwood of *Prunus spinosa*, of the association *Peucedano-Coryletum* or else the community including *Juniperus communis*, formed owing to cattle grazing. The succession is presented schematically in fig. 20.

Plant protection postulates

A plan is suggested for setting up eight reservations on the area discussed with the aim of protecting the most valuable fragments of relict sward and xerothermic brushwood associations as well as of certain very rare species. A description is given of the present state of the vegetation in two previously planned reservations. The distribution of the envisaged reservations is shown in fig. 30.

Department of Plant Systematics and Geography,
A. Mickiewicz University, Poznań

- Browicz K., 1962, *Rosa gallica* L. na Lubelszczyźnie, Roczn. Sekcji Dendrol. PTB. Vol. XVI, Warszawa.
- Browicz K. i Gostyńska M., 1963, Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce (pod redakcją S. Białoboka i Z. Czubińskiego), z. 2, Poznań.
- Browicz K. i Gostyńska M., 1964, Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce (pod redakcją S. Białoboka i Z. Czubińskiego), z. 3.
- Brzyski B., 1961, *Orchis pallens* i inne interesujące gatunki w dolinie Dunajca koło Wojnicza (pow. Brzesko), Fragm. Flor. et Geobot. Ann. VII. Pars 2.
- Celiński F., 1953a, Czynniki glebowe a roślinność kserotermiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace monograf. nad przyr. Wlkp. Parku Narod. p. Poznaniem, Tom II, z. 8, Poznań.
- Celiński F., 1953b, Pontyjskie zbocza koło Grędzka nad jeziorem Miedwie, Chrońmy przyrodę Ojczyzną, R. IX, z. 3, Kraków.
- Celiński F., 1954, Flora pontyjska w Mielniku nad Bugiem, Ibidem Roczn. X, 6.
- Celiński F., 1964, Rośliny naczyniowe Puszczy Bukowej pod Szczecinem, Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat.-Przyr. Prace Komisji Biol. Tom XXIX, z. 2, Poznań.
- Celiński F. i Filipek M., 1958, Flora i zespoły roślinne leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą, Pozn. Tow. Przyj. Nauk Wydz. Mat.-Przyr. Komitet Fizjograf. Bad. Fizjogr. nad Polską Zachodnią, Tom. IV, Poznań.
- Czubiński Z., 1950, Zagadnienia geobotaniczne Pomorza, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Bad. Fizjogr. nad Polską Zachodnią, Tom II, z. 4, Poznań.
- Czubiński Z., 1956, Rola elementów kserotermicznych w szacie roślinnej Wielkopolski, „Stosunki klimatyczno-glebowe Wielkopolski”, PAN, Kom. Nauk, z. 7, Warszawa.
- Dobrzański B., 1949, Gospodarka wodna w glebie lessowej, Ann. Univ. MCS, Sectio B. Vol. III (1948), z. 11, Lublin.
- Drymmer K., 1890, Rośliny naczyniowe najbliższych okolic Kielc, Pam. Fizjogr. Tom X, Warszawa.
- Dylik J., 1954, Zagadnienie genezy lessu w Polsce, Biuletyn Peryglacjalny Nr 1, Łódzkie Tow. Nauk. Wydział III, Łódź.
- Dziubałtowski S., 1916, Stosunki geobotaniczne nad dolną Nidą, Pam. Fizjogr., 23, Warszawa.
- Dziubałtowski S., 1918, Rozwój roślinności na porębach lessowych w Sandomierskim w oświetleniu florystyczno-statystycznym, Spraw. Tow. Nauk. Warsz., Wydz. IV, 11, 2, Warszawa.
- Dziubałtowski S., 1922, O zbiorowiskach roślinnych godnych ochrony w Sandomierskim i Opatowskim, Kosmos 47, Lwów.
- Dziubałtowski S., 1923, La distribution et l'écologie des associations steppiques sur le plateau de la Petite Pologne, Acta Soc. Bot. Pol., Vol. I, Nr 3.
- Dziubałtowski S., 1925, Les associations steppiques sur le plateau de Petite Pologne et leur successions, Acta Soc. Bot. Pol. Vol. III, Nr 2.
- Dziubałtowski S., 1934, Kilka uwag o występowaniu i pochodzeniu roślinności stepowej nad dolną Wisłą, Roczn. Nauk Rol. Tom XXXIII.
- Fabijanowski J., Knapp Cz., 1953, O ochronę najliczniejszego w Polsce stanowiska wiśni karłowatej, Chrońmy Przyrodę Ojczyzną z. 5.
- Faliński J. B., Hryniewicz-Sudnik J. i Fabiszewski J., 1963, Śródpolne zarośla z rzędu *Prunetalia* (czyżnie) Równiny Kutnowskiej jako wskaźnik dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej, Acta Soc. Bot. Pol. Vol. XXXII Nr 4.

- Fijałkowski D., 1954, Szata roślinna okolic Lublina na tle niektórych warunków siedliskowych, Ann. UMCS Sectio B, Vol. IX z. 4, Lublin.
- Fijałkowski D., 1957, Zbiorowiska kserotermiczne projektowanego rezerwatu stepowego koło Czumowa nad Bugiem, Ibidem, Vol. X, z. 13.
- Fijałkowski D., 1960, Roślinność leśno-stepowa w Łabuniach koło Zamościa, Ibidem, Vol. XIII, z. 6.
- Fijałkowski D., 1961, Miłek wiosenny (*Adonis vernalis* L.) w województwie lubelskim, Ibidem, Sectio C, Vol. XVI, z. 3.
- Fijałkowski D., 1964, Zbiorowiska kserotermiczne okolic Izbicy na Wyżynie Lubelskiej, Ibidem, Vol. XIX, z. 4.
- Fijałkowski D. i Izdebski K., 1956, Fragment roślinności kserotermicznej w Kątach pod Zamościem, Ibidem, Sectio C, Vol. XI, z. 13.
- Fijałkowski D. i Izdebski K., 1957, Zbiorowiska stepowe na Wyżynie Lubelskiej, Ibidem, Sectio B, Vol. XII, z. 4.
- Flora polska, 1959, Tom VIII (red. W. Szafer i B. Pawłowski), PAN, Kraków.
- Flora polska, 1960, Tom IX (red. W. Szafer i B. Pawłowski) PAN Kraków.
- Frankiewicz W., 1955, Młode formy denudacyjne na obszarze lessowym w okolicy Ostrowca, Przegląd Geograficzny, Tom XXVII z. 2, Warszawa.
- Głazek T., 1960, Stanowiska wiśni karłowatej w dorzeczu Opatówki, Biol. w szkole 5(7).
- Głazek T., 1964, Rozmieszczenie stanowisk wiśni karłowatej (*Cerasus fruticosa* Pall. Woronow i ostnicy włosowatej (*Stipa capillata* L.) w dorzeczu Opatówki na Wyżynie Sandomierskiej, Zeszyty Naukowe UAM, Biologia, z. 5.
- Gostyńska M., 1963, Nowe stanowiska wiśni stepowej (*Cerasus fruticosa* Woronow) w Polsce, Roczn. Sekcji Dendrol. PTB XVII.
- Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, z. 1.
- Hegi G., 1906, Illustrierte Flora von Mittel-Europa, München.
- Hempel M., 1885, Spis roślin jawnokwiatowych dziko rosnących w Słupi Nadbrzeżnej, Pam. Fizj. V.
- Herzog Th., 1926, Geographie der Moose, Jena.
- Izdebski K., 1958a, Zbiorowiska z roślinnością kserotermiczną w Rudniku k. Lublina i Dobużku k. Łaszczowa, Acta Soc. Bot. Pol. vol. XXVII Nr 4.
- Izdebski K., 1958b, Badania fitosocjologiczne i florystyczne w rezerwacie Stawska Góra pod Chełmem, Ann. UMCS Sectio C, Vol. VII, z. 13.
- Jahn A., 1956, Wyżyna Lubelska, rzeźba i czwartorzęd, Inst. Geograf. Prace Geogr. 7, Warszawa.
- Jarosz S., 1951, Parki Narodowe i rezerwaty przyrody. Kraj, Warszawa.
- Jarosz S., 1954, Krajobrazy Polski i ich pierwotne fragmenty, Bud. i Arch., Warszawa.
- Karczmarsz K., 1961, The bryological characteristics of the Polish loess area, Ann. UMCS Sectio B, Vol. XV, z. 12, Lublin.
- Kaznowski 1922, Przyczynek do flory okolic Zawiercia i wyżyny kielecko-sandomierskiej, Kosmos R. 47, Lwów, K. Kaznowski (msk). Materiały do znajomości flory Gór Świętokrzyskich.
- Klika J., 1938, Xerotherme Pflanzengesellschaften der Kováčover Hügel in der Südslovakei, Beih. Bot. Centralbl. Bd. 58. Abt. B.
- Klika J., 1955, Nauka o rostlinnych společenstvech (Fytocenologie), Nakl. Českoslov. Akad., Praha.

- Klimaszewski M., 1946, Podział morfologiczny południowej Polski, Czasopismo Geogr. Tom XVII, z. 3—4, Wrocław.
- Kobendza R., 1947, Projekt rezerwatu na ścianach łupkowych w Częstokowie koło Góry Chelmowej w Górach Świętokrzyskich, Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. III Nr 5/6.
- Koczwarą M., 1930, Zespoły stepowe Podola Pokuckiego, Przedruk z prac geograficznych, zeszyt XII.
- Koppe F., 1944, Das mediterrane Element in der Mossflora Westfalens, Traux Bryologiques. Fasc. II.
- Koppe F., 1955, Die bryogeographischen Verhältnisse des Niedersächsischen Tieflandes, Mitt. d. Arbeitsgem. für Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg, H. 5, Kiel.
- Kornaś J., 1952b, *Grimaldia fragrans* (Bald.) Corda, *Fimbriaria saccata* (Wahlb.) Nees i *Riccia Bischoffii* Hüb. w Jurze Krakowskiej, Materiały do Fizjografii Kraju PAU Nr 30.
- Kornaś J., 1960, Geografia roślin (rozdział w podręczniku: Strassburger E. Botanika). Podręcznik dla szkół wyższych, wyd. 26. PWRiL, Warszawa.
- Kostrowicki A. S., 1954, Materiały do biogenezy fauny wzgórz kserotermicznych w dolinie Nidy, Przegl. Geograf. Tom XXVI z. 1, PAN, Instytut Geografii, Warszawa.
- Kozłowska A., 1923, Stosunki geobotaniczne ziemi Miechowskiej, Spraw. Kom. Fizjograf. PAU, 57, Kraków.
- Kozłowska A., 1925, Zmienność kostrzewy owczej (*Festuca ovina* L.) w związku z sukcesją zespołów stepowych na Wyżynie Małopolskiej, Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 59, Kraków.
- Kozłowska A., 1926, Rezerwat stepowy w Jaksicach w Ziemi Miechowskiej, Ochr. Przyr. 6, Kraków.
- Kozłowska A., 1928, Naskalne zbiorowiska roślin na Wyżynie Małopolskiej, Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 67, ser. A/B, Kraków.
- Kozłowska A., 1931, The genetic elements and the origin of the steppe flora in Poland, Mem. Ac. Pol. Sc. et de L. Cl. Math. Nat., ser. B, Sc Nat., Kraków.
- Kozłowska A., 1959, Rola roślin uprawnych w historycznym ujęciu rozwoju kultury materialnej Polski, Szata roślinna Polski, Tom I, PWN, Warszawa.
- Kozłowska-Szczęśna T., 1957, Badania klimatu lokalnego nad środkową Wisłą (w 1954 r.), Dokumentacja Geograficzna z. 1. PAN, Instytut Geografii, Warszawa.
- Krausch H. D., 1961, Die kontinentalen Steppenrassen (*Festucetalia vallesiacae*) in Brandenburg, Feddes Repertorium Spec. No. Regn. Veg. Beih. 139.
- Książkiewicz M., Samsonowicz J., 1953, Zarys geologii Polski, Warszawa.
- Kuc M., 1959, Mchy Wyżyny Sandomiersko-Opatowskiej (Okręg Sandomierski), Fragm. Flor. et Geobot. Ann. V. Pars 1.
- Kulczyński S., Motyka J., 1936, Zespoły leśne i stepowe okolicy Łysej Góry koło Złoczowa, Kosmos A, 61, Lwów.
- Lencewicz S., 1955, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
- Lencewicz S., 1957, Wyżyna Kielecko-Sandomierska, Pisma wybrane z geografii fizycznej Polski, Warszawa.
- Lencewicz S., 1957, Czwartorzęd Wyżyny Małopolskiej. Ibidem.
- Lencewicz S. i Kondracki J., 1959, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.

- Libbert W., 1932—1933, Die Vegetationseinheiten der Neumärkischen Stau-
becken Landschaft, Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg, Jg. 79, Berlin —
Dahlem.
- Libbert W., 1941, Steppenvegetation in der Mark Brandenburg, Branden-
burgische Jahrbücher Nr 16.
- Łapczyński K., 1887, Roślinność Sandomierza i Gór Pieprzowych, Pam. Fizjogr.
7, Warszawa.
- Malicki A., 1950, Geneza i rozmieszczenie lessów w środkowej i wschodniej
Polsce, Ann. UMCS, Sectio B. Vol. IV.
- Matuszkiewicz W., 1962, Dyskusja nad systemem zbiorowisk roślinnych Eu-
ropy Zachodniej i Środkowej, Wiadomości Botaniczne, VI, 3.
- Mazur Z., 1963, Erozja wodna gleb w zlewni rzeki Opatówki, Wiadomości Insty-
tutu Melioracji i Użytków Zielonych, Tom III z. 2, PWRiL, Warszawa.
- Medwecka-Kornaś A., 1952, Zespoły leśne Jury Krakowskiej, Ochrona
Przyrody R. 20, Kraków.
- Medwecka-Kornaś A., 1959, Roślinność rezerwatu stepowego „Skorocice”
koło Buska, Ochrona Przyrody R. 26, Kraków.
- Medwecka-Kornaś A., 1960, Poland's steppe vegetation and its conservation,
State Council for Conserv. of Nature in Poland, Nr 6, Kraków.
- Meusel H., 1943, Vergleichende Arealkunde, Berlin — Zehlendorf.
- Miklaszewski S., 1913, Lössy w Sandomierskim, Spraw. Tow. Nauk. War-
szawskiego. R. VI.
- Miskiewicz M., 1959, Wyniki prac wykopaliskowych w Mierzanowicach pow.
Opatów prowadzonych w r. 1958, Wiadomości Archeologiczne. Vol. XXVI
z. 1—2.
- Musierowicz A., 1958, Gleboznawstwo szczegółowe, PWRiL, Warszawa.
- Musierowicz A., Konecka-Betley K., Kuźnicki F., 1963, Zagad-
nienie typologii gleb wytworzonych z lessów, Roczn. Nauk Roln., Tom 104 Ser. D.
- Oberdorfer E., 1949, Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwest-
deutschland, Verlag E. Ulmer, Stuttgart.
- Pawłowska S., 1959, Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej,
Szata roślinna Polski t. I, PWN, Warszawa.
- Pawłowski B., Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., 1959, Przegląd
ważniejszych zespołów roślinnych Polski, Ibidem.
- Pawłowski B., Pawłowska S., Zarzycki K., 1960, Zespoły roślinne
kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza, Fragm. Flor. et Geobot. 6(2).
- Pierzchałko L., 1954, Gleby kopalne w lessie okolic Bodzechowa, Łódzkie
Tow. Nauk., Wydział III. Biuletyn Peryglacjalny Nr 1.
- Radłowska C., 1960, W sprawie lessu na międzyrzeczu Kamiennej i Krępianki,
Przegl. Geograf. XXXII, z. 3, PWN, Warszawa.
- Rejmont-Grochowska I., 1950, Wątrobowce, PZWS, Warszawa.
- Rothmaler W., 1958, Exkursionsflora von Deutschland, Gefäßpflanzen. Band I,
Berlin.
- Rothmaler W., 1963, Exkursionsflora von Deutschland, Gefäßpflanzen. Band II,
Berlin.
- Sałata B., 1964, Rzadsze rośliny okolic Annapola nad Wisłą. (woj. lubelskie),
Fragm. Flor. et Geobot. Ann. X. Pars. 4.
- Samsonowicz J., 1924—1925, O loessie wschodniej części Gór Świętokrzyskich,
Wiad. Archeol. Vol. IX. Warszawa.
- Samsonowicz J., 1931, Sprawozdanie z badań geologicznych na arkuszu San-

- domierza oraz charakterystyka tektoniczna niecki międzygórskiej, Spraw. z pos. FIG, nr 30.
- Samsonowicz J., 1934, Ogólna mapa geologiczna Polski w skali 1:100 000, arkusz Opatów.
- Schmuck A., 1959, Zarys klimatologii Polski, PWN, Warszawa.
- Sławiński W., 1952, Zespoły kserotermiczne okolic Kazimierza nad Wisłą, Ann. UMCS Sectio E. Vol. VI z 12, Lublin.
- Staniewska W., 1961, Kserotermiczne zbiorowiska murawowe okolic Poznania, Zeszyty Naukowe UAM. Biologia, z. III.
- Strzemiński M., 1954, Gleby województwa kieleckiego, Przegląd Geograficzny Tom XXVI, z. 1, PAN, Instytut Geografii, Warszawa.
- Strzemiński M., 1957, Zagadnienie podziału Wyżyny Małopolskiej w granicach woj. kieleckiego, Ibidem. Tom XXIX, z. 1.
- Szafer W., 1959, Szata roślinna Polski Niżowej, Szata roślinna Polski, Tom II, PWN, Warszawa.
- Szafer W., Kulczyński St., Pawłowski B., 1953, Rośliny Polskie, PWN, Warszawa.
- Szafran B., 1957, Mchy (Musci) Tom I, PAN. Instytut Botaniki, Warszawa.
- Szafran B., 1961, Mchy (Musci) Tom II, Ibidem.
- Sulma T., Walas J., 1963, Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły, Ochrona Przyrody XXIX, Kraków.
- Smarda J., 1963, Rozsireni xerothermnich rostlin na Morave a ve Slezsku. Brno CSAV.
- Tobolewski Z., 1953, Porosty, PWN.
- Tüxen R., 1952, Hecken und Gebüsch, Mitteil. der geographisch. Gesellschaft im Hamburg 50.
- Tüxen R., Ellenberg H., 1937, Der systematische und der ökologische Gruppenwert, Mitt. d. Floristisch-soziol. Arbeitsgem. 3.
- Walter H., 1954, Grundlagen der Pflanzenverbreitung. (Einführung in die Phytologie 3), Teil II. Arealkunde, Stuttgart.
- Walter H., Lieth H., 1958, Klimadiagrammen, Weltatlas, Jena.
- Wiszniewski W., 1953, Atlas opadów atmosferycznych w Polsce, PIHM, Warszawa.
- Wiszniewski W., Gumiński R., Bartnicki L., 1949, Przyczynki do klimatologii Polski. Temperatura, cz. II, Wiad. Służby Hydr. i Meteor. Vol. I z. 3.

The Sandomierz Upland and the Iłża Forehills are characterized by a relatively large number of habitats with relict steppe and xerothermic plant communities. Nevertheless, only floristic studies have been carried out on this territory.

The above mentioned areas constitute two subregions of the Kielce—Sandomierz Upland region.

The Sandomierz (Opatów) Upland has been distinguished by Szafer (1959) as a separate floristic region under the name of the Sandomierz—Opatów district which extends eastwards from the Holy Cross Mountains to the Vistula valley.

The relief of the Sandomierz Upland is diversified. It is built of strongly folded Palaeozoic rocks and Miocene formations. The older rocks have been overlaid by Pleistocene deposits, chiefly loess.

The network of rivers on the Sandomierz Upland is sparse, neither are there any major water bodies here.

The Iłża Forehills are covered with formations of the central Polish glaciation. The glacier has left traces here in the form of gravel mounds, eskers and sands. From under the diluvial sediments, Cretaceous and Jurassic rocks crop out (Samsonowicz 1931). A patch of loess lies only between Solec Sandomierski, Iłża and the mouth of the river Kamienna.

These two subregions are a most favourable area for the settlement of sward communities and xerothermic brushwood owing to the numerous ravines, gorges and depressed roads (by intensive water erosion), deep river canyons with steep banks and southern slopes, and finally owing to the warm loess and calcareous substratum and the specific microclimate of these sites.

Methods

The investigations on the xerothermic vegetation of the Sandomierz Upland and Iłża Forehills were carried out in the period 1959—1963. On an area of about 1150 sq. km 350 phytosociological records were made, 189 of which were used for the compilation of tables. For the phytosociological records the generally accepted method of Braun-Blanquet was applied. The tables give a short topographical-ecological characteristic of each record and the floristic composition of the association.

For comparison of the contribution of the groups of characteristic species, the systematical value of these groups was calculated in the communities described for the individual phytosociological units by the method of Tüxen and Ellenberg. Soil investigations were also performed consisting in determination on the area studied of the pH values by means of Hellig's reagent, and in the description of the soil profiles. A total of 27 soil profiles were taken, from which samples were collected for laboratory analyses. The mechanical composition of the soil was determined by the areometric method of Cassagrande in Prószyński's modification, the CaCO_3 content — by Scheibler's method, active pH and exchangeable pH — potentiometrically with the use of a glass and of a calomel electrode. The organic matter content was determined manganometrically by the method of Ishcherek-Rollov in the Dublany modification.

The xerothermic communities described in the present work belong to two classes: *Festuco-Brometea* and *Quercio-Fagetea*.

In the systematics of the communities and higher units within the class *Festuco-Brometea*, the classical conceptions of Braun-Blanquet 1936, Braun-

-Blanquet and Tüxen 1943 and Klika 1931 published in the book „The vegetation of Poland”, Warsaw, 1966, were adopted. In the brushwood communities of the *Quercus-Fagetum* class, the conception of Tüxen 1952 relative to the order *Prunetalia* was adopted.

Characteristic of the plant communities

In the area investigated six well developed associations were distinguished: 4 sward associations (2 of them and 1 subassociation new) and 2 brushwood associations; moreover, four sward communities and three brushwood communities were described.

1. *Stipetum capillatae* Dziub. 1925 occurs solely within the area of the Sandomierz Upland, whereas it is absent in the Iłża Forehills. This relict association develops on dry loess soils, Miocene gravelstone and dolomitic limestone. On the area studied the association is differentiated into two subassociations: the typical one and *Stipetum capillatae bothriochloetosum*. These differences are connected with the deterioration of the physical soil conditions owing to trampling of some patches by grazing cattle and frequent burning the grasses with *Stipa capillata*. The following species distinguish *Stipetum capillatae bothriochloetosum* from the type association: *Bothriochloa ischaemum* and *Achillea setacea*. The occurrence of this association is mostly limited to the ledge of the Vistula valley and ravines entering it between Gorzyczany and Zawichost, and to the Opatówka valley between Kichary and Dwikozy.

2. *Koelerio-Festucetum sulcatae* Kornaś 1952 does not in the area studied include species characterizing it in the local sense (compare table No. 42). It occupies dry and strongly insolated places, particularly on loess soils subject to intensive water erosion and on slopes of river valleys. Within this association two subassociations may be distinguished: *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae* and the type subassociation. The latter occurs in very dry habitats, whereas on somewhat moister or relatively lower situated places or on milder slopes the subassociation *Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae* is found. In this subassociation a variant has been distinguished with *Linosyris vulgaris* characterized by the occurrence of *Agropyron intermedium* and *Linosyris vulgaris* and by a somewhat drier substratum.

3. *Scabioso-Teucrietum* ass. nova belongs to the order *Brometalia erecti* which is characteristic of xerothermic swards in the western parts of central Europe. It is a secondary association. It has developed on dry insolated postsilvatic habitats on chernozem rendzina formed from Cretaceous marls. This unit is locally sociologically distinct.

4. *Asteri-Linetum flavae* ass. nova, a Pontic relict association. It occurs in the warmest habitats and developed on skeletal poorly consolidated calcareous soil of the rendzina type which is in its initial stage of development. It is one of the rarest, and at the same time most lovely sward associations on this territory. It occurs solely within the Iłża Forehills.

5. *Prunetum fruticosae* S. Dziub. 1925 covers loess slopes, ravines, gorges, canyons, river valley edges, road depressions, lanes, edges of fields and woods. On the Sandomierz Upland it is common, whereas in the Iłża Forehills it occurs more rarely. It develops on various substrata: loess, Miocene gravelstone, Cretaceous marls, and even, in a poorer form, on acidic shales in the Pieprzowe Mountains. Patches of *Prunetum fruticosae* brushwood may be found at various stages of development. Therefore the records of this association were compiled in two

SPIS TREŚCI

Wstęp	3
I. Ogólna charakterystyka badanego terenu	4
1. Obszar i granice	4
2. Położenie, geologia, hydrologia i rzeźba	5
3. Stosunki klimatyczne	10
4. Stosunki glebowe	16
5. Wpływ człowieka na przekształcenie szaty roślinnej	20
II. Metodyka pracy	22
1. Uwagi ogólne	22
2. Uwagi dotyczące przyjętej systematyki zespołów	23
III. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych	24
1. <i>Stipetum capillatae</i> S. Dziub. 1925	24
2. <i>Koelerio-Festucetum sulcatae</i> J. Kornaś 1952	34
A. <i>Koelerio-Festucetum sulcatae odontitetosum luteae</i> subass. nova	36
B. <i>Koelerio-Festucetum sulcatae</i> podzespół typowy	39
C. <i>Koelerio-Festucetum sulcatae</i> a zbiorowiska pokrewne	41
3. Zbiorowisko z <i>Festuca duriuscula</i> - <i>Potentilla arenaria</i>	43
4. Zbiorowisko inicjalne z <i>Poa compressa</i>	47
5. Zbiorowisko z <i>Brachypodium pinnatum</i>	48
6. <i>Scabioso-Teucrietum</i> ass. nova	57
7. Zespół <i>Asteri-Linetum flavae</i> ass. nova	62
8. Zbiorowisko z <i>Carex humilis</i> - <i>Thesium linophyllum</i>	68
9. <i>Prunetum fruticosae</i> S. Dziub. 1925	69
10. Zbiorowisko z <i>Prunus spinosa</i>	83
11. Zbiorowisko luźnych zarośli z <i>Berberis vulgaris</i> - <i>Rosa rubiginosa</i>	88
12. Zespół <i>Coryleto-Peucedanetum cervariae</i> Kozł. 1925 em. Me- dwecka - Kornaś 1952 [= <i>Peucedano-Cor etum</i>]	90
13. Zbiorowisko z <i>Juniperus communis</i>	100
IV. Sukcesja roślinności zespołów kserotermicznych	103
V. Postulaty ochrony przyrody	110
1. Uwagi ogólne	110
2. Rezerваты przyrody	112
VI. Zestawienie wyników badań	124
Summary	127
Literatura	130

Tabela 6 — Table 6
Stipetum capillatae S. Dziub. 1925

Numer kolejny zdjęcia (Successive number of relevé)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Numer zdjęcia (No. of relevé)	100	101	102	108	109	110	111	103	104	120	89	98	114	115	76	77	78	81	71		
Miejscowość (Locality)	Góry Wysokie			Panieńska Góra k/Dwikóz			Podgórze	Kichary	Żurawniki	Kamień Pleb. k/San- domierza	Winiarki	Góry Wysokie	Góry Pieprzowe	Kichary	Winiary	Kamień Pleb. k/Sandom.					
Data (Date)	17.VIII.1962			18.VIII.1962			19.VIII 1962	17.VIII.1962	26.VIII 1962	2.VIII 1962	13.VIII 1962	23.VIII.1962	6.VII.1962			7.VII 1962	2 VII 1962				
Wystawa (Exposure)	SW	SW	SSW	S	SE	SE	S	S	S	SSE	S	SSE	S	SSE	S	S	S	S	S		
Nachylenie w° (Inclination in°)	50	40	40	50	50	50	50	40	40	40	45	50	40	20	40	30	45	50	60		
Pokrycie warstwy ziół „c” (Cover of herbaceous layer „c”)	80	75	80	90	85	80	75	85	90	75	90	80	90	85	90	90	90	95	95		
Pokrycie warstwy mchów „d” (Cover of moss layer „d”)	5	5	5	ślad	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	ślad	ślad	—	ślad	ślad		
Powierzchnia zdjęcia w m² (Surface of the relevé in m²)	30	50	50	50	30	25	30	35	45	50	50	50	50	30	50	75	100	50	50		
Ilość gatunków w zdjęciu (No. of species in relevé)	26	28	29	25	19	16	15	16	16	30	21	21	34	24	26	27	18	26	27		
Podzespół (Subassociation)	typicum							bothriochloetosum													
Gatunki charakterystyczne zespołu (Species characteristic of the association):																					
Stipa capillata	2.2	2.2	1.2	3.3	3.3	3.3	3.3	V	3.3	1.1	3.3	1.1	3.3	1.1	1.1	3.3	3.3	4.4	4.4	4.4	V
Alyssum montanum	+	+	+	+	.	+	+	V	.	.	1.1	+	.	.	+	+	.	.	.	+	III
Stipa Joannis	.	.	.	2.2	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gatunki wyróżniające podzespół (Differential species):																					
Stipetum capillatae bothriochloetosum																					
Bothriochloa ischaemum																					
Achillea setacea																					
Gatunki charakterystyczne związku (Species characteristic of the alliance)																					
Festucion vallesiaceae																					
i rzędu (and the order) Festucetalia vallesiaceae:																					
Potentilla arenaria	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	.	V	1.1	1.1	2.2	1.1	1.1	1.1	+	.	1.1	1.1	1.1	+	V
Thymus Marshallianus	1.1	.	.	+	+	.	+	III	1.1	.	+	1.1	.	1.1	+	1.1	.	+	+	.	IV
Falcaria vulgaris	.	.	+	+	+	+	.	III	.	.	+	.	1.1	+	.	.	+	+	+	.	III
Festuca duriuscula var. trachyphylla	1.1	1.1	.	1.1	.	.	.	III	.	.	.	1.1	.	2.2	+	.	1.1	.	1.1	+	III
Achillea millefolium ssp. pannonica	.	+	+	+	+	+	+	V	.	+	1.1	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	II
Anthemis trincoria	1.1	+	+	.	1.1	.	.	III	+	.	.	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	I
Campanula sibirica	.	.	+	.	.	.	.	I	+	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	III
Bromus inermis	.	.	+	.	+	+	.	III	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):	Agropyron intermedium (71, 81), Carex praecox (76), C. supina (76), Hieracium echinoides (77, 114), Pulsatilla pratensis var nigricans (114), Scabiosa ochroleuca (102, 114, 115), Scorzonera purpurea (103, 108).																				
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class) Festuco-Brometea:																					
Medicago falcata	2.2	2.2	2.2	+	+	+	.	V	1.1	2.2	+	1.1	2.2	1.1	1.1	2.2	2.2	.	.	.	V
Koeleria gracilis	1.1	+	1.1	2.2	2.2	2.2	.	V	2.2	2.3	.	2.2	.	.	.	1.1	1.1	+	1.1	1.1	IV
Galium verum	+	.	+	.	+	+	+	IV	.	+	+	+	+	1.1	+	+	.	1.1	+	+	V
Euphorbia cyparissias	+	1.1	1.1	+	+	.	+	V	+	.	+	.	.	1.1	+	+	.	.	+	+	III
Poa pratensis var. angustifolia	+	+	+	+	.	+	+	V	1.1	1.1	+	.	+	+	.	+	+	+	+	.	IV
Centaurea rhenana	.	+	1.1	+	1.1	.	2.2	III	.	.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	.	V
Salvia pratensis	.	+	+	+	+	.	.	III	+	+	1.1	.	.	1.1	1.1	1.1	+	.	.	+	III
Calamintha acinos	+	+	.	+	.	.	.	III	+	.	.	+	.	1.1	+	+	+	.	+	.	III
Festuca sulcata	.	.	2.2	.	1.1	1.1	.	III	1.1	.	1.1	.	.	+	+	1.1	.	.	.	.	III
Dianthus carthusianorum	+	+	.	.	+	.	.	III	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Allium oleraceum	.	.	.	.	+	+	.	III	+	.	.	.	+	+	.	+	.	+	.	.	III
Asperula cynanchica	.	.	+	+	.	.	.	II	.	.	+	.	.	+	.	+	.	.	.	.	II
Veronica spicata	.	+	.	.	.	.	+	II	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	II
Stachys recta	.	.	.	.	1.1	1.1	.	II	+	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	II
Coronilla varia	.	+	.	.	.	.	+	II	.	.	+	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	II
Phleum Boehmeri	.	+	+	.	.	.	+	III	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	II
Brachypodium pinnatum	.	+	+	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Odontites lutea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Erigeron acer	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Seseli annuum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Mchy charakterystyczne klasy (Moss characteristic of the class):																					
Abietinella abietina	1.1	1.1	1.1	+	.	.	.	III	.	.	1.1	.	.	.	1.1	.	+	.	.	.	II
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):	Anthyllis vulneraria (101, 115, 120), Arabis hirsuta (120), Aster amellus (120), Centaurea scabiosa (81, 110, 114), Echium vulgare (81), Eryngium planum (108, 120), Orobancha vulgaris (78, 114), Plantago media (120), Pimpinella saxifraga (76, 77), Prunella grandiflora (101), Tragopogon orientalis (102), Verbascum lychnitis (78), Viola rupestris (83, 102, 104)																				
Gatunki towarzyszące (Accompanying species):																					
Hypericum perforatum	+	.	r	1.1	.	.	+	III	+	+	+	.	.	+	+	+	.	.	.	.	III
Agropyron repens	1.1	.	1.1	.	+	+	.	III	.	.	.	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	I
Helichrysum arenarium	.	+	+	.	.	+	.	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Rosa canina c	+	+	+	+	.	.	.	III	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Convolvulus arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Lappula myosotis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Veronica verna	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Camelina sativa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Chenopodium album	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Consolida regalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Nigella arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Tripleurospermum inodorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):	(Acer negundo) c (111) Alectorolophus glaber (77, 101) Aloina rigida d (76) Barbula gracilis d (76) Berberis vulgaris c (100, 108) Bromus tectorum (77) Bryum caespitium d (81) Calamagrostis epigeios (101, 102) Calamintha vulgaris (102) Carduus acanthoides (101, 108) Cerasus fruticosa c 109) Ceratodon purpureus d (71, 77) Cichorium intybus (71) Dactylis glomerata (100) Descurainia sophia (100, 89)							Daucus carota (111) Encalypta contorta d (71) Erigeron canadensis (71) Fragaria viridis (71, 98) Hieracium pilosella (71, 102) Holosteum umbellatum (103) Knautia arvensis (100, 101, 120) Linum catharticum (120) Medicago lupulina (71, 81) Mycelis muralis (98) Myosotis versicolor (76) Origanum vulgare (77, 101) Papaver rhoeas (76) Plantago lanceolata (101) Pirus cammunis c (100)							Plantago maior (120) Polygonum aviculare (89) Polygonum convolvulus (71, 98) Prunus spinosa c (100, 76) Rhamnus cathartica c (100) Sedum acre (81, 89, 108) Sedum maximum (111) Setaria viridis (71, 81) Taraxacum officinale (120) Thalictrum minus (120) Tortula ruralis d (71, 76) Torilis japonica (108) Verbascum phlomoides (100) Viola arvensis (100).						

Tabela 7 — Table 7

Porównanie składu florystycznego jednostek wyróżnionych w obrębie zespołu *Stipetum capillatae*, *Sisymbrio-Stipetum* i *Potentillo-Stipetum*. Comparison of the floristic composition of units distinguished in the association *Stipetum capillatae*, *Sisymbrio-Stipetum* and *Potentillo-Stipetum*.

Zespół (Association)	Stipetum capillatae				Sisymbrio-Stipetum	Potentillo-Stipetum
Podzespół (Subassociation)	typicum	andropogonetosum	typicum	bothriochloetosum		
Region (Region)	Wyżyna Sandomierska i dolina Nidy		Wyżyna Sandomierska		Wyżyna Małopolska (Skorocice)	Pomorze Zachodnie (Bielinek)
Ilość zdjęć fitosocjologicznych (Number of relevé)	25		19		10	23
Gatunki charakterystyczne zespołu (Species characteristic of the association):						
Stipa capillata	V 2 - 4	III + - 1	V + - 3	V + - 4	V + - 4	IV + - 2
Poa bulbosa var. vivipara	II + - 2	.	.	.	V + - 3	.
Achillea millefolium ssp. pannonica	III + - 1	V +	V +	II + - 1	.	V + - 1
Hieracium echiioides	III + - 1	III +	.	I sp.	III + - 2	I +
Alyssum montanum	III + - 2	I +	V +	III + - 1	.	IV + - 1
Stipa Joannis	I 1	.	I 2	.	.	.
Festuca valesiaca	.	.	.	.	V + - 3	.
Veronica praecox	.	.	.	.	IV + - 1	.
Euphrasia tatarica	.	.	.	.	III + - 1	.
Gypsophila fastigiata (char. lok.)	I + - 1	.	.	.	III + - 2	.
Arabis auriculata	.	.	.	.	III + - 1	.
Medicago minima (char. lok.)	.	.	.	.	II + - 1	.
Sisymbrium polymorphum	.	.	.	.	II + - 1	.
Stipa pulcherrima	.	.	.	.	.	V + - 4
Anthericum liliago	.	.	.	.	.	V + - 3
Pleurochaeta squarrosa d	.	.	.	.	.	IV + - 3
Gatunki charakterystyczne podzespołu (Species characteristic of the subassociation) Stipetum capillatae bothriochloetosum:						
Bothriochloa ischaemum	.	.	.	V + - 3	.	.
Achillea setacea	.	.	.	III 1	.	.
Gatunki charakterystyczne związku (Species characteristic of the alliance) Festucion vallesiaceae i rzędu (and the order) Festucetalia vallesiaceae:						
Potentilla arenaria	V 1 - 3	V + - 1	V 1	V + - 2	V + - 3	V + - 2
Thymus Marschallianus	V 1 - 2	V + - 1	III + - 1	IV + - 1	II + - 2	.
glabrescens	.	.	.	.	III + - 1	.
Campanula sibirica	V +	II +	I +	III +	IV + - 1	.
Oxytropis pilosa	II +	.	.	.	.	V + - 1
Veronica austriaca	III +	.	.	.	.	.
Scabiosa ochroleuca	II +	IV +	I sp.	I sp.	.	.
canescens	II +	I +	.	.	.	IV + - 1
Agropyron intermedium	III +	I +	.	I sp.	V + - 3	.
Asparagus officinalis	II +	.	.	.	.	II +
Ornithogalum Gussonei	.	.	.	.	III + - 1	.
Astragalus danicus	.	.	.	.	II + - 1	.
Carex supina	.	.	.	I sp.	II +	III + - 2
Festuca duriuscula var. trachyphylla	.	.	III 1	III + - 2	.	IV + - 2
Bromus inermis	.	.	III +	I +	.	IV + - 2
Anthemis tinctoria	.	.	III + - 1	I +	.	.
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class) Festuca-Brometea:						
Koeleria gracilis	V + - 2	V + - 1	V + - 2	IV + - 2	III + - 2	IV + - 1
Medicago falcata	V 1 - 2	V 1 - 2	V + - 2	V + - 2	V + - 2	V + - 2
Calamintha acinos	V + - 1	III +	III +	III +	IV +	III +
Euphorbia cyparissias	V + - 1	V + - 2	V + - 1	III + - 1	V + - 1	V + - 1
Galium verum	V + - 2	V + - 2	IV +	V + - 1	V + - 2	V + - 1
Falcaria vulgaris	III +	I +	III +	III + - 1	II +	IV +
Centaurea rhenana	IV + - 1	II +	III + - 2	V +	II 1 - 2	V +
Festuca sulcata	V + - 3	V 1 - 3	III 1 - 2	III + - 1	II 1 - 2	.
Salvia pratensis	IV + - 1	V + - 1	III +	III + - 1	.	V + - 2
Stachys recta	II +	I +	II 1	II + - 1	III + - 2	IV + - 1
Dianthus carthusianorum	III + - 1	IV + - 1	III +	III +	.	IV +
Asperula cynanchica	IV + - 1	III + - 1	II +	II +	II +	.
Phleum Boehmeri	III + - 1	II +	III +	.	.	IV + - 3
Veronica spicata	II +	II +	II +	II +	.	II +
Abietinella abietina d	V + - 2	.	III + - 1	II + - 1	III + - 1	II + - 1
Artemisia campestris	V + - 2	III + - 1	.	.	V + - 2	.
Poa pratensis var. angustifolia	II + - 1	I +	V +	IV + - 1	.	.
Silene otites	IV +	II + - 1	.	.	.	.
Euphrasia stricta	III + - 1	II +	.	.	.	.
Onobrychis viciaefolia	III +	I +	.	.	.	.
Allium oleraceum	.	.	II +	II +	.	.
Coronilla varia	.	.	II +	II +	.	.
Odontites lutea	.	.	.	III + - 1	.	.
Orobanche vulgaris	II +	.	.	I sp.	.	II +
Brachypodium pinnatum	.	.	II +	.	.	III + - 1
Linum catharticum	.	.	.	.	.	III + - 4
Alyssum calycinum	.	.	.	.	V + - 2	.
Carex humilis	.	I sp.	.	.	III + - 2	III + - 3
Gatunki towarzyszące (Accompanying species):						
Euphorbia lutea	III + - 1	V + - 1	.	.	.	.
Medicago lupulina	II +	III +	.	I sp.	.	.
Plantago lanceolata	.	III +	I sp.	.	.	.
Hypericum perforatum	.	I +	III + - 1	III +	.	.
Agropyron repens	.	.	III + - 1	I + - 1	.	.
Helichrysum arenarium	.	.	III +	I +	.	.
Rosa canina c	.	.	.	I +	.	.
Convolvulus arvensis	.	.	.	III +	.	.
Lappula myosotis	.	.	.	III +	.	.
Arenaria serpyllifolia	I + - 2	I sp.	.	.	V + - 3	.
Camelina microcarpa	.	.	.	.	II +	II +
Sedum acre	.	.	.	.	IV + - 1	.
Prunus spinosa c	.	.	.	.	.	V + - 2
Dactylis glomerata	.	.	.	.	.	IV + - 1
Quercus robur c	.	.	.	.	.	II +
Ulmus campestris c	.	.	.	.	.	II +
Festuca ovina var. euovina	.	.	.	.	.	II + - 1
Quercus sessilis c	.	.	.	.	.	II +

Tabela 8 — Table 8

Koelerio-Festucetum sulcatae J. Kornaś 1952

Numer kolejny zdjęcia (Successive number of relevé)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Numer zdjęcia (No. of relevé)	94	96	112	113	58	116	117	118	119	175	176	177	29	30	31	32	33	36	47	48		
Data (Date)	12.VIII 1962	13.VIII 1962	19.VIII 1962		18.VII 1961	23.VIII 1962				8.VIII 1963			9.VII 1961		10.VII 1961			11.VII 1961				
Miejscowość (Locality)	Radoszki	Podgórze	Galkowice Ocin		Bykowiec	Góry Wysokie		Kichary	Galkowice Ocin	Galkowice Ocin			Wieprzki		Radoszki	Wieprzki		Lenarczyce	Radoszki			
Wystawa (Exposure)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SSE	S	SE	—	S	SE	S	S	S	S	S		
Nachylenie w° (Inclination in°)	15	20	30	15	45	30	40	35	40	40	45	45	—	45	50	45	45	45	20	40		
Pokrycie warstwy ziół „c” (Cover of herbaceous layer „c”)	80	100	100	100	80	95	80	100	95	85	80	100	100	100	100	90	80	90	100	100		
Pokrycie warstwy mchów „d” (Cover of moss layer „d”)	30	—	5	5	—	5	5	5	—	5	40	40	—	—	—	5	—	—	—	—		
Powierzchnia zdjęcia w m² (Surface of the relevé in m²)	50	40	50	50	20	50	25	40	50	25	50	50	15	25	20	15	15	10	25	10		
Ilość gatunków w zdjęciu (No. of species in relevé)	32	26	38	31	15	38	27	29	26	24	22	21	28	20	23	20	18	20	22	17		
Podzespół (Subassociation)	Odontitetosum luteae												typowy									
Gatunki charakterystyczne zespołu (Species characteristic of the association):																						
Festuca sulcata	3.3	3.3	3.3	3.2	+	+	+	+	+	1.1	+	+	V	3.3	2.2	2.2	3.3	3.3	2.2	3.3	2.2	V
Thymus Marschallianus (lok.)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	+	.	2.2	2.2	1.1	1.1	V	1.1	1.1	.	1.1	+	1.1	1.1	.	IV
Koeleria gracilis	+	1.1	1.1	1.1	3.3	2.3	2.2	.	2.2	2.1	.	+	V	.	2.3	2.3	+	1.1	.	1.1	3.2	IV
Asperula cynanchica	.	.	1.1	+	.	.	.	+	+	+	.	.	III	+	+	.	+	+	+	+	+	V
Phleum Boeheimeri	+	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	II	1.1	+	+	+	1.1	.	1.1	.	V
Podzespół (Subassociation) Odontitetosum luteae:																						
Achillea millefolium ssp. pannonica	+	1.1	1.1	1.1	+	1.1	+	+	2.2	+	1.1	+	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Odontites lutea	1.1	2.2	1.1	1.1	1.1	2.2	2.2	2.2	2.2	+	+	+	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hieracium echinoides	+	+	+	.	1.1	.	1.1	.	+	+	+	+	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Festuca duriuscula var. trachyphylla	.	.	.	.	2.2	2.2	2.2	3.3	1.1	1.1	+	1.1	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bothriochloa ischaemum	.	.	2.3	2.3	.	+	.	1.1	.	1.1	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Campanula sibirica	.	.	+	.	+	+	.	+	.	.	.	+	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pulsatilla pratensis var. nigricans	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wariant z (Variant with) Linosyris vulgaris:																						
Linosyris vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	2.2	3.3	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Agropyron intermedium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	2.1	2.2	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gatunki charakterystyczne związku (Species characteristic of the alliance) Festucion vallesiaca																						
i rzędu (and the order) Festucetalia vallesiaca:																						
Potentilla arenaria	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.2	1.1	1.1	1.1	V	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	V
Scabiosa ochroleuca	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	+	+	III	.	.	+	+	+	.	.	.	III
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):	Adonis vernalis (119), Bromus inermis (112), Carex praecox (112, 119), Stipa capillata (58, 117)																					
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class) Festuco-Brometea:																						
Centaurea rhenana	.	+	+	.	1.1	+	+	+	+	+	+	+	V	.	.	.	.	.	.	+	I	
Dianthus carthusianorum	+	+	+	+	.	+	.	+	+	+	+	+	V	+	+	+	.	.	1.1	+	III	
Salvia pratensis	+	.	1.1	1.1	+	1.1	+	1.1	1.1	+	1.1	1.1	V	.	.	+	.	.	1.1	+	III	
Artemisia campestris	+	+	+	1.1	.	1.1	+	1.1	1.1	+	.	.	IV	.	.	.	.	+	1.1	.	II	
Galium verum	.	+	1.1	1.1	.	1.1	+	.	1.1	+	2.2	1.1	IV	.	+	1.1	+	.	+	+	IV	
Medicago falcata	+	.	1.1	1.1	.	.	+	1.1	2.2	2.1	1.1	2.2	IV	+	1.1	.	+	.	1.1	1.1	IV	
Calamintha acinos	.	1.1	+	1.1	1.1	1.1	+	+	1.1	.	.	.	IV	.	.	1.1	.	.	.	.	II	
Euphorbia cyparissias	+	1.1	+	.	+	+	+	+	.	.	.	.	III	.	.	.	.	.	1.1	+	III	
Veronica spicata	+	+	.	.	.	+	+	.	1.1	+	+	.	III	.	.	.	.	.	.	.	.	
Poa pratensis var. angustifolia	.	+	.	+	.	+	+	+	+	.	.	.	III	.	.	+	.	.	.	.	I	
Centaurea scabiosa	+	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	II	.	.	.	.	+	+	.	II	
Silene otites	.	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	+	II	.	.	.	.	.	.	.	.	
Helianthemum ovatum	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	1.1	II	
Viola rupestris	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	II	+	.	+	.	.	+	.	II	
Onobrychis viciaefolia	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I	.	.	+	.	.	+	+	III	
Prunella grandiflora	r	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I	+	.	+	.	+	.	.	III	
Trifolium montanum	.	.	r	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I	+	+	.	+	.	.	+	III	
Mchy (Mosses):																						
Abietinella abietina d	2.2	.	+	+	.	+	+	.	.	1.1	3.3	2.2	IV	+	.	+	1.1	.	.	.	+	III
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):	Anthericum ramosum (94), Anthyllis vulneraria var. polyphylla (94, 118), Erigeron acer (112, 113), Falcaria vulgaris (29, 32, 112), Filipendula hexapetala (96), Plantago media (29, 47, 113, 116), Potentilla heptaphylla (96), Tragopogon orientalis (32, 47)																					
Gatunki towarzyszące (Accompanying species):																						
Helichrysum arenarium	+	.	+	+	.	.	.	.	+	+	+	.	III	.	.	+	.	+	+	+	IV	
Hypericum perforatum	+	+	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	III	.	.	+	.	+	.	.	II	
Medicago lupulina	+	1.1	.	.	.	1.1	.	2.2	.	.	.	.	III	.	.	.	1.1	.	.	.	I	
Sedum acre	.	+	.	+	.	+	+	+	.	.	.	.	III	.	.	.	+	.	.	.	I	
Agropyron repens	.	.	.	.	.	+	.	1.1	1.1	.	1.1	.	II	.	.	1.1	.	.	+	.	II	
Cichorium intybus	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	+	.	.	I	
Hieracium pilosella	.	.	.	+	.	1.2	.	1.1	.	.	.	.	II	1.1	1.1	1.1	2.2	1.1	1.1	+	V	
Plantago lanceolata	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	II	+	.	.	.	.	.	+	II	
Senecio jacobaea	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	I	
Juniperus communis c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	V	
Agrostis alba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	r	+	+	+	r	+	r	II	
Mchy (Mosses):																						
Camptothecium lutescens d	+	.	+	+	.	.	.	+	.	.	1.1	2.2	III	.	.	.	.	.	.	.	.	
Bryum caespiticium d	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):																						
Alectorolophus glaber (29)											Dicranella heteromalla d (94)											
Anemone silvestris (94)											Erigeron canadensis (117)											
Anthoxanthum odoratum (29)											Equisetum arvense (112, 113)											
Barbula gracilis d (116, 118)											Festuca pratensis (116)											
Berberis vulgaris c (116)											Fragaria viridis (29)											
Calamagrostis epigeios (29, 31)											Hieracium umbellatum (96, 118, 175)											
Calamintha vulgaris (94)											Lappula myosotis (96)											
Camelina sativa (117)											Leontodon hispidus (29)											
Calluna vulgaris (29, 32)											Linaria vulgaris (118)											
Carduus acanthoides (96)											Linum catharticum (116)											
Cerasus fruticosa c (33, 175)											Lygia passerina (118)											
Convolvulus arvensis (119)											Luzula multiflora (29)											
Cratagus monogyna c (33)											Melilotus albus (116)											
Cytisus nigricans (29, 47)											Origanum vulgare (30, 36, 116)											
Daucus carota (116)											Pastinaca sativa (94)											
											Peucedanum oreoselinum (36, 94, 113)											
											Plantago maior (47, 112)											
											Poa compressa (175)											
											Pohlia cruda d (112)											
											Polygala vulgaris (29, 31)											
											Populus tremula c (29)											
											Rosa canina c (30)											
											Rosa rubiginosa c (112)											
											Rubus caesius (31, 112)											
											Sedum maximum (96)											
											Setaria viridis (117)											
											Trifolium alpestre (30, 32)											
											Trifolium arvense (30, 33)											
											Tortula ruralis d (117)											
											Valeriana officinalis (29).											

Tabela 18 — Table 18

Porównanie składu florystycznego jednostek wyróżnionych w obrębie
Thalictro-Salvietum pratensis i zbiorowiska z Brachypodium pinnatum
Comparison of the floristic composition of units distinguished in the
association Thalictro-Salvietum pratensis and community with
Brachypodium pinnatum

Zespół (Association)	Thalictro-Salvietum pratensis	
Zbiorowisko (Community)		Brachypodium pinnatum
Region (Region)	Niecka Nidziańska (Skorocice)	Wyżyna Sandomierska
Ilość zdjęć (No. of relevés)	6	15
Gatunki charakterystyczne * i wyróżniające zespołu (Species characteristic * and differential of the association):		
* Agropyron intermedium	V + - 3	I sp.
* Carex praecox	V 1 - 3	I sp.
Falcaria vulgaris	V + - 1	II +
Fragaria viridis	V + - 2	II + - 1
Medicago falcata	V 2 - 3	IV + - 1
Salvia pratensis	V 1 - 3	IV + - 1
Thalictrum minus	V + - 2	I sp.
* Eryngium campestre	V + - 1	.
* Campanula bononiensis	II +	.
* Ranunculus illyricus	I(+)	.
Gatunki charakterystyczne związku (Species characteristic of the alliance) Festucion vallesiaceae		
i rzędu (and of the order) Festucetalia vallesiaceae:		
Achillea millefolium ssp. pannonica	V 1 - 2	IV + - 1
Adonis vernalis	V + - 2	I sp.
Scabiosa ochroleuca	V + - 1	II +
Potentilla arenaria	III +	III +
Thymus Marschallianus	III +	III + - 1
Festuca valesiaca	IV +	.
Thymus austriacus	III +	.
Thymus pannonicus	III +	.
Astragalus danicus	II +	.
Bromus inermis	II +	.
Thymus glabrescens	II +	.
Stipa capillata	I 2	II + - 1
Cytisus ratisbonensis	.	II +
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class) Festuca-Brometea:		
Asperula cynanchica	V + - 1	III +
Coronilla varia	V + - 2	II +
Dianthus carthusianorum	V + - 1	III +
Euphorbia cyparissias	V + - 1	III +
Galium verum	V + - 2	IV + - 1
Plantago media	V +	II +
Stachys recta	V + - 1	II + - 1
Agrimonia eupatoria	IV +	I sp.
Phleum Boehmeri	IV +	IV + - 1
Poa pratensis var. angustifolia	IV + - 3	III + - 1
Ranunculus bulbosus	IV +	II +
Abietinella abietina d	II + - 2	III + - 1
Artemisia campestris	II +	I sp.
Brachypodium pinnatum	II + - 3	V 3 - 4
Calamintha acinos	II +	II + - 1
Filipendula hexapetala	II + - 2	II + - 1
Sanguisorba minor	II +	II +
Seseli annuum	II +	I sp.
Festuca sulcata	I 2	IV +
Koeleria gracilis	I 3	II + - 2
Pimpinella saxifraga	IV + - 2	.
Potentilla argentea	IV +	.
Thlaspi perforatum	IV + - 1	.
Arabis hirsuta	III + - 1	.
Verbascum lychnitis	III +	.
Potentilla recta	II +	.
Scabiosa canescens	II +	.
Prunella grandiflora	.	III + - 1
Centaurea rhenana	.	II +
Centaurea scabiosa	.	II +
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Prunetalia * związku i rzędu (of the alliance and of the order) Quercetalia pubescentis **		
i klasy (and of the class) Querco-Fagetea:		
* Rosa canina b + c	.	IV +
* Berberis vulgaris c	.	III + - 1
* Cerasus fruticosa	.	II + - 1
* Prunus spinosa c	.	II + - 2
* Rhamnus cathartica b + c	.	II + - 2
** Viola collina	.	II + - 1
** Anemone silvestris	.	II + - 1
Gatunki towarzyszące (Accompanying species):		
Carex contigua	V + - 1	I sp.
Dactylis glomerata	IV +	II + - 1
Hypericum perforatum	IV +	II +
Plantago lanceolata	III +	II + - 1
Hieracium pilosella	II +	II + - 1
Camptothecium lutescens d	II + - 1	II +
Cerastium arvense	V + - 1	.
Berteroa incana	IV +	.
Convolvulus arvensis	III + - 1	.
Festuca pratensis	III + - 1	.
Knautia arvensis	.	IV + - 1
Origanum vulgare	.	III + - 1
Juniperus communis b + c	.	III + - 1

Tabela 23 — Table 23

Asteri — Linetum flavae

Numer zdjęcia (No. of relevé) (Successive number of relevé)	1	2	3	4	5	6	7	Stałość (Constancy)
Numer zdjęcia (No. of relevé)	134	135	136	137	138	139	166	
Data (Date)	1.VIII.1963 r.						5.VIII. 1963	
Miejscowość (Locality)	S a d k o w i c e						Nowe	
Wystawa (Exposure)	S						S	
Nachylenie w° (Inclination in°)	35	35	25	15	25	35	45	
Pokrycie krzewów „b” (Cover of shrub layer „b”)	10	2	3	2	10	1	5	
Pokrycie warstwy ziół „c” (Cover of herbaceous layer „c”)	50	40	55	55	45	50	35	
Pokrycie warstwy mchów „d” (Cover of moss layer „d”)	10	5	10	10	5	10	5	
Powierzchnia zdjęcia w m² (Surface of the relevé in m²)	50	40	35	25	20	40	50	
Ilość gatunków w zdjęciu (No. of species in relevé)	28	23	27	28	21	19	23	
Gatunki charakterystyczne i wyróżniające * zespołu (Species characteristic and differential of the association):								
Aster amellus	2.2	1.1	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	V
Linum flavum	1.1	1.1	2.2	2.2	1.1	1.2	1.1	V
Hieracium Bauhini	+	+	.	+	+	1.1	+	V
* Peucedanum cervaria	+	.	+	+	+	+	r	V
* Cytisus nigricans	+	+	+	.	+	+	.	IV
Gatunki charakterystyczne dla rzędu (Characteristic of the order)								
Festucetalia vallesiacae:								
Salvia verticillata	1.1	1.1	1.1	+	1.1	1.1	1.1	V
Scabiosa ochroleuca	+	+	+	+	+	+	+	V
Anthemis tinctoria	+	+	.	.	.	r	.	III
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Campanula sibirica (135, 166), Potentilla arenaria (136, 137)								
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class)								
Festuco — Brometea:								
Anthericum ramosum	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	.	1.1	V
Medicago falcata	+	+	+	1.1	+	.	.	IV
Achillea millefolium ssp. pannonica	+	+	+	.	+	.	.	III
Anthyllis vulneraria var. polyphylla	.	+	+	+	.	+	.	III
Brachypodium pinnatum	1.1	.	1.1	1.1	1.1	.	.	III
Euphoria cyparissias	+	.	+	+	.	.	1.1	III
Stachys recta	+	.	.	r	r	.	+	III
Salvia pratensis	1.1	.	.	+	.	.	+	III
Sanguisorba minor	.	+	.	+	.	+	.	III
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Agrimonia eupatoria (139), Calamintha acinos (137), Coronilla varia (134), Echium vulgare (143), Koeleria gracillis (135, 136), Koeleria pyramidata (134), Plantago media (136), Poa pratensis var. angustifolia (137), Ranunculus bulbosus (135, 166), Teucrium chamaedrys (143), Thymus pulegioides (137)								
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Prunelalia *, związku (alliance) Quercion pubescentis -sessiliflorae i rzędu (and of the order) Quercetalia pubescentis:								
Anemone silvestris	+	.	1.1	+	1.1	2.2	r	V
Berberis vulgaris b	.	.	.	+	.	.	+	V
c	r	r	+	+	+	.	.	III
* Rosa rubiginosa c	r	.	.	+	.	r	r	III
* Prunus spinosa c	1.1	.	.	.	1.1	r	.	III
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Cerasus fruticosa (166), *Cornus sanguinea b (134), *Crataegus monogyna c (134), *Rosa canina b/c (134, 136), Vincentoxicum officinale (134), Viola collina (135)								
Gatunki towarzyszące (Accompanying species):								
Festuca rubra	+	+	+	+	+	+	.	V
Galium mollugo	+	1.1	+	+	1.1	+	.	V
Hieracium pilosella	.	.	+	+	+	+	.	III
Daucus carota	.	+	.	r	.	.	+	III
Juniperus communis c	.	+	+	.	.	.	r	III
Mchy (Mosses):								
Camptothecium lutescens d	1.1	.	+	.	+	1.1	+	IV
Ceratodon purpureus d	.	+	1.1	1.1	+	+1	.	IV
Gatunki sporadyczne (Sporadic species): Barbula gracilis d (138), Chrysanthemum leucanthemum (135, 137), Hypericum perforatum (134, 136), Dipsacus pilosus (166), Knautia arvensis (136), Picris hieracioides (166), Vicia craca (136).								

Tabela 28 — Table 28

Prunetum fruticosae S. Dziubaltowski 1925 w optymalnej fazie rozwoju
Prunetum fruticosae S. Dziubaltowski 1925 in its optimal phase of growth

Numer kolejny zdjęcia (Successive number of relevé)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Stalność (constancy)
Numer zdjęcia (No. of relevé)	68	66	67	17	2	3	1	8	40	62	18	34	35	16	43	44	9	42	41	37	14	15	38	4	5	
Data (Date)	23.VII 1961	21.VII 1961	23.VII 1961	6.VII 1961	16.VII 1960	16.VII 1960	9.VII 1960	23.VII 1960	11.VII 1961	20.VII 1961	8.VII 1961	10.VII 1961	10.VII 1961	6.VII 1961	15.VII 1961	15.VII 1961	4.VII 1961	14.VII 1961	14.VII 1961	11.VII 1961	5.VII 1961	5.VII 1961	11.VII 1961	16.VII 1960	16.VII 1961	
Miejscowość (Locality)	Radoszki	Zurawniki	Malice Kościelne	Radoszki	Zagrody	Komorna	Rożki	Czermin	Lenarczyce	Podgórze	Radoszki	Wieprzki	Radoszki	Radoszki	Wysiadłów	Wysiadłów	Walentynów	Pawłowice	Wysiadłów	Lenarczyce	Radoszki	Radoszki	Radoszki	Komorna	Komorna	
Wystawa (Exposure)	SE	SE	SW	S	SE	SE	—	S	SE	SE	S	SE	SE	SE	SE	S	—	SE	SSE	S	S	S	SE	SE	S	
Nachylenie w° (Inclination in°)	45	60	40	60	40	40	—	30	40	35	45	45	45	60	70	60	—	20	45	60	30	45	60	20	45	
Zwarcie krzewów „b” (Density of shrub layer „b”)	90	80	100	80	90	100	90	100	90	80	100	75	100	50	80	80	80	80	100	75	90	100	90	100	100	
Pokrycie warstwy „c” (Cover of layer „c”)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	95	100	100	95	100	80	80	100	100	100	100	100	100	100	
Pokrycie warstwy mchów „d” (Cover of moss layer „d”)	śląd trace	5	śląd trace	śląd trace	—	—	śląd trace	—	śląd trace	śląd trace	śląd trace	5	5	20	śląd trace	śląd trace	śląd trace	5	—	śląd trace	śląd trace	5	śląd trace	—	—	
Powierzchnia zdjęcia w m² (Surface of the relevé in m²)	50	100	100	60	90	150	75	70	75	50	50	120	75	50	100	80	50	150	50	50	60	60	50	75	120	
Ilość gatunków w zdjęciu (No. of species in relevé)	45	34	20	28	25	19	17	18	29	27	35	31	33	37	31	30	21	29	29	34	20	22	23	18	15	
Gatunki charakterystyczne zespołu (Species characteristic of the association): Cerasus fruticosa Anemone silvestris	3.4 .	3.4 .	4.4 .	3.4 .	4.4 .	3.4 .	4.4 .	3.4 .	4.4 .	3.4 +	4.4 +	3.3 +	3.4 1.1	3.3 +	3.4 .	3.4 .	3.4 .	3.4 +	4.5 .	3.3 +	4.5 .	4.5 +	4.4 +	5.5 .	5.5 .	V II
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Prunetalia: Rosa canina b/c Prunus spinosa b/c Rhamnus cathartica b	1.1 . +	+	1.1 .	. +	+	2.2 +	. .	1.1 .	+	+	+	+	.	+	+	+	+	+	+	1.1 .	+	1.1 .	+	+	+	IV III II
Gatunki sporadyczne (sporadic species)	Evonymus verrucosa b (66), Rosa rubiginosa b (42)																									
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Querce- talia pubescentis i klasy (and of the class) Querco-Fagetea *; Cytisus nigricans Pirus communis b Fragaria viridis	. + +	. . .	. . .	+. . .	. . .	. + .	+. + .	. + .	. + .	. + .	. + .	+. . .	+. . .	+. + .	+. . .	+. + .	+. + 1.1	+. r +	+. . .	. + .	+. . .	. . .	. . .	. + .	. . .	III II II
Gatunki sporadyczne (sporadic species):	Calamintha vulgaris (66), Inula hirta (4), Potentilla alba (9), Trifolium alpestre (34, 3, 8) * Viburnum opulus b (43), Vincetoxicum officinale (17, 34, 66), Viola collina (42, 41, 37)																									
Gatunki charakterystyczne związku (Species characteristic of the alliance) Fe- stucion vallesiacae i rzędu (and of the order) Festucetalia vallesiacae: Achillea millefolium ssp. pannonica Potentilla arenaria Thymus Marschallianus Anthemis tinctoria Bromus inermis Campanula sibirica Scabiosa ochroleuca	. 1.1 +	. 1.1 .	+. . .	. 1.1 .	1.1 . .	. . .	+. . .	+. + .	+. . .	+. 1.1 .	+. . .	+. + .	+. + .	. . 1.1	+. . .	+. + .	. . .	. . .	+. . .	+. 1.1 .	+. . .	+. + .	1.1 . .	+. . .	. . .	IV II II II II II II
Gatunki sporadyczne (sporadic species):	Hieracium echinoides (66), Veronica austriaca (68, 41, 66)																									
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class) Festuco-Brometea: Galium verum Phleum Boehmeri Festuca sulcata Dianthus carthusianorum Medicago falcata Euphorbia cyparissias Asperula cynanchica Agrimonia eupatoria Artemisia campestris Koeleria gracilis Coronilla varia Poa pratensis var. angustifolia Stachys recta Calamintha acinos Plantago media Tragopogon orientalis Centaurea rhenana Salvia pratensis Centaurea scabiosa Falcaria vulgaris Prunella grandiflora	1.1 + 2.2 + 1.1 + + + + 1.1 1.1 + + . 																									

Tabela 30 — Table 30

Porównanie składu florystycznego jednostek wyróżnionych w obrębie *Prunetum fruticosae*
Comparison of the floristic composition of units distinguished in the association *Prunetum fruticosae*

Zespół (Association)	Prunetum fruticosae					
	Wyżyna Sandomierska i dolina Nidy (Pińczowskie)*	z udziałem gatunków murawowych with sward species	w optymalnej fazie rozwoju in optimal development phase	z udziałem gatunków leśnych with forest species	Podzespół Subassociation	
					typicum	Prunetum fruticosae cytisetosum albae
Region (Region)		Wyżyna Sandomierska i Przedgórze Łżeczkie**		Wyżyna Lubelska***		
Ilość zdjęć fitosocjologicznych (Number of relevé)	10	24	25	8	29	12
Gatunki charakterystyczne zespołu (Species characteristic of the association):						
<i>Cerasus fruticosa</i>	V 3 - 5	V + - 2	V 3 - 5	III	II	II
<i>Anemone sylvestris</i>	III + - 2	IV + - 2	II + - 1	II	I	III
<i>Stachys recta</i>	III + - 1	II + - 1	II + - 1	I	II	IV
<i>Seseli annuum</i>	III +	II +	.	.	.	.
<i>Brachypodium pinnatum</i>	V + - 2	.	.	.	I	V
<i>Agropyron intermedium</i>	IV + - 2	.	.	.	I	II
<i>Asperula tinctoria</i>	III + - 1	.	.	.	.	.
Gatunki wyróżniające podzespół (Species differential of the subassociation)						
<i>Prunetum fruticosae cytisetosum albae</i> :						
<i>Cytisus alba</i>						IV
<i>Scorzonera purpurea</i>						IV
<i>Iris aphylla</i>					I	III
<i>Echium rubrum</i>						II
<i>Nepeta nuda</i>						II
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order)						
<i>Prunetalia</i> :						
<i>Prunus spinosa</i> b + c	.	II +	II + - 2	III	I	.
<i>Rosa canina</i> b + c	.	III +	IV + - 1	I sp.	I sp.	.
<i>Rhamnus cathartica</i> b	.	II + - 1	II + - 1	I sp.	I sp.	I sp.
<i>Berberis vulgaris</i> b + c	.	IV + - 1	.	I	II	.
<i>Crataegus monogyna</i> b	.	II +	.	I sp.	.	.
Gatunki charakterystyczne związku (Species characteristic of the alliance)						
<i>Quercion pubescentis-sessiliflorae</i>						
rzędu (of the order) <i>Quercetalia pubescentis</i>						
i klasy (and the class) <i>Querco-Fagetea</i> *:						
<i>Fragaria viridis</i>	.	III + - 2	II + - 1	.	I	I
<i>Cytisus nigricans</i>	.	IV + - 1	III +	.	.	.
<i>Pirus communis</i> a + b	.	II +	II +	.	I sp.	.
<i>Calamintha vulgaris</i>	I	III +	I sp.	.	.	.
<i>Trifolium alpestre</i>	.	II +	I sp.	II	.	.
<i>Thalictrum minus</i>	.	I sp.	.	II	II	III
<i>Cytisus ruthenicus</i>	.	.	.	II	II	I
<i>Peucedanum cervaria</i>	.	.	.	II	I	.
* <i>Corylus avellana</i>	.	.	.	II	I	.
* <i>Carex digitata</i>	.	.	.	II	I	.
* <i>Campanula trachelium</i>	.	I sp.	.	II	I	.
* <i>Geum urbanum</i>	.	.	.	III	.	.
<i>Cimicifuga europaea</i>	.	II +	.	.	.	.
Gatunki charakterystyczne związku (Species characteristic of the alliance)						
<i>Festucion vallesiaceae</i>						
i rzędu (and of the order) <i>Festucetalia vallesiaceae</i> :						
<i>Achillea millefolium</i> ssp. <i>pannonica</i>	IV + - 2	IV + - 1	IV + - 1	.	I	I
<i>Campanula sibirica</i>	IV + - 1	III + - 1	II +	II	III	III
<i>Thymus Marschallianus</i>	V 1 - 2	III + - 1	II + - 1	.	.	.
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	III + - 1	II + - 1	II r - 1	.	IV	II
<i>Potentilla arenaria</i>	V + - 2	III + - 1	II + - 1	II	IV	IV
<i>Bromus inermis</i>	.	I sp.	II + - 1	II	II	I
<i>Anthemis tinctoria</i>	.	II + - 1	II +	.	I sp.	.
<i>Adonis vernalis</i>	.	.	.	I	IV	.
<i>Verbascum phoeniceum</i>	.	.	.	II	III	.
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class)						
<i>Festuco-Brometea</i> :						
<i>Artemisia campestris</i>	V + - 2	II +	II +	I	V	.
<i>Calamintha acinos</i>	IV + - 1	III + - 1	II + - 1	.	I	.
<i>Dianthus carthusianorum</i>	V + - 1	III + - 1	IV + - 1	.	.	.
<i>Galium verum</i>	V + - 2	IV + - 1	IV + - 1	II	V	V
<i>Festuca sulcata</i>	V + - 1	V + - 3	IV + - 1	.	.	.
<i>Medicago falcata</i>	V + - 2	III + - 2	IV + - 1	.	.	.
<i>Euphorbia cyparissias</i>	V + - 1	IV + - 1	III + - 1	IV	IV	IV
<i>Salvia pratensis</i>	IV + - 1	II + - 1	II + - 1	I	IV	IV
<i>Pimpinella saxifraga</i>	III + - 1	II +	I sp.	IV	IV	I
<i>Phleum Boehmeri</i>	III + - 1	IV + - 1	IV + - 1	II	II	III
<i>Koeleria gracilis</i>	III + - 1	III + - 2	II + - 1	I	IV	III
<i>Coronilla varia</i>	II +	III + - 2	II + - 1	IV	II	I
<i>Veronica spicata</i>	I +	I sp.	I sp.	I	V	III
<i>Filipendula hexapetala</i>	II +	I sp.	I sp.	III	II	V
<i>Poa pratensis</i> var. <i>angustifolia</i>	I +	II +	II +	IV	II	II
<i>Campanula glomerata</i>	I +	II +	I sp.	III	II	I
<i>Plantago media</i>	I +	.	II +	III	I	III
<i>Centaurea rhenana</i>	III r - 1	I sp.	II +	.	I	II
<i>Centaurea scabiosa</i>	.	II +	II r - +	II	I	I
<i>Agrimonia eupatoria</i>	.	II +	III + - 1	IV	I	.
<i>Trifolium montanum</i>	.	II + - 2	.	II	II	III
<i>Prunella grandiflora</i>	.	III + - 2	II r - +	.	.	II
<i>Abietinella abietina</i> d	IV + - 2	III + - 2	II + - 2	.	.	I
<i>Asperula cynanchica</i>	.	IV + - 1	III +	.	.	I
<i>Aster amellus</i>	.	.	I sp.	.	.	I
<i>Viola rupestris</i>	.	III + - 1	I sp.	I	II	I
<i>Thymus pulegioides</i>	.	II + - 1	I sp.	IV	III	I
<i>Onobrychis viciaefolia</i>	III +	.	.	.	.	.
Gatunki towarzyszące (Accompanying species):						
<i>Agropyron repens</i>	III + - 2	II + - 1	IV + - 2	I	I	.
<i>Hypericum perforatum</i>	II +	II +	III + - 1	IV	III	II
<i>Solidago virga aurea</i>	II +	I sp.	.	III	II	I
<i>Hieracium umbellatum</i>	II + - 1	.	.	IV	II	.
<i>Knautia arvensis</i>	IV +	III +	I +	II	II	.
<i>Vicia cracca</i>	.	III +	III +	IV	II	I
<i>Origanum vulgare</i>	.	IV + - 1	IV + - 2	V	II	I
<i>Festuca rubra</i>	.	I sp.	I sp.	II	III	IV
<i>Frangula alnus</i> b	.	IV + - 2	I sp.	IV	II	.
<i>Calamagrostis epigeios</i>	II + - 1	III + - 1	.	I sp.	I sp.	.
<i>Populus tremula</i> b	.	III + - 2	I sp.	I	I	.
<i>Fragaria vesca</i>	I +	.	.	IV	II	II
<i>Rubus caesius</i>	.	II + - 1	II + - 1	IV	I	.
<i>Festuca ovina</i>	.	.	.	.	III	III
<i>Galium verum</i>	.	.	.	IV	II	.
<i>Betonica officinalis</i>	.	.	.	IV	I	.
<i>Juniperus communis</i> b	.	IV + - 2	.	I	II	.
<i>Camptothecium lutescens</i> d	.	III + - 1	.	II	I	.

* Dziubałowski (1925)

** badania własne

*** Fijałkowski, Izdebski 1957.

(the present author)

Tabela 34 — Table 34

Zbiorowisko z (Community with) *Berberis vulgaris* — *Rosa rubiginosa*

Numer kolejny zdjęcia (Successive number of relevé)	1	2	3	4	5	6	7	8
Numer zdjęcia (No. of relevé)	163	164	165	172	173	174	177	178
Data (Date)	3.VIII.1963			7.VIII.1963			10.VIII.1963	
Miejscowość (Locality)	Biedrzychów			Sulejów			Biedrzy- chów	
Ekspozycja (Exposure)	ESE							
Nachylenie w° (Inclination in°)	40	30	30	30	30	30	40	40
Zwarcie krzewów „b” (Density of shrub layer „b”)	30	35	40	40	40	40	30	35
Pokrycie warstwy ziół „c” (Cover of herbaceous layer „c”)	40	45	50	30	40	45	40	30
Pokrycie warstwy mchów „d” (Cover of moss layer „d”)	5	15	10	20	15	10	5	10
Powierzchnia zdjęcia w m² (Surface of the relevé in m²)	100	150	100	150	100	100	50	75
Ilość gatunków w zdjęciu (No. of species in relevé)	44	48	50	51	43	46	37	34
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) <i>Prunetalia</i> :								
Berberis vulgaris b	+	+	1.1	2.1	2.2	2.2	+	1.1
Rosa rubiginosa b	2.1	2.1	2.1	2.2	1.1	1.1	1.1	2.2
Prunus spinosa b	+	+	+	1.1	.	+	.	.
Rosa canina b	.	+	+	+	+	+	.	.
Rhamnus cathartica b	.	.	+	.	.	.	.	.
Cornus sanguinea b	.	+	1.1	.	.	.	+	.
Crataegus curvisepala b	.	.	.	1.1	+	+	.	.
Rosa spinosissima c	.	+	+	.	.	.	.	+
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):	<i>Crataegus monogyna</i> b (165, 178), <i>Evonymus ver-</i> <i>rucosa</i> b/c (164, 165), <i>Rosa glauca</i> b/c (163, 174)							
Gatunki charakterystyczne związku (Species characteristic of the all- iance) <i>Quercetalia pubescentis-ses-</i> <i>siflorae</i> i klasy (and of the class) <i>Querco-</i> <i>Fagetea</i> *:								
Calamintha vulgaris	.	+	+	+	.	.	+	+
Clematis recta	.	.	+	+	1.1	1.1	r	.
Fragaria viridis	.	.	1.1	1.1	1.1	1.1	.	+
Viola collina	.	.	1.1	1.1	+	1.1	.	+
Vincetoxicum officinale	r	.	1.1	+	.	.	.	+
Anemone silvestris	+	+	1.1	.	.	.	.	.
Lithospermum officinale	+	.	+	.	+	.	.	.
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):	* <i>Asarum europaeum</i> (173, 174), * <i>Brachypodium</i> <i>silvaticum</i> (165), <i>Cytisus nigricans</i> (163, 94), * <i>Galeobdolon luteum</i> (172, 173), * <i>Hedera helix</i> (173, 174), <i>Lilium martagon</i> (174), <i>Pirus commu-</i> <i>nis</i> b/c (165, 172), <i>Primula officinalis</i> var. <i>canes-</i> <i>cens</i> (165, 178), <i>Thalictrum minus</i> (165, 178), * <i>Viola mirabilis</i> (178)							
Gatunki charakterystyczne związku (Species characteristic of the all- iance) <i>Festucion vallesiacae</i> * rzędu (of the order) <i>Festucetalia</i> <i>vallesiacae</i> ⊕ i klasy (and of the class) <i>Festuco-</i> <i>-Brometea</i> :								
Poa pratensis var. angustifolia	+	1.1	1.1	+	.	+	+	1.1
⊕ Scabiosa ochroleuca	+	+	+	.	+	+	+	+
Aster amellus	+	2.1	1.1	+	.	.	1.1	1.1
Pimpinella saxifraga	+	.	+	+	.	+	+	+
Teucrium chamaedrys	2.2	1.1	.	+	.	+	1.1	+
Agrimonia eupatoria	.	+	+	.	+	+	.	+
Coronilla varia	.	+	+	+	+	+	.	.
Echium vulgare	+	r	.	r	.	.	+	+
Euphorbia cyparissias	1.1	.	+	+	.	+	.	+
Koeleria gracilis	.	+	1.1	.	.	.	+	+
Stachys recta	+	+	+	.	.	.	+	+
Thymus pulegioides	+	.	+	1.1	1.1	1.1	.	.
Calamintha acinos	+	.	+	.	.	+	+	.
⊕ Campanula sibirica	+	+	.	+	.	.	+	.
⊕ Hieracium Bauhini	.	+	+	.	+	+	.	.
Medicago falcata	+	+	.	+	.	+	.	.
Salvia pratensis	.	2.1	1.1	+	.	.	1.1	.
⊕ Salvia verticillata	1.1	1.1	.	.	.	.	+	+
Sanguisorba minor	+	+	+	.	.	.	+	.
Allium oleraceum	.	+	+	.	.	.	r	.
Carex caryophyllea	.	+	1.1	+	.	.	.	.
Carlina vulgaris	+	+	.	.	.	.	.	+
Centaurea scabiosa	.	+	+	.	.	.	+	.
⊕ Potentilla arenaria	.	.	.	1.1	.	+	+	.
Mchy (Mosses):								
Abietinella abietina	1.1	1.1	.	1.1	1.1	.	+	1.1
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):	⊕ <i>Anthemis tinctoria</i> (163, 177), <i>Anthericum ra-</i> <i>mosum</i> (178), <i>Anthyllis vulneraria</i> var. <i>Kernerii</i> (174), <i>Brachypodium pinnatum</i> (164, 178), * <i>Bro-</i> <i>mus inermis</i> (172), <i>Campanula glomerata</i> (172, 174), <i>Erigeron acer</i> (163, 172), <i>Eryngium planum</i>							

Tabela 37 — Table 37

Peucedano-Coryletum A. Kozłowska 1925 em. Medwecka-Kornaś 1952

[illegible]

- Gatunki charakter
- ** Lokalnie (Locally)

Tabela 39 — Table 39

Porównanie składu florystycznego jednostek wyróżnionych w obrębie zespołu
Peucedano-Coryletum
Comparison of the floristic composition of units distinguished in the
association Peucedano-Coryletum

Zespół (Association)	Peucedano-Coryletum	
Region (Region)	Jura Krakowsko- Wieluńska	Wyżyna San- domierska i Podgórze Iłżeckie
Ilość zdjęć fitosocjologicznych (Number of relevé)	10	10
Gatunki charakterystyczne zespołu (Species characteristic of the association) związku (of the alliance) Quercion pubescentis- -sessiliflorae i rzędu (and of the order) Quercetalia pubescentis:		
<i>Calamintha vulgaris</i>	V + -2	IV +
<i>Vincetoxicum officinale</i>	V + -2	III + -1
<i>Peucedanum cervaria</i>	IV + -3	V + -1
<i>Viola collina</i>	III + -1	V + -1
<i>Fragaria viridis</i>	II + -1	V + -1
<i>Primula officinalis</i>	III + -1	II + -1
<i>Trifolium alpestre</i>	IV + -2	I sp.
<i>Campanula persicifolia</i>	III + -1	I sp.
<i>Digitalis grandiflora</i>	III + -2	I sp.
<i>Lathyrus niger</i>	III + -1	I sp.
<i>Melittis melissophyllum</i>	II + -1	I sp.
<i>Potentilla alba</i>	II + -1	I sp.
<i>Geranium sanguineum</i>	V + -2	.
<i>Polygonatum officinale</i>	IV + -2	.
<i>Inula hirta</i>	III + -1	.
<i>Laserpitium latifolium</i>	III + -2	.
<i>Veronica teucrium</i>	III +	.
<i>Carex montana</i>	III + -2	.
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	II + -3	.
<i>Trifolium rubens</i>	II +	.
<i>Clematis recta</i>	I 1	V + -2
<i>Anemone silvestris</i>	I 2	III + -1
<i>Cimicifuga europaea</i> (lok)	.	IV + -1
<i>Lithospermum officinale</i> (lok)	.	IV +
<i>Cytisus nigricans</i>	.	II +
Gatunki charakterystyczne rzędu (Species characteristic of the order) Prunetalia:		
<i>Cornus sanguinea</i> b	III + -5	II + -1
c	III +	I + -1
<i>Rhamnus cathartica</i> b	IV + -2	III + -1
c	II +	III +
<i>Evonymus verrucosa</i> b	III + -1	III + -1
c	II +	I +
<i>Prunus spinosa</i> b	III + -2	I 1
c	I +	III 1 -2
<i>Crataegus monogyna</i> a	.	I 1
b	II + -2	IV + -1
c	.	III + -1
<i>Berberis vulgaris</i> b	.	V + -2
c	I +	III + -1
<i>Rosa canina</i> b	.	V + -1
c	.	II + -1
<i>Rosa rubiginosa</i> b	.	V + -1
c	.	I + -1
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class) Quercio-Fagetea:		
<i>Corylus avellana</i> b	IV + -3	V + -2
c	I +	I 1
<i>Carex digitata</i>	IV + -1	II +
<i>Poa nemoralis</i>	IV + -2	II +
<i>Lathyrus vernus</i>	II +	III + -1
<i>Viola mirabilis</i>	II + -1	III +
<i>Melampyrum nemorosum</i>	IV + -2	I 1
<i>Campanula trachelium</i>	II +	I +
<i>Melica nutans</i>	IV + -1	.
<i>Carpinus betulis</i> a	I 1	.
b	III + -1	.
c	I +	.
<i>Fagus sylvatica</i> a	II 1 -2	.
b	I +	.
c	I +	.
<i>Hepatica nobilis</i>	II + -1	.
<i>Ulmus campestris</i> var <i>suberosa</i> b	.	II + -1
c	.	II + -1
<i>Pulmonaria obscura</i>	.	III + -1
<i>Galeobdolon luteum</i>	.	II + -1
<i>Lilium martagon</i>	.	II +
<i>Viburnum opulus</i> b/c	.	II + -1
<i>Pirus communis</i> b	.	III + -1
Gatunki charakterystyczne klasy (Species characteristic of the class) Festuco-Brometea:		
<i>Achillea collina</i> et <i>pannonica</i> *	IV + -1	* III +
<i>Brachypodium pinnatum</i>	IV + -3	V + -1
<i>Anthericum ramosum</i>	III + -2	II +
<i>Coronilla varia</i>	III + -1	IV +
<i>Euphorbia cyparissias</i>	III + -1	IV +
<i>Abietinella abietina</i> d	II +	III + -1
<i>Festuca sulcata</i>	II + -1	I +
<i>Plantago media</i>	II +	IV +
<i>Stachys recta</i>	II +	III +
<i>Agrimonia eupatoria</i>	.	V +
<i>Campanula sibirica</i>	.	IV +
<i>Salvia pratensis</i>	.	IV + -1
<i>Salvia verticillata</i>	.	IV + -1
<i>Allium oleraceum</i>	.	III +
<i>Aster amellus</i>	.	III + -1
<i>Calamintha acinos</i>	.	III +
<i>Campanula glomerata</i>	.	III +
<i>Medicago falcata</i>	.	III +
<i>Sanguisorba minor</i>	.	III +
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	.	III +
<i>Seseli annuum</i>	.	III +
<i>Thymus pulegioides</i>	.	II
Gatunki towarzyszące (Accompanying species):		
<i>Galium verum</i>	V + -1	III +
<i>Veronica chamaedrys</i>	V +	I +
<i>Betonica officinalis</i>	III + -1	II +
<i>Sedum maximum</i>	III + -1	II +
<i>Solidago virga-aurea</i>	III + -2	II +
<i>Origanum vulgare</i>	III + -1	.
<i>Silene nutans</i>	III + -1	.
<i>Camptothecium lutescens</i> d	.	IV + -1
<i>Linum catharticum</i>	.	IV +
<i>Prunella vulgaris</i>	.	IV + -1
<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> d	.	V + -1
<i>Angelica silvestris</i>	.	III + -1
<i>Daucus carota</i>	.	III +
<i>Frangula alnus</i> b + c	.	III + -1
<i>Hieracium pilosella</i>	.	III + -1
<i>Leontodon hispidus</i>	.	III +
<i>Lysimachia nummularia</i>	.	III +
<i>Medicago lupulina</i>	.	III +
<i>Plantago lanceolata</i>	.	III + -1
<i>Thuidium Philiberti</i> d	.	III + -1
<i>Trifolium repens</i>	.	III +

Uwzględniono tylko wariant typowy
(Only typical variant was taken in account)

Tabela 40 — Table 40
Zbiorowisko z (Community with) *Juniperus communis*

Numer kolejny zdjęcia (Successive number of relevé)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Stalność (Constancy)
Numer zdjęcia (No. of relevé)	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	
Data (Date)	13.VIII.1963					14.VIII.1963						
Miejscowość (Locality)	Biedrzychów											
Ekspozycja (Exposure)	ESW	ESE	ESE	ESE	ESW	ESE	ESE	ESW	ESW	E	ESE	
Nachylenie w° (Inclination in°)	15	20	30	20	30	30	30	20	15	10	20	
Zwarcie krzewów „b” (Density of shrub layer „b”)	60	60	60	60	40	50	60	45	60	70	60	
Pokrycie warstwy ziół „c” (Cover of herbaceous layer „c”)	40	80	50	50	60	50	40	55	40	30	70	
Pokrycie warstwy mchów „d” (Cover of moss layer „d”)	50	40	40	60	50	35	25	60	60	40	30	
Powierzchnia zdjęcia w m² (Surface of the relevé in m²)	100	100	75	100	100	100	50	75	150	100	50	
Ilość gatunków w zdjęciu (No. of species in relevé)	47	44	38	39	43	38	37	35	41	32	33	
Gatunki charakterystyczne rzędu (Characteristic of the order) Prunetalia:												
Berberis vulgaris b	+	1.1	1.1	+	1.1	1.1	1.1	1.1	+	+	+	V
c	+	.	+	.	+	+	+	+	+	+	+	V
Rosa rubiginosa b	+	+	1.1	+	+	+	.	+	+	+	+	III
c	+	.	+	.	+	+	.	+	+	+	.	III
Rosa canina b	+	+	+	+	.	.	+	+	.	.	.	II
c	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	II
Rosa spinosissima c	+	.	.	.	.	r	+	.	.	+	r	II
Prunus spinosa b	.	.	+	.	.	+	.	.	+	.	.	II
c	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	II
Rhamnus cathartica c	.	r	.	.	r	.	.	r	.	.	.	II
Rosa glauca b	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	II
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):												
Cornus sanguinea b/c (189), Crataegus monogyna c (189)												
Gatunki charakterystyczne związku (Characteristic of the alliance) Quercion pubescentis-sessiliflorae												
rzędu (order) Quercetalia pubescentis												
i klasy (and of the class) Querco-Fagetea:												
Fragaria viridis	.	+	1.1	1.1	.	1.1	+	+	1.1	+	1.1	V
Anemone sylvestris	1.1	1.1	+	.	1.1	+	1.1	.	.	1.1	1.1	IV
Viola collina	.	+	.	.	2.1	2.2	3.2	2.1	.	.	1.1	III
Primula officinalis var. canescens	.	.	+	.	+	2.2	.	.	+	.	.	II
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):												
Calamintha vulgaris (188, 199), * Campanula trachelium (189), Cytisus nigricans (188), * Melica nutans (183), * Pirus communis c (187), Thalictrum minus (189, 190)												
Gatunki charakterystyczne związku (Characteristic of the alliance) Festucion vallesiacaе ⊕												
rzędu (order) Festucetalia vallesiacaе *												
i klasy (and of the class) Querco-Fagetea *:												
Carlina vulgaris	+	+	1.1	+	+	+	r	+	+	+	+	V
Teucrium chamaedrys	1.1	1.1	.	2.1	1.1	2.2	1.1	2.1	2.1	1.1	2.1	V
Euphorbia cyparissias	.	r	+	+	+	+	.	+	+	+	+	V
Sanguisorba minor	+	1.1	+	+	+	+	.	+	+	+	+	V
* Scabiosa ochroleuca	+	+	+	+	+	.	+	+	+	+	+	V
Thymus pulegioides	2.1	1.1	.	1.1	1.1	+	+	+	+	.	1.1	V
Anthyllis vulneraria var. Kernerii et polyphylla°	+	+	+	+	.	+°	+°	+°	.	.	+	IV
Medicago falcata	+	.	+	+	+	+	.	+	+	+	.	IV
Galium verum	+	+	+	+	+	.	.	.	+	+	.	IV
* Campanula sibirica	+	+	+	.	+	.	.	+	.	.	+	III
* Salvia verticillata	+	.	.	.	+	+	.	+	1.1	1.1	.	III
Carex caryophyllaea	+	1.1	1.1	+	+	.	.	.	.	.	.	III
Coronilla varia	.	+	.	.	+	+	+	.	.	+	.	III
Koeleria gracilis	.	+	+	.	r	.	.	+	+	.	+	III
Plantago media	.	+	.	.	.	.	+	+	+	.	+	III
Poa pratensis var. angustifolia	.	+	.	1.1	.	+	.	+	+	1.1	.	III
* Hieracium Bauhini	+	1.1	.	.	.	.	.	+	.	.	+	II
Pimpinella saxifraga	.	.	.	+	+	.	+	+	.	.	.	II
Viola rupestris	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II
* Anthemis tinctoria	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	II
Seseli annuum	+	.	.	+	.	.	.	.	r	.	.	II
Mchy (Mosses):												
Abietinella abietina d	.	2.1	2.1	2.2	.	.	.	.	.	2.2	.	II
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):												
Agrimonia eupatoria (188), Aster amellus (189, 190), Calamintha acinos (187, 188), Centaurea rhenana (181), Centaurea scabiosa (180, 188), Potentilla arenaria (180, 181), Salvia pratensis (180, 186), O Veronica autriaca (187)												
Gatunki towarzyszące (Accompanying species):												
Juniperus communis b	3.3	3.3	3.3	3.3	2.1	2.2	3.2	2.1	3.3	3.3	3.3	V
c	1.1	1.1	+	1.1	+	+	+	1.1	1.1	1.1	1.1	V
Camptothecium lutescens d	2.2	2.1	1.1	1.1	1.1	2.2	2.2	2.2	2.2	3.2	.	V
Origanum vulgare	.	1.1	1.1	+	1.1	1.1	+	1.1	+	+	+	V
Linum catharticum	+	+	.	+	+	+	.	+	+	+	+	V
Plantago lanceolata	+	+	+	+	.	+	r	.	+	+	+	V
Sedum acre	+	+	+	+	r	+	+	+	.	+	.	V
Thuidium Philiberti d	2.1	1.1	2.1	1.1	1.1	2.2	1.1	2.2	2.2	.	.	V
Medicago lupulina	.	+	.	.	+	+	+	+	+	+	+	IV
Festuca pratensis	2.1	.	+	1.1	.	+	.	+	.	+	+	IV
Leontodon hispidus	1.1	1.1	1.1	.	+	.	.	+	1.1	+	.	IV
Phleum pratense	+	.	+	+	+	.	+	+	.	+	.	IV
Achillea millefolium	+	.	+	+	.	.	+	+	+	.	.	III
Ononis spinosa	+	+	.	+	.	+	+	.	+	.	.	III
Rhytidadelphus triquetrus d	2.1	.	.	3.2	3.2	.	.	3.2	3.2	.	3.2	III
Carex tomentosa	.	+	.	.	.	.	+	+	+	+	.	III
Daucus carota	+	.	+	+	.	.	.	+	.	+	.	III
Hieracium pilosella	1.1	.	+	.	.	.	.	+	+	+	+	III
Knautia arvensis	+	.	.	.	+	.	+	+	+	.	.	III
Prunella vulgaris	1.1	.	.	.	.	+	+	.	+	.	+	III
Veronica chamaedrys	.	+	+	.	+	.	+	.	.	+	.	III
Frangula alnus c	r	.	.	+	.	.	.	.	r	.	r	II
Hypericum perforatum	.	.	.	r	r	.	r	+	.	.	.	II
Pinus silvestris a/b	.	.	+	.	.	r	r	.	.	.	.	II
Gatunki sporadyczne (Sporadic species):												
Agropyron repens (181), Antennaria dioica (180, 182, 183), Anthoxanthum odoratum (183), Bryum caespiticiu d (181), Bryum pallescens d (182), Campanula patula (180, 181, 190), Carduus acanthoides (184), Carex contigua (186), Catharinea undulata d (180), Cetraria islandica d (181), Centaurium umbellatum (182), Cladonia furcata d (180), Cladonia pyxidata d (182), Ceratodon purpureus d (182), Dactylis glomerata (180, 184, 186), Entodon Schreberi d (182, 190), Festuca rubra (184), Fissidens taxifolius d (181, 184), Fragaria vesca (184, 185), Galium boreale (184), Galium mollugo (185), Galium vernum (184), Glechoma hederacea (180, 186), Hypnum cupressiforme d (180), Hypnum cupressiforme var. uncinatum d (182), Leontodon autumnalis (182, 186), Linaria vulgaris (184), Mnium affine d (183), Plantago maior (181, 185), Poa pratensis (181, 185), Polygala vulgaris (183, 185, 188), Taraxacum officinale (180, 184), Trifolium repens (182), Valeriana officinalis (190), Vicia cracca (188), Viscaria vulgaris (185).												

Rola gatunków kserotermicznych w zbiorowiskach muraw i zarośli
The role of xerothermic plants in turf and brushwood communities

Zespół (Association)	Stipetum capillatae		Koelerio-Festucetum sulcatae				Scabioso- -Teucrietum	Asteri-Line- tum flavae	Prunetum fruticosae		Peucedano-Coryletum		
Podzespół (Subassociation)	typicum	bothrio- chloetosum	odontitetosum luteae		typicum								
Jednostki niższe Lower units			wariant typowy typical variant	wariant z Linosyris vulgaris					z udziałem gatunków murawo- wych with sward species	w optymal- nej fazie rozwoju in optimal develop- ment phase	wariant typowy typical variant	wariant z variant with Cornus sanguinea	wariant zubożały pauperized variant
Species char. and differential													
Zbiorowisko (Community)						Brachypo- dium pinnatum							
Ilość zdjęć (No. of relevé)	7	12	9	3	8	15	12	7	24	25	10	3	11
Stipa capillata	2713 V + -3	3249 V + -4				67 II + -1							
Alyssum montanum	8 V +	83 III + -1											
Stipa Joannis	250 I 2												
Bothriochloa ischaemum		1084 V + -3	444 III + -2	166(1)1									
Achillea setacea		625 III 1											
Festuca sulcata	392 III 1 - 2	126 III + -1	1671 IV + -3	172(3) + -1	2745 V 2 - 3	434 IV 2 - 3			1501 V + -3	490 IV + -2	1 I +		140 IV + -1
Thymus Marschallianus	75 III + -1	74 IV + -1	528 V + -2	926(3)1 - 2	313 IV + -1	135 III + -1			331 III 1	102 II + -1			
Koeleria gracilis	893 V + -2	603 IV + -2	1166 V + -3	169(2) + -1	1375 IV + -3	66 II + -1			217 III + -2	121 II + -1			
Asperula cynachica	2 II +	2 II +	58 III + -1	3(1) +	8 V +	5 III +			67 IV + -1	44 III + -1			
Phleum Boehmeri	4 II +	.	4 III +	.	192 V +	169 IV + -1			169 IV + -1	106 IV + -1			
Odontites lutea	.	.	1194 V 1 - 2	10(3) +									
Achillea millefolium ssp. pannonica	8 V +	83 II + -1	420 V + -2	172(3) + -1		40 IV + -1		5 III +	26 IV + -1	45 IV + -1	5 III +		1 I +
Festuca duriuscula var. trachyphylla	214 III 1	271 III + -2	1054 III 1 - 3	336(3) + -1									
Hieracium echioides	.	.	115 IV + -1	10(3) +									
Campanula sibirica	1 I +	4 III +	4 III +	6(2) +		4 III +			24 III + -1	2 II +	7 IV +		
Pulsatilla pratensis var. nigricans			2 II +	6(2) +									
Linosyris vulgaris				2416(2)2 - 3									
Agropyron intermedium				1332(3)1 - 2									
Brachypodium pinnatum	2 II +					5416 V 3 - 4	3 II +	285 III 1			302 IV + -1		91 II + -1
Teucrium chamaedrys							3290 V 2 - 4					3(1) +	
Scabiosa columbaria							1437 V 1 - 2						
Viola collina						100 II + -1	1518 V + -2						
Aster amellus								1571 V 1 - 2	2 II +			3(1) +	3 II +
Linum flavum								857 V 1 - 2	64 III + -1				45 I + -1
Hieracium Bauhini								78 V + -1	1 +				
Peucedanum cervaria								8 V r + -1					
Cytisus nigricans								7 IV +	67 IV + -1	5 III +	255 V + -1	6(2) +	90 I 1
Cerasus fruticosa											3 II +		
Anemone silvestris									1269 V + -2	5050 V 3 - 5			
Fragaria viridis									698 IV + -2	23 II + -1	54 III + -1		1 I +
Calamintha vulgaris											303 V + -1	3(1) +	54 V + -1
Cimicifuga europaea											8 IV +	172(3) + -1	3 II +
Clematis recta											202 III + -1	6(2) +	137 II + -1
Vincetoxicum officinale											602 V + -2	.	.
Primula officinalis var. canescens											103 III + -1	6(2) +	3 III +
Lithospermum officinale											53 II + -1	166(1)1	138 III + -1
Digitatis grandiflora											7 IV +	.	.
Campyllum chrysophyllum d												6(2) +	4 III +
Cypripedium calceolus												500(3)1	
Hieracium murorum												172(3) + -1	
Melica nutans												336(3) + -1	
Rubus saxatilis												336(3) + -1	
Senecio aurantiacus												336(3) + -1	
Centaurea rhenana	289 III + -2	14 V +	61 IV + -1	10(3) r + -1	2 I +	3 II +						6(2) +	
Falcaria vulgaris	5 III +	45 III + -1	1 I +	.	2 II +	3 II +							
Veronica spicata	2 II +	2 II +	59 III + -1	6(2) +	.	2 II +							
Dianthus carthusianorum	4 III +	4 III + -1	7 V +	10(3) +	65 III + -1	6 III +							
Galium verum	4 IV +	89 V + -1	224 IV + -1	752(3) + -2	68 IV + -1	40 IV + -1			86 III + -1	46 IV + -1			
Potentilla arenaria	428 V 1	480 V + -2	638 V 1 - 2	500(2)1	500 V 1	4 III +			130 IV + -1	106 IV + -1		3(1) +	
Abietinella abietina d	215 III + -1	83 II + -1	198 III + -2	1999(3)2 - 3	128 III + -1	37 III + -1	854 IV 1 - 2		18 III + -1	82 II + -1			
Calamintha acinos	4 III +	46 III + -1	280 V + -1	.	64 II + -1	35 II + -1	4 III +		291 III + -1	150 II + -2	300 III 1		
Coronilla varia	2 I +	2 II +	.	.	.	3 II +	4 III +		86 III + -1	42 II + -1	5 III +		
Euphorbia cyparissias	147 V + -1	46 III + -2	.	.	.	6 III +	47 IV + -1		119 III + -1	82 II + -1	7 IV +	6(2) +	2 I +
Poa pratensis var. angustifolia	5 V +	88 IV + -1	7 IV +	.	1 I +	37 III + -1	5 III +	75 III +	108 IV + -1	45 III + -1	8 IV +		2 II +
Salvia pratensis	5 III +	167 III + -1	280 V + -1	336(3) + -1	65 III + -1	602 IV + -1	44 III + -1			2 II +			
Stachys recta	142 II 1	146 II + -2	56 II + -1	.	.	35 II + -1			74 II + -1	22 II + -1	202 III + -1	6(2) +	46 I + -1
Medicago falcata	754 V + -1	750 V + -2	.	1332(3)1 - 2	190 IV + -1	235 IV + -1			64 II + -1	62 II + -1	5 III +		
Anthericum ramosum						188 V + -2	76 IV + -2		157 III + -1	124 IV + -1	105 IV +		1 I +
Berberis vulgaris b						292 III + -2	428 V 1				4 II +	169(2) + -1	
c												3(1) +	
Prunus spinosa b						103 III + -1	5 III r + -1	5 V r + -1	169 IV + -1		776 V + -2		499 III + -2
c									2 II +			10(3) +	
Rosa canina b						183 II + -1		143 III r - 1		93 III + -2	800 III 1 - 2		184 IV + -1
c													
Rosa rubiginosa b						6 IV +			6 III +	85 IV + -1	353 V + -1		51 IV + -1
c													2 II +
Rhamnus cathartica b+c						5 III r + -1					451 V + -1		
Crataegus monogyna b						151 II + -2							
c									22 II + -1	42 II + -1	156 V + -1		
Cornus sanguinea b									2 II +				
c											253 V + -1		184 IV + -1
Corylus avellana b													
c											52 II +	6253(3)4	632 III 1 - 3
Evonymus verrucosa b+c											405 IV + -2	333(2) r - 1	2863 V 2 - 4
Pulmonaria obscura													
Poa nemoralis											104 III + -1	.	140 IV + -1
Lilium martagon											103 III + -1	.	91 II + -1
Viburnum opulus b+c											4 II +	166(1)1	4 II +
Asarum europaeum											4 II +	6(2) +	1 I +
Brachypodium silvaticum											52 II + -1	169(2) + -1	45 I + -1
Galeobdolon luteum											.		138 III + -1
Lathyrus vernus											166(1)1		48 III + -1
Lonicera xylosteum b											52 II + -1	.	1 I +
Melampyrum nemorosum											54 III + -1	.	1 I +
Viola mirabilis											50 I 1	3(1) +	181 III + -1
											5 III +	.	92 II + -1
												.	139 IV + -1