ZBIGNIEW PODBIELKOWSKI

ROŚLINNOŚĆ STAWÓW RYBNYCH WOJ. WARSZAWSKIEGO

Die Vegetation der Fischteiche der Woiwodschaft Warszawa

WSTĘP

Gospodarka rybna w regionach pozbawionych naturalnych zbiorników wodnych korzysta ze zbiorników sztucznych, jakimi są odpowiednio urządzone stawy. Jak w każdym tego typu zbiorniku wodnym, tak i tu rozwija się roślinność, której wynikiem działalności jest proces zarastania. Z jednej strony zarastanie jest szkodliwe, ponieważ zmniejsza powierzchnię użytkową stawów i zuboża je w cenne składniki pokarmowe. Z drugiej jednak strony obecność roślinności naczyniowej jest niezbędna do stworzenia odpowiednich warunków biocenotycznych dla żyjących tu organizmów, przede wszystkim — ryb. Znajomość roślinności i jej przemian w procesie zarastania stawów może dać pewne wskazówki dotyczące racjonalnej ich pielęgnacji, co niewątpliwie mogłoby dodatkowo wpłynąć na produkcję rybną. Dlatego moja praca, której celem jest analiza roślinności i procesu zarastania stawów rybnych, poza aspektem czysto poznawczym, może mieć również i znaczenie praktyczne dla stawowej gospodarki rybnej.

Pragnąlbym podziękować doc. dr Izabeli Dąbskiej z Katedry Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za oznaczenie ramienic, dr Dygnie Sobotkowej zaś i Dr Jadwidze Mickiewiczowej z Zakładu Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego — za oznaczenie mszaków. Prof. dr Alinie Skirgiełło serdecznie dziękuję za cenne rady, jakich nie szczędziła mi podczas pisania niniejszej pracy.

Pracę wykonałem w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego.

ROZMIESZCZENIE I TOPOGRAFIA STAWÓW RYBNYCH

Obserwacje nad roślinnością i procesem zarastania przeprowadziłem na 90 kompleksach stawowych (ryc. 1) o łącznej powierzchni około 5000 ha, co w stosunku do całkowitej powierzchni stawów rybnych

w woj. warszawskim, ocenianej na około 6200 ha (Tuszek 1960), wynosi w przybliżeniu 80%. Powierzchnię poszczególnych kompleksów stawowych oceniałem najczęściej szacunkowo w oparciu o mapy 1 : 100 000; tylko dla niektórych obiektów miałem szczegółowe dane. Dlatego wydaje mi się, że liczby uzyskane przeze mnie są zaniżone, a stopień zbadanej przeze mnie powierzchni stawów z pewnością sięga 90%.

Niżej podaję spis przebadanych obiektów wraz z danymi dotyczącymi ich powierzchni i stopnia zarośnięcia (w okresie przeprowadzania obserwacji tzn. w r. 1965 lub 1966); w nawiasie podano liczbę określającą numer danego obiektu (ryc. 1) oraz literowy skrót jego nazwy zastosowany w tabelach fitosocjologicznych i w spisie gatunków.

Bartków (28, Ba), pow. Sokołów-Podlaski. 23 km na południowy wschód od Sokołowa Podlaskiego. Powierzchnia 10 ha. Zarośnięcie duże.

Białki Dolne (43, Bl), pow. Ryki. 0,5 km na południowy zachód od Białek Dolnych. Powierzchnia 15 ha. Zarośnięcie duże.

Broszków (35, Br), pow. Siedlce. 1 km na wschód od Kotunia. Powierzchnia 250 ha. Zarośnięcie niewielkie. Tylko w części stawów (głównie stawy peryferyczne) proces zarastania jest poważnie zaawansowany.

Budy Krępskie (73, By), pow. Garwolin. 3,5 km na południowy wschód od Łaskarzewa. Powierzchnia 40 ha. Stawy wypłycone i zarośnięte. Gospodarki rybnej nie prowadzi się.

Chlewnia (81, Ch), pow. Grodzisk Mazowiecki. 3 km na północny zachód od Grodziska Mazowieckiego. Powierzchnia 50 ha. Zarośnięcie średnie.

Cisie (23, Ci), pow. Siedlce. Między Pierogiem k. Kotunia a Cisiem. Powierzchnia 60 ha. Zarośnięcie średnie. Niektóre stawy wypłycone i zupełnie zarośnięte.

Czołomyje (5, Cz), pow. Siedlce. 1 km na południowy zachód od Czołomyj. Powierzchnia 60 ha. Zarośnięcie średnie.

Dąbia (54, Db), pow. Ryki. 4 km na północny zachód od Ryk. Powierzchnia 6 ha. Zarośnięcie znaczne, część stawów osuszona.

Drozdzi (76, Dr), pow. Grójec. 2 km na południowy zachód od Tarczyna. Powierzchnia 50 ha. Stopień zarośnięcia średni lub znaczny, niektóre stawy osuszone.

Falenty (88, Fa), pow. Piaseczno. Między Raszynem a Falentami. Powierzchnia 95 ha. Zarośnięcie znaczne. Niektóre stawy osuszone, w przebudowie.

Gałki-Chojeczo (32, Ga), pow. Węgrów. 4 km na północny wschód od Boimia. Powierzchnia 65 ha. Stawy osuszone i przygotowywane do przebudowy.

Głusków (87, Gw), pow. Piaseczno. 7 km na południowy zachód od Piaseczna. Powierzchnia 20 ha. Zarośnięcie znaczne lub duże.

Golice (20, Go), pow. Siedlce. 7 km na północny wschód od Siedlec. Powierzchnia 60 ha. Zarośnięcie znaczne. Niektóre stawy wypłycone i zupełnie zarośnięte.

Golebiówka (36, Gl), pow. Mińsk Mazowiecki. 2 km na południowy zachód od Groszek. Powierzchnia 110 ha. Zarośnięcie średnie.

Gostomia (8, Gs), pow. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie. 4 km na wschód od Nowego Miasta nad Pilicą. Powierzchnia 100 ha. Zarośnięcie średnie.

Gójsz (37, Gj), pow. Mińsk Mazowiecki. 5 km na południowy zachód od Groszek. Powierzchnia 10 ha. Zarośnięcie średnie lub znaczne.

Grzegorzewice (62, Gr), pow. Grodzisk Mazowiecki. 7 km na wschód od Mszczonowa. Powierzchnia 45 ha. Zarośnięcie średnie. Część stawów osuszona, w przebudowie.

Jadów (4, Jd), pow. Wołomin. 2 km na południe od Jadowa. Powierzchnia 60 ha. Zarośnięcie średnie lub znaczne. Część stawów osuszona.

- Jagiela (57, Jg), pow. Ryki. 2 km na zachód od Trojanowa. Powierzchnia 20 ha. Zarośnięcie znaczne.
- Jagodne (40, Jg), pow. Ryki. 3 km na północny wschód od Kłoczewa. Zarośnięcie niewielkie. Kilka stawów spłyconych i silnie zarośniętych.
- Jarczew — Nowy Świat (41, JN), pow. Łuków, woj. lubelskie. 7 km na wschód od Żelechowa. Powierzchnia ok. 10 ha. Stawy osuszone, część przygotowana do przebudowy.
- Jarczew — Pod Lisem (42, JP), pow. Łuków, woj. lubelskie. 7 km na wschód od Żelechowa. Powierzchnia 5 ha. Stawy zaniedbane, w znacznym stopniu zarośnięte.
- Jarnice (17, Ja), pow. Węgrów. 0,5 km na północ od Jarnic. Powierzchnia 14 ha. Zarośnięcie znaczne. Gospodarki rybnej nie prowadzi się.
- Jegiel (75, Je), pow. Wyszków. 12 km na północny wschód od Wyszkowa. Powierzchnia 65 ha. Zarośnięcie średnie, tylko stawy peryferyczne w części północno zachodniej są spłycone i bardzo zarośnięte.
- Jezioro (79, Jz), pow. Błonie. Na wschód od Leszna. Powierzchnia 12 ha. Zbiornik pół-naturalny, podzielony groblami na mniejsze partie. Zarośnięcie duże, tylko miejscami widoczne lustro wody.
- Karolówka — Kocerańska Wólka (61, Kw), pow. Grójec. 7 km na południe od Tarczyna. Powierzchnia 55 ha. Zarośnięcie znaczne.
- Klimonty (6, Kl), pow. Siedlce. 1 km na południe od Mord. Powierzchnia 270 ha. Większość stawów zapuszczona, zarastająca lub zarośnięta.
- Kłoczew (39, Kł), pow. Ryki. Koło Kłoczewa. Powierzchnia 2 ha. Zarośnięcie średnie.
- Kobyła Wola (50, Kb), pow. Garwolin. Na północny zachód od Kobylej Woli. Powierzchnia 12 ha. Zarośnięcie znaczne.
- Korytnica (51, Kr), pow. Ryki. Koło Korytnicy. Powierzchnia 7 ha. Zarośnięcie znaczne, niektóre partie stawów peryferycznych silnie spłycone i zarośnięte.
- Koty (18, Ko), pow. Siedlce. 9 km na południe od Siedlec. Powierzchnia 85 ha. Stawy osuszone i użytkowane jako pastwiska i łąki.
- Kownata (24, Kw), pow. Siedlce. 3 km na południe od Żeliszewa. Powierzchnia 65 ha. Zarośnięcie znaczne. Niektóre stawy spłycone, zarośnięte i zmienione na pastwiska.
- Krępa (63, Kp), pow. Mława. 10 km na zachód od Mławy. Powierzchnia 20 ha. Stawy osuszone i zmienione na pastwiska.
- Książenice (83, Kż), pow. Grodzisk Mazowiecki. 5 km na południowy wschód od Grodziska Mazowieckiego. Zarośnięcie średnie. Niektóre stawy osuszone i zmienione na łąki.
- Kulak (11, Ku), pow. Siedlce. 2 km na południowy wschód od Seroczyna. Powierzchnia 50 ha. Zarośnięcie niewielkie.
- Lesznówola (60, Ls), pow. Grójec. 5 km na północ od Grójca. Powierzchnia 110 ha. Zarośnięcie średnie. Część stawów osuszona i zmieniona na pastwiska.
- Łazów (16, Ła), pow. Sokołów Podlaski. 1 km na zachód od Łazowa. Powierzchnia 15 ha. Zarośnięcie średnie lub znaczne.
- Łysów (26, Ły), pow. Łosice. 10 km na północ od Łosic. Powierzchnia 25 ha. Zarośnięcie znaczne.
- Maścibody (19, Ma), pow. Siedlce. 5 km na południe od Siedlec. Powierzchnia 120 ha. Tylko część stawów z wodą i te są mało zarośnięte. Reszta osuszona i w przebudowie.
- Mieczysławowice (48, Mc), pow. Ryki. Koło Trzcianki. Powierzchnia 2 ha. Stawy osuszone i całkowicie zarośnięte.
- Moszna (80, Mn), pow. Pruszków. 3 km na północny zachód od Pruszkowa. Powierzchnia 50 ha. Zarośnięcie średnie lub znaczne.

- Mroków (77, Mk), pow. Piaseczno. Na północ od Mrokowa. Powierzchnia 30 ha. Stawy zaniedbane i zapuszczone. Zarośnięcie duże.
- Mroków (52, Mr), pow. Ryki. 3,5 km na zachód od Woli Zadybskiej. Powierzchnia 10 ha. Zarośnięcie średnie.
- Niwiski (22, Ni), pow. Siedlce. 1 km na zachód od Niwisek. Powierzchnia 20 ha. Stawy zaniedbane i prawie zupełnie zarośnięte. Gospodarkę rybną prowadzi się na bardzo małą skalę.
- Nowinki (3, Nk), pow. Wołomin. 2,5 km na zachód od Jadowa. Powierzchnia 10 ha. Dwa stawy, przegrodzone groblą, powstałe z naturalnego zbiornika. Bardzo intensywne zarastanie odbrzegowe.
- Nowodwór (1, Nr), pow. Mińsk Mazowiecki. 3 km na południowy zachód od Sienicy. Powierzchnia 30 ha. Zarośnięcie średnie.
- Nowodwór — Wólka Sobieszewska (47, Nd, Wk), pow. Ryki. Między Nowodworem a Podlodowem. Powierzchnia 200 ha. Zarośnięcie znaczne. Są miejsca, gdzie prowadzi się intensywną pielęgnację, ale są również stawy zupełnie spłycone i zarośnięte.
- Oleksianka (13, Ol), pow. Mińsk Mazowiecki. 5 km na zachód od Seroczyna. Powierzchnia 25 ha. Stawy zupełnie zaniedbane, większość ich zarośnięta jest zupełnie. Gospodarki rybnej nie prowadzi się.
- Opypy (82, Op), pow. Grodzisk Mazowiecki. 5 km na południowy wschód od Grodziska Mazowieckiego. Powierzchnia 20 ha. Zarośnięcie znaczne. Niektóre stawy spłycone i prawie całkowicie zarośnięte.
- Otałążka (7, Ot), pow. Grójec. 4 km na południowy wschód od Mogielnicy. Powierzchnia 5 ha. Wiele stawów, zupełnie lub prawie zupełnie zarośniętych. Niektóre osuszone i zmienione na pastwiska. Gospodarki rybnej nie prowadzi się.
- Pęcice (85, Pc), pow. Pruszków. Na południe od Pruszkowa. Powierzchnia 80 ha. Zarośnięcie średnie, miejscami znaczne.
- Pięgłowo (65, Pg), pow. Mława. 0,5 km na wschód od Pięgłowa. Powierzchnia 45 ha. Zarośnięcie znaczne.
- Podrudzie (56, Pd), pow. Mińsk Mazowiecki. 5 km na południowy zachód od Mińska Mazowieckiego. Powierzchnia 4 ha. Zarośnięcie średnie.
- Podzamecze (72, Pz), pow. Garwolin. 2,5 km na północny wschód od Maciejowic. Powierzchnia 25 ha. Zarośnięcie duże.
- Ponikiew Duża (67, Pw), pow. Ostrołęka. 0,5 km na północny wschód od Ponikwi Dużej. Powierzchnia 15 ha. Zarośnięcie średnie.
- Przekop (29, Pr), pow. Łosice. 2 km na północ od Korczewa. Powierzchnia 30 ha. Stawy zaniedbane, o znacznym stopniu zarośnięcia; niektóre osuszone i przekształcone w pastwiska.
- Ruda (55, Rd), pow. Mińsk Mazowiecki. 2 km na południe od Dębe Wielkie. Powierzchnia 100 ha. Zarośnięcie średnie. Część stawów osuszona, w przebudowie.
- Rudka (14, Ra), pow. Mińsk Mazowiecki. 5 km na północny zachód od Oleśnicy. Powierzchnia 120 ha. Zarośnięcie znaczne, miejscami bardzo duże. Niektóre stawy czyszczone lub w przebudowie.
- Rudnik (27, Ru), pow. Łosice. 0,5 km na wschód od Rudnika. Powierzchnia 35 ha. Większość stawów silnie zarośnięta.
- Rumoka (64, Rm), pow. Mława. 2 km na południowy wschód od Rumoki. Powierzchnia 70 ha. Zarośnięcie średnie.
- Ryczyca (33, Ry), pow. Mińsk Mazowiecki. 1 km na południowy wschód od Grozsek. Powierzchnia 50 ha. Zarośnięcie średnie. Niektóre stawy osuszone, w przebudowie.

- Ryki (53, Rk), pow. Ryki. Koło Ryk. Powierzchnia 200 ha. Zarośnięcie średnie, miejscami znaczne.
- Sarny (44, Sr), pow. Ryki. Koło Sarn. Powierzchnia 45 ha. Zarośnięcie znaczne, niektóre stawy zupełnie spłycone.
- Sierskowola (45, Sw), pow. Ryki. Koło Sierskowoli. Powierzchnia 10 ha. Stawy wypłycone i silnie zarośnięte.
- Sinołęka (34, Sl), pow. Węgrów. 3 km na zachód od Boimia. Powierzchnia 40 ha. Tylko kilka stawów z wodą, reszta osuszona i przekształcona na pastwiska.
- Skrzeki (12, Sk), pow. Mińsk Mazowiecki. 5 km na zachód od Borek. Powierzchnia 30 ha. Prawie wszystkie stawy osuszone i zmienione na łąki.
- Sobieszyn (49, Sb), pow. Ryki. Koło Sobieszyna. Powierzchnia 115 ha. Zarośnięcie średnie lub niewielkie, chociaż są partie silnie wypłycone i prawie całkowicie zarośnięte.
- Stawinoga (2, St), pow. Pułtusk. 9 km na północ od Serocka. Powierzchnia 110 ha. Tylko część stawów objęta gospodarką rybną, reszta zarastająca lub nawet spłycona i zupełnie zarośnięta.
- Sucha (31, Su), pow. Węgrów. 4 km na północny wschód od Boimia. Powierzchnia 50 ha. Zarośnięcie znaczne. Niektóre stawy wypłycone i zupełnie zarośnięte.
- Szczeglacin (30, Ss), pow. Łosice. 2 km na północny zachód od Korczewa. Powierzchnia 110 ha. Zarośnięcie znaczne.
- Szostek (15, Sz), pow. Siedlce. 5 km na północny wschód od Oleśnicy. Powierzchnia 120 ha. Zarośnięcie dość duże. Niektóre stawy spłycone i zupełnie zarośnięte.
- Trojanów (58, Tr), pow. Ryki. Koło Trojanowa. Powierzchnia 65 ha. Zarośnięcie średnie lub niewielkie. Część stawów osuszona.
- Ułęż (50, Uł), pow. Ryki. 0,5 km na południe od Ułęża Górnego. Powierzchnia 130 ha. Zarośnięcie średnie.
- Walendów (78, Wl), pow. Pruszków. 3,5 km na zachód od Sękocina. Powierzchnia 50 ha. Zarośnięcie średnie. Niektóre stawy osuszone.
- Wapnica (71, Wp), pow. Garwolin. 2 km na wschód od Maciejowic. Powierzchnia 80 ha. Stawy osuszone lub spłycone i całkowicie zarośnięte.
- Wilga (74, Wg), pow. Garwolin. Na południe od Wilgi. Powierzchnia 7 ha. Stawy dobrze zagospodarowane. Tylko niektóre z nich są silnie spłycone, i częściowo zarośnięte.
- Wodynie (10, Wo), pow. Siedlce. Na północny zachód od Wodyń. Powierzchnia 40 ha. Zarośnięcie znaczne. Niektóre stawy osuszone i zamienione na pastwiska.
- Wola Rowska (70, Wa), pow. Garwolin. Na północny wschód od Woli Rowskiej. Powierzchnia 15 ha. Zarośnięcie znaczne. Niektóre partie spłycone i zupełnie zarośnięte. Część stawów osuszona, w przebudowie.
- Wola Wodyńska (90, WW), pow. Siedlce. 4 km na wschód od Wodyń. Powierzchnia 2 ha. Stawy zaniedbane i zarośnięte. Gospodarki rybnej nie prowadzi się.
- Woźniki Cuchleby (25, Wz), pow. Łosice. 0,5 km na południe od Cuchlebow. Powierzchnia 110 ha. Część stawów dość silnie zarośnięta, część — w przebudowie.
- Wrzósów (69, Wr), pow. Garwolin. 3 km na północny wschód od Głoskowa. Powierzchnia 5 ha. Zarośnięcie i spłylenie duże. Gospodarki rybnej nie prowadzi się.
- Wymysłów (46, Wy), pow. Ryki. 1 km na północny zachód od Sędowic. Powierzchnia 20 ha. Stawy osuszone. Na ich miejscu łąki kośne.
- Zaborów (89, Zr), pow. Gostynin. 2 km na zachód od Sokołowa. Powierzchnia 2 ha. Stawy zaniedbane, częściowo osuszone i zarośnięte. Gospodarki rybnej nie prowadzi się.
- Zalesie (28, Zl), pow. Ryki. 3,5 km na północny wschód od Ryk. Powierzchnia 5 ha. Zarośnięcie duże.

Zawiesiuchy (9, Za), pow. Mińsk Mazowiecki. 5 km na północny zachód od Pustelnika. Tylko niewielka część stawów zarośnięta, większa część dobrze utrzymana; niektóre osuszone i w przebudowie.

Zwola (68, Zw), pow. Garwolin. Na zachód od Zwoli. Powierzchnia 5 ha. Zarośnięcie duże.

Zabieniec (86, Żb), pow. Piaseczno. 2 km na południe od Piaseczna. Powierzchnia 70 ha. Zarośnięcie niewielkie. Tylko niektóre stawy miejscami spłycone i dość silnie zarośnięte.

Zabokliki (21, Ża), pow. Siedlce. 2 km na północny wschód od Siedlec. Powierzchnia 190 ha. Zarośnięcie średnie. Niektóre stawy wypłycone i silnie zarośnięte.

Żelazna (66, Żl), pow. Przasnysz. 2,5 km na wschód od Żelaznej. Powierzchnia 45 ha. Zarośnięcie znaczne. Część stawów spłycona i zupełnie zarośnięta.

Zółwin (84, Żl), pow. Pruszków. Na południe od Podkowy Leśnej. Powierzchnia 7 ha. Zarośnięcie niewielkie.

Stawy rybne są z reguły sztucznymi zbiornikami wodnymi, utworzonymi przez człowieka w celu hodowli ryb.

Położone są najczęściej w naturalnych zagłębieniach terenu, w dolinach rzecznych, na łagodnych zboczach; niekiedy zakładane są w terenie

Ryc. 1. Rozmieszczenie kompleksów stawów rybnych w woj. warszawskim
Objaśnienie numeracji w tekście

Dislokation der Fischteichkomplexe in der Woiwodschaft Warszawa
Erläuterung der Nummer im Texte

zupełnie płaskim, wówczas istnieją jednak pewne komplikacje z doprowadzeniem lub odprowadzeniem wody.

Powstają one zasadniczo przez piętrzenie wód strumienia lub rzeki za pomocą grobli, wskutek czego następuje rozlew wody na odpowiedniej, przygotowanej do tego celu przestrzeni, albo przez doprowadzenie wody z naturalnego cieką za pomocą specjalnego kanału doprowadzającego ją do uprzednio przygotowanych zbiorników. Stawy czerpiące wodę z cieków naturalnych mogą być położone po jednej lub po dwóch stronach tego cieką i zasilane odpowiednim systemem kanałów (ryc. 2, 3).

Ryc. 2. Usytuowanie stawów po obu stronach rzeki
Beiderseits des Flusses gelegene Teiche

Ryc. 3. Usytuowanie stawów po lewej stronie rzeki
Am linken Flussufer gelegene Teiche

Ryc. 4. Stawy łańcuskowe

A — widok z góry; B — profil

Kettenteiche;

A — Sicht von oben; B — Profil

Ryc. 5. Kompleks stawowy czerpiący wodę ze stawów zbiorczych

A — widok z góry; B — profil

Teichkomplex aus Sammelbecken gespeist

A — Sicht von oben; B — Profil

Podobna sytuacja może kształtować się w przypadku sztucznego cieku. Stawy mogą również być włączone bezpośrednio w koryto rzeki lub strumienia i położone szeregowo, jeden za drugim (ryc. 4). Pobierają one wówczas wodę kolejno jeden od drugiego. System ten ma tę niedogodność, że nie pozwala na odizolowanie któregoś ze stawów. W nowoczesnym budownictwie stawowym zakłada się takie doprowadzenie i od-

prowadzenie wody, aby każdy staw można było użytkować jako samodzielłą jednostkę.

Zasilanie stawów wodą odbywa się za pomocą systemu kanałów doprowadzających — doprowadzalników. Leżą one wyżej (często przebiegają w wałach) niż znajdujące się zwykle w wykopach rowy odprowadzające wodę — odprowadzalniki. Istnieją również stawy zasilane wodami opadowymi, pochodzącymi głównie ze stopionych śniegów, które spływają po zboczu gromadząc się w specjalnych stawach zbierających wodę, znajdujących się u stóp zbocza, z których rozprowdza się ją dalej (ryc. 5).

Stawy budowane są zwykle po kilka lub kilkanaście, tworząc mniejsze lub większe kompleksy; tego wymagają założenia gospodarki rybnej.

Wielkość powierzchni poszczególnych stawów bywa bardzo różna i zależna jest od ich przeznaczenia; waha się ona w granicach od jednego ara do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu hektarów. Natomiast sumaryczna powierzchnia stawów w kompleksach wynosi od kilku do kilkuset hektarów.

Kształt stawów bywa bardzo różny i zależy od konfiguracji terenu oraz różnych warunków lokalnych; na ogół zbliżony jest do jakiegoś wieloboku, rzadko zupełnie nieregularny.

Głębokość stawów, w zależności od ich przeznaczenia, bywa różna, nie przekracza jednak 2 m.

Dno stawów jest płaskie, wyrównane, pokryte niezbyt gęstą siecią rowów osuszających, łączących się zwykle w jeden kanał spustowy zakończony mnichem (ryc. 6, 7). Obecność i rozmieszczenie tych rowów zaznacza się wyraźnie w stawach spłyconych o dość daleko posuniętym procesie zarastania. W miejscach, gdzie one przebiegają, dość długo istnieje odkryte lustro wody; miejsca te, zarastające stopniowo roślinnością złożoną zwykle z gatunków wodnych i wysokich bylin szuwarowych (*Typha latifolia*, *T. angustifolia*, *Phragmites communis*, *Sparganium ramosum*), wybitnie różnią się od turzycowisk położonych obok na miejscach bardziej spłyconych.

Stawy buduje się zazwyczaj przez otoczenie przewidzianego terenu groblami i doprowadzenie wody do tak powstałych zbiorników. W zależności od konfiguracji terenu stawy mogą być otoczone groblami ze wszystkich stron lub tylko częściowo ogroblowane. Niekiedy wykorzystuje się jako stawy rybne również naturalne zbiorniki wodne, dokonując pewnych, korygujących ich strukturę zmian, jak: wyrównanie dna, lokalne ogroblowanie itp.

Groble okalające poszczególne stawy mają w przekroju poprzecznym postać trapezu (ryc. 8). Wymiary ich są różne i zależą od materiału, z którego grobla jest usypana oraz od głębokości stawu. Wysokość ich z reguły bywa taka, by górowały nad powierzchnią wód co najmniej

40—60 cm. W przypadku stawów o bardzo dużej powierzchni groble muszą być znacznie wyższe, gdyż podczas silnego falowania może nastąpić ich rozmycie i przerwanie. Szerokość korony grobli wynosi zwykle 1,5—2 (3) m, przy czym bardzo szerokie groble wykorzystywane bywają nawet do komunikacji kołowej. Nachylenie grobli, tzn. stosunek jej

Ryc. 6. System sieci rowów osuszających
a — groble; b — rów główny; c — ograbie;
l — lokalne zagłębienia; e — rowy boczne;
f, g — młochy. Z Tuszki, nieco zmienione

Netzsystem der Entwässerungsgräben

a — Damm; b — Hauptgraben; c — Randgräben;
d — lokale Vertiefungen, e — Nebengräben;
f, g — Wassermönche. Nach Tuszko, etwas
geändert

Ryc. 7. Rowy osuszające na dnie stawu (Zawiesiuchy)
Entwässerungsgräben im Teichboden (Zawiesiuchy)

wysokości do rzutu poziomego skarpy, bywa różne i zależy głównie od materiału, z którego zbudowana jest grobla, oraz od wielkości i głębokości stawu. Skarpy grobli obłożone są zwykle darnią w celu zmniejszenia przesiąkania wody i erozji brzegów.

Ryc. 8. Przekrój poprzeczny przez groblę

a — dno; b — rów osuszający; c — ława; d — skarpa wewnętrzna (odwodna); e — korona; f — wysokość; g — podszwa (stopa); h — skarpa zewnętrzna (odpowietrzna); i — rzut skarpy na podszwę; j — rów odsiąkowy (odprowadzalnik). Z Tuszki nieco zmienione

Querschnitt durch den Damm

a — Boden; b — Entwässerungsgraben; c — Bank; d — innere Böschung (wasserseits); e — Krone; f — Höhe; g — Sohle (Fuss); h — äussere Böschung (luftseits); i — Projektion der Böschung auf die Sohle; j — Sauggraben (Abführgraben). Nach Tuszko, etwas geändert

Do napuszczania wody lub spuszczenia jej ze stawu służą tzw. mnichy. Mnichem nazywany jest system dwóch przewodów wodnych zbudowanych z drewna, betonu lub żelaza i połączonych ze sobą pod kątem prostym. Część pionowa nosi nazwę stojaka, część pozioma — leżaka. W stojaku umieszczone są stawidła, którymi reguluje się wpust ewentualnie spływ wody.

ZAKRES I METODA BADAŃ

Obserwacje nad roślinnością i zarastaniem stawów rybnych prowadziłem w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych (od lipca do września) 1965 i 1966 roku. Badania przeprowadzane w tym kierunku polegały na zebraniu danych dotyczących układu strefowego roślinności, porównywaniu roślinności różnych pod względem wiekowym stawów oraz na możliwie dokładnym przeanalizowaniu roślinności z fitosocjologicznego punktu widzenia.

Opracowanie struktury socjalnej roślinności oparłem na ogólnie przyjętej w Polsce metodzie Braun-Blanqueta (Braun-Blanquet 1951; Tüxen i Preising 1942; Ellenberg 1956; Szata roślinna Polski 1959; Scamoni 1967). Powierzchnia zdjęć fitosocjologicznych zależała od warunków lokalnych i wynosiła od kilku do kilkudziesięciu m². Ogółem wykonałem ponad 550 zdjęć, z czego około 350 wykorzystałem do zestawień tabelarycznych; reszta posłużyła mi jako materiał przy opracowaniu tekstowym.

Klasyfikację wyróżnionych zbiorowisk roślinnych oparłem na pracach Braun-Blanqueta (1951), Tüxena (1937, 1955, [1955],

[1958]), Knappa (1948), Scamoniego (1955, 1967), Oberdorfera (1949, 1957), Miyawaki i J. Tüxena (1960), Kępczyńskiego (1960, 1965), Poli i J. Tüxena (1960), Dąbskiej (1961), Donselaara (1961), Ellenberga (1963) i Balátovéj-Tulačkovéj (1963). Przy zestawieniu zbiorowisk posłużyłem się systemem podanym przez Matuszkiewicza (1962).

W tych przypadkach, gdy zbiorowiska — ze względu na dużą liczbę różnych elementów — nie można było zaklasyfikować do jakiejś jednostki systematycznej, podawałem tabelkę syntetyczną, ilustrującą jego strukturę socjalną.

W celu lepszego zobrazowania budowy omawianych zbiorowisk roślinnych podawałem ich spektra morfologiczno-biologiczne, oparte na wprowadzonej przeze mnie klasyfikacji (Podbielkowski 1960, 1967). W spektrach tych podaję procentowy udział poszczególnych grup morfologiczno-biologicznych według ich wartości pokrycia. Według wspomnianej klasyfikacji morfologiczno-biologicznej podzieliłem rośliny na następujące grupy:

1. Drzewa — D
2. Krzewy — K
3. Krzewinki — Ki
4. Rośliny zielne, występujące na podłożu trwałym, niekiedy okresowo zanurzone, których organy asymilujące znajdują się zawsze w środowisku powietrznym — A
 - a) byliny — At
 - kwiatowe — kłaczowe i rozłogowe — Atr
 - kwiatowe — kępkowe — Atp
 - mszaki — B-At
 - b) roczne lub dwuletnie — As
5. Rośliny wodne lub takie lądowe, których organy asymilujące pływają na powierzchni wody (np. *Agrostis stolonifera*) — H
 - a) rośliny, których organy asymilacyjne pływają na powierzchni wody lub wyrastają ponad nią — Ho; zaliczam tu również część mszaków — B-Ho
 - α) przytwierdzone do dna — Hoz
 - β) swobodnie pływające — Hon
 - b) rośliny, których organy asymilujące znajdują się pod wodą — Hu; zaliczam tu również część mszaków — B-Hu
 - α) przytwierdzone do dna — Huz
 - β) swobodnie pływające — Hun
6. Glony — G.

ZBIOROWISKA ROŚLINNE

Przy analizie roślinności stawów rybnych należy zwrócić uwagę na jej wielką różnorodność mimo niewielkiej liczby budujących ją gatunków.

Różnorodność ta wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim występujące tu zbiorowiska są bardzo dynamiczne i zmieniają się w bardzo szybkim tempie. W krótkim okresie czasu, niekiedy w ciągu 1—2 sezonów wegetacyjnych, zachodzą w nich zasadnicze zmiany ilościowe i jakościowe. Ponieważ są to zbiorowiska ubogie w gatunki, dużą rolę odgrywają w nich zmiany ilościowe poszczególnych komponentów, ponieważ decydująco wpływają nie tylko na strukturę zbiorowiska, ale i na bieg sukcesji. Często spotkać można zgola różne strukturalnie zbiorowiska, lecz o składzie gatunkowym do siebie zbliżonym. Bardzo pospolitym zjawiskiem jest kształtowanie się jednogatunkowych skupień roślin, przy czym obok siebie mogą występować różne skupienia, tworząc bardzo urozmaiconą mozaikę. Takie jednogatunkowe zbiorowiska budowane są zwykle przez gatunki wyróżniające się wielką ekspansywnością i zdolne do opanowania w stosunkowo krótkim czasie znacznych obszarów. Zbiorowiska te, kontaktując się z sobą, przenikają się nawzajem, wchodzą jedno w drugie, wskutek czego następuje często gruntowne przemieszanie ich komponentów. W ten sposób ukształtowane zbiorowiska są bardzo pospolite i pokrywają często duże przestrzenie. Z fitosocjologicznego punktu widzenia są to jednak płaty nietypowe, nie dające przyporządkować się do określonych jednostek systematycznych. Dlatego, starając dostosować się do wymogów fitosocjologicznej klasyfikacji zbiorowisk, omówiłem tylko te zbiorowiska, których przynależność systematyczna była możliwa do ustalenia. Przegląd wyróżnionych jednostek podaje niżej:

Klasa: *Lemnetalia* W. Koch et R. Tx. 1954

Rząd: *Lemnetalia* W. Koch et R. Tx. 1954

Związek: *Lemnion minoris* W. Koch et R. Tx. 1954

Zespół: *Lemna minor-Lemna trisulca* R. Tx. (1955) 1956

Wolffietum arrhizae Miyawaki et J. Tx. 1960

Riccietum fluitantis Slavnič 1956

Salvinieto-Spirodeletum polyrrhizae Slavnič 1956

Jednogatunkowe skupienia *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza*,
Salvinia natans i in.

Klasa: *Potametea* R. Tx. et Prsg 1942

Rząd: *Potametalia* W. Koch 1926

Związek: *Eu-Potamion* (W. Koch 1926) Oberd. 1957

Potametum lucentis Hueck 1931

Związek: *Nymphaeion* Oberd. 1957

Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 1926

Hydrocharo-Stratiotetum (Van Langendock 1935) Krusem. et Vlieger 1937

Jednogatunkowe skupienia *Stratiotes aloides*, *Myriophyllum verticillatum*, *Elodea canadensis* i in.

- Rząd: *Charetalia* Fukarek 1961
 Związek: *Charion fragilis* Krausch 1964
Charetum contrariae Corillion 1957 (zbiorowisko zbliżone do tego zespołu)
 Jednogatunkowe skupienia ramienic
- Klasa: *Phragmitetea* R. Tx. et Prsg 1942
 Rząd: *Phragmitetalia eurosibirica* (W. Koch 1926) R. Tx. et Prsg 1942
 Związek: *Phragmition* W. Koch 1926
Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926
 Zbiorowisko z *Acorus calamus*
Glycerietum maximae Hueck 1931
Oenantho-Rorippetum Lohmeyer 1950
Scirpetum maritimi (Christ. 1934) R. Tx. 1937
- Związek: *Magnocaricion* W. Koch 1926
Caricetum elatae W. Koch 1926
Caricetum paniculatae Wang. 1916
 Zbiorowisko z *Carex elongata* (częściowo)
Caricetum inflato-vesicariae W. Koch 1926
Caricetum gracilis (Graeb.-Hueck 1931) R. Tx. 1937
Caricetum acutiformis Sauer 1937
Caricetum ripariae Soó 1928
Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931
Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Siss. 1942
Thelypterideto-Phragmitetum Kuiper 1957
 Zbiorowisko z *Equisetum limosum*
 Zbiorowisko szuwarowo-łąkowe (częściowo)
 Zbiorowisko rdestowo-szuwarowe (częściowo)
- Klasa: *Molinio-Arrhenatheretea* R. Tx. 1937
 Rząd: *Molinietalia* W. Koch 1926
 Zbiorowisko szuwarowo-łąkowe (częściowo)
 Zbiorowisko z *Calamagrostis canescens*
- Klasa: *Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et R. Tx. 1943
 Rząd: *Alnetalia glutinosae* R. Tx. 1937
 Związek: *Alnion glutinosae* (Malc. 1929) M. Drees 1936
Salici-Franguletum Malc. 1929
Carici elongatae-Alnetum (W. Koch 1926) R. Tx. et Bodeaux 1955
- Klasa: *Bidentetea tripartiti* R. Tx., Lohm., Prsg 1950
 Rząd: *Bidentetalia tripartiti* Br.-Bl. et R. Tx. 1943
 Zbiorowisko szuwarowo-łąkowe (częściowo)
 Zbiorowisko z *Polygonum persicaria* (częściowo)
- Klasa: *Plantaginetea maioris* R. Tx. et Prsg 1950
 Rząd: *Plantaginetalia maioris* R. Tx. (1947) 1950
 Zbiorowisko *Rumex maritimus-Alopecurus geniculatus*
 Zbiorowisko z *Polygonum persicaria* (częściowo)

W stawach rybnych najliczniej reprezentowane są zbiorowiska wodne i błotne. Występują one w ogromnej większości stawów. Niewielkie wyjątki stanowią tylko stawy zupełnie zarośnięte lub takie, które po osuszeniu przeznaczono na pastwiska lub uprawy polowe.

Zbiorowiska wodne lokują się zwykle w pewnej odległości od brzegów, jednak nie jest to regułą, ponieważ spotkać je można również w bezpośrednim sąsiedztwie grobli. Trwają zwykle długo, od pierwszych stadiów zasiedlania przestrzeni wodnej aż po późne stadia lądowacenia zbiornika. Niezbędnym warunkiem umożliwiającym występowanie ich jest obecność wody; jednak w pewnych, wyjątkowych przypadkach niektóre gatunki mogą bytować również i na podłożu stałym, tworząc często charakterystycznie wykształcone formy lądowe. Ta długotrwałość bytowania przedstawicieli roślinności wodnej jest przyczyną występowania wielu gatunków wodnych w obrębie zbiorowisk bardziej zaawansowanych rozwojowo, wśród których mogą tworzyć samoistne enklawy lub mieszać się z nimi dość gruntownie.

Roślinność wodna tworzy w zasadzie dwie warstwy: nawodną i podwodną, z tym że niektóre gatunki mogą brać udział w budowaniu obu warstw. Jedne zbiorowiska, zakotwiczone dzięki obecności gatunków zakorzenionych w dnie, są nieruchliwe i występują stale w jednym miejscu. Inne zaś, pozbawione zakotwiczących je roślin, wykazują dużą ruchliwość i pod wpływem wiatru i falowania mogą z łatwością zmieniać miejsce swego występowania. Często jednak ruchliwość ta zostaje zahamowana przez elementy obce, nie należące do roślinności wodnej — głównie rośliny szuwarowe, które przerastając te zbiorowiska zakotwiczą je.

Zbiorowiska wodne odgrywają dużą rolę w zarastaniu stawów rybnych. One to właśnie, wespół z glonami, rozpoczynają ten proces i biorą w nim udział prawie do jego późnych stadiów. Produkują bardzo duże ilości masy organicznej, która wprawdzie dość szybko ulega rozkładowi, tym niemniej jednak przyczynia się znacznie do spływania zbiornika.

Roślinność wodną stawów rybnych budują zbiorowiska dwóch klas — *Lemnetea* i *Potametea*. Należy tu jednak zaznaczyć, że zbiorowiska w postaci dobrze rozwiniętych zespołów nie występują często. Zwykle są to albo zespoły fragmentarycznie rozwinięte albo ich facje, albo wreszcie mieszanina różnych elementów, która bardzo często nie daje się zaklasyfikować nawet do jednostek systematycznych wyższego rzędu, ponieważ udział komponentów bywa praktycznie jednakowy.

Jednogatunkowe skupienia tworzy wiele gatunków, jak np.: *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza*, *Salvinia natans*, *Stratiotes aloides*, *Myriophyllum verticillatum*, *Elodea canadensis*, *Ceratophyllum demersum*, *Potamogeton lucens*, *P. pusillus*, *P. pectinatus*, *P. natans*, *Polygonum amphibium*, *Batrachium circinatum* i in.

Zbiorowiska zbudowane z mieszaniny komponentów różnych pod względem przynależności systematycznej tworzą przedstawicieli klas: *Lemnetea*, *Potametea* i *Phragmitetea*.

Mimo niesprecyzowanej przynależności systematycznej zbiorowiska te są jednak jak najbardziej godne uwagi, ponieważ występują bardzo pospolicie, pokrywają duże przestrzenie i biorą bardzo aktywny udział w lądowaceniu zbiornika.

Zbiorowiska glonów

Występowanie zbiorowisk glonów w stawach rybnych jest zjawiskiem pospolitym. Pojawiają się one bardzo wcześnie, w inicjalnych stadiach zarastania stawów i trwają bardzo długo, aż po końcowe stadia lądowacenia. Przede wszystkim zasiedlają one przestrzeń wodną. Występują tu głównie zielenice oraz sinice; wśród tych ostatnich bardzo pospolitym gatunkiem jest *Aphanizomenon flos-aquae*. Również często jednak można obserwować naloty okrzemek na częściach roślin zanurzonych w wodzie. Większość glonów zasiedlających stawy rybne to gatunki α - i β -mezo-saprobowe.

Nierzadko spotkać można również ramienice, które tworzą niekiedy rozległe, podwodne płyty. Zbiorowiska tych glonów omówione są oddzielnie (str. 34).

W zarastaniu stawów rybnych glony nie odgrywają większej roli. Mimo że występują niekiedy w bardzo dużych ilościach, produkowana przez nie masa organiczna ulega bardzo szybkiemu rozkładowi.

W gospodarce stawowej natomiast rola ich jest bardzo duża. Większość glonów stanowi bazę pokarmową zoocenozy stawu; obecność niektórych z nich, np. sinic pojawiających się masowo, bywa jednak wręcz szkodliwa.

Zespół *Lemna minor*-*Lemna trisulca* R. Tx. (1955) 1956

Zespół *Lemna minor*-*Lemna trisulca* budują głównie trzy gatunki: *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza* i *Lemna trisulca*, przy czym stosunki ilościowe między nimi mogą kształtować się bardzo różnie; największą stałością wyróżniają się dwa pierwsze gatunki.

Wskutek prymitywnej struktury, łatwości mieszania się z innymi zbiorowiskami i dużej labilności w zestawie gatunkowym zbiorowisko to przy ujmowaniu go w randze zespołu autonomicznego budzi pewne obiekcje. W przypadkach gdy występują licznie gatunki towarzyszące z klasy *Potametea* lub *Phragmitetea*, ranga jego jako zespołu autonomicznego zostaje wyraźnie zachwiana na rzecz zbiorowisk ze wspomnianych klas.

Zespół *Lemna minor*-*Lemna trisulca* tworzy jedno- lub dwuwarstwowe, pływające ławice. W pierwszym przypadku złożone one są z obu komponentów pływających na powierzchni wody (*Lemna minor* i *Spirodela polyrrhiza*), w drugim zaś — z gatunków nawodnych (*Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza*) i podwodnych (*Lemna trisulca*). W zależności więc od składu gatunkowego spektrum morfologiczno-biologiczne tego zbiorowiska może przedstawiać się różnie.

Omawiany zespół jest jednym z najpospolitszych zbiorowisk roślinnych w stawach rybnych. Występuje w wodach o różnej głębokości, w skrajnych przypadkach nawet na mokrym podłożu stałym. Lokuje się zwykle przy brzegach, pod osłoną dużych bylin, w zacisznych zatoczkach. Pośrodku zbiornika występuje rzadko. Dzieje się to zwykle wówczas, gdy staw jest mały lub silnie zarośnięty od brzegów, z bardzo małą powierzchnią lustra wody. Poza tym może tu występować pośród innych zbiorowisk roślinnych — wodnych i szuwarowych. Jest to zbiorowisko bardzo ruchliwe, zwłaszcza gdy pozbawione jest swego podwodnego komponenta — *Lemna trisulca*, który działa wybitnie hamująco na przesuwanie się ławic. Mniejsze lub większe płyty tego zespołu pędzone bywają przez wiatr z jednego końca stawu w drugi. Cecha wielkiej ruchliwości tego zbiorowiska podkreślana była wielokrotnie (Podbielkowski 1960, Miyawaki i Tüxen 1960, Ellenberg 1963, Olaczek 1963).

Jest to zbiorowisko pionierskie, jednak utrzymuje się bardzo długo, od pierwszych chwil zasiedlania zbiornika aż do momentu zupełnego jego zładowacenia. Dlatego widzimy jego komponentów w obrębie innych zbiorowisk i w różnych stadiach rozwojowych roślinności stawów. Z powodu swej ruchliwości i wielkiej możliwości przenoszenia diaspory występuje właściwie we wszystkich zbiorowiskach zarastających stawy rybne z wyjątkiem ostatnich stadiów zarastania, gdzie ze względu na brak wody nie znajduje dogodnych dla siebie warunków życiowych.

Mimo że zbiorowisko budują byliny, jest ono efemeryczne; rozwija się w ciągu lata, znikając z powierzchni wody jesienią. Produkuje dużą ilość masy organicznej, która jednak szybko ulega rozkładowi. Udział jego w zarastaniu jest duży, jednak tylko okresowy, ograniczony do sezonu wegetacyjnego.

Ze względu na bardzo prymitywny charakter tego zbiorowiska i jego ubóstwo florystyczne nie robiłem zdjęć fitosocjologicznych. Klasa stałości jego podstawowych komponentów wynosi od IV do V.

Wolffietum arrhizae Miyawaki et J. Tx. 1960

Podstawowymi gatunkami budującymi ten zespół (tab. 1) są: *Spirodela polyrrhiza*, *Lemna minor*, *L. trisulca* i *Wolffia arrhiza*, która w zasiedlanych przez nią stawach występowała bardzo licznie.

Wolfietum arrhizae Miyawaki et Tx. J. 1960

	Nr zdjęcia - Nr. d. Aufnahme	155b	155c	155d	155e	155f	155g	155h	155i	155j	155k	155l	155m	155n	155o	155p	155q	155r	155s	155t	155u	155v	155w	155x	155y	155z	155aa	155ab	155ac	155ad	155ae	155af	155ag	155ah	155ai	155aj	155ak	155al	155am	155an	155ao	155ap	155aq	155ar	155as	155at	155au	155av	155aw	155ax	155ay	155az	155ba	155bb	155bc	155bd	155be	155bf	155bg	155bh	155bi	155bj	155bk	155bl	155bm	155bn	155bo	155bp	155bq	155br	155bs	155bt	155bu	155bv	155bw	155bx	155by	155bz	155ca	155cb	155cc	155cd	155ce	155cf	155cg	155ch	155ci	155cj	155ck	155cl	155cm	155cn	155co	155cp	155cq	155cr	155cs	155ct	155cu	155cv	155cw	155cx	155cy	155cz	155da	155db	155dc	155dd	155de	155df	155dg	155dh	155di	155dj	155dk	155dl	155dm	155dn	155do	155dp	155dq	155dr	155ds	155dt	155du	155dv	155dw	155dx	155dy	155dz	155ea	155eb	155ec	155ed	155ee	155ef	155eg	155eh	155ei	155ej	155ek	155el	155em	155en	155eo	155ep	155eq	155er	155es	155et	155eu	155ev	155ew	155ex	155ey	155ez	155fa	155fb	155fc	155fd	155fe	155ff	155fg	155fh	155fi	155fj	155fk	155fl	155fm	155fn	155fo	155fp	155fq	155fr	155fs	155ft	155fu	155fv	155fw	155fx	155fy	155fz	155ga	155gb	155gc	155gd	155ge	155gf	155gg	155gh	155gi	155gj	155gk	155gl	155gm	155gn	155go	155gp	155gq	155gr	155gs	155gt	155gu	155gv	155gw	155gx	155gy	155gz	155ha	155hb	155hc	155hd	155he	155hf	155hg	155hh	155hi	155hj	155hk	155hl	155hm	155hn	155ho	155hp	155hq	155hr	155hs	155ht	155hu	155hv	155hw	155hx	155hy	155hz	155ia	155ib	155ic	155id	155ie	155if	155ig	155ih	155ii	155ij	155ik	155il	155im	155in	155io	155ip	155iq	155ir	155is	155it	155iu	155iv	155iw	155ix	155iy	155iz	155ja	155jb	155jc	155jd	155je	155jf	155jg	155jh	155ji	155jj	155jk	155jl	155jm	155jn	155jo	155jp	155jq	155jr	155js	155jt	155ju	155jv	155jw	155jx	155jy	155jz	155ka	155kb	155kc	155kd	155ke	155kf	155kg	155kh	155ki	155kj	155kk	155kl	155km	155kn	155ko	155kp	155kq	155kr	155ks	155kt	155ku	155kv	155kw	155kx	155ky	155kz	155la	155lb	155lc	155ld	155le	155lf	155lg	155lh	155li	155lj	155lk	155ll	155lm	155ln	155lo	155lp	155lq	155lr	155ls	155lt	155lu	155lv	155lw	155lx	155ly	155lz	155ma	155mb	155mc	155md	155me	155mf	155mg	155mh	155mi	155mj	155mk	155ml	155mm	155mn	155mo	155mp	155mq	155mr	155ms	155mt	155mu	155mv	155mw	155mx	155my	155mz	155na	155nb	155nc	155nd	155ne	155nf	155ng	155nh	155ni	155nj	155nk	155nl	155nm	155nn	155no	155np	155nq	155nr	155ns	155nt	155nu	155nv	155nw	155nx	155ny	155nz	155oa	155ob	155oc	155od	155oe	155of	155og	155oh	155oi	155oj	155ok	155ol	155om	155on	155oo	155op	155oq	155or	155os	155ot	155ou	155ov	155ow	155ox	155oy	155oz	155pa	155pb	155pc	155pd	155pe	155pf	155pg	155ph	155pi	155pj	155pk	155pl	155pm	155pn	155po	155pp	155pq	155pr	155ps	155pt	155pu	155pv	155pw	155px	155py	155pz	155qa	155qb	155qc	155qd	155qe	155qf	155qg	155qh	155qi	155qj	155qk	155ql	155qm	155qn	155qo	155qp	155qq	155qr	155qs	155qt	155qu	155qv	155qw	155qx	155qy	155qz	155ra	155rb	155rc	155rd	155re	155rf	155rg	155rh	155ri	155rj	155rk	155rl	155rm	155rn	155ro	155rp	155rq	155rr	155rs	155rt	155ru	155rv	155rw	155rx	155ry	155rz	155sa	155sb	155sc	155sd	155se	155sf	155sg	155sh	155si	155sj	155sk	155sl	155sm	155sn	155so	155sp	155sq	155sr	155ss	155st	155su	155sv	155sw	155sx	155sy	155sz	155ta	155tb	155tc	155td	155te	155tf	155tg	155th	155ti	155tj	155tk	155tl	155tm	155tn	155to	155tp	155tq	155tr	155ts	155tt	155tu	155tv	155tw	155tx	155ty	155tz	155ua	155ub	155uc	155ud	155ue	155uf	155ug	155uh	155ui	155uj	155uk	155ul	155um	155un	155uo	155up	155uq	155ur	155us	155ut	155uu	155uv	155uw	155ux	155uy	155uz	155va	155vb	155vc	155vd	155ve	155vf	155vg	155vh	155vi	155vj	155vk	155vl	155vm	155vn	155vo	155vp	155vq	155vr	155vs	155vt	155vu	155vv	155vw	155vx	155vy	155vz	155wa	155wb	155wc	155wd	155we	155wf	155wg	155wh	155wi	155wj	155wk	155wl	155wm	155wn	155wo	155wp	155wq	155wr	155ws	155wt	155wu	155wv	155ww	155wx	155wy	155wz	155xa	155xb	155xc	155xd	155xe	155xf	155xg	155xh	155xi	155xj	155xk	155xl	155xm	155xn	155xo	155xp	155xq	155xr	155xs	155xt	155xu	155xv	155xw	155xx	155xy	155xz	155ya	155yb	155yc	155yd	155ye	155yf	155yg	155yh	155yi	155yj	155yk	155yl	155ym	155yn	155yo	155yp	155yq	155yr	155ys	155yt	155yu	155yv	155yw	155yx	155yy	155yz	155za	155zb	155zc	155zd	155ze	155zf	155zg	155zh	155zi	155zj	155zk	155zl	155zm	155zn	155zo	155zp	155zq	155zr	155zs	155zt	155zu	155zv	155zw	155zx	155zy	155zz	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905
--	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gatunki charakterystyczne zespołu
Charakterarten d. Assoziation:

Wolffia arrhiza

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten Lemnion minoris:

Lenna minor

Lemma trisulca

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten

id Lemneta:

Spirodela polyrrhiza

Niccocarpus natans

Charakterystyka

and Potametea :

Hydrocharis morsus-ranae

Ceratophyllum demersum

Stratocotes aloides

Hon

Hon

Hum

ДОН

For

1000

 

Ryc. 9. *Wolffietum arrhizae*. Oprócz podstawowych komponentów zespołu występuje tu również *Stratiotes aloides* (Jarnice)

Wolffietum arrhizae. Ausser den Hauptkomponenten der Assoziation tritt hier auch *Stratiotes aloides* auf (Jarnice)

Omawiany zespół jest w zasadzie dwuwarstwowy. Warstwę nawodną tworzy *Wolffia arrhiza*, *Spirodela polyrrhiza* i *Lemna minor*, natomiast warstwę podwodną buduje *Lemna trisulca* niekiedy z innymi roślinami wodnymi. Bezwzględnie dominują pływające rośliny wodne, co obrazuje niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne:

Hon	87
Hun	11
B-Ho	2

Liczba gatunków wynosi 4—6, zaś pokrycie przez roślinność osiąga 100%.

Obserwowane przeze mnie *Wolffietum arrhizae* występuje w postaci dwóch wariantów. Wariant pierwszy, typowy, budują rzęsy i *Wolffia arrhiza*, natomiast w wariacie drugim, oprócz wyżej wymienionych roślin, występują przedstawiciele rzędu *Potametalia*; struktura wariantu drugiego jest bardziej skomplikowana, a warstwa podwodna jest bardziej rozbudowana niż w wariacie pierwszym. Wariant pierwszy przemieszany jest mozaikowo z wariantem drugim. Płaty zespołu pokrywają prawie całkowicie powierzchnię wody.

Tabela 2
Riccietum fluitantis Slavnić 1956

Forma morf.- biol.	Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme	Miejscowość - Ort	Data - Datum	Głęb.wody cm	pH	Pokrycie przez roślinność % Veg.-Bedeckung %	warstwa nadwodna Luftschrift	warstwa na- i podwodna Wasserschicht	Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnahmefläche m ²	Liczba gatunków - Artenzahl	z Riccia fluitans - mit Riccia fluitans										z Ricciocarpus natans mit Ricciocarpus natans										Sto- słość	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											109a	109b	170c	170a	173c	174b	170b	195b	196b	319b	293b	276b	280b	488b	524b	279b	176b	270b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Wo	Wo	Go	Go	Go	Go	Go	Go	Go	Ci	Ci	Ci	Ci	Ci	Jg	Er	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry	Ry

Gatunki charakterystyczne

zespółu
Charakterarten d. Assoziation:

B-Hu
B-Ho
Riccia fluitans
Ricciocarpus natans

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten
Lemmon minoris:

Hon
Hun
Lemna minor
Lemna trisulca

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten
Lemmetalia und Lemnetea:

Hon
Spirodela polyrrhiza

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten
Potametalia und Potametea:

Hun
Huz
Huz
Huz
Utricularia vulgaris
Potamogeton lucens
Hydrocharis morsus-ranae
Hottonia palustris

231.9
1722

IV
III

1672
1669

V
IV

641

III

541
111
64
0.5

I
I
I
I

Wolffietum arrhizae jest zespołem bardzo rzadko występującym w badanych przeze mnie stawach rybnych; widziałem je tylko w Jarnicach (pow. Węgrów). Odkryłem je również w Izabelinie (pow. Wołomin), w Bielawie koło Powsina pod Warszawą i koło Kotunia (pow. Siedlce), ale występowało ono tam w dołach potorfowych. Na wszystkich wspomnianych stanowiskach zbiorniki wodne, w których rozwija się zespół, są bardzo dobrze osłonięte od wiatru, otoczone gęstymi zaroślami (*Salix cinerea*) i drzewami (*Alnus glutinosa*), i wykazują obecność przynajmniej fragmentarycznie rozwiniętego *Hydrocharo-Stratiotetum*. Odczyn wody wynosi tu 6,5—8 pH, a jej głębokość najczęściej 50—60 cm.

Jest to zespół w zasadzie ruchliwy, lecz wszędzie tam, gdzie go widziałem, zarówno w stawach, jak i w dołach potorfowych, tworzył zwarte, pływające ławice i tak dobrze był osłonięty (ryc. 9), że nawet przy średnim wietrze nie można było zaobserwować żadnych jego przemieszczeń. Przy zmniejszonym stopniu pokrywania lokuje się prawdopodobnie w przybrzeżnych, zarośniętych strefach zbiorników lub pośród płatów *Hydrocharo-Stratiotetum*.

W zarastaniu bierze duży udział okresowo, ponieważ nie każdego roku występuje obficie, a poza tym rozwija się tylko w miesiącach letnich. Produkowana przez niego masa organiczna jest duża, ale ulega szybkiemu rozkładowi.

Riccietum fluitantis Slavnić 1956

Riccietum fluitantis (tab. 2) jest w zasadzie zespołem dwuwarstwowym. Pływającą po powierzchni wody górną warstwę tworzą *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza* i *Ricciocarpus natans*. Druga warstwa, podwodna, chociaż bardzo często ulokowana tuż pod powierzchnią wody, budowana jest przez *Riccia fluitans* i *Lemna trisulca*; niekiedy bierze w niej udział *Utricularia vulgaris*, rzadziej — *U. minor*. Podanego przez Miyawaki i Tüxena (1960) drugiego gatunku *Riccia* — *R. rhenana* — nie odnalazłem w badanym przeze mnie *Riccietum fluitantis*, natomiast znajdowałem go w postaci formy lądowej pośród roślinności pionierskiej na dnie osuszonych stawów.

Liczba gatunków w zdjęciu wynosi 4—7, zaś pokrycie przez roślinność — 40—100%.

W omawianym zespole wyróżniłem trzy warianty: 1) typowy, 2) z *Riccia fluitans* i 3) z *Ricciocarpus natans*.

Dominują oczywiście rośliny wolne, chociaż zaznacza się również pewien, niekiedy znaczny udział bylin szuwarowych, co ilustruje niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne:

B-Hu	20	} 35	Hun	19
B-Ho	15		Huz	1
Hon	10		Atr	25

Płaty tego zespołu pływają swobodnie w wodzie i często ulegają przemieszczeniom pod wpływem wiatru. Dlatego zespół ten spotyka się zwykle nie na otwartych przestrzeniach wodnych, lecz w cichych, osłoniętych zatoczkach, wśród roślinności przybrzeżnej oraz pośród zarośli szuwarowych, gdzie znajduje osłonę przed wiatrem i ulega zakotwiczeniu. Fakt ten tłumaczy występowanie w jego płatach znacznej ilości przedstawicieli rzędu *Phragmitetalia*.

Wchodzące w skład tego zespołu *Riccia fluitans* i *Lemna trisulca*, szczególnie w starszych stadiach rozwojowych zespołu, szczepiają się ze sobą, tworząc dość zwartą pływającą darnń, która z łatwością zakotwicza się o pędy roślin szuwarowych. Jeśli jeszcze, co zdarza się dość często, wśród tych darni osiedlą się glony nitkowate, wówczas zwartość takiego pływającego kożucha i jego zdolność zakotwiczenia się wybitnie wzrastają.

Udział tego zespołu w zarastaniu stawów rybnych jest znaczny, lecz ogranicza się tylko do krótkiego okresu wegetacyjnego (por. również T ü x e n 1960). Produkowana masa organiczna jest duża, ale ulega dość szybko rozkładowi.

Zespół ten jest bardzo niepożądany w stawach rybnych, ponieważ przy obfitym jego występowaniu i gęstym kożuchu bardzo utrudniona zostaje aeracja wody w stawie.

Salvinieto-Spirodeletum polyrrhizae Slavnič 1956

Salvinieto-Spirodeletum polyrrhizae (tab. 3) jest dość ubogie pod względem florystycznym. W skład jego wchodzi głównie *Salvinia natans*, *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza* i niektóre inne rośliny wodne (ryc. 10). W zdjęciu występuje 2—4 gatunków, zaś pokrycie przez roślinność waha się od 75 do 100%. Zespół ten zbudowany jest z jednej lub dwóch warstw, przy czym warstwa podwodna reprezentowana jest zwykle dość skąpo (*Lemna minor*, *Utricularia vulgaris*).

Głównym elementem są i tu, oczywiście, rośliny wodne, na co wyraźnie wskazuje spektrum morfologiczno-biologiczne:

Hon	86	Hoz	4
Hun	9	Atr	1

Zespół ten w stawach rybnych nie jest pospolity, jednak występuje znacznie częściej, niż by to wynikało z danych florystycznych dla województwa warszawskiego. Bardzo interesujący jest fakt, co zresztą obserwowałem również w dołach potorfowych (Podbielkowski 1960), że frekwencja *Salvinia natans* nie jest jednakowa każdego roku. Gatunek ten może występować w jakimś zbiorniku bardzo obficie, zarastając całkowicie jego powierzchnię wodną, w następnym zaś roku może być reprezentowany zaledwie przez kilka okazów. Przy obfitym występowaniu

	Nr. zdjęć - Nr. d. Aufnahme	472b	417b	19a	19b	19c	379a	379b	472c	417c	Sto- kość	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
Forma	Miejsowość - Ort	Fz	Is	Nr	Nr	Nr	Rd	Rd	Fz	Is		
morf.- biol.	Data - Datum	3.8. 1966	21.7. 1966	17.8. 1964	17.8. 1964	17.8. 1964	14.7. 1966	14.7. 1966	3.8. 1966	21.7. 1966		
Morph.- biol.	Głęb. wody w cm - Wassertiefe cm	80	40	80	80	80	30	30	80	40		
Form	pH	8	7,5	8,5	8,5	8,5	7,5	7,5	8	7,5		
	Pokrycie przez roślinność % -Veg.-Bedeckung %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	warstwa nadwodna Luftschrift	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	warstwa na- i podwodna Wasserschicht	100	100	100	85	75	100	85	90	60		
	Powierzchnia zdjęć m ² Aufnahmefläche m ²	1	1,5	6	1	1,5	4	2	0,5	1,5		
	Liczba gatunków - Artenzahl	3	3	4	3	3	4	4	2	3		

Gatunki charakterystyczne zespołu
Charakterarten der Assoziation:

Salvinia natans

Hon

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten Lemnion minoris:

Lemna minor

Lemna trisulca

Hon

Hun

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten Lemnietalia, Lemnietea:

Spirodela polyrrhiza

Hon

Gatunki towarzyszące - Begleiter:

Utricularia vulgaris

Polygonum amphibium

Typha angustifolia

Hun

Hoz

Atr

V

6016

IV

I

1295

194

V

1473

I

I

I

694

416

127

1-2

Salvinia natans zespół zajmuje często całą powierzchnię stawu, przy mniejszej frekwencji tej rośliny lokuje się zwykle pośród przybrzeżnej strefy roślin szuwarowych. Zespół ma charakter wybitnie sezonowy, a jego główny komponent — *Salvinia natans* — przezimowuje zwykle w postaci zarodników.

Przy znacznym zwarcu jest to stosunkowo mało ruchliwe zbiorowisko, zwłaszcza gdy spajają je jeszcze dodatkowo występujące częstogłony nitkowate. Jeśli pokrywa znaczne przestrzenie, jego zwarty kożuch utrudnia aerację wód, wskutek czego jest ono zbiorowiskiem niepożądanym, a nawet szkodliwym dla gospodarki stawowej. Natomiast gdy *Salvinia natans*, jako główny jego komponent, występuje w umiarkowanych ilościach, staje się elementem pożądanym, ponieważ na jej silnie postrzępionych liściach podwodnych osiedlają się obficie okrzemki, będące przecież bazą pokarmową dla wielu planktonowych stawonogów, które z kolei stanowią pożywienie ryb.

Potametum lucentis Hueck 1931

Potametum lucentis (tab. 4) jest zespołem ubogim pod względem florystycznym. W skład jego wchodzi 2—8 gatunków. Panuje zwykle *Potamogeton lucens*, który osiąga największą klasę stałości (V). Obok niego występują inne gatunki, jak: *Potamogeton pusillus*, *P. compressus*, *P. pectinatus* i *P. natans* (ryc. 11), na podstawie obecności których można by wydzielić odpowiednie warianty tego zespołu. Zespół jest typowo rozwinięty, choć nie brak w nim również elementów należących do *Lemnetalia* (*Lemnetea*) — głównie *Lemna minor* i *Spirodela polyrrhiza*. Wśród innych gatunków towarzyszących spotyka się prawie wyłącznie przedstawicieli *Potametalia*.

Panują tu rośliny wodne zanurzone i przytwierdzone do dna, co wyraźnie wykazuje spektrum morfologiczno-biologiczne:

Huz	70	Hon	13
Hoz	9	Atr	2
Hun	4	G	2

Rośliny te tworzą grubą warstwę sięgającą od dna do powierzchni wody. W skład jej wchodzi przede wszystkim przedstawiciele rodzaju *Potamogeton* z niewielką domieszką innych roślin, jak: *Lemna trisulca*, *Chara* sp. div., *Myriophyllum verticillatum*, *Batrachium circinatum*, *Utricularia vulgaris* i *Ceratophyllum demersum*. Warstwę napowierzchniową tworzą *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Stratiotes aloides*, *Salvinia natans* i wreszcie *Potamogeton natans*, który może nawet budować jeden z wariantów zespołu. Bardzo często tuż pod powierzchnią wody występuje *Potamogeton lucens*, a przy wielkiej jego obfitości część pędów, nie mówiąc już o kwiatostanach, sterczy ponad wodą. Stwarza to doskonałe warunki do lokowania się

Ryc. 10. *Salvinieto-Spirodeletum polyrrhizae* (Nowodwór)

Ryc. 11. Płat *Potametum lucentis*, w którym dominuje *Potamogeton natans* (Opypy)

Ein Fragment von *Potametum lucentis*, in welchem *Potamogeton natans* dominiert (Opypy)

Tabela 4

Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme	434	335a	307	566	248	572	538	374	236	212	420	264	543	145	51	392	441a	125	98a	433a	433b	Staność	Współczynniki pokrycia Dekunks-wart
Miejscowość - Ort	Rm	Sr	GZ	Zb	Ba	Gw	Ch	Rk	Ly	Cl	Is	Su	Op	La	Nr	JL	ZL	Ra	Za	Rm	Rm		
Data - Datum	26.7.1966	4.7.1966	14.9.1966	18.8.1966	9.9.1966	18.8.1966	13.8.1966	12.7.1966	7.9.1966	26.8.1966	21.7.1966	10.9.1966	13.8.1966	18.8.1966	16.7.1966	19.7.1966	28.7.1966	13.8.1966	31.7.1966	26.7.1966	26.7.1966		
Głęb.wody cm - Wassertiefe cm	100	60	30	100	80	110	80	60	40-200	50	60	60	100	40	70	70	40	50	60	80	80		
pH	8	7.5	8	8	8	7	8	7	8	7.5	8.5	8	8	7.5	7	7.5	8	8	8	8	8		
Fokrycie przez roślinność % - Veg.-Bedeckung % warstwa nadwodna Luftschticht warstwa na- i podwodna Wasserschicht	-	-	-	-	-	-	10	5	10	0.3	2	2.0	-	40	0.2	-	-	-	-	-	-		
Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnehmerfläche m ²	100	16	2	16	25	25	100	6	25	4	25	12	12	6	16	8	8	25	16	6	6		
Liczba gatunków - Artenzahl	3	2	3	2	7	5	3	3	7	7	7	6	2	6	4	5	3	5	8	3	4		
Gatunki charakterystyczne zespołu																							
Charakterarten der Assoziation:																							
Huz	4-5	4	4	4	4	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	3	3	4-5	4	4	3-4	2-3	1	1-2	V	5471
Huz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	5	I	1131
Gatunki charakterystyczne																							
Charakterarten Su-Potamion:																							
Huz	3-4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	I	321
Huz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	357
Gatunki charakterystyczne																							
Charakterarten Potametalia,																							
Potametea:																							
Hoz	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	5	3	+	4	.	.	.	.	.	I	893
Hoz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4-5	.	.	.	.	I	107
Huz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	357
Hon	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	2-3	.	.	I	109
Huz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	I	131
Huz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I	83
Hon/Huz	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	2
Huz	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	2
Huz	.	.	.	.	1-1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1
Gatunki charakterystyczne																							
Charakterarten Lemnetalia:																							
Hon	2	.	1	2	1	1-2	.	.	2	2	2	1-2	.	1	.	3	.	+	.	.	I	III	622
Hon	.	.	2-3	.	2	.	.	.	3	1	1-2	+	.	1	.	1	.	.	.	.	.	II	588
Hon	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	2-3	.	II	416
Hon	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	55
Gatunki towarzyszące																							
Begleiter:																							
Huz/Atr	.	.	.	.	.	.	.	1	1-2	+	+	2	.	2-3	+	.	.	.	.	.	.	II	306
Atr	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	14
Atr	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	24
Atr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	54
Atr	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1
Atr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	2
Atr	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	12
Atr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0.5
G	.	.	.	.	2-3	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	I	262
Głowy nitkowate																							
Fadenalgen																							

wśród jego płatów roślinności pływającej na powierzchni wody, która, przemieszczając się pod wpływem wiatru, łatwo się tu zakotwicza.

Obydwie warstwy — nawodna i podwodna — przetkane są bylinami szuwarowymi, które tworzą trzecią, wprowadzie niezbyt obficie reprezentowaną warstwę nadwodną; największą stałość pośród tych bylin wykazują *Sagittaria sagittifolia* (szczególnie forma podwodna) i *Equisetum limosum*. Pokrycie przez roślinność wynosi tu od 60 do 100%, choć niekiedy pozornie wydaje się znacznie mniejsze, a to ze względu na duże rozproszenie pionowe poszczególnych komponentów.

Potametum lucentis jest zespołem bardzo pospolitym w stawach rybnych. Występuje w pewnej odległości od brzegów, zajmując zwykle centralną część zbiornika. Wydaje się, że ze względu na niewielką zwartość roślinności zespół ten nie jest szkodliwy dla gospodarki rybnej. Niepożądane są tylko jego warianty z dominującymi drobnymi rdestnicami (np. *Potamogeton pusillus*), które mogą tworzyć bardzo zwarte, gęsto splecione podwodne ławice. W zarastaniu stawów odgrywa znaczną rolę, produkując dość duże ilości substancji organicznej.

Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 1926

Głównymi komponentami tego zespołu (tab. 5) są *Nymphaea alba* i *N. candida*. Poza tym występują tu niektóre inne rośliny wodne, jak np.: *Potamogeton natans*, *Myriophyllum verticillatum*, *Utricularia vulgaris*, *Elodea canadensis*. Liczba gatunków w zdjęciu wynosi 3—7, zaś pokrycie przez roślinność waha się od 50 do 100%.

W zasadzie jest to zbiorowisko dwuwarstwowe, jednak, ze względu na specyficzne warunki, w jakich występuje w stawach rybnych (mała głębokość), bywa trójwarstwowe. Warstwę nawodną i podwodną tworzą wówczas wodne rośliny zakorzenione lub wolno pływające, natomiast warstwa nadwodna utworzona jest przez byliny szuwarowe. Wszędzie jednak dominują rośliny wodne, co wyraźnie wykazuje spektrum morfologiczno-biologiczne:

Hoz	43	Hun	7
Hon	3	Atr	7
Huz	40	G	< 1

Większa część masy roślinnej pogrążona jest w wodzie.

W badanych przeze mnie stawach rybnych *Myriophyllo-Nupharetum* było zwykle rozwinięte fragmentarycznie i przemieszane z elementami pochodzącymi z innych zespołów wodnych. Bardzo często w obrębie jego płatów spotkać można przedstawicieli związku *Eu-Potamion* (głównie *Potamogeton lucens*), czego wyrazem są zbiorowiska o charakterze mieszanym, wyróżniające się mniej lub więcej jednakowym udziałem przedstawicieli obu związków — *Nymphaeion* i *Eu-Potamion*. W zespole

[illegible]

zaznacza się również niekiedy dość znaczny udział przedstawicieli rzędu *Phragmitetalia*, i to głównie ze związku *Phragmition*, co wydaje się naturalne, ponieważ, ze względu na niewielką głębokość stawów, mogą one swobodnie docierać do centralnych partii zbiornika. Daje się natomiast zauważyć brak przedstawicieli *Lemnetalia*. Dzieje się to dlatego, że zespół na powierzchni wody jest mało zwarty, wskutek czego, podczas wietrznej pogody zostaje niekiedy całkowicie oczyszczony z wolno pływających drobnych roślin.

W stawach, gdzie przeprowadzałem obserwacje, występują trzy warianty omawianego zespołu: 1) z *Nymphaea alba*, 2) z *Nymphaea candida* i 3) typowy (z *Nymphaea candida* i *Nuphar luteum*). Wprowadzenie *Nymphaea candida* jako gatunku charakterystycznego dla zespołu motywuję tym, że w *Myriophyllo-Nupharetum*, a także w zbiorowiskach do niego zbliżonych, gatunek ten występuje bardzo często, znacznie częściej niż *N. alba*. Sądzę zatem, że można go uważać przynajmniej za gatunek zastępczy w stosunku do *Nymphaea alba*; podobne stanowisko zajmują również Oberdorfer (1949) i Kępczyński (1965), uważając go za gatunek charakterystyczny zespołu.

Płaty *Myriophyllo-Nupharetum* w stawach rybnych nie osiągają większych rozmiarów; zespół ten tylko w wyjątkowych przypadkach pokrywa 1/4—1/3 powierzchni stawu.

Dość luźna struktura tego zespołu stwarza dogodne warunki dla aeracji i cyrkulacji wody, w związku z czym nie jest on niepożądany w stawach rybnych. Udział jego w zarastaniu i spłycaaniu zbiornika nie jest duży.

Hydrocharo-Stratiotetum (Van Langendock 1935)

Krus. et Vlieg. 1937

Typową postać *Hydrocharo-Stratiotetum* (tab. 6) budują *Hydrocharis morsus-ranae* i *Stratiotes aloides* z domieszką *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza*, *Lemna trisulca* i kilku innych gatunków (ryc. 12). Dominują tu więc bezwzględnie, jak to widać z niżej podanego spektrum morfologiczno-biologicznego, rośliny wodne nie przytwierdzone do dna.

Hon	53	Huz	3
Hun	38	Atr	2
Hoz	4	G	< 1

Florystycznie jest to zbiorowisko ubogie, podobnie zresztą jak wszystkie zbiorowiska wodne, i zawiera zaledwie 4—7 gatunków w w zdjęciu; pokrycie przez roślinność wynosi 80—100%.

Struktura jego w pewnym sensie ma charakter kompleksowy; między jego głównymi komponentami (*Hydrocharis morsus-ranae* i *Stratiotes aloides*) rozmieszczone są mozaikowo zbiorowiska rzęs.

Forma biol.- Morph.- biol. Form	Nr zdjęcia	Nr.d.Aufnahme	90	333a	333b	25	27	124	347	360	478	137	342	St.- Współ- czyn- nik Sten- tę- cia Dak- kungs- wert
Miejscowość - Ort			St	Sr	Sr	St	St	Ra	Nr.	Sz	Wg	Sz	Nr	
Data - Datum			28.7.1965	4.7.1966	4.7.1966	19.8.1964	19.8.1964	13.8.1965	6.7.1966	9.7.1966	4.8.1966	16.8.1966	6.7.1966	
Głęb.wody cm - Wassertiefe cm	60	60	60	60	60	40-60	60	50	100	40-60	50	40	40-80	
pH	8	7,5	7,5	7,5	7,5	7	7	8	7,5	6,5	7,5	7	7	
Pokrycie przez roślinność %														
- Veg.-bedługość %														
Wartowa nadwodna														
Wartowa ma- i podwodna														
Wasserschicht														
Powierzchnia zdjęcia m ²	9	25	25	25	25	16	12	6	100	12	8	4	12	
Aufnahmefläche m ²														
Liczba gatunków - Artenzahl	4	5	6	5	4	5/6/			7	6	7	6	6	

Gatunki charakterystyczne

zespółu

Charakterarten der Assoziation:

Stratiotes aloides

Hydrocharis morsus-ranae

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten Nymphaeion:

Myriophyllum verticillatum

Utricularia vulgaris

Nymphaea candida

Najas luteum

Polygonum amphibium

Gatunki wyróżniające związek

Differentialarten des Ver-

bandes Nymphaeion:

Lemna minor

Spirodela polyrrhiza

Lemna trisulca

Salvinia natans

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten

Potamogetalia und Potametea:

Potamogeton lucens

Potamogeton natans

Ceratophyllum demersum

Gatunki towarzyszące

Regleiter:

Equisetum limosum

Sparganium ramosum

Typha latifolia

Phragmites communis

Gloxy nitkowate

Padnailgen

Hon/Hun

Hon

Hun

Hun

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Hoz

Ryc. 12. *Hydrocharo-Stratiotetum* (Stawinoga)

Hydrocharo-Stratiotetum jest zespołem trójwarstwowym. Warstwę najwyższą tworzą wynurzone egzemplarze *Stratiotes aloides* oraz niektóre rośliny szuwarowe. Warstwę napowierzchniową buduje *Hydrocharis morsus-ranae* i rżęsy. Pod wodą występuje *Lemna trisulca*, *Utricularia vulgaris*, *Myriophyllum verticillatum*, *Potamogeton lucens*, *Ceratophyllum demersum* oraz zanurzone egzemplarze *Stratiotes aloides*.

Zespół tworzy dość zwartą, pływającą darni, powiazaną spletanymi z sobą rozłogami obydwóch komponentów, trudną do rozerwania nawet przez bardzo silny wiatr. Ponieważ darnie te zakotwiczą się zwykle o jakieś rośliny zakorzenione na dnie, zespół ten jest prawie zupełnie nie ruchliwy i nie podlega przemieszczeniom pod wpływem wiatru. Tylko podczas bardzo silnego falowania i wiatru mogą odrywać się mniejsze lub większe płyty i pływać swobodnie dopóki nie ulegną zakotwiczeniu.

Jest to jeden z najpospolitszych zespołów roślin pływających w stawach rybnych. Zwykle występuje w postaci rozwiniętej fragmentarycznie, natomiast typowo ukształtowany — z obydwoma głównymi komponentami — pojawia się stosunkowo rzadko i zajmuje niewielkie przestrzenie. Występuje zarówno w miejscach otwartych, jak również pośród roślinności szuwarowej, gdzie znajduje najlepsze warunki życiowe. W ostatnim przypadku do budowy jego włącza się drugi składnik —

roślinność szuwarowa, co jeszcze bardziej powiększa kompleksowość zbiorowiska.

Darnie *Hydrocharo-Stratiotetum* bardzo silnie zmniejszają falowanie, działając ochronnie na brzegi stawów, z drugiej jednak strony — wskutek dużej zwartości — bardzo utrudniają aerację wód.

Zbiorowiska ramienic

Zbiorowiska ramienic spotykałem w stawach rybnych dość rzadko. Rośliny te tworzą w nich zwykle jednogatunkowe skupienia i wchodziły w skład innych zbiorowisk. Występują one jako domieszka roślinności szuwarowej, rzadko tworzą zbiorowiska autonomiczne.

Jedynie może zbiorowisko z *Chara contraria* (tab. 7) wykazuje pewne podobieństwo do zespołu *Charetum contrariae* Corillion 1957; zbiorowisko to, kierując się sugestiami Dąmbskiej (1966), włączyłem do klasy *Potametea*. Jest ono złożone w zasadzie z dwóch warstw. Warstwa podwodna jest najsilniej rozbudowana i złożona przede wszystkim z podwodnych łanów ramienic, ponad którymi i wśród których występują różne gatunki roślin naczyniowych, jak przedstawiciele rodzaju *Potamogeton*, *Batrachium circinatum*, *Elodea canadensis* i inne. Warstwę nawodną budują *Potamogeton natans*, *Nymphaea candida*, *Stratiotes aloides* oraz niekiedy *Agrostis stolonifera*.

Z innych gatunków ramienic występujących niekiedy masowo w stawach rybnych warto wymienić jeszcze *Chara fragilis* i *Ch. vulgaris*. Ze względu jednak na skąpy materiał zdjęciowy, jaki miałem do dyspozycji, nie mogłem się pokusić o wyróżnienie jakichś zbiorowisk. Dla orientacji podaję niżej trzy zdjęcia, które w pewnym sensie są reprezentatywne dla obserwowanych przeze mnie zbiorowisk ramienic.

Zdjęcie 98 (Zawiesiuchy 31.7.65, głęb. wody 60 cm, pH 8, pokrycie przez rośl. 100%, pow. zdjęcia 16 m²): *Chara fragilis* 5, *Chara contraria* var. *hispidula* 1, *Potamogeton pusillus* 3, *Potamogeton lucens* 1.

Zdjęcie 158 (Maścibody, 19.8.65, głęb. wody 30 cm, pH 7,5, pokrycie przez rośl. 80%, pow. zdjęcia 4 m²): *Alisma plantago-aquatica* 1—2, *Agrostis stolonifera* 2, *Heleocharis acicularis* 1, *Chara vulgaris* 3—4.

Zdjęcie 309 (Gójśc, 14.9.65, głęb. wody 50 cm, pH 8, pokrycie przez rośl. 100%, pow. zdjęcia 6 m²): *Potamogeton pectinatus* 2, *Chara gracilis* 4—5, glony nitkowate (zielenice) 2—3.

Występujące obficie zbiorowiska ramienic mogą odgrywać niekiedy znaczną rolę w zarastaniu, ponieważ produkują znaczne ilości masy organicznej. Kilkakrotnie miałem możliwość obserwować, jak po osuszeniu stawu zeschnięte ramienice zaścielały jego dno warstwą grubości kilku centymetrów.

Forma morfol. -biol.	Mr. zdjęcia - Nr. d. Aufnahme	441b	313	340c	311	112	312	Sta- lość	Wpół- czm- nik
	Miejscowość - Ort	21	Gj	Na	Gj	Ku	Gj		
	Data - Datum	28.7.1956	14.9.1955	6.7.1956	14.9.1955	7.8.1955	14.9.1955		
	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	40	60	40	60	60	60	Ste- tyg- keit	po- czy- cia
	pH	8	8	7	8	8	8		Dek- kungs- wert
	Pokrycie przez roślinność % veg.-bedeckung %								
	warszwa nadwodna - Luftschicht		5						
	warszwa na- i podwodna - Wasserschlacht	100	100	95	100	75	65		
	Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	8	10	9	12	12	12		
	Liczba gatunków - Artenzahl	3	5	3	4	7	4		

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten des *Charætum contrariæ*:*Chara contraria*

V 6296

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten Potametalia, Potametes:

Hoz
Huz
Huz
Huz
Huz
Huz
Huz
Huz
Huz
Huz/Hon

Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potamogeton lucens
Ratracium circinatum
Lymphaea candida
Potamogeton compressus
Potamogeton pusillus
Ruz
Elodea canadensis
Stratiotes aloides

Gatunki towarzyszące - Begleiter:

Atr/Hoz
B-Hoz/B-Hu
Hon
Huz/Atr
Acr
G

Acrostis stolonifera
Drepanocladus aduncus
Lemna minor
Sagittaria sagittifolia
Equisetum limosum
Glony nitkowane - Fadenalgen

5 4-5 4-5 4-5 2-3 3 V 6296

• 3 1 4-5 1-2 1526
• 3 1 4-5 3 1250
• 2 2-3 3 127
• 2 1 3 458
• 1 1-2 291
• 1 1-2 191
• 1 1 191
• 1 1 11

83
83
1
1
1
1
83

Zbiorowiska bagienne są w stawach rybnych równie pospolite jak zbiorowiska wodne. Występują one we wszystkich zarastających stawach, z wyjątkiem tych, które po osuszeniu przekształcone zostały w pastwiska lub użytki rolne. Występowanie ich w czasie jest nieco przesunięte w stosunku do zbiorowisk wodnych — powstają później od nich i później kończą swoje istnienie. W stadiach inicjalnych to przesunięcie w czasie jest niewielkie i wynosi niekiedy 1—2 sezony wegetacyjne, natomiast w stadiach końcowych jest bardzo duże. Zbiorowiska bagienne mogą bowiem utrzymywać się bardzo długo, zarówno wśród zbiorowisk zaroślowych, jak i drzewiastych. Ich amplituda ekologiczna, jeśli chodzi o wymagania wodne, jest o wiele większa niż roślinności wodnej; mogą występować bezpośrednio w wodzie, w towarzystwie roślinności wodnej, jak również w miejscach zupełnie nie podtopionych lub podtapianych tylko okresowo.

Z reguły występują przy brzegach, jednak bardzo często, szczególnie w stawach o bardziej zaawansowanym procesie zarastania, rozwijają się w środkowych partiach zbiornika. W ostatnim przypadku bardzo częste występowanie ich tłumaczy się przede wszystkim tym, że stawy rybne — ze względu na niewielką a równocześnie dogodną dla nich głębokość — stwarzają siedlisko, w którym zbiorowiska te znajdują bardzo dobre warunki życiowe.

Struktura zbiorowisk bagiennych jest różna. Przy brzegach tworzą one dość wąski i gęsty pas, pośrodku natomiast mogą występować w postaci z rzadka rozsianych roślin, niewielkich ich skupień, tworzących często rodzaj mozaiki, lub formują mniej lub więcej zwarte łany, najczęściej jednogatunkowe. Nierzadko zdarza się, że całą prawie powierzchnię stawu pokrywa zbiorowisko zupełnie jednolite pod względem strukturalnym i florystycznym.

Zbiorowiska bagienne, jeśli nie z reguły, to przynajmniej bardzo często, występują przemieszane z roślinnością wodną; tylko w przypadkach, gdy tworzą jednogatunkowe, bardzo gęste skupienia, mogą być pozbawione roślin wodnych. Budowa zbiorowisk bagiennych jest zwykle 2—3-warstwowa; warstwę nadwodną tworzą wysokie byliny szuwarowe i one to są właściwymi twórcami zbiorowisk bagiennych. Warstwę na i podwodną budują rośliny wodne.

W związku z przemieszaniem roślinności bagiennnej i wodnej powstają niekiedy trudności z zaklasyfikowaniem niektórych zbiorowisk, szczególnie takich, gdzie udział poszczególnych grup zaangażowanych w budowaniu zbiorowiska jest prawie jednakowy. Zasadniczym elementem tworzącym zbiorowiska bagienne są przedstawiciele *Phragmitetea* (*Phragmitetalia*). We wcześniejszych stadiach rozwojowych prawie stałym komponentem tych zbiorowisk są przedstawiciele *Lemnetea* i *Po-*

tametea, w późniejszych natomiast — *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* i *Molinio-Arrhenatheretea*. Ostatnia grupa bierze bardzo czynny udział w końcowych stadiach ładowacenia, gdy wody już nie ma zupełnie lub prawie zupełnie.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na zbiorowiska facjalne, a właściwie jednogatunkowe skupienia roślin szuwarowych. Występowanie tych skupień jest w stawach rybnych tak pospolitym zjawiskiem, że staje się właściwie regułą; trudno znaleźć staw, w którym nie występowałoby takie zbiorowisko. Najpospoliej występujące i największe przestrzennie skupienia jednogatunkowe tworzą: *Typha angustifolia*, *Phragmites communis*, *Glyceria aquatica*, *Sparganium ramosum*, *Equisetum limosum*. Okupowaniu wielkich przestrzeni (niekiedy całych stawów) przez takie skupienia bardzo sprzyja jednakowa w zasadzie głębokość wody w stawie, stwarzająca jednakowe i bardzo dobre warunki do zasiedlania. Ponieważ wody stawów są często nawożone, stwarzane warunki życiowe są doskonałe dla występujących tu roślin wodnych i bagiennych i dlatego proces zarastania przebiega tu bardzo intensywnie, przysparzając wiele kłopotów gospodarce rybnej. Skupienia jednogatunkowe roślin szuwarowych, oprócz wielkich płatów, mogą tworzyć i płyty niewielkie, układające się w mozaikę, której poszczególne fragmenty są jednak od siebie dość ostro odgraniczone.

Roślinność szuwarowa bierze jak najbardziej aktywny udział w zarastaniu stawów rybnych. Ogromne masy szybko rosnących kłaczy i rozłogów penetrują dno we wszystkich kierunkach, przyczyniając się znacznie do jego wypiętrzania, zaś pędy nadziemne dają bardzo duże ilości stosunkowo trudno rozkładającej się substancji organicznej (np. trzcina), co jest przyczyną szybkiego spływania dna stawów. Roślinność szuwarowa wykazuje ogromną ekspansywność, co w warunkach dla niej bardzo korzystnych, jakie znajduje w stawach, stwarza ogromne możliwości szybkiego opanowywania zasiedlanego terenu.

Walka z roślinnością szuwarową jest ciężka. Corocznie ogranicza się tylko do podwodnego przycinania pędów. Co kilka lat należy jednak przeprowadzać generalne czyszczenie stawów połączone z najdokładniejszym zdarciem warstwy dna wraz z kłaczami, rozłogami i diasporami.

Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926

Scirpo-Phragmitetum (tab. 8, 9) budują duże byliny szuwarowe, głównie: *Sparganium ramosum*, *Typha latifolia*, *T. angustifolia*, *Phragmites communis* i *Glyceria aquatica*, przy czym największy stopień stałości (V) wykazuje *Sparganium ramosum*. Poza roślinami szuwarowymi, które nadają charakterystyczny aspekt zbiorowisku, występują tu również rośliny wodne, które mimo niekiedy dużego zacienienia, znajdują pośród roślinności szuwarowej dogodne dla rozwoju warunki.

Ryc. 13. *Scirpo-Phragmitetum* (Kownata)

Ryc. 14. *Scirpo-Phragmitetum*, facja z *Typha angustifolia* (Golice)
Scirpo-Phragmitetum, Fazies mit *Typha angustifolia* (Golice)

Forma biol. morf. Morph. biol. Form	Nr zdjęcia - Bild. Aufnahme	34	48	269	241	272	139	75b	557	218	558	555	575	257	308	45	498	562	291	216	96	215	20	Sta- łość	Sta- łość	Sta- łość	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
	Miejscowość - Ort	Jd	Kl	Sn	Rn	Sn	Sz	Ot	Pc	Kw	Pc	Pc	Pa	Sc	Q2	Kl	Mr	Zb	Br	Kw	Za	Kw	Nr				
	Data - Datum	24.8.1964	12.7.65	10.9.65	7.9.65	10.9.65	16.8.65	23.7.65	13.8.66	30.8.66	13.8.66	13.8.66	18.8.66	9.9.65	14.9.65	12.7.65	9.8.66	18.8.66	13.9.65	30.8.65	31.7.65	30.8.65	17.8.64				
	Głębokość wody cm	30	30	40	40	10	30	0	40	40	30	30-50	35	10-30	30	20	35	40	40-50	20-40	50	0-10	40				
	Wassertiefe cm	30	30	40	40	10	30	0	40	40	30	30-50	35	10-30	30	20	35	40	40-50	20-40	50	0-10	40				
	pH	8	7	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8,5	8	8	8	8,5				
	Pokrycie przez roślin. %																										
	Veg.-Bedeckung %																										
	warstwa nadwodna	90	75	20	85	100	90	75	100	95	100	100	95	90	90	75	100	90	70	95	95	95	75				
	Luftschicht																										
warstwa na- i podwodna	30	20	30	45	65	25	30	60	30	60	75	100	40	40	10	20	40	10	15	15	15	15					
Wasserschicht																											
Powierzchnia zdjęcia m ²	25	12	25	25	25	12	8	100	100	100	100	25	25	8	20	25	6	8	15	12	16	20					
Aufnahmefläche m ²																											
Liczba gatunków	10	4	6	7	14	7	12	8	6	13	8	13	11	6	6	6	6	5	10	7	6	6					
Artenzahl																											
Variant - Variante:		A										B										A	B				
Gatunki charakt. zespołu																											
Charakterarten der																											
Assoziation:																											
Atr	Sparganium ramosum	1-2	2-3	1	2-3	3	1	1	4	5	4	4-5	4	2-3	4	3	4-5	4	1-2	3-4	+1	+1	1	V	V	V	3660
Atr	Typha angustifolia	.	.	.	.	.	.	.	+1	+1	+1	+1	1	+1	1	1	1-2	2-3	3	3-4	5	5	4	-	V	IV	1782
Atr	Typha latifolia	2	4	5	1-2	+1	4	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3-4	.	.	.	V	-	II	1160
Gatunki charakterystyczne																											
Charakterarten																											
Phragmition:																											
Atr	Glyceria aquatica	2	1-2	1-2	.	2-3	+	.	4	.	3	1	2-3	.	.	2-3	1-2	2	.	.	+	.	.	IV	III	III	1165
Atr	Rumex hydrophilum	1	.	.	1	2	.	.	+	+	+1	.	+1	.	2	2	1	.	1-2	1-2	+	+	.	III	IV	III	355
Atr	Sium latifolium	1	.	.	.	+1	.	.	+	.	2	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	+	II	II	II	251
Atr	Schoenoplectus lacustris	.	.	.	3	.	.	.	.	.	1	1-2	+	2-3	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	I	II	II	423
Atr	Phragmites communis	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1-2	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I	I	I	53
Atr	Phalaris arundinacea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+1	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	I	I	I	46
Huz/Hoz	Sagittaria sagitifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	-	I	I	80
Atr	Butomus umbellatus	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	12
Atr	Ranunculus lingua	.	.	.	.	2	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	80
Atr	Rorippa amphibia	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	80
Atr	Sparganium simplex	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	-	I	23
Atr	Schoenoplectus tabernaemontani	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	-	I	I	12
Gatunki charakterystyczne																											
Charakterarten																											
Phragmitetalia,																											
Phragmitetea:																											
Atr	Equisetum limosum	2-3	.	.	.	1-2	+	.	.	.	.	.	1	.	2	1-2	1	.	.	+	.	.	.	III	II	II	355
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	.	.	.	1	.	3	.	.	1	.	+1	1	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	II	I	II	250
Atr	Galium palustre	.	.	.	.	1-2	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	II	I	I	107
Atr	Acorus calamus	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I	I	I	159
Atr	Carex pseudocyperus	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	-	I	I	23
Atr	Carex gracilis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	79
Atr	Leersia oryzoides	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	-	I	79
Atr	Carex rostrata	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I	-	I	52
Atr	Iris pseudoacorus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	-	I	I	23
As	Oenanthe aquatica	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	-	I	I	12
Atr	Heleocharis palustris	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	-	I	12
Atr	Poa palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	-	I	0,5
Atr	Cicuta virosa	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	-	I	0,5
Gatunki towarzyszące																											
Begleiter:																											
Hon	Lemna minor	.	.	2-3	1-2	3-4	+	.	3	1	2	1	2	.	1-2	.	.	1	.	+	.	+	1	III	III	III	629
Hon	Spirodela polyrrhiza	.	.	+	.	1	.	.	3	+	2	4	1	.	3	.	.	1	.	.	.	.	.	II	III	II	773
Atr	Lythrum salicaria	.	.	.	.	11	.	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	II	II	104
Hon	Lemna trisulca	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	I	I	204
Atr/Hoz	Agrostis stolonifera	.	.	.	.	1	.	1-2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	98
Huz	Potamogeton lucens	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	-	I	159
Hon	Hydrocharis morsus-ranae	2	.	+	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	80
Atr	Epilobium parviflorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	52
Atr	Scirpus silvaticus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	-	I	I	23
Hon	Salvinia natans	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	23
Atr	Equisetum palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	12
Atr	Mentha aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	12
Atr	Solanum dulcamara	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	12
Hoz	Potamogeton natans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	-	12
Atr	Myosotis palustris	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	-	12
Atr	Glyceria fluitans	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	4-5	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	-	I	I	511
G	Microcystis flos-aquae	.	.	.	.	.	2-3	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	204
G	Glony nitkowate	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	284
G	Aphanizomenon flos-aquae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	I	I	

Forma morf.- biol.	Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme Miejscowość - Ort	20.8.	23.8.	21.8.	9.9.	13.8.	9.7.	23.7.	31.7.	28.7.	31.7.	13.8.	18.8.	28.7.	12.7.	24.8.	23.8.	11.9.	11.9.	4.7.	9.7.	13.8.	13.8.	19.7.	13.8.	9.9.	30.8.	14.9.	14.9.	11.8.	19.7.	13.8.	23.7.	16.7.
		1965	1965	1965	1965	1966	1966	1965	1965	1966	1966	1966	1966	1966	1966	1966	1965	1965	1965	1965	1966	1966	1966	1966	1966	1966	1965	1965	1965	1965	1966	1966	1965	1965
	Data - Datum	20.8.	23.8.	21.8.	9.9.	13.8.	9.7.	23.7.	31.7.	28.7.	31.7.	13.8.	18.8.	28.7.	12.7.	24.8.	23.8.	11.9.	11.9.	4.7.	9.7.	13.8.	13.8.	19.7.	13.8.	9.9.	30.8.	14.9.	14.9.	11.8.	19.7.	13.8.	23.7.	16.7.
	Głęb.wody cm - Wassertiefe	40	40	100	30-40	50	60	10-20	40	40	40	40	40	30-40	30-40	30-40	30-80	30-40	40	60	50	0	0	70	50	50	60	50	40	30	50	40	10	50
	pH	7,5	7,5	7,5	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7	7,5	8	8	7,5	7	7	7	7,5	8	8	8	8	7	7	7	7	7	
Morph. biol. Form	Pokrycie przez roślinność % Veg.-Bedeckung %																																	
	warstwa nadwodna Luftschicht	100	60	100	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100	90	100	75	80	100	100	100	100	100	100	80	75	100	85	100	75	100	100	100	100
	warstwa na- i podwodna Wasserschicht	100	20	30	20	20	25	75	20	20	15	20	50	20	90	100	60	20	20	20	2	20	20	20	90	25	20	20	20	35	20	20	20	20
	Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnahmefläche m ²	12	12	25	100	25	25	20	8	100	6	8	10	8	25	12	25	12	12	25	12	100	100	25	25	25	20	25	100	100	12	25	25	8
	Liczba gatunków - Artenzahl	6	2	4	6	1	3	5	2	6	2	2	6	8	8	8	8	8	2	2	1	2	4	5	5	6	6	4	5	4	8	2	4	2
Facja z - Facies mit:		Typha angustifolia						Typha latifolia				Sparganium ramosum						Schoenoplectus lacustris						Phragmites communis										
Gatunki charakt.zespołu Charakterarten der Assoziation:																																		
Atr	Typha angustifolia	5	4	5	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Typha latifolia	.	.	+	.	.	1-2	5	5	5	.	5	5	4-5	5	4-5	4-5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Sparganium ramosum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmiton:																																		
Atr	Phragmites communis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Schoenoplectus lacustris	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Rumex hydrolapathum	+	+-1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Glyceria aquatica	.	.	.	.	.	+-1	+	+	+	.	.	.	+-1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Huz/Hoz/ Atr	Sagittaria sagittifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+-1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Sium latifolium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Phalaris arundinacea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Rorippa amphibia	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia, Phragmitetum:																																		
Atr	Equisetum limosum	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
As	Oenanthe aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Acorus calamus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Carex gracilis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Poa palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Galium palustre	.	.	.	+-1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Iris pseudocorus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr/Hoz	Cicuta virosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gatunki towarzyszące Begleiter:																																		
Hon	Lemna minor	+-1	.	1	.	.	.	3-4	.	.	.	.	1	.	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	4-5	+	+	1	+-1	2	.	+
Hon	Spirodela polyrrhiza	4-5	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hoz	Myriophyllum verticillatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Huz	Potamogeton lucens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Lythrum salicaria	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hon	Hydrocharis morsus-ranae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hun	Lemna trisulca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Alopecurus geniculatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Huz	Potamogeton compressus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Solanum dulcamara	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hun	Utricularia vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hon	Salvinia natans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Atr	Mentha aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hun	Ceratophyllum demersum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hun	Riccia fluitans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B-Hu	Drepanocladus aduncus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
G	Microcystis flos-aquae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
G	Aphanizomenon flos-aquae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
G	Glony nitkowate	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Fadenalgen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryc. 15. *Scirpo-Phragmitetum*, facje ze *Sparganium ramosum* i z *Schoenoplectus lacustris* (Ryczyca)

Scirpo-Phragmitetum, Fazies mit *Sparganium ramosum* und mit *Schoenoplectus lacustris* (Ryczyca)

Typowo rozwinięte *Scirpo-Phragmitetum*, mimo bardzo pospolitego występowania jego komponentów, spotykane jest rzadko i to najczęściej w postaci niewielkich płatów (ryc. 13). Najbardziej reprezentatywne zdjęcia tego zespołu zestawiono w tabeli 8. Przedstawiony tu zespół występuje w postaci dwóch wariantów: A — z *Typha latifolia* (typowy) i B — z *T. angustifolia*. Zestaw gatunków charakterystycznych dla *Scirpo-Phragmitetum* przyjąłem za Ellenbergiem (1963), co w zasadzie odpowiada ujęciu Tüxena i Preisinga (1951).

Jest to zbiorowisko trójwarstwowe, przy czym warstwę nadwodną tworzą byliny szuwarowe, zaś warstwę na- i podwodną — drobne naczyniowe rośliny wodne i glony. Dominują zwykle rośliny kłaczowe, co wykazuje wyraźnie niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne:

Atr	81	Hun	1
As	< 1	Huz,	1
Hon	11	G	6
	Hoz	< 1	

Pod względem florystycznym zespół jest dość ubogi; w zdjęciu występuje 5—14 gatunków. Rozwinięty jest zwykle fragmentarycznie, z widoczną przewagą któregoś z komponentów. W ten sposób powstają jego facje (tab. 9) budowane głównie przez 5 najpospoliciej występujących gatunków: *Typha angustifolia* (ryc. 14), *Typha latifolia*, *Sparganium ramosum*, *Schoenoplectus lacustris* i *Phragmites communis*. Te zbiorowiska facjalne pokrywają niekiedy ogromne przestrzenie stawów, przy czym w jednym kompleksie stawów zaznacza się zwykle dominacja któregoś z nich. Rozłożone jednak bywają również mozaikowo (ryc. 15), zachodząc często na siebie lub wnikając pomiędzy siebie. Granice między nimi mogą być czasem bardzo wyraźne, a w innych przypadkach zatarte, gdy poszczególne gatunki dominujące mieszają się z sobą. Zwartość pokrywy roślinnej *Scirpo-Phragmitetum* może być różna i waha się, w zależności od warunków, od 20 do 100%; największą zwartość osiąga ten zespół w swych formach facjalnych, gdzie pokrycie warstwy nadwodnej osiąga zwykle około 100%.

Scirpo-Phragmitetum występuje zarówno w strefach przybrzeżnych, jak również i pośrodku stawów, zarastając je niekiedy całkowicie. Tylko w stawach regularnie czyszczonych umiejscawia się przy brzegach, jednak już po 2—3 latach braku pielęgnacji wkracza w środkowe partie zbiornika.

Omawiany zespół jest najpospolitszym zbiorowiskiem zarastającym stawy rybne. Bierze on bardzo aktywny udział w zarastaniu stawów i wskutek swej ogromnej ekspansywności jest w nich bardzo niepożądanym. Działalność jego jest bardzo groźna, ponieważ w stawach rybnych, jako w zbiornikach o jednakowej i niewielkiej głębokości wód, znajduje dla siebie optymalne warunki i tylko bezustanna walka z nim — regularne czyszczenie stawów — może zapobiegać całkowitemu zarośnięciu. Zbiorowisko to działa intensywnie w kierunku spływania stawów — z jednej strony przez produkcję znacznych ilości masy organicznej, której tylko część ulega szybkiemu rozkładowi, z drugiej zaś — przez przeraśnięcie dna zbiornika za pomocą licznych kłaczy.

Zbiorowisko z *Acorus calamus*

W zbiorowisku tym (tab. 10) gatunkiem przewodnim i równocześnie dominującym jest *Acorus calamus*. Poza nim występują tu dość licznie rośliny szuwarowe, jak: *Glyceria aquatica*, *Phragmites communis*, *Schoenoplectus lacustris*, *Equisetum limosum* i wiele innych oraz rośliny wodne, głównie *Lemna minor* i *Spirodela polyrrhiza*. Liczba gatunków w zdjęciu wynosi 2—10.

Zbiorowisko jest trójwarstwowe; warstwę nadwodną tworzą duże byliny szuwarowe, warstwę na- i podwodną — rośliny wodne.

Zbiorowisko z *Acorus calamus*

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Leitart der Gesellschaft:

Y 6704

•

III

III

11

$$\begin{array}{cc} \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

III

II

I

III

II

H

— — —

44

I

III

III

— — —

H

— — —

II

I

Ryc. 16. Zbiorowisko z *Acorus calamus* (Gostomia)
Pflanzengesellschaft mit *Acorus calamus* (Gostomia)

Jak widać z podanego spektrum morfologiczno-biologicznego, dominują byliny kłaczowe:

Atr	78	Hon	20
As	< 1	Huz	> 1
Hoz	< 1	G	< 1

Z punktu widzenia systematyki fitosocjologicznej stanowisko tego zbiorowiska jest kontrowersyjne. Niektórzy autorzy, jak np. Kępczyński (1965), uwzględniając jego specyficzny charakter, traktują je jako zespół *Acoretum calami* (Eggler 1933), Kobendza 1948, inni zaś, i tych jest większość, w ogóle nie wymieniają takiego zespołu, uwzględniając tylko odpowiedni wariant w ramach *Scirpo-Phragmitetum*. Z moich obserwacji wynika, że zbiorowisko z *Acorus calamus* można włączyć do związku *Phragmition*, lecz — ze względu na bardzo częsty brak w nim gatunków charakterystycznych dla *Scirpo-Phragmitetum* — nie wydaje mi się słuszne zaliczenie go do tego zespołu. Z drugiej strony częsty udział *Acorus calamus* w zbiorowiskach z przewagą wysokich turzyc może stawiać je wśród zbiorowisk przejściowych między *Phragmition* i *Magnocaricion*.

Acorus calamus tworzy często zbiorowiska bardzo prymitywne, fac-

jalne. Niekiedy stanowi domieszkę w zbiorowskich szuwarowych, innym razem zaś jest stałym składnikiem zbiorowisk turzycowych.

Zwarcie zbiorowiska z *Acorus calamus* jest zwykle duże i waha się od 70 do 80%.

Zbiorowisko to jest bardzo pospolite. Występuje zarówno przy brzegach (ryc. 16), jak również pośrodku stawów, gdzie może zajmować duże przestrzenie. W zarastaniu bierze bardzo duży udział, głównie dzięki spływającej działalności grubych kłaczy *Acorus calamus*. Jest ono bardzo ekspansywne i szybko zasiedla teren.

Glycerietum maximae Hueck 1931

Głównym gatunkiem budującym *Glycerietum maximae* (tab. 11) jest *Glyceria aquatica*, jedyny gatunek charakterystyczny tego zespołu; wykazuje on największą stałość (V) w tym zespole i bierze w nim największy udział. Poza nim występuje tu wiele roślin szuwarowych, jak np.: *Sparganium ramosum*, *Rumex hydroiopathum*, *Schoenoplectus lacustris*, *Equisetum limosum*, *Acorus calamus* i szereg innych, które tworzą warstwę nadwodną. Warstwę nadwodną budują głównie drobne rośliny pływające, jak *Lemna minor* i *Spirodela polyrrhiza* oraz — niekiedy — *Hydrocharis morsus-ranae*. Najslabiej rozwiniętą warstwę podwodną tworzy czasem *Potamogeton lucens* i niektóre mchy oraz glony.

Zbiorowisko jest dość ubogie pod względem florystycznym; liczba gatunków w zdjęciu waha się od 4 do 12. Zwartość roślinności jest zwykle duża i wynosi często 100%. Jak widać z podanego niżej spektrum morfologiczno-biologicznego bezwzględnie panują w nim rośliny kłaczowe, chociaż dość znaczny udział mają tam również pływające rośliny wodne.

Atr	76.0	Hoz	< 1.0	B-Hu	< 1.0
K/D	< 1.0	Huz	2.3	B-Ho	< 1.0
As	1.6	Hon	15.0	G	3.8

W typowej postaci, z udziałem różnych innych gatunków szuwarowych, *Glycerietum maximae* występuje dość pospolicie, jednak znacznie częściej tworzy zbiorowiska facjalne zbudowane prawie wyłącznie z *Glyceria aquatica*. Lokuje się ono zwykle na otwartej przestrzeni stawów, tworząc ogromne płyty, pokrywające nieraz całkowicie lub prawie całkowicie powierzchnię zbiornika (ryc. 17). W stawach regularnie czyszczonych i dość głębokich tworzy wąskie pasy przybrzeżne. Bardzo często jest pionierskim zbiorowiskiem szuwarowym, wchodzącym bezpośrednio w wodę (ryc. 18).

Jest to zbiorowisko bardzo pospolite, występujące prawie we wszystkich stawach, tworzące zazwyczaj duże łany, które zajmują znaczne przestrzenie zbiornika. Często występuje jako jeden z elementów w mozaice zbiorowisk facjalnych.

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gatunki towarzyszące - Begleiter:

Lemna minor

Spirodela po

Potamogeton

Lythrum salicaria

Hydrocharis

Polygonum hy

Polygonum am.

Agrostis sto.

Alnus glutinosa

Lysimachia v.

Cirsium palu-

Epilobium pa-

Solanum dulc
etaceae

Stachys pallu-

Drepanocladu

D. aduncus I.

Классификация

Glony nitkow

Aphanizomeno

Ryc. 17. *Glycerietum maximae* (Łazów)

Ryc. 18. Wkraczający w wodę płat *Glycerietum maximae* (Jagięła)
Ein ins Wasser eindringendes Fragment von *Glycerietum maximae* (Jagięła)

Ryc. 19. Płat *Oenanthro-Rorippetum* (Golice)
Ein Fragment von *Oenanthro-Rorippetum* (Golice)

Udział jego w zarastaniu stawów rybnych jest bardzo duży, ponieważ występuje bardzo pospolicie i zasiedla duże obszary. Produkuje dużą ilość masy organicznej, która jednak ulega szybkiemu rozkładowi. Rola jego w spłycaaniu zbiornika jest znaczna, ponieważ liczne i dość grube kłacza *Glyceria aquatica* przerastają dno we wszystkich kierunkach i wypiętrzają je.

Zbiorowisko bardzo ekspansywne i trudne do zwalczania.

Oeanthro-Rorippetum Lohmeyer 1950

Oeanthro-Rorippetum (tab. 12) budują głównie dwa gatunki, charakterystyczne zresztą dla zespołu: *Rorippa amphibia* i *Oenanthe aquatica*. Poza nimi występują stosunkowo nielicznie reprezentowane inne rośliny szuwarowe, jak np. *Sagittaria sagittifolia*, *Equisetum limosum* oraz niektóre wodne, jak np. *Potamogeton lucens*.

Zespół jest ubogi w gatunki, których liczba w zdjęciu waha się od 5 do 8. Dominują byliny kłaczowe, chociaż ze względu na obecność *Oenanthe aquatica* udział roślin rocznych (dwuletnich) jest również znaczny.

Forma morf.- -biol. Morph.- -biol. Form	Nr.zdjęcia - Nr.d.Aufnahme Miejscowość - Ort	164	539	359	Sta- łość w sto- sunku do 3	Współ- czyn- nik pokry- cia
		G	Ch	Sb		
	Data - Datum	21.8.1965	13.8.1966	9.7.1966		
	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	60	100	60		
	pH	7	8	7		
	Pokrycie przez roślinność %					
	Veg.-Bedeckung %					
	warstwa nadwodna - Luftschicht	100	100	90		
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	40	30	15		
	Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	8	25	25		
	Liczba gatunków - Artenzahl	8	5	7		
Gatunki charakterystyczne zespołu Charakterarten der Assoziation:		1	2	3		
Atr	Rorippa amphibia	5	4	2	3	5550
As	Oenanthe aquatica	+	2	3	3	1837
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmiton:						
Huz/Hoz	Sagittaria sagittifolia	.	1-2	1-2	2	766
Atr	Sparganium ramosum	.	.	2-3	1	917
Atr	Phalaris arundinacea	+	.	.	1	3
Atr	Rumex hydrolapathum	+	.	.	1	3
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia und Phragmiteteta:						
Atr	Equisetum limosum	+1	.	1	2	253
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	3	.	1	1250
Gatunki towarzyszące - Begleiter:						
Huz	Potamogeton lucens	2	1	.	2	750
Hoz	Polygonum amphibium	+	.	1-2	2	387
Atr	Lythrum salicaria	+	.	.	1	3
Atr	Alopecurus geniculatus	.	.	+	1	3

Tabela 13

Scirpetum maritimi /Christ.1934/ R.Tx.1937

Forma morf.- -biol. Morph.- -biol. Form	Nr zdjęcia - Nr. d. Aufnahme Miejscowość - Ort	559	Współ- czyn- nik pokry- cia
		2b	
	Data - Datum	18.8.1966	
	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	30	
	pH	8	
	Pokrycie przez roślinność %		
	Veg.-Bedeckung %		
	warstwa nadwodna - Luftschicht		
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht		
	Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	8	
	Liczba gatunków - Artenzahl	9	
Gatunki charakterystyczne zespołu Charakterarten der Assoziation:			
Atr	Eulboschoenus maritimus	4	6250
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmiton:			
Atr	Glyceria aquatica	2	1750
Atr	Phragmites communis	1-2	1150
Atr	Butomus umbellatus	+	10
Gatunki towarzyszące - Begleiter:			
Hoz	Lemna minor	4	6250
Hoz	Spirodela polyrrhiza	2	1750
Atr	Lysimachia vulgaris	+	10
Atr	Stachys palustris	+	10

Atr	68.1	Huz	9.7
As	15.7	Hoz	6.5

W postaci typowej zespół występuje dość rzadko. Zwykle spotkać go można w formie facjalnej. Występuje zarówno przy brzegach, jak również w centralnych partiach stawów (ryc. 19). Często pojawia się jako zbiorowisko pionierskie w świeżo oczyszczonych stawach. Jego dwa podstawowe komponenty, *Oenanthe aquatica* i *Rorippa amphibia*, wchodzi niekiedy w skład pionierskich zbiorowisk na dnie osuszonych stawów.

Ze względu na niewielką frekwencję w stawach i produkcję szybko rozkładającej się masy organicznej nie odgrywa większej roli w zarażaniu zbiorników.

Scirpetum maritimi (Christ. 1934) R. Tx. 1937

Poza gatunkiem charakterystycznym, *Bulboschoenus maritimus*, w zespole tym (tab. 13) biorą udział również inne rośliny szuwarowe, jak: *Glyceria aquatica*, *Phragmites communis* i *Butomus umbellatus* oraz rośliny wodne: *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza* i glony (*Microcystis flos-aquae*).

Panują rośliny kłaczowe, a w tym bezwzględną przewagę utrzymuje *Bulboschoenus maritimus* (por. niżej spektrum morfologiczno-biologiczne).

Atr	46
Hon	40
G	14

Ten bardzo specyficzny zespół występuje na terenach Polski głównie w miejscach zasolonych (por. Olaczek 1963). Notowany był jednak i znad brzegów Wisły, w jej dolnym i średnim biegu (Kępczyński 1965). Jego istnienie stwierdziłem w roku 1967 również nad Wisłą w obrębie Warszawy.

W badanych przeze mnie stawach znalazłem to zbiorowisko tylko na obszarze gospodarstwa rybnego w Żabieńcu koło Warszawy. Zajmuje ono tam niewielki fragment brzegu dużego stawu położonego w północnej części gospodarstwa (w pobliżu bramy wjazdowej).

Sądząc z jego zwartości i składu gatunkowego, można przypuszczać, że zespół ten przy obfitym występowaniu miałby duże znaczenie w zarastaniu przestrzeni wodnej stawów. Jednak z powodu jego sporadycznego występowania w obecnej chwili nie odgrywa żadnej roli w zarastaniu stawów woj. warszawskiego.

Caricetum elatae W. Koch 1926

Głównym i nadającym aspekt elementem tego zespołu (tab. 14) jest *Carex Hudsonii*, która tworzy kępy bardzo zwarte i wysokie do 50 cm

Tabela 14
Caricetum elatae W.Koch 1926

Forma morf.- -biol. Morph.- -biol. Form	Nr zdjęcia - Nr. d.Aufnahme Miejscowość - Ort	299	295	298	162	520	339	Sta- żość w sto- sunku do 6	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
		Br	Br	Br	Go	Jz	Nd		
	Data - Datum	13.9. 1965	13.9. 1965	13.9. 1965	21.8. 1965	11.8. 1966	6.7. 1966		
	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	30	0-0	30-40	20-35	40-10	15		
	pH	7	6,5	7	6,5	6	7		
	Pokrycie przez roślinność %								
	Veg.-Bedeckung %								
	warstwa nadwodna - Luftschicht	100	100	100	80	90	100		
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	20	-	30	30	80	20		
	Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	100	50	200	20	25	25		
	Liczba gatunków - Artenzahl	12	9	14	9	12	14		
	Gatunki charakterystyczne zespołu Charakterarten der Assoziation:	1	2	3	4	5	6		
Atp	Carex Hudsonii	4-5	4	5	3	4-5	3	6	6250
	Gatunki charakterystyczne Charakterarten Magnocaricion:								
Atr	Lysimachia thyrsiflora	.	.	.	+1	1	.	2	127
Atr	Carex rostrata	.	.	+1	.	.	.	2	45
Atr	Leersia oryzoides	.	.	.	.	.	2-3	1	458
Atr	Carex gracilis	.	.	.	.	.	1-2	1	191
Atr	Galium palustre	.	.	.	.	1	.	1	83
Atp	Carex pseudocyperus	.	.	.	.	.	+	1	2
Atr	Peucedanum palustre	.	.	.	+	.	.	1	2
	Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia, Phragmiteten:								
Atr	Iris pseudacorus	+	1	+	.	+1	.	4	130
Atr	Phragmites communis	1	.	.	3	.	+1	3	752
Atr	Sparganium ramosum	1	2	+	.	.	.	3	377
Atr	Equisetum limosum	.	1	+1	.	.	+	3	128
Atr	Rumex hydrolapathum	1	1	+	.	.	.	3	168
Atr	Typha latifolia	+	.	+	.	.	+	3	5
Atr	Glyceria aquatica	.	1-2	.	.	.	2	3	485
Atr	Typha angustifolia	.	1-2	.	.	.	2	3	485
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	1	.	.	.	+	2	85
Atr	Schoenoplectus lacustris	.	.	.	.	.	1	1	83
Atr	Heleocharis palustris	.	.	.	.	.	1	1	83
Hoz/Huz	Sagittaria sagittifolia	.	.	.	.	.	+	1	2
	Gatunki towarzyszące - Begleiter								
Atr	Calamagrostis lanceolata	1-2	.	+	1	+1	.	4	340
Hoz	Lemna minor	+	.	1	+1	.	.	3	128
Atr/Hoz	Polygonum amphibium	.	+1	.	.	+1	.	2	86
Atr	Lysimachia vulgaris	+	.	.	+	.	.	2	3
Huz	Potamogeton gramineus	.	.	.	.	1-2	.	1	191
Atr	Dryopteris thelypteris	.	.	.	.	1	.	1	83
Atr/Hoz	Agrostis canina	.	.	.	.	1	.	1	83
Atr	Hydrocotyle vulgaris	.	.	.	.	1	.	1	83
Atr	Comarum palustre	.	.	+	.	.	.	1	2
Atr	Menyanthes trifoliata	.	.	+	.	.	.	1	2
Hoz	Spirodela polyrrhiza	.	.	+	.	.	.	1	2
K	Salix cinerea /150 cm/	.	.	.	.	.	.	1	2
K	Alnus glutinosa /100 cm/	+	.	.	.	.	.	1	2
Atr	Epilobium palustre	.	.	.	.	.	.	1	2
B-Hu	Riccia fluitans	+1	.	+1	.	.	.	2	86
B-At/B-Ho	Calliergon cuspidatum	.	.	.	.	1-2	.	1	191
B-Ho	Ricciocarpus natans	.	.	+	.	.	.	1	2
G	Gleny - Algen	.	.	.	2	1	.	2	375

Ryc. 20. *Caricetum elatae* (Broszków)

(ryc. 20). Kępy te z wiekiem stają się pośrodku martwe, „łysieją”, i wówczas lokują się na nich różne inne rośliny. Między kępami znajduje się zwykle woda, a w niej rośliny szuwarowe (*Lysimachia thyrsiflora*, *Iris pseudoacorus*, *Phragmites communis*, *Sparganium ramosum*, *Equisetum limosum* i inne) i wodne (*Lemna minor*, niektóre gatunki z rodzaju *Potamogeton*, *Riccia fluitans*, *Calliergon cuspidatum* i inne). Stosunek powierzchni kęp do powierzchni dolinek bywa różny; istnieją płaty, gdzie dominują kępy, ale bywa i tak, że są one rozłokowane dość luźno. Zwartość roślinności jest duża i wynosi około 100%. Przeważają byliny kępkowe, chociaż dużą frekwencję wykazują również byliny kłaczowe, co ilustruje niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne:

Atp	54.0	Hon	1.1
Atr	37.0	B-At	< 1.0
K	< 1.0	B-Hu	< 1.0
Hoz	< 1.0	B-Ho	< 1.0
Huz	1.5	G	3.2

Florystycznie zespół nie jest bogaty; w zdjęciu występuje od 9 do 14 gatunków.

W zarastaniu odgrywa znaczną rolę, gdyż produkuje duże ilości substancji organicznej, która rozkłada się powoli. W skali ogólnej jednak, ponieważ występuje dość rzadko, nie jest zbiorowiskiem groźnym dla gospodarki stawowej. Jest symptomem zaniedbania stawów i pojawia się

tylko w miejscach, gdzie nie przeprowadzano czyszczenia przez dłuższy okres czasu, lub w peryferycznych partiach stawów graniczących bezpośrednio (bez grobli) z łąkami.

Caricetum paniculatae Wangerin 1916

Podstawowym składnikiem tego zespołu (tab. 15) i zarazem jego gatunkiem charakterystycznym jest *Carex paniculata*. Buduje ona duże (do 40 cm wysokości), rozłożyste kępy, na których — podobnie jak w przypadku *Carex Hudsonii* — w późniejszych stadiach rozwojowych mogą lokować się różne rośliny — do krzewów włącznie (np. *Salix cinerea*). Między tymi kępami, w dolinkach, które nierzadko są podtopione, występują różne rośliny błotne (*Equisetum limosum*, *Rumex hydrolapathum*, *Ranunculus lingua*, *Peucedanum palustre*, *Comarum palustre*, *Lythrum salicaria*, *Lycopus europaeus*, *Menyanthes trifoliata* i szereg innych) oraz niekiedy wodne (głównie *Lemna minor* i mszaki). Zbocza kęp i dolinki pokrywają mchy, a wśród nich najczęściej *Calliergon cuspidatum* i *Drepanocladus aduncus* var. *polycarpa*.

Zespół jest dość bogaty pod względem florystycznym; liczba gatunków w zdjęciu wynosi 9—20.

Charakterystyczny aspekt całemu zbiorowisku nadają kępy *Carex paniculata*, jednak, jak wynika z niżej podanego spektrum morfologiczno-biologicznego, dominują byliny kłaczowe. Dopiero drugie miejsce po nich zajmują rośliny kępkowe i obficie reprezentowane mszaki.

Atr	35	Hon	2	B-At	24
Atp	29	As	< 1	B-Ho	4
Hoz	1	K	3	B-Hu	2

Panującą tutaj grupę tworzą gatunki ze związku *Magnocaricion*. Zaznacza się jednak znaczny udział elementów należących do *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* i *Molinio-Arrhenatheretea*. Fakt ten potwierdza stanowisko *Caricetum paniculatae* w ciągu sukcesyjnym przemian roślinności w badanych przeze mnie stawach. Zespół ten stanowi pewnego rodzaju ogniwo łączące zbiorowiska szuwarowe z łąkowymi, a nawet, w niektórych przypadkach, z ostatnimi członami sukcesji — zbiorowiskami krzewiastymi i leśnymi (lasy olszowe). Omawiany zespół występuje w stawach niezbyt często. Rozwija się głównie w spłyconych i zaniedbanych partiach stawów, gdzie głębokość wody nie przekracza 30 cm, albo w miejscach zupełnie zładowaonych, o podłożu zatorfionym. Jego główny komponent, *Carex paniculata*, często wchodzi w zbiorowiska łąk mszysto-turzycowych, tworząc tu i ówdzie duże kępy.

W zarastaniu (w końcowych stadiach) stawów *Caricetum paniculatae* odgrywa dużą rolę dzięki szybkiemu rozrastaniu się kęp, powodowaniu

wypiętrzania podłoża i produkcji dużej ilości wolno rozkładającej się masy organicznej. Pojawianie się tego zespołu stanowi sygnał zupełnego zaniedbania stawów.

Zbiorowisko z *Carex elongata*

Zbiorowisko z *Carex elongata* jest bardzo zbliżone do *Caricetum paniculatae*, i to zarówno florystycznie (oczywiście poza gatunkiem przewodnim), jak i fizjonomicznie. Budują je dość duże kępy *Carex elongata* porośnięte na zboczach przez *Calliergon cuspidatum*. Między kępami występują różne byliny (głównie szuwarowe). O składzie florystycznym tego zbiorowiska daje wyobrażenie zdjęcie 55 (Nowodwór, 16.7.65, głęb. wody — 10 cm, pH 6,5, pokrycie przez roślinność 100%, pow. zdjęcia 25 m²); *Carex elongata* 3, *Iris pseudoacorus* +, *Sium latifolium* +, *Carex vesicaria* +—1, *Heleocharis palustris* 3, *Equisetum limosum* 1, *Ranunculus lingua* +, *Lythrum salicaria* +, *Poa palustris* +—1, *Rumex hydrolapathum* +, *Galium palustre* +—1, *Carex fusca* +—1, *Polygonum amphibium* 1, *Myosotis palustris* 1, *Calliergon cuspidatum* 2.

W badanych przeze mnie stawach zbiorowisko to jest rzadko spotykane. Występuje w miejscach o bardzo zaawansowanym procesie ładowania zbiornika. Jest ekspansywne i wytwarza znaczną ilość na ogół wolno rozkładającej się substancji organicznej.

Caricetum inflato-vesicariae W. Koch 1926

Gatunkiem panującym w *Caricetum inflato-vesicariae* (tab. 16) jest zwykle *Carex rostrata*. Oprócz niej występują tu również inne rośliny błotne (*Equisetum limosum*, *Rumex hydrolapathum*, *Cicuta virosa*, *Typha angustifolia*, *Sparganium ramosum* i szereg innych) oraz wodne (głównie *Calliergon cuspidatum* i *Drepanocladus aduncus*). Florystycznie nie jest to zespół bogaty i, w zależności od warunków, wykazuje obecność od 5 do 16 gatunków w zdjęciu.

W zasadzie jest to zbiorowisko dwuwarstwowe, tylko czasem, gdy biorą w nim udział rośliny podwodne, wyróżnia się obecnością trzech warstw.

Bezwzględnie dominują tu byliny kłaczowe, co uwidacznia niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne:

Atr	82.0	Huz	< 1.0
Atp	< 1.0	B-Ho	5.0
Hoz	< 1.0	B-Hu	5.2
Hon	2.4	B-At	3.6
Hun	< 1.0	G	< 1.0

Caricetum inflato-vesicariae jest zespołem wielopostaciowym. Główną przyczyną tego jest duża rozpiętość jego wymagań siedliskowych. W ba-

Ryc. 21. Płat *Caricetum inflato-vesicariae* w wodzie (Szostek)

Ein Fragment von *Caricetum inflato-vesicariae* im Wasser (Szostek)

danych przeze mnie stawach zespół ten występował w postaci dwóch wariantów:

- A — wariantu z dużą ilością wielkich bylin, głównie ze związku *Phragmition* (*Equisetum limosum*, *Rumex hydrolapathum*, *Typha angustifolia*, *Sparganium ramosum*, *Glyceria aquatica*, *Typha latifolia*);
- B — wariantu typowego, o umiarkowanym udziale przedstawicieli *Phragmition*.

Występuje bardzo pospolicie w zaniedbanych, nie czyszczonych stawach lub w peryferycznych częściach stawów zbiorczych, stykających się bezpośrednio (bez grobli) z okalającymi je łakami. Zbiorowisko to spotkać można zarówno bezpośrednio w wodzie (ryc. 21), jak również w miejscach zupełnie zładowaonych, tylko okresowo podtopionych, gdzie wchodzi w skład łąk mszysto-turzycowych.

Odgrywa bardzo dużą rolę w zarastaniu stawów. Występuje zarówno w dość wczesnych stadiach rozwojowych roślinności stawów, jak również w stadiach późnych. Bardzo szybko opanowuje teren i tworzy doskonałe warunki dla nowych, po nim następujących zbiorowisk (łąki mszysto-turzycowe).

Przeważającym fizjonomicznie elementem tego zespołu (tab. 17, 18, 19) jest *Carex gracilis*. Tworzy ona mniej lub więcej zwarte łany przetkane innymi roślinami błotnymi. Są to głównie: *Rumex hydrolapathum*, *Equisetum limosum*, *Iris pseudoacorus*, *Sparganium ramosum*, *Typha latifolia* i *T. angustifolia*, *Galium palustre*, *Carex rostrata*, *C. vesicaria*, *Poa palustris* i szereg innych. W zdjęciu występuje 5—7 gatunków.

W zależności od stanu rozwojowego tego zespołu można wyróżnić dwa stadia: wcześniejsze i późniejsze.

Stadium wcześniejsze (tab. 17), w stosunku do stadium późniejszego, wyróżnia się znaczną ilością roślin wodnych (patrz niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne) oraz nieco mniej zwartą budową.

Atr	90.5	Huz	< 1.0
Atp	< 1.0	B-Hu	2.0
Hoz	< 1.0	B-Ho	2.0
Hon	5.0		

W stadium tym zbiorowisko może występować w postaci dwóch wariantów:

A — wariantu bez gatunków charakterystycznych dla *Magnocaricion* (oczywiście z wyjątkiem *Carex gracilis*);

B — wariantu typowego.

Wariant pierwszy (A) wskutek obecności wielu gatunków ze związku *Phragmition* nawiązuje dość wyraźnie do zespołów tego związku i to tak dalece, że niektóre jego płaty mogą być zaklasyfikowane równie dobrze do związku *Magnocaricion* jak i *Phragmition*. Jest on rozwojowo wcześniejszy od wariantu drugiego (B), który wykazuje już pewien udział gatunków ze związku *Magnocaricion*.

Stadium późniejsze (tab. 18) *Caricetum gracilis* jest już w zasadzie typowo rozwiniętym zespołem, zawierającym zawsze gatunki ze związku *Magnocaricion*, i jest florystycznie bogatsze od stadium wcześniejszego. Zaznacza się tu bardzo duży udział mszaków i to — ze względu na znaczne spływanie, a nawet całkowite złądownienie — mszaków lądowych (patrz niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne).

Atr	67.8	Hon	2.1
Atp	2.7	B-At	18.1
As	< 1.0	B-Hu	4.2
K	< 1.0	B-Ho	4.2
Hoz	< 1.0		

Na osobną uwagę zasługuje wariant tego zespołu z *Calamagrostis canescens* (tab. 19). Należy go zaliczyć do późnego stadium rozwojowego *Caricetum gracilis*. Panują tu byliny kłaczowe, co ilustruje niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne:

Tabela 16
Caricetum inflato-vesicariae Koch 1926

Forma morf.- biol. -biol. Form	Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme	85a	296	141	446	219	344	486	134	394	460	504	222	140	133c	132	113b	Sta- łość	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert	
	Miejscowość - Ort	St	Br	Sz	21	Kw	Nd	Je	Sz	J2	Wa	W1	Kw	Sz	Sz	Sz	Ku			
	Data - Datum	28.7. 1965	13.9. 1965	16.8. 1965	28.7. 1966	30.8. 1965	6.7. 1966	7.8. 1966	16.8. 1965	19.7. 1966	29.7. 1966	9.8. 1966	30.8. 1965	16.8. 1965	16.8. 1965	16.8. 1965	7.8. 1965			
	Głęb.wody cm - Wassertiefe cm	0-10	20	15	30-40	20	5-10	-5	50-50	60	50	10	20	30	30	30	30			
	pH	8	6,5	7	7	7-5	7-5	7	7	7	7	7	6,5	7-5	7	7	8			
	Pokrycie przez roślinność %																			
	Veg.-Bedeckung %																			
	warstwa nadwodna	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90	100	100	40	100	95	70			
	Luftschicht																			
	warstwa na- i podwodna	20	40	30	60	80	25	80	20	15	70	80	90	5	20	20	15			
	Wasserschicht																			
	Powierzchnia zdjęcia m ²	12	25	25	100	25	25	100	25	25	100	100	25	6	25	8	8			
	Aufnahmefläche m ²																			
	Liczba gatunków - Artenzahl	6	11	5	11	16	11	15	11	5	10	9	14	6	6	7	5			
	Wariant - Variante	A										B								
Gatunki charakterystyczne zespołu																				
Charakterarten der Assoziation:																				
Atr	Carex rostrata	2-3	2	3	3-4	4	4	2-3	4-5	4-5	4-5	4-5	3	2	5	5	2-3	V	5391	
Atr	Carex vesicaria	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	109	
Atr	Lysimachia thyrsiflora	.	.	.	.	.	.	1-1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	16	
Gatunki charakterystyczne																				
Charakterarten Magnocaricion:																				
Atr/Hoz	Cicuta virosa	+	.	.	.	.	.	.	1-1	.	.	.	.	1	+	.	+	II	49	
Atr	Galium palustre	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	I	94	
Atr	Carex pseudocyperus	.	+	.	.	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I	32	
Atr	Carex gracilis	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	73	
Atr	Calla palustris	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	I	73	
Atr	Carex paradoxa	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	31	
Atr	Lycopus europaeus	.	.	.	.	1-1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	16	
Gatunki charakterystyczne																				
Charakterarten Phragmitetalia																				
und Phragmitetea:																				
Atr	Equisetum limosum	1-2	1-1	1-2	1	.	.	4	2-3	2	1	.	2	1-2	2	1-1	.	IV	1201	
Atr	Rumex hydrolapathum	.	+	.	1-2	1-1	.	2-3	+	.	+	1-2	.	.	.	.	.	III	334	
Atr	Typha angustifolia	.	.	4	3-4	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II	706	
Atr	Sparganium ramosum	.	+	1-2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	277	
Atr	Glyceria aquatica	.	.	.	2	.	3	1-1	.	.	.	.	.	.	.	.	1-2	II	432	
Atr	Typha latifolia	+	.	.	.	.	1	1-2	.	.	1-1	.	.	.	.	.	.	II	120	
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	33	
Atr	Iris pseudoacorus	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1-1	I	79	
Atr	Ranunculus lingua	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	2	
Atr	Phragmites communis	4	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I	781	
Atr	Acorus calamus	.	.	.	.	3-4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	312	
Atr	Sium latifolium	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	125	
Atr	Rorippa amphibia	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	125	
Gatunki towarzyszące																				
Begleiter:																				
Hon	Lemna minor	.	1	.	1-2	2	+	.	+	.	.	.	.	1-1	.	+	.	III	231	
Hon	Spirodela polyrrhiza	.	1-2	.	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	II	106	
Atr	Lythrum salicaria	.	.	.	1	1-1	I	2-3	.	.	1-1	.	.	.	.	.	.	II	267	
Atr	Scirpus silvaticus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	II	261	
Atr	Comarum palustre	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2-3	I	416	
Atr	Carex fusca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	I	306	
Atr/Atr	Calla palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-2	3	.	.	.	.	I	88	
Atr	Agrostis stolonifera	.	+	.	.	.	.	1-2	.	.	.	1-1	.	.	.	.	.	I	72	
Atr	Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	1-1	.	.	.	1-2	.	.	.	.	I	17	
Hon	Hydrocharis morsus-ranae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-1	.	I	17	
Atr	Epilobium palustre	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1	
Hon	Utricularia vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	31	
Atr	Myosotis palustris	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	31	
Atr	Ranunculus flammula	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	16	
Atr	Calamagrostis canescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-1	.	.	.	.	.	.	I	16	
Atr	Menyanthes trifoliata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-1	.	.	.	.	I	16	
Atr	Juncus conglomeratus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5	
Hon	Fotamogeton natans	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5	
Huz	Myriophyllum spicatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5	
Hoz	Polygonum amphibium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5	
B-Ho/B-Hu/ /B-At	Calliergon cuspidatum	.	.	.	.	3-4	.	4	.	.	.	4	.	.	.	.	.	I	1094	
B-Ho/B-Hu	Drepanocladus aduncus	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	.	.	I	400	
B-At	Climacium dendroides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-1	.	.	.	.	.	.	I	126	
B-Hu/B-Ho	Drepanocladus vernicosus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	I	391	
B-Hu/B-Ho	Ricciocarpus natans	.	.	.	.	1-1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	16	
B-Hu/B-Ho	Riccia fluitans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5	
G	Głony nitkowate - Fadenalgen	.	.	.	2-3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	84	

Tabela 17
Caricetum gracilis /Graeb.-Hueck 1931/ R.Tr. 1937

Forma morf.- -biol. Morph- -biol. Form	Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme	206	243	26	194b	454	419	355c	274	380	527	397	470	44	558	62	354	328	348	150	Sta- łość	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert		
	Miejscowość - Ort	C1	Ru	St	C1	Pw	Ls	Sb	Ga	Rd	Mn	J2	Pz	Kl	Sb	Lr	Sb	Sr	Nd	La				
	Data - Datum	26.8. 1965	7.9. 1965	19.8. 1964	24.8. 1965	28.7. 1966	21.7. 1966	9.7. 1966	10.9. 1965	14.7. 1966	13.8. 1966	19.7. 1966	3.8. 1966	12.7. 1966	9.7. 1965	16.7. 1965	9.7. 1966	4.7. 1966	6.7. 1966	18.8. 1965				
	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	10	60	10	0-20	0-40	15	20	-20	30-40	-5-0	30	30	20	10	5	30	0-10	20	10-30				
	pH	7	8	7	7	7,5	6,5	7	7	7	7	7	8	7	7	7,5	7	6,5	7	7,5				
	Pokrycie przez roślinność % Veg.-Bedeckung %																							
	warstwa nadwodna - Luftschicht	85	100	80	75	100	100	95	100	100	100	100	95	95	100	100	100	100	100	95				
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	15	20	15	15	75	40	20	-	80	-	75	20	20	20	20	20	20	20	20				
	Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	25	12	50	12	8	25	12	6	12	100	30	12	25	25	25	12	100	12	12				
	Liczba gatunków - Artenzahl	8	6	6	7	8	6	5	8	7	6	17	11	11	11	9	6	13	10	6				
Wariant - Variante		A											B											
Gatunki charakterystyczne zespołu Charakterarten der Assoziation:																								
Atr	Carex gracilis	2	2	3	3	4	4-5	4-5	4-5	4-5	5	2-3	3	3	4	5	5	5	5	5	V	6118		
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Magnocaricion:																								
Atr	Galium palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1-2	.	.	.	.	1-2	+1	.	II	226		
Atr	Carex vesicaria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I	26		
Atr	Carex rostrata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	14		
Atr	Carex riparia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2-3	.	.	.	.	.	.	.	I	145		
Atr	Lycopus europaeus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	I	61		
Atr	Lysimachia thyrsiflora	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	27		
Atr/Hoz	Cicuta virosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I	27		
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmiton:																								
Atr	Rumex hydrolapathum	.	2	2	+1	2	.	.	+	.	.	2-3	1	1	2	.	.	1	.	+	IV	607		
Atr	Glyceria aquatica	.	1	3	.	1-2	.	.	.	2-3	.	.	1-2	.	.	.	+1	2	.	+	III	597		
Atr	Sium latifolium	.	.	.	.	.	.	.	+1	1-2	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	II	162		
Atr	Sparganium ramosum	1.	4	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	II	474		
Atr	Phalaris arundinacea	2	.	2	+1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	II	382		
Atr	Phragmites communis	.	.	1-2	.	1-2	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	+1	.	1-2	.	.	II	208		
Atr	Typha angustifolia	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1-2	.	3-4	.	.	.	.	.	.	II	350		
Atr	Typha latifolia	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	119		
Atr	Schoenoplectus lacustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	1	.	1	I	66		
Atr	Rorippa amphibia	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	1	.	.	.	I	53		
Atr	Ranunculus lingua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	I	92		
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia, Phragmitetea:																								
Atr	Equisetum limosum	2	.	.	.	2	1	.	.	.	2	+1	2	+1	2-3	.	2	1-2	+	.	III	720		
Atr	Acorus calamus	3	2	.	2-3	2	2	.	.	.	.	4	3	.	3-4	.	.	.	.	.	III	1317		
Atr	Iris pseudacorus	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	II	28		
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	2		
Atr	Helopharis palustris	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	26		
Gatunki towarzyszące - Begleiter:																								
Atr	Lythrum salicaria	2	.	1	+1	.	2	.	+	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	II	134		
Hon	Lemna minor	.	+1	.	.	.	2	.	.	.	1-2	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	II	378		
Hon	Spirodela polyrrhiza	.	.	.	2	.	.	.	.	.	3-4	.	2	.	.	.	.	.	.	.	I	247		
Atr	Mentha aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	+1	.	I	40		
Atr	Myosotis palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	122		
Atr	Glyceria fluitans	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-2	1-2	.	I	40		
Atr	Epilobium hirsutum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1		
Atr	Epilobium palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I	27		
Hon	Hydrocharis morsus-ranae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	26		
Hoz	Polygonum amphibium	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I	26		
Atr	Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	26		
Huz	Chara vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	14		
Hon	Salvinia natans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	14		
Atr	Deschampsia caespitosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	I	14		
Atr	Calamagrostis lanceolata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5		
Atr	Stachys palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5		
Atr	Scirpus silvaticus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5		
Atr	Solanum dulcamara	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5		
B-Hu/B-Ho	Drepanocladus aduncus	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	I	153		
B-Hu/B-Ho	Calliergon cuspidatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4-5	.	.	.	.	I	195		

Forma morf.- biol. Morph.- biol. Form.	Nr zdjęcia - Nr. d. Aufnahme Miejscowość - Ort	46	56	71	180	327	329	330a	337	352	413	489	576	421	50	166	187	Sta- łość	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
		Kl	Nr	Ot	Ża	B1	Sr	Sr	Wy	Sb	Kb	Je	Fa	Kw	Kl	Go	M1		
	Data - Datum	12.7. 1965	16.7. 1965	23.7. 1965	23.8. 1965	4.7. 1966	4.7. 1966	4.7. 1966	4.7. 1966	9.7. 1966	19.7. 1966	7.8. 1966	18.8. 1966	21.7. 1966	12.7. 1965	21.8. 1965	24.8. 1965		
	Głęb. wody w cm - Wassertiefe cm	0-0	5	15	10-20	-15	0-5	10	10	20	-20	-10	10-20	0-0	-20	-30	0-10		
	pH	7	7	7	6,5	7	6,5	6,5	7,5	7	5	6,5	7	7	6,5	6,5	6,5		
	Pokrycie przez roślinność % Veg.-Bedeckung %																		
	warstwa nadwodna Luftschicht	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	warstwa na- i podwodna Wasserschicht	15	40	20	20	-	70	70	60	60	-	-	40	30	-	-	70		
	Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnahmefläche m ²	25	12	25	25	12	100	25	25	25	25	12	100	25	50	25	25		
	Liczba gatunków - Artenzahl	14	18	10	13	6	13	6	10	10	5	8	15	11	15	9	7		
Gatunki charakterystyczne zespołu Charakterarten der Assoziation:																			
Atr	Carex gracilis	2-3	3-4	5	4-5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	4-5	5	3-4	4-5	5	V	7516
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Magnocaricion:																			
Atr	Galium palustre	1	+1	.	.	.	2	.	1	.	+	.	.	.	2	.	+	III	261
Atr	Carex vesicaria	1	+1	.	.	.	1	+	2	.	.	+1	+	.	.	.	.	III	205
Atp	Poa palustris	.	.	1	1-2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	III	226
Atr	Carex rostrata	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I	62
Atr/Hoz	Cicuta virosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	I	16
Atr	Lycopus europaeus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1
Atr	Peucedanum palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia, Phragmitetea:																			
Atr	Equisetum limosum	.	1-2	1-2	1	.	1	1-2	.	3	.	1	+1	.	.	.	1	IV	592
Atr	Rumex hydrolapathum	+	1	+	+	.	.	+	.	.	+	+1	+1	.	.	.	.	IV	21
Atr	Iris pseudoacorus	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	II	50
Atr	Sparganium ramosum	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	2	.	.	.	.	II	157
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+1	1	.	.	.	II	79
Atr	Ranunculus lingua	.	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	32
Atr	Typha angustifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	I	32
Atr	Typha latifolia	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	17
Atr	Acorus calamus	.	.	.	.	+	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	17
Atr	Glyceria aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	I	109
Atr	Phalaris arundinacea	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	I	16
Atr	Sium latifolium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Atr	Phragmites communis	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Atr	Rorippa amphibia	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Atr	Heleocharis palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Gatunki towarzyszące Begleiter:																			
Atr	Lythrum salicaria	1	+	+	.	.	.	.	+	.	+	+1	1	.	.	.	+1	III	137
Atr/Atp	Caltha palustris	1	+	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	II	151
Atr	Ranunculus flammula	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	+1	+1	.	II	173
Atr	Polygonum amphibium	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	II	33
Atp	Juncus effusus	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I	43
Atr/Hoz	Lysimachia nummularia	2	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	181
Atr	Agrostis stolonifera	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	I	140
Atr	Lysimachia vulgaris	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	I	126
Atr	Scirpus silvaticus	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	I	88
Atr	Glyceria fluitans	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	62
Hoz	Lemna minor	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I	62
Atp	Carex elongata	.	1	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	47
Atr	Juncus articulatus	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	32
Atr	Epilobium palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	17
Atr	Potentilla anserina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2-3	+1	+	I	172
Atr	Ranunculus repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	I	109
Hoz	Salvinia natans	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	109
Hoz	Spirodela polyrrhiza	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	I	72
Hoz	Hydrocharis morsus-ranae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	I	72
Atr	Alopecurus geniculatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	31
K	Alnus glutinosa /do 2,5 m/	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I	31
Atp	Carex flava	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	16
Atr	Juncus conglomeratus	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	16
Atr	Molinia tectorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
As	Cirsium palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Atr	Lychnis flos-cuculi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Atr	Stellaria uliginosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Atr	Scrophularia alata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Atr	Valeriana officinalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Atr	Equisetum palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
Atr	Stellaria palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5
B-At/B-Ho/ /B-Hu	Drepanocladus aduncus	4	+	.	2-3	4	4	.	.	3	.	.	1	1-2	.	.	3-4	III	1994
B-At/B-Ho/ /B-Hu	Calliergon cuspidatum	2	.	.	.	.	.	3-4	4	.	4	3	.	2-3	2	4	.	III	2109
B-Ho/ /B-Hu	Amblystegium varium	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,5

Tabela 19

Zbigniew Podbielkowski Carietum gracilis /Graeb.-Hueck 1931/ R.Tx. 1937
Mon.Bot.vol.XXVII variant 2 - Variante mit:
Calamagrostis canescens

Forma morf.- biol. Morph.- biol. Form.	Nr zdjęcia - Nr. d. Aufnahme Miejscowość - Ort	172	169	239	200	Sta- łość w sto- sunku do 4	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
		Go	Go	Ru	Ci		
	Data - Datum	21.8. 1965	21.8. 1965	7.9. 1965	26.8. 1965		
	Głębokość wody w cm - Wassertiefe cm	30-40	20	30	10-0		
	pH	7,5	7	8	6,5		
	Pokrycie przez roślinność % Veg.-Bedeckung %						
	warstwa nadwodna - Luftschicht	100	100	100	100		
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	50	25	50	-		
	Pow. zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	36	12	25	25		
	Liczba gatunków - Artenzahl	9	10	13	9		
Gatunki charakterystyczne zespołu Charakterarten der Assoziation:							
Atr	Carex gracilis	4	3	4	4-5	4	5937
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia, Phragmitetea:							
Atr	Rumex hydrolapathum	1	+	+1	+1	4	257
Atr	Equisetum limosum	1-2	.	2	1-2	3	1012
Atr	Ranunculus lingua	+	.	.	+1	2	67
Atr	Sparganium ramosum	.	+	.	+	2	5
Atr	Heleocharis palustris	.	.	2	.	1	438
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	.	1	.	1	125
Atr	Glyceria aquatica	.	.	+1	.	1	65
Atr	Phragmites communis	.	.	+1	.	1	65
Atr	Rorippa amphibia	.	.	+1	.	1	65
Atr	Peucedanum palustre	.	+	.	.	1	2
Atr/Hoz	Cicuta virosa	+	.	.	.	1	2
Atr	Galium palustre	.	.	.	+	1	2
Gatunki towarzyszące - Begleiter:							
Atr	Calamagrostis canescens	2-3	4	1-2	1	4	2662
Atr	Lythrum salicaria	1-2	+	+1	1	4	480
Hoz	Lemna minor	1-2	+	+1	.	3	355
Atr	Agrostis stolonifera	.	.	.	1-2	1	287
Hoz	Hydrocharis morsus-ranae	.	+	.	.	1	2
Atr	Conarum palustre	.	+	.	.	1	2
Hoz	Polygonum amphibium	.	.	+	.	1	2
B-At/B-Hu/ /B-Ho	Drepanocladus aduncus	.	.	2	2	2	875
B-Hu/B-Ho	Calliergon giganteum	2	+1	.	.	2	502

Atr	87.0	B-At	3.5
Hoz	< 1.0	B-Hu	3.5
Hon	2.6	B-Ho	3.5

Caricetum gracilis jest, obok *Scirpo-Phragmitetum*, najpospolitszym zespołem bagiennym stawów rybnych. W stawach regularnie czyszczonych znaleźć go można jedynie przy brzegach, gdzie tworzy dość wąski pas. Natomiast w stawach zaniedbanych rozprzestrzenia się intensywnie, zajmując bardzo duże obszary; często opanowuje całe stawy. Występuje również bardzo często, podobnie jak *Caricetum rostrato-vesicariae*, na peryferiach skrajnie położonych stawów, które bezpośrednio stykają się z łąkami.

Jest to zbiorowisko bardzo ekspansywne, które w stawach rybnych znajduje dobre warunki siedliskowe i dlatego stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla gospodarki stawowej. Splątane kłącza silnie utrwalają i wynoszą podłoże, zaś duża ilość wytwarzanej i powoli rozkładającej się masy organicznej przyczynia się do względnie szybkiego spłykania zbiornika.

Caricetum acutiformis Sauer 1937

Fizjonomicznie i florystycznie zespół ten (tab. 20) bardzo podobny jest do *Caricetum gracilis*. Gatunek charakterystyczny, *Carex acutiformis*, wykazuje tu największą stałość (V) i wartość pokrycia. Również nadaje on specyficzny aspekt całemu zbiorowisku. Obok niego występują: *Equisetum limosum*, *Rumex hydrolapathum*, *Galium palustre*, *Lythrum salicaria*, *Calamagrostis canescens* oraz stosunkowo obficie reprezentowane mchy.

Liczba gatunków w zdjęciu wynosi 6—12. Zwartość roślinności dochodzi do 100%. Dominują byliny kłaczowe przy dużym udziale mszaków, co uwidacznia niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne:

Atr	77.2	B-Hu	6.7
Atp	< 1.0	B-Ho	6.7
Hun	< 1.0	B-At	8.9

Omawiane zbiorowisko traktuję za Balatową-Tulačkovą (1963) jako oddzielny zespół *Caricetum acutiformis*, jednak wielu autorów włącza je jako fację lub wariant do *Caricetum gracilis*.

Występuje niezbyt często, znacznie rzadziej niż *Caricetum gracilis*. Rozwija się zwykle w stawach zaniedbanych i spłyconych (głęb. wody 0—20 cm).

Lokuje się przy brzegach, tworząc tam niezbyt szeroki pas, albo porasta duże przestrzenie w zapuszczonych stawach, gdzie zarzucono gospodarkę rybną, lub też w przybrzeżnych częściach stawów peryferycznych, stykających się bezpośrednio z łąkami.

Forma morf.- biol. -biol. Form	Nr zdjęcia - Nr d.Aufnahme Miejscowość - Ort	456	453	245	63	247	246	163	182	Sta- ność	Współ- czyn- nik pokry- cia
		Wr	Pw	Ba	Ot	Ba	Ba	Ła	Ła		
	Data - Datum	29.7. 1966	28.7. 1966	9.9. 1965	23.7. 1965	9.9. 1965	9.9. 1965	23.8. 1965	23.8. 1965		
Morph.- biol. Form	Głęb.wody w cm - Wassertiefe cm	0-0	0-0	10	20	5	10	10	0-0	Ste- tig- keit	Dek- lungs- wert
	pH	6,5	7	7	7,5	7	7	6,5	6,5		
	Pokrycie przez roślinność % Veg.-Bedeckung %										
	warstwa nadwodna Luftschicht	100	100	100	95	95	95	95	100		
	warstwa na- i podwodna Wasserschicht	-	-	75	20	40	80	20	-		
	Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnahmefläche m ²	25	25	25	25	25	25	25	100		
	Liczba gatunków - Artenzahl	9	9	11	6	7	10	12	12		
Gatunki charakterystyczne zespołu Charakterarten der Assoziation:											
Atr	Carex acutiformis	4-5	3-4	5	5	4	4	3	4-5	V	6719
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Magnocaricion:											
Atr	Galium palustre	+1	+	.	.	+1	.	.	+	III	68
Atr	Cicuta virosa	.	2-3	+1	.	.	.	.	.	II	378
Atr	Carex rostrata	2	2	.	.	.	.	.	.	II	438
Atr	Peucedanum palustre	.	.	.	.	.	.	+	+	II	2
Atr	Lysimachia thyrsiflora	.	+	.	.	.	.	.	.	I	1
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia, Phragmitetea:											
Atr	Equisetum limosum	2	3-4	1-2	+1	1	3-4	+	1	V	1771
Atr	Rumex hydrolapathum	.	1	2-3	+	.	+1	.	+	IV	441
Atr	Phragmites communis	.	.	.	.	3-4	.	.	+1	II	682
Atr	Glyceria aquatica	.	.	1	.	.	.	+	.	II	64
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	.	+1	.	.	.	+	.	II	34
Atr	Typha angustifolia	.	.	1	.	.	.	.	.	I	62
Gatunki towarzyszące Begleiter:											
Atr	Lythrum salicaria	1-2	.	+	+	.	+	+	+	IV	150
Atr	Calamagrostis canescens	.	.	.	+	.	.	4	2	III	1002
Atr/Atp	Caltha palustris	2	.	.	.	.	.	+	1	II	64
Atr	Epilobium palustre	.	.	+	.	.	+	.	.	II	4
Atr	Agrostis stolonifera	2	1	.	.	.	.	.	.	II	281
Atr	Galium uliginosum	2	.	.	+	.	.	.	.	II	220
Atr	Potamogeton natans f.terrestre	.	.	.	.	.	.	.	1-2	I	143
Hun	Utricularia vulgaris	.	.	.	.	.	.	1	.	I	62
Atr	Comarum palustre	.	.	.	.	.	.	1	.	I	62
Atr	Mentha verticillata	.	.	.	.	.	+1	.	.	I	32
Atr	Cardamine pratensis	.	.	.	.	.	+1	.	.	I	32
Atr	Nyctotis palustris	.	+	.	.	.	.	.	.	I	1
Atr	Mentha aquatica	.	.	+	.	.	.	.	.	I	1
Atr	Solanum dulcamara	.	.	.	+	.	.	.	.	I	1
Atr	Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	.	.	+	.	I	1
Atr	Polygonum amphibium	.	.	.	.	.	.	.	+	I	1
B-Hu/B-Ho/ /B-At	Drepanocladus aduncus	.	.	3-4	.	1-2	4	.	3-4	III	2175
B-At	Calliergon giganteum	4	.	.	.	.	.	.	.	I	781
B-Hu/B-Ho	Calliergon cuspidatum	.	.	.	.	1	.	.	.	I	62

Jest to zespół bardzo ekspansywny, silnie spływający zbiornik i wytwarzający dużą ilość wolno rozkładającej się substancji organicznej.

Caricetum ripariae Soó 1928

Głównym elementem budującym ten zespół (tab. 21) jest *Carex riparia*. Turzyca ta dominuje w zbiorowisku nadając mu specyficzny aspekt. Tworzy ona wysokie, zwarte łany niekiedy przetkane innymi roślinami, głównie dużymi bylinami szuwarowymi, jak: *Typha angustifolia*, *Rumex hydrolapathum*, *Glyceria aquatica*, *Sparganium ramosum*, *Phalaris arundinacea*, *Equisetum limosum*, *Acorus calamus* i in. Liczba gatunków w zdjeciu wynosi 4—13.

Zwarcie roślinności osiąga przeciętnie 100%. Jak widać z załączonego spektrum morfologiczno-biologicznego, dominują tu byliny kłaczowe.

Atr	97.8	Hon	< 1.0
K	< 1.0	G	1.9
Hoz	< 1.0		

Również i to zbiorowisko, opierając się na pracy Bała tovej - Tułaćkovej (1963), potraktowałem jako odrębny zespół.

Caricetum ripariae jest zespołem stosunkowo rzadko spotykanym w stawach rybnych. Lokuje się zwykle przy brzegach, tworząc tam niewielkie i dość wąskie płyty. Rozwija się w niezbyt głębokiej wodzie (20—30 cm), chociaż można go spotkać również w miejscach zupełnie spłyconych.

W zarastaniu odgrywa dużą rolę, ale tylko lokalnie, ponieważ — jak wspominałem — jest zbiorowiskiem rzadkim.

Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931

Gatunkiem panującym i wykazującym największą stałość w *Phalaridetum arundinaceae* (tab. 22) jest *Phalaris arundinacea*. Trawa ta występuje w znacznych ilościach, zwykle z domieszką dużych turzyc (*Carex gracilis*, *Carex acutiformis*) i innych wysokich bylin szuwarowych. W zdjeciu występuje 5—12 gatunków.

Jak widać z podanego niżej spektrum morfologiczno-biologicznego, bezwzględnie dominują tu byliny kłaczowe:

Atr	98.0	Hoz	< 1.0
Atp	1.4	Hun	< 1.0
As	< 1.0	Hon	< 1.0

Zwarcie roślinności jest duże i wynosi 80—100%.

Opinie na temat przynależności tego zespołu do wyższych jednostek fytosocjologicznych są, jak dotychczas, niezgodne. Jedni autorzy (O b e r d o r f e r 1957, E l l e n b e r g 1963) zaliczają go do związku *Phragmi-*

Tabela 21

[illegible]

Ryc. 22. Przybrzeżny pas *Phalaridetum arundinaceae* (Ruda)
Uferstreifen von *Phalaridetum arundinaceae* (Ruda)

tion, inni, jak Balatova-Tulačková, do nowego rzędu *Magnocaricetalia* Pign. 1953 (co odpowiada związkowi *Magnocaricion* w sensie Tüxena, Oberdorfera, Ellenberga i innych). Jeszcze większe zmiany wprowadził Kopecky (1965), tworząc samodzielny związek *Phalaridion arundinaceae* Kopecky 1961 w obrębie rzędu *Nasturtio-Glycerietalia* Pign. 1953 em. Kopecky 1965. Te bardzo różne ujęcia systematyczne wskazują na dużą labilność *Phalaridetum arundinaceae* w jego stanowisku systematycznym. Z moich obserwacji wynika, że omawiany zespół wyróżnia się dużą stałością i ilościowością gatunków z *Magnocaricion*, a poza tym występuje zwykle w miejscach spłyconych, obok zespołów wysokich bylin szuwarowych, zwykle jako dalsze stadium rozwojowe tych zbiorowisk. Dlatego, przynajmniej prowizorycznie, włączam go do związku *Magnocaricion*, w czym zresztą nie jestem odosobniony (Kępczyński 1965).

W badanych przeze mnie stawach rybnych *Phalaridetum arundinaceae* występuje w postaci dwóch wariantów: 1 — z *Carex gracilis*; 2 — z *Carex acutiformis*.

Omawiany zespół nie jest pospolity w stawach rybnych. Występuje najczęściej przy brzegach, tworząc dość wąski, fizjonomicznie bardzo charakterystyczny pas roślinności przybrzeżnej (ryc. 22). Tuż za tym pasem, nie mieszając się z nim, występują dość często zwarte łany wysokich bylin szuwarowych (palka, trzcina) lub zbiorowiska wodne.

	Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme	437	254	282	210	208	205	103	101c	Sta- łość	Współ- czyn- nik pokry- cia
Forma morf.- biol.	Miejscowość - Ort	Pg	Pr	Rd	C1	C1	C1	Za	Za		
Morph.- biol. Form	Data - Datum	26.7. 1966	9.9. 1965	14.7. 1966	26.8. 1965	26.8. 1965	26.8. 1965	31.7. 1965	31.7. 1965		
	Głęb.wody w cm. - Wassertiefe cm	20	30	0	10-30	-10	20	0-5	20-30	Ste- tig- keit	Dek- tungs- wert
	pH	7,5	8	7,5	7,5	6,5	7	7	8		
	Pokrycie przez roślinność %	100	100	100	75	90	90	90	75		
	Veg.-Bedeckung %										
	warstwa nadwodna Luftschicht	100	100	100	75	90	90	90	75		
	warstwa na- i podwodna Wasserschicht	20	20	-	15	-	15	5	10		
	Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnahmefläche m ²	25	100	12	12	12	12	25	6		
	Liczba gatunków - Artenzahl	7	6	5	9	8	6	12	9		

Gatunki charakterystyczne zespołu
Charakterarten der Assoziation:

Atr	Phalaris arundinacea	4	3-4	5	3-4	3-4	3-4	4	4	V	6250
Atp	Poa palustris	.	1-2	.	.	.	.	.	.	I	144

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten Magnocaricion:

Atr	Carex gracilis	.	.	+	+1	1-2	+1	2-3	+	IV	555
Atr	Carex acutiformis	3	2-3	.	.	.	.	.	.	II	812
Atr	Lycopus europaeus	.	.	.	1	1	.	.	.	I	125
Atr	Carex rostrata	.	.	.	.	.	.	+1	.	I	32
Atr	Galium palustre	.	.	.	.	.	.	+	.	I	1

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten Phragmition:

Atr	Rumex hydrolapathum	1	.	.	.	.	+	+	+	III	66
Atr	Typha latifolia	.	.	.	.	+	.	.	+	II	2
Atr	Typha angustifolia	.	.	.	.	.	.	+	+	II	2
Atr	Sparganium ramosum	.	.	.	1	.	.	.	.	I	62
Atr	Glyceria aquatica	.	.	+1	.	.	.	.	.	I	32
Atr	Sium latifolium	.	.	.	.	.	.	.	+	I	1

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten Phragmitetalia und
Phragmitetea:

Atr	Equisetum limosum	2	2-3	+	.	.	.	1-2	.	III	708
Atr	Iris pseudocorus	1-2	.	.	.	.	.	.	+	II	145
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	.	.	.	.	+1	+	.	II	34
Atr	Acorus calamus	.	.	.	.	.	+1	.	.	I	32

Gatunki towarzyszące
Begleiter:

Atr	Lysimachia vulgaris	2	.	.	.	.	.	+	+1	II	265
Atr	Lythrum salicaria	.	.	.	1	1-2	.	+	.	II	208
Atr	Scirpus silvaticus	.	1	+1	1	.	.	.	.	II	158
Atr/Hoz	Agrostis/stolonifera	.	.	.	+1	1	.	.	.	II	95
Atr	Epilobium hirsutum	.	.	.	.	2	.	.	.	I	219
Atr	Solanum dulcamara	.	.	.	.	.	.	.	1-2	I	144
Atr	Carex fusca	2	.	.	.	.	.	.	.	I	219
Atr	Epilobium palustre	.	.	.	+1	.	.	.	.	I	32
Hun	Utricularia vulgaris	.	.	.	.	.	.	+1	.	I	32
Atr/Atp	Caltha palustris	.	+	.	.	.	.	.	.	I	32
Hoz	Polygonum amphibium	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1
Atr	Eupatorium cannabinum	.	.	.	+	.	.	.	.	I	1
As	Rumex maritimus	.	.	.	.	.	+	.	.	I	1
Hon	Lemna minor	.	.	.	.	.	.	+	.	I	1

	Nr zdjęcia - Nr. d.Aufnahme	233	92	151b		
	Miejscowość - Ort	Wz	St	Ja	Sta- łość w sto- sunku do 3	Współ- czyn- nik pokry- cia
Forma morf.- -biol.	Data - Datum	7.9. 1965	28.7. 1965	18.8. 1965		
Morph.- -biol.	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	0-10	40	50		
Form	pH	6,5	7	7	Ste- tig- keit im Ver- hält- nis zu 3	Dek- kungs- wert
	Pokrycie przez roślinność % Veg.-Bedeckung, %					
	warstwa nadwodna - Luftschicht	80	20	50		
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	10	90	25		
	Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnahmefläche m ²	100	200	16		
	Liczba gatunków - Artenzahl	18	12	9		
	Gatunki charakterystyczne zespołu Charakterarten der Assoziation:	1	2	3		
Atr Atr/Hoz	Carex pseudocyperus	2	1-2	2	3	1550
	Cicuta virosa	1-2	1-2	1-2	3	1150
	Gatunki charakterystyczne Charakterarten Magnocaricion:					
Atr	Carex rostrata	.	1	2-3	2	1083
Atr	Lysimachia thyrsiflora	1	.	.	1	167
Atr	Galium palustre	+1	.	.	1	87
Atr	Lycopus europaeus	+1	.	.	1	87
	Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia, Phragmitetea:					
Atr	Rumex hydrolapathum	1-2	+	+	3	390
Atr	Glyceria aquatica	1	+	.	2	170
Atr	Equisetum limosum	3-4	.	.	1	1660
Atr	Alisma plantago-aquatica	1-2	.	.	1	383
Atr	Phalaris arundinacea	+1	.	.	1	87
Atr	Rorippa amphibia	+	.	.	1	3
Atr	Typha angustifolia	+	.	.	1	3
Atr	Sparganium ramosum	+	.	.	1	3
Atr	Typha latifolia	.	+	.	1	3
Atr	Sium latifolium	.	.	+	1	3
	Gatunki towarzyszące - Begleiter:					
Hon	Hydrocharis morsus-ranae	.	2	1	2	750
Hon	Lemna minor	.	1-2	+1	2	470
Hun	Lemna trisulca	.	1-2	+1	2	470
Hon/Hun	Stratiotes aloides	.	4	.	1	2083
Atr	Scirpus silvaticus	.	.	1	1	167
Atr	Cardamine pratensis	1	.	.	1	167
Atr	Galium uliginosum	+1	.	.	1	87
Atr	Epilobium palustre	+1	.	.	1	87
Hun	Utricularia vulgaris	.	+1	.	1	87
Hon	Spirodela polyrrhiza	.	+	.	1	3
Atr	Lythrum salicaria	+	.	.	1	3
Atr	Solanum dulcamara	+	.	.	1	3
B-At/B-Hu/ E-Ho	Drepanocladus aduncus	4	+	.	2	2087

Zespół mozgi trzcinowatej odgrywa dość specyficzną rolę w zarastaniu zbiornika. Ponieważ występuje tylko w pewnej, określonej, niewielkiej głębokości w strefach przybrzeżnych, nie jest groźny dla gospodarki stawowej, a nawet w pewnym sensie spełnia użyteczne zadanie, umacniając dobrze brzegi grobli.

Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Siss. 1942

Zespół ten (tab. 23) jest trójwarstwowy. Warstwę nadwodną tworzą byliny szuwarowe, wykazujące niezbyt wielkie zwarcie (*Carex pseudocyperus*, *Cicuta virosa*, *Carex rostrata*, *Rumex hydrolapathum*, *Glyceria aquatica*). Nawodna warstwa zbudowana jest z *Hydrocharis morsus-ranae*, *Stratiotes aloides* (częściowo) i *Spirodela polyrrhiza*, w tworzeniu zaś warstwy podwodnej biorą udział: *Lemna trisulca*, *Stratiotes aloides* (częściowo) i *Utricularia vulgaris*. Liczba gatunków w zdjęciu waha się od 9 do 18.

Zwarcie roślinności wynosi 75—100%. Przeważają byliny kłaczowe, chociaż stosunkowo duży jest udział również bylin kępkowych (*Carex pseudocyperus*). Uderza bardzo duża ilość roślin wodnych, które doskonale konkurują z roślinami bagiennymi (por. spektrum morfologiczno-biologiczne).

Atr	38.2	Hun	11.7
Atp	11.7	B-Hu	< 1.0
Hoz	5.7	B-Ho	7.7
Hon	17.0	B-At	7.7

W typowej postaci zespół występuje rzadko. Przemieszany jest zwykle z innymi zbiorowiskami szuwarowymi i wodnymi i to tak dalece, że poszczególne jego płaty mogą być zakwalifikowane zarówno do *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*, jak i do innych zespołów (np. do *Hydrocharo-Stratiotetum*, zdjęcie 92, tab. 23). To przemieszanie różnych elementów stawia zespół na pograniczu zbiorowisk wodnych i szuwarowych.

Zespół jest bardzo ekspansywny i gra doniosłą rolę w zarastaniu stawów. Mimo że w formie typowej występuje rzadko, facje lub warianty jego są bardzo pospolite. Występuje w stawach niezbyt dobrze czyszczonych jako jedno z pierwszych stadiów wkraczania zbiorowisk szuwarowych.

Thelypterideto-Phragmitetum Kuiper 1957

Zespół ten budują gęste łany *Phragmites communis* przerosnięte w dole dość obficie występującą *Dryopteris thelypteris* (ryc. 23). Poza tymi dwoma głównymi komponentami występuje tu *Galium palustre*, *Epilobium palustre*, *Carex paniculata* oraz, jeśli płat jest podtopiony,

Ryc. 23. *Thelypteridetum-Phragmitetum* (Stawinoga)

rośliny wodne, jak np.: *Lemna minor*, *Hydrocharis morsus-ranae* i in.; niekiedy dość dobrze wykształcona jest warstwa mszysta. Skład florystyczny i stosunki ilościowe tego zespołu ilustrują niżej podane dwa zdjęcia fitosocjologiczne:

Zdjęcie 82 (Stawinoga, 28.7.65, głęb. wody 0—0 cm, pH 6,5, pokrycie przez roślinność 100%, pow. zdjęcia 25 m²): *Phragmites communis* 4—5, *Galium palustre* 2, *Lysimachia vulgaris* +, *Epilobium palustre* 2, *Carex gracilis* +, *Dryopteris thelypteris* 2—3, *Epilobium hirsutum* +, *Glyceria aquatica* +, *Myosotis palustris* +, *Lemna minor* +—1, *Calliargon cuspidatum* +.

Zdjęcie 350 (Wólka Sobieszyńska, 6.7.66, głęb. wody 0—20 cm, pH 7, pokrycie przez roślinność 100%, pow. zdjęcia 100 m²): *Phragmites communis* 4—5, *Carex paniculata* 2—3, *Ranunculus lingua* 1, *Galium palustre* 1, *Sparganium ramosum* +—1, *Lycopus europaeus* 1, *Dryopteris thelypteris* 1—2, *Cirsium palustre* +, *Comarum palustre* +, *Caltha palustris* 1, *Hydrocharis morsus-ranae* 1—2, *Utricularia minor* +, *Calliargon giganteum* 1—2, *Plagiothecium denticulatum* 1, *Lophocolea bidentata* +.

Według Kuipera (1957) i Donselaara (1961) omawiane zbiorowisko uważane jest za zespół i zaliczane do związku *Magnocaricion*.

W stawach rybnych jest ono rzadko spotykane. Występuje w miejscach silnie zamulonych, a nawet zatorfionych w zapuszczonych peryferycznych stawach, które bezpośrednio stykają się z otaczającymi je

Ryc. 24. Zbiorowisko z *Equisetum limosum* (Cisie)
Pflanzengesellschaft mit *Equisetum limosum* (Cisie)

łąkami lub innymi naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi. Stanowi często przejście od zbiorowisk szuwarowych do łąk mszysto-turzycowych, a nawet do zbiorowisk zaroślowych.

W zarastaniu odgrywa lokalnie dużą rolę.

Zbiorowisko z *Equisetum limosum*

Zbiorowisko z *Equisetum limosum* (tab. 24) budują gęste, prawie lite łany *Equisetum limosum* z bardzo niewielką domieszką innych bylin szuwarowych (ryc. 24). Dość często i obficie występują tu pływające rośliny wodne, jak: *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza*, *Hydrocharis morsus-ranae* i in. Liczba gatunków w zdjęciu wynosi 2—12. Zwartość pokrywy roślinnej osiąga 100%.

Dominują byliny kłaczowe (patrz niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne), co jest związane z bardzo obfitym występowaniem głównego komponenta zbiorowiska — *Equisetum limosum*.

Atr	85.8	Hoz	1.1
Atp	< 1.0	Huz	5.9
As	< 1.0	B-Hu	< 1.0
Hon	5.9	B-Ho	< 1.0

Przynależność systematyczna zbiorowiska z *Equisetum limosum* nie jest sprecyzowana; być może jest to jedna z facji *Scirpo-Phragmitetum*.

Omawiane zbiorowisko jest dość pospolite w stawach rybnych. Często zajmuje duże przestrzenie. Lokuje się zwykle w środkowych partiach stawów, tworząc — na równi z innymi wysokimi bylinami (*Phragmites*, *Typha*) — zbiorowiska facjalne. Występuje w wodach o głębokości od 10 do 50 cm, zwykle w zaniedbanych i spłyconych stawach. Jest bardzo ekspansywne i odgrywa w zarastaniu dużą rolę.

ZBIOROWISKA ŁAKOWE

Zbiorowiska łakowe sensu stricto są bardzo rzadko spotykane w stawach. Zwykle zajmują one tylko niewielkie przestrzenie w stawach zupełnie zarośniętych i złądownianych, tworząc enklawy w obrębie zbiorowisk zaroślowych lub szuwarowych. Zasadniczymi elementami budującymi je są gatunki z *Molinio-Arrhenatheretea* (głównie z rzędu *Molinietalia*). We wcześniejszych stadiach rozwojowych znaczny udział w tworzeniu łąk biorą rośliny szuwarowe, natomiast w stadiach późnych zaznacza się udział przedstawicieli zbiorowisk zaroślowych (*Salici-Fraguletum*).

Najczęściej spotykane są wspomniane już zbiorowiska rozwojowo wcześniejsze, w których duży udział biorą rośliny szuwarowe. Stanowią one pewnego rodzaju przejście między zbiorowiskami szuwarowymi a czysto łąkowymi, jakimi są łąki z rzędu *Molinietalia*. Zbiorowiska te pokrywają niekiedy znaczne obszary, nawet całe stawy. Podłoże, na którym rozwijają się, jest jeszcze miejscami lub okresowo podtopione. Stopień podtopienia nie jest jednakowy we wszystkich miejscach, co wpływa na powstanie pewnych różnic w kształtowaniu się roślinności i pociąga za sobą mozaikowość pokrywy roślinnej.

Do grupy zbiorowisk z wcześniejszych stadiów rozwojowych należy zaliczyć jeszcze podtopione łąki mszysto-turzycowe. Tworzą się one w przybrzeżnych partiach stawów zbiorczych i przechodzą, w miarę wypiętrzania się podłoża, w łąki z rzędu *Molinietalia*. W warstwie zielnej występuje tu zwykle *Carex rostrata* i *Carex fusca*. Bardzo dobrze rozwinięta jest warstwa mszysta, którą budują gatunki z rodzaju *Drepanocladus* i *Calliergon* oraz, w miejscach mniej podtopionych, *Climacium dendroides*.

Stadia pośrednie reprezentowane są przez zbiorowiska typowo łąkowe należące do rzędu *Molinietalia*. W badanych przeze mnie stawach występują one jednak bardzo rzadko i pokrywają niewielkie obszary.

Stadia późne stanowią już właściwie przejście do zbiorowisk zaroślowych. Reprezentowane są również nielicznie, prawdopodobnie dlatego, że trwają krótko i przechodzą w *Salici-Fraguletum*.

Zbiorowiska łakowe stanowią jedno z późniejszych stadiów zarasta-

nia stawów rybnych i są symptomem kompletnego zaniedbania ich. Likwidacja ich może być przeprowadzona jedynie przez odnowienie całego stawu.

Zbiorowisko szuwarowo-łakowe

Zbiorowisko szuwarowo-łakowe (tab. 25), jak nazwa wskazuje, budują rośliny szuwarowe i łakowe. Fizjonomia jego jest bardzo zmienna i zależy od tego, jaki gatunek aktualnie panuje i nadaje aspekt zbiorowisku. Bywa ono zwykle kilkuwarstwowe. W późnych stadiach rozwojowych, gdy już miejscami występuje zakrzewienie a nawet zadrzewienie, najwyższą warstwę stanowią *Salix cinerea* i — miejscami — *Alnus glutinosa*. Warstwa ta zwykle zbudowana jest jeszcze bardzo luźno — kępy krzewów są niewielkie i położone w znacznej odległości od siebie. Warstwę wysokich bylin tworzą: *Equisetum limosum*, *Lythrum salicaria*, *Cirsium palustre*, *Poa palustris*, *P. pratensis*, *Carex gracilis*, *Rumex hydrolapathum*, *Glyceria aquatica*, *Typha latifolia*, *Phragmites communis*, *Lysimachia vulgaris*, *Juncus conglomeratus* i in. W skład warstwy niskich bylin wchodzi: *Ranunculus flammula*, *Menyanthes trifoliata*, *Ranunculus repens*, *Agrostis stolonifera*, *Myosotis palustris* i in. Zwykle bardzo bogato rozwinięta jest warstwa mszysta, którą budują: *Climacium dendroides*, *Calliergon cuspidatum*, *Drepanocladus aduncus*, *Marchantia polymorpha*, *Mnium Seligeri* i szereg innych mszaków.

Zbiorowisko jest florystycznie bogate; w zdjęciu występuje 15—31 gatunków. Pokrycie przez roślinność wynosi zwykle 100%.

Z fitosocjologicznego punktu widzenia zbiorowisko szuwarowo-łakowe składa się z różnych elementów. Jego strukturę socjalną przedstawia niżej podana tabelka:

n=18					
Grupa gatunków Artengruppe	z	Σg	G	S	D
<i>Phragmitetalia</i> , <i>Phragmitetea</i>	28	94	26.5	18.6	4.9
<i>Caricetalia fuscae</i> , <i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	11	32	9.0	16.0	1.4
<i>Molinietalia</i> , <i>Molinio-Arrhenatheretea</i>	29	120	33.5	23.0	7.7
<i>Alnetalia glutinosae</i> , <i>Alnetea glutinosae</i>	7	21	6.0	16.6	1.0
<i>Plantaginietalia</i> , <i>Plantaginetea</i>	8	21	6.0	14.6	0.9
Towarzyszące — Begleiter	33	67	19.0	11.2	2.1
	116	t=355	100.0		

Z zestawienia powyższego widać, że główną rolę w omawianym zbiorowisku odgrywają gatunki z *Molinietalia* i *Molinio-Arrhenatheretea* (D = 7,7) oraz elementy z *Phragmitetalia* (D = 4,9). Zbiorowisko, w zależności od składu florystycznego, a więc i struktury socjalnej, rozpada się na kilka „wariantów”, w których występują gatunki z różnych grup systematycznych:

- A — *Phragmitetalia*, *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, *Molinio-Arrhenatheretea*, *Alnetalia*, *Plantaginetalia*;
- B — *Phragmitetalia*, *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, *Molinio-Arrhenatheretea*;
- C — *Phragmitetalia*, *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, *Molinio-Arrhenatheretea*, *Alnetalia*;
- D — *Phragmitetalia*, *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, *Molinio-Arrhenatheretea*, *Plantaginetalia*;
- E — *Phragmitetalia*, *Molinio-Arrhenatheretea*;
- F — *Phragmitetalia*, *Molinio-Arrhenatheretea*, *Alnetalia*.

W zbiorowisku dominują byliny kłaczowe przy dużym udziale mszaków, co ilustruje niżej podane spektrum morfologiczno-biologiczne:

Atr	55.0	Hon	1.0
Atp	12.0	B-At	24.0
As	1.0	B-Ho	2.0
K	2.0	G	1.0

Wcześniejsze stadia rozwojowe zbiorowiska szuwarowo-łąkowego są niekiedy silnie podtopione. Natomiast w stadiach późniejszych nie widać

Ryc. 25. Zbiorowisko szuwarowo-łąkowe, późne stadium rozwojowe (Nowodwór)
Röhrichten-Wiesengesellschaft, ein spätes Entwicklungsstadium (Nowodwór)

Tabela 25

Zbigniew Podbielkowski
Mon.Bot.vol.XXVIIZbierowisko szuwarowo-łąkowe
Röhrichten-Wiesen-Gesellschaft

Forma morf.- biol. Morph- biol. Form	Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme Miejscowość - Ort	281	43c	165	338	351	226	294	121	86	370	369	487	425	106	43d	384	72	65	Sta- lość	Współ- czyn- nik pokry- cia
		Sl	Cz	Go	Wy	Mc	Kw	Br	Ra	St	Rk	Rk	Je	Kwk	Wo	Cz	Rd	Ot	Nr		
	Data - Datum	11.9.1955	12.7.1965	21.8.1965	4.7.1966	6.7.1966	30.8.1965	13.9.1965	13.8.1965	28.7.1965	12.7.1966	12.7.1966	7.8.1966	21.7.1966	7.8.1965	12.7.1965	14.7.1966	23.7.1965	16.7.1965		
	Głęb.wody w cm - Wassertiefe cm	20	15	-40	-15	-10	10	30	5	0-0	0-0	0-0	-10	0-0	-20	10	-10	-15	0-0		
	pH	6,5	7	6,5	6,5	6	7	8,5	7,5	7,5	7	7	7	6,5	6	7	7	7	7,5		
	Pokrycie przez roślinność %																				
	Veg.-Bedeckung %																				
	warstwa nadwodna - Luftschicht	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	50	30	-	-	-	30	40	30	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-		
	Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnahmefläche m ²	200	25	100	100	100	100	40	25	25	25	25	100	25	100	25	100	25	200		
	Liczba gatunków - Artenzahl	16	18	23	20	23	15	23	13	25	18	15	18	19	19	19	31	14	25		
	Wariant - Variante	A										B		C		D		E	F		
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia, Phragmitetoea:																					
Atr	Galium palustre	2	1	+	1-2	2	.	.	.	+1	.	.	2-3	2	.	+	+	.	+	IV	550
Atr	Equisetum limosum	.	.	.	.	.	2	1	.	2	3	4	3-4	.	.	.	.	+	+	III	1058
Atr	Poa palustris	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3-4	.	.	.	II	539
Atr	Carex gracilis	1	2	+	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	2-3	.	2-3	2	II	391
Atr	Lycopodium europaeus	.	.	.	.	2	+1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1-2	.	.	II	204
Atr	Rumex hydrolapathum	1	.	+	.	.	.	.	.	.	2-3	.	1	.	.	.	.	.	.	II	210
Atr	Glyceria aquatica	3	.	.	.	3-4	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	2	.	II	647
Atr	Carex rostrata	.	.	.	.	.	.	3	.	2-3	.	.	1	3	.	.	.	.	.	II	805
Atr	Typha latifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2-3	.	.	.	.	.	.	.	1	II	334
Atr	Carex vesicaria	.	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+1	II	107
Atr	Phragmites communis	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	1-2	.	I	73
Atr	Acorus calamus	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	29
Atr	Typha angustifolia	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I	43
Atr	Schoenoplectus lacustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	I	19
Atr	Rorippa amphibia	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	I	125
Atr	Alisma plantago-aquatica	.	.	.	.	.	.	1-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	64
Atr	Carex pseudocyperus	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	I	42
Atr	Phalaris arundinacea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	I	28
Atr	Peucedanum palustre	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	28
Atr	Cicuta virosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	I	208
Atr	Iris pseudoacorus	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	28
Atr	Ranunculus lingua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I	28
Atr	Berula angustifolia	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	28
Atr	Heleocharis palustris	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	14
Atr	Calla palustris	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	14
Atr	Sparganium ramosum	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	14
Atr	Sium latifolium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	0,6
As	Oenanthe aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I	0,6
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Caricetalia fuscae, Scheuchzerio-Caricetea fuscae:																					
Atr	Ranunculus flammula	1	+	1	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	+	+1	.	.	.	III	11
Atr	Epilobium palustre	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	II	264
Atr	Menyanthes trifoliata	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	709
Atr	Juncus articulatus	.	1-2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	I	189
Atr	Veronica scutellata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	162
Atr	Comarum palustre	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1-2	.	.	I	153
Atr	Carex fusca	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	194
B-At/B-Ho	Drepanocladus revolvens	.	.	.	.	.	.	4	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	I	344
Atr	Carex panicea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	I	97
Atr	Carex flava	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	97
.	Parnassia palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I	0,6
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Molinietales, Molinio-Arrhenatheretea:																					
Atr	Lythrum salicaria	+	+	1-2	1	2	+	+1	1-2	.	.	1	2-3	2	3-4	+	1	+	+	V	854
Atr	Poa pratensis	.	.	3-4	3	.	.	.	.	+1	.	2	.	.	1	1	1	+	+	III	682
Atr	Myosotis palustris	.	.	.	.	2-3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	III	350
As	Cirsium palustre	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	2	.	1-2	+1	.	.	+	III	178
Atr	Lysimachia vulgaris	+	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	+1	.	+	III	157
Atr	Caltha palustris	.	+	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	+1	.	+	III	239
Atr	Juncus conglomeratus	.	.	.	1	.	.	2-3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	+	II	210
B-At	Climacium dendroides	.	.	4	.	.	.	.	2-3	.	2-3	3	.	4-5	.	.	.	.	.	II	1278
Atr	Scirpus silvaticus	.	.	.	.	.	.	1-2	.	1	2-3	.	.	.	.	.	.	.	3	II	301
Atr	Deschampsia caespitosa	2	+	.	2-3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	279
Atr	Holcus lanatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	+		

już wolnego lustra wody — albo zbiornik został zupełnie wypłycony, albo roślinność utworzyła zwarty kożuch pływający na wodzie.

Omawiane zbiorowisko jest bardzo pospolite w stawach rybnych. W zarośniętych i spłyconych stawach zajmuje często całe ich powierzchnie, natomiast tam, gdzie lustro wody nie jest zupełnie zarośnięte, lokuje się przy spłyconych brzegach, tworząc tu bardzo szeroki pas (ryc. 25). Obecność jego wskazuje na zupełne zaniedbanie stawów.

W tym miejscu warto jeszcze zwrócić uwagę na rzadko występujące w stawach (Żelazna, Lesznówola) zbiorowisko z *Hippuris vulgaris*. Ma ono również charakter przejściowy między zbiorowiskami szuwarowymi a łąkowymi. Występuje w miejscach okresowo podtapianych. Jego gatunek przewodni, *Hippuris vulgaris*, przez jednych autorów (Oberdorfer 1957) zaliczony jest do związku *Nymphaeion*, natomiast inni (Tüxen 1955, Oberdorfer 1949) uważają go za gatunek charakterystyczny dla *Scirpo-Phragmitetum*. Skład florystyczny omawianego zbiorowiska ilustruje zdjęcie 443 (Żelazna, 28.7.66, głęb. wody 10 cm, pH 7, pokrycie przez rośliny 100%, pow. zdjęcia 100 m²): *Hippuris vulgaris* 2—3, *Lysimachia thyrsiflora* 1, *Equisetum limosum* 1—2, *Heleocharis uniglumis* 2, *Lycopus europaeus* +—1, *Polygonum hydropiper* 1—2, *Alisma plantago-aquatica* 1, *Lythrum salicaria* 2, *Carex rostrata* 1, *Carex fusca* 2, *Galium palustre* 2—3, *Ranunculus flammula* 2, *Cardamine pratensis* 2—3, *Agrostis stolonifera* 3—4, *Drepanocladus aduncus* var. *polycarpa* f. *gracilescens* 2.

Zbiorowisko z *Calamagrostis canescens*

Charakterystyczny aspekt nadaje temu zbiorowisku (tab. 26) obficie występujący gatunek przewodni, *Calamagrostis canescens*. Poza nim prawie zawsze występują tu: *Lythrum salicaria*, *Carex gracilis* i *Equisetum limosum*. Godna uwagi jest stała obecność mchów.

Ilość gatunków w zdjęciu waha się od 7 do 15. Pokrycie przez roślinność wynosi 100%.

Dominują byliny kłaczowe przy dużym udziale mszaków łąkowych (patrz spektrum morfologiczno-biologiczne).

Atr	70.0	Hoz	< 1.0
Atp	1.0	B-At	22.4
K	2.0	B-Ho	4.3

Jest to pewnego rodzaju wariant zbiorowiska szuwarowo-łąkowego lub późne stadium rozwojowe *Caricetum gracilis*, wariant z *Calamagrostis canescens*.

Struktura socjalna omawianego zbiorowiska uwidoczniła jest na niżej podanej tabelce.

Zbiorowisko z *Calamagrostis canescens*
Calamagrostis canescens - Gesellschaft

	Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme	197	181	567	188	201	366	Sta- tość wsto- sunku do 6	Współ- czyna- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
		Ci	Ża	Zb	Ni	Ci	Kr		
	Miejscowość - Ort	26.8.	23.8.	18.8.	24.8.	26.8.	9.7.		
	Data - Datum	1965	1965	1966	1965	1965	1966		
	Głęb.wody cm - Wassertiefe cm	0-0	0-0	10-10	5	0-0	10		
Forma morf.- biol.	pH	6,5	6,5	6,5	6,5	7	6,5		
Morph.- biol.	Pokrycie przez roślinność								
Form	- Veg.-Bedekung %	100	100	100	100	100	100		
	warstwa nadwodna Luftschrift								
	warstwa na- i podwodna Wasserschicht								
	Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnahmefläche m ²	25	25	100	25	25	25		
	Liczba gatunków - Artenzahl	12	15	13	7	8	11		
	Gatunek przewodni zbiorowiska Leitart der Gesellschaft:								
Atr	<i>Calamagrostis canescens</i>	2-3	3	3-4	4	4-5	5	6	5666
	Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia und Phragmitetea:								
Atr	<i>Carex gracilis</i>	.	1	2	+1	1	1	5	585
Atr	<i>Equisetum limosum</i>	3	3	2	+1	1	.	5	1668
Atr	<i>Rumex hydrolapathum</i>	+	.	1	.	+1	.	3	128
Atr	<i>Phragmites communis</i>	.	2	2-3	.	.	.	2	750
Atr	<i>Ranunculus lingua</i>	+1	.	1-2	.	.	.	2	235
Atr	<i>Lycopus europaeus</i>	.	+	.	.	.	.	1	2
Atr	<i>Carex rostrata</i>	.	+	.	.	.	.	1	2
Atr	<i>Poa palustris</i>	.	+	.	.	.	.	1	2
Atr	<i>Typha latifolia</i>	.	+	.	.	.	.	1	2
Atr	<i>Glyceria aquatica</i>	.	.	.	+	.	.	1	2
Atr	<i>Phalaris arundinacea</i>	.	.	.	.	+	.	1	2
Atr	<i>Cicuta virosa</i>	.	.	.	.	+	.	1	2
Atr	<i>Iris pseudoacorus</i>	.	.	.	.	.	+	1	2
	Gatunki charakterystyczne Charakterarten Caricetalia fuscae und Scheuchzerio-Caricetea fuscae:								
Atr	<i>Menyanthes trifoliata</i>	3	.	+1	.	.	.	2	668
Atr	<i>Ranunculus flammula</i>	.	.	.	+	.	1	2	85
Atr	<i>Epilobium palustre</i>	+1	.	+	.	.	.	2	45
Atr	<i>Comarum palustre</i>	.	.	2-3	.	.	.	1	485
Atr	<i>Juncus articulatus</i>	.	.	.	.	.	+	1	2
	Gatunki charakterystyczne Charakterarten Molinietaalia und Molinio-Arrhenatheretea:								
Atr	<i>Lythrum salicaria</i>	1-2	+	+	1	+1	1	6	405
Atr	<i>Lysimachia vulgaris</i>	+1	+	.	.	.	1	3	45
Atr	<i>Scirpus silvaticus</i>	.	.	2	.	.	+1	2	335
Atr	<i>Juncus effusus</i>	.	1	1	.	.	.	2	166
Atr	<i>Myosotis palustris</i>	.	+	.	.	.	.	1	2
Atr	<i>Caltha palustris</i>	.	.	.	.	.	+	1	2
	Gatunki towarzyszące Begleiter:								
K	<i>Salix cinerea</i> /1,5 m/	+1	2	.	.	.	.	2	335
Atr	<i>Mentha verticillata</i>	1	.	.	.	.	.	1	83
Hoz	<i>Polygonum amphibium</i>	.	.	.	.	.	+1	1	83
B-At	<i>Drepanocladus aduncus</i>	3-4	.	4	3	2	.	4	2792
B-At/B-Ho	<i>Calliergon cuspidatum</i>	2	+	.	.	.	4-5	3	1543
B-At	<i>Bryum ventricosum</i>	.	+1	.	.	.	.	1	45

Grupa gatunków Artengruppe	z	Σg	G	S	D	Suma współcz. pokr. Summe des mittl. Dek- kungs- wertes
<i>Alnetalia, Alnetea</i>	2	8	11.5	66.6	7.7	6001
<i>Phragmitetalia, Phragmitetea</i>	13	25	38.0	32.0	19.0	3282
<i>Caricetalia fuscae, Scheuchzerio- -Caricetea fuscae</i>	5	8	11.5	26.6	3.1	1258
<i>Molinietalia, Molinio-Arrhenatheretea</i>	6	15	23.0	41.6	9.6	950
Towarzyszące — Begleiter	5	10	16.0	33.3	5.3	4514
	31	t=66	100.0			

Z powyższego zestawienia wynika, że zbiorowisko z *Calamagrostis canescens* należy do *Phragmitetalia* (D = 19) przy pewnym, znacznym powinowactwie do rzędu *Alnetalia* (D = 7,7) i *Molinietalia* (D = 9,6). Jednakże analizując sumę współczynników pokrycia gatunków poszczególnych grup, widać wyraźnie, że główną masę zbiorowiska stanowią przedstawiciele *Alnetalia* (*Calamagrostis canescens*).

Ryc. 26. Zbiorowisko z *Calamagrostis canescens* (Cisie)
Pflanzengesellschaft mit *Calamagrostis canescens* (Cisie)

Omawiane zbiorowisko występuje często w starych, zupełnie zarośniętych i pozbawionych wody stawach. Tworzy rozległe, słabo podtopione lub suche łąki (ryc. 26) często pokrywające całą powierzchnię stawu. W ciągu przemian sukcesyjnych stanowi, jak się zdaje, jedno z dalszych ogniw rozwojowych zbiorowisk szuwarowo-łąkowych.

ZBIOROWISKA ZAROŚLOWE I DRZEWIASTE

Zbiorowiska zaroślowe w stawach rybnych mogą być różnie wykształcone. Jedne z nich mają charakter mozaikowo-kompleksowy i występują w postaci dość suchych łąk zakrzewionych, stanowiąc jedno z końcowych stadiów ładowacenia stawów; należy tu *Salici-Franguletum*. Inne budowane są głównie przez wierzby krzewiaste (*Salix cinerea*, *Salix purpurea* i *Salix pentandra*) oraz przez roślinność szuwarową. Występują one w miejscach jeszcze mocno podtopionych i powstają jako konsekwencja dalszego rozwoju zbiorowisk szuwarowych przy dużym udziale krzewów. Warstwa mszysta jest miejscami bardzo dobrze wykształcona.

Zbiorowiska drzewiaste reprezentowane są w stawach przez niewielkie i mocno zniszczone przez wypas fragmenty młodego *Carici elongatae-Alnetum*.

Salici-Franguletum Malcuit 1929

Zespół ten (tab. 27) jest mniej lub więcej zakrzewioną łąką (ryc. 27). W warstwie krzewów występuje przede wszystkim *Salix cinerea*; może rosnąć tu niekiedy *Salix pentandra* i *Alnus glutinosa*. Warstwę zielną budują średnio wysokie byliny z niewielką domieszką dużych bylin szuwarowych. Dobrze rozwinięta jest również warstwa mchów.

Liczba gatunków w zdjęciu waha się od 8 do 21. Pokrycie przez roślinność wynosi 100%.

Dominują byliny kłaczowe i krzewy przy dużym udziale mszaków łąkowych i bylin kępkowych (patrz spektrum morfologiczno-biologiczne).

Atr	39.0	K	30.0
Atp	14.7	Hoz	< 1.0
As	< 1.0	B-At	15.5

W badanych przeze mnie stawach omawiany zespół jest rozwinięty fragmentarycznie. Oprócz grupy gatunków charakterystycznych dla niego zawiera on znaczną liczbę gatunków z *Phragmitetalia*, *Molinietalia* i *Molinio-Arrhenatheretea* oraz *Caricetalia fuscae* i *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*. Występuje w postaci dwóch wariantów:

- A — rozwojowo wcześniejszego, z małą liczbą gatunków z *Molinio-Arrhenatheretea*;

Ryc. 27. *Salici-Franguletum* (Kownata)

B — rozwojowo późniejszego, z większą liczbą gatunków łąkowych.

W stawach rybnych zespół ten występuje dość rzadko. Rozwija się w zupełnie suchych, zarośniętych stawach, gdzie obecność wody można stwierdzić tylko na wiosnę. Może tworzyć się również na skrajach kompleksów stawowych, gdzie stawy peryferyczne bezpośrednio przechodzą w zbiorowiska naturalne. Stanowi jedno z ostatnich stadiów zarastania.

Salici-Franguletum Malcuit 1929

podzespół z *Salix repens* R. Tx. 1937

Zbiorowisko to (tab. 28), podobnie jak poprzednie, jest trójwarstwowe z tym, że warstwa mszysta jest tu uboższa, a warstwa krzewów zróżnicowana na część wyższą (*Salix cinerea*) i niższą (*Salix rosmarinifolia*).

Pod względem florystycznym zespół ten jest bogaty; liczba gatunków w zdjęciach wynosi 24—25. Pokrycie przez roślinność sięga 100%.

Dominują byliny kłaczowe i kępkowe przy dużym udziale krzewów (patrz spektrum morfologiczno-biologiczne).

Atr	35.0	As	< 1.0
Atp	46.0	B-At	4.0
K	14.0		

	Nr zdjęcia - Nr.d. Aufnahme	202	271	89c	518	519	120	223	237	Staość w sto- sunku do 8	Współ- czyn- nik pokry- cia
	Miejscowość - Ort	Ci	Su	St	Jz	Jz	Ra	Kw	Ru		
	Data - Datum	26.8 1965	10.9 1965	28.7 1965	11.8 1966	11.8 1966	13.8 1965	30.8 1965	7.9 1965		
Forma morf.- biol.	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	0-0	0-30	0-0	-10	-40	0-5	-10	-40		
Morph.- biol.	pH	7	7	7	7	5	7,5	6,5	6,5		
Form	Pokrycie przez roślinność % Veg.-Bedeckung %									Steg- tig- keit im Ver- hält- nis zu 8	Dek- kungs- wert
	warstwa nadwodna - Luftschicht	100	100	100	100	100	100	100	100		
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	-	-	-	-	-	10	-	-		
	Powierzchnia zdjęcia m ² Aufnahmefläche m ²	200	200	200	100	100	25	100	100		
	Liczba gatunków - Artenzahl	9	11	8	9	21	13	18	18		
	Wariant - Variante	A				B					
Gatunki charakterystyczne											
Charakterarten Alnetalia glutinosae.											
Alnetea glutinosae:											
K	Salix cinerea	1	4	5	3	3	1	1	3	8	3281
Atr	Calamagrostis canescens	1-2	.	.	3-4	.	.	.	+	3	770
K	Alnus glutinosa	2	3	.	.	.	.	.	.	2	688
K	Salix pentandra	.	.	.	.	.	.	.	2	1	219
K	Salix aurita	.	.	.	.	.	.	1	.	1	62
Gatunki charakterystyczne											
Charakterarten Phragmitetalia,											
Phragmitetetea:											
Atr	Phragmites communis	.	.	+	2	1	.	1	+	5	346
Atr	Rumex hydrolapathum	3	1-2	+	.	.	.	.	.	3	614
Atr	Galium palustre	.	.	+1	.	2	.	1	+	4	426
Atr	Carex gracilis	3	.	.	1	.	.	.	.	2	531
Atr	Carex rostrata	.	.	.	.	.	2	1	.	2	424
Atr	Iris pseudoacorus	.	1	.	.	+1	.	.	.	2	95
Atr	Equisetum limosum	.	+1	.	.	.	.	1	.	2	95
Atr	Typha latifolia	+	1	.	.	.	.	.	.	1	64
Atp	Carex paniculata	.	.	.	.	.	3-4	.	.	1	625
Atr	Lycopus europaeus	.	.	.	.	2	.	.	.	1	219
Atp	Carex hudsonii	.	.	.	.	.	.	.	.	1	219
Atr	Lysimachia thyrsiflora	.	.	.	.	1-2	.	.	.	1	144
Atr	Glyceria aquatica	.	1	.	.	.	.	.	.	1	62
Atr	Poa palustris	.	.	.	.	+1	.	.	.	1	32
Gatunki charakterystyczne											
Charakterarten Caricetalia fuscae,											
Scheuchzeria-Caricetea fuscae:											
Atr	Carex fusca	.	.	.	.	2	.	2	.	2	438
Atp	Juncus articulatus	.	.	.	.	.	1	+	.	2	64
Atr	Parnassia palustris	.	.	.	.	.	.	1	+	2	64
Atp	Carex flava	.	.	.	.	1-2	.	.	.	1	144
Atr	Ranunculus flammula	.	.	.	.	.	1	.	.	1	62
Gatunki charakterystyczne											
Charakterarten Molinietalia,											
Molinio-Arrhenatheretea:											
Atr	Lythrum salicaria	2	2	.	2	.	1-2	+	+	6	802
Atr	Lysimachia vulgaris	+1	+1	+	+	1	.	.	.	5	130
E-At	Climacium dendroides	.	.	.	2	2	4	.	.	3	1219
Atp	Deschampsia caespitosa	.	.	.	.	3	.	.	3	2	938
Atr	Hydrocotyle vulgaris	.	.	.	1-2	3-4	.	.	.	2	769
Atp	Poa pratensis	.	.	.	.	1	.	.	1	2	125
As	Cirsium palustre	.	.	.	.	.	.	+1	+	2	34
Atp	Juncus effusus	.	.	.	.	1-2	.	1	.	2	206
Atr	Equisetum palustre	.	.	.	.	.	.	1	+	2	64
Atr	Scirpus silvaticus	.	1	+	.	.	.	.	.	2	64
Atr	Hypericum acutum	.	.	.	.	+	1	.	.	2	64
Atp	Holcus lanatus	.	.	.	.	.	.	1-2	.	1	144
Atr	Vicia cracca	.	.	.	.	.	.	1	.	1	62
Atp	Briza media	.	.	.	.	.	.	1	.	1	62
Atr	Rumex acetosa	.	.	.	.	.	.	.	+	1	1
Atr	Alopecurus pratensis	.	.	.	.	.	.	.	+	1	1
Atp	Juncus conglomeratus	.	.	.	.	.	+	.	.	1	1
Gatunki towarzyszące - Begleiter											
K	Salix rosmarinifolia	.	.	.	.	.	.	3	+	2	470
K	Frangula alnus	.	2	.	.	+	.	.	.	2	220
K	Betula pubescens	.	.	.	.	2	+	.	.	2	220
Atr/Hoz	Agrostis stolonifera	.	.	.	.	.	.	2	.	1	219
Atr	Ranunculus repens	.	.	.	.	1	.	.	.	1	62
Atr	Achillea millefolium	.	.	.	.	.	.	.	1	1	62
Atr	Mentha arvensis	.	.	.	.	1	.	.	.	1	62
Atr	Cirsium arvense	.	.	.	.	.	.	.	+1	1	32
Atr	Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.	.	.	+1	1	32
Atr	Potentilla anserina	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
Atr	Geum rivale	.	.	.	.	.	.	.	+	1	1
E-At	Calliergon cuspidatum	.	.	+	2	.	2	.	.	3	439
E-At	Drepanocladus aduncus	+	.	1-2	.	.	.	.	.	2	143
E-At	Ailacomnium palustre	.	.	.	.	.	.	4	.	1	781
E-At	Thuidium delicatulum	.	.	.	.	.	.	.	+1	1	32
E-At	Polytrichum attenuatum	.	.	.	.	.	+1	.	.	1	32

Forma morf.- -biol. Morph.- -biol. Form	Nr zdjęcia - Nr. d.Aufnahme	184	168	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
	Miejscowość - Ort	2a	Go	
	Data - Datum	23.8.1965	21.8.1965	
	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	-30	-40	
	pH	6	6,5	
	Pokrycie przez roślinność %			
	Veg.-Bedeckung %			
	warstwa nadwodna - Luftschicht	100	100	
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	-	-	
	Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	200	100	
	Liczba gatunków - Artenzahl	24	25	

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten der Assoziation,
der Ordnung Alnetalia glutinosae und
der Klasse Alnetea glutinosae:

K	Salix cinerea	2-3	+1	1505
K	Salix pentandra	1	.	250
K	Salix purpurea	+	.	5
Atr	Calamagrostis canescens	+	.	5

Gatunki wyróżniające podzespół
Differentialarten der Subassoziation:

Salix rosmarinifolia	1	1	500
----------------------	---	---	-----

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten Molinio-Arrhenatheretea:

Atp	Deschampsia caespitosa	1	2-3	1625
Atp	Briza media	1-2	1-2	1150
Atr	Centaurea jacea	1	1-2	825
Atr	Succisa pratensis	1-2	+	580
Atp	Poa pratensis	+	2	880
Atr	Selinum carvifolia	+	2	880
B-At	Climacium dendroides	1	1	500
Atp	Phleum pratense	+1	1	380
Atp	Dianthus superbus	+	+	10
Atp	Molinia coerulea	.	2-3	1375
Atr	Trifolium pratense	1	.	250
Atr	Chrysanthemum leucanthemum	.	1	250
Atp	Holcus lanatus	+1	.	130
Atr	Vicia cracca	+1	.	130
Atr	Lysimachia vulgaris	+1	.	130
Atr	Stachys palustris	+	.	5
Atp	Festuca pratensis	.	+	5
Atp	Arrhenatherum elatius	.	+	5
Atr	Filipendula ulmaria	.	+	5
As	Cirsium palustre	.	+	5

Gatunki towarzyszące - Begleiter

Atr	Carex panicea	2	+1	1005
Atr	Gentiana pneumonanthe	+	+	10
Atp	Anthoxanthum odoratum	1	.	250
Atr	Galium verum	.	+1	130
Atr	Potentilla silvestris	.	+1	130
Atr	Potentilla silvestris	.	+1	130
Atr	Plantago media	.	+1	130
As	Odontites rubra	+	.	5
Atr	Brunella vulgaris	+	.	5
Atp	Juncus inflexus	.	+	5
Atr	Triglochin palustre	.	+	5
B-At	Thuidium delicatulum	.	+	5

Omawiany zespół występuje w stawach dość rzadko. Lokuje się w miejscach podobnych, jak *Salici-Franguletum*, lecz o jeszcze niższym poziomie wody gruntowej. Z reguły nie jest podtapiany, nawet na wiosnę.

W ciągu rozwojowym zbiorowisko stanowi etap łądowacenia następujący po *Salici-Franguletum*. Przy regularnym koszeniu może przez długi okres czasu nie ulegać poważniejszym zmianom. Ze względu na wysoką jakość otrzymywanej z niego paszy przedstawia znaczną wartość pod względem gospodarczym.

Carici elongatae-Alnetum (W. Koch 1926) R. Tx. et Bodeaux 1955

Oles (tab. 29) jest jedynym zespołem leśnym, jaki występuje w badanych przeze mnie stawach. Jest to dość wczesne stadium rozwojowe tego zespołu. Olsze są młode i osiągają zaledwie 8—10 m wysokości i 20 cm pierśnicy. U podstawy tworzą one charakterystyczne wypiętrzenia podłoża osiągające miejscami znaczną wysokość. Roślinność dolinek jest prawie zupełnie zniszczona wskutek wypasu.

Panującym elementem są tu krzewy, co wyraźnie wykazuje podane niżej spektrum morfologiczno-biologiczne:

K	41.0	Atp	2
D	16.0	As	1.0
Atr	39.0	B-At	< 1.0

Oles występuje bardzo rzadko na terenie stawów rybnych. Stanowi on ostatnie, jakie zaobserwowałem, stadium zarastania stawów. Rozwija się w stawach zupełnie zaniedbanych, od lat nie czyszczonych i nie zalewanych wodą.

ZBIOROWISKA ROŚLINNE NA ODKRYTYM DNIIE STAWÓW

Zbiorowiska roślinne na odkrytym dnie stawów mają bardzo specyficzny charakter. Pojawiają się i rozwijają na dnie stawów, z których spuszczone wodę. Tworzą więc tu pierwsze stadia zasiedlania.

Są to zwykle zbiorowiska efemeryczne, chociaż niektóre z nich mogą przetrwać i przez dłuższy okres czasu. Ich skład florystyczny bywa różny. Inaczej kształtują się w stawach, gdzie przestrzeń wodna była mało zarośnięta, a inaczej tam, gdzie obficie występowały rośliny szuwarowe, które teraz włączają się do budowania nowego zbiorowiska. Inaczej jeszcze kształtuje się roślinność bardzo dokładnie oczyszczonego dna. Osiedlają się tu bowiem zupełnie nowe rośliny, a tylko tu i ówdzie widać przedstawicieli roślinności dawnej.

Po ponownym zalaniu stawu ta efemeryczna, pionierska roślinność częściowo ginie, a częściowo zachowuje się jeszcze przez pewien okres czasu, po czym — w miarę osiedlania się roślin wodnych i szuwarowych — powoli ustępuje.

Forma morf.- -biol. Morph.- -biol. Form	Nr zdjęcia - Nr. d.Aufnahme Miejscowość - Ort Data - Datum Głębokość wody cm - Wassertiefe cm pH Pokrycie przez roślinność % Veg.-Bedeckung % warstwa nadwodna - Luftschicht warstwa na- i podwodna - Wasserschicht Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ² Liczba gatunków - Artenzahl	199	57	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
		Ci	Nr	
		28.8.	16.7.	
		1965	1965	
		-30	0-0	
		6,5	6,5	
		100	100	
		-	-	
		200	200	
		31	16	

Gatunki charakterystyczne zespołu

Charakterarten der Assoziation:

Atp	Carex elongata	+1	+1	260
Atr	Solanum dulcamara	1	+	255
K	Ribes nigrum	+1	.	130

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten Alnetalia glutinosae,

Alnetea glutinosae:

K/D	Alnus glutinosa	2	4	3700
K	Frangula alnus	1	2	1125
K	Salix cinerea	1	+1	380
Atr	Lycopodium europaeus	+	+	10
Atr	Dryopteris thelypteris	+	+	10

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten Phragmitetalia,

Phragmitetea:

Atr	Equisetum limosum	+	1	255
Atr	Iris pseudoacorus	.	1	250
Atr	Rumex hydrolyapathum	+1	.	135
Atr	Cicuta virosa	.	.	5
Atp	Poa palustris	+	.	5

Gatunki charakterystyczne

Charakterarten Molinietaalia,

Molinia-Arrhenatheretea:

Atr	Lysimachia vulgaris	1	2	1125
Atr	Filipendula ulmaria	1	1-2	825
Atr	Caltha palustris	+1	+	135
Atr	Epilobium hirsutum	2	.	875
Atr	Lythrum salicaria	1	.	250
Atr	Scirpus silvaticus	1	.	250
Atr	Equisetum palustre	+1	.	135
Atr	Myosotis palustris	+1	.	135
Atr	Cirsium oleraceum	+	.	5
Atp	Deschampsia caespitosa	+	.	5

Gatunki towarzyszące - Begleiter:

K	Rubus idaeus	1	2-3	1625
K/D	Populus tremula	.	1-2	575
Atr	Epilobium palustre	1	.	250
Atr	Urtica dioica	1	.	250
K	Betula pubescens	+1	.	135
As	Bidens cernuus	+1	.	135
Atr	Dryopteris spinulosa	.	+	5
Atr	Athyrium filix-femina	+	.	5
As	Polygonum hydropiper	+	.	5
Atr	Eupatorium cannabinum	+	.	5
K	Sorbus aucuparia	+	.	5
B-At	Flagiothecium denticulatum	.	+	5

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten *Caricetalia fuscae*,
Scheuchzeria-Caricetalia fuscae:

Atr	1-2	1	+1	+	+	129
Atr	1-2	1	1-2	1-2	+	133
Atr	1-2	1	1-2	1-2	+	231
Atr	1-2	1	1-2	1-2	+	33

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten *Molinia et alia*,
Molinio-Arrhenatheretea:

Atr	2	1	1	2	1-2	293
Atr	2	1	1	2	1-2	364
Atr	2	1	1	2	1-2	1
Atr	2	1	1	2	1-2	1

Gatunki charakterystyczne
Charakterarten *Plantaginetea maioris*:

Atr	2	1	1	2	1-2	417
Atr	2	1	1	2	1-2	151
Atr/Hoz	2	1	1	2	1-2	210

Gatunki towarzyszące - Begleiter:

Atr	2-3	1	1	2	1-2	211
Huz	2-3	1	1	2	1-2	440
Hon	2-3	1	1	2	1-2	150
Atr	2-3	1	1	2	1-2	177
Atr	2-3	1	1	2	1-2	177
Atr	2-3	1	1	2	1-2	33
Hon	2-3	1	1	2	1-2	33
Huz	2-3	1	1	2	1-2	33
Huz	2-3	1	1	2	1-2	33
Huz	2-3	1	1	2	1-2	17
Huz	2-3	1	1	2	1-2	17
B-At/B-Hu	2-3	1	1	2	1-2	693
B-At	2-3	1	1	2	1-2	17
G	2-3	1	1	2	1-2	417

Główną masę tego zbiorowiska (tab. 30) stanowią rdesty i rośliny szuwarowe. Fizjonomicznie zbiorowisko nie jest jednolite i aspekt jego kształtuje się w zależności od gatunku dominującego. Istnieje cała gama przejść od płatów z panującymi gatunkami szuwarowymi do takich płatów, w których prawie zupełnie nie ma roślin szuwarowych (np. zdjęcie 155, tab. 30).

Zbiorowisko jest dwu-trójwarstwowe. Liczba gatunków w zdjęciu wynosi od 3 do 18, a zwarcie roślinności — 80—100%.

Jak widać z podanego niżej spektrum morfologiczno-biologicznego, panują tu byliny kłaczowe i rośliny roczne (dwuletnie):

Atr	50.0	Hon	1.1
As	35.0	Hun	< 1.0
Atp	< 1.0	B-At	5.0
Hoz	1.0	B-Hu	1.8
Huz	2.0	G	3.0

Strukturę socjalną tego zbiorowiska ilustruje poniższa tabelka:

n=15					
Grupa gatunków Artengruppe	z	Σg	G	S	D
<i>Bidentetalia</i> , <i>Bidentetea</i>	7	19	14.0	18.0	2.5
<i>Phragmitetalia</i> , <i>Phragmitetea</i>	22	65	47.0	20.0	9.4
<i>Caricetalia fuscae</i> , <i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	4	11	8.0	18.0	1.4
<i>Molinietalia</i> , <i>Molinio-Arrhenatheretea</i>	4	11	8.0	18.0	1.4
<i>Plantaginetalia</i> , <i>Plantaginetea</i>	3	10	7.0	22.0	1.5
Towarzyszące — Begleiter	13	22	16.0	11.0	1.8
	53	t=138	100.0		

Z tabeli tej wynika, że omawiane zbiorowisko należałoby zaliczyć do *Phragmitetalia*, ponieważ wartość systematyczna tej grupy jest największa (D = 9,4). Porównując jednak ze sobą dwie dominujące grupy, *Bidentetalia* i *Phragmitetalia*, pod względem wartości pokrycia, widzimy, że prawie wcale nie różnią się one między sobą; suma współczynników pokrycia dla *Bidentetalia* wynosi 4313, zaś dla *Phragmitetalia* — 4375.

Zbiorowisko rdestowo-szuwarowe jest wielopostaciowe. Wyróżniłem w nim 4 warianty:

- A — z *Polygonum hydropiper*;
- B — z *Polygonum persicaria*;
- C — z *Polygonum nodosum* (ryc. 28);
- D — z *Polygonum mite*.

Najczęściej pojawia się ono w stosunkowo niedawno czyszczonych i nie zalanych stawach; jest ono wynikiem inwazji rdestów na nagie dno stawu tylko tu i ówdzie pokryte szuwarami.

Ryc. 28. Zbiorowisko rdestowo-szuwarowe wariant z *Polygonum nodosum* (Ruda)
Knöterich-Röhrichtgesellschaft, Variante mit *Polygonum nodosum* (Ruda)

Zbiorowisko jest dość pospolite. Lokuje się zwykle w środkowych partiach stawu lub w znacznej odległości od brzegów. Ze względu na charakter licznie reprezentowanych tu rdestów (rośliny roczne i dwuletnie) po zalaniu stawu przekształca się w zbiorowisko szuwarowe. W obecnym składzie nie przedstawia większej groźby dla gospodarki stawowej. W zarastaniu bierze bardzo duży udział. Daje dużą ilość masy organicznej, która ulega jednak szybkiemu rozkładowi.

Zbiorowisko z *Agrostis stolonifera*

Zbiorowisko z *Agrostis stolonifera* (tab. 31) tworzą prawie lite łany *Agrostis stolonifera* przylegające ściśle do wilgotnego podłoża. W obrębie ich występują tu i ówdzie inne rośliny, jak np.: *Polygonum hydropiper* czy też *Alopecurus geniculatus*.

Zbiorowisko jest bardzo ubogie pod względem florystycznym. Liczba gatunków w zdjęciu wynosi 2—4. Pokrycie przez roślinność sięga 95—100%.

Dominują tu byliny kłaczowe (*Agrostis stolonifera*), co ilustruje spektrum morfologiczno-biologiczne:

Atr	85.0	Hon	< 1.0
As	11.0	B-At	4.0

Zbiorowisko z *Agrostis stolonifera*
Agrostis stolonifera - Gesellschaft

	Nr. zdjęcia - Nr. d. Aufnahme Miejscowość - Ort	492	400	479	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
		Je	Tr	Wg	
Forma	Data - Datum	7.8.	19.7.	4.8.	
morf.- -biol.		1966	1966	1966	
Morph.- -biol.	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	-20	0-0	0-2	
Form	pH	8	8	7	
	Pokrycie przez roślinność %				
	Veg.-Bedeckung %				
	warstwa nadwodna - Luftschicht	100	100	95	
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	-	-	-	
	Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	100	4	25	
	Liczba gatunków - Artenzahl	4	5	2	

Gatunek przewodni zbiorowiska
Leitart der Gesellschaft:

Atr	<i>Agrostis stolonifera</i>	4-5	5	5	8330
	Gatunki towarzyszące - Begleiter:				
As	<i>Polygonum hydropiper</i>	3	+	.	1250
Atr	<i>Alopecurus geniculatus</i>	2	.	.	583
Atr	<i>Equisetum palustre</i>	1	.	.	166
Hon	<i>Lemna minor</i>	.	.	+	
Atr	<i>Rorippa silvestris</i>	.	+	.	
Atr	<i>Caltha palustris</i>	.	+	.	
B-At	<i>Amblystegium riparium</i>	.	1-2	.	83

Tabela 32

Zbiorowisko z *Heleocharis acicularis*
Heleocharis acicularis - Ges.

	Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme Miejscowość - Ort	403	273	473	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
		Fr	Ga	By	
Forma	Data - Datum	19.7.	10.9.	3.8.	
morf.- -biol.		1966	1965	1966	
Morph.- -biol.	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	-10	-20	0-10	
Form	pH	8	6,5	8	
	Pokrycie przez roślinność %				
	Veg.-Bedeckung %				
	warstwa nadwodna - Luftschicht	85	100	100	
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	-	-	20	
	Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	25	25	25	
	Liczba gatunków - Artenzahl	16	12	8	

Gatunek przewodni zbiorowiska
Leitart der Gesellschaft:

Atr	<i>Heleocharis acicularis</i>	3	3-4	3-4	4166
	Gatunki towarzyszące - Begleiter:				
Atr	<i>Agrostis stolonifera</i>	2-3	1	.	1300
Atr	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	1	2-3	.	1300
As	<i>Oenanthe aquatica</i>	+	.	2-3	920
As	<i>Polygonum hydropiper</i>	+1	2	.	670
Atr	<i>Lythrum salicaria</i>	+	.	2	586
Atr	<i>Glyceria fluitans</i>	+1	1	.	253
Atr	<i>Epilobium palustre</i>	.	.	3-4	1666
Atr	<i>Callitriche sp. /f.lądowa/</i>	.	3	.	1250
Atr	<i>Veronica anagallis</i>	.	2-3	.	916
Atr	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	.	2-3	.	916
Atr	<i>Equisetum limosum</i>	.	.	2-3	916
Atr	<i>Alopecurus geniculatus</i>	.	1	.	166
G	<i>Chara vulgaris</i>	1	.	.	166
B-At	<i>Drepanocladus aduncus</i>	+1	.	.	86
Atr	<i>Heleocharis palustris</i>	+1	.	.	86
Atr	<i>Typha angustifolia</i>	+	.	.	3
As	<i>Bidens tripartitus</i>	+	.	.	3
As	<i>Bidens cernus</i>	+	.	+	3
Atr	<i>Sium latifolium</i>	+	.	.	3
Atr	<i>Potentilla anserina</i>	+	.	.	3
Atr	<i>Mentha arvensis</i>	+	.	.	3
B-At	<i>Riccia fluitans f.terrestris</i>	+	.	.	3
Atr	<i>Glyceria aquatica</i>	.	+	.	3
Atr	<i>Polygonum amphibium</i>	.	+	.	3
Atr	<i>Rorippa silvestris</i>	.	+	.	3
Atr	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	.	.	+	3
As	<i>Rumex maritimus</i>	.	.	+	3

Ryc. 29. Zbiorowisko z *Agrostis stolonifera* (Trojanów)
Pflanzengesellschaft mit *Agrostis stolonifera* (Trojanów)

Występuje na wilgotnym dnie stawów, z których spuszczo wodę. Instaluje się tu dość szybko, a przede wszystkim bardzo szybko rozrasta się, pokrywając niekiedy znaczne przestrzenie (ryc. 29). Przy ponownym zalewie po pewnym okresie czasu ginie.

Zbiorowisko z *Heleocharis acicularis*

Głównym składnikiem tego zbiorowiska (tab. 32) jest *Heleocharis acicularis*. Gatunek ten tworzy niskie, dość zwarte darnie, przerośnięte niekiedy innymi roślinami, jak np.: *Agrostis stolonifera*, *Alisma plantago-aquatica*, *Oenanthe aquatica*, *Lythrum salicaria* (ryc. 30). Zbiorowisko to może mieć różną fizjonomię, zależną od panującego gatunku wysokich bylin. Jest ono, przynajmniej we wczesnych stadiach rozwojowych, dość ubogie pod względem florystycznym; liczba gatunków w zdjęciu wynosi 8—16. Pokrycie zasiedlanej powierzchni osiąga 85—100%.

Panują tu byliny kłaczowe (por. spektrum morfologiczno-biologiczne).

Atr	89.0	B-At	< 1.0
As	10.0	G	1.0

Jest to zbiorowisko pionierskie, rozwijające się niezbyt często na dnie osuszonych stawów. Podczas ponownego zalania wodą darnie

Ryc. 30. Zbiorowisko z *Heleocharis acicularis* (Trojanów)
Pflanzengesellschaft mit *Heleocharis acicularis* (Trojanów)

Ryc. 31. Zbiorowisko *Rumex maritimus*-*Alopecurus geniculatus*; panuje *Rumex maritimus* (Jarczew — Nowy Świat)
Pflanzengesellschaft *Rumex maritimus*-*Alopecurus geniculatus*; vorherrschend *Rumex maritimus* (Jarczew — Nowy Świat)

Tabela 33

Zbiorowisko Rumex maritimus - Alopecurus geniculatus
Rumex maritimus - Alopecurus geniculatus - Ges.

Forma morf.- -biol. Morph.- -biol. Form	Nr zdjęcia - Nr. d. Aufnahme Miejscowość - Ort	322	505	502	428	Współ- czyn- nik pokry- cia Dek- kungs- wert
		JN	W1	W1	Gr	
	Data - Datum	1.7.1966	9.8.1966	9.8.1966	21.7.1966	
	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	-5-0	-20	-5-0	0-0	
	pH	7	6,5	7,5	7,5	
	Pokrycie przez roślinność %					
	Veg.-Bedeckung %					
	warstwa nadwodna - Luftschicht	100	100	100	100	
	warstwa na- i podwodna - Wasserschicht	-	-	-	-	
	Pow.zdjęcia m ² - Aufnahmefläche m ²	40	25	100	100	
	Liczba gatunków - Artenzahl	10	13	15	7	
	Gatunki charakterystyczne					
	Charakterarten Bidentetalia:					
Atr	Rumex maritimus	4-5	+1	+1	2-3	2692
As	Polygonum hydropiper	.	1	+1	.	190
As	Polygonum persicaria	1	.	.	.	125
	Gatunki charakterystyczne					
	Charakterarten Plantaginetales:					
Atr	Alopecurus geniculatus	1-2	3	.	+	2790
Atr	Rorippa silvestris	2	1-2	.	1-2	1012
Atr	Plantago maior	.	1	1-2	.	412
	Gatunki charakterystyczne					
	Charakterarten Phragmitetalia:					
Atr	Alisma plantago-aquatica	2	3	1-2	1	1788
As	Oenanthe aquatica	1	.	1	.	250
Atr	Rumex hydrolapathum	.	1	+	.	128
Atr	Veronica anagallis	.	.	.	2	438
Atr	Rorippa amphibia	.	.	1	.	125
Atr	Sium latifolium	.	.	+	.	2
Atr	Phragmites communis	.	.	+	.	2
	Gatunki towarzyszące - Begleiter:					
Atr	Juncus articulatus	.	.	2	4	2000
Atr	Batrachium trichophyllum	2-3	.	+1	.	752
Atr	Myosotis palustris	.	1-2	1	.	412
Atr	Mentha arvensis	.	2-3	.	.	688
Atr	Heleocharis acicularis	1-2	.	.	.	288
As	Cyperus fuscus	.	.	.	1-2	288
Atr	Lythrum salicaria	.	.	1	.	125
Atr	Glyceria fluitans	.	+	1	.	65
As	Juncus bufonius	+	.	.	.	2
B-At	Calliargon cuspidatum	.	2-3	.	.	688
B-At	Amblystegium riparium	.	.	1	.	125
B-At	Climacium dendroides	.	1	.	.	125
B-At	Philonotis caespitosa	.	1	.	.	125
B-At	Physcomitrium pyriforme	+	.	.	.	2

Heleocharis acicularis nie giną, lecz pozostają żywe i pędzą podwodny tryb życia, wchodząc w skład roślinności podwodnej.

Zbiorowisko *Rumex maritimus*-*Alopecurus geniculatus*

W zależności od aktualnie panującego gatunku zbiorowisko *Rumex maritimus*-*Alopecurus geniculatus* (tab. 33) ma różną fizjonomię (ryc. 31). Największą stałość wykazują tu: *Rumex maritimus*, *Alopecurus geniculatus*, *Rorippa silvestris* i *Alisma plantago-aquatica*. Liczba gatunków w zdjęciu wynosi 7—15. Zwarcie roślinności osiąga 100%.

Panują byliny kłączowe przy znacznym udziale roślin rocznych lub dwuletnich (patrz spektrum morfologiczno-biologiczne).

Atr 71.5

As 21.5

B-At 7.0

Z fitosocjologicznego punktu widzenia zbiorowisko to nie wykazuje wyraźnie sprecyzowanej przynależności systematycznej. Jego strukturę socjalną przedstawia niżej zamieszczona tabelka:

n=4

Grupa gatunków Artengruppe	z	Σg	G	S	D
<i>Bidentetalia</i> , <i>Bidentetea</i>	3	7	15.5	58.2	9.0
<i>Plantaginetalia</i> , <i>Plantaginetea</i>	3	9	20.0	75.0	15.0
<i>Phragmitetalia</i> , <i>Phragmitetea</i>	7	12	26.5	42.8	11.3
Towarzyszące — Begleiter	14	17	38.0	30.3	11.5
	27	t=45	100.0		

Jest to zbiorowisko pionierskie, rozwijające się dość często na dnie osuszonych stawów. W przypadku ponownego zalewu prawdopodobnie pozostają przy życiu tylko gatunki szuwarowe, które z czasem kształtują odpowiednie zbiorowisko.

Zbiorowisko z *Polygonum persicaria*

W skład tego zbiorowiska (tab. 34) wchodzi różne gatunki i dlatego fizjonomia jego, w zależności od gatunku aktualnie panującego, bywa różna (ryc. 32). Największą stałość wykazują: *Polygonum persicaria*, *Bidens tripartitus*, *Rorippa silvestris*, *Alopecurus geniculatus*, *Alisma plantago-aquatica*, *Oenanthe aquatica*, *Lythrum salicaria* i *Cyperus fuscus*. Zbiorowisko jest dwuwarstwowe. Prawie zawsze występuje warstwa mszysta, niekiedy zupełnie dobrze rozwinięta. Miejscami podłoże pokrywają naziemne glony (*Cyanophyceae*).

Forma morf.- biol. Morph. -biol. Form	Nr zdjęcia - Nr.d.Aufnahme Miejscowość - Ort Data - Datum	462	493	466	465	463	464	321	131	494	427	461	Sta- łość	Współ- czyn- nik pokry- cia
		Wp	Dr	Wg	Wg	Wg	Wg	JN	Sz	Dr	Gr	Wa		
	Głębokość wody cm - Wassertiefe cm	3.8.	9.8.	3.8.	3.8.	3.8.	3.8.	1.7	16.8.	9.8.	21.7.	29.7.		
	pH	1966	1966	1966	1966	1966	1966	1966	1965	1966	1966	1966		
	Pokrycie przez roślinność %	-30	-40	-10	-50	-50	-30	-20	-40	-10	-30	-30		
	Veg.-Bedeckung %	7	7	7	7	7	8	6,5	7	7	7	6,5		
	warstwa nadwodna - Luftschicht	100	100	100	100	100	100	100	25	100	100	100		
	warstwa na-1 podwodna -Wasserschicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Powierzchnia zdjęcia m ²	100	25	25	25	25	25	100	8	25	100	25		
	Aufnahme fläche m ²													
	Liczba gatunków - Artenzahl	18	19	19	10	9	18	15	11	13	20	7		
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Bidention, Bidentetalia tripartiti:														
As	Polygonum persicaria	1-2	2	3	3	+	+	+	+	+	3-4	4	▼	2427
As	Bidens tripartita	2	2	1-2	1	1	2	+	+1	+	+	+	IV	697
Atr	Malachium aquaticum	1	1	1-2	1-2	2	+	+	+	+	+	+	II	415
As	Rumex maritimus	+	+	+1	+	+	+1	+	+	+	+	+	II	49
As	Polygonum hydropiper	+	2	+	+	+	+	1-2	+	1	+	+	II	309
As	Polygonum mite	+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	23
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Agropyro-Rumicion crispi, Plantaginietalia maioris, Plantaginietea maioris:														
Atr	Rorippa silvestris	1	2	+	+	+	+	3	+	3	+1	2	IV	1071
Atr	Alopecurus geniculatus	2	2	2	3	+	+	4	+	1-2	1-2	+	IV	1436
Atr	Plantago maior	3	3	+	4	3	+	1	+	+	+	+	IIII	1637
Atr	Agrostis stolonifera	+	+	+	+	+	+	2	+	+	+	+	I	500
Atr	Leontodon autumnalis	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	24
Atr	Potentilla anserina	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	45
Atr	Lysimachia nummularia	+	+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	23
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Phragmitetalia, Phragmitetetea:														
Atr	Alisma plantago-aquatica	+	+	+	+	+	+	+	+	2	3	+	IIII	503
As	Oenanthe aquatica	+	+	2-3	2	+	1-2	+	+	+	+	+	III	515
Atr	Veronica anagallis	+	+	1-2	+	+	3	+	+	+	2	+	II	545
Atr	Rorippa amphibia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II	33
Atr	Loersia oryzoides	+	+	+	+	+	+	+	+	3-4	1	+	I	500
Atr	Schoenoplectus lacustris	2-3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	250
Atr	Equisetum limosum	+	+	+	+	+	+	+	+	2-3	+	+	I	250
Atr	Lycopus europaeus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	I	45
Atr	Carex pseudocyperus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	I	45
Atr	Typha angustifolia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	45
Atr	Sium latifolium	+1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	23
Atr	Butomus umbellatus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	1
Atr	Lysimachia thyrsiflora	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	1
Atr	Poa palustris	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	1
Gatunki charakterystyczne Charakterarten Molinietalia, Molinio-Arrhenatheretea:														
Atr	Lythrum salicaria	1	+	3	+1	+1	2	+	+	2-3	1-2	+	IV	947
Atr	Myosotis palustris	+	+1	1	1	+	2	+	+	+	+	+	III	274
Atr	Lysimachia vulgaris	+	1	+	+	+	+	+	+	+	1	+	II	92
Atr	Epilobium hirsutum	+	+	+1	+	+	1	+	+	+	+	+	I	69
Atr	Equisetum palustre	+	+	+	+	+	+	+	2	+	+	+	I	159
Atr	Scirpus silvaticus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+1	+	I	23
B-At	Climacium dendroides	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	1
Gatunki towarzyszące - Begleiter:														
Atr	Cyperus fuscus	+	3	2-3	+	+	4	+	+1	2	+	+1	III	1383
Atr	Epilobium palustre	1	+	1	1	+	+	+	+	+	+	+	III	138
Atr	Mentha arvensis	1	+	1	+	+	+1	+	+	+	+	+	II	115
Atr	Polygonum amphibium	4-5	+	+	+	+	4	+	+	+	+	+	I	1250
Atr	Helosciacis acicularis	+	+	+	+	+	+	+1	+	+	+	+	I	364
Atr	Juncus articulatus	+	+	+	+	+	+	+	+	1	2	+	I	204
As	Gnaphalium uliginosum	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	46
As	Polygonum tomentosum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	568
As	Juncus bufonius	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	341
Atr/As	Juncus bulbosus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	104
Atr	Ranunculus flammula	1	+	+	+	+	+	+	1-2	+	+	+	I	45
Atr	Mentha aquatica	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	45
As	Centaurium umbellatum	+	+1	+	+	+	+	+	+	1	+	+	I	23
As	Matricaria discoidea	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	1
K	Salix cinerea /20 cm/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	1
Atr	Batrachium trichophyllum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I	1
B-At	Riccia crystallina	+	2	1	+	+	+	+1	+	+	+	4	II	796
B-At	Pleuridium alternifolium	2-3	+	+	+	+	2	+1	+	+	+	+	II	433
B-At	Drepanocladus aduncus	+	+	+	1	+	+	+	2	+	+	+	I	204
B-At	Physcomitrium eurystomum	+	+	+	+	2	1	+	+	+	+	+	I	204
B-At	Funaria hygrometrica	+	+	+	+	2	+	+	+	+	+	+	I	160
B-At	Bryum argenteum	+	1	+	+	+	+	+	+	+	1	+	I	90
B-At	Physcomitrium pyriforme	+	+	+	+	+	+	4	+	+	+	+	I	568
B-At	Mniobryum albicans	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3-4	+	I	454
B-At	Bryum caespiticium	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	I	45
G	Cyanophyceae /nazienne -terrestrische/	4	2	+	+	+	+	+	+	2-3	+	+	II	977

Ryc. 32. Zbiorowisko z *Polygonum persicaria* (Grzegorzewice)
Pflanzengesellschaft mit *Polygonum persicaria* (Grzegorzewice)

Pod względem florystycznym zbiorowisko jest dość bogate; w zdjęciu występuje 7—20 gatunków. Pokrycie podłoża przez roślinność wynosi prawie zawsze 100%.

Dominują byliny kłaczowe przy dużym udziale roślin rocznych (dwuletnich) i mszaków lądowych, co ilustruje niżej zamieszczone spektrum morfologiczno-biologiczne:

Atr	50.0	B-At	14.0
Atp	7.0	K	< 1.0
As	24.0	G	5.0

Strukturę socjalną omawianego zbiorowiska ilustruje podana niżej tabelka:

n=11

Grupa gatunków Artengruppe	z	Σg	G	S	D
<i>Bidentetalia</i> , <i>Bidentetea</i>	6	31	20.0	44.0	8.8
<i>Plantaginetalia</i> , <i>Plantaginetea</i>	7	27	17.0	35.0	5.9
<i>Phragmitetalia</i> , <i>Phragmitetea</i>	14	28	17.5	18.0	3.2
<i>Molinietalia</i> , <i>Molinio-Arrhenatheretea</i>	7	20	12.5	26.0	3.2
Towarzyszace — Begleiter	26	52	33.0	18.0	5.9
	60	t=158	100.0		

Z danych tych wynika, że zbiorowisko wykazuje najczęściej powinowactwa do rzędu *Bidentetalia*. Jednak, biorąc pod uwagę współczynnik pokrycia, grupą dominującą jest *Plantaginetalia*.

Zbiorowisko jest dość często na dnie osuszonych stawów, gdzie pokrywa niekiedy znaczne przestrzenie. Ma ono charakter wybitnie pionierski i przy zmianie warunków (ponowne zalanie) ulega likwidacji.

ZARASTANIE PRZESTRZENI WODNEJ STAWÓW

Zarastanie przestrzeni wodnej stawów rybnych może odbywać się postępowo, od brzegów (lub innych ośrodków ekspansji) lub równocześnie na znacznej powierzchni zbiorowiska (por. Podbielkowski 1960, 1967). Zarastanie postępowe przebiega prawie wyłącznie oddolnie; biorą w nim udział byliny kłaczowe, penetrujące dno swymi organami podziemnymi, jak: *Typha angustifolia*, *Phragmites communis*, *Sparganium ramosum*, *Schoenoplectus lacustris* i inne. Zarastanie równoczesne może odbywać się trojako: 1) odgórnie, gdy biorące w nim udział rośliny pływają po powierzchni wody, jak np.: *Spirodela polyrrhiza*, *Lemna minor*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Stratiotes aloides*; 2) pośrednio, gdy zaangażowane w nim rośliny zanurzone są pod wodą, wykazując pewne oscylacje pionowe, jak: *Lemna trisulca*, *Riccia fluitans*, *Ceratophyllum demersum*, *Elodea canadensis*, glony; 3) oddolnie, gdy rośliny przyczepione są do dna, jak np.: różne gatunki *Potamogeton*, *Polygonum amphibium*, *Myriophyllum verticillatum*, *Chara*, *Sagittaria sagittifolia*. Do tego ostatniego typu zaliczyć można również zarastanie przez łany bylin szuwarowych. Zarastanie to jednak jest pewną kombinacją zarastania postępowego z równoczesnym.

Przebieg procesu zarastania stawu nie jest jednakowy w obrębie całej jego przestrzeni wodnej; inaczej odbywa się on w strefie przybrzeżnej, a inaczej w centralnej, właściwej partii przestrzeni wodnej.

Właściwa przestrzeń wodna stawu zaczyna się od podnóża skarpy ogroblowania. Dla zasiedlających ją roślin wodnych i bagiennych stanowi bardzo dobre siedlisko. Składa się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim dużą rolę odgrywa tu żyzność wód, które w normalnie funkcjonujących gospodarstwach rybnych są zwykle dodatkowo nawożone. Drugą istotną przyczyną intensywnego rozwoju roślinności jest niewielka i jednakowa na całym obszarze stawu głębokość wody. Ta właściwość zbiornika bardzo sprzyja rozwojowi roślin bagiennych i zakorzenionych wodnych, a one przecież odgrywają największą rolę, przynajmniej we wczesnych fazach zasiedlania.

Pierwsze fazy zasiedlania stawu kształtują się różnie i zależą od tego, czy staw przed zalaniem wodą był gruntownie wyczyszczony, czy nie. W pierwszym przypadku, jeśli zalanie nastąpiło zaraz po oczyszczeniu dna, staw jest początkowo zupełnie pozbawiony dostrzegalnej dla oka

roślinności. Woda wpływająca doń niesie jednak ze sobą różne diaspory, które w krótkim czasie po zalaniu zaczynają kiełkować. Jako pierwsze pojawiają się glony — są to przeważnie różne zielenice, okrzemki i sinice; niekiedy, przy dobrych warunkach, można nawet obserwować ich zakwity. Prawie równocześnie z glonami rozpoczynają zasiedlanie wód *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza* i *Lemna trisulca*, które jednak, spychane przez wiatr, lokują się zwykle w strefach przybrzeżnych; rzadko tworzą większe płyty w centralnych partiach zbiornika. W tym czasie można również obserwować obecność mniejszych lub większych ławic *Riccia fluitans*. Wreszcie zaczynają pojawiać się inne rośliny wodne, jak: *Myriophyllum verticillatum*, *Hydrocharis morsus-ranae* i *Salvinia natans*. Wraz z nimi tu i ówdzie zjawiają się forpoczty roślinności szuwarowej. Są to zwykle pojedyncze egzemplarze *Typha angustifolia*, *Phragmites communis*, *Glyceria aquatica*, *Sparganium ramosum* i innych gatunków, które rozwinęły się albo z wegetatywnych diaspor przyniesionych przez wodę podczas zalewu albo z pozostałych na dnie części kłaczy. Na ogół inwazja roślinności szuwarowej rozpoczyna się od brzegów. Nie jest to jednak regułą i bardzo często obserwować można mniejsze lub większe łany roślin szuwarowych rozwijające się w środkowych partiach stawu. W tym okresie mogą również rozpoczynać inwazję inne rośliny wodne, jak różne gatunki *Potamogeton* oraz *Polygonum amphibium*. Zbiorowiska, jakie w tym czasie występują, składają się głównie z roślin wodnych, niekiedy z niewielką domieszką roślin szuwarowych. Są to: zbiorowiska glonów, zespół *Lemna minor*-*Lemna trisulca*, *Wolffietum arrhizae* (str. 19, tab. 1), *Riccietum fluitantis* (str. 24, tab. 2), *Salvinieto-Spirodeletum polyrrhizae* (str. 25, tab. 3), *Potametum lucentis* (str. 27, tab. 4), *Myriophyllo-Nupharetum* (str. 29, tab. 5), *Hydrocharo-Stratiotetum* (str. 31, tab. 6), zbiorowiska ramienic (str. 34, tab. 7), *Scirpo-Phragmitetum* (częściowo, str. 37, tab. 8), *Glycerietum maximae* (częściowo, str. 43, tab. 11) i *Oenanthro-Rorippetum* (częściowo, str. 47, tab. 12).

Nieco inaczej kształtuje się roślinność w stawach, które po oczyszczeniu nie zostają zalane od razu, lecz przez dłuższy okres czasu pozbawione są wody. Na ich dnie lokują się wówczas różne pionierskie zbiorowiska roślinne, które wywierają pewien wpływ, czasem dość znaczny, na kształtowanie się roślinności po zalaniu stawu wodą. Niektóre z tych zbiorowisk, jak zbiorowisko *Polygonum nodosum* (str. 82), wchodzą w środowisko wodne bez jakichkolwiek zmian ilościowych wśród komponentów dominujących.

Wymienione wyżej zbiorowisko bardzo łatwo przystosowuje się do zmiany środowiska, lecz nie jest zbyt długotrwałe, ponieważ wkraczające tu elementy wodne i szuwarowe wypierają z czasem głównego komponenta.

Stawy nie czyszczone i ponownie zalane wodą mają, przynajmniej

Ryc. 33. Wczesne stadia zarastania; w wodzie *Polygonum amphibium* i *Potamogeton lucens*; rzadkie jednogatunkowe skupienia *Sparganium ramosum* i *Schoenoplectus lacustris* (Zabokliki)

Ein frühes Verwachstungsstadium; im Wasser *Polygonum amphibium* und *Potamogeton lucens*; eine spärliche, einartige Anhäufungen von *Sparganium ramosum* und *Schoenoplectus lacustris* (Zabokliki)

częściowo, już ukształtowaną roślinność. Pozostawione na dnie rośliny szuwarowe (i część wodnych, które zdołały przetrwać niekorzystny dla nich okres) po zalaniu wodą rozpoczynają intensywny rozwój i ekspansję. Odnowienie roślinności i rozbudowa pierwszych stadiów zarastania następuje tu o wiele szybciej niż w stawach czyszczonych, gdzie tworzenie się zbiorowisk musiało odbywać się od nowa.

Te inicjalne stadia przechodzące swój rozwój dwiema różnymi drogami łączą się w końcu w jednym, wspólnym ogniwie, które przedstawia konglomerat zaawansowanych w rozwoju zbiorowisk wodnych i rozpoczynających swą działalność zasiedleńczą zbiorowisk szuwarowych, najczęściej występujących w tym momencie w postaci facjalnej (ryc. 33). Zbiorowiska szuwarowe, jak wspomniano, nie są jeszcze w pełni rozwinięte, występują w postaci przypadkowych skupień kilkogatunkowych, a najczęściej są jednogatunkowe. Roślinność wodna natomiast zdążyła już wykształcić w pełni rozwinięte zbiorowiska.

Proces zarastania we wczesnych stadiach przebiega intensywnie

Ryc. 34. Wczesne stadia powstawania gniazd *Schoenoplectus lacustris* (Szostek)
Frühes Aufwuchsstadium der Nester von *Schoenoplectus lacustris* (Szostek)

Ryc. 35. Gniazdo *Schoenoplectus lacustris* (Zawiesiuchy)
Ein Nest von *Schoenoplectus lacustris* (Zawiesiuchy)

a produkcja masy organicznej jest duża. Głównym zadaniem roślinności w tym okresie jest wypełnienie i zasiedlenie przestrzeni wodnej. Dopiero roślinność stadiów pośrednich powoduje w całym tego słowa znaczeniu łądowanie zbiornika — spłykanie go i wypiętrzanie jego dna.

W przejściowych stadiach zarastania stawów rybnych biorą udział zbiorowiska roślinne szuwarowe i wodne. Są to wymienione już poprzednio zbiorowiska wodne oraz osiągające tu pełnię rozwoju zbiorowiska szuwarowe, jak: *Scirpo-Phragmitetum* (str. 37, tab. 8), zbiorowisko z *Acorus calamus* (str. 40, tab. 10), *Glycerietum maximae* (str. 43, tab. 11), *Oenanthro-Rorippetum* (str. 47, tab. 12), *Scirpetum maritimi* (str. 49, tab. 13), *Cicuto-Caricetum pseudocyperi* (str. 64, tab. 23), zbiorowisko z *Equisetum limosum* (str. 66, tab. 24).

We wcześniejszych stadiach pośrednich zbiorowiska szuwarowe są jeszcze słabo rozwinięte. Rośliny szuwarowe tworzą mniejsze lub większe skupienia jednogatunkowe. Postać tych skupień bywa bardzo różna, ukształtowana w zależności od aktualnych warunków. Na szczególną jednak uwagę zasługują koliste skupienia niektórych gatunków, jak np.: *Schoenoplectus lacustris* i *Phragmites communis*. Ten bardzo swoisty sposób zarastania przestrzeni wodnej określiłem jako zarastanie gniazdowe; na zjawisko to zwróciłem już kiedyś uwagę omawiając zarastanie rowów melioracyjnych przez *Glyceria fluitans* (Podbielkowski 1967). W obserwacjach nad tworzeniem się postaci gniazdowych przez *Phragmites communis* i *Schoenoplectus lacustris* nie jestem odosobniony; koliste postacie skupień tych roślin odkrył również Fedorow (1966) na niektórych jeziorach Karelii; nazwał je „krugowinami”.

Zarastanie gniazdowe polega na tworzeniu początkowo niewielkich i stosunkowo luźnych (ryc. 34), później większych i bardziej zwartych (ryc. 35), kolistych gniazd tworzonych przez *Schoenoplectus lacustris* i *Phragmites communis*. Powstają one zwykle w środkowych partiach stawu i znacznie oddalone są od innych zbiorowisk szuwarowych. Środek gniazda zwykle bywa opanowany przez najwyższe pędy opatrzone kwiatostanami. Na brzegach natomiast występują pędy bez kwiatostanów, znacznie niższe i malejące ku peryferiom. Nie udało mi się prześledzić, jak takie twory powstają. Przypuszczać można jedynie, że geneza ich może być następująca. Z kiełkującej diaspyry powstaje na dnie roślina, która tworzy kłącze. Kłącze to rozrastając się, rozgałęzia się we wszystkich kierunkach i tworzy szereg pędów wychodzących ponad wodę. Powstające coraz nowe rozgałęzienia rozrastają się odśrodkowo, ponieważ tylko w tym kierunku nie znajdują kłaczy konkurencyjnych i nie napotykać na jakikolwiek opór. Kształtująca się kępa, będąca w zasadzie jednym osobnikiem, rozrasta się coraz bardziej, powiększając swą średnicę. Skoro rozwój jej osiągnie już znaczny stopień zaawansowania, w regularności jej postaci następują zaburzenia powstające wskutek lokalnych zahamowań lub przyspieszeń wzrostu kłaczy. Zetknięcie się

Ryc. 36. Wczesne stadium tworzenia się gniazd *Carex gracilis* (Żabokliki)
Ein frühzeitiges Entwicklungsstadium von *Carex gracilis*-Nestern (Żabokliki)

Ryc. 37. Uformowane gniazda *Carex gracilis* (Gorlice)
Ausgeformte Nester von *Carex gracilis* (Gorlice)

z inną kępą lub innym zbiorowiskiem roślinnym również może być przyczyną powstania takich deformacji.

Tworzenie się kolistych form gniazdowych obserwowałem również u wybitnie rozłogowo-kłaczowych turzyc, jak *Carex acutiformis* i *C. gracilis* (ryc. 36, 37). Mechanizm powstawania tych gniazd jest, jak się zdaje, zupełnie taki sam, jak w przypadku *Phragmites communis* i *Schoenoplectus lacustris*. Tu jednak udało mi się zaobserwować dalsze stadia rozwojowe gniazd. Początkowo gniazda te są niewielkie (ryc. 38), składają się z kilkunastu do kilkudziesięciu pędów, z czasem jednak bardzo znacznie powiększają swą średnicę i stają się bardziej zwarte. Wskutek odkładania się substancji organicznej między pędami i wokół gniazda następuje znaczne jego wyniesienie ponad powierzchnię dna. Tworzy się wówczas rodzaj dość zwartej i dużej kępy przypominającej kępę *Carex Hudsonii*, lecz znacznie od niej większej. Z czasem kępa taka zatracą pośrodku swą zwartą strukturę, „łysieje”, przy czym osiedlają się na jej szczycie inne gatunki roślin. Ponieważ tak rozwinięte kępy kształtują się już w późnych stadiach zarastania (tu omawiane tylko ze względu na ciągłość tematu), w zapuszczonych, od dawna nie odnawianych i nie zalewanych stawach, rozwój ich stopniowo ulega zahamowaniu. Zmienia się zbiorowisko, lecz mimo tych zmian pozostają one w nim jeszcze przez długi okres czasu.

Jak już wspomniałem, we wcześniejszych stadiach pośrednich zbiorowiska szuwarowe są jeszcze słabo rozwinięte. Zwykle występują one w postaci mniejszych lub większych skupień jednogatunkowych tworząc dość luźną mozaikę. Wśród nich i między nimi rozwija się już bardzo dobrze ukształtowana roślinność wodna. Są tu już w zasadzie reprezentowane wszystkie występujące w stawach zbiorowiska wodne.

Rozwój roślinności szuwarowej postępuje bardzo szybko dalej. Przybiera wiele nowych gatunków, zaczynają kształtować się poszczególne zespoły, jednogatunkowe skupienia łączą się ze sobą i przenikają się wzajemnie. Przestrzeń wodna ulega coraz intensywniejszemu zarastaniu. Roślinność wodna, z wyjątkiem stosunkowo nielicznych, większych obszarów nie zajętych przez szuvary, zostaje stłoczona na niewielkich przestrzeniach lub przemieszana z roślinnością szuwarową (ryc. 39). To stadium zarastania jest okresem najbujniejszego rozwoju roślinności szuwarowej, którą reprezentują w zasadzie wszystkie występujące w stawach zbiorowiska bagienne.

Taki bardzo zaawansowany proces zarastania występuje jednak tylko w stawach gospodarczo zaniedbanych; w stawach pielęgnowanych stale nie dopuszcza się na ogół do takiego zarośnięcia, które by przekroczyło wcześniejsze stadia pośrednie. Zaniedbanych stawów nie zalewa się również, co w zasadniczy sposób wpływa na zwiększenie szybkości wypływanego i intensywność zarastania. Lustro wody zmniejsza szybko swą powierzchnię, zostaje rozczłonkowane, podzielone na mniejsze lub więk-

Ryc. 38. A-F — kolejne stadia rozwoju gniazda *Carex gracilis*
 A-F — sukzessive Entwicklungsstadien von *Carex gracilis*-Nest

Ryc. 39. *Salvinia natans* między roślinami szuwarowymi (Lesznawola)
Salvinia natans zwischen Sumpfpflanzen (Lesznawola)

Ryc. 40. Zbiorowisko szuwarowo-łakowe z kępami *Salix cinerea* (Żabokliki)
Röhricht-Wiesengesellschaft mit Buschgruppen von *Salix cinerea* (Żabokliki)

sze fragmenty, które z kolei zmniejszają się tak, że ostatecznie roślinność pokrywa staw dość zwartymi łanami. W konsekwencji tego procesu lustro wody występuje jeszcze miejscami między pokrywą roślinną oraz tam, gdzie przekopane są rowy osuszające.

W tym okresie następują zasadnicze zmiany w składzie florystycznym roślinności. Pojawiają się mianowicie duże turzycy — *Carex acutiformis*, *C. gracilis* oraz — niekiedy — *C. riparia*, których udział w zbiorowiskach szuwarowych staje się coraz większy. Poza dobrze rozwiniętymi zbiorowiskami dużych bylin szuwarowych formują się teraz zbiorowiska turzycowe, jak np.: *Caricetum gracilis* (str. 56, tab. 17), *Caricetum acutiformis* (str. 57, tab. 20), *Caricetum ripariae* (str. 59, tab. 21). Między gniazdami (kępami) turzyc tu i ówdzie widać jeszcze odkryte lustro wody z roślinnością wodną, tym niemniej jednak na miejscach bardziej spłyconych, tylko okresowo zatapianych, rozpoczyna się już inwazja roślin łąkowych. Powstałe w ten sposób zbiorowiska szuwarowo-łakowe (str. 69, tab. 25) zajmują niekiedy bardzo duże przestrzenie, występują pospolicie i są reprezentatywne dla tego stadium zarastania.

Z chwilą ostatecznej likwidacji lustra wody kończy się etap przejściowych stadiów zarastania a rozpoczynają się stadia końcowe. Okres ten

Ryc. 41. Wąski przybrzeżny pas roślin szuwarowych złożony z *Typha angustifolia*, *Schoenoplectus lacustris*, *Rumex hydrolapathum*, *Sparganium ramosum* i *Phragmites communis* (Broszków)

Ein schmaler Uferstreifen von Sumpfpflanzen zusammengesetzt aus: *Typha angustifolia*, *Schoenoplectus lacustris*, *Rumex hydrolapathum*, *Sparganium ramosum* und *Phragmites communis* (Broszków)

trwa dość długo, a zmiany zachodzące wśród roślinności odbywają się powoli. Dzieje się tak dlatego, ponieważ przez długi czas zachodzą jeszcze okresowe zmiany w stosunkach hydrologicznych, które z jednej strony nie pozwalają na zupełne wygaśnięcie pewnych zbiorowisk, głównie wodnych, a z drugiej — utrudniają instalowanie się innych zbiorowisk, którym takie warunki nie odpowiadają.

Okres ten wyraża się również pojawieniem się krzewów i drzew (ryc. 40). Są to przede wszystkim *Salix cinerea*, *S. pentandra*, *Betula pubescens* i *Alnus glutinosa*. Przyczyniają się one wybitnie do intensyfikacji procesu łądowacenia i w zasadniczy sposób zmieniają strukturę zbiorowisk.

W dalszym rozwoju roślinności następuje teraz pewien zwrot warunkowany ingerencją człowieka. W przypadku gdy tak ukształtowane zbiorowisko zaczyna być koszone, powoli zmienia się w zbiorowisko łąkowe z rosnącymi tu i ówdzie krzewami. Gdy natomiast zostanie pozostawione samo sobie, wówczas zakrzewienie staje się coraz większe

Ryc. 42. Wąski przybrzeżny pas roślin szuwarowych złożony ze *Sparganium ramosum*, *Rumex hydrolapathum*, *Lycopus europaeus*, *Alisma plantago-aquatica* i *Rorippa amphibia* (Chlewnia)

Ein schmaler Uferstreifen von Sumpfpflanzen zusammengesetzt aus: *Sparganium ramosum*, *Rumex hydrolapathum*, *Lycopus europaeus*, *Alisma plantago-aquatica* und *Rorippa amphibia* (Chlewnia)

i wreszcie — poprzez *Salici-Franguletum* (str. 74, tab. 27) — przekształca się w zbiorowisko drzewiaste z olszą, które przynajmniej miejscami, tam gdzie nie zostanie zniszczone przez bydło, przybiera postać *Carici elongatae-Alnetum* (str. 78, tab. 29).

Zarastanie strefy przybrzeżnej, mimo swej wielkiej intensywności, nie ma w stawach rybnych tak wielkiego znaczenia, jak w mniejszych zbiornikach wodnych. Rozpoczyna się ono bardzo wcześnie, natychmiast po usypaniu grobli. W wąskim pasie przybrzeżnym, na skarpie grobli, w granicach pionowej oscylacji wód poczynają osiedlać się pojedyncze rośliny szuwarowe, których liczba stale powiększa się, wskutek czego następuje porośnięcie również niżej położonych, trwale zatopionych partii skarpy. Ten wąski pas roślinności ma dla skarpy bardzo pozytywne znaczenie, ponieważ umacnia groblę i nie dopuszcza do rozmycia jej podczas dużego falowania. Budują go różne gatunki (ryc. 41, 42), najczęściej: *Phragmites communis*, *Glyceria aquatica*, *Sparganium ramosum*, *Typha angustifolia*, *Rumex hydrolapathum*. Tu kształtują się niewielkie, ale dość typowo rozwinięte płyty różnych zespołów bagiennych.

Ryc. 43. Obszar rowu osuszającego nie zarośnięty przez roślinność szuwarową (Cisie)

Durch Sumpfpflanzen nicht bewachsene Fläche eines Entwässerungsgrabens (Cisie)

Ten wąski pas roślinności szuwarowej stanowi również zacisne miejsce, gdzie bytują spędzane wiatrem zbiorowiska drobnych roślin pływających. Stanowi on także, i to jest w procesie zarastania najważniejsze, ośrodek ekspansji roślin szuwarowych na otwartą przestrzeń wodną stawu. Tu następuje wytwarzanie diaspor roznoszonych przez wodę i wiatr po całym stawie, stąd wnikają w przestrzeń wodną liczne kłaczka i rozłogi zdobywające i zasiedlające coraz dalej od brzegu położone tereny. W miarę rozwoju roślinności i wzmagania się jej ekspansji pas przybrzeżny staje się coraz szerszy. Penetrujące dno kłaczka i rozłogi tworzą coraz większą ilość pędów. To wkraczanie roślin od brzegów w przestrzeń wodną odbywa się dość szybko, tak że po kilku latach braku pielęgnacji stawu forpocztą roślinności przybrzeżnej sięgają dość daleko ku środkowi stawu. Są to początkowo luźne jednogatunkowe skupienia, które stopniowo ulegają zagęszczeniu, tworząc z czasem zwarte, lite łany. Bywa i tak, że skupienia różnych gatunków łączą się ze sobą i przenikają się wzajemnie, wskutek czego powstaje zbiorowisko kilkogatunkowe. Jego skład florystyczny zostaje wzbogacony wskutek przybywania i instalowania się innych roślin, którym to siedlisko odpowiada. Dalszy rozwój roślinności przebiega podobnie, jak w przypadkach zara-

stania centralnych partii stawu i nie ma potrzeby powtórnie go omawiać.

Pewne zaburzenia w procesie zarastania odbrzegowego mogą powstawać wówczas, gdy w pobliżu brzegu, równoległe do niego, przebiega na dnie stawu rów osuszający. Wówczas roślinność szuwarowa dochodzi tylko do tego wykopu, nie przekraczając go. Nawet w przypadkach bardzo zaawansowanego procesu zarastania obszar rowów osuszających przez długi okres czasu wyróżnia się obecnością lustra wody (ryc. 43).

Ryc. 44. A-C — kolejne stadia powstawania stref

a — zbiorowisko inicjalne; *b* — zbiorowisko wykształcone po zbiorowisku *a*; *c* — zbiorowisko wykształcone po zbiorowisku *b*; strzałka wskazuje ukierunkowanie zmian

A-C — sukzessive Entwicklungsstadien von Zonen

a — Initialgesellschaft; *b* — nach der Pflanzengesellschaft *a* entwickelte Gesellschaft; *c* — nach der Pflanzengesellschaft *b* — entwickelte Gesellschaft; der Pfeil weist auf die Umgestaltungsrichtung hin

Aż do ostatnich stadiów zarastania roślinność takich rowów osuszających różni się wyraźnie od roślinności reszty stawu, ponieważ w nich najdłużej utrzymuje się woda.

Mimo niewielkiej szerokości pas przybrzeżny wykazuje niekiedy wyraźną strefowość uwarunkowaną zmianą głębokości wody w miarę oddalania się od brzegów. Najbliżej brzegu, w miejscach najbardziej spłyconych, lokują się zwykle turzycy, *Mentha aquatica*, *Lycopus europaeus*, *Agrostis stolonifera*. Dalej ciągną się zbiorowiska szuwarowe najczęściej wykształcone fragmentarycznie. Strefę najdalej odsuniętą od brzegów, o najgłębszej wodzie zasiedla zwykle *Sparganium ramosum* lub *Schoenoplectus lacustris*, niekiedy w towarzystwie *Sagittaria sagittifolia*.

Mniej lub lepiej wyrażoną strefowość w poziomym układzie roślinności daje się zauważyć w każdym typie zarastania postępowego. Strefowość ta może być powodowana:

1) pochyłym ułożeniem dna, wskutek czego im bliżej brzegu, tym

warstwa wody nad nim jest mniejsza, co jest przyczyną zmiany warunków siedliska; na każdej głębokości ustala się odpowiednia roślinność;

2) wiekiem i stopniem rozwoju roślinności kształtującej strefy. Inicjalne zbiorowisko (ryc. 44 A) po pewnym okresie czasu ulega przekształceniom zarówno pod wpływem zmieniających się wskutek jego działalności warunków siedliska (tu: spływanie), jak i wskutek przemian wiekowo-rozwojowych zachodzących w samym zbiorowisku. Przekształca się ono w inne zbiorowisko (ryc. 44 B, C) dostosowane do nowych warunków siedliskowo-socjalnych. Zbiorowisko inicjalne (a) nie ginie jednak, lecz zostaje przesunięte na peryferie zbiorowiska drugiego (b), które z kolei znowu po pewnym czasie przekształca się w jeszcze inne zbiorowisko (c), ulegając również przesunięciu na jego peryferie. W ten sposób powstaje kompleks strefowo ułożonych trzech zbiorowisk różnych wiekowo i rozwojowo i tworzących pewne ukierunkowane następstwo; strefowość odpowiada tu więc przemianom sukcesyjnym. Zbiorowisk tych może być oczywiście więcej, przy czym układ ich może ulegać pewnym komplikacjom pod wpływem specyficznych warunków lokalnych.

Wszystkie stadia zarastania odrzégowego, jak również w pełni wykształconą strefowość, można obserwować tylko w tych stawach, które spływają się stopniowo i które przechodzą w stykające się z nimi naturalne zbiorowiska roślinne. Stawy takie położone są w peryferycznych partiach kompleksów stawowych, a zadaniem ich jest zbieranie i magazynowanie spływającej tu wody (str. 11, ryc. 5). Warunki, jakie znajdują tu zbiorowiska roślinne biorące udział w zarastaniu, są zbliżone do naturalnych i dlatego tam, gdzie ingerencja człowieka jest minimalna, kształtuje się niekiedy charakterystyczny strefowy układ roślinności (ryc. 45, 46).

Pierwszą strefę (ryc. 45a), licząc od wody, zasiedlają rośliny wodne, najczęściej takie, które zakotwiczone są na dnie, a więc: *Nymphaea alba*, *N. candida*, *Nuphar luteum*, *Myriophyllum verticillatum*, różne gatunki *Potamogeton* oraz *Polygonum amphibium*. Między tymi roślinami spotkać można *Elodea canadensis*, *Lemna trisulca* oraz *Riccia fluitans*. Tu i ówdzie widać liście *Sagittaria sagittifolia*.

Następną strefę (ryc. 45b) stanowią dość luźno rozlokowane rośliny szuwarowe. Mogą to być luźne skupienia jednogatunkowe *Glyceria aquatica*, *Schoenoplectus lacustris*, *Sparganium ramosum*, *Phragmites communis* oraz *Typha angustifolia*. Między nimi w dalszym ciągu występują wspomniane wyżej rośliny wodne.

Kolejną strefę (ryc. 45c) okupują już dość zwarte jedno- lub wielogatunkowe zarośla szuwarowe. Wśród nich występują rośliny wodne, lecz są one zwykle rozlokowane na niewielkich, wolnych od szuwarów przestrzeniach. Niektóre gatunki wodne, jak np. *Nymphaea alba*, *N. candida*, *Nuphar luteum* i pewne rdestnice zmniejszają swój udział na ko-

Ryc. 45. Schematyczny obraz układu stref roślinnych w zarastającym stawie
 a — strefa roślin wodnych; b — strefa roślin wodnych i szuwarowych; c — zwarte zarośla szuwarowe; d — strefa wysokich turzyc; e — łąki mszysto-turzycowe; f — zbiorowiska zaroślowe; g — las olszowy

Schematisches Bild der Pflanzenzonenanordnung im verwachsenden Teiche;
 a — Wasserpflanzenzone; b — Wasser- und Sumpfpflanzenzone; c — dichtes Röhrichtsgestrüpp;
 d — Zone der hohen Seggen; e — moosige Seggenwiesen; f — Gebüschgesellschaften;
 g — Erlenwald

Ryc. 46. Strefowy układ roślinności; na planie pierwszym zbiorowisko szuwarowo-
 łąkowe, dalej łąki zakrzewione, zbiorowiska zaroślowe i las olszowy (Broszków)
 Zonenanordnung der Vegetation; im Vordergrund Röhricht-Wiesengesellschaften,
 weiter buschige Wiesen, Gebüschgesellschaften und Erlenwald (Broszków)

rzyść *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza*, *Ricciocarpus natans*, *Stratiotes aloides* i *Hydrocharis morsus-ranae*. Nieco dalej (ryc. 45d) daje się zauważyć rozpoczynające się już spływanie dna. Objawem tego jest pojawienie się dużych turzyc, *Carex acutiformis* i *C. gracilis*. Takie zbiorowiska pokrywają niekiedy duże przestrzenie, tworząc szeroki, widoczny z daleka pas. Jest tu już dość płytko, a nawet miejscami zupełnie nie ma wody; roślinność wodna powoli ustępuje. W tej strefie zaznacza się duży udział mszaków, jak np.: *Drepanocladus aduncus*, *Calliergon cuspidatum*. Tu i ówdzie występują krzewy *Salix cinerea*.

Kolejna strefa (ryc. 45e) jest już tylko okresowo podtapiana, szczególnie na wiosnę lub jesienią. Pokrywają ją łąki mszysto-turzycowe. Głównymi elementami budującymi je są: *Carex rostrata*, *Galium palustre*, *Juncus articulatus*, *Caltha palustris*, *Poa palustris* oraz mchy z rodzajów *Drepanocladus* i *Calliergon* oraz *Climacium dendroides*. W przypadku gdy łąki te nie są koszone, co zdarza się dość rzadko, tu i ówdzie występują krzewy *Salix cinerea*.

Łąki te przechodzą wreszcie w strefę zbiorowisk zaroślowych (ryc. 45f) z kępami *Salix cinerea*, pośród których osiedlają się *Alnus glutinosa*, *Frangula alnus* i *Salix pentandra*. Między kępami znajduje się łąka mszysto-turzycowa, a nawet, gdy kępy są bardzo wyniesione, a położone między nimi dolinki przez to bardziej podtopione, mogą niekiedy rosnąć tu również niektóre rośliny szuwarowe. Tak ukształtowane zbiorowisko graniczy z ostatnią strefą (ryc. 45g), którą stanowi las olszowy.

Od wyżej opisanego schematu obejmującego pełny układ stref roślinnych istnieją różne odstępstwa. Różnice te mogą dotyczyć zarówno pierwszych (od wody) stref, jak również ostatnich.

W pierwszym przypadku różnice te mają przeważnie charakter ilościowy; zmienia się tu tylko zagęszczenie poszczególnych komponentów w zależności od strefy. W przypadku drugim różnice polegają zwykle na zmniejszaniu się liczby stref. Układ ich kończy się najczęściej na strefie zbiorowisk szuwarowo-łąkowych. Strefa ta jest stosunkowo niewiele podtopiona i stanowi właściwie granicę średniej wody. Położona za nią strefa łąk podtapiana jest już tylko okresowo. Dlatego też użytkowana jest ona w różny sposób — jako łąki kośne lub pastwiska — i stanowi wskutek tego granicę zbiorowisk naturalnych, tym bardziej, że w pobliżu znajdują się zwykle uprawy rolne.

ZARASTANIE DNA W STAWACH OSUSZONYCH

Po spuszczeniu wody ze stawu wynurza się jego dno, które pozostawione bywa w stanie nienaruszonym, albo czyści się je mniej lub więcej dokładnie aż do zupełnego usunięcia nie tylko występujących tu roślin i ich szczątków, ale również zalegającego mułu.

Ryc. 47. Osuszone i oczyszczone dno stawu; wchodzi *Agrostis stolonifera*, *Polygonum persicaria*, *Rorippa silvestris* i *Juncus articulatus* (Maścibody)

Trockengelegter und gereinigter Teichboden; Ansiedlung von: *Agrostis stolonifera*, *Polygonum persicaria*, *Rorippa silvestris* und *Juncus articulatus* (Maścibody)

Podczas dokładnego czyszczenia dna wraz z muliem usunięta zostaje ogromna większość występujących w nim diaspor. Dlatego zupełnie obnażone podłoże ma charakter dziewiczy, a pojawiające się na nim rośliny pochodzą z diaspor przyniesionych nań różnymi środkami transportu. Jeśli dno jest mokre lub dostatecznie wilgotne, zasiedlanie odbywa się względnie szybko i już w krótkim czasie po jego obnażeniu zaczynają osiedlać się pierwsze gatunki pionierów roślinnych. Przede wszystkim pojawiają się glony — głównie sinice, których naloty pokrywają niekiedy znaczne przestrzenie. Obok nich dostrzegamy szybko rozrastające się rozetki wątrobowców: *Riccia rhenana* i *R. crystallina* oraz darninki mchów: *Pleuridium alternifolium*, *Mniobryum albicans* oraz *Bryum caespititium*; w bardziej suchych miejscach spotkać można *Physcomitrium pyriforme* i *Bryum argenteum*.

Po mszakach lub równocześnie z nimi zaczynają pojawiać się rośliny kwiatowe. Przede wszystkim trafiają tu i zaczynają osiedlać się takie gatunki, które łatwo rozmnażają się wegetatywnie. Najpospoliej występującym przedstawicielem tej grupy zasiedleńców jest *Agrostis sto-*

Ryc. 48. Forma ładowa *Sagittaria sagittifolia* na osuszonym dnie stawu (Maścibody)
Landform von *Sagittaria sagittifolia* im trockengelegten Teichboden (Maścibody)

lonifera (ryc. 47). Pod koniec sezonu wegetacyjnego mogą pojawiać się również niektóre rośliny roczne (dwuletnie), jak np. różne gatunki *Polygonum* lub *Bidens*. Następny sezon, jeśli staw nie zostanie zalany, wyróżnia się zwykle eksplozywnym pojawem tych właśnie roślin rocznych (dwuletnich) oraz pewnej liczby bylin. Ponieważ zgromadzona tu woda po wiosennych roztopach i deszczach nie znajduje spływu, następuje bardzo znaczne nawilgocenie dna, co stwarza dogodne warunki dla kiełkowania diaspor roślin wodnych i bagiennych, które dostały się tu w różny sposób. Pojawienie się i rozwój roślin wodnych i bagiennych zmienia z czasem strukturę rozwiniętych tu zbiorowisk pionierskich, które w tym momencie upodobniają się do zbiorowisk rozwijających się na nie czyszczonym dnie stawów.

Znacznie intensywniej przebiega proces zarastania dna stawów, które pozostawiono w stanie nienaruszonym albo oczyszczono tylko powierzchnie, usuwając głównie tylko duże byliny kłaczowe. Podczas osuszania stawu ogromna większość znajdujących się w wodzie diaspor osiada na dnie, stwarzając potencjalne możliwości jego zasiedlenia. Oprócz tego na dnie pozostają również, o ile nie zostały usunięte, duże byliny lub przynajmniej ich części podziemne.

Z chwilą spłynięcia wód zaczyna się proces zasiedlania dna. Zanim rozwinie się on i pójdzie jedną z kilku dróg, następują zasadnicze zmiany w pozostałej na dnie, wynurzonej roślinności autochtonicznej. Część ga-

Ryc. 49. Staw po spuszczeniu wody; jaśniejsza smuga na pasie roślinności przybrzeżnej oznacza dawny poziom wody w stawie (Gałki-Chojeczno)

Ein Teich nach Abführung des Wassers: der hellere Streifen auf dem Uferpflanzengürtel weist auf den ehemaligen Wasserstand im Teiche (Gałki-Chojeczno)

tunków ginie, są to głównie rośliny wodne i błotne; pozostają tylko ich diaspory wegetatywne lub generatywne. Jedne gatunki są bardzo wrażliwe na brak środowiska wodnego i te giną bardzo szybko, jak np.: ramienice, *Elodea canadensis*, *Ceratophyllum demersum* i przedstawiciele rodzaju *Potamogeton*. Pewien wyjątek pośród tych ostatnich stanowi *Potamogeton natans*, który po spłynięciu wody tworzy formę lądową o krótkich, przyziemnych pędach i niewielkich krótkoogonkowych, na wpół zwiniętych liściach. Formy lądowe, znacznie różniące się od wodnych, tworzy również *Sagittaria sagittifolia*. Forma lądowa tej rośliny wyróżnia się bardzo zwartą budową i krótkoogonkowymi, strzałkowatymi liśćmi (ryc. 48). Wiele roślin po wynurzeniu nie zmienia jednak swej zasadniczej postaci. Stają się one tylko nieco mniejsze i niekiedy słabiej rozwinięte od form typowych, jak np.: *Typha latifolia*, *T. angustifolia*, *Schoenoplectus lacustris* i *Sparganium ramosum*. Prawie zupełnie nie zmieniają się turzyce i *Phragmites communis*.

Tak więc po spłynięciu wód nie czyszczone dno znajduje się w pewnym stadium zarastania, miejscami nawet dość zaawansowanym. Widać tu i ówdzie sterczące pojedynczo lub w skupieniach wynurzone byliny

Ryc. 50. *Riccia fluitans* f. *terrestris* na dnie osuszonego stawu (Gałki-Chojeczno)
Riccia fluitans f. *terrestris* im trockengelegten Teichboden (Gałki-Chojeczno)

szuwarowe; najlepiej prezentuje się zwarty pas roślinności przybrzeżnej (ryc. 49). Między tymi dużymi roślinami rozpościera się obnażone dno, na którym rozpoczyna się proces zasiedlania. Również i w tym przypadku pierwszymi zasiedleńcami nagich fragmentów dna są glony, głównie sinice, choć nierzadko spotkać można również groszkowate darnie *Botrydium granulatum*. Miejscami pojawiają się, początkowo małe, później coraz bardziej rozrastające się rozetki *Riccia rhenana*, *R. crystallina* i *R. fluitans* f. *terrestris* (ryc. 50). Obok nich występują często mchy, a także rośliny kwiatowe.

Obraz roślinności tego wczesnego stadium zarastania wygląda więc następująco. Na wilgotnym, a miejscami jeszcze podtopionym dnie wyrastają większe lub mniejsze płyty roślinności bagiennej, która zasiała staw jeszcze przed spuszczeniem wody. Między tymi płatami znajduje się względnie wyrównany teren, na którym występuje zbiorowisko roślinne o dość luźnej strukturze (ryc. 51). Tu i ówdzie widać zwykle pojedynczo usytuowane egzemplarze *Alisma plantago-aquatica*, *Sagittaria sagittifolia*, *Sium latifolium*. Między nimi płożą się rozłogi *Agrostis stolonifera* lub leżą długie, zakorzeniające się pędy *Rorippa amphibia*. Do podłoża przylegają ściśle niziutkie, na wszystkie strony rozgałęzione i tworzące rodzaj płaskich poduszeczek pojedyncze osobniki *Batrachium circinatum*. Naj-

Ryc. 51. Fragment pokrywy roślinnej dna osuszonego stawu; rosną tu: *Sium latifolium*, *Agrostis stolonifera*, *Rorippa amphibia* (Maścibody)

Fragment einer Pflanzendecke im entwässerten Teiche; es wachsen hier: *Sium latifolium*, *Agrostis stolonifera*, *Rorippa amphibia* (Maścibody)

niższą warstwę, bo bezpośrednio stykającą się z podłożem, stanowią wątrobowce (*Riccia rhenana*, *R. crystallina* i *R. fluitans* f. *terrestris*) oraz glony (sinice i *Botrydium granulatum*). Wymienione wyżej gatunki oczywiście nie wyczerpują całej listy florystycznej roślin lokujących się na dnie osuszonych stawów; występują tu jeszcze: *Heleocharis palustris*, *H. acicularis*, *Juncus articulatus*, *Glyceria fluitans*, *Oenanthe aquatica* oraz wiele innych.

Roślinność wczesnych stadiów zasiedleńczych może kształtować się zupełnie inaczej, gdy dominację przejmuje jeden bardzo ekspansywny gatunek. Wówczas wolną powierzchnię dna pokrywa jednogatunkowa, zwarta darni, co można obserwować w przypadkach panowania takich gatunków, jak np. *Agrostis stolonifera* (ryc. 47, 51) lub *Heleocharis acicularis* (ryc. 52). Szczególnie szybko zdobywa teren ten drugi gatunek tworzący niekiedy na dnie zalanych stawów rozległe łany. Po spuszczeniu wody przechodzi on na lądowy tryb życia, a nie napotykaąc na konkurencję innych gatunków, rozwija się szybko i w pierwszych stadiach zasiedleńczych pokrywa zwartym łanem duże powierzchnie dna.

W omówione wyżej, bardzo luźne, pionierskie zbiorowiska wkraczają często różne gatunki *Polygonum* (*P. persicaria*, *P. mite*, *P. nodosum*, *P. hydropiper*). Jest to już zasiedlanie wtórne, inicjujące późniejsze (przejściowe) stadia zarastania. W tym okresie wykształcają się już bar-

Ryc. 52. Fragment pokrywy roślinnej osuszonego dna stawu; rosną tu: *Heleocharis acicularis*, *H. palustris*, *Alisma plantago-aquatica*, *Oenanthe aquatica*, *Sagittaria sagittifolia* (Gałki-Chojeczno)

Fragment der Pflanzendecke eines trockengelegten Teichbodens; es wachsen hier: *Heleocharis acicularis*, *H. palustris*, *Alisma plantago-aquatica*, *Oenanthe aquatica*, *Sagittaria sagittifolia* (Gałki-Chojeczno)

dziej zwarte i strukturalnie złożone zbiorowiska. Reprezentatywne dla tych stadiów są: zbiorowisko z *Polygonum persicaria* (str. 88, tab. 34), zbiorowisko *Rumex maritimus*-*Alopecurus geniculatus* (str. 88, tab. 33) oraz część zbiorowisk rdestowo-szuwarowych (str. 82, tab. 30).

Na dnie stawów, które przez dłuższy okres czasu nie były zalewane, ale których podłoże jest bardzo wilgotne, rozwijają się zbiorowiska z dużym udziałem gatunków szuwarowych. Skład florystyczny takich zbiorowisk ilustrują przykładowo niżej podane dwa zdjęcia:

Zdjęcie 533 (Chlewnia, 18.8.66, głęb. wody 0—5 cm, pH 8, pokrycie przez rośliny 100%, pow. zdjęcia 100 m²): *Oenanthe aquatica* 3, *Alisma plantago-aquatica* 1—2, *Sagittaria sagittifolia* +, *Polygonum amphibium* +—1, *Juncus articulatus* 3—4, *Nasturtium silvestre* 2, *Alopecurus geniculatus* +, *Oenanthe aquatica* (siewki) 4, *Agrostis stolonifera* +, *Amblystegium riparium* 2, *Riccia crystallina* 2.

Zdjęcie 534 (Chlewnia, 13.8.66, głęb. wody 5—5 cm, pH 8, pokrycie przez rośliny 100%, pow. zdjęcia 100 m²): *Typha angustifolia* 4, *Oenanthe*

aquatica 1, *Butomus umbellatus* + -1, *Phalaris arundinacea* 1—2, *Schoenoplectus lacustris* + -1, *Alisma plantago-aquatica* 2, *Heleocharis palustris* 1, *Alopecurus geniculatus* 2—3, *Nasturtium silvestre* 2, *Plantago maior* +, *Oenanthe aquatica* (siewki) 4.

W stawach również przez dłuższy czas nie zalewanych, ale o podłożu mniej wilgotnym, kształtuje się zbiorowisko szuwarowo-ławkowe, którego ilustracją może być zdjęcie 384 w tabl. 25.

Zbiorowiska tego typu powstają w krytycznym momencie dla rozwoju roślinności stawów, bowiem w pewnym sensie stanowią one ogniwo, które łączy ze sobą w jeden ciąg dwa nurty sukcesji zarastania stawów — bieg przemian roślinności na osuszonym dnie i serię przekształceń zbiorowisk roślinnych uczestniczących w zarastaniu przestrzeni wodnej. Od tego momentu dalszy rozwój roślinności idzie jedną wspólną drogą prowadzącą poprzez zbiorowiska szuwarowo-ławkowe, ławkowe i zaroślowe, do ostatniego ogniwa, jakie obserwowałem w stawach, do lasu olszowego.

PRZEMIANY ROŚLINNOŚCI STAWÓW

Przemiany roślinności w procesie zarastania stawów rybnych są bardzo skomplikowane. Głównym powodem tego jest ciągła ingerencja człowieka, która nie dopuszcza do wykształcenia się dłuższych ciągów sukcesyjnych. Każde spuszczenie wody i czyszczenie stawu przerywa rozwój różnych zbiorowisk, a ponowne zalanie zbiornika wodą z jednej strony powoduje powstanie nowych, pionierskich zbiorowisk, z drugiej zaś — odnowienie zbiorowisk starych. W konsekwencji powstaje mieszanina zbiorowisk różnych genetycznie i rozwojowo, z których każde rozwija się w charakterystyczny dla siebie sposób. Kształtują się więc krótsze lub dłuższe ciągi sukcesyjne, przerywane lub inicjowane okresami osuszania i czyszczenia stawu, które różnymi drogami włączają się we wspólny, generalny nurt przemian roślinności. Te drobne ciągi sukcesyjne nie zawsze są przy tym jasno wyrażone i nie zawsze dają się wiernie zrekonstruować. Dlatego też sukcesji zbiorowisk roślinnych w stawach rybnych nie można zilustrować za pomocą konwencjonalnego schematu, lecz należy zastosować znaczne jego uogólnienie, które przedstawiałoby pewną ciągłość przemian zachodzących wśród roślinności. Bieg przemian roślinności stawów rybnych w bardzo ogólnych zarysach (szczegółowiej omówiony został w dwóch poprzednich rozdziałach) przedstawiałby się więc następująco (ryc. 53). Ciągi sukcesyjne roślinności układają się w dwóch seriach: wodnej i lądowej. Serię wodną inicjują oczywiście zbiorowiska wodne — początkowo prymitywne, z czasem o strukturze złożonej. Z kolei wkraczą w wodę rośliny szuwarowe, tworzące początkowo również prymitywne, jednogatunkowe skupienia, później — zbiorowiska złożone. W miarę rozwoju zbiorowisk szuwarowych udział roślinności

Ryc. 53. Schemat sukcesyjnych przemian roślinności w stawach rybnych
Schema der sukzessiven Umwandlungen der Vegetation in Fischteichen

wodnej maleje. W spływającym się zbiorniku pojawiają się z czasem wysokie turzycy. Wreszcie zupełnie spłycony zbiornik opanowują zbiorowiska szuwarowo-ławkowe. Następnym etapem przemian roślinności są łąki, które z kolei przekształcają się w zbiorowiska łąkowo-zaroślowe. Ostatnim etapem rozwoju roślinności badanych przeze mnie stawów rybnych jest las olszowy. Seria łąkowa rozpoczyna się, w zależności od stopnia oczyszczenia dna, albo od wybitnie pionierskich zbiorowisk (na dnie oczyszczonym), albo od zbiorowisk będących już na pewnym etapie rozwojowym (na dnie nie oczyszczonym). Obydwie te drogi prowadzą do wykształcenia się zbiorowisk łąkowych z pewnym udziałem roślin szuwarowych. Te z kolei przekształcają się w zbiorowiska szuwarowo-ławkowe, stanowiące wspólne ogniwo ze zbiorowiskami serii wodnej. Dalszy rozwój roślinności przebiega już jednym wspólnym torem poprzez zbiorowiska łąkowe i zaroślowe do lasu olszowego.

PODSUMOWANIE

Praca niniejsza stanowi kontynuację szeroko zakrojonego tematu o roślinności i zarastaniu zbiorników i cieków wodnych w woj. warszawskim. Dwa poprzedzające ją opracowania dotyczyły dolów potorfowych (Podbielkowski 1960) i rowów melioracyjnych (Podbielkowski 1967). Celem niniejszego opracowania było wyróżnienie zbiorowisk roślinnych w stawach rybnych oraz analiza procesu zarastania tych zbiorników. Na obszarze woj. warszawskiego stawy rybne pokrywają znaczną powierzchnię, bo około 6000 ha, stanowiąc w jego południowo-wschodniej części charakterystyczny element krajobrazu. Zarastająca je roślinność przedstawia interesujący obiekt dla badań botanicznych, tym bardziej godny uwagi, że uzyskane wyniki mogą mieć również znaczenie praktyczne. Znajomość bowiem struktury i dynamiki roślinności oraz przebiegu procesu zarastania może dać pewne wskazówki dla racjonalnej pielęgnacji stawów i w związku z tym może przyczynić się do zwiększenia ich wartości produkcyjnej.

Obserwacje nad roślinnością i zarastaniem stawów przeprowadziłem w ciągu dwóch sezonów 1965 i 1966 roku. Ogółem wykonałem ponad 550 zdjęć fitosocjologicznych, z czego do zestawień wykorzystałem około 350.

Wyróżnione zostały następujące zbiorowiska i zespoły roślinne: zbiorowiska glonów, zespół *Lemna minor*-*Lemna trisulca*, *Wolffietum arrhizae*, *Riccietyum fluitantis*, *Salvinieto-Spirodeletum polyrrhizae*, *Potametyum lucentis*, *Myriophyllo-Nupharetum*, *Hydrocharo-Stratiotetum*, zbiorowiska ramienic, *Scirpo-Phragmitetum*, zbiorowisko z *Acorus calamus*, *Glycerietum maximae*, *Oenanthro-Rorippetum*, *Scirpetum maritimi*, *Caricetum elatae*, *Caricetum paniculatae*, zbiorowisko z *Carex elongata*, *Caricetum inflato-vesicariae*, *Caricetum gracilis*, *Caricetum acutiformis*,

Caricetum ripariae, *Phalaridetum arundinaceae*, *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*, *Thelypterideto-Phragmitetum*, zbiorowisko z *Equisetum limosum*, zbiorowisko szuwarowo-łakowe, zbiorowisko z *Calamagrostis canescens*, *Salici-Franguletum*, *Carici elongatae-Alnetum*, zbiorowisko rdestowo-szuwarowe, zbiorowisko z *Agrostis stolonifera*, zbiorowisko z *Heleocharis acicularis*, zbiorowisko *Rumex maritimus-Alopecurus geniculatus*, zbiorowisko z *Polygonum persicaria*. Oprócz wyżej wymienionych zbiorowisk pospolicie występują też jednogatunkowe skupienia roślin.

Zarastanie stawów może odbywać się postępowo od brzegów lub innych ośrodków ekspansji albo równocześnie na znacznej powierzchni zbiornika. Zarastanie postępowe odbywa się w stawach w ogromnej większości przypadków oddolnie. Zarastanie równoczesne przebiega trzema sposobami: odgórnie, pośrednio i oddolnie.

Zasiedlanie przestrzeni wodnej w centralnych partiach stawu zaczyna się inaczej w stawach o dnie uprzednio dokładnie oczyszczonym, a inaczej tam, gdzie nie czyszczono dna. W pierwszym przypadku poprzez zbiorowiska glonów i prymitywne zbiorowiska wodne kształtują się zbiorowiska bardziej skomplikowane — wodne lub wodne z udziałem elementów szuwarowych. W drugim przypadku roślinność jest już przynajmniej częściowo wykształcona (głównie elementy szuwarowe) i pierwsze stadia zasiedlania przestrzeni wodnej są tu już znacznie rozwinięte. Istotnym momentem w rozwoju roślinności zarastającej stawu jest pojawienie się zbiorowisk szuwarowych. Początkowo są one zbudowane bardzo prymitywnie, z czasem struktura ich staje się coraz bardziej złożona. Następuje coraz wyraźniejsze spływanie zbiornika i wraz z nim pojawiają się zbiorowiska wysokich turzyc. Roślinność wodna coraz bardziej ustępuje i wreszcie, gdy wykształcą się zbiorowiska szuwarowo-łakowe, zupełnie ginie. Wśród tych zbiorowisk woda występuje już tylko okresowo. Następne stadium zarastania tworzą zbiorowiska łakowe, które z kolei przechodzą w zbiorowiska zaroślowe. Te ostatnie przekształcają się na koniec w las olszowy będący w badanych przeze mnie stawach ostatnim etapem rozwoju roślinności.

Zasiedlanie strefy przybrzeżnej, mimo wielkiej intensywności tego procesu, nie odgrywa zbyt wielkiej roli w zarastaniu stawów. Przy zasiedlaniu brzegów kształtuje się gorzej lub lepiej wyrażona strefowość roślinności, która w sprzyjających warunkach (w peryferycznych stawach zbiorniczych) w bardzo ogólnych zarysach odpowiada poszczególnym stadiom zarastania przestrzeni wodnej (por. str. 104).

Zupełnie inne zbiorowiska roślinne biorą udział w zasiedlaniu dna osuszonych stawów. Pierwsze stadia zasiedleńcze formują się i tu w zależności od tego, czy dno zostało oczyszczone, czy też pozostało w takim stanie, w jakim było po spuszczeniu wody. W pierwszym przypadku proces zasiedlania inicjują różne pionierskie rośliny, jak niektóre glony,

mszaki i rośliny kwiatowe. Z kolei następuje wykształcenie różnych pionierskich zbiorowisk lądowych, do których z czasem włączają się różne gatunki szuwarowe. W drugim przypadku, gdy dno nie było czyszczone, w początkowym okresie, natychmiast po spuszczeniu wody, część roślinności wskutek braku środowiska wodnego ginie, część natomiast inicjuje kształtowanie się nowych zbiorowisk. Zbiorowiska te zbudowane częściowo z roślinności autochtonicznej, częściowo zaś z nowych przybyszów, po szeregu przekształceń przybierają postać zbiorowisk z dużym udziałem roślin rocznych (dwuletnich) i gatunków szuwarowych.

Tak ukształtowane zbiorowiska przybierają z czasem formę zbiorowisk szuwarowo-łąkowych i stają się ogniwem łączącym obie serie rozwojowe roślinności stawów — wodną i lądową. Od tego ogniw przebieg przekształceń roślinności idzie już jedną, wspólną drogą. Powstają zbiorowiska łąkowe, które z kolei przeobrażają się w las olszowy — ostatni etap zarastania stawów rybnych i ostatnie ogniwo sukcesji ich roślinności.

Ciąg przemian roślinności stawów rybnych składa się z wielu drobnych fragmentów. Powodem tego jest ciągła ingerencja człowieka, który przez czyszczenie stawów przerywa lub inicjuje poszczególne stadia rozwojowe roślinności. Dlatego bardzo często występują obok siebie i zachodzą na siebie różne genetycznie i rozwojowo fragmenty zbiorowisk.

Ta fragmentacja stadialnych przemian roślinności jest również powodem, że nie można w pełni zrekonstruować sukcesji roślinności w sposób konwencjonalny, wyprowadzając jedno zbiorowisko z drugiego, lecz należy model tych przemian bardzo uogólnić, czego ilustracją jest ryc. 53.

DIE VEGETATION DER FISCHTEICHE DER WOJWODSCHAFT WARSAWA

Zusammenfassung

Das Problem der Vegetation als auch des Verwachsens der Fischteiche in Polen ist bisher noch nicht bearbeitet. In der mir bekannten Fachliteratur sind nur unwesentliche, sporadische Erwähnungen betreffs Teichvegetation anzutreffen. Dieses Problem ist jedoch von grosser Bedeutung nicht nur aus rein wissenschaftlichen sondern auch aus praktischen Gründen. Der Verwachsungsprozess wirkt sich für die Fischwirtschaft einerseits schädlich aus (Abnahme des Wasserareals, Verminderung der Nährsubstanzen des Wassers), andererseits ist die Anwesenheit von Gefässpflanzen unumgänglich zwecks Schaffung der zum Leben der Fische nötigen biozönotischen Verhältnisse. Die Kenntnis der Vegetation als auch des Verwachsungsprozesses kann etliche Hinweise rationeller Bewirtschaftung der Teiche liefern, was sich unzweifelhaft positiv auf die Fischproduktion auswirken wird.

Meine Beobachtungen bezüglich der Vegetation und der Verwachsung der Fischteiche führte ich im Gebiete der Woiwodschaft Warszawa (Mittel-Polen). Sie umfassten 90 Teichkomplexe eines Gesamtareals von ca 5000 ha, was annähernd 90% der Teiche dieses Gebietes beträgt. Ich führte diese Untersuchungen während

der Vegetationsperioden der Jahre 1965 und 1966. Von den 550 phytosoziologischen Aufnahmen nutzte ich für meine Aufstellungen ca 350 aus.

Diese Bearbeitung stellt eine Kontinuation dar und zwar des Themas: Vegetation und Verwachsung künstlicher Wasserbecken und Wasserrinnen der Woiwodschaft Warszawa. Die vorangehenden Arbeiten betrafen Torfgruben (Podbielkowski 1960) und Meliorationsgräben (Podbielkowski 1967). Der vorliegende Aufsatz stellt eine Analyse der Vegetation und des Verwachsungsprozesses der Fischteiche im oben genannten Gebiete dar.

Die Vegetation der Fischteiche umfasst Wasser-, Sumpf-, Röhrichts-, Wiesen-, Busch- und Waldgesellschaften als auch Pioniergesellschaften, welche trockengelegte Teichböden besiedeln. Ich habe nächstfolgende Pflanzengesellschaften und Assoziationen ausgesondert: Algengesellschaften, die Assoziation *Lemna minor-Lemna trisulca*, *Wolffietum arrhizae*, *Riccietyum fluitantis*, *Salvinieto-Spirodeletum polyrrhizae*, *Potametyum lucentis*, *Myriophyllo-Nupharetum*, *Hydrocharo-Stratiotetum*, Armleuchteralgengesellschaften, *Scirpo-Phragmitetum*, Pflanzengesellschaft mit *Acorus calamus*, *Glycerietum maximae*, *Oenantho-Rorippetum*, *Scirpetum maritimi*, *Caricetum elatae*, *Caricetum paniculatae*, Gesellschaft mit *Carex elongata*, *Caricetum inflato-vesicariae*, *Caricetum gracilis*, *Caricetum acutiformis*, *Caricetum ripariae*, *Phalaridetum arundinaceae*, *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*, *Thelypterideto-Phragmitetum*, Gesellschaft mit *Equisetum limosum*, Röhricht-Wiesengesellschaft, Gesellschaft mit *Calamagrostis canescens*, *Salici-Franguletum*, *Carici elongatae-Alnetum*, Knöterich-Röhrichtsgesellschaft, Gesellschaft mit *Agrostis stolonifera*, Gesellschaft mit *Heleocharis acicularis*, Gesellschaft *Rumex maritimus-Alopecurus geniculatus*, Gesellschaft mit *Polygonum persicaria*.

Der Verwachsungsprozess der Fischteichwasserflächen kann progressiv — von den Ufern — verlaufen, oder gleichzeitig — auf beträchtlichen Flächen des Beckens. Der Verlauf dieses Prozesses kann vonstatten gehen: 1) von oben, falls an ihm Wasserschwimmpflanzen teilnehmen, wie z.B.: *Spirodela polyrrhiza*, *Lemna minor*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Stratiotes aloides*; 2) von unten, wenn die Pflanzen am Boden haften, wie z.B.: *Myriophyllum verticillatum*, *Chara* sp. liv., 3) indirekt, wenn die Pflanzen im Wasser untergetaucht sind, aber gleichzeitig gewisse senkrechte Schwingungstendenzen aufweisen, wie z. B.: *Lemna trisulca*, *Riccia fluitans*, *Ceratophyllum demersum*, Algen.

Der Wasserraum der Fischteiche stellt für die hier lebenden Pflanzen äusserst vorteilhafte Siedlungsverhältnisse dar. Das Gewässer ist hier fruchtbar, was noch durch die häufige Düngung der Teiche begünstigt wird, und die Tiefe ist nicht gross als auch gleichmässig im ganzen Becken. Derartige Siedlungseigenschaften üben einen sehr vorteilhaften Einfluss auf das Gedeihen der hier wurzelnden Wasser- und Sumpfpflanzen aus, und diese spielen ja gerade die grösste Rolle im Verlandungsprozesse.

Das Verwachsen des Wasserraumes verläuft anfangs auf zwei Wegen, abhängig davon, ob der Teichboden vor dem Einguss des Wassers gründlich gereinigt wurde oder nicht. Im ersten Falle hat es anfangs den Augenschein, dass der Teich jeglicher Pflanzen entbehrt. Mit der Zeit beginnen jedoch die beim Einfluss des Wassers angeschwemmten Diasporen zu keimen, und so beginnt die Ansiedlung. Zuerst erscheinen gewöhnlich die Algen — Grünalgen, Blaualgen und Kieselalgen — und fast gleichzeitig mit ihnen — *Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza* und *Lemna trisulca*. Nach diesen beginnt die Invasion anderer Wasserpflanzen, wie z. B.: *Hydrocharis morsus-ranae*, *Salvinia natans*, *Myriophyllum verticillatum*, *Potamogeton* sp. div. Mit ihnen erscheinen Vorposten der Sumpfpflanzen — vereinzelte Exemplare oder spärliche Ansammlungen von *Typha angustifolia*, *Phragmites communis*, *Glyceria aquatica*, *Sparganium ramosum*. Mit der Zeit wachsen die Pflanzen auf, vergrössern ihr Areal und verdichten sich. Die Wasserpflanzen exi-

stieren zwar noch, sind aber auf kleinen Flächen inmitten von Röhrichtsgesellschaften zusammengedrängt.

Während der Ausbreitung der Anhäufungen gewisser ausgesprochen Rhizom- oder Ausläuferpflanzen, wie *Phragmites communis*, *Schoenoplectus lacustris*, *Carex gracilis*, *C. acutiformis* konnte ich das Aufwachsen von Horstformen beobachten. Diesen Verwachsungstypus nannte ich Nestverwachsung.

Das Verdichtungsstadium der Röhrichtsvegetation zieht eine deutliche Verseichung des Beckens nach sich. Die bisher auftretenden Gesellschaften gaben zwar ein beträchtliches Quantum organischer Masse, aber diese erlag einer schnellen Verwesung. Jetzt ist die Produktion der organischen Masse vielmals grösser und viele Pflanzenreste unterliegen schon nicht mehr einem schnellen Verwesungsprozesse. Auf den sich so verseichtenden Teichen stellen sich nun Riedgräser ein — *Carex gracilis*, *C. acutiformis* und *C. rostrata*. Der Verseichungsprozess wird immer intensiver. In der sich nun gestaltenden Röhrichten — Wiesengesellschaft tritt das Wasser nur noch stellenweise, oder auch nur periodisch, auf. Die Wasserpflanzen verschwinden und immer zahlreicher kommen typische Festlandarten auf. Die Röhrichten-Wiesengesellschaft geht allmählich in Wiesen über. Gleichzeitig setzt sich nach und nach, stufenweise, eine Verbüschung ein. Sie tritt in Form von nur einzeln auftretenden Büschen von *Salix cinerea* und *S. pentandra* auf; hier und dort kommen auch niedrige Erlen und Birken auf. Derartig bebüschelte Wiesen gehen in die Buschgesellschaft (*Salici-Franguletum*) über, und diese dann — in einen Erlenwald, welcher auf dem von mir untersuchten Gebiete das Endstadium der Fischteichverwachsung darstellt.

Das Verwachsen des Wasserraumes in Teichen, deren Bodengrund nicht einer Austrocknung unterlag, beginnen schon ziemlich gut ausgebildete Gesellschaften (Sumpfgesellschaften und einige Wassergesellschaften). Der Verwachsungsprozess eines derartigen Teiches ist also, im Moment der Aufwässerung, in einem oft schon ziemlich fortgeschrittenem Stadium. Dieses zwar initiale, aber in seiner Entwicklung schon ziemlich fortgeschrittene Stadium bilden verschiedenartig ausgeformte Sumpfgesellschaften, als auch ihre äusserst intensive Entwicklung einsetzende Wasserpflanzengesellschaften. In kurzer Zeit gestalten sich Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften aus, deren Entwicklung, wie schon oben beschrieben, verläuft.

Das von den Ufern verlaufende sukzessive Verwachsen spielt in den Teichen eine geringere Rolle als die Verwachsung der zentralen Partien. Infolge der Aktivität der daran teilnehmenden Pflanzengesellschaften — es sind hauptsächlich Sumpfgesellschaften — entsteht ein ziemlich schmaler Uferpflanzenstreifen, welcher mit der Zeit — bei fortschreitender Seichtheit der Uferpartien der Teiche — sich ausbreitet. Dieser Uferpflanzenstreifen weist manchmal eine deutliche, durch den Tiefenunterschied bedingte Zonenanordnung auf. Diese Gürtelung ist äusserst deutlich ausgeprägt an Ufern der peripherischen Sammelteiche, die an natürliche Pflanzengesellschaften grenzen. Man kann hier nächstfolgende Zonen beobachten: Wasserpflanzen-, Wasserpflanzen-Röhrichtsgesellschaften, Röhrichte, Röhrichten-, Wiesengesellschaften, Wiesen-, Busch- und Waldgesellschaften.

Eine derartige Zonenanordnung kann verursacht werden:

1) durch die Teichbodenneigung, welche sie derart auswirkt, dass die Wasserschicht umso seichter ist, je näher dem Ufer, was eine Siedlungsänderung nach sich zieht; demgemäss siedeln sich in jeden Tiefen die ihnen entsprechenden Pflanzen an;

2) durch das Alter und den Entwicklungsgrad der die entsprechenden Zonen gestaltenden Vegetation. Die Initialgesellschaft (Fig. 44 A) unterliegt nach einer gewissen Zeitspanne einer Umgestaltung, einerseits unter dem Einflusse der durch die Einwirkungen dieser Gesellschaft entstandenen Änderungen der Siedlungs-

verhältnisse (hier Verseichung), anderseits infolge von Alters- und Entwicklungs-umwandlungen innerhalb dieser Pflanzengesellschaft. Sie unterliegt nun einer weiteren Umgestaltung in eine andere Gesellschaft (Fig. 44 B, C), welche den neuen Siedlungs- und Sozialverhältnissen entspricht. Die Initialgesellschaft (a) verschwindet jedoch nicht, sondern unterliegt einer Verschiebung an die Peripherie der zweiten Gesellschaft (b), welche dann wieder nach einer gewissen Zeit sich noch in eine andere Gesellschaft umstaltet (c) und wiederum einer Verschiebung an die Peripherie unterliegt. Auf diese Weise entsteht ein Komplex der drei zonenartig geordneten Gesellschaften, welche verschiedenes Alter und verschiedene Entwicklungsstadien aufweisen und eine regelrecht gerichtete Nachfolge darstellen. Diese Zonenanordnung entspricht hier also Sukzessionsumgestaltungen. Es können natürlich zahlenmässig mehr Gesellschaften auftreten, wobei ihre Anordnung infolge spezifischer lokaler Verhältnisse gewissen Komplikationen unterliegen kann.

Die Verwachsung trockengelegter Teiche verläuft anfangs ebenfalls auf zwei Wegen, abhängig davon, ob der Teichboden gründlich gereinigt wurde, oder ob der Boden nach der Trockenlegung unberührt blieb. Im ersten Falle setzt eine ganz neue Besiedlung des Teichbodens ein. Zu allererst erscheinen hier Pionierpflanzen — Algen (hauptsächlich Blaualgen, sowie *Botrydium granulatum*), gewisse Lebermoose (*Riccia rhenana*, *R. crystallina*), Laubmoose (*Pleurozium alternifolium*, *Mniobrium albicans*, *Bryum caespititium*, *B. argenteum*, *Physcomitrium pyriforme*), als auch Blütenpflanzen (*Agrostis stolonifera*, *Polygonum* sp. div., *Bidens cernuus*, *B. tripartitus*, *Rumex maritimus*). Die so entstandene Gesellschaft verdichtet sich nun immer mehr. Der Teichboden wird nach Regenfällen, infolge des Fehlens jeglichen Abflusses, durchfeuchtet, wodurch günstige Keimungsbedingungen für die hier transportierten Diasporen der Sumpfpflanzen geschaffen werden. Auf diese Weise entwickeln sich mit der Zeit verschiedene Gesellschaften, welche sich aus Pionierarten mit Beimischung von Sumpfpflanzen zusammensetzen. Diese Gesellschaften unterliegen nun, infolge einer Elimination der Pionierarten und einer Zuwanderung der Wiesenarten, einer Metamorphose und gestalten sich in Röhrrichten-Wiesengesellschaften um. Diese gehen nun — auf dem uns schon bekannten Wege der Umgestaltungen — durch Wiesen- und Buschgesellschaften, in einen Erlenwald über.

Bedeutend schneller verläuft der Verwachsungsprozess der trockengelegten Teiche, deren Böden unberührt blieben, oder nur oberflächlich gereinigt worden sind. Solcher Teichboden ist schon teilweise durch Pflanzen besiedelt, welche hier aus den alten Gesellschaften verblieben — hauptsächlich Rhizomsumpfstauden als auch gewisse Wasserstauden, welche Landformen entwickeln können, wie z. B. *Potamogeton natans*, *Riccia fluitans*. Das Ansiedlungspotenzial wird noch durch eine Anzahl von Diasporen vergrößert, die nach dem Abfluss des Wassers sich auf dem Teichboden niedergelassen haben. Ein derartig ungereinigter Boden befindet sich also, nach der Ableitung des Wassers, in einem schon ziemlich fortgeschrittenen Verwachsungsstadium. Die Vegetation dieses Stadiums, gewöhnlich repräsentiert durch Röhrrichtsgesellschaften, unterliegt einer allmählichen Umgestaltung in Röhrrichten-Wiesengesellschaften und diese gehen wiederum, auf dem schon oben beschriebenen Wege — weiteren Umgestaltungen entgegen.

Die Umwandlungen der Vegetation im Verwachsungsprozesse der Fischteiche werden noch durch die ständige Ingerenz des Menschen kompliziert. Jede Trockenlegung und Reinigung des Teiches unterbricht eine Sukzessionszüge und regt andere an. Es entstehen also zahlreiche, kleine, oft nicht klar ausgeprägte Sukzessionszüge, und die Konsequenz davon ist, dass sich die Vegetation dieser Teiche — sowie in genetischer, als auch entwicklungsmässiger Hinsicht — aus verschiedenartigen Elementen zusammensetzt. Ein derartiger Tatbestand ermöglicht nicht

eine ausführliche Rekonstruktion der Umgestaltungen der Teichvegetation sondern nur eine äusserst allgemeine Darstellung, wie es Fig. 53 — wiedergibt.

Die in den phytosoziologischen Tabellen und morphologisch-biologischen Spektren angegebenen Abkürzungen haben folgende Bedeutungen: As — ein- oder zweijährige Pflanzen; Atp — Horststauden; Atr — Stauden mit Rhizomen und Ausläufern; B-At — Moose; D — systematischer Gruppenwert; G — Gruppenanteil; G — Algen; Ho — Wasserpflanzen oder solche Landpflanzen, deren Assimilationsorgane auf der Wasseroberfläche schwimmen; hier gehört auch ein Teil von Moosen — B-Ho; Hon — frei schwimmende Pflanzen, deren Assimilationsorgane auf der Wasseroberfläche schwimmen; Hoz — am Grunde befestigte Pflanzen, deren Assimilationsorgane auf der Wasseroberfläche schwimmen; Hu — Pflanzen mit untergetauchten Assimilationsorganen; hier gehört auch ein Teil von Moosen — B-Hu; Hun — frei schwimmende Pflanzen mit untergetauchten Assimilationsorganen; Huz — am Grunde befestigte Pflanzen, deren Assimilationsorgane untergetaucht sind; K — Sträucher; Ki — Zwergsträucher; L — Flechten; n — Zahl der zur Tabelle vereinigten Aufnahmen; S — Gruppenstetigkeit; t — Summe der Einzelvorkommen aller Arten in der Tabelle; z — Gesamtzahl der zur Gruppe gehörigen Arten; Σg — Summe der Einzelvorkommen der zur Gruppe gehörigen Arten.

LITERATURA

- Balatova-Tulačková E., 1963, Zur Systematik der europäischen *Phragmitetea*, Preslia, 35, 2.
- Braun-Blanquet J., 1951, Pflanzensoziologie, Wien.
- Dąmbska I., 1961, Roślinne zbiorowiska jeziorne okolic Sierakowa i Międzychodu, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol., XXIII, 4.
- Dąmbska I., 1966, Zbiorowiska ramienic Polski, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol., XXXI, 3.
- Donselaar J. van, 1961, On the vegetation of former river beds in the Netherlands, Wentia, 5.
- Ellenberg H., 1965, Aufgaben und Methoden der Vegetationskunde, Einführ. in die Phytol., Bd. IV, I Teil, Stuttgart.
- Ellenberg H., 1963, Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in kausaler, dynamischer und historischer Sicht, Einführ. in die Phytol., Bd. IV, II Teil, Stuttgart.
- Fedorow A. A., 1966, „Krugowiny” (Osobiennosti rosta niekotorych rastienij), Bot. żurnal, 51, 11.
- Kępczyński K., 1960, Zespoły roślinne Jezior Skępskich i otaczających je łąk, Stud. Soc. Sc. Tor., Suppl. VI.
- Kępczyński K., 1965, Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej, Wyd. Uniw. M. Kopernika, Toruń.
- Knapp R., 1948, 1949, Einführung in die Pflanzensoziologie, I, II, III, Stuttgart (Ludwigsburg).
- Kopecky K. und Hejny S., 1965, Zur Stellung der Flussröhrichte des *Phalaridion arundinaceae*-Verbandes im mitteleuropäischen phytocoenologischen System, Preslia, 37.
- Kuiper P. J. C., 1957, Verlandingsvegetaties in N. W. Overijssel, Jb. Kon. Ned. Bot. Ver.
- Miyawaki A. und Tüxen J., 1960, Über *Lemnetea*-Gesellschaften in Europa und Japan, Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 8, Stolzenau Weser.

- Matuszkiewicz W., 1962, Dyskusja nad systemem zbiorowisk roślinnych Europy Zachodniej i Środkowej, Wiad. Bot., VI, 3.
- Oberdorfer E., 1949, Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland und die angrenzenden Gebiete, Stuttgart.
- Oberdorfer E., 1957, Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Pflanzensoziologie, 10, Jena.
- Olaczek R., 1963, Zbiorowiska roślinne torfowisk niskich okolic Łęczycy, Łódź (Mskr.).
- Podbielkowski Z., 1960, Zarastanie dołów potorfowych, Mon. Bot., X, 1, Warszawa.
- Poli E. und Tüxen J., 1960, Über Bidentetalia-Gesellschaften Europas, Mitt. d. Flor.-soz. Arbeitsgem., N. F. 8.
- Scamoni A., 1955, Einführung in die praktische Vegetationskunde, Berlin.
- Scamoni A., 1967, Wstęp do fitosocjologii praktycznej, Warszawa.
- Szata roślinna Polski I, II, 1959, Oprac. zbior. pod red. Wł. Szafera, Warszawa.
- Tuszkowski A., 1960, Inżynieria melioracyjno-rybacka, Warszawa.
- Tüxen R., 1937, Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands, Mitt. d. Flor.-soz. Arbeitsgem. in Niedersachsen, 3.
- Tüxen R., 1955, Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften, Mitt. d. Flor.-soz. Arbeitsgem., N. F. 5.
- Tüxen R., (1955), Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands, Wegweiser durch die pflanzensoziologisch-systematische Abteilung, Bremen.
- Tüxen R. und Preising E., 1942, Grundbegriffe und Methoden zum Studium der Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften, Deutsche Wasserwirtschaft, 37, 1, 2.
- Tüxen R. und Preising E., 1951, Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des westdeutschen Grünlandes, Angew. Pflanzensoziol. 4, Stolzenau/Weser.

TRZĘŚĆ

Wstęp	3
Rozmieszczenie stawów rybnych i ich topografia	3
Zakres i metoda badań	13
Zbiorowiska roślinne	14
Zbiorowiska wodne	17
Zbiorowiska glonów	18
Zespół <i>Lemna minor</i> - <i>Lemna triscula</i>	18
<i>Wolffietum arrhizae</i>	19
<i>Riccietyum fluitantis</i>	24
<i>Salvinieto-Spirodeletum polyrrhizae</i>	25
<i>Potametyum lucentis</i>	27
<i>Myriophyllo-Nupharetum</i>	29
<i>Hydrocharo-Stratiotetyum</i>	31
Zbiorowiska ramienic	34
Zbiorowiska bagienne	36
<i>Scirpo-Phragmitetyum</i>	37
Zbiorowisko z <i>Acorus calamus</i>	40
<i>Glycerietum maximae</i>	43
<i>Oenanthro-Rorippetum</i>	47
<i>Scirpetum maritimi</i>	49
<i>Caricetyum elatae</i>	49
<i>Caricetyum paniculatae</i>	52
Zbiorowisko z <i>Carex elongata</i>	54
<i>Caricetyum inflato-vesicariae</i>	54
<i>Caricetyum gracilis</i>	56
<i>Caricetyum acutiformis</i>	57
<i>Caricetyum ripariae</i>	59
<i>Phalaridetum arundinaceae</i>	59
<i>Cicuto-Caricetyum pseudocyperi</i>	64
<i>Thelypterideto-Phragmitetyum</i>	64
Zbiorowisko z <i>Equisetum limosum</i>	66
Zbiorowiska łąkowe	68
Zbiorowisko szuwarowo-łąkowe	69
Zbiorowisko z <i>Calamagrostis canescens</i>	71
Zbiorowiska zaroślowe i drzewiaste	74
<i>Salici-Franguletum</i>	74
<i>Salici-Franguletum</i> podzespół z <i>Salix repens</i>	75
<i>Carici elongatae-Alnetum</i>	78
Zbiorowiska na odkrytym dnie stawów	78
Zbiorowisko rdestowo-szuwarowe	82
Zbiorowisko z <i>Agrostis stolonifera</i>	83
Zbiorowisko z <i>Heleocharis acicularis</i>	85
Zbiorowisko <i>Rumex maritimus-Alopecurus geniculatus</i>	88
Zbiorowisko z <i>Polygonum persicaria</i>	88
Zarastanie przestrzeni wodnej stawów	91
Zarastanie dna w osuszonych stawach	106
Przemiany roślinności stawów	113
Podsumowanie	115
Zusammenfassung	117
Literatura	121