JERZY NIKLEWSKI

INTERGLACJAŁ EEMSKI W GŁÓWCZYNIE KOŁO WYSZOGRODU

The Eemian Interglacial at Główny near Wyszogród
(Central Poland)

WSTĘP

Stanowisko interglacjalne, z którego zebrano materiał do badań paleobotanicznych, znajduje się na północnym zapleczu wzgórza morenowego pomiędzy wsiami Główny, Dzierżanowo i Słomin, ok. 11 km na północ od Wyszogrodu. Wzgórze to jest częścią większego kompleksu, nazwanego przez H. Ruszczyńską-Szenajch (1964) kobylnickimi morenami czołowymi. Zespół moren kobylnickich ciągnie się dalej ku południowemu wschodowi do okolic wsi Komsin i Radzikowo. O morenach tych pisali ogólnie St. Lencewicz (1917, 1919) i J. Samsonowicz (J. Lewiński, A. Łuniewski, St. Małkowski i J. Samsonowicz 1927). Obszerniejsze opracowanie geologiczne poświęcone plejstocenowi okolic Wyszogrodu ogłosiła H. Ruszczyńska-Szenajch (1964). W osobnym artykule autorka przedstawiła wyniki szczegółowych obserwacji budowy moren, opierając się na kilku nowych, dużych odsłonięciach (H. Ruszczyńska 1961). Wschodnie przedłużenie omawianego ciągu morenowego opisała K. Kopczyńska-Żandarska (1961).

Moreny kobylnickie wyznaczają linię postoju czoła lądolodu stadiału Wkry zlodowacenia środkowopolskiego (H. Ruszczyńska-Szenajch 1964, por. St. Zb. Różycki 1965, fig. 9). Lądolód zlodowacenia bałtyckiego nie dotarł do okolic Główny; jezior lodowca Kotliny Płockiej (St. Lencewicz 1927) w swym maksymalnym zasięgu zbliżył się do Główny na odległość ok. 25 km (por. St. Zb. Różycki 1961a, fig. 12).

Moreny kobylnickie na zachód od wsi Kobylniki osiągają wysokość bezwzględną 160 m n.p.m. Składa się na nie głównie materiał żwirowo-piaszczysty i gliniasty. W rejonie najwyższych kulminacji formę główną nadbudowuje wyodrębniający się mniejszy wał, złożony z materiału gładowego i żwirowo-piaszczystego. Na zapleczu moreny znajdują się

mniejsze wzgórza morenowe i kemowe oddzielone od siebie płytkimi obniżeniami, wypełnionymi piaskami i mułami. Zdaniem H. Ruszczyńskiej-Szenajch (1964) są to ślady dolinek odpowiadających liniom odpływu wód w czasie topnienia lodu. W jednym z takich obniżen, położonym na zapleczu zachodniej części zespołu moren kobylnickich, H. Ruszczyńska-Szenajch natrafiła na wyraźnie zaznaczające się w morfologii zagłębienie bezodpływowe o powierzchni ok. 6500 m², w którym znalazła torfy przykryte piaskami i mułami. Wykonana przez autora w roku 1960 wstępna analiza pyłkowa kilku prób tego torfu pozwoliła na przypuszczenie, że mamy tu do czynienia z pogrzebanym torfowiskiem interglacjalnym.

Pierwsza próba przebicia piaszczystego nadkładu i pobrania materiału do analizy pyłkowej przy użyciu świdra Hillera udała się tylko częściowo, gdyż nie udało się wówczas przebić całego osadu interglacjalnego, a — jak się później okazało — w najniższej części profilu próby uległy pewnemu zaburzeniu. Materiał ten okazał się jednak wystarczający dla dokonania oceny wieku stanowiska. Badania wykonane przez autora częściowo przy współpracy mgra Janusza Kąckiego (J. Niklewski, J. Kącki i J. Stawin 1964), oparte na przeliczeniu 200 ziarn AP w każdej próbce pozwoliły na stwierdzenie charakterystycznej dla interglacjału eemskiego sekwencji kulminacji pyłku dębu, leszczyny i grabu.

Dzięki życzliwości Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w roku 1963 wykonano ponownie trzy głębsze wiercenia rurowane. Za umożliwienie wykonania tych wierceń autor serdecznie dziękuje Panu Prezesowi Docentowi mgrowi inż. Mieczysławowi Mrozowskiemu. Niniejsza praca oparta głównie na materiałach z tych wierceń została wykonana w latach 1963—1967 w Katedrze Geologii Czwartorzędu UW, pod kierunkiem profesora dra St. Zb. Różyckiego. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Profesorowi drowi Stefanowi Zbigniewowi Różyckiemu za stałą życzliwą i wszechstronną opiekę naukową i nadanie kierunku pracy, za liczne i bardzo cenne wskazówki metodyczne i zwrócenie mojej uwagi na szereg interesujących zagadnień. Panu Profesorowi drowi Andrzejowi Środoniowi i Panu Profesorowi drowi Mikołajowi Kostyniukowi gorąco dziękuję za uwagi krytyczne i cenne wskazówki dotyczące zarówno zagadnień metodycznych, jak i interpretacyjnych. Pani Docent dr Annie Stachurskiej dziękuję za umożliwienie mi korzystania ze zbiorów Zakładu Paleobotaniki Uniwersytetu we Wrocławiu i przeszkolenie w jej zakładzie w zakresie mikrofotografii. Panu Docentowi drowi Stanisławowi Markowi wdzięczny jest za oznaczenie makroskopowych szczątków roślin. Szczególną wdzięczność winieniem Panu drowi Mieczysławowi J. Dąbrowskiemu za wielokrotne konsultacje i dyskusje dotyczące wszelkich zagadnień związanych z wykonywaniem pracy, poczynając od najbardziej szczegółowych problemów morfopalynologicznych po ogólne zagadnienia interpretacyjne, za zainteresowanie postępami pracy i wszechstronną pomoc. Pani dr Krystynie Wasylikowej, pani dr Marii Borowik-Dąbrowskiej i pani dr Hannie Ruszczyńskiej-Szenajch dziękuję za uwagi i dyskusje, a panu drowi Zbigniewowi Lamparskiemu za ofiarną pomoc w pracach terenowych.

Jedno z trzech wierceń wykonanych na obszarze zagłębienia bezodpływowego w Główczyźnie, oznaczone symbolem G2, przebiło całą serię interglacjalną i sięgnęło do dna kopalnego zbiornika na głębokości 5,2 m poniżej powierzchni terenu (ok. 124 m n.p.m.). Dwa pozostałe wiercenia wykonane zostały w brzeżnych częściach zagłębienia. Wyniki wierceń uzupełnione zostały profilami 32 sond ręcznych, przeważnie do głębokości 3 m, które tylko w brzeżnych częściach zagłębienia przebiły wyklinowującą się serię organogeniczną. W środkowej części zbiornika profile uzyskane z sond ograniczają się do nadkładu serii interglacjalnej i jej górnych poziomów (ob. fig. 1*). Przy opisywaniu w pracowni osadów organogenicznych obok zwykłego opisu litologicznego zastosowano system J. Troels-Smitha (1955), polegający na wyznaczeniu wzajemnego stosunku ilościowego szacowanych powierzchniowo składników osadu w umownej, czterostopniowej skali (ob. tabela 1). Skład osadu wg systemu J. Troels-Smitha przedstawiony jest graficznie w diagramach pyłkowych w nieco zgeneralizowanej postaci.

Profile wierceń

Otwór G1 — we wschodniej części zagłębienia

- 0,0 — 0,6 m — piasek różnoziarnisty z przewagą drobnoziarnistego w górnej części, z wzrastającym ku dołowi udziałem ziarn większych (1—2 mm), w górnej części z domieszką mułu i obfitością korzonków turzyc, barwy brunatnoszarej; HCl—.
- 0,6 — 1,2 m — piasek różnoziarnisty z przewagą średnio- i gruboziarnistego, z ziarnami żwirowymi o średnicy do 20 mm, barwy rudobruatnej; HCl—.
- 1,2 — 1,6 m — piasek gruboziarnisty ze żwirem i otoczkami do 25 mm średnicy, barwy brunatnożółtej, HCl—.
- 1,6 — 2,3 m — piasek średnioziarnisty z domieszką gruboziarnistego i pojedynczymi ziarnami żwirowymi — zwłaszcza w górnej części, barwy brunatnoszarej; HCl—.
- 2,3 — 2,8 m — gytia detritusowa silnie ilasta, z dość znaczną domieszką piasku, barwy brunatnej; w najniższej części warstwy kilkucentymetrowa wkładka szarego łu; HCl—.
- 2,8 — 7,2 m — piasek różnoziarnisty z ziarnami żwirowymi i otoczkami do 40 mm średnicy, gliniasty — zwłaszcza poniżej gł. 6,0 m, barwy niebieskoszarej; HCl—.
- 7,2 — 9,5 m — glina zwałowa piaszczysta, dość zwięzła, barwy niebieskoszarej, z licznymi nieobtoczonymi okruchami białego kruchego marglu, z otoczkami skał krystalicznych, kwarcytów, kwarców i wapieni; HCl+.

* Schematy przekrojów geologicznych i diagramy pyłkowe umieszczono pod opaską na końcu książki.

Tabela 1 - Table 1

Skład osadów organogenicznych z gł. 1,8 - 5,2 m w wierceniu G2
Composition of organic deposits at depth 1,8—5,2 m in borehole G2

Nr	Głębokość									
No.	Depth									
20	1,8-1,9 m	Sh 0,5						Dg 1	As 2	Ag 0,5
21	1,9-2,0 m	Sh 0,5					Dh +	Dg 0,5	Ld 1	As 1,5 Ag 0,5
22	2,0-2,1 m	Sh 0,5	Tb 0,5	Th 0,5	Dl +		Dh +		Ld 1	As 1 Ag 0,5
23	2,1-2,2 m	Sh 1	Tb 0,5	Th 0,5			Dh +	Dg 0,5		As 1 Ag 0,5
24	2,2-2,35 m	Sh 1	Tb 2	Th 0,5	Dl +		Dh +	Dg +		As 0,5
25	2,35-2,5 m	Sh 1	Tb 2,5	Th +				Dg 0,5		
26	2,5-2,65 m	Sh 0,5	Tb 3,5	Th +						
27	2,65-2,8 m	Sh 0,5	Tb 3,5	Th +			Dh +	Dg +		
28	2,8-2,9 m	Sh 0,5	Tb 3,5	Th +	Dl +		Dh +	Dg +		
29	2,9-3,0 m	Sh 0,5	Tb 1	Th 0,5	Dl 1,5		Dh 0,5			
30	3,0-3,1 m	Sh 0,5	Tb 2,5	Th 0,5	Dl 0,5					
31-32	3,1-3,2 m	Sh 0,5	Tb 3,5	Th +						
33-34	3,2-3,4 m	Sh 0,5	Tb 2,5	Th 0,5	Dl +		Dh 0,5			
35-36	3,4-3,5 m	Sh 0,5	Tb 3,5	Th +	Dl +			Dg +		
37	3,5-3,6 m	Sh 0,5	Tb 2	Th 1	Dl +		Dh 0,5	Dg +		
38	3,6-3,7 m	Sh 0,5	Tb 3	Th 0,5	Dl +		Dh +	Dg +		
39	3,7-3,8 m	Sh 1	Tb 2	Th 1			Dh +	Dg +		
40	3,8-3,9 m	Sh 1	Tb 2,5	Th +	Dl 0,5					
41	3,9-4,0 m	Sh 1,5	Tb 1	Th 0,5	Dl +			Dg 1		
42	4,0-4,1 m	Sh 1	Tb 1	Th 0,5	Dl +		Dh +	Dg 1	As 0,5	
43	4,1-4,2 m	Sh 1	Tb 1		Dl 0,5			Dg 0,5	As 1	Ag +
44	4,2-4,3 m	Sh 2,5			Dl 0,5			Dg +	As 1	Ag +
45	4,3-4,4 m	Sh 2,5					Dh +	Dg 0,5	As 1	
46	4,4-4,5 m	Sh 2,5					Dh +	Dg 0,5	Ld +	As 1 Ag +
47	4,5-4,6 m	Sh 2,5						Dg +	Ld 0,5	As 1 Ag +
48	4,6-4,7 m	Sh 1					Dh +	Dg +	Ld 2	As 1 Ag +
49	4,7-4,8 m	Sh 1,5							Ld 1	As 1 Ag 0,5
50	4,8-4,9 m	Sh 2								As 1 Ag 1,5
51	4,9-5,0 m	Sh 2,5								As 0,5 Ag 1
52-53	5,0-5,2 m	Sh 0,5								As 2,5 Ag 1

Skład osadów organogenicznych z gł. 1,85 - 2,6 m w sondzie G28a
Composition of organic deposits at depth 1,85 - 2,6 m in sounding G28a

Nr	Głębokość									
No.	Depth									
39	1,85-1,9 m	Sh 0,5						As 1	Ag 1,5	Ga 1
40	1,9-1,95 m	Sh 0,5						As 3	Ag 0,5	Ga +
41	1,95-2,0 m	Sh 0,5						As 2	Ag 1	Ga 0,5
42-43	2,0-2,1 m	Sh 0,5						As 3	Ag 0,5	
44	2,1-2,15 m	Sh 0,5						As 2	Ag 1	Ga 0,5
45-49	2,15-2,4 m	Sh 0,5						As 3,5	Ag +	
50	2,4-2,45 m	Sh 0,5						As 2	Ag 1	Ga 0,5
51-52	2,45-2,55 m	Sh 0,5						As 3,5	Ag +	Ga +
53	2,55-2,6 m	Sh 0,5						As 2	Ag 1	Ga 0,5

Otwór G2 — w środkowej części zagłębienia

- 0,0 — 0,5 m — muł nieco piaszczysty z licznymi korzonkami turzyc i innymi szczątkami roślinnymi, miejscami z większą domieszką piasku, barwy ciemnoszarej; HCl—.
- 0,5 — 1,8 m — piasek różnoziarnisty z dużym udziałem gruboziarnistego, z ziarnami żwirowymi i pojedynczymi otoczkami do 30 mm średnicy, barwy brunatnożółtej; HCl—.
- 1,8 — 1,9 m — il gytlowaty jasnobrunatny ze słabo zaznaczonym warstwowaniem polegającym na wtrąceniu cienkich (0,5—1 mm) warstewek jaśniejszych w nieco ciemniejszej zasadniczej masie skały; HCl—.
- 1,9 — 2,1 m — gytia silnie ilasta, jasnobrunatna, z rozproszonymi szczątkami roślinnymi; HCl—.
- 2,1 — 4,1 m — torf turzycowo-mszysty i mszysty, słabo rozłożony, w stanie świeżym jasnobrunatny.
- 4,1 — 5,0 m — gytia detritusowa, nieco ilasta, ciemnobrunatna, w dolnej części szarobrunatna; HCl—. Na głębokości 4,8 m cienkie (3 cm) wkładki rudy jeziornej.
- 5,0 — 5,2 m — il szary drobnowarstwowany, na sucho łupiący się na blaszki o grubości 0,2—0,3 mm; HCl—.
- 5,2 — 5,9 m — piasek gliniasty drobno- i średnioziarnisty barwy niebieskoszarej, z pojedynczymi ziarnami żwirowymi, dość zwięzły, w górnej części z rozproszonym detritusem roślinnym, w dolnej z większą domieszką materiału gruboziarnistego; HCl—.
- 5,9 — 6,4 m — piasek gruboziarnisty niebieskoszary ze znaczną domieszką żwiru i otoczków do 50 mm średnicy; HCl—.
- 6,4 — 11,7 m — glina zwałowa piaszczysta, niebieskoszara, z obfitością nieobtoczonych okruchów białego marglu, z otoczkami skał krystalicznych, kwarcytów, kwarców i wapieni; HCl+.

Otwór G3 — w zachodniej części zagłębienia

- 0,0 — 1,3 m — piasek różnoziarnisty, w górnej części z przewagą drobnociarnistego, w dolnej — grubociarnistego, w górnej części z pojedynczymi ziarnami żwirowymi, w dolnej — ze żwirem i otoczkami do 40 mm średnicy, barwy szarożółtawej, w górnej części ciemnoszarożółtawej; HCl—.
- 1,3 — 1,9 m — muł ilasty, delikatnie warstwowany, w dolnej części z domieszką piasku drobnociarnistego, barwy oliwkowej z rudymi plamami i przewarstwieniami; HCl—.
- 1,9 — 6,2 m — piasek średnioziarnisty z udziałem drobno- i domieszką grubociarnistego, barwy niebieskoszarej. Ku dołowi od gł. 3,4 m pojawiają się ziarna żwirowe do 15 mm średnicy, a od gł. ok. 5,5 m znaczna domieszka gliniasta; HCl—.
- 6,2 — 9,0 m — glina zwałowa piaszczysta, dość zwięzła, szara, z okruchami białego, kruchego marglu i otoczkami skał krystalicznych, kwarcytów, kwarców i wapieni; HCl+.

Sonda G28a — w środku zachodniej zatoczki zagłębienia

- 0,0 — 0,6 m — muł piaszczysty barwy ciemnoszarej, z obfitością korzonków turzyc i innych szczątków roślinnych; HCl—.
- 0,6 — 1,2 m — muł oliwkowy, zwięzły, nieco piaszczysty; HCl—.

- 1,2 — 1,65 m — muł rdzawy, zwięzły, nieco piaszczysty; HCl—.
- 1,65— 1,85 m — piasek różnoziarnisty z ziarnami żwirowymi, barwy szarozółtej; HCl—.
- 1,85— 2,6 m — gytia bardzo silnie ilasta, jasnobrunatna; HCl—
- 2,6 — 2,9 m — piasek drobno- i średnioziarnisty z pojedynczymi ziarnami żwirowymi, barwy szaroniebieskiej; HCl—.

Profile sondy G28a i wierceń wyżej opisanych oraz pozostałych sond zestawiono na przekrojach geologicznych zbiornika interglacjalnego (fig. 1 i 2). Strop gliny zwałowej znajduje się na wysokości ok. 123 m n.p.m. Granica pomiędzy gliną (fig. 1 i 2, 1) a przykrywającymi ją szarymi piaskami różnoziarnistymi (2), aczkolwiek dobrze uchwytna, zwłaszcza w świeżych próbach, jest niezupełnie ostra. Piaski, szczególnie w dolnej części, są silnie gliniaste i makroskopowo różnią się od gliny właściwie tylko mniejszą zwięzłością. Zawierają one liczne ziarna żwirowe i pojedyncze otoczaki. Strop szarej gliny zwałowej stwierdzonej wierceniami na obszarze zagłębienia hipsometrycznie odpowiada powierzchni na przedpolu moren kobylnickich zbudowanej z „brązowej gliny zwałowej”, której główna masa powstała w starszych stadiach zlodowacenia środkowopolskiego (H. Ruszczyńska-Szenajch 1964, tablica I i tabela 1, nr 6 i 8).

Wobec braku danych wiertniczych i niemożności odtworzenia pełnego przekroju geologicznego przez podłoże moreny, nie można dokładnie określić stosunku stratygraficznego gliny szarej do „gliny brązowej”. Gлина szara może być — podobnie, jak „głina brązowa” — zarówno osadem stadiów starszych, jak i stadiału Wkry. Za pierwszą możliwością przemawia zbliżona sytuacja hipsometryczna, przy czym różnice litologiczne między „gliną brązową” a gliną szarą, wyrażające się przede wszystkim w barwie skały, spowodowane byłyby działaniem procesów wietrzeniowych na powierzchni. Charakterystycznym składnikiem gliny szarej są okruchy białawego marglu (kredowego?), kruchego i po wydobyciu próby szybko rozpadającego się na powietrzu. H. Ruszczyńska-Szenajch przy omawianiu „gliny brązowej” nie wspomina o nim, ale w powierzchniowych warstwach mógł on ulec zupełnemu rozkładowi.

Wydaje się jednak logiczne, że najmłodsza gлина zwałowa na zapleczu moren czołowych stadiału Wkry jest związana wiekowo z tymże stadiem. Nadległe piaski gliniaste (2), w których utworzony jest zbiornik interglacjalny, są prawdopodobnie również osadem pochodzenia glacjalnego. Warto może zaznaczyć, że sytuacja geologiczna osadów interglacjalnych w Głównicy pod niektórymi względami przypomina sytuację eemskich osadów jeziornych i torfowych w Józefowie k. Rogowa, gdzie poszczególne interglacjalne zagłębienia bezodpływowe są podścielone i oddzielone od siebie „grzędami” zbudowanymi z materiału gliniasto-piaszczystego, leżącego na typowej glinie zwałowej. Z. Klajnert

(1965) osady gliniasto-piaszczyste podścielające serię interglacialną porównywał z „superglacial till” w sensie R. F. Flinta (a glinę zwałową leżącą niżej — z „basal till”). Możliwe zatem, że w Głównicy — podobnie jak w Józefowie — glina zwałowa i zbliżone do niej piaski gliniaste (2) są zbliżone do siebie wiekowo i pokrewne genetycznie stanowiąc osad końcowej fazy tego samego stadiału — glaciostadiału Wkry.

Z kształtu zbiornika interglacialnego w Głównicy, jego bezodpływowego charakteru i położenia w strefie czołowomorenowej można wnosić, że było to tzw. „oczko” lodowcowe, wypełnione następnie osadami interglacialnymi. Powstanie zagłębień bezodpływowych wiąże się zazwyczaj bądź ze zjawiskami bezpośrednio związanymi z lodowcem, bądź ze zjawiskami peryglacialnymi typu krasu termicznego (B. Hallicki 1951, A. Kalniet 1952, Z. Klajnert 1965). Zagłębienie wypełnione wodą w interglaciale było typowym jeziorkiem śródmorenowym, jakich wiele dziś znajdujemy na obszarach objętych ostatnim zlodowaceniem. Powierzchnia jeziorka interglacialnego w okresach jego maksymalnego rozwoju była zapewne bliska dzisiejszej powierzchni zagłębienia (6500 m²). Nie odbiegała zatem wiele od wielkości uważanej przez K. Faegriego i J. Iversena (1964, str. 54) za idealną z punktu widzenia reprezentatywności spektrów pyłkowych (5000 m²).

Seria interglacialna rozpoczyna się cienką, 20-centymetrową warstwą szarego iłu (3), stwierdzonego w otworze G2 na głębokości 5,0—5,2 m. Zawiera on ok. 75% popiołu. Ten sam osad w wierceniu G1 stwierdzono na głębokości 2,8 m, a w sondzie G27 na głębokości 2,1—2,3 m. Przykrywa go brunatna, ilasta gytia detritusowa (4), zawierająca od 49 do 65% popiołu. Miąższość gytii brunatnej w otworze G2 wynosi 90 cm (4,1—5,0 m). Gytia przykryta jest warstwą torfu mszystego (6) o maksymalnej miąższości 2 m występującej w otworze G2 (2,1—4,1 m). W przeważającej części składa się on ze szczątków mchów brunatnych, w mniejszej — z turzyc, skrzypów i bobrka oraz drewna brzozy i wierzby. W dolnej części warstwy torfowej wśród mchów oznaczono *Drepanocladus aduncus*, *D. Sendtneri* i *Meesea triquetra*, w górnej ponadto *Calliergon trifarium*, *C. giganteum*, *Drepanocladus vernicosus* i *Scorpidium scorpioides*. W najwyższym odcinku profilu torfu zjawiają się torfowce z sekcji *Cymbifolia*. Popielność torfu waha się od 4% w części dolnej do 10% (wyjątkowo 18%) w części górnej; są to wartości bliskie przeciętnej zawartości popiołu w torfach mszystych (por. K. Lubliner-Mianowska 1953).

Interglacialny cykl sedymentacyjny zamykają ponownie osady zbiornika wodnego. Bezpośrednio na wyrównanej powierzchni torfu leży warstwa jasnobrunatnej gytii ilastej (7), stwierdzona w wierceniu G2 i większości sond. Miąższość „górnej” gytii wynosi od 20 do 50 cm. Zawiera ona ok. 70% popiołu. Ku górze gytia przechodzi w jasnobrunatny ił (8) o miąższości od 10 do 40 cm.

Serię interglacialną przykrywają niewarstwowane szarżółte piaski różnoziarniste (9), zawierające znaczną ilość materiału gruboziarnistego, żwiru i otoczków do 3—4 cm średnicy. Ta piaszczysto-żwirowa pokrywa występuje na całym obszarze zagłębienia; miąższość jej waha się od 30 cm do ok. 2 m. W środkowej części zagłębienia (wiercenie G2) piaski mają 1,3 m grubości.

W zachodniej zatoczce zagłębienia osady interglacialne są silnie zredukowane. Ukształtowaną w piaskach gliniastych (2) płytką nieckę oddzieloną od głównej części zbiornika grzędą z tychże piasków zbudowaną wypełnia bardzo silnie ilasta gytia (5) o jasnobrązowej barwie, zawierająca aż ok. 90% popiołu. Dno niecki znajduje się 2,9 m powyżej dna zbiornika głównego. Miąższość tej ilastej gytii wynosi 75 cm. Przykrywa ją cienka w tym miejscu warstwa piaszczysto-żwirowa (9). Zagłębienie utworzone w piaskach ze żwirem wypełnione jest niewarstwowanym, rdzawym mułem (10) i mułem barwy oliwkowej (11).

Piaski ze żwirem (9) w znacznej części zagłębienia przykryte są mułami szarymi i ciemnoszarymi (12). Miąższość ich dochodzi do 1 m.

III. METODYKA PRACY

Próby z wierceń w Głównicy pobrane zostały z zachowaniem właściwej staranności co do określenia ich głębokości i czystości materiału; wzięto je jednak w niezupełnie regularnych odstępach, co oczywiście w pionowej skali diagramu znalazło swoje odzwierciedlenie. Objętość prób wynosiła ok. 1 dcm³. Sonda G28a w zachodniej zatoczce zagłębienia wykonana została świdrem Hillera. Próby — oczywiście o niewielkiej objętości — pobrano co 5 cm. Wszystkie próby przygotowywane były do analizy pyłkowej metodą acetolizy G. Erdtmanna wg przepisu podanego przez K. Faegriego i J. Iversena (1964). W przypadku prób zawierających materiał klastyczny lub ilasty acetoliza poprzedzona była preparacją rozdzielczą przy użyciu roztworu jodku kadmu i jodku potasu (J. E. Doroganiewskaja, I. A. Szenfiniel, W. P. Griczuk 1952). Spektrum pyłkowe każdej próby oparte jest na analizie co najmniej dwóch preparatów. W materiale z wiercenia G2 liczono co najmniej 1000 ziarn pyłku AP; profil pyłkowy sondy G28a, gdzie próby pobrane były regularnie i w małych odstępach oparty jest na przeliczaniu co najmniej 500 ziarn pyłku AP. Znakiem + w diagramie opatrzone typy sporomorf znalezione po zakończeniu liczenia w trakcie dodatkowego przeglądania preparatów. Przy oznaczaniu sporomorf posługiwano się kluczami K. Faegriego i J. Iversena (1964), H. J. Beuga (1963), S. Nilssona i J. Radwana Pragłowskiego (1963), niektórymi szczegółowymi opracowaniami morfopaliologicznymi poświęconymi poszczególnym grupom roślin (M. Ch. Mo-

Zestawienie makroskopowych szczątków roślin stwierdzonych w wierceniu G2

List of macroscopic plant remains confirmed in borehole G2

Nr No.	Głębokość Depth	<i>Abies cf. alba</i>	<i>Betula humilis</i>	<i>B. pubescens</i>	<i>B. verrucosa</i>	<i>Betula sp.</i>	<i>Carpinus betulus</i>	<i>Picea excelsa</i>	<i>Picea sp.</i>	<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Quercus sp.</i>	<i>Rubus idaeus</i>	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Salix sp.</i>	<i>Tilia sp.</i>	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	<i>Batrachium aquatile</i>	<i>Calla palustris</i>	<i>Carex acutiformis</i>
		s	o	o	o	n, d, k	o	n	d	k, d	d	n	n	d	o	n	o	o	o
20	1,8-1,9 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1,9-2,0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	2,0-2,1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2,1-2,2 m	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	2,2-2,35 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25	2,35-2,5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2,5-2,65 m	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27	2,65-2,8 m	-	-	2	3	+	8	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1
28	2,8-2,9 m	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	2,9-3,0 m	-	2	3	2	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30	3,0-3,1 m	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
31-32	3,1-3,2 m	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	3,2-3,3 m	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3,3-3,4 m	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
35-36	3,4-3,5 m	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
37	3,5-3,6 m	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
38	3,6-3,7 m	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	3,7-3,8 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	3,8-3,9 m	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
41	3,9-4,0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
42	4,0-4,1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
43	4,1-4,2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
44	4,2-4,3 m	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
45	4,3-4,4 m	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
46	4,4-4,5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
47	4,5-4,6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
48	4,6-4,7 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
49	4,7-4,8 m	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50	4,8-4,9 m	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	4,9-5,0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
52	5,0-5,1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	5,1-5,2 m	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	5,2-5,3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	5,3-5,4 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	5,4-5,65 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	5,65-5,9 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

s szpilki, d drewno, k korowina, e epiderma, n nasienie, o owoc
 s needles, d wood, k crust, e epidermis, n seed, o fruit

noszon 1959, S. Chanda 1962, P. Sorsa 1964, W. Karpowiczówna 1929, A. N. Sładkow 1951 i in.), a przede wszystkim preparatami porównawczymi zarodników i pyłku roślin współczesnych.

Nr No.	Carex cf. disticha	C. fusca	C. gracilis	C. Hudsonii	C. limosa	C. pseudocyperus	C. riparia	C. rostrata	C. vesicaria	Comarum palustre	Ceratophyllum demersum	C. submersum	Dulichium spathaceum	Equisetum limosum	Heleocharis palustris	Juncus sp.	Lycopus europaeus	Menyanthes trifoliata	Nuphar luteum	Nymphaea alba	N. candida
20	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	e	o	o	o	e, n	n	n	n
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
25	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	1	5	3	7	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	1	-	10	-	-	4	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1	2	-	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-32	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	6	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	12	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
35-36	-	8	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	-	2	-	21	2	-	8	1	-	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
39	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
40	-	-	6	5	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-
42	-	-	3	14	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
43	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-
44	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	3
45	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Szczątki makroskopowe, a także stosunkowo nieliczne szczątki drewna oraz mchy oznaczył docent dr Stanisław Marek. W obrębie listy owoców i nasion zwraca uwagę obecność *Dulichium spathaceum* w poz. 42.

Popielność osadów organogenicznych określona została zgodnie ze

Nr	<i>Potamogeton scutifolius</i>	<i>P. lucens</i>	<i>P. natans</i>	<i>P. obtusifolius</i>	<i>P. perfoliatus</i>	<i>P. pusillus</i>	<i>Potamogeton</i> sp.	<i>Ranunculus sceleratus</i>	<i>Rumex hydrolapathum</i>	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	<i>Scheuchzeria palustris</i>	<i>S. lacustris</i>	<i>S. Tabernaemontani</i>	<i>Sparganium minimum</i>	<i>S. simplex</i>	<i>Stellaria palustris</i>	<i>Stratiotes aloides</i>	<i>Urtica dioica</i>	<i>Calliergon giganteum</i>	<i>C. trifarium</i>	<i>Drepanocladus aduncus</i>	<i>D. Sandneri</i>	<i>D. vernicosus</i>	<i>Meesia triquetra</i>	<i>Scorpidium scorpioides</i>	<i>Sphnum</i> sect. <i>Cyathifolia</i>
20	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n								
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
22	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
23	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		+	+					
24	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		+	+					
25	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
26	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-		+	+					
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1		+	+					
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		+	+					
30	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		+	+					
31-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+		+	+					
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		+	+					
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
35-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
44	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-		+	+					
45	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
46	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		+	+					
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
48	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		+	+					
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		+	+					
51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+	+					

oznaczyl Stanislaw Marek

identified by Stanisław Marek

wskazówkami A. Maksimowa (1965, str. 235). W profilu G2 oznaczono także zawartość piasku w osadzie. Rozkład substancji organicznej dokonywany był przez długotrwale gotowanie w wodorotlenku potasu i — po dokładnym przemyciu — przez trawienie w chromianie. Następ-

nie po ponownym przemyciu wodą próbka była dokładnie przepłukiwana na sicie 0,2 mm aż do całkowitego usunięcia szczątków tkankowych i frakcji mineralnej poniżej 0,2 mm. Pozostały na sicie piasek był ważony i jego zawartość określana była w procentach w stosunku do początkowej wagi materiału. W organogenicznej części profilu waha się ona od 0,2 do 4,3%.

Podstawą do obliczenia spektrów pyłkowych była suma pyłku drzew i roślin zielnych, z wyjątkiem pyłku znajdującego się z pewnością na wtórnym złożu, pyłku roślin wodnych i zarodników. Udział procentowy elementów wyłączonych z sumy totalnej obliczany był w stosunku do tejże sumy. Diagramy pyłkowe obejmują krzywe o podwójnej skali (procentowej — pola czarne i promilowej — pola białe). Profile litologiczne zestawiono przy użyciu dwóch typów wydzielen: „słupek” lewy przedstawia ogólny profil geologiczny z zastosowaniem sygnatur użytych także na przekrojach geologicznych (fig. 1 i 2), „słupek” prawy — szczegółowy skład osadu wg klasyfikacji J. Troels-Smitha (1955). W następnej kolejności przedstawiono popielność osadu w skali procentowej i zawartość piasku w skali promilowej. Dalej podano krzywe *Pinus* i *Betula* na tle stosunku AP do NAP, przy czym do grupy NAP włączono także pyłek krzewów, wyłączono natomiast pyłek roślin wodnych i zarodniki. Krzywe zbiorcze tych dwóch ostatnich grup przedstawione są obok. Grupa krzywych „A” obejmuje pyłek drzew, grupa „B” — pyłek krzewów i roślin zielnych związanych z klimatem chłodniejszym i grupujących się głównie w dolnej i górnej części profilu, grupa „C” — sporomorfy roślin zielnych i krzewów wchodzących w skład zbiorowisk cieplej części interglacjału i zgrupowanych w środkowej części profilu, grupa „D” — pyłek roślin wodnych, grupa „E” — pyłek roślin szuwarowych i związanych z miejscami wilgotnymi, grupa „F” wreszcie — zarodniki paprotników i torfowców.

Przy wydzieleniu faz rozwoju roślinności posłużono się klasycznym schematem K. Jessena i V. Milthersa (1928). Cały profil — jak to niżej uzasadniono — mieści się w okresie II K. Jessena i V. Milthersa i zawiera fazy od d do i. W schemacie W. Szafera (1952) obejmuje okresy od I do IV.

IV. INTERPRETACJA SPEKTRÓW Z OSADÓW ZANIECZYSZCZONYCH MATERIAŁEM PYŁKOWYM NA WTÓRNYM ZŁOŻU

Materiał pyłkowy w najniższych odcinkach obydwóch profili głównych zanieczyszczony jest w znacznym stopniu sporomorfami pochodzącymi z osadów starszych. Stwierdzono tu wiele typów sporomorf roślin egzotycznych, nie występujących w Europie środkowej od schyłku trzeciorzędu, a wśród nich charakterystyczne sporomorfy trzeciorzędowe,

podawane z wielu złóż węgla brunatnego i innych osadów podobnego wieku. Z oczywistych względów nie zajmowano się ich bliższym oznaczaniem, większość jednak form znajdujących się z pewnością na wtórnym złożu zidentyfikowana została przynajmniej z którymś z umownych typów zbiorczych, opisywanych w bogatej literaturze stratygraficzno-palynologicznej dotyczącej trzeciorzędu (por. np. R. Potonіé, P. W. Thomson & F. Thiergart 1950). Są to następujące typy:

Sequoia-Cryptomeria-Poll. polyformosus
Thierg.
Pollenites hiatus R. Pot.
Pollenites magnus dubius R. Pot. et Ven.
Sciadopitys
Podocarpus
Pinus typ *haploxyton* Rudolph forma klasyczna
Tsuga
Carya
Pterocarya
Juglans
Engelhardtia-Platycarya
Quercoidites henrici R. Pot.

Quercoidites microhenrici R. Pot.
Pollenites liblarensis Thoms.
Castaneoidites angustus Dokt. Hrebn.
Castaneoidites exactus R. Pot.
Pollenites cingulum brühlensis Thoms
Pollenites cingulum fusus R. Pot.
Rhooidites pseudocingulum R. Pot.
Nyssa
Pollenites cf. edmundi R. Pot.
Symplocos
Liquidambar
Diervilla
Staphylea
Ilex

Część typów reprezentujących prawdopodobnie również wtórny materiał pochodzenia trzeciorzędowego nie została oznaczona nawet w ten uproszczony sposób i trafiła do grupy „varia”.

Z ogólnego układu procentowego spektrów pyłkowych najniższych odcinków obydwóch profilów wynika, że odcinki te reprezentują wczesne, chłodne fazy interglacjału. W spektrach panuje pyłek sosny i brzozy, występuje pyłek *Juniperus* i *Populus*, w obrębie urozmaiconej grupy NAP stwierdzono pyłek roślin wybitnie heliofilnych i roślin wskaźnikowych klimatu chłodnego. Te spektra, reprezentujące roślinność chłodnego klimatu pochodzą z osadów mineralnych lub organiczno-mineralnych z olbrzymią przewagą materiału mineralnego. Jeśli wziąć pod uwagę te wszystkie fakty i jednocześnie porównać przebieg krzywych występowania pyłku egzotycznego i pyłku „czwartorzędowych” drzew ciepłolubnych, takich, jak *Quercus*, *Ulmus*, *Tilia*, *Corylus*, *Carpinus* i *Fraxinus*, staje się jasne, że sporomorfy reprezentujące te rodzaje co najmniej w czterech najniższych próbach profilu G2 i w najniższym poziomie profilu G28a znajdują się także na wtórnym złożu, przeniesione z osadów starszych i osadzone w gliniastym piasku obok pyłku niewątpliwie egzotycznego. Najbardziej zanieczyszczone materiałem niewątpliwie obcym są próby 56 i 57 z profilu G2, w tych też próbach stosunkowo obficie występuje pyłek ciepłolubnych drzew „czwartorzędowych”. Częściowo pochodzi on ze skał trzeciorzędowych, częściowo może z jakichś zniszczonych starszych osadów interglacialnych, o czym świadczyłoby znalezienie w próbie 57 massuli *Azolla* o jednokomorowych glo-

chidach, charakterystycznych dla *A. filiculoides* uważanej za przewodnią dla interglacjału wielkiego (por. K. Mäddler 1955, M. Sobolewska 1956a, M. Gołębowa 1957, J. Dyakowska 1959).

Pylek obcy, przeniesiony na wtórne złożę ze skał starszych występuje często w osadach późnoglacialnych, wczesnointerglacialnych i wczesnoholoceńskich (A. Śröder 1962, K. Wasylkowa 1964 i in.). Już w roku 1936 J. Iversen zaproponował korygowanie spektrów zanieczyszczonych materiałem obcym na podstawie ich porównania ze spektrami świeżej, niezwiędniętej gliny zwałowej z najbliższej okolicy (por. K. Faegri & J. Iversen 1964, str. 120—121). Zastosowanie tej metody w przypadku Głównicy wydaje się możliwe. Jak już bowiem wspomniano, rozpatrywane próby z najniższych odcinków obydwóch profilów zawierają pyłek pochodzący z osadów starszych oraz zmieszany z nim pyłek pochodzący z deszczu pyłkowego, reprezentującego miejscową roślinność wczesnointerglacialną. Skład domieszki obcej można ustalić na podstawie spektrów gliny zwałowej stadiału Wkry. Analizę gliny przeprowadzono na trzech próbach: z gł. 9,5 m w otw. G1, z gł. 9,7 m w otw. G2 i z gł. 9,0 m w otw. G3. Te trzy spektra z trzech odrębnych prób są dość zgodne ze sobą; zestawione w jedno spektrum reprezentują przybliżony obraz palynologiczny gliny zwałowej. Za podstawę procentową przyjęto w tym wypadku cały materiał pyłkowy wraz z pyłkiem NAP i zarodnikami.

Spektrum pyłkowe gliny zwałowej z wierceń w Głównicy
Pollen spectrum of boulder clay from borings at Głównica

Drzewa „czwartorzędowe” — „Quaternary” trees	%
<i>Pinus</i>	15,97
<i>Betula</i>	10,64
<i>Salix</i>	0,47
<i>Corylus</i>	2,75
<i>Quercus</i>	1,70
<i>Tilia cordata</i>	0,29
<i>Ulmus</i>	2,11
<i>Fraxinus</i>	0,12
<i>Alnus</i>	12,40
<i>Carpinus</i>	1,11
<i>Picea</i>	0,23
<i>Abies</i>	0,06
<i>Larix</i>	0,06
	47,90
Sporomorfy egzotyczne — Exotic sporomorphs	
<i>Araliaceae?</i>	0,06
<i>Carya</i>	0,18
<i>Castanea-Castanopsis</i>	0,06
<i>Cyrillaceae</i>	1,29
<i>Engelhardtia-Platycarya</i>	0,29

<i>Fagus</i>	0,23
<i>Ilex</i>	0,47
<i>Juglans</i>	0,41
<i>Liquidambar</i>	0,35
<i>Nyssa</i>	2,63
<i>Oleaceae?</i>	0,06
<i>Pinus t. haploxyton Rudolph f. klasyczna</i>	0,41
<i>Podocarpus</i>	0,12
<i>Pollenites cingulum R. Pot.</i>	0,06
<i>Pollenites exactus R. Pot.</i>	0,06
<i>Pollenites laesus R. Pot.</i>	0,29
<i>Poll. liblarensis Thoms., Cupuliferoidites quisqualis R. Pot.</i>	0,23
<i>Pollenites microlaesus R. Pot.</i>	0,06
<i>Pterocarya</i>	0,47
cf. <i>Ptelea</i>	1,29
<i>Quercoidites henrici R. Pot.</i>	0,12
<i>Quercoidites microhenrici R. Pot.</i>	0,12
<i>Rhoidites</i>	1,52
<i>Sciadopitys</i>	1,35
<i>Sequoia-Cryptomeria-Poll. polyformosus Thierg.</i>	3,16
<i>Symplocos</i>	0,06
<i>Taxodiaceae-Taxaceae-Cupressaceae</i>	18,48
<i>Tsuga</i>	0,23
Spory trzeciorzędowe — Tertiary spores	0,94
	<hr/> 35,15

Pyłek NAP — NAP pollen

<i>Caryophyllaceae</i>	0,18
<i>Chenopodiaceae</i>	0,23
<i>Artemisia</i>	0,82
<i>Compositae</i>	0,18
<i>Cruciferae</i>	0,06
<i>Cyperaceae</i>	0,58
<i>Ericaceae</i>	1,75
<i>Calluna</i>	0,12
<i>Gramineae</i>	3,80
<i>Juniperus</i>	0,06
<i>Polygonum t. persicaria</i>	0,06
<i>Ranunculaceae</i>	0,12
<i>Rubiaceae</i>	0,06
<i>Pleurospermum</i>	0,06
<i>Umbelliferae</i>	0,06
<i>Butomus</i>	0,06
<i>Sparganium-Typha</i>	1,17
	<hr/> 9,36

Zarodniki — Spores

<i>Polypodiaceae</i>	5,67
<i>Sphagnum</i>	1,93
	<hr/> 7,60
Razem — Total	<hr/> 100,01

Liczono 1710 sporomorf

1710 sporomorphs were counted

Warto podkreślić, że dominacja *Pinus*, *Betula* i *Alnus* w obrębie pyłku drzew „czwartorzędowych” zbliża to spektrum do innych spektrów osadów glacialnych podawanych przez różnych autorów (por. np. K. Wasylińska 1964, str. 310, W. Koperowa i A. Śröder 1965, str. 15).

Rachunkowi korygującemu wg J. Iversena (1936) poddano próby 54—57 z otworu G2 i próbę 54 z sondy G28a. W próbach tych udział materiału pochodzenia trzeciorzędowego, obliczony w stosunku do ogólnej sumy pyłku AP (także i „czwartorzędowych” drzew ciepłolubnych) i pyłku roślin zielnych wynosi od ok. 44% w próbce 57 do 1,9% w próbce 54 z otw. G2. W pozostałych, wyższych poziomach wczesnointerglacialnych sporomorfy egzotyczne występują sporadycznie i udział ich nigdzie nie przekracza 0,5%. Warto jeszcze podkreślić, że krzywe ciepłolubnych drzew „czwartorzędowych” w najniższych odcinkach obydwóch profilów opadają gwałtownie wraz ze spadkiem udziału sporomorf egzotycznych, przerywają się lub wykazują wyraźne minimum występowania (0,5% i mniej) w poziomach, gdzie domieszka egzotyczna spada do 0,3% i mniej, by później znowu wzrosnąć, co jest już naturalną konsekwencją przemian klimatycznych i rozwoju lasów liściastych.

Na tej podstawie do grupy A w sensie J. Iversena (1936), tzn. do grupy zawierającej typy pyłkowe znajdujące się na wtórnym złożu (por. też J. Dyakowska 1956) zaliczono obok form egzotycznych następujące typy „czwartorzędowe” przeniesione bądź z osadów neogénskich, bądź interglacialnych: *Corylus*, *Quercus*, *Tilia*, *Ulmus*, *Acer*, *Fraxinus*, *Carpinus*, *Abies* i *Fagus*; do grupy B natomiast: *Pinus*, *Betula*, *Salix*, *Larix*, *Populus*, *Picea* i *Alnus* oraz pyłek NAP. Dwa ostatnie z wymienionych drzew włączane były przez J. Iversena (1936) i J. Dyakowską (1956) do grupy A. W wypadku interglacialu eemskiego *Picea* nie może być a priori wykluczony z grupy B ze względu na rzeczywisty, obfity udział świerka w lasach wczesnointerglacialnych w niektórych regionach Polski, na Litwie i Białorusi (A. Śröder 1950, Z. Borówko-Dłużakowa i B. Halicki 1957). Ponieważ rozpatrywane spektra rejestrują zbiorowiska leśne klimatu chłodnego, a nie tundrę arktyczną (ob. niżej), nie można również i w przypadku olszy z góry założyć, że pyłek *Alnus* znajduje się w całości na wtórnym złożu. Należy zresztą wziąć jeszcze pod uwagę możliwość wystąpienia pyłku *Alnus incana*, sięgającej dziś daleko na północ po polarną granicę lasu.

Przeliczenie można wykonać dwoma sposobami. W pracy z roku 1936 J. Iversen proponuje przyjęcie sumy sporomorf z grupy A w glinie

zwałowej i spektrach korygowanych za 100% i obliczenie udziału wszystkich składników spektrum w stosunku do tej sumy. Pyłku z grupy B bywa na ogół więcej w późnoglacialnych osadach wodnych — które badał J. Iversen — niż w glinie zwałowej. Ta nadwyżka pyłku ma pochodzić od miejscowej roślinności. Wobec tego od udziału procentowego poszczególnych typów pyłku z grupy B w spektrach poddawanych korygowaniu obliczonych w stosunku do sumy grupy A odejmuje się udział procentowy tychże typów w tak samo obliczonym spektrum z gliny zwałowej. Różnica ma określać ilość pyłku danego typu znajdującą się na złożu pierwotnym. Suma tych nadwyżek staje się nową podstawą dla procentowego obliczenia skorygowanego spektrum (por. J. Iversen 1936, tabele II—IV).

K. Faegri i J. Iversen (1964, str. 121) przedstawiają nieco inny sposób przeprowadzenia rachunku, przy czym założenia pozostają te same. Jest on oparty na następującym rozumowaniu: w glinie zwałowej pyłek grupy A stanowi $N\%$ całego pyłku w niej zawartego. W osadzie późnoglacialnym jego udział jest mniejszy i stanowi $n\%$ pyłku. Zatem miarą zanieczyszczenia osadu pyłkiem pochodzącym z gliny zwałowej może być stosunek $\frac{n}{N}$. Przez odjęcie od udziału procentowego danego

typu pyłkowego z grupy B $\frac{n}{N}$ części udziału tegoż typu w glinie zwałowej otrzymuje się ilość pyłku znajdującą się na złożu pierwotnym. Suma tych różnic stanowi nową podstawę procentowania. Rachunek ten opiera się na założeniu — obowiązującym również i przy zastosowaniu poprzedniego sposobu — że udział redeponowanego pyłku z grupy B w spektrach późnoglacialnych zmniejsza się proporcjonalnie do zmniejszania się udziału sporomorf z grupy A. Jeśli zatem udział danego typu pyłku z grupy B w glinie zwałowej wynosi $p\%$, a w korygowanym spektrum późnoglacialnym $P\%$, przy czym $p < P$, to $p \cdot \frac{n}{N}\%$ tego pyłku znajduje się na złożu wtórnym, na pierwotnym natomiast $(P - p \cdot \frac{n}{N})\%$.

W wypadku, gdy $P = p \cdot \frac{n}{N}$ lub nawet $P < p \cdot \frac{n}{N}$ trzeba przyjąć, że cały pyłek danego typu pochodzi z przeniesienia. Ostatnią czynnością — jak poprzednio — jest sprowadzenie spektrum do nowej postaci procentowej.

W poniższej tabelce przedstawiono przykładowo przeliczenie spektrum 57 z otworu G2. Pozostałe skorygowane spektra, na podstawie których zestawiono dodatkowe, uproszczone diagramy sondy G28a i starszej części osadów z otworu G2 (fig. 5), przeliczono w identyczny sposób.

Oczywiste jest, że takie skorygowane diagramy mogą służyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do interpretacji. Dla przeprowadzenia rachunku wg Iversena trzeba bowiem przyjąć a priori, że pewne rośliny „czwartorzędowe” w danym okresie nie występowały na miejscu i zaliczyć do grupy A, inne włączyć do grupy B, trzeba wreszcie przy-

Przeliczenie metodą J. Iversena spektrum 57 z otw. G2 zanieczyszczonego
redeponowanym materiałem pyłkowym
Recalculation according to J. Iversen's method of the spectrum of sample no. 57
from boring G2 contaminated by redeposited pollen material

	Glina zwałowa Boulder clay %	G2 57 %			
Grupa A — Group A					
<i>Corylus</i>	3.01	1.11	$\frac{n}{N} \frac{37.59}{47.47} = 0.79$		
<i>Quercus</i>	1.86	3.70			
<i>Tilia</i>	0.32	0.37			
<i>Ulmus</i>	2.31	0.62			
<i>Fraxinus</i>	0.13	0.25			
<i>Carpinus</i>	1.22	0.80			
<i>Abies</i>	0.06	0.06			
Sporomorfy egzo- tyczne					
Exotic sporomorphs	38.55	30.66			
Suma grupy A					
Sum of group A	47.47 (N)	37.59 (n)			

	P %	P %	$P \cdot \frac{n}{N} \%$	$P - P \cdot \frac{n}{N} \%$	Spektrum skorygow. Spectrum corrected
Grupa B — Group B					
<i>Pinus</i>	17.51	27.10	13.83	13.27	59.29
<i>Betula</i>	11.67	12.65	9.22	3.43	15.33
<i>Salix</i>	0.51	0.68	0.40	0.28	1.25
<i>Alnus</i>	13.60	9.32	10.74	—	—
<i>Picea</i>	0.26	0.25	0.20	0.05	0.22
<i>Larix</i>	0.06	—	0.05	—	—
<i>Populus</i>	—	0.80	—	0.80	3.58
Pylek NAP					
NAP pollen	8.91	11.60	7.05	4.55	20.32
Suma grupy B	52.52	62.40			
Sum of group B					
Suma grupy A i B					
Sum of groups A+B	99.99	99.99		22.38	100.00
Liczono ziaren					
Pollen grains counted	1559	1620			

jąć, że w obrębie grupy A proporcje między ilością sporomorf trzeciorzędowych i pyłku „czwartorzędowych” drzew ciepłolubnych są takie same w glinie zwałowej jak w piasku, z którego pochodzą korygowane spektra. Zwłaszcza to ostatnie założenie nie zawsze musi być zgodne z rzeczywistością, o czym świadczy np. spektrum z otw. G2, gdzie pyłku

„czwartorzędowych” drzew ciepłolubnych jest względnie więcej w stosunku do pyłku trzeciorzędowego niż w glinie zwałowej i sąsiednich próbach poddanych korygowaniu.

V. UWAGI O NIEKTÓRYCH TYPACH SPOROMORF

Oznaczenia sporomorf dokonywane były na podstawie porównania ze współczesnym materiałem porównawczym. Przy wydzielaniu typów pyłkowych w obrębie niektórych rodzin posługiwano się znanymi kluczami i opracowaniami morfologicznymi. I tak pyłek *Rosaceae*, *Ranunculaceae*, *Caryophyllaceae*, *Papilionaceae* oznaczano opierając się głównie o klucz K. Faegriego i J. Iversena (1964), *Ericaceae* — głównie na podstawie klucza S. Nilssona i J. Radwana Pragłowskiego (1963), *Compositae* — przede wszystkim w oparciu o opracowanie G. Erdtmanna, B. Berglunda i J. Pragłowskiego (1961). Oznaczenia uzyskane z pomocą tego typu kluczy były stale kontrolowane przez porównywanie z materiałem porównawczym.

Poniżej zamieszczono uwagi dotyczące morfologii i występowania niektórych typów pyłku bardziej interesujących z różnych punktów widzenia.

Betula

W celu zbadania możliwości ewentualnego rozpoznania obecności pyłku brzozy z sekcji *nanae* wykonano w dolnej części profilu pomiary wielkości ziarn pyłku *Betula* w pięciu próbach z profilu G2 i dwóch próbach z sondy G28a. Użyto okularu pomiarowego $8\times$ o najmniejszej odległości pomiędzy liniami okularowymi $1,8\mu$ przy pow. $480\times$. W każdej z prób zmierzono co najmniej 100 ziarn.

Wielkość ziarn pyłku brzozy w próbach pochodzących z najniższej części profilu waha się od $19,8$ do $39,6\mu$ (wyjątkowo do 45μ), zakres zmienności wynosi zatem $19,8\mu$ ($25,2\mu$). Wartości te są większe niż podawane na ogół w literaturze (J. Jentys-Szaferowa 1928, G. Erdtman 1943, O. Eneroth 1951, S. T. Andersen 1961), wykazują jednak znaczną zgodność z wartościami podanymi przez K. Wasylikową (1964) z późnego glacjału w Witowie. Trzeba przypomnieć, że próby z Głównicy, podobnie jak próby z Witowa, macerowane były metodą KOH i acetolizy.

W krzywych frekwencji wielkości pyłku *Betula* w dolnej części profilu głównicyńskiego zaznaczają się zasadniczo cztery wierzchołki: przy 27μ , $28,8\mu$, $30,6\mu$ i $32,4\mu$. Dla prób 55, 56 i 57 z profilu G2 otrzymano krzywe dwuwierzchołkowe lub do dwuwierzchołkowych zbliżone. W próbie 57 „lewy” wierzchołek przypada przy 27μ , „prawy” przy $30,6\mu$, w próbie 56 obydwa wierzchołki przesunięte są odpowiednio o jedną klasę w prawo. W próbie 55 oprócz wierzchołka przy $30,6\mu$ występuje jeszcze mały wierzchołek przy 36μ . Pozostałe próby reprezentowane są przez krzywe mniej lub bardziej wyraźnie jednowierzchołkowe.

Materiał pyłkowy w trzech najniższych próbach z otworu G2 jest silnie zanieczyszczony domieszką pyłku znajdującego się na wtórnym złożu (ob. wyżej). Jak wykazała analiza prób gliny zwałowej, w skład tego materiału przeniesionego z osadów starszych wchodzi także pyłek brzozy. Pomiary pyłku *Betula* w glinie

wykazały przewagę ziarn stosunkowo małych. Wierzchołek krzywej frekwencji wielkości pyłku brzozy z gliny znajduje się przy 27 μ . Biorąc pod uwagę, że znaczna część pyłku *Betula* w próbach 56 i 57 z otw. G2 znajduje się na wtórnym złożu (jak wynika z przeprowadzonego wyżej rachunku odpowiednio ok. 30% i 70%) można przyjąć, że dwuwierzchołkowy rozkład wielkości i przesunięcie krzywych frekwencji wielkości w kierunku wartości mniejszych jest wynikiem przede wszystkim domieszkania pyłku pochodzącego z osadów glacialnych, odznaczającego się mniejszymi wymiarami ziarn. Krzywe frekwencji wielkości pyłku *Betula* w poziomach

Wykres 1. Rozkład wielkości pyłku *Betula* w dolnej części profilów z Głównicy
Distribution of size of *Betula* pollen in lower parts of profiles at Głównicy

w nieznacznym tylko stopniu zanieczyszczonych materiałem obcym są jednowierzchołkowe z wierzchołkami przy 30,6 lub 32,4 μ . Nie ma zatem podstaw do stwierdzenia obecności we wczesnointerglacialnym materiale pyłkowym ziarn pyłku brzozy z sekcji *nanae* (*Betula nana*, *B. humilis*).

Populus

Do rodzaju *Populus* zaliczono ziarna pyłku o kształcie zbliżonym do kulistego, odznaczające się delikatną egzyną ok. 1 μ grubości, pokryte gęsto i dość regularnie małymi brodawkami (ob. Tabl. I, fot. 1—3). Wielkość ziarna waha się od 27 do 39,6 μ (średnia z 20 pomiarów 34,5 μ), zakres zmienności jest więc najbliższy współczesnym ziarnom pyłku *Populus tremula* (por. H. J. Beug 1963, str. 25).

Taxus

Bezotworowe ziarna pyłku o dość grubej (ok. $1,5\mu$) egzynie, pokryte gęsto wyrostkami typu gemm rozmaitej wysokości, w niektórych miejscach z wydłużonymi maczużkowato wyrostkami do 1μ wysokości zaliczono do rodzaju *Taxus* (ob. Tabl. I, fot. 4—6). Wielkość ziarn pyłku *Taxus* w materiale z Głównicy waha się od $28,8$ do 36μ (średnia z 15 pomiarów $30,6\mu$). Wg. J. Radwana Pragłowskiego (1963) średnica ziarn pyłku cisa wynosi ok. 30μ , wg H. J. Beuga (1963) waha się od $19,3$ do $29,8\mu$.

Juniperus

Cienkościenne, na ogół pęknięte ziarna pyłku jałowca oznaczano na podstawie obecności nieregularnie i rzadko rozmieszczonych wyrostków typu gemm, dobrze widocznych zarówno na powierzchni, jak i na brzegu ziarna. U wielu ziarn stwierdzono występowanie zaledwie kilku lub kilkunastu gemm na powierzchni ziarna (ob. Tabl. I, fot. 7—9).

Ulmus

W obrębie pyłku wiązu wyróżniono za K. Faegrim i J. Iversenem (1964, str. 190) typy A i B (ob. Tabl. I, fot. 14 i 15). Typ A cechuje wyraźniejsza skulptura, zgrubiałe pierścienie wokółporowe i kształt zbliżony do wielobocznego. Delikatniejsza skulptura i kształt okrągły w rzucie biegunowym charakteryzują typ B. Typ A ma być głównie związany z *Ulmus laevis*, typ B — z *U. campestris*. U *U. scabra* występują obydwa typy (por. też M. Ch. Monoszon 1959).

W profilu Głównicy przeważa stale typ B nad typem A, przewaga ta jest jednak znacznie wyraźniejsza w młodszej części okresu ciepłego niż w jego części starszej. Może to wiązać się z ilościowymi zmianami w występowaniu poszczególnych gatunków wiązu u schyłku fazy f.

Tilia

Wśród pyłku lipy tylko trzy ziarna stwierdzone w próbach 42, 47 i 48 z otw. G2 charakteryzują się grubą (ok. $2,5\mu$) egzyną i wielobocznymi, nieregularnymi, lejkowatymi zagłębieniami na powierzchni egzyny do ok. 2μ długości. Średnica tych ziarn wynosi ok. 46μ . Morfologicznie należą one do typu *T. platyphyllos* (por. J. Trela 1928, J. Dyakowska 1959, J. Radwan Pragłowski 1963). Pozostałe ziarna o cieńszych ścianach i delikatniejszej rzeźbie zaliczono do typu *T. cordata*.

Fagus

Pojedyncze ziarna pyłku buka stwierdzono nie tylko w najstarszych poziomach profilu Głównicy, gdzie znajdują się z pewnością na wtórnym złożu, ale i w osadach faz g i h, wolnych od niewątpliwych zanieczyszczeń materiałem na wtórnym złożu. Brak pyłku buka uważany był za jedną z cech interglacjału eemskiego odróżniającą osady tego wieku od osadów holocenów (J. Dyakowska 1959). Ostatnio jednak znikome ilości pyłku buka podane zostały znowu z interglacjałów w Górze Kalwarii (M. Sobolewska 1961), Bażantarni koło Elbląga (W. Ołtuśzewski, w: B. Halicki & I. Brodniewicz 1961), Józefowa (M. Sobolewska 1966), Gołkowa (Z. Jańczyk-Kopikowa 1966) i Polanicy-Zdroju (W. Walczak i P. Szczypek 1966). Drzewo to rosło zapewne w dużym roz-

proszniu i nie tworzyło zwartych lasów analogicznych do młodoholocenijskich i współczesnych lasów bukowych, całkowite jednak negowanie jego występowania w interglacjale eemskim wydaje się niesłusznym.

Ephedra

Prześl była charakterystycznym składnikiem bezleśnej roślinności późnoglacialnej Europy środkowej u schyłku zlodowacenia bałtyckiego i uważana była za swego rodzaju stratygraficzny element wskaźnikowy ostatniego okresu zimnego (V. Kneblova 1958a, str. 4). W Czechosłowacji występowała także w okresie przedostatniego zlodowacenia (V. Kneblova 1958a i 1958b), a ostatnio została wykryta w późnym (Józefów, M. Sobolewska 1966) i wczesnym (Gołków, Z. Janczyk-Kopikowa 1966) interglacjale eemskim w Polsce. Prawdopodobnie i w Polsce występowała także w okresie zlodowacenia środkowopolskiego (J. Niklewski 1966). W osadach interglacialnych z Głównicy stwierdzono występowanie prześli zarówno we wczesnych, jak i schyłkowych fazach rozwoju roślinności interglacialnej. Można za H. J. Beugiem (1963) wyróżnić dwa typy:

typ *distachya* — z bruzdami zygzakowatymi (Tabl. I, fot. 11); należeć tu mogą *Ephedra distachya* L. i *E. maior* Host,

typ *fragilis* — z bruzdami prostymi (Tabl. I, fot. 12), reprezentujący *Ephedra fragilis* Desf.

M. Welten (1957) wiąże typ *distachya* z *E. distachya* L. i *E. nebrodensis* Tineo (= *E. maior* Host), typ *fragilis* głównie z *E. fragilis* Desf. var. *campylopoda* C. A. Meyer i *E. strobilacea* Bunge. Cechą odróżniającą od *E. fragilis* Desf. var. *Desfontaini* Poiret może tu być zupełnie prosty przebieg żeber (por. M. Welten tab. 2, fig. 19—20), od *E. strobilacea* — brak jasnego pasa biegnącego środkiem żebra (M. Welten 1957, ryc. 3 i tab. 3, fig. 41 oraz 46—54).

Vitis

W próbie 45 z profilu G2 stwierdzono w czasie przeglądania preparatu po przeliczeniu nieco ponad 1000 ziarn AP jedno ziarno reprezentujące rodzaj *Vitis*, oznaczone na podstawie porównania z pyłkiem współczesnego *Vitis silvestris*. Jest to ziarno prawie kuliste (*prolato sphaeroides*) o wymiarach $24 \times 23,2 \mu$, trójbruzdowoporowe, o zarysie okrągłotrójkątnym w rzucie biegunowym, z aperturami umieszczonymi na wierzchołku trójkąta (*goniotreme*). Bruzdy z rąbkiem (*margo*) i krótkimi żebrami (*costae colpi*), pory okrągłe, nakryte, o średnicy ok. 2μ . Bruzdy w okolicy równika biegną mniej więcej prosto, w odległości ok. $\frac{1}{3}$ odstępu między równikiem a biegunami łukowato załamują się ku biegunom. Przestrzeń wokółbiegunowa (*apocolpium*) ok. 4μ średnicy. Egzyna na równiku cieńsza (ok. $0,8 \mu$), na biegunie grubsza (ok. $1,8 \mu$), powierzchnia jej pokryta nieregularną siatką słabo zaznaczoną na powierzchniach międzybruzdowych (*mesocolpia*), bardzo wyraźną, wystającą na ok. $0,8 \mu$ ponad powierzchnię ziarna — na przestrzeniach wokółbiegunowych (*apocolpia*).

Stwierdzenie pyłku *Vitis* w osadach eemskich jest raczej nieoczekiwane. *Vitis silvestris* w postaci nasion znajdowany był dotychczas w plej-

stocenie Polski najpóźniej w interglacjale wielkim (M. Brem 1953, M. Sobolewska 1954 i 1956b oraz ostatnio A. Środoń 1965). Uważany jest za jeden z elementów odróżniających interglacjal wielki od eemskiego (A. Środoń 1962 i 1965). Poziom z pyłkiem *Vitis* w Głównicy przypada na fazę najpełniejszego rozwoju dąbrów i lasów typu lęgowego (ob. niżej). Ten odcinek profilu nie zawiera już zupełnie żadnych niewątpliwych domieszek na wtórnym złożu. Znalezienie jednak tylko jednego ziarna pyłku nie popartego materiałem makroskopowym pozwala wyłącznie na zasygnalizowanie jego obecności bez wyciągania dalej idących wniosków co do przynależności winorośli do flory interglacjal eemskiego w Polsce.

Buxus

Trzy ziarna identyczne ze współczesnym pyłkiem *Buxus sempervirens* stwierdzone zostały w próbach 25, 27 i 29 z otw. G2. Są to ziarna o kształcie zbliżonym do kulistego o wymiarach $32,4 \times 36 \mu$ i $36 \times 41,4 \mu$, każde z 16 porami o średnicy ok. $3,5 \mu$ rozmieszczonymi na całej powierzchni ziarna. Grubość egzyny wynosi ok. $2,5 \mu$. Pałeczki (*columellae*) tworzą na powierzchni ziarna siatkę o niezupełnie jednakowych oczkach. Pory zbliżone kształtem do okrągłych, wyraźnie odgraniczone od siatkowatej pozostałej powierzchni ziarna, ale bez pierścienia.

Ta atlantycko-śródziemnomorska roślina była sygnalizowana z fazy g interglacjal eemskiego w Cambridge (H. Godwin 1956), oraz — co ważniejsze — z utworów eemskich w miejscowości Gánovce w północno-wschodniej Słowacji (V. Kneblva 1958a). Gánovce znajdują się wprawdzie daleko na południe od Mazowsza, na południowych stokach Tatr, położone są jednak na wysokości 650 m n.p.m. i podlegały w interglacjale — jak podlegają i dziś — wpływom klimatu górskiego. Okoliczność ta czyni prawdopodobiejszym występowanie bukszpanu na zachodnim Mazowszu w interglacjale eemskim.

Orientacyjne dzisiejsze dane klimatyczne dla Mazowsza i północnej Słowacji przedstawiają się następująco:

	śr. temp. roczna	śr. temp. stycznia	śr. temp. lipca	śr. suma opadów rocznych
Warszawa	7,8°	—2,9°	18,6°	530 mm
Spiska Nowa Wieś	6,7°	—5,8°	17,3°	641 mm

Polypodiaceae

Spory paproci z rodziny *Polypodiaceae* w przytłaczającej większości pozbawione były peryny i nie można było ich bliżej oznaczyć. W starszej części interglacjal znaleziono wyjątkowo trzy zarodniki z zachowaną skulpturą. Jeden z nich morfologicznie zbliżony jest do *Dryopteris*, pozostałe do *Cystopteris fragilis* ssp. *eufragilis* i *Asplenium*.

Obecność tych dwóch zarodników jest dość zaskakująca, ponieważ zarówno *Cystopteris fragilis*, jak i gatunki z rodzaju *Asplenium* występują dziś na podłożu skalistym.

Tabela 3 - Table 3

Tabela pyłkowa wiercenia G2

Pollen table of borehole G2

Numer próby Number of sample	Głębokość w m Depth in m	Popielność w % Contents of ash, in %	Zawartość piasku w % Contents of sand, in %	AP	NAP	Pyłek roślin wod. i błot. Pollen of water and swamp plants	Spory	Spores	Pyłek na wtórnym złożu Pollen on secondary bed	Pinus	Picea	Betula	Populus	Larix
20	1,8-1,9	73	0,8	69,0	31,0	1,1	9,4	0,1		53,5	3,4	6,9	-	+
21	1,9-2,0	73	1,0	72,0	28,0	0,9	7,1	-		56,7	3,7	7,4	-	-
22	2,0-2,1	67	0,5	76,2	23,8	1,2	8,8	-		58,3	4,9	7,4	-	-
23	2,1-2,2	53	1,0	78,4	21,6	0,9	8,1	-		60,5	5,1	6,9	-	-
24	2,2-2,35	42	0,6	88,5	11,5	0,5	4,4	-		57,2	12,8	8,9	-	+
25	2,35-2,5	9	0,3	93,8	6,2	2,3	0,8	-		33,2	25,1	11,5	0,1	-
26	2,5-2,65	18	3,0	90,6	9,5	1,8	0,7	-		10,4	10,3	3,7	-	-
27	2,65-2,8	8	0,6	89,8	10,2	0,4	0,9	-		11,9	6,1	5,5	-	-
28	2,8-2,9	9	0,9	91,1	8,9	0,6	4,4	-		3,9	6,2	0,9	-	-
29	2,9-3,0			92,0	8,0	0,2	0,6	-		2,1	1,7	1,9	-	-
30	3,0-3,1	10	2,3	88,0	12,0	3,1	1,7	-		1,9	0,7	1,0	-	-
31	3,1-3,15			90,6	9,4	0,6	1,0	-		2,5	1,1	0,5	-	-
32	3,15-3,2	5		94,4	5,7	0,1	0,1	-		2,0	0,1	0,7	-	-
33	3,2-3,3			95,2	4,8	0,1	0,1	-		1,6	0,2	0,2	-	-
34	3,3-3,4	5	0,8	90,2	9,8	0,9	1,8	-		1,0	0,3	13,8	-	-
35	3,4-3,45			88,8	11,2	0,3	1,3	-		2,9	0,8	0,8	-	-
36	3,45-3,5	4		93,2	6,8	0,6	1,2	-		1,4	0,1	4,1	-	-
37	3,5-3,6			94,6	5,4	0,3	0,5	-		2,0	0,4	0,6	-	-
38	3,6-3,7	4	0,2	93,3	6,7	0,8	1,6	-		0,6	-	0,6	-	-
39	3,7-3,8			93,9	6,1	0,4	1,7	-		1,4	0,4	0,8	-	-
40	3,8-3,9	4	0,4	95,6	4,4	-	0,2	-		1,3	0,2	-	-	-
41	3,9-4,0			92,0	8,0	2,4	173,6	-		3,0	0,4	0,4	-	-
42	4,0-4,1	7	0,4	92,5	7,6	2,0	40,8	-		2,1	0,1	0,6	-	-
43	4,1-4,2	49	4,3	97,7	2,3	1,2	6,4	-		6,3	0,1	1,8	-	-
44	4,2-4,3	46	2,1	96,2	3,8	1,8	6,8	-		10,9	0,1	2,8	-	-
45	4,3-4,4	59	1,7	94,7	5,3	4,2	13,0	-		19,1	+	6,0	-	-
46	4,4-4,5	59	2,0	94,3	5,7	2,9	13,9	-		19,3	-	6,9	-	-
47	4,5-4,6	51	1,0	93,5	6,5	2,1	4,1	-		17,0	+	4,2	0,1	-
48	4,6-4,7	54	0,7	93,3	6,7	3,7	5,1	0,1		17,0	+	5,1	-	-
49	4,7-4,8	65	0,2	92,5	7,5	3,6	8,0	-		35,6	+	22,5	0,2	-
50	4,8-4,9	53	0,2	93,4	6,7	2,1	8,8	-		41,6	+	21,9	0,4	-
51	4,9-5,0	57	0,4	93,8	6,2	1,0	6,7	0,1		41,6	+	23,3	0,2	-
52	5,0-5,1	76	0,2	92,1	7,9	0,3	3,0	0,3		36,8	0,1	50,9	1,2	-
53	5,1-5,2	75	0,4	93,6	6,4	0,8	3,6	0,1		37,6	0,1	53,9	0,3	-
54	5,2-5,3	98	19,1	92,7	7,3	0,5	1,5	1,9		81,9	0,2	8,1	+	-
55	5,3-5,4		23,4	92,3	7,7	0,9	2,4	4,9		74,0	+	10,3	1,3	-
56	5,4-5,65		25,5	88,2	11,8	1,5	12,1	16,9		36,8	0,2	25,7	0,6	0,1
57	5,65-5,9		25,5	83,5	16,5	2,9	13,3	43,5		38,5	0,4	18,0	1,1	-

Tabela 3 c.d. - Table 3 cont.

Numer prób Number of sample	Quercus	Ulmus				Acer	Corylus	Tilia platyphyllos	Tilia cordata	cf. typ Pirus	typ Prunus	Malus	Taxus	Carpinus	Fagus
		typ A type A	typ B type B	ogółem in all											
20	0,1	+	+	+	-	-	0,1	-	+	+	-	-	-	2,4	-
21	0,1	-	+	+	-	-	0,1	-	+	-	-	-	-	2,0	-
22	0,4	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	2,5	-
23	0,5	+	+	+	-	+	0,2	-	+	-	-	-	-	2,2	0,1
24	1,7	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	3,7	-
25	1,8	0,1	0,2	0,3	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	11,0	-
26	1,5	-	0,1	0,1	-	-	3,4	-	0,1	-	-	-	0,1	44,1	-
27	2,1	-	0,4	0,4	0,1	0,1	3,1	-	0,2	-	-	-	-	47,2	-
28	1,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	26,5	-	0,6	-	-	-	0,2	41,8	-
29	1,4	-	0,7	0,7	0,2	0,2	13,9	-	0,9	-	-	-	0,2	60,9	-
30	1,9	0,3	1,5	1,7	-	-	20,0	-	2,8	-	-	-	0,1	47,2	-
31	1,5	0,1	1,2	1,3	0,2	0,2	26,0	-	6,2	-	-	-	0,3	41,9	-
32	1,0	0,2	1,2	1,2	0,4	0,4	21,4	-	3,9	-	-	-	-	55,3	-
33	0,8	0,4	0,4	0,7	0,1	0,1	20,0	-	2,2	-	-	-	-	59,7	-
34	2,7	0,1	1,3	1,4	0,2	0,2	20,1	-	4,7	-	-	-	0,4	36,1	-
35	2,0	0,1	0,8	0,9	0,4	0,4	22,1	-	10,4	-	-	-	-	36,8	-
36	2,0	0,1	1,4	1,5	0,4	0,4	21,7	-	4,1	-	-	-	-	46,5	0,1
37	1,3	0,2	0,7	0,9	0,4	0,4	25,3	-	6,9	-	-	-	-	44,5	-
38	3,9	0,1	0,5	0,6	0,3	0,3	34,4	-	8,4	-	-	-	0,2	34,0	-
39	4,2	0,6	2,4	3,0	0,2	0,2	43,8	-	5,1	-	-	-	-	25,9	-
40	3,2	0,5	1,0	1,5	0,7	0,7	51,1	-	8,1	-	-	-	+	19,9	-
41	4,2	0,6	2,1	2,7	0,4	0,4	51,0	-	10,5	-	-	-	-	7,3	-
42	5,0	0,6	1,0	1,6	0,2	0,2	54,0	+	12,4	-	-	-	0,1	4,1	-
43	28,2	1,0	1,1	2,1	0,2	0,2	52,3	-	0,2	-	+	+	-	+	-
44	44,3	0,9	1,2	2,1	0,4	0,4	24,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-
45	47,7	0,6	1,7	2,3	0,5	0,5	9,7	-	-	-	-	-	-	0,2	-
46	48,8	0,4	1,7	2,2	0,3	0,3	8,2	-	+	-	-	-	-	-	-
47	54,1	1,1	1,6	2,7	0,2	0,2	5,8	+	+	-	-	-	-	+	-
48	60,7	0,7	2,3	3,0	0,1	0,1	3,0	+	+	-	-	-	-	+	-
49	28,4	0,8	1,8	2,5	0,1	0,1	1,0	-	-	-	-	-	-	0,1	-
50	25,9	0,6	1,0	1,5	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
51	25,4	0,8	1,8	2,6	+	+	0,1	-	-	-	+	-	-	+	-
52	1,6	+	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	0,4	0,1	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
54	0,6	0,1	0,2	0,3	-	-	0,6	-	0,1	-	-	-	-	0,2	+
55	0,9	+	0,4	0,4	-	-	1,4	-	0,2	-	-	-	-	0,1	0,1
56	4,7	1,2	1,9	3,1	+	+	5,9	-	1,0	-	-	-	-	1,9	+
57	5,3	0,4	2,0	2,4	-	-	1,6	-	0,5	-	-	-	-	1,1	-

Tabela 3 c.d. - Table 3 cont.

Number of sample	Abies	Fraxinus	Alnus	Salix	Ephedra typ distachya	Ephedra typ fragilis	Helianthemum typ oelandicum	Helianthemum typ nummularium	Hippophae	Saxifraga typ oppositifolia	Juniperus	Gramineae	Cyperaceae	Artemisia
20	0,4	-	1,8	0,4	-	-	+	-	-	-	10,5	6,7	9,4	1,8
21	0,1	0,1	1,6	0,3	-	-	-	-	-	-	11,4	3,5	9,2	1,6
22	0,3	-	2,1	0,2	-	-	+	-	-	-	5,1	4,0	12,1	0,5
23	0,5	-	2,4	0,1	-	+	-	-	-	-	6,0	4,1	9,3	0,6
24	1,3	-	2,9	0,1	-	-	-	-	-	-	0,7	2,5	6,7	0,4
25	3,8	+	6,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,4	+
26	3,2	0,1	12,4	0,7	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,0	-
27	1,5	0,3	11,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,4	-
28	1,2	0,3	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	6,8	+
29	+	0,2	7,7	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,5	7,1	+
30	0,1	1,1	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	11,0	0,1
31	+	0,2	8,3	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,2	8,3	0,1
32	0,1	0,4	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	4,9	-
33	-	0,8	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	4,6	-
34	0,2	0,3	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	8,0	-
35	-	0,7	10,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	9,4	0,3
36	-	0,5	10,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	6,0	0,1
37	-	0,4	12,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,4	4,4	-
38	0,1	1,4	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	3,7	0,1
39	-	1,8	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	4,7	0,2
40	+	1,5	8,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	3,3	-
41	-	3,2	8,7	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,2	6,4	0,1
42	-	2,3	9,9	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,9	6,4	+
43	-	4,7	1,8	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,3	0,4
44	-	9,1	1,7	+	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,2	0,3
45	-	8,3	0,8	0,1	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,5	0,4
46	0,1	7,7	0,6	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	2,0	2,1	0,4
47	-	9,2	0,3	+	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,1	0,3
48	+	4,0	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	0,1	2,7	2,2	0,3
49	-	1,4	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	3,5	2,1	0,6
50	-	1,4	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	0,1	3,2	1,8	0,9
51	-	+	+	0,7	-	-	-	-	-	-	-	3,2	2,4	0,3
52	-	-	-	1,0	+	+	-	-	-	+	+	2,2	3,4	1,6
53	-	+	0,2	0,3	+	+	-	-	-	0,1	0,1	1,6	2,5	0,9
54	-	-	0,6	0,2	+	-	-	-	-	-	0,6	2,4	2,7	0,9
55	-	+	3,7	0,1	-	-	-	-	+	-	0,6	2,5	1,9	1,1
56	-	0,2	7,6	0,4	-	-	0,1	-	-	-	1,0	4,4	1,9	1,1
57	0,1	0,4	13,3	1,0	-	-	-	-	-	-	1,1	6,7	3,7	0,5

Tabela 3 c.d. - Table 3 cont.

Numer proby Number of sample		Rosaceae								Labiatae			Ranunculaceae							
Umbelliferae		Pleurosperum		ogolem bez Comarum i Filipendula in all, without Comar. and Filip.		Agrimonia	typ Geum	typ Potentilla	typ Rosa	typ Rubus	ogolem in all	typ Mentha	typ Stachys	Rubiaceae	ogolem bez Caltha i Thalictrum in all, without Caltha and Thal.	typ Aconitum	typ Anemone	typ Ranunculus	Thalictrum	Eriaceae ogolem bez Calluna Ericaceae in all, without Calluna
20	0,4	+	+	0,1	+	+	0,1	+	+	0,1	-	-	-	0,2	0,1	+	-	0,1	0,1	0,2
21	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	+	-	-	+	0,1	0,1
22	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1	+	+	-	-	-	0,1	+	-	-	+	0,2	0,5
23	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-	0,1	0,1	-	+	-	-	-	0,2	+	-	-	+	0,1	0,3
24	+	-	-	0,2	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3
25	+	-	-	0,1	-	-	+	-	0,1	-	+	+	-	-	0,4	-	-	0,4	-	0,2
26	0,4	-	-	0,3	-	-	0,3	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,5	-	-	0,5	-	0,4
27	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	1,4
28	0,3	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-	0,2	-	0,1
29	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-
30	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
31	0,4	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
32	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
35	0,3	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
36	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
37	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
38	0,3	-	-	1,5	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
40	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	+	-	-	+	-	-
44	0,1	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	+	-	-
47	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-
48	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-
49	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	-
50	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-
51	+	-	0,1	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	0,2	-	-	0,2	+	+
52	0,2	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	0,3	-
53	0,2	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+	0,4	-	-	0,4	0,3	-
54	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0,1	-	-	0,1	0,1	0,2
55	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	0,3	0,3
56	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	0,2	-	1,6
57	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,2	2,5

Tabela 3 c.d. - Table 3 cont.

Numer próby Number of sample	Ericaceae						Compositae Tubuliflorae							Papilionaceae				
	typ Androneda	typ Erica	typ Vaccinium	typ Ledum	Calluna	Drosera	Chenopodiaceae	ogółem in all	Cirsium	cf. Centaurea	typ Aster	typ Anthemis	typ Helianthus	Compositae Liguliflorae	Scorzonera humilis	ogółem in all	typ Lotus	typ Genista
20	-	-	+	0,1	0,3	+	0,3	0,4	+	-	-	0,3	0,1	0,1	-	0,1	-	-
21	-	-	+	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	+	-	-	0,2	0,2	+	-	+	-	-
22	-	-	0,2	-	0,5	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,1	+	-	-	-	-
23	-	+	+	0,2	0,3	-	0,1	0,2	0,1	-	-	0,1	0,1	+	-	+	-	-
24	0,1	-	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
25	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
26	-	-	0,2	0,1	0,2	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
27	-	-	+	0,2	0,1	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
29	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	+	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	0,2	+	-	-	+	0,2	+	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	+	0,1	+	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	0,1	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	0,3	0,1	-	-	-	+	0,1	-	-	0,1	-	0,1
49	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	-	+	0,1	+	-	+	-	+
50	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
51	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-
52	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	+	-	0,1	+	+	+	-	0,1	-	0,1
54	-	-	-	-	0,1	-	0,3	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-
55	-	-	-	-	0,1	-	0,1	+	+	-	-	+	+	0,1	-	-	-	-
56	-	-	-	-	0,1	-	+	0,2	-	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-	-
57	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	0,1	0,2	0,3	-	+	+	-

Tabela 3 c.d. - Table 3 cont.

Numer próby Number of sample	Papilionaceae		Caryophyllaceae							Cruciferae	Plantago typ media	Plantago typ lanceolata	Polygonum typ bistorta	Polygonum typ aviculare	Polygonum typ convolvulus	Polygonum typ persicaria	Rumex	Urtica	Valeriana	Campanula
	typ Vicia	typ Trifolium	ogłosz in all	typ Cerastium	typ Gypsophila	typ Dianthus	typ Lychnis													
20	0,1	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	+	+	+	+	+	+	0,1	0,1	0,1	+
21	+	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	+	+	+	+	+	+	0,2	0,3	+	+
22	+	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	+	+	0,1	+	+	+	0,1	+	+	+
23	+	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24	+	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
26	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
27	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
29	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
30	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
32	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,1	+	+
33	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
34	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
35	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,1	+	+	+
36	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
37	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
38	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
39	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
40	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
41	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
42	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
43	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
44	+	+	0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
45	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
46	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
47	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
48	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
49	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,1	+	+
50	0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
51	+	+	0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,1	+
52	+	+	0,1	+	+	0,1	+	0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,1	+
53	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
54	+	+	+	+	+	+	+	0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
55	+	+	+	+	+	+	+	0,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,1
56	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	+	0,1	0,3	+	+
57	+	+	+	+	+	+	+	0,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,1	0,1	+

Tabela 3 c.d. - Table 3 cont.

[illegible]

Tabela 3 c.d. - Table 3 cont.

Number of sample	Rhus	Vitis	Stellaria holostea	Oxalis	Mercurialis	Potamogeton	Myriophyllum verticillatum	Myriophyllum spicatum	Myriophyllum alternifolium	Butomus	Hydrocharis	Utricularia	Nuphar	Nymphaea	Salvinia	Stratiotes	Pyłek roślin wodnych	Pollen of water plants
20	-	-	-	-	-	0,1	+	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
21	-	-	-	-	-	0,3	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
22	-	-	-	-	-	0,4	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
23	-	-	-	-	-	0,4	+	+	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,5	
24	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	
25	-	+	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	
26	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	
27	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2	
28	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,4	
29	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,2	-	0,4	
30	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	-	2,8	
31	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
32	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
33	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
34	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	
35	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
36	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2	
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
39	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,1	0,1	-	1,4	
42	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	+	1,8	-	0,1	1,9	
43	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,1	0,1	0,9	
44	-	-	+	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,4	0,5	0,1	1,3	
45	-	-	-	-	-	0,6	+	+	-	-	-	-	0,3	0,3	1,9	0,1	3,0	
46	-	-	-	-	-	0,4	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,8	0,5	0,4	2,3	
47	-	-	-	-	-	0,7	+	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,1	0,2	1,4	
48	-	-	-	-	-	1,7	+	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,2	0,1	2,5	
49	-	-	-	-	-	0,6	0,1	-	-	0,1	0,1	-	0,3	0,8	-	+	1,9	
50	-	-	-	-	-	0,7	+	-	-	-	-	-	0,2	0,5	-	0,2	1,6	
51	-	-	-	-	-	0,5	+	+	-	-	-	-	+	0,2	-	-	0,7	
52	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	+	0,2	
53	-	-	-	-	-	0,3	+	-	-	0,1	-	-	0,1	+	-	-	0,5	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,2	
55	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	0,2	
56	-	-	-	-	-	0,4	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	+	-	-	0,6	
57	-	-	-	-	-	0,6	0,1	+	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,8	

Tabela 3 c.d. - Table 3 cont.

Numer próby Number of sample	Sparganium-Typha angustifolia	Typha latifolia	Scheuchzeria	Menyanthes	typ Caltha	Pilipendula	Lythrum	Sagittaria	Alisma	Triglochin	Calla	Comarum	Pyłek roślin szuwar. i błotn. Pollen of plants of lake edge and swamps	Pedicularis	Equisetum	Lycopodium annotinum	Lycopodium clavatum
20	0,5	0,1	-	+	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,9	2,8	+	-	-
21	0,2	-	0,1	+	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,6	9,8	+	+	-
22	0,4	+	-	-	-	+	-	-	-	0,2	-	0,1	0,6	9,5	-	+	-
23	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	8,1	+	+	-
24	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	5,9	-	-	-
25	0,1	0,1	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	+	-
26	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	+	+	1,5	0,1	-	-	-
27	+	-	-	-	+	-	-	-	-	0,3	+	+	0,3	-	-	-	-
28	0,2	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0,2	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,1	-
31	+	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	0,3	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	0,5	-	0,1	-	-
35	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-
36	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,1	-	-
37	0,2	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
38	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6	0,1	-	-	-
39	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	0,9	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,1	-	-	-
42	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
43	+	0,4	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-
44	+	0,4	-	0,1	-	-	-	-	+	-	-	-	0,5	-	-	-	-
45	0,5	0,4	-	-	-	+	+	-	0,2	0,1	-	-	1,1	0,2	-	-	-
46	0,4	0,2	-	-	-	-	+	0,1	0,1	-	-	-	0,7	-	-	-	-
47	0,2	0,4	-	-	-	+	-	0,1	+	-	-	-	0,6	+	-	-	-
48	0,3	0,5	-	-	-	-	0,1	+	0,1	0,2	-	-	1,2	0,1	-	-	-
49	0,6	0,2	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,7	-	+	1,7	0,2	-	-	-
50	0,2	0,1	-	-	-	+	-	-	-	0,2	-	-	0,5	0,2	-	-	-
51	0,3	+	-	-	+	-	-	+	-	0,1	-	-	0,4	0,2	-	+	-
52	0,1	0,1	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	0,2	0,1	-	-	-
53	+	0,3	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	0,3	+	+	-	-
54	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,3	3,2	-	-	-
55	0,4	+	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	0,7	2,0	+	-	+
56	0,7	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,9	3,6	0,2	-	0,1
57	2,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	8,3	0,2	-	+

Tabela 3 c.d. - Table 3 cont.

Numer próby Number of sample	Lycopodium complanatum	Lycopodium inundatum	Lycopodium selago	Selaginella selaginoides	Polypodiaceae	Cystopteris fragilis	Polypodium vulgare	cf. Dryopteris	Pteridium	Ophioglossum	Osmunda	Sphagnum	varia	Pyłek zniszczony Damaged pollen	Liczono AP AP grains counted	Liczono ogółem All spores counted
20	-	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	8,8	+	0,2	1097	1757
21	-	+	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	7,0	+	0,2	1084	1626
22	-	+	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	8,2	0,7	0,2	1038	1499
23	-	+	-	-	0,3	-	-	-	-	0,1	+	7,7	0,2	+	1023	1421
24	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,1	-	-	3,9	0,1	0,3	1055	1251
25	-	-	-	-	0,6	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,4	1117	1227
26	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	0,1	-	4,3	1064	1204
27	-	-	-	-	0,7	-	-	-	0,1	-	+	0,1	0,1	0,1	1030	1161
28	-	-	-	-	4,1	-	-	-	0,1	-	-	0,4	0,1	2,0	1008	1162
29	-	-	+	-	0,4	-	-	-	+	-	-	0,2	0,1	2,3	1162	1273
30	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	1010	1202
31	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1000	1122
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	1036	1100
33	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1036	1090
34	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,1	-	-	0,6	0,1	2,4	1050	1195
35	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,7	1005	1150
36	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	3,1	1014	1108
37	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	-	2,5	1038	1105
38	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,1	1009	1117
39	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	0,1	3,5	1006	1092
40	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1027	1076
41	-	-	-	-	173,6	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,7	1058	3172
42	-	-	-	-	40,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1004	1551
43	-	-	-	-	6,4	-	-	-	+	-	-	-	0,1	0,1	1027	1131
44	-	-	-	-	6,8	-	-	-	+	-	-	-	-	0,6	1140	1286
45	-	-	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1011	1185
46	-	-	-	-	13,9	-	-	-	+	-	-	+	0,1	0,8	1091	1179
47	-	-	-	-	4,1	-	-	-	+	-	-	+	+	0,6	1039	1352
48	-	-	-	-	5,1	-	-	-	+	-	-	+	+	0,4	1226	1431
49	-	-	-	-	7,8	-	-	-	0,1	-	-	0,1	+	0,2	1218	1469
50	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,2	-	-	+	+	0,3	1151	1366
51	-	-	-	-	6,6	+	-	-	0,2	-	-	+	+	0,2	1271	1461
52	-	-	-	-	3,0	-	-	-	+	-	-	+	+	0,1	1070	1204
53	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	1316	1468
54	0,1	-	+	-	1,2	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	1,5	1152	1287
55	-	+	+	+	1,9	-	-	-	0,1	-	-	0,4	2,6	4,6	953	1117
56	-	-	-	-	11,0	-	-	-	0,2	-	-	0,7	3,2	6,6	1017	1505
57	-	-	-	-	12,3	-	-	0,1	+	-	0,1	0,7	6,1	26,3	952	1822

Табела 4 - Table 4

Табела пыrkowa sondy G28a
Pollen table of profile G28a

Number of sample	Głębokość w m	Depth in m	Popielinosc w %	Contents of ash, in %	AP	NAP	Pyłek roślin wod. i błot.	Spory - Spores	Pyłek na wtórnym złożu	Pinus	Picea	Betula	Populus	Quercus	Ulmus				Acer	Corylus	Tilia cordata	Carpinus	Fagus	Praxinus
							Pyłek roślin wod. i błot.	Spory - Spores	Pyłek na wtórnym złożu						typ A	typ B	ogółem	In all						
39	1,85-1,9	8,0	4,9	354,8	92,0	8,0	Pyłek na wtórnym złożu	+	6,1	-	15,7	-	40,0	0,7	7,0	7,7	+	18,3	0,7	0,9	-	-	1,7	
40	1,9-1,95	5,8	0,9	20,1	94,2	5,8	-	-	58,7	-	10,7	-	22,3	0,2	1,5	1,7	+	0,2	-	-	-	-	2,3	
41	1,95-2,0	5,3	1,8	19,2	94,7	5,3	-	-	60,5	0,2	7,1	0,2	23,5	+	1,1	1,1	-	0,2	-	-	-	-	1,8	
42	2,0-2,05	5,3	0,7	10,8	94,7	5,3	+	+	72,4	-	15,9	-	4,4	0,6	0,4	0,9	-	-	-	-	-	-	0,9	
43	2,05-2,1	7,4	0,9	9,9	92,7	7,4	-	-	72,3	0,2	18,3	+	0,9	+	0,5	0,5	-	-	-	0,2	-	-	0,2	
44	2,1-2,15	7,1	1,4	11,3	92,9	7,1	0,2	0,2	66,5	0,1	28,1	0,3	0,8	+	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	0,1	
45	2,15-2,2	9,2	1,4	11,0	90,8	9,2	-	-	58,9	0,2	28,5	-	0,2	0,4	2,1	2,5	-	+	+	+	+	+	-	
46	2,2-2,25	6,7	1,6	15,3	93,3	6,7	+	+	45,7	+	45,9	0,9	0,2	+	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	
47	2,25-2,3	11,5	1,2	0,7	88,6	11,5	+	+	58,8	0,3	27,0	1,9	+	+	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	+	
48	2,3-2,35	16,0	1,9	0,4	84,0	16,0	0,3	0,3	65,9	0,4	15,1	1,2	0,1	0,1	0,3	0,4	-	0,1	-	0,1	-	-	+	
49	2,35-2,4	14,9	1,2	1,8	85,1	14,9	+	+	50,9	0,3	30,6	1,8	+	+	0,5	0,7	-	+	-	0,2	-	-	-	
50	2,4-2,45	17,0	0,5	1,1	83,1	17,0	+	+	54,7	+	27,5	0,5	0,2	+	0,2	0,2	-	-	-	+	-	-	-	
51	2,45-2,5	12,3	0,7	0,1	87,7	12,3	+	+	76,3	+	10,8	0,4	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
52	2,5-2,55	12,3	0,8	0,5	87,7	12,3	+	+	76,7	+	10,1	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	
53	2,55-2,6	8,1	0,5	1,0	91,8	8,1	+	+	85,6	-	5,7	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
54	2,6-2,65	7,6	0,2	1,6	92,4	7,6	3,6	3,6	82,8	0,2	5,6	-	0,3	0,5	0,2	0,7	-	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	

Tabela 4 c.d. - Table 4 cont.

Number of sample	Alnus	Salix		Sphedra typ distachya	Sphedra typ fragilis	Helianthemum typ oelandicum	Juniperus	Gramineae	Cyperaceae	Artemisia	Umbelliferae	Pleurospermum	ogolem in all	typ Potentilla	typ Rosa	typ Rubus	Labatae typ Mentha	Rubiaceae	typ Ranunculus	Thalictrum	Eriaceae /bez Calluna/ Calluna/without Calluna/	Calluna	Chenopodiaceae	ogolem in all	Cirsium	typ Anthemis	typ Helianthus	Compositae Tubuliflorae
39	0,9	0,2						6,1	0,5	0,5	-								0,2									+
40	0,2	+						2,6	2,1	0,2	+						+		-									
41	0,2	0,2						3,0	1,4	+	+						+		-									
42	+	0,2						3,3	1,3	0,4	+												0,2					
43	+	0,3						4,4	2,4	0,2	+		0,2							+								
44	0,1	0,1						5,3	0,7	0,6	+						+		0,2									+
45	+	0,5					0,2	6,9	1,1	0,5	0,2									+								+
46	+	0,2					0,2	3,3	1,9	0,9	+									+								+
47	+	0,3					+	3,8	5,1	2,2	+									+								+
48	0,1	0,4					0,9	6,5	5,4	1,9	0,3									+	0,1							+
49	0,2	0,5					0,8	4,8	4,3	2,8	0,2									+								+
50	+	+					1,8	7,2	2,8	3,4	0,2									+								+
51	-	0,1					0,1	4,2	4,2	1,8	+		0,3							+	0,1							+
52	0,5	0,5					0,9	3,8	4,8	2,0	+									+	0,3							+
53	0,2	0,2					0,2	2,8	4,5	0,2	+									+	0,2							+
54	2,0	0,2				0,2	2,5	2,8	1,8	+										+	0,2							+

Tabela 4 c.d. - Table 4 cont.

Compositae Liguliflorae	Papilionaceae					Caryophyllaceae					Plantago typ media	Polygonum typ persicaria	Rumex	Valeriana	Epilobium-Chamaenerion	Hypericum	Polemonium	Cornus sanguinea	Synonymus	Humulus	Calystegia	Alburnum	Viscum	Mercurialis	Potamogeton	Myriophyllum verticillatum	Butomus	0,2	
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+	+	+	+	+	+	+	0,2
+	ogzem	typ Viola	typ Trifolium	ogzem	In all	typ Cerastium	typ Dianthus	typ Lychnis	typ Scleranthus	Cruciferae	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0,2	+							

Tabela 4 c.d. - Table 4 cont.

Number of sample	Hydrocharitaceae	Utricularia	Nuphar	Nymphaea	Salvinia	Stratiotes	Pyłek roślin wodnych + Salvinia	Sparganium-Typha angustifolia	Typha latifolia	Menyanthes	Typ Caltha	Ptilipendula	Sagittaria	Alisma	Cornus	Pyłek roślin szumowatych i błot. and swamps	Pedicularis	Selaginella	Polypodiaceae	Asplenium	Sphagnum	Varia	Pyłek zniszczony	Damaged pollen	Liczone AP grains counted	Liczone ogółem	All sporomorphs counted
39	-	-	-	0,2	1,2	-	1,4	1,2	1,9	0,2	0,2	-	0,2	-	-	3,5	-	-	354,5	-	-	-	+	8,5	529	2643	All sporomorphs counted
40	-	-	+	+	0,2	+	0,6	0,2	+	-	-	-	0,2	+	-	0,4	0,4	0,4	20,1	-	-	+	+	0,6	502	644	Liczone AP grains counted
41	-	-	0,4	+	-	0,4	1,1	0,7	+	-	-	-	-	-	-	0,7	0,2	0,2	19,2	-	-	+	+	0,2	532	599	Liczone ogółem
42	-	-	+	0,6	-	+	0,6	+	0,2	-	-	-	+	-	-	0,2	-	-	10,8	-	-	+	+	+	518	610	Liczone ogółem
43	-	-	0,2	0,2	-	+	0,3	0,5	+	+	-	-	-	-	-	0,5	-	-	9,9	-	-	+	+	+	542	648	Liczone ogółem
44	-	-	+	0,3	0,1	0,7	0,7	0,7	+	+	-	-	+	-	+	0,7	-	-	11,3	-	-	+	+	+	815	988	Liczone ogółem
45	-	-	0,2	0,5	-	-	1,2	0,2	+	+	-	-	+	-	+	0,2	-	-	11,0	-	-	+	+	+	513	635	Liczone ogółem
46	-	-	0,4	0,9	-	-	1,2	0,2	0,2	+	-	-	+	-	+	0,4	0,2	0,2	15,3	-	-	+	+	+	531	665	Liczone ogółem
47	-	-	1,0	+	-	-	1,0	+	0,2	+	-	-	+	+	+	0,2	0,7	0,7	0,7	-	-	+	+	+	518	596	Liczone ogółem
48	-	-	1,1	0,1	-	-	1,5	+	0,4	+	-	-	+	-	+	0,4	2,3	-	0,4	-	+	+	+	0,3	623	731	Liczone ogółem
49	-	-	0,8	0,2	-	-	1,0	0,2	+	-	-	+	+	-	+	0,2	0,7	0,7	1,8	-	-	+	+	0,7	510	617	Liczone ogółem
50	-	-	0,2	-	-	-	0,3	0,2	+	-	-	-	-	-	+	0,2	0,7	0,7	1,0	-	0,2	0,2	0,7	0,7	510	623	Liczone ogółem
51	-	-	+	-	-	-	0,1	+	0,4	-	-	-	-	0,1	+	0,5	2,3	0,1	0,1	-	-	0,1	+	+	676	776	Liczone ogółem
52	-	-	+	+	-	-	0,5	+	0,2	-	0,2	-	-	-	+	0,3	0,8	0,5	0,5	-	-	+	+	+	584	674	Liczone ogółem
53	-	-	+	+	-	-	+	0,4	+	-	0,2	-	-	-	+	0,5	0,7	1,0	1,0	-	-	0,2	+	+	531	587	Liczone ogółem
54	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	-	0,2	0,2	5,6	563	643	Liczone ogółem	

1. Fitofaza d

Obydwa profile głowczyńskie rozpoczynają się już w okresie leśnym wczesnego interglacjału. Ani jedno spektrum nie reprezentuje otwartej roślinności tundrowej czy stepowo-tundrowej, która musiałaby się odzwierciedlić m. in. w wysokich frekwencjach pyłku roślin zielnych, jak to ma miejsce np. w osadach najstarszego i starszego dryasu. W próbie 57 z otworu G2 udział pyłku NAP (głównie *Gramineae*, *Cyperaceae* i *Ericaceae*) sięga 16,5% (ok. 20% w spektrum skorygowanym). Później ilość pyłku roślin zielnych szybko spada do wartości bliskich przeciętnej dla całego profilu. Jeśli pominąć stosunkowo znaczny udział pyłku drzew ciepłolubnych, znajdującego się na wtórnym złożu, to w spektrach pyłkowych aż do końca tego pierwszego odcinka diagramu G2 panuje *Pinus* i *Betula*. Charakterystyczne są przy tym trzy kolejne maksima sosny, rozdzielone dwoma maksimami brzozy. Diagram G28a, obejmujący w zasadzie tylko wczesną część interglacjału, pokazuje również dwa maksima brzozowe pomiędzy trzema maksimami sosnowymi, z których najmłodsze poprzedza bezpośrednio gwałtowne wzniesienie krzywych dębu i leszczyny, charakterystyczne dla początków optymalnego okresu interglacjału. Najniższe spektra w diagramie G28a zawierają ponad 80% pyłku sosny, ok. 6% pyłku brzozy i zaledwie ok. 8% pyłku NAP. Również i tu nie ma podstaw do wydzielenia okresu I wg K. Jessena i V. Mithersa, który był okresem panowania roślinności arktycznej i subarktycznej (1928, str. 335).

W tym miejscu należy zauważyć, że rysuje się inna możliwość interpretacji najniższych spektrów głowczyńskich. Można bowiem przypuścić, że wysoki udział pyłku AP złożonego głównie z pyłku sosny, zwłaszcza w najstarszych poziomach profilu G28a, spowodowany jest dalekim transportem pyłku *Pinus* na obszar o bardzo małej lokalnej produkcji pyłku. Współczesnym przykładem takiej sytuacji mogą być spektra powierzchniowe z fieldowego obszaru masywu Petsamontunturit opublikowane przez L. Aario (1943). Procentowy udział pyłku NAP jest tam mniejszy niż na obszarach leśnych, ponieważ uboga, luźna roślinność zielna i krzewinkowa na skalistym podłożu fieldowym produkuje niewiele pyłku i w deszczu pyłkowym panuje łatwo przenoszony przez prądy powietrza pyłek sosny z odległych nawet obszarów leśnych. Analogia ta wydaje się jednak mało przekonywująca. Uwolnione przez lądolód środkowopolski obszary Niżu Polskiego nie przypominały najprawdopodobniej w niczym pod względem siedliskowym skalistych, niesprzyjających rozwojowi roślinności obszarów fieldowych Skandynawii. Przeciwnie, równiny wysoczyzn polodowcowych, zbudowane z młodej, bogatej w węglan wapnia i inne związki mineralne gliny zwałowej mogły

być w miarę ocieplania się klimatu opanowywane przez zróżnicowaną roślinność pionierską. O składzie tej roślinności schyłku przedostatniego zlodowacenia niewiele wiadomo. Są jednak chyba podstawy do przypuszczenia, że — przynajmniej w swych najogólniejszych cechach — była ona zbliżona bardziej do stosunkowo dobrze już poznanej roślinności tundr i stepotundr schyłku ostatniego okresu zimnego (J. Iversen 1954, K. Wasylićowa 1964 i in.), niż do skąpej roślinności skandynawskich fieldów. Zbiorowiska bezleśne późnego glacjału bałtyckiego cechują się w diagramach pyłkowych wysokimi udziałami pyłku NAP; podobnie powinno być też i w wypadku zbiorowisk schyłku przedostatniego zlodowacenia. Potwierdzić tę hipotezę lub obalić mogłyby dopiero szczegółowe badania opróbowanych w małych odstępach pionowych profilów osadów z przełomu zlodowacenia środkowopolskiego i interglacjału eemskiego. W tej chwili, prawdopodobniejszym wydaje się przypuszczenie, że najniższe spektra interglacjalne ze zdecydowaną dominacją pyłku *Pinus* i słabym udziałem pyłku NAP reprezentują jednak roślinność leśną, a nie ubogie zbiorowiska bezleśne odznaczające się bardzo słabą produkcją pyłku.

Obrazy wczesnych faz interglacjału w diagramach G2 i G28a korelują się ze sobą bardzo dobrze. Należy pamiętać, że sonda G28a odległa była od wiercenia G2 zaledwie o ok. 70 m, chociaż wykazała obecność innych niż wiercenie osadów. Najstarsze maksimum sosnowe w profilu G28a nie ma ścisłego odpowiednika w profilu G2. Najniższe spektrum z wiercenia odpowiadać może mniej więcej spektrum 50 z sondy. Można sądzić, że profil G28a rozpoczyna się nieco wcześniej niż profil G2. Pierwsze maksimum brzożowe rysuje się wyraźnie w obydwóch profilach, podobnie jest z drugą kulminacją sosny zaznaczającą się w poziomie 54 z wiercenia i 48 z sondy oraz z drugim maksimum brzożowym przypadającym na poz. 53 w profilu G2 i poz. 46 w profilu G28a. Trzecia i ostatnia wczesointerglacjalna kulminacja sosny nakłada się już na początek przyrostu krzywej dębu podobnie jak w niektórych innych diagramach eemskich. Z profilu G28a pobrano próbki gęściej niż z profilu G2. Trzecie maksimum *Pinus* poprzedza przyrost krzywej *Quercus*, stąd różnice liczbowe pomiędzy spektrum 51 z otw. G2, a spektrum 42 z sondy. Niewielkie maksimum pyłku wiązu w próbie 45 z sondy następujące wkrótce po drugim maksimum brzożowym, a poprzedzające przyrost krzywej dębu, dobrze odpowiada analogicznemu maksimum *Ulmus* w próbie 51 z wiercenia. Można by znaleźć jeszcze kilka szczegółowych przykładów dobrej korelacji między obydwoma profilami. Występują pewne niezgodności w przebiegu krzywych NAP, wiadomo, że reprezentacja roślin zielnych w deszczu pyłkowym w większym stopniu niż reprezentacja drzew podlega wpływowi warunków ściśle lokalnych.

Dolna część diagramu G2 i diagram G28a, które odtąd traktowane będą łącznie zgodnie z przyjętym schematem ich paralelizacji, obejmują

wczesną część interglacjału należą do faz *d—e* wg K. Jessena i V. Milthersa (1928), kiedy to głównymi drzewami budującymi ówczesne lasy były sosna i brzozy. Podział ten w przypadku profilów główczyńskich daje się z grubsza zastosować. Fazie *d* odpowiadałyby najniższe odcinki profilów z pyłkiem sosny i brzozy oraz osiki, której obecność w lasach tej fazy podkreślają cytowani autorzy klasycznego podziału ostatniego interglacjału (str. 336). Faza *e* obejmowałaby odcinek poprzedzający gwałtowny wzrost frekwencji pyłku dębu, charakteryzujący się pojawem niewielkich ilości pyłku drzew ciepłolubnych, a m. in. pyłku wiązu, którego krzywa ma tu niewielką, ale wyraźną kulminację. Granica między fazą *d* i *e* przypada na głębokości 5,0 m w profilu G2 i 2,2 m w profilu G28a.

Przedewszystkim rzuca się jednak w oczy owo omówione wyżej kolejne, wyraźne kulminowanie krzywych pyłku *Pinus* i *Betula*. Można sądzić, że odzwierciedla ono rzeczywiste kolejno po sobie następujące przemiany w składzie lasów otaczających główczyńskie jezioro, w których na plan pierwszy wybijała się to brzoza, to sosna. Przyczyny tych przemian mogły być różne, bądź natury lokalnej (np. zniszczenie boru sosnowego przez pożar i jego sukcesyjne odradzanie się poprzez stadium brzozowe z osiką), bądź ogólniejszej (np. oscylacje klimatyczne). Wydaje się jednak wątpliwe, by lokalne przemiany typu sukcesyjnego mogły tak wybitnie odzwierciedlić się w diagramie, w którym dość długi okres czasu reprezentowany jest przez stosunkowo niewiele spektrów. Działać tu musiały czynniki raczej ogólniejszej natury, przynajmniej o regionalnym zasięgu. Rzeczywiście, niektóre profile pyłkowe interglacjału eemskiego Polski środkowej wykazują analogiczne wahania udziału pyłku *Pinus* i *Betula* we wczesnych fazach. Diagramy główczyńskie dają się najlepiej porównać z profilem otworu 4 z Warszawy (J. Raniecka-Bobrowska 1954), odwierconego w północnej części jeziora żoliborskiego. Ze znanych stanowisk ostatniego interglacjału to właśnie jest geograficznie najbliższe. Spektra 41 i 42 z otw. 4 w Warszawie odpowiadać mogą trzeciemu maksimum sosnowemu w Głównicy, poprzedzającemu wzrost krzywej *Quercus*, a następującemu — jak w Warszawie — po niewielkiej kulminacji *Ulmus*. Spektrum 47 J. Ranieckiej-Bobrowskiej odpowiada dość ściśle drugiej kulminacji brzozy w Głównicy, a spektrum 52 — drugiej kulminacji sosny. Niższe poziomy z otworu 4 w Warszawie zawierają domieszkę pyłku *Corylus* i *Tilia* oraz *Quercus* i *Abies*, pochodzącą, jak pisze autorka (str. 116) — z rozmytej gliny zwałowej tworzącej dno jeziora żoliborskiego. I tu w spektrach panuje jednak pyłek sosny i brzozy, przy czym spektrum 53 z Warszawy odpowiada pierwszej kulminacji brzozowej w diagramach główczyńskich, a spektrum 55 — pierwszemu maksimum sosnowemu zarysowanemu dobrze w najniższych poziomach profilu G28a. Najstarsze spektra żoliborskie z pierwszą od dołu kulminacją *Betula*

nie mają odpowiednika w Głównicy; być może reprezentują one schyłek brzozy fazy c, niezarejestrowanej w żadnym z diagramów głównych.

Inne profile warszawskie są mniej kompletne i nie zawierają fazy lasów sosnowo-brzozowych określonej przez J. Raniecką-Bobrowską symbolem A, bądź też są poważnie zanieczyszczone w tej części obcym materiałem pyłkowym (por. Z. Borówko-Dłużakowa 1960).

Przebieg krzywych pyłkowych w profilach głównych, zwłaszcza w profilu G2, wykazuje również podobieństwo do układu kulminacji i minimów w profilu z Bedlna koło Końskich (A. Środoń i M. Gołbowa 1956). Autorzy wyróżnili tam okres I K. Jessena i V. Milthersa na podstawie obecności szczątków *Dryas*, *Salix herbacea* i *Betula nana*. Fazy c — jak piszą autorzy (str. 19) — profil nie zawiera. Spektrum próby 72, zawierającej szczątki krzewinek subarktycznych — nie ma charakteru wyraźnie tundrowego i może być z przybliżeniem paralelizowane ze spektrum 57 z wierzenia G2 w Głównicy, spektrum 71 — z pierwszą kulminacją brzozy, spektrum 70 — z drugą kulminacją sosnową Głównicy i Warszawy, spektra 69 i 68 reprezentujące już fazę e — z odpowiednimi odcinkami w profilach tych stanowisk.

Dla lepszego uwidocznienia charakteru profili pyłkowych wczesnego interglacjału eemskiego w Polsce środkowej zestawiono diagramy korelacyjne (fig. 6) oparte na oryginalnych publikowanych lub nie publikowanych tabelach pyłkowych* dotyczących tego okresu. Wszystkie spektra sprowadzone są do jednolitej podstawy procentowej, gdzie za 100% uznano sumę pyłu drzew i leszczyny. Przyjęcie takiego — rzadko dziś używanego — układu procentowego było konieczne, ponieważ poszczególne profile opracowywane były w różnych latach i różnymi metodami, a niektóre z nich, mianowicie wykonane blisko 40 lat temu profile ze Szczercowa i Dżbanków Kościuszkowskich (K. Piech 1932) nie zawierają ilościowych informacji o występowaniu pyłu NAP. Skala pionowa diagramów została zmieniona, a za punkty synchroniczne przyjęto charakterystyczne kulminacje pyłu sosny i brzozy, z którymi można ściśle lub z zastrzeżeniami paralelizować odpowiednie punkty w diagramach głównych. Wydaje się, że dobrze wyrażone kulminacje sosny i brzozy w fazach poprzedzających wkroczenie dębu można odszukać we wspomnianych diagramach ze Szczercowa i Dżbanków Kościuszkowskich; odpowiadałyby one drugiej i trzeciej kulminacji sosnowej i drugiej kulminacji brzozy w Głównicy. Podobnie jest w Otapach (K. Bitner 1956) położonych we wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. Natomiast mniej wyraźny obraz pokazuje profil z Kalisza (St. Tołpa 1952), gdzie trzecia kulminacja sosny zdaje się nakładać

* Pani dr Marii Sobolewskiej serdecznie dziękuję za udostępnienie rękopisu tabeli pyłkowej interglacjału z Góry Kalwarii.

na wyraźnie już podniesione udziały *Quercus* i *Corylus*. Ta sama trzecia kulminacja nie rysuje się też jasno w profilu z Góry Kalwarii (M. Sobolewska 1961). Inne profile interglacjału eemskiego w Polsce środkowej bądź nie zawierają wcale początkowych faz interglacjału, bądź też nie dają ich dostatecznie pełnego obrazu. Z porównania wyłączono grupę profilów z Polski północno-wschodniej i znad Niemna (M. Brem, M. Sobolewska 1950, A. Środoń 1950, Z. Borówko-Dłużakowa i B. Halicki, 1957). Rozwój roślinności na tamtych obszarach odbywał się inaczej i w myśl zasad obowiązujących przy próbach synchronizacji diagramów pyłkowych (J. Dyakowska 1959, str. 197) profile te nie mogą być w tym wypadku brane pod uwagę.

Jak wynika ze stosunkowo nieznacznego udziału pyłku NAP, zmiany roślinności zarejestrowane w diagramach główczyńskich polegają jedynie na przewadze w składzie lasów to brzozy, to sosny. Nie są więc porównywalne z przemianami znanymi ze schyłku plejstocenu, kiedy to po okresach rozwoju zbiorowisk leśnych wracała na teren Polski środkowej roślinność subarktyczna i arktyczna. Diagram G28a zaczyna się w okresie panowania borów sosnowych. Później sosna traci na znaczeniu, przybywa brzozy i spektra 56 z wiercenia i 49 z sondy wskazują na panowanie lasów sosnowo-brzozowych z przewagą brzozy. Wniosek taki można wysnuć na podstawie porównania wspomnianych spektrów ze spektrami prób powierzchniowych z dzisiejszych stref leśnych w obszarach sąsiadujących od południa z polarną granicą lasu, podawanymi przez L. Aario (1940 i 1943) oraz przez F. Firbasa (1949, ryc. 7b, por. także K. Wasylikiowa 1964). W składzie tych lasów pewną rolę odgrywała także osika. Pyłek *Populus*, reprezentujący zapewne *P. tremula*, występuje w nieco większej ilości niż gdzie indziej właśnie w spektrach „brzozowych” lub z „brzozowymi” sąsiadujących. Wiadomo, że przechowuje się on w złożu nie najlepiej, a kwestia reprezentacji osiki w spektrach pyłkowych jest daleka od wyjaśnienia. Trudno wobec tego ocenić ilościowy udział *Populus* w opisywanych lasach, zwłaszcza że część gorzej zachowanych ziarn mogła pozostać nie zauważona.

Można więc wnosić, że sosna została częściowo wyeliminowana przez jakiś czynnik regionalnej, klimatycznej natury, a rozwinęły się lasy z przewagą brzozy i z osiką. Gdy czynnik ten przestał działać, odrodziły się znowu bory sosnowe. Do wniosku takiego prowadzi porównanie spektrów 54—55 z wiercenia G2 i 48 z sondy G28a ze spektrami powierzchniowymi z borów sosnowych z Laponii fińskiej (L. Aario 1940) i Karelii (W. P. Griczuk 1950).

Po tym okresie rozwoju borów sosnowych następuje kolejna zmiana klimatyczna powodująca radykalniejsze niż poprzednia wyparcie sosny z okolic Głównicy, a może i ze znacznych połaci Polski środkowej. W oparciu o dane powierzchniowe L. Aario (1940) oraz T. van der Hammena (1952, cyt. wg K. Wasylikiowej 1964) można wnosić,

że rozwinęły się lasy brzozowe z domieszką przetrwałej gdzieniedzie sosny. W skład ich wchodziła również najprawdopodobniej osika.

W dalszym ciągu rozwoju roślinności odradzają się znowu bory sosnowe, znamionujące już początek fazy e.

Oprócz sosny, brzozy i osiki w lasach fazy d mógł występować jeszcze i modrzew (ślady pyłku w profilu G2). Ślady pyłku wiatropylnych drzew ciepłolubnych, pojawiające się w większości spektrów fazy d mogą częściowo pochodzić z dalekiego transportu, częściowo może jeszcze z osadów glacialnych, bowiem aż do końca fazy d w obydwóch profilach stwierdzono przynajmniej niewielką domieszkę sporomorf trzyczęściowych.

Sądząc z udziału pyłku roślin zielnych, lasy fazy d były już w zasadzie zwarte i nie istniały już większe płaty roślinności otwartej. Jedynie w miejscach szczególnie niekorzystnych siedliskowo dla drzew, może gdzieś na północnych stokach moreny, musiały znajdować się lokalne stanowiska reliktowe światłolubnych gatunków, które przetrwały tu przynajmniej do końca fazy d. Reprezentują one zapewne resztki zbiorowisk pionierskiej roślinności otwartej późnego glaciału środkowopolskiego i najwcześniejszych faz interglacjału, której żaden z diagramów główczyńskich nie zarejestrował. W pierwszym rzędzie trzeba tu wymienić prześl; co najmniej dwa jej gatunki utrzymały się do końca fazy d. Ten rodzaj znoszący niskie temperatury występował dość powszechnie w Europie środkowej u schyłku zlodowacenia bałtyckiego, a także gdzieniedzie jako relikw w holocenie poza właściwą strefą stepową (J. Iversen 1954, 1964 i U. Hafsten 1956, cyt. wg M. Weltena 1957). Z wczesnego interglacjału eemskiego Mazowsza został ostatnio podany z Gołkowa (Z. Janczyk-Kopikowa 1966). Występował również z pewnością i w Głównicy; w glinie zwałowej pyłku *Ephedra* nie stwierdzono i nie ma podstaw do podejrzeń, że znajduje się on w osadzie interglacialnym na wtórnym złożu. W skład zbiorowisk heliofitów wchodziły ponadto *Helianthemum*, *Artemisia* i niektóre inne rośliny z *Compositae*, gatunki z rodzin *Chenopodiaceae* i *Caryophyllaceae*, *Plantago media*, *Polygonum*, *Rumex*, *Thalictrum*, *Polemonium* i może *Sedum*. Częściowo z tymi zbiorowiskami mógł być związany *Juniperus*, mógł on także wchodzić w skład widnych borów sosnowych. Znalezione jedno ziarno pyłku *Hippophaë*; może i ten światłolubny krzew utrzymał się jeszcze na miejscu. Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie obecności elementu arktyczno-górskiego: *Selaginella selaginoides* i *Saxifraga* typ *oppositifolia*. Występowało także *Pleurospermum*, roślina znosząca ocienienie, ale o kontynentalnym zasięgu i z zachodnią granicą zasięgu w Europie środkowej związaną z izotermą styczniową -2°C (J. Iversen 1954). Do grupy roślin w stanie kopalnym notowanych głównie w osadach pochodzących z wczesnych faz formowania się roślinności postglacialnej i wczesnointerglacialnej można

jeszcze zaliczyć *Campanula*, *Ericaceae*, *Ranunculaceae*, *Valeriana* i wreszcie widlaki: *Lycopodium selago* i *L. annotinum*, dziś występujące głównie w górach i w północnej Europie (M. R. Kelly 1964, W. Koperowa & A. Środoń 1965).

Większość ze wspomnianych wskaźnikowych typów pyłkowych pojawia się w niewielkiej ilości, niektóre z nich wręcz sporadycznie. Niełatwo jest zatem prześledzić ich występowanie w stosunku do zarysowanych kulminacji *Pinus* i *Betula*. Trzeba się przy tym oprzeć głównie na profilu G28a, z którego pobrano próbki w mniejszych odstępach i który jest mniej zanieczyszczony materiałem na wtórnym złożu. Ogólna suma pyłku NAP, na którą — ilościowo rzecz biorąc — składa się głównie pyłek traw, turzyc i *Artemisia* nie wykazuje większych wahań. Na tym oparto przypuszczenie, że stopień zalesienia okolic Głównicy nie ulegał większym zmianom. Jednak występowanie niektórych roślin heliofilnych, reprezentowanych w diagramie przez mniej lub bardziej ciągle krzywe, wykazuje związek z domniemanymi ochłodzeniami klimatu wyznaczanymi przez kulminacje pyłku brzozy. Dotyczy to zwłaszcza *Artemisia*, której krzywa wykazuje niewysokie, ale wyraźne maksima w poziomach „brzozowych”. Podobnie rysuje się krzywa *Chenopodiaceae*. Ciągłe występowanie *Thalictrum* wydaje się być związane z pierwszą kulminacją brzozy. Na tę część fazy d przypada słabe maksimum *Juniperus*. Inne heliofity występują sporadycznie, nie dają ciągłych krzywych i są rozproszone w osadzie całej fazy d.

Wydaje się zatem, że w odcinkach fazy d, charakteryzujących się dominacją brzozy w lasach, kształtowały się warunki sprzyjające nieznacznej ekspansji roślin światłolubnych lub przynajmniej ich intensywniejszemu pyleniu.

Wobec nierozstrzygnięcia zagadnienia, które gatunki brzozy wchodziły w skład lasów z przewagą *Betula* w środkowej i młodszej części fazy d, trudno doszukiwać się w poszczególnych zbiorowiskach leśnych rejestrowanych przez spektra tej fazy ścisłych analogii z podstrefami roślinnymi, sąsiadującymi z polarną granicą lasów w północnej Skandynawii. Można jednak sądzić, że dwukrotne pojawienie się lasów z przewagą brzozy i z osiką na miejscu zwartych borów sosnowych wiązało się z przejściowymi pogorszeniami klimatu i nieznacznymi, ale uchwytnymi przesunięciami podstref roślinnych. Klimat, jeszcze chłodny, chociaż bynajmniej nie arktycznego typu, umożliwił przetrwanie tu i ówdzie ograniczonych płatów roślinności heliofilnej z gatunkami arktycznymi.

Interpretacja najstarszego odcinka diagramów główczyńskich w nawiązaniu do innych stanowisk interglacjału eemskiego w Polsce środkowej może mieć siłą rzeczy charakter prowizoryczny, oparta jest bowiem na materiale stosunkowo szczupłym i niepełnym pod względem stratygraficznym. Zagęszczenie sieci stanowisk interglacjalnych i szczegółowe

badania gęsto opróbowanych profilów przyniosą niewątpliwie nowe fakty paleobotaniczne i stratygraficzne, które pozwolą na lepsze poznanie granicy zlodowacenia środkowopolskiego i interglacjału eemskiego. Okres ten jest — jak dotąd — słabo poznany, nie tylko w Polsce środkowej, ale i na innych obszarach (por. np. G. von der Brélie 1955, ryc. 1). Wiele profilów zaczyna się dopiero w późniejszych fazach interglacjału i nie zawiera żadnych informacji o wczesnej jego części. Łatwo to zrozumieć, jeśli się weźmie pod uwagę, że na kilkaset opracowanych polskich profilów pyłkowych mieszczących się w okresie po ostatnim zlodowaceniu naszych ziem, zaledwie pięć zawiera wszystkie fazy późnego glaciału z interfazą belling włącznie, a tylko piętnaście dalszych przynajmniej starszy dryas i interfazę allerød (por. K. Wasylikowa 1964, tab. XXII). Można się zatem spodziewać, że dalsze szczegółowe badania nowych stanowisk interglacialnych oraz rewizje niektórych stanowisk dotąd opracowanych przyniosą wiele informacji, które potwierdzą, skorygują lub obalą przedstawioną wyżej próbę interpretacji dolnej części profilu główczyńskiego.

Z porównania profilów G2 i G28a wynika, że sedymentacja jeziorna rozpoczęła się w małej zachodniej zatoczce zbiornika wcześniej niż w głównej, wschodniej jego części. Wiąże się to zapewne ze zjawiskami, jakie zachodziły w miejscu dzisiejszego zagłębienia w okresie od wycofania się lądolodu środkowopolskiego. Musiało upłynąć nieco czasu, nim pogrzebany lód glacialnego czy peryglacialnego pochodzenia wytopił się całkowicie. Analogiczny proces w miejscach, gdzie w postglaciale powstały wielkie jeziora, trwał prawdopodobnie aż do okresu borealnego (K. Więckowski 1966). Masa lodu i skala przestrzenna zjawisk, które doprowadziły do utworzenia zbiorników, o których pisze K. Więckowski, są oczywiście zupełnie nieporównywalne z sytuacją w Głównicy. Jednak ukształtowanie się i mniejszych zbiorników nie nastąpiło zapewne natychmiast po ustąpieniu lądolodu (por. Z. Klajnert 1965). Tym częściowo może tłumaczyć się brak w profilach główczyńskich śladów najwcześniejszych ogniw interglacialnego cyklu rozwoju roślinności. W okresie panowania w okolicy otwartych zbiorowisk arktycznych i subarktycznych, których resztki przetrwały do fazy d, zbiornik główczyński w jego późniejszej postaci jeszcze nie istniał i nie tworzyły się jeszcze osady, w których te zbiorowiska mogłyby się zapisać. Płytki, miniaturowy zbiorniczek zachodni ukształtował się i ustabilizował wcześniej. Już w starszej części fazy d rozpoczęła się sedymentacja bardzo silnie ilastej gytii (5). W środkowej części basenu głównego prawie do schyłku fazy d gromadziły się osady piaszczysto-gliniaste zmywane dośrodkowo z dość stromych zboczy. Proces ten stopniowo słabł. Osad powstały w ten zapewne sposób zawiera ku górze coraz mniej sporomorf trzeciorzędowych pochodzących z rozmywanych osadów pochodzenia glacialnego,

a coraz więcej pyłku produkowanego przez roślinność miejscową. O ile w próbie 57 stwierdzono aż 30,7% sporomorf egzotycznych, czyli niewiele mniej niż w glinie zwałowej (38,6%), to w próbie 54 zaledwie 1,8%. Udział piasku w osadzie zmniejsza się od 26% w poz. 57 do 19% w poz. 54. Wreszcie u schyłku fazy *d* i w głównym zbiorniku rozpoczyna się sedymentacja właściwych osadów jeziornych w postaci warstwowanego szarego iłu (3). Jego popielność jest jeszcze nadal wysoka (ok. 75%), ale zawiera on już minimalną domieszkę piasku i jest w znikomym stopniu zanieczyszczony obcym materiałem pyłkowym.

Ze względu na ową domieszkę pyłku przeniesionego, znaczną w dolnej części, znikomą w górnej części fazy *d*, spektra z wiercenia nie są wiarygodnym materiałem do zorientowania się w składzie flory wodnej, zwłaszcza, że w utworach fazy *d* nie stwierdzono żadnych szczątków makroskopowych. W glinie zwałowej wykryto także przecież pyłek roślin wodnych, można mieć zatem wątpliwości co do charakteru występowania części pyłku tych roślin w osadach zawierających sporomorfy na wtórnym złożu. Lepiej przedstawia się sytuacja w profilu G28a, gdzie próby reprezentujące starszą część fazy *d* — z wyjątkiem najniższej — nie zawierają już znaczniejszej domieszki obcej. Wydaje się, że początkowo flora wodna nie była zbyt bogata; stwierdzono pyłek *Potamogeton*, *Myriophyllum verticillatum*, *Nymphaea* i *Nuphar*, a w śladach ponadto *Butomus*, *Utricularia* i *Alisma*. W stosunkowo czystych spektrach ze schyłku fazy *d* w profilu G2 znaleziono jeszcze typ *Sparganium-Typha* oraz ślady *Hydrocharis* i *Sagittaria*. Nie ma tu roślin o wybitniejszych wymaganiach klimatycznych. Są to przeważnie rośliny południowo-skandynawskie w sensie G. Samuelssona (1934), ale — z wyjątkiem *Nymphaea* — należące do grup sięgających daleko na północ. Na uwagę zasługuje kulminacja pyłku *Nuphar* w profilu G28a związana z drugim okresem borów sosnowych w środkowej części fazy *d*.

2. Fitofaza *e*

Jak już wspomniano, granicę faz *d* i *e* w diagramach główczyńskich wyznaczyć można zgodnie z opisami K. Jessena i V. Milthersa (1928) oraz A. Środonia i M. Gołąbowej (1956). Oparto ją na spadku krzywej pyłku brzozy, wzroście krzywej pyłku sosny i pojawieniu się niskiej, ale charakterystycznej kulminacji pyłku *Ulmus*, zanotowanej także w odległym o 55 km profilu żoliborskim (J. Raniecka-Bobrowska 1954). Od początku fazy zarysowuje się już wyraźnie jednokierunkowa tendencja przemian klimatycznych, warunkująca rozwój roślinności od borów iglastych chłodnego klimatu umiarkowanego do bogatych wielogatunkowych lasów liściastych, charakterystycznych dla optimum interglacjału. Ze schyłkiem fazy *d* giną ostatecznie ważniejsze rośliny przetrwale z pionierskich zbiorowisk roślin-

ności heliofilnej. Pyłek *Ephedra*, *Helianthemum* i niektórych innych heliofitów notowanych w fazie *d* w osadach fazy *e* już się nie pojawia. Inne stwierdzono w mniejszych niż poprzednio ilościach. Zanotowano natomiast pyłek roślin wskaźnikowych o wręcz przeciwstawnej wymowie klimatycznej.

Faza *e* definiowana jest jako okres rozwoju lasów sosnowo-brzozowych z wiązem i innymi drzewami ciepłolubnymi (A. Środoń i M. Gołębowa 1956). W diagramach pyłkowych jej granicę z następną fazą *f* przeprowadza się na ogół z początkiem wyraźnego wzrostu krzywej *Corylus*. Zgodnie z tym w profilach główczyńskich do fazy *e* zaliczono poziom od 4,7 do 5,0 m w profilu G2 i od 1,9 do 2,2 w profilu G28a.

W starszej części fazy rozwinęły się zwarte bory sosnowe, początkowo jeszcze z udziałem brzozy, stopniowo wypieranej ze zbiorowisk leśnych. To samo dotyczy prawdopodobnie osiki. Pewną rolę w lasach na granicy faz *d* i *e* odgrywał zapewne także i świerk, wykryty w postaci pyłku w ilości nie przekraczającej 0,5% i potwierdzony szczątkami makroskopowymi w próbie 53 z otw. G2. Zjawiają się wreszcie pierwsze dwa rodzaje drzew ciepłolubnych — wiąz i dąb. Jak można wnosić z układu krzywych w opróbowanym w mniejszych odstępach profilu G28a wiąz wkracza nieco wcześniej niż dąb. Drewno dębu pojawia się jednak w osadzie od samego początku fazy.

Faza *e* ma charakter przejściowy; zbiorowiska leśne przekształcają się w mieszane lasy dębowo-sosnowe, przy czym dębu i innych drzew ciepłolubnych stopniowo przybywa. Były to lasy zapewne dość widne, o bogatym podszyciu, w skład którego wchodziły *Cornus sanguinea*, *Evonymus*, *Rhamnus cathartica* i *Frangula alnus*, *Viburnum* i nawet *Berberis*. Krzewy te mogły obficie występować, a przynajmniej intensywniej kwitnąć na skraju lasu otaczającego jeziorko. Niektóre z nich mogły być ponadto związane z innym zbiorowiskiem leśnym, którego ślady zaznaczają się w diagramach od połowy fazy *e*, a mianowicie z wilgotnym lasem typu łęgowego. W obydwóch diagramach podnosi się wyraźnie krzywa *Fraxinus* i jednocześnie pojawia się pyłek *Humulus*. Chmiel, występujący dziś w najrozmaitszego typu wilgotnych lasach, w profilu główczyńskim wyraźnie związany jest z jesionem. Pyłek *Humulus* stwierdzony został wyłącznie w poziomach zawierających także pyłek *Fraxinus*, a późniejszej kulminacji jesiona w fazie *f* towarzyszy kulminacja chmielu. W najbliższym sąsiedztwie jeziorka miejscem sprzyjającym rozwojowi lasu łęgowego mogła być dolinka biegnąca ku północnemu wschodowi; w jej górnej części znajdowało się samo jeziorko.

O istotnej zmianie klimatu świadczy pojawienie się w składzie flory *Viscum* i kwitnącego bluszczu, który stwierdzono już w najwyższej części fazy *d*; począwszy od schyłku fazy *e* daje on już krzywą ciągłą.

Lokalna roślinność wodna w fazie *e* wzbogaca się w nowe elementy.

Wchodzą w jej skład *Ceratophyllum demersum* i *C. submersum*, *Myriophyllum verticillatum* i *M. spicatum*, *Potamogeton* (reprezentowany w szczątkach makroskopowych przez *P. natans*), *Nymphaea* i *Nuphar*, *Hydrocharis* i *Stratiotes aloides*, *Butomus* oraz *Batrachium aquatile*. W pobliżu brzegów rosły zbiorowiska szuwarowe z *Typha latifolia*, *Sparganium*, *Sagittaria sagittifolia*, *Schoenoplectus lacustris* i *Alisma*. Większość wymienionych roślin reprezentuje mniej lub bardziej wyraźne przywiązanie do wód eutroficznych o odczynie obojętnym lub zasadowym (G. Samuelsson 1934, H. Luther 1951, W. Szafer 1959).

Zbiornik głowczyński był w fazie e małym, śródleśnym jeziorkiem eutroficznym, wypełniającym się stopniowo brunatną gytią powstającą z rozkładu żyjących w nim organizmów. Gytia jest bezwapienna; sądząc z występowania alkalifilnych roślin wodnych woda zawierała sporo węglanu wapnia. Sedymentacja węglanowa była jednak powstrzymywana przez obecność znacznej ilości rozkładających się szczątków organicznych i obfitość dwutlenku węgla. K. Więckowski (1966) podkreśla odwrotną zależność pomiędzy sedymentacją węglanów i osadzaniem się substancji organicznej (por. też literaturę cyt. przez tego autora). Osad zawiera ok. 60% popiołu, ale zawartość piasku jest w nim znikomo mała. Oczywiście część wchodzących w skład popiołu substancji mineralnych może być pochodzenia allochtonicznego i świadczyć o trwającym nadal spłukiwaniu do zbiornika najdrobniejszego materiału ze stoków moreny, ale tak wysoka popielność gytii nie jest zjawiskiem odosobnionym i wiąże się częściowo ze stosunkowo wysoką popielnością samych roślin „gytiotwórczych” (A. Maksimow 1965, str. 142). W jeziorku zachodziły procesy koncentracji związków żelaza; w osadach tej właśnie fazy znaleziono konkrety rudy jeziornej.

3. Fitofaza f

Lasy liściaste, formujące się od początków fazy e najpełniejszy rozwój uzyskują w fazie f. Faza ta dla stratygraficznej interpretacji profilów interglacjalnych ma szczególne znaczenie, wyznaczają ją bowiem spektra pyłkowe o swoistym charakterze, nieznanym ani z profilów holocenów, ani ze starszych osadów interglacjalnych. Na znacznych obszarach Europy od Wysp Brytyjskich po Rosję wykształcone są one na ogół dość podobnie i mają wobec tego znaczenie przewodnie w takim sensie, w jakim to pojęcie rozumiane jest w geologii historycznej.

W Głowczynie spektra fazy f przedstawiają się w sposób typowy. W starszej części fazy występuje maksimum pyłku *Quercus* wynoszące ponad 60%, w młodszej — wybitna kulminacja pyłku *Corylus*. Górna granica fazy w diagramie G2 oparta została na gwałtownym spadku udziału pyłku dębu, pojawieniu się szybko rosnącej krzywej pyłku grabu i na granicy racjonalnej pyłku *Tilia cordata*.

Przemiany roślinności zapoczątkowane w fazie e doprowadziły do ukształtowania lasów liściastych, których głównym składnikiem był dąb. Obok niego w skład lasów wchodziły wiązy i klony, w mniejszym stopniu *Tilia cordata*, w niewielkiej domieszce *Tilia platyphyllos*. Wilgotniejsze miejsca, może m.in. we wspomnianej dolince śródmorenowej zajęte były przez lasy zbliżone charakterem do lęgów wyrażone w diagramach wysokimi i dobrze ze sobą skorelowanymi udziałami pyłku *Fraxinus* (do ok. 9%) i *Humulus* (ok. 1%). Z tego typu zbiorowiskami mógł być związany także i *Vitis*. W podszyciu i na skrajach lasu rosły *Cornus sanguinea*, *Evonymus* i *Viburnum*, obficie kwitł bluszcz, którego pyłek tworzy ciągłą krzywą przez niemal całą fazę f. Występowała także jemiola.

Ku schyłkowi fazy przybywa w spektrach pyłku *Corylus*, charakterystyczna kulminacja pyłku leszczyny przypada na przełom faz f i g. Leszczyna była z pewnością ważnym składnikiem lasów. Jednak do dziś nie wyjaśniono w pełni czy stanowiła ona tylko szczególnie obficie występujący element podszycia liściastych lasów interglacjalnych (jak to dla analogicznych faz holocenu przyjmował L. von Post), czy też istniały odrębne, czyste zbiorowiska leszczynowe. Zwracano bowiem uwagę, że leszczyna w podszyciu zwartego lasu kwitnie słabo i produkuje niewiele pyłku (K. Faegri & J. Iversen 1964). A. Środoń i M. Gołąbowa (1956) podkreślają jednak, że leszczyna jest pospolita w dąbrowach i kwitnie bardzo wcześnie na wiosnę, a dąb bardzo późno okrywa się liśćmi. Zatem w pierwotnych świetlistych lasach dębowych, w których inne drzewa występowały co najwyżej jako domieszka, leszczyna mogła mieć dobre warunki kwitnienia. Wyjaśnienie to — jak stwierdzają autorzy — jest tylko częściowo zadowalające. Rzeczywiście, pyłek leszczyny występuje obficie i w następnej fazie interglacjału, kiedy dominującymi składnikami lasu stają się lipa i grab, a udział dębu radykalnie się zmniejsza.

Ostatnio S. T. Andersen (1964) zasugerował, że szczególne zachowanie się *Corylus* w interglacjalach może znaleźć wyjaśnienie w zmianach typu ewolucyjnego i rasowej odrębności kopalnej leszczyny (str. 359).

Runo lasów interglacjalnych było zapewne bogate i zróżnicowane. Spektra pyłkowe osadów jeziornych i torfowych z reguły bardzo słabo rejestrują jego ślady. Tym bardziej warto podkreślić wykrycie pyłku *Stellaria holostea*, związanej dziś z lasami typu grondowego (W. Szafer 1959, str. 286).

Sosna została wyparta z lasów niemal całkowicie. W środkowej części fazy f zaznacza się jednak drobna przejściowa kulminacja *Pinus* (i *Betula*), stanowiąca może odległy ślad wydarzeń zarejestrowanych w profilu z Góry Kalwarii odległej o 85 km (M. Sobolewska 1961).

Rośliny wodne w fazie f miały w spływającym się, zacisznym je-

ziorku optymalne warunki rozwoju. W składzie flory wodnej na początku fazy zjawia się *Salvinia*, stwierdzona po raz pierwszy w interglacjale eemskim Polski w Górze Kalwarii (M. Sobolewska 1961). Występują — jak w fazie poprzedniej — *Potamogeton* (reprezentowany przez szczątki makroskopowe *P. natans*, *P. perfoliatus* i *P. acutifolius*), *Myriophyllum verticillatum* i *M. spicatum*, *Nuphar* i *Nymphaea* (*N. alba* i *N. candida*), *Stratiotes aloides*, *Ceratophyllum demersum* i *C. submersum*, *Hydrocharis*, *Batrachium aquatile* i *Aldrovanda vesiculosa*. Roślinność szuwarowa reprezentowana jest przez *Sparganium*, *Typha latifolia*, *Sagittaria sagittifolia*, *Alisma*, *Schoenoplectus lacustris*. Próby pochodzące z młodszej części fazy zawierają już też szczątki roślin związanych dziś ze związkiem *Magnocaricion*: *Carex gracilis*, *C. acutiformis*, *C. pseudocyperus* i *C. vesicaria*. Ilościowo rzecz biorąc faza f jest okresem najwyższego w całym profilu udziału pyłku roślin wodnych. Jest to jednak okres postępującego spłylenia i kurczenia się jeziora, zaznaczonego może najbardziej przez rosnącą ku górze domieszkę piasku w osadzie, co znamionowałoby „zbliżanie się” brzegów jeziora do środkowej części zagłębienia, skąd pobrany był profil G2. Dokładnie na granicy faz f i g kończy się sedymentacja gytii i rozpoczyna rozwój torfowiska mszystego.

W zachodniej zatoczce zagłębienia sedymentacja jeziorna wygasa prawdopodobnie już w środkowej części fazy f. Faza ta reprezentowana tu jest tylko przez 5-centymetrową warstwę osadu. Osady jeziorne fazy f (5) przykryte są tu bezpośrednio przez piaski ze żwirem (9), w innych częściach zagłębienia leżące dopiero na iłach i gytiach późnointerglacialnych. Strop osadów jeziornych w zatoczce przypadający na fazę f znajduje się 2,4 m powyżej kontaktu gytii i torfu w zbiorniku głównym datowanego na przełom faz f i g. Zbiorniczek zachodni stanowił zatokę zbiornika głównego albo był może stale lub okresowo oddzielony od niego wąską, kilkumetrową grzędą stwierdzoną wierceniem G3. Sądzić można, że nawet jeśli rzeczywiście istniał okresowy lub trwały przesmyk między obydwoma zbiornikami, poziom wody w nich był jednakowy. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by taki wąski próg zbudowany z piasków (co prawda, nieco gliniastych) mógł tworzyć barierę nieprzepuszczalną w tym stopniu, by jeden zbiornik mógł być „zawieszony” o kilka metrów nad drugim.

Przyjęcie założenia o wspólnym rozwoju obu zbiorników i jednakowym poziomie lustra wody w obu częściach basenu prowadzi do wniosku, że zanik jeziora i jego przekształcenie w torfowisko nastąpiło nie tylko w wyniku gromadzenia się osadów, zarastania i „zładowacenia” zgodnie ze znanymi schematami jeziorno-torfowiskowego cyklu sedymentacyjnego, lecz głównie wskutek wydatnego obniżania się poziomu wód zbiornika trwającego co najmniej od początku fazy f do końca fazy. Spływająca się zatoczka zachodnia została opanowana przez roślinność szuwa-

rową, zaznaczoną w spektrum pyłkowym podniesionymi udziałami *Sparganium-Typha* i *Typha latifolia*. Później osady ulegają całkowitemu odsłonięciu. Ziarna pyłku w poziomie 1,85—1,9 m z sondy G28a są (zwłaszcza w porównaniu z innymi poziomami) szczególnie źle zachowane, blade i często o zatartej rzeźbie powierzchni, co sugeruje, że osad był narażony na stosunkowo intensywną aerację. Wreszcie wynurzony teren zostaje lokalnie — w najściślejszym sensie tego słowa — opanowany przez paprocie, co w spektrum wyraża się olbrzymim udziałem zarodników *Polypodiaceae* (355%!).

Postępujący spadek poziomu wód nie dopuszcza do powstania torfowiska w zachodniej części basenu. W głównej, głębszej jego części jeziorko istnieje nadal, stopniowo jednak kurczy się i wreszcie u schyłku fazy *f* przekształca się w torfowisko.

Na podstawie różnicy hipsometrycznej położenia stropu osadów jeziornych w zatoczce i w zbiorniku głównym minimalny spadek poziomu wód w fazie *f* można oszacować na ok. 2,5 m. W rzeczywistości był on prawdopodobnie jeszcze nieco większy. Zjawisko to miało oczywiście charakter czysto lokalny — jeziorko główczyńskie było niewątpliwie zbiornikiem bezodpływowym nie łączącym się z ówczesną czynną siecią rzeczną, o czym świadczy zarówno sytuacja geologiczna, jak i skład flory wodnej (m. in. obecność dość znacznych ilości szczątków glonów *Pediastrum*, por. St. Tołpa 1961, str. 17). Poziom wody i charakter sedimentacji w takich basenach zależy od miejscowego bilansu wodnego, uwarunkowanego — jak to podkreśla E. Rühle (1961, str. 10) — rozmiarami samego zbiornika i jego zlewni, a także warunkami klimatycznymi. S. Z. Różycki (1961b) pisze, że funkcjonowanie małych zbiorników wodnych o niewielkich zlewniach, odizolowanych od sieci rzecznej uzależnione jest w pierwszym rzędzie od intensywności parowania, a nie wprost od wilgotności klimatu wyrażonej w sumie opadów atmosferycznych. Używając obrazowego porównania S. Z. Różycki (1961a, str. 54) pisze, że małe jeziorka bezodpływowe na wysoczyznach zachowują się jak „stacje meteorologiczne mierzące stosunek pomiędzy ilością opadów a możliwością parowania”. Nie jest więc chyba rzeczą przypadku, że poziom wody w jeziorku główczyńskim w cieplej, optymalnej fazie interglacjału obniżał się, w miejscu jeziorka powstało torfowisko, które później — u schyłku interglacjału — uległo ponownie zatopieniu. Klimat fazy *f* był — ogólnie rzecz biorąc — nadal wilgotny i obfitujący w opady, sprzyjający rozwojowi bogatych lasów liściastych, ale wraz ze wzrostem temperatury wzmożło się parowanie z wolnej powierzchni wodnej i równowaga między ilością wody opadowej a jej odprowadzaniem do atmosfery przesunęła się na korzyść parowania. Tak ukształtował się bilans jeziorka główczyńskiego, będący wypadkową ogólnych zjawisk związanych z klimatem i lokalnej sytuacji morfologicznej i hydrologicznej. Rozwój innych jezior interglacialnych mógł

w zależności od ich sytuacji przebiegać zupełnie inaczej. Warto jednak zaznaczyć, że zmiana sposobu sedymentacji z jeziornej na torfową w wielu eemskich zbiornikach o podobnym do jeziora głowczyńskiego charakterze następuje bądź — jak w Głównicy — na przełomie faz *f i g* (Bedlno — A. Śrdoń i M. Gołabowa 1956; Góra Kalwaria — M. Sobolewska 1961), bądź w czasie trwania tych faz (Dzbanki Kościuszkowskie i Szczerców — K. Piech 1932; Józefów — M. Sobolewska 1966), w każdym razie w najcieplejszym okresie interglacjału, gdy parowanie mogło być najintensywniejsze.

4. Fitofaza *g*

Spektra pyłkowe wczesnej części fazy *g* charakteryzują się wysokimi udziałami pyłku *Tilia cordata* i wzrastającym udziałem pyłku *Carpinus*. Udział pyłku *Corylus* utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Udział pyłku dębu spada gwałtownie na granicy faz *f i g* do znikomych wartości. Rola tego drzewa w ówczesnych lasach radykalnie się zmienia. Staje się ono podrzędnym składnikiem zbiorowisk leśnych. Kształtują się zbliżone do dzisiejszych gronów lasy lipowo-grabowe; obficie występuje leszczyna. Z innych drzew w skład lasów wchodzi *Ulmus* (reprezentowany tu głównie przez pyłek typu B) i *Acer*. Pojawia się także *Taxus*. Ku schyłkowi fazy *Corylus* i *Tilia* stopniowo tracą na znaczeniu. Panującym drzewem staje się *Carpinus*. Miejscami mógł on tworzyć czyste drzewostany grabowe (podobnie jak w okolicach Józefowa, M. Sobolewska 1966). Jednocześnie wkraczają jodła oraz świerk, stanowiący już zapowiedź nawrotu lasów iglastych. Podział fazy *g* na wczesną część grabową i późną grabowo-swierkową (fazy VIIa i VIIb wg W. Sellego, ob. G. von der Brelie 1955) jest dość dobrze widoczny.

W starszej części fazy klimat musiał być nadal ciepły. Stale występowały i kwitły *Hedera* i *Viscum*. Pojawił się także *Ilex*. Te trzy rośliny traktowane są powszechnie jako dobre wskaźniki klimatu ciepłego. Dzięki zainteresowaniu, jakie od dość dawna budziło ich występowanie w holocenie (J. Iversen 1944 i 1960, J. Troels-Smith 1960) ich dzisiejsze wymagania termiczne zostały dość dokładnie poznane (J. Iversen 1944). Jeśliby przyjąć, że wymagania klimatyczne interglacjalnego bluszczu, jemioli i ostrokrzewu nie odbiegały w sposób istotny od dzisiejszych, to średnią temperaturę najzimniejszego miesiąca w starszej części fazy można by ocenić na nie mniej niż ok. $-0,5^{\circ}\text{C}$, najcieplejszego co najmniej ok. $16-17^{\circ}\text{C}$. K. Jessen i V. Milthers (1928) przyjmowali 18°C jako średnią lipca w fazach *f i g* w Danii. Klimat był zatem ciepły i odznaczał się zwłaszcza łagodnymi zimami, co umożliwiło także cisowi zajęcie trwałego miejsca w roślinności. Wschodnia i północna granica zasięgu *Taxus* jest bowiem

— jak pisze F. Firbas (1949) — wyznaczana bezpośrednio przez temperaturę zim. Z powyższego nie wynika, że w fazie poprzedniej (f) klimat był chłodniejszy. Ze stałego kwitnienia *Hedera* można wnosić, że i wtedy zimy były dość ciepłe. Obecność *Ilex* nie została w fazie f zanotowana, wiadomo jednak, że krzew ten produkuje nadzwyczaj mało pyłku i to zupełnie nieprzystosowanego do przenoszenia przez wiatr (K. Faegri & J. Iversen 1964). Zatem z negatywnego faktu niewykrucia ostrokrzewu w fazie f nie można wyciągać wniosków klimatycznych. Dotychczas obecność *Ilex* w interglacjale eemskim Polski środkowej stwierdzona została w fazie g (Szelaǵ, A. Środoń 1956; Sławno, St. Tołpa 1961; Kaliska, Z. Janczyk-Kopikowa 1965), a także w odcinkach profilów z Góry Kalwarii i Józefowa, zaliczonych do fazy f (M. Sobolewska 1961 i 1966).

Uderzający jest brak lub słabe występowanie takich elementów podszycia, jak *Rhamnus*, *Cornus sanguinea*, *Viburnum* i *Evonymus*, tak dobrze reprezentowanych w fazie poprzedniej. Wiązać to się może z przyczynami natury fitosocjalnej. Zwracano uwagę, że w typowych gronach zbudowanych głównie z grabu — a takiego typu zbiorowisko występowało w znacznej części fazy g — podszycie krzewów jest nikłe i ograniczone do leszczyny (J. Paczowski 1930, str. 110 i nast.). Niektóre z tych krzewów mogły być ponadto związane z lasami typu łęgowego, reprezentowanymi w poprzednich fazach przez pyłek *Fraxinus* i *Humulus*, które ze schyłkiem fazy f tracą na znaczeniu. Wpłynęły na to zapewne zmiany hydrologiczne wyrażające się w samym jezioru spadkiem poziomu wód. W fazie g pojawia się natomiast w nieco większych niż poprzednio ilościach pyłek *Alnus*. Olcha mogła — niezbyt obficie — rosnąć w otoczeniu torfowiska.

Na wynurzonej wskutek zaniku jezior powierzchni pojawiają się masowo paprocie. Spektrum 41 zawiera 174% zarodników *Polypodiaceae*, których niestety — wobec braku peryny — nie można było bliżej oznaczyć. Na gytiowym podłożu rozwija się torfowisko mszyste. Warunki pojeziernych zagłębień sprzyjają obfitej torfotwórczej wegetacji mchów brunatnych. Nie działają tu bowiem czynniki eliminujące mchy, jak duża amplituda wahań poziomu wód, czy mechaniczne niszczenie darni mszystej przez prądy wody na torfowiskach niskich innego typu (M. Jasnowski 1959). W torfie główczyńskim fazy g najregularniej występują *Drepanocladus Sendtneri*, *D. aduncus* i *Meesea triquetra*, później także i *Calliergon trifarium*; w pojedynczych próbach została ponadto stwierdzona obecność *Calliergon giganteum*, *Drepanocladus vernicosus* oraz *Scorpidium scorpioides*. Główną masę torfu tworzą mchy brunatne; w zbiorowiskach torfotwórczych brały udział także i turzyce. W dolnej części torfu stwierdzono obecność *Carex gracilis*, *C. riparia*, *C. Hudsonii* i *C. rostrata*, w środkowej obok *C. gracilis* i *C. Hudsonii* zanotowano *C. fusca* i rzadziej *C. limosa*, w górnej *C. acutiformis*, *C. gra-*

cilis, *C. riparia*, *C. Hudsonii* i *C. rostrata*. Gatunki związane dziś głównie ze zbiorowiskami ze związku *Magnocaricion* skupiają się więc przeważnie w dolnej i górnej części torfu. Udział turzyc w roślinności torfowiska zaznacza się dobrze wyraźnie podniesionym w stosunku do okresu sedymentacji jeziornej udziałem pyłku *Cyperaceae*. Obecność immersyjnych turzyc (grupujących się głównie — jak wspomniano — w dolnej i górnej części profilu torfowego) oraz innych roślin typu szuwarowego (*Schoenoplectus lacustris*, *Sch. Tabernaemontani*, *Rumex hydrolapathum*, *Equisetum limosum*, *Typha latifolia*) sugeruje, że przynajmniej pewne części torfowiska ulegać mogły silniejszemu podtapianiu. W ogóle torfowisko stale miało co najmniej dostateczną asekurację wodną. Darń mszysta, odżywiana żyznymi wodami spływającymi i przesiąkającymi z moreny zbudowanej z rozmaitych skał dostarczających związków mineralnych narastała szybko. W całym profilu najgrubsze są właśnie osady przypadające na fazę *g*, a frekwencja pyłku wyrażona w ilości ziarn na 1 cm² preparatu jest tu najniższa. Wierzchnie warstwy torfowiska podlegały zapewne okresami pewnemu przesuszaniu, nieszkodliwemu może dla samego rozwoju torfowiska, ale wpływającemu na stan zachowania pyłku. Pyłek w torfie jest stosunkowo źle zachowany, zwłaszcza w porównaniu z pyłkiem osadów jeziornych niżej i wyżej leżących. Ziarna mają ślady korozji, a procentowy udział strzępów egzyny i ziarn zniekształconych w stopniu uniemożliwiającym oznaczenie jest w fazie *g* największy.

W młodszej części fazy *g* zapisało się w profilu intensywniejsze chociaż jeszcze przejściowe podtopienie torfowiska. Torf z poz. 3,0—3,1 m zawiera znacznieszą domieszkę piasku (2,3% wobec 0,8 i 0,9% w sąsiednich próbach). Jednocześnie pojawia się charakterystyczna kulminacja pyłku *Potamogeton*. W tejże próbie wykryto szczątki *Potamogeton perfoliatus*. Stwierdzono także obecność *Salvinia*. Krzywa pyłku *Cyperaceae* w tym poziomie wykazuje dość wyraźne maksimum. Można sądzić, że poziom ten, obok intensyfikacji splukiwania materiału piaszczystego ze stoków moreny rejestruje przejściowy wzrost poziomu wód i krótkotrwale odrodzenie się jeziora. Nieco niżej w profilu — w poz. 3,3—3,4 m — można odnaleźć jeszcze jedną bardzo nieznaczną kulminację pyłku *Potamogeton* skorelowaną i tym razem z podwyższonym udziałem pyłku *Cyperaceae*. W tym wypadku obraz jest mniej wyraźny niż w poz. 3,0—3,1 m, gdzie przejściowe podniesienie poziomu wód stwierdzić można na podstawie kilku niezależnych, a współbrząających ze sobą faktów. Również wyżej (próba 25), już w fazie *h* przejściowemu wzrostowi domieszki piaszczystej w torfie towarzyszy wybitna kulminacja pyłku *Potamogeton*.

Jakie mogły być przyczyny zmian w miejscowej sytuacji hydrologicznej, powodujących przejściowe podniesienia się poziomu wód? Zwracano już uwagę na fakty, które mogłyby świadczyć o oscylacjach klimatycznych występujących w fazie *g*. R. Hallik (1953) w diagra-

mach z północno-zachodnich Niemiec wykrył alternację wierzchołków krzywych grabu i świerka i wiązał ją z krótkotrwałymi zmianami klimatu protegującymi to *Carpinus*, to *Picea*. W Polsce podobne wahania zauważyła M. Sobolewska (1961) w profilu z Góry Kalwarii. W Głównicy obraz tej alternacji jest mniej wyraźny. Dostrzec można jednak i pierwszą, słabą kulminację świerka we wczesnej, lipowej części fazy *g* (spektra 39—40), i trzy nieco wyraźniejsze maksima *Picea* przypadające na minima *Carpinus* (spektra 35, 31 i 26). Cztery kolejne kulminacje graba wyrażone są doskonale. Piąta, najwybitniejsza kulminacja świerka, wyznaczająca fazę *h*, przypada już po ostatecznym cofnięciu się krzywej *Carpinus*, a towarzyszy jej — jak u R. Hallika i M. Sobolewskiej — wybitny wzrost udziału pyłku sosny, charakterystycznej później dla fazy *i*. Kulminacje pyłku roślin wodnych i inne zjawiska znamionujące wzrost poziomu wód występują w Głównicy wprawdzie w okresach obniżonego udziału pyłku graba, ale nie korelują się zbyt dobrze z subtelnymi maksimami *Picea*. Ponadto przesunięcia w spektrach pyłkowych na niekorzyść pyłku *Carpinus* spowodowane są nie tylko przejściową zwyżką udziału pyłku świerka, ale także i innych drzew, często o wręcz przeciwnej wymowie klimatycznej. Zatem bezpośrednie wiązanie poszczególnych kulminacji i minimów udziału pyłku drzew i zjawisk zachodzących w obrębie torfowiska z oscylacjami klimatycznymi w sensie R. Hallika nie miałoby dostatecznego uzasadnienia (por. M. Sobolewska 1961, str. 83).

Faktem jest jednak, że w młodszej części fazy *g* udział pyłku wszystkich drzew ciepłolubnych zmniejsza się. Przybywa natomiast pyłku *Picea* i — w mniejszym stopniu — *Abies*. Krzywa *Carpinus* — po absolutnym maksimum w poz. 29 (61%) ma aż do schyłku fazy tendencję spadkową. Pyłek roślin wskaźnikowych klimatu ciepłego (*Hedera*, *Viscum*) zanika przed końcem fazy. Chociaż dopiero w tej części fazy *g* pojawia się *Buxus*, to generalna tendencja ku ochłodzeniu klimatu jest dość dobrze widoczna. Coraz większe znaczenie w składzie ówczesnych lasów odgrywa świerk. Drzewo to znane jest ze swej wrażliwości na suszę zarówno atmosferyczną, jak i glebową (J. Tomanek 1966). Zwracano uwagę na zależność zasięgu świerka od wilgotności klimatu wyrażonej bądź jako wskaźnik niedosytu wilgotności (D. Szymkiewicz 1923, cyt. wg W. Szafera 1964, str. 67—69), bądź jako suma opadów atmosferycznych (F. Firbas 1949, str. 226—227, ryc. 31). Postępujące ochłodzenie i zwilgotnienie klimatu odzwierciedlone w przemianach w składzie lasów mogło przyczyniać się do zmian w reżimie hydrologicznym torfowiska i przy pewnym układzie warunków termicznych i wilgotnościowych powodować jego częściowe zatapianie, umożliwiające rozwój roślinności wodnej.

Koniec fazy *g* zarejestrowany jest gwałtownym spadkiem udziału pyłku grabu pomiędzy próbami 25 a 26. Wzrost udziału pyłku *Picea* zapoczątkowany w fazie *g* prowadzi do jego kulminacji w fazie *h* (25%). Jednocześnie zaznacza się słabe maksimum pyłku jodły.

Ze składu pyłkowego próby 25 wynika, że udział drzew liściastych — w tym także i olchy — w lasach został poważnie ograniczony, a niektóre z nich zostały całkowicie wyeliminowane. Ukształtowały się lasy złożone głównie ze świerka (*Picea excelsa*) oraz z sosny i jodły (*Abies alba*). Niski udział pyłku jodły — zwłaszcza w porównaniu z profilami z obrzeżenia Gór Świętokrzyskich — zgodny jest z wiadomościami o rozmieszczeniu jodły w interglacjale eemskim (A. Śröder i M. Gołabowa 1956).

Wycofanie się ciepłolubnych drzew liściastych, zanik już u schyłku fazy *g* wskaźnikowych roślin klimatu ciepłego, ekspansja świerka i sosny świadczą o dość radykalnej zmianie klimatu w kierunku jego ochłodzenia. Zwracano uwagę na to, że obok zależności od warunków wilgotnościowych rozmieszczenie świerka w Europie środkowej wykazuje związek z przebiegiem izoterm miesiąca najzimniejszego; w IX piętrze holocenu wg F. Firbasa wysokie udziały świerka skupiają się głównie na obszarach, gdzie średnia stycznia wynosi obecnie ok. -2° do -3°C i mniej (F. Firbas 1949, str. 226—227, ryc. 31). Ekspansji świerka (i sosny) towarzyszy pojawienie się *Ericaceae*, a wśród nich *Calluna*.

Jednocześnie z kulminacją świerka zaznacza się w profilu przejściowe maksimum *Potamogeton* skorelowane — jak poprzednio — ze wzrostem domieszki piasku w osadzie i zawartości popiołu.

6. Fitofaza i

Począwszy od kulminacji świerka w próbie 25 następuje wybitny wzrost udziału pyłku sosny, rozpoczyna się także dość szybki wzrost udziału pyłku NAP. Fakty te obrazują dwa zjawiska o zbieżnej wymowie klimatycznej: odzyskiwanie przewagi w drzewostanie przez sosnę i postępujące rozluźnienie szaty leśnej. Pyłek liściastych drzew ciepłolubnych pojawia się już tylko w śladach z wyjątkiem pyłku *Carpinus* utrzymującego się aż do końca profilu w ilości ok. 2%.

Okolice Głównyina opanowuje więc bór sosnowy ze świerkiem i domieszką brzozy. Znaczną rolę w lokalnej roślinności odgrywa jałowiec; wchodził on może częściowo w podszycie wyżej położonych, suchszych partii borów sosnowych, chociaż wysoki udział jego pyłku — zwłaszcza w młodszej części fazy — sugerowałby, że zaczęły się już tworzyć większe samodzielne skupienia *Juniperus*. Pojawiają się znowu: *Ephedra* (reprezentowana i tu przez typy *fragilis* i *distachya*), *Helianthemum*,

Artemisia, *Thalictrum*, *Chenopodiaceae*, *Caryophyllaceae*, *Cruciferae*, *Plantago typ media*, *Polygonum* (typy *bistorta*, *aviculare*, *convolvulus*, *persicaria*), *Valeriana*, *Pleurospermum*. Wzrasta udział pyłku *Compositae Tubuliflorae*, *Cyperaceae* i *Gramineae*. Stwierdzono także obecność *Lycopodium selago* i *L. annotinum*. Pojawienie się znacznej liczby roślin heliofilnych obok zmniejszenia się udziału pyłku drzew w spektrach świadczą o postępującym procesie zmierzającym do ukształtowania się otwartych zbiorowisk schyłku interglacjału i początków okresu glacialnego. Oprócz form stwierdzonych poprzednio we wczesnym interglacjale w fazie *i* pojawiają się jeszcze *Linum* i *Gentiana* subgen. *Gentianella*.

Ochłodzenie i zwilgotnienie klimatu znajduje również wyraz w zmianach lokalnej sytuacji hydrologicznej. Zagłębienie główczyńskie wypełnia się stopniowo wodą. Jeszcze w torfie z najmłodszego poziomu fazy *g* znaleziono pestki *Potamogeton natans* i *P. perfoliatus*. W fazie *h* widoczna jest wspomniana przejściowa kulminacja pyłku rdestnic. W najstarszym poziomie fazy *i* stwierdzono jeszcze *Stratiotes aloides*, potem *Potamogeton pusillus*, *P. obtusifolius* i *P. lucens*. Dopiero jednak od połowy fazy *i* w wierceniu G2 występuje ilasta gytia jasnobrunatnej barwy. Granica między torfem a gytia nie jest dobrze uchwytana, ale wydaje się, że warunki dla rozwoju roślinności wodnej musiały przynajmniej w części zbiornika istnieć już od końca fazy *g*.

Zwilgotnienie klimatu i wkroczenie drzew iglastych, a zwłaszcza świerka wpłynęło na zmianę warunków siedliskowych. W fazie *i* znaczny udział w spektrach mają zarodniki *Sphagnum*; torfowce pojawiają się w składzie samego torfu w poz. 2,1—2,3 m. Stwierdzono także pyłek *Drosera*. Można sądzić, że w niższych położeniach w wilgotnych miejscach bory fazy *i* miały charakter borów bagiennych z krzewinkami z rodziny wrzosowatych. Podobne zjawiska u schyłku interglacjału wywołane zmianami klimatu i przemianami w składzie lasu są w wielu profilach eemskich zaznaczone wyraźnie podwyższonymi krzywymi zarodników *Sphagnum* i pyłku *Ericaceae* oraz pojawieniem się śladów obecności roślin charakterystycznych dla torfowisk wysokich i borów bagiennych. Może najlepiej zaznacza się to w profilu Józefowa (M. Sobolewska 1966). Zjawiskom zakwaszania i degradacji gleb towarzyszy tendencja ku zubożeniu samego zbiornika, objawiająca się w diagramie z Józefowa dość obfitym występowaniem zarodników *Isoetes lacustris*. W Głównicy zubożenie jeziora nie jest tak dobrze widoczne jak w Józefowie. W najwyższym poziomie profilu stwierdzono wprawdzie pyłek *Myriophyllum alternifolium*, gatunku związanego z wodami o charakterze oligotroficznym, obok niego jednak także pyłek *M. verticillatum* i *M. spicatum*, których wymagania troficzne są wręcz przeciwstawne.

Na tle naszkicowanego obrazu roślinności klimatu chłodnego u schyłku interglacjału uderzająca jest obecność w trzech poziomach fazy *i* pyłku *Hedera*. Wykluczone jest tu zanieczyszczenie prób materiałem ze star-

szej części profilu, ponieważ w momencie pobierania i opakowywania prób ze stropowych partii serii interglacjalnej jej część środkowa była jeszcze nienaruszona. Wobec zanotowanego w diagramie postępującego rozrzedzenia lasów można sobie wyobrazić wzmożenie działalności erozyjnej i wtórnego przenoszenia ziarn pyłku, o czym świadczyłyby także stwierdzenie jednego ziarna pyłku *Nyssa* w próbie 20. Może tu należałoby szukać przyczyny ponownego pojawienia się pyłku bluszczu w osadach fazy *i*. Występowanie pyłku *Hedera* na pierwotnym złożu w fazie *i* stanowiłoby pewien dysonans w stosunku do dość jasnego obrazu roślinności tej fazy. Jest jednak faktem, że elementy ciepłolubne utrzymują się dość długo w schyłkowej części interglacjału (por. np. St. Tołpa 1961). Również M. Sobolewska (1961) podaje pyłek bluszczu z fazy *i* interglacjału w Górze Kalwarii. Klimat tej fazy autorka określa jako borealno-subarktyczny (str. 84).

*

Na zakończenie charakterystyki przemian roślinności interglacjalnej w okolicach Głównicy konieczne jest ustosunkowanie się do niektórych wniosków sformułowanych w cytowanym poprzednio artykule opartym na wstępnym rozpoznaniu materiału z Głównicy (J. Niklewski, J. Kącki i J. Stawin 1964). Pełny profil oparty na próbach z otworu G2 nie potwierdza wysuniętego wówczas przypuszczenia o trójdzielności fazy *f*. Trójdzielność ta wydawała się uzasadniona zarysowaniem się w tamtym, niepełnym diagramie podfazy leszczynowej z dębem i lipą, podfazy dębowej z sosną i podfazy leszczynowo-lipowej. Obraz ten był zgodny w pewnym stopniu z osobliwym obrazem faz optymalnych w profilu z Góry Kalwarii (M. Sobolewska 1961) z jednej strony, z drugiej zaś — z niezbyt wyraźną, przejściową kulminacją sosny, synchroniczną z absolutnym maksimum dębu w Bedlnie (A. Śródóń i M. Gołębowa 1956) w poz. 54—55. W obecnie przedstawionym diagramie główczyńskim nie ma śladów tej trójdzielności, jeśli pominąć zupełnie nikłe podniesienie się krzywej sosny w poz. 45—46 profilu G2. W każdym razie wysokie udziały pyłku leszczyny układają się w profilu G2 tylko powyżej absolutnego maksimum dębu (jak w większości profilów eemskich), a nie poniżej i powyżej tego punktu, jak to było w diagramie główczyńskim z roku 1964 i w profilu z Bedlna.

VII. KILKA UWAG O OSADACH PRZYKRYWAJĄCYCH SERIĘ INTERGLACJALNĄ

Profil interglacjalny kończy się w Głównicy fazą *i*. Staranne poszukiwania osadów, które zawierałyby ślady młodszych faz, nie dały rezultatu. Profil nie wnosi zatem nic nowego do obrazu granicy interglacjału eemskiego i zlodowacenia bałtyckiego.

Osady interglacjalne przykryte są w całym zagłębieniu piaskami różnoziarnistymi ze żwirem (fig. 1, 9). Jak w większości stanowisk eemskich poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia nadkład piaszczysto-żwirowy jest najprawdopodobniej produktem soliflukcyjnego przemieszczenia materiału z wyżej położonego obszaru morenowego. Nastąpiło to zapewne w okresie zlodowacenia bałtyckiego; nie ma jednak żadnych podstaw do bliższego określenia wieku nadkładu. Soczewki mułu rdzawego (10) i mułu oliwkowego (11) w zachodniej części zagłębienia nie zawierają niemal zupełnie pyłku. W piaskach ze żwirem (9) znaleziono natomiast wiele pyłku roślin synantropijnych wymytych od góry z szarych mułów piaszczystych (12), które są najmłodszym ogniwem stratygraficznym i powstały prawdopodobnie już w czasach historycznych.

Dziś zagłębienie główczyńskie otoczone jest ok. 30-letnim lasem sosnowym i jest w zasadzie suche. Natomiast do końca lat trzydziestych było płytkim jeziorkiem*, a w najbliższym jego otoczeniu rozciągały się pola orne i pastwiska. Spadek poziomu wód gruntowych i osuszenie jeziorka nastąpiło wkrótce po zasadzeniu lasu (wg uprzejmej informacji leśniczego pana Z. Lewandowskiego). Osady mułowo-piaszczyste, zawierające ogromne ilości pyłku roślin synantropijnych powstały zapewne w okresie, gdy zagłębienie było częściowo przynajmniej wypełnione wodą, a ze stoków moreny stale oranych splukiwany był materiał pylasty i piaszczysty. Warstwa mulasto-piaszczysta zawdzięcza swą stosunkowo dużą miąższość znacznej podatności gleb ornych na zboczach wzgórz na splukiwanie.

Wykonano analizę pyłkową kilku prób z tejże warstwy mułu piaszczystego. Spekttra wskazują, że osad ten powstał niewątpliwie w okresie intensywnej gospodarki rolnej w otoczeniu jeziorka. Udział w nich pyłku NAP wynosi od 62 do 77% (w układzie totalnym) i jest świadectwem bardzo silnego odlesienia. Stwierdzono obecność pyłku wielu roślin uprawnych, głównie zbóż (przy czym udział pyłku typu *Secale* wynosi od 8 do 12%) oraz *Cannabaceae*, występujących w ilości od 10 do 25%. Wykryto także *Fagopyrum* oraz liczne chwasty (*Centaurea cyanus*, *Plantago lanceolata*, cf. *Consolida*, *Convolvulus* i in.).

Próby piasków ze żwirem (9) dały zbliżone wyniki. Analiza dwóch prób wykazała obecność 57—65% pyłku NAP, a w jego obrębie m.in. ok. 9% pyłku typu *Secale* i 20—25% pyłku *Cannabaceae*, ponadto m.in. pyłek *Centaurea cyanus*, *Plantago lanceolata* itp. Jak w większości stanowisk interglacjału eemskiego poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia osady piaszczysto-żwirowe przykrywające właściwą serię interglacjalną są zapewne genetycznie związane z warunkami peryglacjalnymi ostatniego okresu zimnego i stanowią stratygraficzny ekwiwalent osadów zlodowacenia bałtyckiego. Zawarty w piaskach materiał pyłkowy nie

* Zagłębienie do dziś zwane jest przez ludność miejscową „jeziorkiem”.

jest synchroniczny z osadem i pochodzi z przeniesienia pyłku z mułów młodoholocenijskich daleko w głąb piasków ze żwirem przez spływającą wodę opadową i wskutek wahań poziomu wód. W bardzo luźnym materiale piaszczysto-żwirowym nie nastąpiła przy tym segregacja pyłku zachodząca na ogół w piaskach, polegająca na względnym wzbogaceniu niższych poziomów osadu w ziarna pyłku o mniejszych wymiarach (W. Selle 1940, J. Dyakowska 1959, str. 145). Wielkie ziarna pyłku typu *Secale* stwierdzone zostały np. w próbach z mułu w ilości 8—12%, a w próbie z piasku z gł. 1,5—1,6 m w ilości 9%; obok tego stosunkowo małe ziarna pyłku *Betula* odpowiednio w ilości 4—9% i 6%. Infiltracja pyłku w głąb serii piaszczysto-żwirowej nie miała zatem charakteru selektywnego.

VIII. PODSUMOWANIE

1. Pełne opracowanie profilu z Głównicy całkowicie potwierdza zaliczenie tego stanowiska do interglacjału eemskiego.

2. Stanowisko główczyńskie jest zagłębieniem bezodpływowym wypełnionym osadami jeziornymi i torfowymi interglacjału przykrytymi soliflukcyjnymi utworami piaszczysto-żwirowymi.

3. Profil obejmuje fazy od *d* do *i* wg schematu K. Jessena i V. Milthersa.

4. Spektre fazy *d* rejestrują współistnienie lasów złożonych z sosny, brzozy i osiki z ograniczonymi płatami reliktovej roślinności heliofilnej przetrwałej z otwartych zbiorowisk najwcześniejszych faz interglacj. u.

5. Alternacja wierzchołków krzywych pyłku sosny i brzozy w fazie *d* jest najprawdopodobniej odzwierciedleniem dwóch przejściowych fal ochłodzenia eliminujących częściowo sosnę.

6. Faza *e* jest początkiem kształtowania dwóch zasadniczych typów zbiorowisk leśnych charakterystycznych później dla optymalnego odcinka interglacjału: lasów liściastych z dębem jako głównym składnikiem i lasów typu łęgowego z jesionem i chmielem.

7. Faza *f* jest okresem najpełniejszego rozwoju dąbrów i lasów typu łęgowego; z tym drugim typem zbiorowiska leśnego związany mógł być *Vitis*, którego pyłek znaleziono w tej fazie.

8. Skutkiem przemian klimatycznych i przesunięcia równowagi między opadami a parowaniem na korzyść parowania jest postępujący w fazie *f* spadek poziomu wód prowadzący do zaniku sedymentacji w zachodniej części zbiornika i powstania torfowiska mszystego w części wschodniej.

9. Faza *g* jest okresem rozwoju lasów lipowo-grabowych z cisem, potem grabowych, wreszcie grabowych ze wzrastającą domieszką świerka i jodły. W starszej części fazy współwystępują *Ilex*, *Viscum* i *Hedera*,

1—3. *Populus*

4—6. *Taxus*

7—9. *Juniperus*

10. *Pleurospermum*

11. *Ephedra* typ *distachya*

12. *Ephedra* typ *fragilis*

13. *Fagus*

14. *Ulmus* typ A

15. *Ulmus* typ B

1 i 3. *Selaginella*

2. *Helianthemum* typ *nummularium*

4. *Helianthemum* typ *oelandicum*

5. *Polemonium*

6. *Gentiana* subgen. *Gentianella*

1—6. *Vitis*
 7 i 10—11. *Buxus*
 8. *Hedera*

9. *Ilex*
 12. *Berberis*
 13. *Viscum*

co pozwala ocenić temperaturę miesiąca najzimniejszego nanie mniej niż $-0,5^{\circ}\text{C}$, najcieplejszego na co najmniej $16-17^{\circ}\text{C}$.

10. W młodszej części fazy *g* stwierdzono obecność *Buxus*. Najbliższym stanowiskiem interglacialnym bukszpanu są Gánovce (650 m n.p.m.) na południowych stokach Tatr.

11. W górnej części fazy *g* zaznaczyło się przejściowe podtopienie torfowiska wyrażone kulminacją pyłku roślin wodnych (*Potamogeton*) i podwyższeniem domieszki piaszczystej w osadzie.

12. Fazę *h* charakteryzuje kulminacja świerka. Jednocześnie pojawiają się *Ericaceae*.

13. W związku z postępującym ochłodzeniem i zwilgotnieniem klimatu zachodzi w fazie *i* zjawisko przeciwne w stosunku do zjawiska zarejestrowanego w fazie *f* — na terenie zagłębienia odradza się jeziorko.

14. Przemiany klimatyczne i wkroczenie drzew iglastych powodują zmiany siedliskowe w kierunku zubożenia — pojawiają się w profilu zarodniki *Sphagnum*, pyłek *Drosera* i *Ericaceae*.

15. Fazę *i* cechuje postępujące rozluźnienie szaty leśnej wyrażone zwiększoną frekwencją pyłku NAP i ponownym pojawieniem się heliofitów.

Katedra Geologii Czwartorzędu
Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 22, al. Żwirki i Wigury 93

THE EEMIAN INTERGLACIAL AT GŁÓWCZYN NEAR WYSZOGRÓD (CENTRAL POLAND)

Summary

The interglacial site at Główny 11 km north of Wyszogród (Western Masovia) lies at the inner side of the end moraine of the Wkra Stadial of the Middle Polish Glaciation. It is a small intermorainal lake of basin without drainage type filled with interglacial organogenic deposits. The basin consisted of two parts: a deeper and larger eastern part and a smaller and shallower western one. The older part of interglacial series consists of grey clay and brown detritus gyttja, the younger is formed by moss peat and the youngest one by brown clayey gyttja again. The interglacial series is covered by an about 2-m solifluction cover of sand with gravel.

In the lowest parts of the profile the pollen material is contaminated with redeposited sporomorphs. A correction of the spectra of this contaminated material was attempted after J. Iversen (1936); as a result of this attempt additional simplified diagrams were obtained (Fig. 5).

The profile begins with phase *d* according to the scheme of K. Jesen & V. Milthers (1928). In this phase three successive maxima of *Pinus* pollen separated by two birch maxima can be distinguished. This alternation of the culminations of the curves of *Pinus* and *Betula* reflects probably the successively occurring

changes in the composition of the forests. Analogical variations in the occurrence of *Betula* and *Pinus* pollen are seen in some other Eemian profiles in central Poland. The correlation diagram seems to confirm the supposition that the variations in the contribution of pine and birch pollen reflect the changes in the forest composition occurring on a wide area of central Poland and caused by some regional factor, maybe of climatic nature. The twice repeated appearance of forests with the prevalence of birch (and with aspen) on the area previously covered by pine forests was probably connected with a temporary deterioration of the climate and small but perceptible shifts of the plant subzones. Although the forests of phase *d* were as a rule dense, there remained in some sites particularly unfavourable to trees relict groups of heliophilous species constituting the remnants of pioneer open plant communities of the late Middle Polish Glaciation and of the oldest interglacial phases (*Ephedra*, *Helianthemum*, *Caryophyllaceae*, *Chenopodiaceae*, *Plantago*, *Thalictrum*, *Polemonium*, *Hippophaë*, *Saxifraga*, *Pleurospermum*, *Selaginella*, *Lycopodium selago*).

With the decline of phase *d* the more important heliophilous elements vanished and traces of indicator plants of a completely contrasting climatic character appeared (*Viscum* and *Hedera*). In the earlier part of phase *e* pine forests developed at first still intermixed with birch and aspen; they in time gradually evolved into relatively light oak-pine stands with an undergrowth of *Cornus*, *Evonymus*, *Rhamnus*, *Viburnum* and *Berberis*. On moister sites forests of the *Fraxinetum* type with *Humulus* appeared. The local aquatic flora became enriched in *Stratiotes aloides*.

For phase *f* deciduous forests with the oak as dominating component were characteristic. They comprised also elms and maples and lindens (mainly *Tilia cordata*). Moister places were covered as before by forests resembling the *Fraxinetum* type ones. In sample 45 in the borehole G2 belonging to this phase one pollen grain of *Vitis* was found. This genus is considered as one of the floristic elements distinguishing the Penultimate Interglacial from the Eemian period. In the undergrowth and at the border of these forests grew *Cornus*, *Evonymus* and *Viburnum*. *Hedera* and *Viscum* flowered profusely. The local aquatic flora was at this phase extremely rich and a new component appeared in it at this time — *Salvinia*.

In the western bay of the depression lake sedimentation ended probably in the middle of phase *f* and in main part at the turn between phase *f* and *g* a moss peat bog formed. The gradual disappearance of the water body and transformation of the lake into a peat bog occurred chiefly owing to a considerable lowering of the water level (at least by ca 2.5 m). According to S. Z. Różycki's views this phenomenon may be referred to climatic changes leading to a shift in the equilibrium between precipitation and evaporation in favour of evaporation.

For the older part of phase *g* linden-hornbeam forests with hazel undergrowth were characteristic as well as admixture of elm, maple and yew. Fir and spruce appeared later. Judging by the occurrence of *Ilex* and *Viscum* and the constant flowering of ivy in the older part of phase *g* the mean temperature of the coldest month must have been not lower than -0.5°C , and of the warmest month not less than $16-17^{\circ}\text{C}$ (comp. J. Iversen 1944). In the younger part of this phase the presence of *Buxus* has been established, so far not recorded in the Eemian Interglacial in Poland. The finding of *Buxus* closest to Główny in the Interglacial is in Gánovce on the southern slopes of the Tatras (650 m a.s.l.).

Within the depression a moss peat bog developed repeatedly inundated in the younger part of phase *g*.

In phase *h* forests developed composed mainly of spruce, fir and pine. In connection with the climatic changes deciduous trees became scarcer or were comple-

tely eliminated. Later — in phase *i* — on the area of Główny pine forests predominated and the forest cover became less dense. Heliophytes reappeared (*Ephedra*, *Helianthemum*, *Gentiana*, *Chenopodiaceae*, *Caryophyllaceae*, *Plantago*, *Thalictrum*, *Pleurospermum*, *Linum*, *Lycopodium selago*). The cooler and moister climate now prevailing was manifested also in changes of the local hydrological situation. The depression was gradually filled with water again. Phase *i* is represented by gyttja and clay deposits. In connection with the general climatic transformations and the prevalence of coniferous trees (particularly of spruce) the habitat also changed, this being manifested by an increased contribution of *Sphagnum* spores and *Ericaceae* pollen and by the appearance of traces of plants characteristic for *Sphagnum* bogs. In the water body *Myriophyllum alternifolium* appeared known for its occurrence in waters of oligotrophic character.

Chair of Quaternary Geology
University of Warsaw
Warszawa 22, al. Żwirki i Wigury 93

LITERATURA

- Aario L., 1940, Waldgrenzen und subrezentent Pollenspektren in Petsamo Lapp-land Ann. Acad. Sci. Fenn. B, 54 (8): 1—120, Helsinki.
- Aario L., 1943, Über die Wald- und Klimaentwicklung an der lapplandischen Eismeerküste in Petsamo, Annal. Bot. Soc. Zool. Botan. Fenn. Vanamo, 19 (1): 1—158, Helsinki.
- Andersen S. Th., 1961, Vegetation and its environment in Denmark in the early Weichselian Glacial, Danm. Geol. Unders. II, 75: 1—175, København.
- Andersen S. Th., 1964, Interglacial plant successions in the light of environmental changes, INQUA, Rep. of the VIth Int. Congr. on Quaternary, Warsaw 1961, 2: 359—368, Łódź.
- Beug H. J., 1963, Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende Gebiete, 1, 63 S., Stuttgart.
- Bitner K., 1956, Flora interglacialna w Otapach, Biul. IG 100: 61—120, Warszawa.
- Borówko-Dłużakowa Z., 1960, Dwa nowe profile interglacialne z Warszawy w świetle badań paleobotanicznych, Biul. IG 150: 105—124, Warszawa.
- Borówko-Dłużakowa Z. i Halicki B., 1957, Interglacja Suwalszczyzny i terenów sąsiednich, Acta Geol. Pol. 7 (4): 361—397, Warszawa.
- von der Brelie G., 1955, Die pollenstratigraphische Gliederung des Pleistozäns in Nordwestdeutschland, Eiszeitalter u. Gegenwart 6: 25—38, Öhringen.
- Brem M., 1953, Flora interglacialna z Ciechanek Krzesimowskich, Acta Geol. Pol. 3 (3): 475—480, Warszawa.
- Bremówna M. i Sobolewska M., 1950, Wyniki badań botanicznych osadów interglacialnych w dorzeczu Niemna, Acta Geol. Pol. 1 (4): 336—364, Warszawa.
- Chanda S., 1962, On the pollen morphology of some Scandinavian *Caryophyllaceae*, Grana Pal. 3 (3): 67—89, Stockholm.
- Doroganiewskaja J. E., Szenfinkiel I. A., Griczuk W. P., 1952, Nowaja tiażielaja židkost' dla sporowo-pylcowego analiza, Izv. AN SSSR sier. gieogr. 4: 73—74, Moskwa.
- Dyakowska J., 1956, Spektra pyłkowe utworów zastoiskowych, Biul. IG 100: 217—224, Warszawa.

- Dyakowska J., 1959, Podręcznik palynologii, str. 325, Warszawa.
- Eneroth O., 1951, Investigations of the possibility of differentiating the pollen of different species of *Betula* in fossil material, Geol. För. Förh. 73 (3): 343—405, Stockholm.
- Erdtman G., 1943, An introduction to pollen analysis, 239 p., New York.
- Erdtman G., Berglund B. & Pragłowski J., 1961, An introduction to a Scandinavian pollen flora, 92 p., Stockholm.
- Fægri K. & Iversen J., 1964, Text-book of pollen analysis, 237 p., Copenhagen.
- Firbas F., 1949, Waldgeschichte Mitteleuropas, 1, 480 S., Jena.
- Godwin H., 1956, The history of the British flora, 384 p., Cambridge.
- Gołabowa M., 1957, Roślinność interglacialna z Makowa Mazowieckiego, Biul. IG 118: 91—103, Warszawa.
- Griczuk W. P., 1950, Rastitelnost' russkoj rawniny w niżnie- i sriednieczetwierticnoje wriemia, Tr. Inst. Gieogr. AN SSSR 46: 5—202, Moskwa—Leninograd.
- Hafsten U., 1956, Pollenanalytic investigations on the Late Quaternary development in the inner Oslo Fjord area, Univers. Bergen Årbok, Naturviten. rekke 8: 1—161, Bergen.
- Halicki B., 1951, Rola lodu gruntowego w kształtowaniu plejstocénskich form, peryglacialnych, Acta Geol. Pol. 2 (4): 616—618, Warszawa.
- Halicki B. & Brodniewicz I., 1961, La stratigraphie du Pléistocène supérieur dans la région péribaltique méridionale, Bull. de l'Acad. Pol. des Sci. sér. d. sci. géol. et géogr. 9 (3): 163—169, Warszawa.
- Hallik R., 1953, Zur Feinstratigraphie des Eem-Interglazials, Geol. Jhb. 68: 179—184, Hannover.
- van der Hammen T., 1952, Late-Glacial flora and periglacial phenomena in the Netherlands, Leidse Geol. Mededel. 17: 71—183, Leiden.
- Iversen J., 1936, Sekundäres Pollen als Fehlerquelle, Danm. Geol. Unders. IV 2 (15): 1—24, København.
- Iversen J., 1944, *Viscum*, *Hedera* and *Ilex* as climate indicators. Geol. För. Förh. 66 (3): 463—483, Stockholm.
- Iversen J., 1954, The Late-Glacial flora of Denmark and its relation to climate and soil, Danm. Geol. Unders. II, 80: 87—119, København.
- Iversen J., 1960, Problems of the early Post-Glacial forest development in Denmark, Danm. Geol. Unders. IV, 4 (3): 1—32, København.
- Iversen J., 1964, Plant indicators of climate, soil and other factors during the Quaternary, INQUA, Rep. of the VIth Int. Congr. on Quaternary Warsaw 1961, 2: 421—428, Łódź.
- Janczyk-Kopikowa Z., 1965, Flora interglacialu eemskiego w Kaliskiej koło Chodcza na Kujawach, Biul. IG 187: 107—117, Warszawa.
- Janczyk-Kopikowa Z., 1966, Interglacial eemski w Gołkowie koło Warszawy, Kwart. Geol. 10 (2): 453—461, Warszawa.
- Jasnowski M., 1959, Czwartorzędowe torfy mszyste, klasyfikacja i geneza, Acta Soc. Bot. Pol. 28 (2): 319—364, Warszawa.
- Jentys-Szaferowa J., 1929, Budowa błon pyłku leszczyny, woskownicy i europejskich brzoź oraz rozpoznawanie ich w stanie kopalnym, Rozpr. Wydz. Mat. Przyr. PAU B, 68 (5): 300—340, Kraków.
- Jessen K. & Milthers V., 1928, Stratigraphical and paleontological studies of interglacial fresh-water deposits in Jutland and Northwest Germany, Danm. Geol. Unders. II 48: 1—380, København.
- Kalniet A., 1952, Zagadnienie genezy i wieku tzw. oczek lodowcowych, Wiad. Muz. Ziemi 6 (2): 339—355, Warszawa.

- Karpowiczówna W., 1929, Badania nad rozwojem przedrośli oraz pierwszych liści sporofitu paproci krajowych (*Polypodiaceae*), Rozpr. Wydz. Mat. Przyr. PAU B, 68 (4): 257—298, Kraków.
- Kelly M. R., 1964, The Middle Pleistocene of North Birmingham, Phil. Trans. of the Roy. Soc. of London B 247 (741): 533—592, London.
- Klajnert Z., 1965, Budowa geologiczna i geneza zagłębień bezodpływowych w Józefowie, Przegl. Geogr. 37 (1): 143—162, Warszawa.
- Kneblova V., 1958a, Flora interglacialna trawertynów w Ganowcach (wsch. Słowacja), Acta Biol. Cracov. ser. bot. 1 (1): 1—5, Kraków.
- Kneblova V., 1958b, Die glaziale Flora in den pleistozänen Sedimenten bei Brusperk im Ostrauer Gebiet, Anthropozoikum 7: 291—305, Praha.
- Kopczyńska-Żandarska K., 1961, Rozwój rzeźby okolic Radzikowa w czasie recesji zlodowacenia środkowopolskiego, Biul. Geol. 1 (1): 3—16, Warszawa.
- Koperowa W. & Srodoń A., 1965, Pleniglacial deposits of the Last Glaciation at Zator (west of Kraków), Acta Palaeobot. 6 (1): 3—31, Kraków.
- Lencewicz S., 1917, Moreny czołowe między Płońskiem a Wyszogrodem, Spraw. Tow. Nauk. Warsz. 10 (8): 988—990, Warszawa.
- Lencewicz S., 1919, Nowe moreny czołowe na Niżu Polskim, Przegl. Geogr. 1: 108—114, Warszawa.
- Lencewicz S., 1927, Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla, Prace PIG 2 (2): 66—194, Warszawa.
- Lewiński J., Łuniewski A., Małkowski S. i Samsonowicz J., 1927, Przewodnik geologiczny po Warszawie i okolicy, str. 183, Warszawa.
- Lubliner-Mianowska K., 1953, Wskazówki do badania torfu, str. 88, Katowice.
- Luther H., 1951, Verbreitung und Ökologie der höheren Wasserpflanzen in Brackwasser der Ekenäs-Gegend in Südfinnland, Acta Bot. Fenn. 50: 1—370, Helsinki.
- Mädler K., 1955, *Azolla* aus dem Quartär und Tertiär sowie ihre Bedeutung für die Taxonomie älteren Sporen, Geol. Jhb. 70: 143—158, Hannover.
- Maksimow A., 1965, Torf i jego użytkowanie w rolnictwie, str. 396, Warszawa.
- Monoszon M. Ch., 1959, Opisanie pyłcy przedstawitelej siemiejstwa *Ulmaceae* proizrastajuszczich na tieritorii SSSR, Tr. Inst. Gieogr. AN SSSR 77: 187—198, Moskwa—Leningrad.
- Nilsson S. & Radwan Pragłowski J., 1963, Pollen and spore key, An introduction to a Scandinavian pollen flora 2: 27—89, Stockholm.
- Niklewski J., 1966, Plejstoczeński profil pyłkowy z okolic Koniecpola nad Pilicą, Acta Geol. Pol. 16 (3): 401—412, Warszawa.
- Niklewski J., Kaćki J. i Stawin J., 1964, Analiza pyłkowa interglacjalu z Głównicy, Acta Geol. Pol. 14 (3): 407—414, Warszawa.
- Paczoski J., 1930, Lasy Białowieży, str. 575, Poznań.
- Piech K., 1932, Utwory międzylodowcowe w Szczercowie (woj. łódzkie), Rocznik Pol. Tow. Geol. 8 (2): 51—132, Warszawa.
- Potonié R., Thomson P. W. & Thiergart F., 1950, Zur Nomenklatur und Klassifikation der neogenen Sporomorphae (Pollen und Sporen), Geol. Jhb. 65: 35—70, Hannover.
- Radwan Pragłowski J., 1963, Notes on the pollen morphology of Swedish trees and shrubs, An introduction to a Scandinavian pollen flora 2: 5—25, Stockholm.
- Raniecka-Bobrowska J., 1954, Analiza pyłkowa profilów czwartorzędowych Woli i Żoliborza w Warszawie, Biul. IG 69: 107—133, Warszawa.

- Różycki S. Z., 1961a, INQUA VIth Congress, Guide-book of excursion from the Baltic to the Tatras 2 (1) Middle Poland: 1—116, Łódź.
- Różycki S. Z., 1961b, Substages of Great Interglacial stage, *Prace o plejst.* Polski śr.: 13—42, Warszawa.
- Różycki S. Z., 1965, Traits principaux de la stratigraphie et de la paleomorphologie de la Pologne pendant le Quaternaire, INQUA, Rep. of the VIth Int. Congr. on Quaternary Warsaw 1961, 1: 123—143, Łódź.
- Rühle E., 1961, Przekrój geologiczny osadów w Sławnie koło Radomia, *Biul. IG* 169: 5—14, Warszawa.
- Ruszczyńska H., 1961, Struktura moren czołowych koło wsi Kobylniki na północ od Wyszogrodu, *Biul. Geol.* 1 (1): 17—23, Warszawa.
- Ruszczyńska-Szenajch H., 1964, Plejstocen w okolicach Wyszogrodu nad Wisłą, *Acta Geol. Pol.* 14 (3): 341—360, Warszawa.
- Samuelsson G., 1934, Die Verbreitung der höheren Wasserpflanzen in Nordeuropa, *Acta Phytogeogr. Suecica* 6: 1—211, Stockholm.
- Selle W., 1940, Die Pollenanalyse von Ortstein Bleichsandschichten, *Beih. Bot. Cbl.* B60: 525—549, Dresden.
- Sładkow A. N., 1951, Opriedielenie widow *Lycopodium* L. i *Selaginella* Spring. po sporam i mikrosporam, *Tr. Inst. Geogr. AN SSSR* 50: 107—200, Moskwa—Leningrad.
- Sobolewska M., 1954, Dzika winorośl (*Vitis silvestris* Gmel.) w plejstocenie polskim, *Biul. IG* 69: 159—164, Warszawa.
- Sobolewska M., 1956a, *Azolla filiculoides* Lam. w starszym interglacjale w Polsce, *Biul. IG* 100: 241—244, Warszawa.
- Sobolewska M., 1956b, Roślinność plejstoceńska z Syrnika nad Wieprzem, *Biul. IG* 100: 143—186, Warszawa.
- Sobolewska M., 1961, Flora interglacjału eemskiego z Góry Kalwarii, *Biul. IG* 169: 73—90, Warszawa.
- Sobolewska M., 1966, Wyniki badań paleobotanicznych nad eemskimi osadami z Józefowa na Wyż. Łódzkiej, *Biul. Perygl.* 15: 303—312, Łódź.
- Sorsa P., 1964, Studies on the spore morphology of the Fennoscandian fern species, *Ann. Bot. Fenn.* 1 (3): 179—201, Helsinki.
- Szafer W., 1952, Stratygrafia plejstocenu w Polsce na podstawie florystycznej, *Rocznik Pol. Tow. Geol.* 22 (1): 1—60, Kraków.
- Szafer W. (red.), 1959, Szata roślinna Polski, 1, str. 586, Warszawa.
- Szafer W., 1964, Ogólna geografia roślin, str. 433, Warszawa.
- Szymkiewicz D., 1923, Sur l'importance du deficit hygrométrique pour la phytogéographie écologique, *Acta Soc. Bot. Pol.* 1: 8—18, Warszawa.
- Środoń A., 1950, Rozwój roślinności pod Grodnem w czasie ostatniego interglacjału, *Acta Geol. Pol.* 1 (4): 365—400, Warszawa.
- Środoń A., 1956, W sprawie interglacjału w Szelażu pod Poznaniem, *Biul. IG* 100: 45—55, Warszawa.
- Środoń A., 1962, O niektórych zagadnieniach dotyczących paleobotaniki i stratygrafii czwartorzędu w Polsce, *Kwart. Geol.* 6 (4): 679—694, Warszawa.
- Środoń A., 1965, *Vitis silvestris* Gmel. in the interglacial flora at Suszno on the river Bug (East Poland), *Acta Palaeobot.* 6 (1): 33—44, Kraków.
- Środoń A., i Gołabowa M., 1956, Plejstoceńska flora z Bedlna, *Biul. IG* 100: 7—36, Warszawa.
- Tołpa S., 1952, Flora interglacjałna w Kaliszu, *Biul. IG* 68: 73—113, Warszawa.
- Tołpa S., 1961, Flora interglacjałna ze Sławna koło Radomia, *Biul. IG* 169: 15—56, Warszawa.
- Tomanek J., 1966, Botanika leśna, str. 478, Warszawa.

- Troels-Smith J., 1955, Characterization of unconsolidated sediments, Danm. Geol. Unders. IV 3 (10): 1—73, København.
- Troels-Smith J., 1960, Ivy, mistletoe and elm, climate indicators — fodder plants, Danm. Geol. Unders. IV 4 (4): 1—32, København.
- Walczak W. i Szczypek P., 1966, Nowe stanowisko interglacjału eemskiego w Sudetach Kłodzkich, Czasop. Geogr. 37 (3): 305—310, Wrocław.
- Wasylikowa K., 1964, Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Polsce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy, Biul. Perygl. 13: 261—418, Łódź.
- Welten M., 1957, Über das glaziale und spätglaziale Vorkommen von *Ephedra* am nordwestlichen Alpenrand, Ber. d. Schweiz. Bot. Ges. 67: 33—54, Bern.
- Więckowski K., 1966, Osady denne jeziora Mikołajskiego, Prace Geogr. 57: 1—112, Warszawa.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	125
II. Sytuacja geologiczna i stratygrafia osadów interglacjalnych w Głównicynie	127
III. Metodyka pracy	132
IV. Interpretacja spektrów z osadów zanieczyszczonych materiałem pyłkowym na wtórnym złożu	136
V. Uwagi o niektórych typach sporomorf	143
VI. Rozwój roślinności interglacjalnej w okolicach Głównicy	162
1. Fitofaza <i>d</i>	162
2. Fitofaza <i>e</i>	170
3. Fitofaza <i>f</i>	172
4. Fitofaza <i>g</i>	176
5. Fitofaza <i>h</i>	180
6. Fitofaza <i>i</i>	180
VII. Kilka uwag o osadach przykrywających serię interglacjalną	182
VIII. Podsumowanie	184
Summary	185
Literatura	187

Fig. 1. Przekrój geologiczny zagłębienia bezodpływowego w Głowczynie
Geological section of basin without drainage at Głowczyn

Numbers in circles: 1 — boulder clay;	7 — light brown gyttja;
2 — loam sands;	8 — light brown clay;
3 — grey clay;	9 — coarse sand with gravel;
4 — brown gyttja;	10 — reddish silt;
5 — clayey gyttja in western part of basin;	11 — olivegreen silt;
6 — moss peat;	12 — grey silt.

Fig. 2. Przekrój geologiczny zagłębienia bezodpływowego w Głowczynie
 Geological section of basin without drainage at Głowczyn

Numbers in circles: 1 — boulder clay;
 2 — loam sands;
 3 — grey clay;
 4 — brown gyttja;
 6 — moss peat;
 7 — light brown gyttja;

8 — light brown clay;
 9 — coarse sand with gravel;
 10 — reddish silt;
 12 — grey silt;
 13 — dusty sand.

GŁÓWCZYN

otwór G2-borehole G2

GŁÓWCZYN

SONDA G 28a

SOUNDING G 28a

Fig. 4. Diagram pyłkowy sondy G28a w Główny
Pollen diagram of sounding G28a at Główny

02

G28a

Fig. 5. Uproszczone diagramy pyłkowe sondy G28a i dolnej części wiercenia G2 skorygowane wg J. Iversena
Simplified pollen diagrams of profile G28a and lower part of borehole G2, corrected according J. Iversen

Fig. 6. Porównanie wczesnych faz interglacjalu eemskiego w profilach z Polski środkowej
Comparison of early phases of the Eemian Interglacial in profiles from Central Poland