MONOGRAPHIAE BOTANICAE

vol. XXXIII, 1970

EUGENIUSZ ĆWIKLIŃSKI

FLORA SYNANTROPIJNA
SZCZECINA

The synanthropic flora of Szczecin

WARSZAWA

Wydano z zasiłku
Polskiej Akademii Nauk

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE — WARSZAWA 1970

Wydanie I. Nakład 400+80 egz. Ark. wyd. 7,75. Ark. druk. 6,5.
Papier druk. sat. III kl. 80 g, 70 × 100.16. Oddano do składu
w styczniu 1970 r. Podpisano do druku w październiku 1970 r.
Druk ukończono w listopadzie 1970 r.

Zam. 242 23.I.1970 r. K-37 Cena zł 24.—

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, Lublin, ul. Unicka 4.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	5
2. Charakterystyka badanego terenu	7
a. Obszar, położenie i rys morfologiczny	7
b. Budowa geologiczna	9
c. Warunki klimatyczne	10
3. Przemiany w krajobrazie Szczecina w ujęciu historycznym	12
4. Rozwój portu szczecińskiego i wpływ jego na rozprzestrzenianie się roślin	15
5. Analiza flory synantropijnej Szczecina	16
6. Zmiany w składzie gatunków w okresie od 1840—1966 roku	21
7. Porównanie flory synantropijnej Szczecina z florą sześciu innych miast Polski i z florą Berlina	25
8. Wykaz synantropijnych gatunków flory Szczecina	28
9. Zestawienie wyników badań i wnioski	95
10. Piśmiennictwo	97
11. Summary	102

1. WSTĘP

Zagadnienie roślinności synantropijnej, jakkolwiek nie nowe, stało się przedmiotem badań w Polsce dopiero po drugiej wojnie światowej.

Pierwszą pionierską pracą badawczą z tego zakresu była praca Krawiecowej — „Analiza geograficzna roślinności synantropijnej miasta Poznania” (1951). Cennymi pozycjami są również prace Kornasia (1950, 1952, 1953, 1959). W latach następnych podjęto badania nad roślinnością synantropijną niektórych miast Polski. Obecnie własne opracowania flory synantropijnej posiadają, oprócz Poznania, Chełm (opracował Fijałkowski 1963), Gdańsk (Schwarz 1967), Łódź (Sowa 1962, msk. 1964), Rabka (Skowrońska 1965), Warszawa (Zanowa 1964 msk.) i Wrocław (Rostański msk.).

Rozwijają się również badania roślinności synantropijnej portów. U nas zagadnienia te uwzględniła Schwarz w pracy pt. „Badania nad florą synantropijną Gdańska i okolicy (1967).

Roślinność Szczecina i okolicy budziła od dawna zainteresowanie wielu florystów. Szczególną uwagę zwracała tutaj znaczna liczba gatunków drzew i krzewów obcego pochodzenia.

Wśród roślinności zielnej obserwowano pojawianie się nowych gatunków roślin, które zdomowiały się i wzbogacały miejscową florę, albo ginęły. Autorzy „Roślin Polskich” piszą o tym na str. VI swego dzieła następująco: „Ziemie Zachodnie, a zwłaszcza zaś otoczenie portu szczecińskiego nasunęły nam w szczególnie jaskrawej formie pewną trudność, z którą zresztą spotykamy się, choć bez porównania rzadziej, i w innych częściach kraju: oto znaleziono tam wielką ilość roślin obcych, zawleczonych do nas przypadkowo i przejściowo [...]. Postanowiliśmy uwzględnić tylko bardzo nieliczne gatunki, a mianowicie te, co do których mamy podstawę przypuszczać, że zdomowily się u nas już na dobre i rozszerzają swe zasięgi. Czy dokonany przez nas wybór był trafny, okaże się dopiero z czasem”.

Duży wpływ na różnicowanie się flory szczecińskiej miał niewątpliwie portowy charakter miasta. Szczecin, jako port, był bramą wejściową dla wielu zamorskich roślin, których diaspory (przeważnie nasiona i owoce) przybywały z transportami drogą morską, względnie podróżowały szlakami lądowymi. Rozwojowi tych przybyszów sprzyjały tutaj

sze warunki, przede wszystkim urozmaicenie ukształtowanie terenu, na którym mogły znaleźć odpowiednie dla siebie siedlisko oraz łagodny klimat, odpowiadający wielu nowym gatunkom. Duże znaczenie dla składu flory miało również sąsiedztwo lasów, łąk i terenów wydmych oraz sieć dróg lądowych, rzeki i zbiorniki wodne.

W niemieckiej literaturze botanicznej wiadomości o florze Szczecina zawierają prace następujących autorów: Schmidt 1840, Marsson 1869, Ascherson i Graebner 1898—99, Müller 1911, Hegi 1908—1960, Holzfuss 1933, 1936, 1937, 1939, 1941. Ten ostatni interesował się przybywaniem gatunków obcych na teren Szczecina i Pomorza.

Z botaników polskich wiadomości o roślinach Szczecina podają: Celiński (1964), Czubiński (1950), Kownas (1958, 1959), Kownas i Piskorski (1958), Kownas i Sienicka (1962), Radomski i Jasnowska (1964, 1965), Wodziec i inni (1948) oraz Żukowski (1959, 1960, 1961). Szczególną wartość przy opracowywaniu podjętego przeze mnie tematu mają publikacje Żukowskiego, w których wymieniono ze Szczecina kilkanaście gatunków roślin synantropijnych i praca Celińskiego z 1964, w której podano gatunki synantropijne ze wschodnich krańców miasta.

Początek moich zainteresowań roślinnością synantropijną Szczecina zawdzięçam prof. dr Jakubowi Mowszowiczowi, pod którego kierunkiem została wykonana niniejsza praca. Badania florystyczne przeprowadziłem w latach 1958—1966. Celem ich było ustalenie aktualnego składu flory synantropijnej Szczecina, dokonanie analizy jej pochodzenia i zmian, jakie zaszły w składzie gatunków w okresie od 1840 do 1966 roku oraz porównanie flory szczecińskiej z florami sześciu innych miast Polski i z florą Berlina.

Przy realizacji powyższego celu przyjąłem ogólnie stosowane dla tego typu prac metody: florystyczną i fitogeograficzną.

Najwięcej czasu pochłonęły mi prace terenowe. W okresie 8 lat przejrzałem wielokrotnie obszar Wielkiego Szczecina. Lustracją były objęte tereny kolejowe i portowe, śmietniska miejskie i przydomowe, przychacie, przydroża, drogi, ulice, gruzyska, ośrodki przemysłowe, cmentarze, zieleńce i parki, murawy, nieużytki, działki pracownicze i ogrody.

Prace terenowe obejmowały gromadzenie materiałów zielnikowych i prowadzenie notatek florystycznych i fitogeograficznych.

Przy oznaczaniu roślin obcego pochodzenia, w sytuacjach wątpliwych, zwracałem się do specjalistów o sprawdzenie tożsamości danego gatunku.

Pewne trudności przy wykonywaniu niniejszej pracy nastąpiło mi ustalenie pochodzenia niektórych zebranych gatunków roślin oraz określenie ich przynależności do odpowiedniej grupy w podziale Thellunga. Tak na przykład *Ligustrum vulgare* L. może być traktowany jako

gatunek rodzimy w południowo wschodniej Polsce, natomiast w niektórych częściach kraju może być zaliczony do ergazjofigofitów lub epeko-fitów. Na terenie Szczecina gatunek ten zaliczyłem do ergazjofigofitów, tj. do gatunków wprowadzonych świadomie, które jako rośliny użytkowe wydostały się spod opieki człowieka.

Ligustr w Szczecinie hodowany jest w parkach i ogródkach przydomowych, a także występuje na gruzach, skarpach kolejowych, przydrożach i nieużytkach.

Składam serdeczne podziękowanie profesorowi drowi Jakubowi Mowszowiczowi za wiele cennych rad i wskazówek przy wykonywaniu niniejszej pracy oraz za umożliwienie mi korzystania z pracowni Katedry i za stałe, bardzo życzliwe interesowanie się postępami badań. Pragnę również podziękować prof. dr Anieli Krawiecowej za cenne uwagi dotyczące analizy flory synantropijnej Szczecina oraz prof. drowi Stefanowi Kownasowi za wszelką udzieloną mi pomoc, życzliwość i za udostępnienie mi materiałów zielnikowych WSR i literatury naukowej z własnej biblioteki.

Doktorowi R. Sowie szczególnie dziękuję za ofiarną pomoc i wskazówki przy opracowaniu i sprawdzaniu materiału zielnikowego, oraz za udostępnienie mi trudnej do zdobycia literatury. Dr Z. Schwarz jestem niezmiernie wdzięczny za udostępnienie mi maszynopisu pracy „Badania nad florą Gdańska i okolicy”, a drowi K. Rostańskiemu za udostępnienie rękopisu „Flora synantropijna Wrocławia”. Dziękuję także doc. dr H. Piotrowskiej, dr H. Trzcińskiej-Tacikowej, drowi T. Tacikowi oraz drowi K. Rostańskiemu za udostępnienie materiałów zielnikowych roślin rzadko spotykanych w Polsce, dr L. Fagasiewicz za sprawdzenie i oznaczenie gatunków z rodzaju *Carex*, a drowi K. Rostańskiemu za oznaczenie gatunków z rodzaju *Oenothera*.

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU

a. Obszar, położenie i morfologia

Obszar Wielkiego Szczecina obejmuje również jezioro Dąbie i wynosi 310 km². Obszar moich badań obejmował tylko tereny lądowe Wielkiego Szczecina, bez jeziora Dąbie i kanałów portowych, o powierzchni około 250 km².

Szczecin położony w odległości o około 65 km od Bałtyku, w pobliżu wielkich zbiorników wodnych (jezioro Dąbie i Zalew Szczeciński), na 53°26' szer. płn. i 14°34' dł. wsch., zajmuje rozległe tereny po obu stronach szerokiej (do 10 km) doliny Odry. Bagnisty obszar tej doliny, którą płyną dwa ramiona Odry, pocięty jest kanałami. W północnej części tej doliny rozciąga się część portowa miasta.

Centrum miasta znajduje się po zachodniej stronie doliny i obejmuje dzielnice: Grabowo, Niebuszewo, Pogodno, Niemierzyn, Turzyn, Świerczewo i Śródmieście. Na północ od niego rozciągają się Wzgórza Warszawskie o powierzchni 50 km² i dochodzące do 131 m n.p.m. Na nich

Rys. 1. Rozmieszczenie dzielnic Szczecina

rozmieszczone są następujące dzielnice miasta: Warszewo, Drzetowo, Gołęcino, Glinki i Skolwin. Na południu i zachodzie znajduje się wał wzniesień bezleśnych, których wysokość dochodzi do 80 m n.p.m. Na nich znajdują się dzielnice: Głębokie, Krzekowo, Gumieńce i Pomorzany.

Powierzchnia wzniesień po tej stronie Odry jest dość urozmaicona. Występują tu różnego typu dolinki. Jedne są pochodzenia polodowcowego o zagłębieniach wypełnionych iłami, inne powstały na skutek erozji i stanowią pochylone tarasy i wąwozy (por. Brinken' 1948). Na wzniesieniach tych znajdują się niewielkie zbiorniki wodne: jezioro Głębokie, jez. Słoneczne oraz stawy: Rusalka, Arkonka, Jasny Staw, Cichy Staw, Syrenie Stawy. Przepływają tu również niewielkie strumienie: Glinka, Osieniec, Gręziniec, Warszawiec, Bystry Rów, Arkonka, Zie-

Rys. 2. Szkic morfologiczny badanego terenu

lonka, Żabieniec, Kijanka Osówka, Bukowa, Gumieniec. Są też tutaj gli-nianki i czynne cegielnie.

Po wschodniej stronie doliny Odry znajdują się wschodnie dzielnice miasta. Część ich położona jest na krawędzi wzniesień Gór Bukowych. Na zachodniej krawędzi tych gór rozmieszczone są cztery dzielnice: Zdroje, Podjuchy, Żydowce i Klucz, a na północnej jest Klęskowo.

Na północ od Gór Bukowych, na piaszczystej równinie znajdują się dzielnice: Dąbie, Kijewo, Wielgowo, Załom. Rozmieszczenie dzielnic Szczecina przedstawia ryc. 1, morfologię terenu ryc. 2.

b. Budowa geologiczna

Podłoże geologiczne Szczecina jest bardzo urozmaicone. Według Brinkena (1948) najgłębsze warstwy zajmuje kreda, na niej zalegają warstwy ilów niebieskich, ilów septariowych i ilów fioletowych o miąższości 50—60 m oraz żółte glaukonitowe piaski szczecińskie o miąższości 11—15 m.

W budowie geologicznej spotyka się przewarstwienia powstałe na skutek ruchów tektonicznych. Wynikiem tego są tak zwane porwaki w okolicy Czarnowa. Północno-wschodnie tereny Szczecina (Kijewo,

Dąbie, Wielgowo i Załom) pokrywają piaski (por. Lencewicz, Kondracki 1962).

W zależności od podłoża wytworzyły się różne rodzaje gleby. Na zachodniej stronie doliny Odry występują przeważnie gleby brunatne (por. Borowiec 1958), po wschodniej — piaszczyste.

c. Warunki klimatyczne

Klimat Szczecina jest wynikiem wpływów morza Bałtyckiego i bliskości Atlantyku. Średnia temperatura lata jest tutaj niższa niż w Polsce centralnej o 1° do 2°C i wynosi od $16,4^{\circ}$ do $17,5^{\circ}\text{C}$, zima jest odpowiednio łagodniejsza o około 2°C . Wiatry wieją przeważnie z zachodu i przynoszą dużo wilgoci. Ogólna ilość opadów jest niższa niż na innych terenach Polski. Często jednak zdarzają się długie i mżyste deszcze, co wywołuje wrażenie dużych opadów. Prawie nie ma tu deszczów ulewnych.

W okresie wykonywania niniejszej pracy najsuchszym rokiem okazał się rok 1963 (poniżej 400 mm). Najwięcej dni gorących (ponad 25°C) było w roku 1964 (30 dni).

Ciekawych danych dostarcza Heliński (1962) odnośnie do pokrycia lodem wód portu szczecińskiego. Według niego przeciętna liczba dni pokrycia lodem portu wynosiła:

w okresie od 1832—1846 r.	— 96 dni
w okresie od 1891—1938 r.	— 28 dni
w okresie od 1949—1960 r.	— 24 dni

Z powyższego zestawienia wynika, że przeciętna ta zmalała w ciągu ostatnich 128 lat o 72 dni. Natomiast przeciętna temperatura miesięcy X—IV w okresie od 1851—1960 r. wg tego samego autora systematycznie wzrastała, i tak:

w okresie od 1851—1890 r.	wynosiła $+3,0^{\circ}\text{C}$
w okresie od 1891—1938 r.	„ $+3,1^{\circ}\text{C}$
w okresie od 1949—1960 r.	„ $+3,2^{\circ}\text{C}$.

Prawdzie (1961) wyróżnił w województwie szczecińskim 8 krain klimatycznych. Obszar Wielkiego Szczecina należy do dwóch krain, a mianowicie: Wzgórza Warszawskie do krainy III B pozostała część miasta do krainy V (por. ryc. 3).

Kraina III (Wzgórza Warszawskie) charakteryzują się średnią temperaturą roczną w granicach od 7 — $7,6^{\circ}\text{C}$, średnią amplitudą dobową od $9,5$ — 11°C . Opady atmosferyczne przekraczają 600 mm w roku.

Krainę V cechują duże ekstrema termiczne od $-29,3^{\circ}\text{C}$ w lutym do $+36,5^{\circ}\text{C}$ w lipcu, wysokie temperatury roczne $8,8^{\circ}\text{C}$. Zima rozpo-

Rys. 3. Krainy klimatyczne województwa szczecińskiego

czyna się po 10.I i trwa 45—50 dni. Jest tu stosunkowo duża ilość przymrozków wiosennych i jesiennych. Amplitudy dobowe w okresie V—VII wynoszą około 11°C . Duża jest wilgotność (80% w V—VII), ale mała ilość opadów, poniżej 525 mm.

Na tle powyższych danych charakteryzujących teren moich badań można stwierdzić dość duże zróżnicowanie w ukształtowaniu powierzchni, a także temperatury i wilgotności. Różnice te uwidaczniają się również w rozmieszczeniu roślinności. Na przykład zbocza zachodniej krawędzi doliny Odry porastają wtórne murawy kserotermiczne, które są najdalej wysuniętymi na północny zachód fragmentami roślinności stepowej w Polsce. Tereny z tą roślinnością, położone między dzielnicą Glinki i Skolwin, zostały opracowane pod względem florystycznym i fitosocjologicznym przez Radomskiego i Jasnowską (1964, 1965). Natomiast w nisko położonych częściach miasta występują gatunki łąkowe.

W opisach polskiej misji na Pomorzu zachowanych z XII wieku są podane wiadomości, z których wynika, że Szczecin był dużym ośrodkiem handlowym. Położony był wówczas na trzech wzgórzach i składał się z obronnego grodu, handlowego podgrodzia i portu (por. Chłopowska 1958).

Wiadomości o roślinach są dość skromne, ale na ich podstawie można stwierdzić, że niektóre drzewa były uważane za miejsca przebywania bóstw pogańskich i otaczane wysoką czcią. Do takich drzew zaliczany był orzech i dąb. Ponadto istniały święte gaje, w których guślarze odprawiali swoje obrzędy. Ówczesny Szczecin posiadał 4 świątynie otoczone zielenią. Nie było tu jednak dużo miejsca na zielen, ze względu na gęstą zabudowę grodu (por. Kownas i Piskorski 1958). Zachowały się informacje o tym, że św. Otton nakazał miejscowej ludności sadzić winorośl. Wynika z tego, że roślina ta, być może, nie była tutaj do tej pory znana.

W przeciwieństwie do skromnej zieleni grodu, okoliczne tereny porastały puszcze z cisami, dębami i bukami. Dąbrowy i buczyny były dobrym terenem do wypasu trzody chlewnej. Lasy dostarczały drewna, miodu, owoców, roślin leczniczych i przemysłowych. W podmokłych lasach zbierano chmiel, używany do wyrobu piwa. W późniejszych czasach szczeciński chmiel znany był na rynkach światowych, a wielkie plantacje tej rośliny były prowadzone w okolicy Polic i Jasienicy.

Na podstawie badań wykopaliskowych można stwierdzić (podają za Kownasem i Piskorskim 1958), że ludność grodu szczecińskiego знаła kilka gatunków zbóż: pszenicę, jęczmień, żyto, owies i proso. Na podmiejskich polach siano len i konopie. Uprawiano też wiele warzyw. Znany był bób, groch, mak i ogórki. Trzodę chlewną karmiono bukwiami i zołędziami. Wykorzystywana była manna jadalna i wodna. Do barwienia płócien i sukna zbierano rośliny w pobliskich borach i na łąkach.

W XIII wieku w grodzie zachodzą duże zmiany. Przede wszystkim zwiększa się ilość ludności napływowej i rozwija się handel. Na miejscu starego grodu powstaje miasto. Jest w nim 6 placów targowych: rybny, węglowy, drzewny, zbożowy, maślany i koński. Powstają kościoły i klasztory otoczone zielenią. Na mocy przywilejów książęcych z 1283 r. i z 1312 roku handel zbożem stał się monopolem Szczecina. Do portu dopływają coraz większe statki. Port powiększa się wzdłuż brzegu Odry. W 1283 r. zostaje wybudowany most Długi, łączący miasto z Łasztownią i przez groblę z Dąbiem.

W 1558 roku rada miasta wydała zakaz sprzedaży statków ze względu na brak odpowiedniego drzewa, co świadczyć by mogło o wyniszczeniu pobliskich lasów. Jednak opisy polowań świadczą o istnieniu dużych

obszarów leśnych. Również sztychy Brauna i Hogenberga z końca XVI wieku przedstawiają Szczecin otoczony zadrzewionymi terenami.

W XVII w. na miejscu dotychczasowych wałów i murów obronnych Szwedzi zakładają nowe urządzenia fortyfikacyjne. Takie otoczenie miasta ograniczało jego rozbudowę (por. Z a r e m b a i O r l i ń s k a 1965). Dlatego też wokół miasta powstają osady o charakterze miejskim oraz rezydencje możnych mieszkańców. Wokół domostw powstają ogrody i parki.

W 1843 r. uruchomiono komunikację kolejową między Szczecinem i Berlinem, a w 1877 r. między Szczecinem i Wrocławiem.

Liczba ludności stale wzrasta. W 1720 r. wynosi 6000, w 1724 r. 10 000, a w 1849 r. 44 500 mieszkańców (por. M y ś l i ń e c k i 1965).

W 1879 r. uruchomiono tramwaje konne, a w 1897 r. elektryczne. W 1875 r. władze miasta postanawiają znieść fortyfikacje, co przyczynia się do dalszego rozwoju miasta i portu. Rozbudowujący się Szczecin zajmuje tereny leśne: na zachodzie tereny Puszczy Wkrzańskiej, na wschodzie tereny Puszczy Bukowej i Goleniowskiej. Powstają leśne parki miejskie, do których obecnie należy Las Arkoński, tereny leśne Głębockiego i na wschodzie krawędź Puszczy Bukowej.

W tych parkach występują stare okazy cisów, dębów i buków, jako świadkowie dawnych tutejszych puszczy. Z tych drzew można obecnie wymienić trzy cisy przy ul. Arkońskiej, o przybliżonym wieku 500 lat, dwa dęby bezszypułkowe w Klęskowie w tym samym wieku, zwane dębami Bolesława Krzywoustego. Nad jeziorem Głębockie rośnie kilka starych dębów i buków (por. K i e r s k a 1959).

Również ślady średniowiecznego Szczecina obserwujemy w zachowanym obecnie układzie ulic na Starym Mieście, przy ul. Kolumba i wzdłuż Odry (Z a r e m b a i O r l i ń s k a 1965).

Nowe plany przestrzennego rozwoju miasta pod koniec XIX i na początku XX wieku uwzględniają dużo miejsca na zieleń. Zakłada się nowe parki, zadrzewia ulice, stare cmentarze zamienia na parki i tworzy nowe tereny cmentarne. Takim nowym cmentarzem o dużych rozmiarach jest założony w 1900 r. Cmentarz Centralny o powierzchni 154 ha, ze specjalnie dobraną roślinnością i zaplanowany jako przyszły park miejski.

Sprzyjające warunki klimatyczne Szczecina, położonego w kotlinie osłoniętej wzgórzami i lasami, umożliwiły zgrupowanie ciekawych gatunków drzew i krzewów.

W okresie II wojny światowej wiele gatunków zginęło podczas bombardowań. Szczególnie ucierpiały delikatne rośliny egzotyczne, które ginęły od mrozu i z braku właściwej opieki ludzkiej.

Spśród obecnie zarejestrowanych 822 gatunków drzew i krzewów, 105 gatunków jest pochodzenia krajowego, 65 pochodzi z płn. Afryki

Rys. 4. Teren zwartych zabudowań Szczecina

i pd.-zachodniej części Azji, 216 jest azjatyckich, 146 pn.amerykańskich (Kownas i Sienicka 1962).

Niektóre z tych gatunków rozprzestrzeniają się z samosiewu. Na przykład *Buddleja davidii* w latach 1955—1959 porastała gruzy między Aleją Wyzwolenia i Parkiem Żeromskiego. Obecnie po kilkanaście krzewów tej rośliny rośnie na gruzach przy ul. Tama Pomorzańska, Staszica i na Osiedlu Grunwaldzkim.

Natrafiłem też na siewki jesionu mannowego (*Fraxinus ornus*) przy ul. 1 Maja.

Dobrze rozwijające się siewki dębu czerwonego (*Quercus rubra*) spotykałem na cmentarzu Centralnym, na skarpach kolejowych między Zdrojami i Podjuchami oraz na gruzach.

Z innych drzew i krzewów spotykanych na terenach kolejowych i gruzach można wymienić: *Acer negundo*, *Symphoricarpos racemosus*, *Rubus odoratus*, *Rhus typhina*, *Quercus palustris*, *Padus racemosa*, *Padus virginiana*, *Clematis vitalba*, *Clematis orientalis*, *Colutea arborescens*, *Cerasus mahaleb*, *Caragana arborescens*.

Obecnie na obszarze Szczecina występują duże skupiska roślinne, np. Park Kasprowicza, Park Żeromskiego (do 1900 r. jako cmentarz Grabowa), Park Hanki Sawickiej, Ogród Botaniczny, Cmentarz Centralny,

Cmentarz Majdański, Las Arkoński, tereny leśne Głębokiego, Gołęcina, Gocławia, Klęskowa, Zdrojów, Żydowiec, Podjuch, Dąbia, Załomu oraz kilkanaście starych cmentarzy i skwerów.

Zieleń miasta wzbogacają drzewa alei i ulic oraz ogrodów przydomowych, szczególnie w dzielnicy willowej Pogodna. Ostatnio powstały duże kompleksy działek pracowniczych, obejmujące ponad trzysta hektarów.

Na krańcach miasta spotyka się znacznej wielkości pola uprawne (ryc. 4).

4. ROZWÓJ PORTU SZCZECIŃSKIEGO I WPLYW JEGO NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ROŚLIN

Port szczeciński od zarania swoich dziejów był stale rozbudowywany. W XVI wieku nastąpiła budowa nowych magazynów, mostu drewnianego i nabrzeża na zachodnim brzegu Odry.

Właściwy rozwój portu rozpoczyna się dopiero w II połowie XVIII w., kiedy pogłębiono i wyprostowano drogę wodną ze Szczecina do morza (por. Terebucha 1948).

Pierwsze statki o napędzie parowym zaczęły przybijać do Szczecina około 1840 r. Do dalszej rozbudowy portu przyczyniają się połączenia kolejowe z Berlinem i Wrocławiem.

Przed pierwszą wojną światową Szczecin wysunął się na pierwsze miejsce spośród portów bałtyckich. W okresie międzywojennym rola tego portu zmieniała się. Na czoło wysuwają się Gdańsk i Gdynia, które stają się portami o dalekim zasięgu, a od 1933 r. Szczecin nastawiony był na obroty wewnątrzniemieckie.

Główną pozycję przywozu portu szczecińskiego stanowiły w tym czasie drzewo i kamienie. Poza tym przywożono węgiel z Anglii dla Berlina, celulozę dla potężnego przemysłu papierniczego Szczecina, soję i siemię lniane dla tutejszej olejarni. W wywozie dużą pozycję stanowiło zboże, cukier, mąka, krochmal, papier, cement i oleje. Zboże i cukier od 1930 r. pochodziły z Polski.

O zasięgu portu szczecińskiego w 1936 r. można wnioskować na podstawie połączeń regularnych linii: z portami bałtyckimi 33 linie, z portami Morza Północnego 12 i z dalszymi 8 linii. Tak więc połączenia z dalszymi portami stanowiły tylko 15%, gdy w Gdańsku ponad 30%, a w Gdyni 40% (por. Michalik 1946).

W 1945 r. port szczeciński został całkowicie zdewastowany i nie nadawał się do użytku. W piętnaście lat później port posiada powiązania liniami regularnymi z portami europejskimi, afrykańskimi i azjatyckimi, ale nie dorównuje Gdyni, która ma połączenia z dalszymi portami.

Mimo tak ograniczonej roli, port szczeciński miał wpływ na rozprzestrzenianie się roślinności.

Brak jest dokładnych materiałów źródłowych do analizy tego zagadnienia w ciągu rozwoju portu. Najbardziej odpowiednie do takiej analizy są prace Holzfussa z lat trzydziestych tego stulecia. Wymienia on w nich 163 gatunki roślin obcego pochodzenia występujących na terenie Szczecina.

Analiza ich pochodzenia wykazuje, że 62 gatunki pochodzą z południowej Europy, 35 z południowej Azji, 27 jest środkowo- i zachodnioeuropejskich, 15 wschodnioazjatyckich, 11 amerykańskich i 13 gatunków z innych terenów.

Spośród tej liczby 66 gatunków podaje Holzfuss ze śmietnisk. Według niego wiele gatunków przedostało się z owocami i nasionami oraz z innymi transportami. Na przykład *Abutilon avicennae*, *Solanum sarachoides*, *Artemisia verlotorum* zostały zawleczone według niego z nasionami roślin oleistych.

W okresie moich obserwacji roślinności na terenach portowych, niektóre gatunki pojawiały się i ginęły, np. *Polygonum brittingeri*, *Portulaca oleracea*, *Verbascum austriacum*, *Malva verticillata*, *Soja hispida*, *Solanum sarachoides*, *Anthemis ruthenica*, *Chrysanthemum segetum*, *Artemisia biennis*, *Ambrosia artemisiaefolia*.

Niektóre z tych gatunków (*Ambrosia artemisiaefolia*, *Polygonum brittingeri*, *Solanum sarachoides*, *Artemisia biennis*) występowały na terenie świeżo rozkopanym, *Portulaca oleracea* na placu składowania, a pozostałe na śmietniskach portowych i przy elewatorach zbożowych.

Z powyższego można wnioskować, że pierwsze cztery gatunki pojawiały się z nasion znajdujących się w ziemi, pozostałe przybywały z transportami.

Na terenie portu obserwowałem również *Polygonum sachalinense*, który dorastając do 3 m wysokości, występował w zwartym płacie o powierzchni do 400 m² i wykazywał dużą żywotność. Gatunek ten nie był podawany ze Szczecina.

Można więc stwierdzić, że port szczeciński, będący portem o bliskim zasięgu, wpływał na przybywanie tutaj przede wszystkim gatunków europejskich i azjatyckich. Gatunki dalszych kontynentów przybywały drogą pośrednią.

5. ANALIZA FLORY SYNANTROPIJNEJ SZCZECINA

Według dotychczasowych badań flora synantropijna Szczecina obejmuje 874 gatunki roślin naczyniowych.

Klasyfikację jej przeprowadziłem według podziału Thellunga (1915) najczęściej stosowanego przez florystów polskich (Krawiecowa 1951; Szafer 1952; Kornaś 1953, 1959; Nowiński 1955; Sowa 1962 msk., Schwarz 1967).

W podziale tym wyróżnia się następujące grupy:

A. Antropofity — rośliny obcego pochodzenia, rozpowszechnione przez człowieka.

I. Gatunki wprowadzone świadomie, które wydostały się spod opieki człowieka i później zdziczały:

1. Ergazjofity — obce rośliny użytkowe
2. Ergazjolipofity — relikty dawnych kultur, tzn. rośliny dawniej hodowane, a współcześnie występujące tylko w stanie dziczym
3. Ergazjofigofity — rośliny hodowane współcześnie i zdziczałe

II. Gatunki zawleczone, czyli wprowadzone przez człowieka nieświadomie:

4. Archeofity — chwasty wprowadzone w czasach przedhistorycznych lub wczesnohistorycznych
5. Neofity — gatunki wprowadzone w czasach nowszych i zdomowione na siedliskach naturalnych
6. Epekofity — gatunki zawleczone w czasach nowszych i już zdomowione, lecz tylko na siedliskach wtórnych
7. Efemerofity — gatunki zawleczone w czasach nowszych, występujące najczęściej tylko przejściowo (nie zdomowiające się).

B. Apofity — rośliny pochodzenia miejscowego, dawniej lub współcześnie użytkowane i powtórnie dziczejące albo rośliny dzikie, korzystające z nowych (sztucznych) siedlisk stworzonych przez człowieka.

W grupie roślin naczyniowych apofity obejmują 425 gatunków, tj. 48,5% ogólnej liczby gatunków. Największą ilość apofitów stanowią gatunki leśne (27,7%) i gatunki łąkowe (26,8%). Apofity o nieokreślonej przynależności do pewnych zbiorowisk stanowią 7,8% (por. tabelę 1).

Stosunkowo duży udział apofitów (48,5%) we florze synantropijnej Szczecina jest wynikiem bliskiego sąsiedztwa lasów i łąk oraz występowania odpowiednich siedlisk dla gatunków kserotermicznych, nadwodnych i zaroślowych.

Antropofity stanowią 51,5% i obejmują 449 gatunków. W tej grupie roślin najwięcej jest epekofitów, to jest gatunków zdomowionych na siedliskach zmienionych przez człowieka (31,1%) i efemerofitów, tj. gatunków niedawno zawleczonych, ale nie zdomowiających się (21,6%) (tabela 1).

Największa ilość antropofitów pochodzi z południowo-wschodniej części Europy i zachodniej Azji oraz z terenów nadśródlądowych (49,5%), co niewątpliwie wiąże się ze szlakami komunikacyjnymi, transportami i ruchem ludności.

Stosunkowo dużo jest gatunków pochodzenia amerykańskiego (18,0%), które różnymi drogami przybywały na ten teren, np. gatunki z rodzaju *Oenothera*. Pochodzenie antropofitów przedstawia tabela 2.

Na ogólną liczbę 874 gatunków roślin naczyniowych najwięcej, bo

Tabela 1

Udział apofitów i antropofitów we florze synantropijnej Szczecina

Apofity	Liczba gatunków	%
Leśne	117	27,7
Łąkowe	114	26,8
Muraw kserotermicznych	54	12,7
Nadwodne	30	7,1
Zaroślowe	24	5,6
Wydm i piaszczysk	21	4,9
Murawowe	17	4,0
Łęgowe	6	1,4
Solniskowe	3	0,7
Aluwiów	2	0,4
Wilgotnych miejsc	2	0,4
Brzegów nadmorskich	1	0,2
Błotne	1	0,2
O nieokreślonej przynależności	33	7,8
Antropofity		
Epekofity	140	31,1
Efemerofity	97	21,6
Archeofity	83	18,4
Ergazjofigofity	68	15,1
Ergazjofity	51	11,3
Ergazjolipofity	6	1,3
Neofity	4	0,9

Tabela 2

Pochodzenie antropofitów synantropijnej flory Szczecina

Gatunki	Liczba	%
Europejskie	174	38,8
Azjatyckie	85	18,9
Amerykańskie	81	18,0
Śródziemnomorsko-irano-turańskie	54	12,0
Afrykańskie	4	0,9
Nieokreślonego pochodzenia	51	11,4

390 jest gatunków krótkotrwałych (jedno- i dwuletnich), tj. 44,6% ogólnej liczby gatunków; byliny obejmują 370 gatunków, tj. 42,3% ogólnej flory Szczecina (tabela 3).

Tabela 3

Spektrum biologiczne synantropijnej flory Szczecina

Grupy wg trwałości biologicznej	Liczba gatunków	%
Byliny	370	42,3
Jednoroczne	247	28,8
Jednoroczne i dwuletnie	82	9,3
Dwuletnie	61	7,0
Krzewy	51	5,9
Drzewa	41	4,7
Dwuletnie i byliny	16	1,8
Półkrzewy	4	0,4
Pnącza	2	0,2

Wśród apofitów przeważają byliny (263 gat.), drugie miejsce zajmują rośliny krótkotrwale (111 gat.); krzewy obejmują 21 gatunków, drzewa 26 (tabela 4).

W grupie antropofitów dużą przewagę mają gatunki krótkotrwale (295 gat.); drugie miejsce zajmują byliny (107 gat.), pozostałe mają mniejszy udział: krzewy 30 gatunków, drzewa 15, półkrzewy 1, pnącza 1 gatunek (tabela 5).

Tabela 5

Spektrum biologiczne antropofitów

Trwałość	Epe- kofity	Efeme- rofity	Arche- ofity	Erga- zjofity	Erga- zjofio- gofity	Erga- zjoli- pofity	Neo- fity	Razem gatu- ków
Jednoroczne	54	48	49	14	26	1	2	194
Jednoroczne, dwul.	20	8	15	1	7	—	—	51
Dwuletnie	19	8	13	—	1	—	—	41
Dwuletnie i byliny	3	2	1	2	1	—	—	9
Byliny	39	29	5	16	13	4	1	107
Krzewy	4	1	—	21	2	1	1	30
Drzewa	1	1	—	12	1	—	—	15
Półkrzewy	—	—	—	1	—	—	—	1
Pnącza	—	—	—	1	—	—	—	1
Razem	140	97	83	68	51	6	4	449

Tabela 4
Spektrum biologiczne apofitów

Trwałość	Gatunki														Razem
	leśne	łąkowe	kseroter- miczne	nadwodne	zaroślowe	wydm i piaszczysk	murawowe	łągowe	solnisk	aluwiów	wilgotnych miejsc	brzegów nadmor.	blotna	nieokre- ślone	
Jedno- roczne	8	7	8	8	3	6	1	1	—	—	1	—	1	9	53
Jednorocz- ne i dwul.	5	7	6	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	31
Dwuletnie	2	7	2	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	3	20
Dwuletnie i byliny	—	1	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7
Byliny	58	91	34	17	17	11	13	4	2	2	1	—	—	13	263
Krzewy	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	21
Drzewa	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
Półkrzewy	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Pnącza	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Razem	117	114	54	30	24	21	17	6	3	2	2	1	1	33	425

6. ZMIANY W SKŁADZIE GATUNKÓW W OKRESIE
OD 1840—1966 ROKU

Przy analizie wykazów gatunków roślin, podanych w botanicznej literaturze niemieckiej i polskiej oraz na podstawie własnych obserwacji dają się zauważyć zmiany, które wystąpiły we florze szczecińskiej w okresie od 1840—1966 roku, to jest w ciągu 126 lat.

Dla przejrzystości analizy tych zmian podzieliłem czas od 1840—1966 r. na trzy okresy:

okres I od 1840—1900 roku

okres II od 1901—1944 roku

okres III od 1945—1966 roku.

Podstawą do analizy okresu I były prace: Schmidta, Marsona, Aschersona i Graebnera.

Do analizy okresu II posłużyły mi prace: Müllera, Hegiego i Holzfussa.

Analizy składu flory okresu III dokonałem na podstawie autorów polskich (Celiński 1964; Czubiński 1950; Kownas 1958, 1959; Kownas i Piskorski 1958; Kownas i Sienicka 1962; Radomski i Jasnowska 1964, 1965; Wodziczko i inni 1948; Zukowski 1959, 1960) oraz na podstawie obserwacji własnych.

Z powyższej analizy wynika, że niektóre gatunki występujące w okresie I nie występowały w okresach następnych. Można więc za niewystępujące już na tym terenie uważać następujące gatunki:

1. *Artemisia tournefortiana*
2. *Atriplex laciniata*
3. *Atriplex säckii*
4. *Nicotiana tabacum*
5. *Nicotiana rustica*
6. *Oxyria amaranthoides*
7. *Polypogon monspeliensis*
8. *Torilis arvensis*

Z gatunków podanych w okresie II przez Müllera i Holzfussa nie odnaleziono obecnie 99. Zaznaczono je, jak i poprzednie, nawiasem przy kolejnym numerze w systematycznym wykazie gatunków.

Natomiast w okresie III znaleziono pewne gatunki, nie notowane do tej pory na tym terenie, które mogą być uważane za nowe dla Szczecina. Gatunki te w liczbie 85 zostały zaznaczone krzyżykiem.

W liczbie nowych gatunków jest 61 antropofitów (72%) i 24 apofity (28%). Wśród antropofitów są 23 epekofity, 15 ergazjofitów, 14 efemerofitów, 4 archeofity, 4 ergazjofity i 1 ergazjolipofit.

Jeśli chodzi o pochodzenie antropofitów, to 17 z nich jest śródziemnomorsko-irano-turańskich. Większość tych gatunków przybyła na ten teren w wyniku drugiej wojny światowej; wśród pozostałych antropofitów przeważają gatunki zdziczałe z hodowli.

Apofity natomiast obejmują 9 gatunków leśnych, 6 murawowych, 4 łąkowe, 2 nadwodne, 2 aluwii i 1 o nieokreślonej przynależności.

Wśród 85 gatunków zanotowanych jako nowe dla Szczecina znajdują się gatunki rzadziej spotykane, np.: *Polygonum sachalinense*, *Claytonia perfoliata*, *Potentilla verna*, *Verbascum austriacum*, *Sideritis montana*, *Galium cruciata*, *Iva xanthiifolia*, *Artemisia austriaca*, *Centaurea nigra*, *Agropyron cristatum*.

Natrafiono również na stanowisko *Oenothera ammophila* Focke, który jest nowym gatunkiem dla Polski.

Z gatunków rzadkich, występujących od przeszło ćwierć wieku na tym terenie, a nie umieszczonych w „Roślinach Polskich” można wymienić:

1. *Ambrosia psilostachya* D. C. notowany od 1900 r.
2. *Hordeum jubatum* L. notowany od 1918 r.
3. *Polygonum baldschuanicum* Regel. notowany od 1937 r.

Wszystkie 3 gatunki wymienia Holzfuss (1937).

Z gatunków rzadkich, występujących na terenie Szczecina i wymienionych w „Roślinach Polskich”, ale bez podania tutejszego stanowiska można podać *Trifolium striatum* L. (por. Schmidt 1840).

Na podstawie cytowanej już wyżej literatury zestawilem lata zanotowania na tym terenie następujących gatunków:

<i>Atriplex nitens</i>	1840 r.	<i>Bunias orientalis</i>	1885 r.
<i>Coronopus didymus</i>	1840 r.	<i>Senecio erucifolius</i>	1890 r.
<i>Euphorbia exiqua</i>	1840 r.	<i>Nasturtium austriacum</i>	1916 r.
<i>Medicago minima</i>	1840 r.	<i>Solidago serotina</i>	1917 r.
<i>Cardaria draba</i>	1876 r.	<i>Vicia pannonica</i>	1923 r.
<i>Salvia verticillata</i>	1877 r.	<i>Medicago arabica</i>	1935 r.

Porównując zestawienia i wykazy dotyczące zmian składu gatunków we florze Szczecina w okresie od 1840 do 1966 roku można podkreślić ciągłą zmienność flory szczecińskiej, co jest charakterystyczną cechą każdej flory synantropijnej.

Na terenach podlegających działalności człowieka niektóre nowe dla danej flory gatunki wykazują dużą żywotność i ekspansywność. W Szczecinie do takich gatunków należą: *Galinsoga parviflora*, *Solidago serotina* i *Solidago canadensis*.

Są też gatunki, które na jednym stanowisku występują latami bez rozszerzenia swego terytorialnego zasięgu. Takimi gatunkami na terenie Szczecina są *Trifolium striatum* (od 1840 r.) i *Senecio erucifolius* (od 1890 r.).

Rys. 5. Rozmieszczenie na terenie Szczecina kilku rzadziej spotykanych gatunków:
1 — *Ambrosia psilostachya*; 2 — *Hordeum jubatum*; 3 — *Polygonum baldschuanicum*; 4 — *Trifolium striatum*; 5 — *Senecio erucifolius*

Podobne obserwacje dotyczące Gdańska podaje Schwarż (msk. 1967) odnośnie do *Eryngium campestre* i *Elytryngia pungens*, które od 1872 r. nie rozszerzyły swego zasięgu i Scholz (1960) z Berlina w odniesieniu do *Sisymbrium irio*, który również od 100 lat nie zmienił swego stanu posiadania.

Rys. 6. Rozmieszczenie na terenie Szczecina kilku rzadziej spotykanych gatunków:
1 — *Iva xanthilifolia*; 2 — *Potentilla verna*; 3 — *Oenothera ammophila*; 4 — *Cardaria draba*

Obecnie panującymi gatunkami na gruzach, terenach kolejowych, przydrożach i przychaciach Szczecina są: *Polygonum aviculare*, *Sisymbrium loeselii*, *Melilotus officinalis*, *Melilotus albus*, *Medicago lupulina*, *Trifolium repens*, *Plantago major*, *Plantago lanceolatum*, *Solidago canadensis*, *Erigeron acer*, *Erigeron canadensis*, *Achillea millefolium*, *Tanacetum vulgare*, *Artemisia vulgaris*, *Taraxacum officinale*, *Calamagrostis epigeios*, *Poa annua*, *Bromus mollis* i *Lolium perenne*.

Jaki będzie skład przyszłej flory synantropijnej Szczecina, nie wiadomo. Z różnicy między liczbą gatunków nie odnalezionych (99 gat.) i nowo zarejestrowanych (85 gat.) można wnioskować, że w przyszłości liczba gatunków flory synantropijnej Szczecina będzie malała.

1

2

3

4

1. *Rumex confertus* Willd.

2. *Polygonum sachalinense* Schm.

3. *Polygonum baldschuanicum* Regel.

4. *Claytonia perfoliata* Donn.

1

2

3

4

1. *Erucastrum gallicum* (Willd.) O. E. Schultz
2. *Amaranthus blitoides* S. Watson

3. *Trifolium striatum* L.
4. *Centaurea nigra* L.

Tablica III

1. *Potentilla verna* L.

2. *Oenothera ammophila* Focke — siewki (seedlings)

Tablica IV

1. *Oenothera ammophila* Focke

2. *Melilotus volgicus* Poir

3. *Artemisia austriaca* Jacq.

Tablica V

1. *Artemisia sieversiana* Willd.

2. *Iva xanthiifolia* Nutt.

3. *Ambrosia psilostachya* D. C.

Rozmieszczenie na terenie Szczecina niektórych rzadziej spotykanych gatunków roślin przedstawiono na ryc. 5 i 6.

7. PORÓWNANIE FLORY SYNANTROPIJNEJ SZCZECINA Z FLORAMI SZEŚCIU MIAST POLSKI I BERLINA

Podstawę do porównań stanowiły opracowania dotyczące Chełma (Fijałkowski 1963), Gdańska (Schwarz 1967), Łodzi (Mowszowicz 1960; Sowa 1962 msk., 1960, 1962, 1964, 1965, 1966; Wiśniewski 1965), Poznania (Krawiecowa 1951; Urbanowski 1955, 1958; Żukowski 1959, 1960), Warszawy (Zanowa 1964 msk.), Wrocławia (Rostański 1965 msk.) i Berlina (Scholtz 1960).

Umożliwiły mi one dokonanie kilku zestawień, porównań i analiz.

Ilościowy skład flory poszczególnych miast przedstawia się następująco:

Nazwa miasta	Ogólna liczba gatunków	W tym zebranych po 1945 r.	Liczba gat. antropofitów	% antropofitów
Wrocław	1076	626	755	70,1
Gdańsk	1006	748	528	52,5
Szczecin	874	771	449	51,5
Warszawa	620	614	308	49,6
Poznań	581	581	341	58,6
Łódź	515	515	259	50,2
Chełm	440	440	169	38,4
Berlin	235	235	146	61,1

Z powyższego zestawienia wynika, że najbogatszą florę synantropijną posiadają Wrocław i Gdańsk, najuboższą Berlin, Szczecin w tym zestawieniu zajmuje trzecie miejsce.

Analizując stosunek procentowy antropofitów do apofitów w poszczególnych florach dochodzi się do wniosku, że skład gatunkowy flory synantropijnej zmienia się na korzyść gatunków obcego pochodzenia w miarę technicznego rozwoju miasta. Na przykład Berlin — miasto o wysokiej technice miejskiej, zwane dawniej „pustynią cementową” (por. Scholtz 1960) mimo ubóstwa gatunków, wykazał wysoki procent antropofitów (62,1).

Również Poznań — charakteryzujący się dobrym stanem technicznym miasta — posiada duży procent gatunków obcego pochodzenia (58,6). Najwyższy udział antropofitów wykazał Wrocław (70,1), najmniejszy Chełm (38,4%).

Szczecin wykazuje pod tym względem największe podobieństwo do Gdańska, Łodzi i Warszawy.

Następne zagadnienie to podobieństwo flory szczecińskiej do flory poszczególnych miast. Największa liczba gatunków wspólnych wskazywać będzie na największe podobieństwo porównywanych flor. Odnosne liczby przedstawia poniższe zestawienie.

Porównywane miasta	Liczba gatunków wspólnych
Szczecin — Gdańsk	657
Szczecin — Poznań	480
Szczecin — Wrocław	596
Szczecin — Warszawa	475
Szczecin — Łódź	458
Szczecin — Chełm	376
Szczecin — Berlin	189

W zestawieniu tym uwidacznia się największe podobieństwo flory Szczecina do flory Gdańska i Wrocławia. Również duże podobieństwo wykazuje flora Szczecina do flory Poznania i Warszawy. Najmniejszą liczbę gatunków wspólnych posiadają: Szczecin — Chełm i Szczecin — Berlin.

Największe podobieństwo flory Szczecina do flory Gdańska jest wynikiem najbardziej zbliżonych warunków klimatycznych, edaficznych i innych obydwu miast.

Również duże podobieństwo flory Szczecina do flory Wrocławia jest potwierdzeniem wpływu szlaków komunikacyjnych na rozprzestrzenianie się roślinności; Wrocław od dawna łączy ze Szczecinem wodne i kolejowe szlaki komunikacyjne.

Znaczne podobieństwo flory szczecińskiej do warszawskiej jest niewątpliwie uwarunkowane rozmiarami terytorialnymi i technicznym stanem obu miast.

Podobieństwo do flory Łodzi wiąże się również z podobieństwem terytorialnym i technicznym.

Największe różnice w składzie flory Chełma i Berlina wynikają z małego podobieństwa terytorialnego, technicznego i ekologicznego.

Ciekawych wyników dostarcza zestawienie gatunków roślin występujących prócz Szczecina tylko w jednym z porównywanych miast, np. w Szczecinie i Gdańsku, w Szczecinie i Wrocławiu itd., a nie występujących w pozostałych miastach. Ilościowo obrazuje to zestawienie na str. 27.

Tylko w Szczecinie i Gdańsku występują lub występowały: *Atriplex glabriuscula*, *Sagina apetala*, *Aristolochia clematitis*, *Erucastrum nasturcifolium*, *Sedum album*, *Potentilla verna*, *Filipendula ulmaria*, *Rosa pomifera*, *Potentilla procumbens*, *Alchemilla nicans*, *Sorbus intermedia*, *Prunus domestica*, *Ononis repens*, *Lathyrus nissolia*, *L. aphaca*, *Soja*

hispida, *Geranium columbinum*, *Tropaeolum majus*, *Cornus stolonifera*, *Hedera helix*, *Archangelica litoralis*, *Myosotis sylvatica*, *Alectorolophus montana*, *Sambucus racemosa*, *Campanula glomerata*, *Aster tripolium*, *Helianthus doronicoides*, *H. decapetalus*, *Gaillardia cristata*, *Centaurea nigra*, *Crepis foetida*, *Juncus gerardii*, *Festuca duriuscula*.

W Szczecinie i Wrocławiu występują: *Amaranthus angustifolius*, *Claytonia perfoliata*, *Malva verticillata*, *Anagalis caerulea*, *Heliotropium europaeum*, *Solanum sarachoides*, *Ligustrum vulgare*, *Valeriana sambucifolia*, *Ambrosia trifida*, *Crepis setosa*, *Hieracium laevigatum*, *Scilla bifolia*, *Galanthus nivalis*, *Cynodon dactylon*, *Phoenix dactylifera*.

Nazwy miast	Liczba gatunków
Szczecin — Gdańsk	33
Szczecin — Wrocław	15
Szczecin — Poznań	6
Szczecin — Warszawa	1
Szczecin — Łódź	5
Szczecin — Chełm	1
Szczecin — Berlin	1

W Szczecinie i Poznaniu znajdujemy: *Chenopodium foetidum*, *Hirschfeldia incana*, *Hypericum maculatum*, *Rubus procerus*, *Lens esculenta*, *Nepeta grandiflora*.

W Szczecinie i Łodzi: *Populus serotina*, *Malus sylvestris*, *Foeniculum capillaceum*, *Salvia officinalis*, *Carex pairaei*.

W Szczecinie i Warszawie: *Philadelphus coronarius*.

W Szczecinie i Chełmie: *Ajuga chamaepitys*.

W Szczecinie i Berlinie: *Chenopodium viride*.

Powyższe zestawienie potwierdza wyniki poprzednich porównań wykazując największe podobieństwo flory Szczecina do flory Gdańska, a najmniejsze do flory Berlina.

Porównując wykazy omawianych flor, stwierdza się, że w Szczecinie występuje 41 gatunków (zaliczanych do flory synantropijnej) nie znalezionych w pozostałych miastach. Są to: *Populus candicans*, *P. laurifolia*, *Polygonum baldschuanicum*, *P. bungeanum*, *Chenopodium pratericola*, *Ch. aristatum*, *Clematis orientalis*, *Eschscholtzia californica*, *Spiraea trilobata*, *S. brachybotris*, *Sorbaria sorbifolia*, *Rubus adoratus*, *Amelanchier spicata*, *A. ovata*, *Prunus virginiana*, *P. serotina*, *Laburnum anagyroides*, *Trifolium striatum*, *Elaeagnus argentea*, *Vicia narborensis*, *Oenothera sirticola*, *Oe. ammophila*, *Malvastrum peruvianum*, *Anodon cristata*, *Oxalis deppei*, *Acer ginnala*, *Nemophila maculata*, *Symphytum asperrinum*, *Corinthe major*, *Verbascum virgatum*, *Digitalis grandiflora*,

Fraxinus ornus, *Viburnum lantana*, *Lonicera tatarica*, *Artemisia tournefortiana*, *A. verlotorum*, *A. biennis*, *Dimorphoteca pluvialis*, *Dactylis aschersoniana*, *Andropogon sorghum*, *Beckmania eruciformis*.

Są to niewątpliwie gatunki różniące florę szczecińską od pozostałych flor synantropijnych.

Gatunki różniące posiadają flory synantropijne każdego miasta. Na przykład Łódź odróżniają i jednocześnie charakteryzują gatunki zawleczone z surowcami włókienniczymi, Chełm — gatunki wschodnie i południowe. Poza tym w opisach poszczególnych flor podawane są gatunki ginące. Na przykład w Berlinie wyginęły: *Chenopodium vulvaria*, *Atriplex rosea*, *Coronopus procumbens*, *Marrubium vulgare*, *Pulicaria vulgaris* (Scholz 1960).

W Warszawie wyginęły: *Chenopodium vulvaria*, *Ch. bonus henricus*, *Marrubium vulgare*, *Pulicaria vulgaris* (por. Zanova 1964 msk.).

Ze Szczecina wymienionych jest 8 takich gatunków (por. str. ...).

W innych miastach występowanie powyższych gatunków przedstawia się następująco: W Gdańsku *Chenopodium vulvaria* była zaliczana do najwcześniejszych przybyszów tego miasta (por. Schwarzbach 1967), natomiast w Łodzi nie była dotąd notowana (por. Sowa 1962 msk.). Również *Chenopodium botrys* nie występuje w Łodzi i nie była dotąd notowana na terenie woj. łódzkiego (por. Mowszowicz 1960), natomiast *Coronopus procumbens*, *Atriplex rosea*, *Marrubium vulgare*, *Pulicaria vulgaris* występują w Łodzi i na terenie województwa (Mowszowicz 1960).

8. WYKAZ GATUNKÓW SYNANTROPIJNYCH SZCZECINA

Wykaz niniejszy obejmuje 874 gatunki roślin naczyniowych, w tym 771 gatunków zebranych przeze mnie w okresie prowadzenia badań i 103 gatunki włączone na podstawie literatury (Schmidt 1840; Marsson 1869; Ascherson i Graebner 1898—99; Müller 1911; Holz-fuss 1936, 1937, 1938, 1941; Celiński 1964).

Zielnik obejmujący 771 gatunków roślin naczyniowych, należących do 392 rodzajów i 79 rodzin złożyłem w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego.

Przy oznaczaniu materiału zielnikowego posługiwałem się następującymi pracami: Białobok i inni 1955; Björn Ursing 1952; Dostal 1953; Hegi 1908—1960; Jasiewicz 1958; Kowal 1954; Mądalski 1948—1965; Mowszowicz, Sowa 1959; Mowszowicz 1950, 1952, 1955, 1956; Rothmaler 1963; Szafer, Kulczyński, Pawłowski 1953; Rostański 1965. Flora Polska I—X, Flora ZSRR 1934—61.

Krytyczne gatunki porównywałem w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego i w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie.

Układ systematyczny i nomenklaturę podaję według Szafera, Kulczyńskiego i Pawłowskiego (1953) z uwzględnieniem najnowszych przepisów. Gatunki obcego pochodzenia podałem wg nomenklatury wyżej cytowanej literatury.

W niniejszym wykazie gatunków stosuję następujące znakowanie i skróty:

Numer kolejny w wykazie gatunków ujęty w nawias, np. (49), oznacza gatunek nie odnaleziony obecnie. Znak + oznacza gatunek nowy dla Szczecina

Za nazwą łacińską niektórych gatunków podaję ich trwałość skrótami:

J. — roślina jednoroczna, J.-Dw. — roślina jednoroczna lub dwuletnia, Dw. — roślina dwuletnia, Dw. Byl. — roślina dwuletnia lub bylina, Byl. — bylina, K. — krzew, D. — drzewo, Półk. — półkrzew.

Przynależność gatunku do odpowiedniej grupy Thellunga określają skróty:

Erg. — ergazjofity, Egl. — ergazjolipofity, Ergfgf. — ergazjofigofity, Arch. — archeofity, Neof. — neofity, Epek. — epekofity, Efem. — efemerofity, Ap. — apofity.

Przy większości gatunków obcych podano ich pochodzenie głównie na podstawie następujących autorów Eig (1931), Gajewski (1937), Krawiecowa (1951), Meusel (1943 i 1965), Nowiński (1955), Sowa (1962 msk.).

Po tych danych podaję stanowiska gatunków rzadszych oraz częstość występowania gatunków pospolitych. Przy gatunkach, które występowały nie w całym okresie moich badań (1958—1966), umieszczam lata występowania.

Zaznaczam, że gatunki podane przez Celińskiego występują tylko w dzielnicach przylegających do Puszczy Bukowej.

Dalsze skróty zastosowane w wykazie są następujące:

afryk. — afrykański
ameryk. — amerykański
azjat. — azjatycki
Cm. Centr. — Cmentarz Centralny
egz. — egzemplarz
europ. — europejski
eurazj. — eurazjatycki
Gat. — gatunek

medit. — medytterrański
pd. — południowy
pn. — północny
submedit. — submedytterrański
śr. — środkowo, środkowy
śmiet. — śmietnisko
śródz. — śródziemnomorski
kol. — kolejny

ir. tur. — irano-turański

m. — między

m. Pom. i Gum. — między Pomorzanami
i Gumieńcami

port. — portowy

tur. — turański

wsch. — wschód, wschodni, wschodnio

zach. — zachód.

Polypodiaceae

1. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. — Ap. Leśny.
Mur Cm. Centr.
2. *Matteucia struthiopteris* (L.) Tod. — Ap. leśny.
Na murze młyna w Dąbiu, domu przy ul. Krasińskiego, oraz zabudowania rogu ul. Przodowników Pracy i Pstrowskiego; rozprzestrzenia się na cmentarzach.
3. *Asplenium ruta muraria* L. — Ap. leśny.
Mury dawnej cementowni w Zdrojach do 1963 r.

Equisetaceae

4. *Equisetum arvense* L. — Ap. łąkowy.
Częsty na terenach kol., przydrożach, śmiet., gruzach i uprawach.
5. *Equisetum maximum* Lam. — Al. leśny i zaroślowy.
Tereny kol. na zach. od Dworca Towar., skarpa kol. m. Żelechowem i Gołęcinem, przydroże m. Stołczynem i Skolwinem.
6. *Equisetum palustre* L. — Ap. łąkowy i wodny.
Dość częsty na terenach kol., przydrożach i gruzach.
7. *Equisetum hiemale* L. — Ap. leśny i łąkowy.
Tereny kol. przy ul. Pieszkiej.

Pinaceae

8. *Pinus sylvestris* L. — Ap. leśny.
Piaszczyste tereny kol. na Międzyodrze oraz nasypy kol. w Dąbiu, Załomie, Wielgowie.

Betulaceae

9. *Betula verrucosa* Ehrh.
Ap. leśny. Siewki i podrost na gruzach, terenach kol. i port., cmentarzach i ruinach.
10. *Betula pubescens* Ehrh. — Ap. leśny.
Siewki i podrost na terenach kol. na Międzyodrze i przy Cm. Centr., gruzy przy ul. Kolumba i Powstańców Wielkopolskich.
11. *Carpinus betulus* L. — Ap. leśny.
Siewki, podrost i drzewka na cmentarzach, skarpach kol., od Turzyna do Dworca Głównego, gruzy przy ul. Tama Pomorzańska, na Niebuszewie i Żelechowie.

12. *Corylus avellana* Ehrh. — Ap. leśny.
Z samosiewu na torach kol. m. stacją kol. Niebuszewo i Turzyn,
tereny kol. na Międzyodrze.

Fagaceae

13. *Fagus sylvatica* L. — Ap. leśny.
Rzadko na terenach kol. w pobliżu naturalnych stanowisk, np.
w Goławiu i Zdrojach.
14. *Quercus robur* L. — Ap. leśny.
Siewki i podrost na terenach kol. i port., cmentarzach, śmietn.
i przy drogach.
15. *Quercus sessilis* Ehrh. — Ap. leśny.
Jak poprzedni.
16. *Quercus rubra* L. — Ergfgf.
Gat. ameryk.
Siewki i podrost na Cm. Centr., skarpy kol. w Zdrojach, m. Tu-
rzymem i Dworcem Głównym.
17. *Quercus palustris* Moench. — Ergfgf.
Gat. pn.ameryk.
Siewki na Cm. Centr.

Salicaceae

18. *Populus alba* L. — Ap. leśny.
Często na gruzach i terenach kol.
19. *Populus tremula* L. — Ap. leśny.
Jak poprzedni.
20. *Populus italica* Moench. — Ergfgf.
Pochodzi z Małej Azji (Białobok).
Tory kol. m. Niebuszewem i Drzetowem, skarpy kol. Wzgórz Het-
mańskich, gruzy na Niebuszewie.
21. *Populus canadensis* Moench. — Ergfgf.
Gat. zach.europ. (Białobok).
Gruzy na Drzetowie, Grabowie, Niebuszewie i przy ul. Kolumba.
22. *Populus candicans* Ail. — Ergfgf.
Tory kol. przy Cm. Centr.
23. *Populus laurifolia* Ledeb. — Ergfgf.
Gat. syberyjski (Białobok).
Siewki przy ul. Dubois, na Cm. Centr.
24. *Salix pentandra* L. — Ap. leśny.
Tereny kol. m. Gum. i Pom., rowy przy ul. Gdańskiej.
25. *Salix fragilis* L. — Ap. leśny.
Gruzy przy ul. Gdańskiej, w Drzetowie, rowy przy Szosie Poz-
nańskiej.

26. *Salix alba* L. — Ap. leśny.
Gruzy przy ul. Władysława IV, rowy przy Szosie Poznańskiej.
27. *Salix cinerea* L. — Ap. leśny.
Gruzy: Niebuszew, Grabów, Gołęcin, ul. Kolumba,
tereny kol. na Międzyodrze, Zdrojach, Dąbiu.
28. *Salix caprea* L. — Ap. leśny.
Dość częsta na gruzach i przydrożach.
29. *Salix aurita* L. — Ap. leśny.
Tereny kol. na Międzyodrze.
30. *Salix viminalis* L. — Ap. leśny.
Tereny port.
31. *Salix purpurea* L. — Ap. leśny.
Tereny kol. m. Gum. i Pom.

Cannabaceae

32. *Humulus lupulus* L. — Ap. leśny.
Gruzy przy ul. Tama Pom., Gdańska, na Niebuszewie i Gołecinie,
częsty też w żywopłotach.
33. *Cannabis sativa* L. — Epek.
Gat. azjat. Pod płotami w Żydowcach i Zdrojach oraz nielicznie
na śmietniskach.

Urticaceae

34. *Urtica urens* L. — Arch.
Gat. eurosyberyjski, często na śmietn. i przychaciach.
35. *Urtica dioica* L. — Ap.
Pospolita na śmietn., gruzach, cmentarzach, nieużytkach i przy-
chaciach.

Ulmaceae

36. *Ulmus laevis* Poll. — Ap. leśny.
Skarpa kol. m. Zdrojami i Dąbiem, m. Niebuszewem i Dworcem
Głównym, gruzy Niebuszewa i Żelechowa.
37. *Ulmus scabra* Mill. — Ap. leśny.
Jak poprzedni.
- +38. *Ulmus suberosa* Moench. non Ehrh. — Ap. leśny.
Skarpa kol. m. Zdrojami i mostem kol. na Regalicy, gruzy przy
ul. Mielczańskiej.
39. *Ulmus campestris* L. em Huds. — Ap. leśny.
Częsty na gruzach i skarpach kol.

40. *Rumex maritimus* L. — Ap. łąkowy.
Gruzy przy ul. Gdańskiej, 1 Maja, na zsyisku gruzu nad Regalicą w Podjuchach, gruz na Niebuszewie i w Dąbiu.
41. *Rumex paluster* Sm. — Ap. łąkowy.
Tereny portowe, działki uprawne i przydroża na Wyspie Puckiej i na Gumieńcach.
42. *Rumex conglomeratus* Murr. — Ap. zaroślowy.
Częsty na gruzach, śmietn. i przychaciach, np. gruz przy ul. Kolumba, Gdańskiej, Tamie Pom. i Dębogórskiej.
43. *Rumex obtusifolius* L. — Ap. zaroślowy.
Częsty na gruzach, śmietn., terenach kol., port. i przydrożach.
44. *Rumex confertus* Willd. — Epek. (Kornaś 1953).
Gat. azjat.-wsch.europ. (Hegi).
Gruzy przy ul. Dębogórskiej i Robotniczej, skarpy kol. m. Niebuszewem i Grabowem.
45. *Rumex crispus* L. — Ap. łąkowy.
Częsty na całym terenie.
- +46. *Rumex thyrsiflorus* Fing. Byl. — Ap. łąkowy.
Tylko na gruzach przy ul. Gdańskiej.
47. *Rumex acetosa* L. — Ap. wilgotnych miejsc.
Licznie na całym terenie.
48. *Rumex acetosella* L. — Ap. wydym i piaszczysk.
Pospolity.
- (49). *Rumex obovatus* Dans. — Dw. Efem.
Gat. pd. amer. (Hegi).
Holzfuss (1941) — licznie przy ul. Tama Pom.
- (50). *Oxyria amaranthoides* L. — Ergfgf.
Gat. wokółbiegun. i alp. Podany przez Holzfussa (1937) ze śmietn. przy Gdańskiej (Altdammer Str.) — licznie.
51. *Polygonum amphibium* L. var. *terrestre* Leyes.
Ap. lasów łgowych.
Tereny kol. i port., śmietn. i przydroża na całym obszarze.
52. *Polygonum persicaria* L. — Ap. zesp. nadwodnych.
Częsty na polach, w rowach przydrożnych, terenach port., przychaciach i śmietniskach.
53. *Polygonum tomentosum* L. — Ap. nadwodny.
Tereny port., gruz na Niebuszewie, przydroża w Skolwinie, śmietn., Tama Pom.
54. *Polygonum nodosum* Pers. — Ap. zesp. nadwodnych.
Gruzy przy ul. Gdańskiej, i w Dąbiu, na polach Gumieniec, w Warszawie, Glinkach, Gołecinie.
- +55. *Polygonum brittingeri* Op. — Ap. nadwodny.

- Tereny port. po kilka egz. w 1958 i 1964 r.
56. *Polygonum hydropiper* L. — Ap. lasów łągowych.
Gruzy, rowy, przydrożne i przychacie na całym terenie.
57. *Polygonum mite* Schrk. — Ap.
Tereny portowe, gruzy przy ul. Gdańskiej, tereny przy Cukrowni Gumieńce.
58. *Polygonum aviculare* L. Ap.
Pospolity.
59. *Polygonum calcatum* Lindb. (*P. aviculare* L. var. *serpyllifolium* Z.)
— Ap. piaszczysk.
Celiński (1964) podaje z Żydowiec jako gatunek rzadko występujący wzdłuż dróg.
- (60). *Polygonum patulum* M. B. — Efem.
Gat. pn. chiński (Holzfuss).
Podany z Gołęcina (Frauendorf) przez Holzfussa (1937).
- +61. *Polygonum sachalinense* Schm. — Epek.
Gat. wsch. azjat. (Hegi).
Płat o pow. ok. 400 m² na terenie portu.
62. *Polygonum cuspidatum* Sieb. et. Zucc. — Ergfgf.
Gat. wsch. azjat.
Często na skarpach kol., gruzach, śmietn., przychaciach i cmentarzach.
63. *Polygonum baldschuanicum* Regel. — Ergfgf.
Pochodzi z Turkiestanu (Holzfuss).
Po kilka okazów na gruzach przy ul. Malczewskiego (1962—64), pod parkanem Stoczni Szczecińskiej przy ul. Dubois, na terenach port. 2 stanowiska (1964). Przez Holzfussa (1937) podany z okolicy Zdrojów (Finkenwalde).
64. *Polygonum convolvulus* L. — Arch. (Buchli).
Gat. holarktyczny (Eurazja, Pn. Ameryka. Hegi).
Licznie na polach, mniej licznie na terenach kol.
65. *Polygonum dumetorum* L. — Arch. (Preuss.).
Gat. eurazj.-boreomerid. (Meusel).
Gruzy przy Gdańskiej i Tamie Pom., na Niebuszewie.
- (66). *Polygonum bungeanum* Turcz. — Efem.
Pochodzi z pn. Chin (Holzfuss).
Holzfuss (1937) podaje z Gołęcina i z terenów przy ul. Tama Pom. (Schwarzer Damm) jako zawleczony z soją.
67. *Fagopyrum sagittatum* Gilib. — Erg. (Arch.).
Gat. środk. azjat.
Tereny port. i kol. na Międzyodrze, Zdunowie, na działkach uprawnych w Zdrojach.
68. *Fagopyrum tataricum* Gaertn. — Efem.
Gat. azjat.

Dworzec kol. w Turzynie, śmietn. przy ul. Roztockiej i działki przydomowe przy ul. Kanałowej jako chwast.

Chenopodiaceae

- +69. *Corispermum hyssopifolium* L. — Epek.
Gat. śródz. (Nowiński).
Skarpy przydrożne w Dziewokliczu.
- +70. *Corispermum marschallii* Stev. — Epek.
Gat. pd.-wsch.-europ.
Piaszczyste tereny w Dziewokliczu,
żwirownia w Żydowcach. (Celiński).
- +71. *Corispermum intermedium* Schweigg. — Epek.
Gat. pd.-wsch.-europ.
Piaszczyste nieużytki w Zdrojach, Kluczu, Podjuchach, Załomiu,
Mścięcinie. (Celiński).
- 72. *Kochia scoparia* Schrad. — Epek.
Gat. tur.-wsch.-śródz.
Śmietn. przy ul. Pieszaj (1958—61) i ul. Nowy Świat, gruz przy
ul. Podgórznej (1963—65), przy Zamku Piastowskim (1960—65) —
wszędzie po kilkanaście egzemplarzy.
- 73. *Beta vulgaris* L. var. *cicla* L. — Erg.
Gat. śródz. (Heği).
Śmietn. przy ul. Tama Pom., gruz na Niebuszewie.
- 74. *Chenopodium botrys* L. — Epek.
Gat. tur.-wsch. śródz.
Śmietn. Tama Pom. (po kilka egz.), na hałdach w Hucie Stołczyn
(licznie w skarłatej formie).
- +75. *Chenopodium foetidum* Schrad. — Efem.
Gat. tropik.afryk.
Kilka egz. na gruzach przy ul. Tama Pom. tylko w latach 1958—
61.
- 76. *Chenopodium polyspermum* L. — Ap.
Gruzy Niebuszewa, tereny port., przydroża w Stołczynie, Skolwi-
nie i Glinkach. Liczniej na terenach uprawnych Wzgórz War-
szewskich.
- (77). *Chenopodium vulvaria* L. — Epek.
Gat. submedit.-ir. tur. (Eig).
Müller (1911) wymienia Szczecin bez stanowiska.
- 78. *Chenopodium hybridum* L. — Arch.
Gat. śródz.-wsch. tur.
Dość często na terenie Międzyodrza, na gruzach, śmietn., tere-
nach port.
- 79. *Chenopodium murale* L. — Efem.

- Gat. tur.-wsch. śródziemn. (Meusel).
 Kilka egz. na terenach port., przy ul. Przędowników Pracy, na
 śmietn. pod Klęskowem.
- +80. *Chenopodium urbicum* L. — Arch.
 Gat. śródziemn.
 Pod płotem dyrekcji Huty Stołczyn, tereny po wapnie przy Cu-
 krowni Gumieńce. Holzfuss (1937) podaje ten gatunek z Ku-
 rowa (Curow).
- (81). *Chenopodium pratericola* Rydl. — Efem.
 Gat. pn. i śr. ameryk. (Holzfuss).
 Śmietn. przy Gdańskiej (Holzfuss 1937).
- (82). *Chenopodium hircinum* Schrader. — Efem.
 Gat. pd.ameryk. (Holzfuss).
 Śmietn. przy ul. Gdańskiej i Tama Pom. (Holzfuss 1937).
83. *Chenopodium album* L. — Arch.
 Gat. holarkt.
 Licznie na całym terenie.
- +84. *Chenopodium striatum* Murr. — Ap.
 Usypisko gruzu przy ul. 1 Maja (1965), przy ul. Kolumba, Wła-
 dysława IV, na śmietn. w porcie Żukowski.
85. *Chenopodium ficifolium* Sm. — Arch. (Ap.).
 Gat. zach.europ.
 Tereny port., śmient. przy Tama Pom.,
 działki prac. na Niebuszewie.
86. *Chenopodium glaucum* L. — Epek.
 Gat. tur.-wch.śródz.
 Na wilgotnych miejscach całego terenu.
 Znosi wydeptywanie.
87. *Chenopodium rubrum* L. — Epek.
 Gat. tur.-wsch. śródz.
 Gruzy przy Łasztowni, ul. Gdańskiej, Dębogórskiej, na Starym
 Mieście, na śmietn. Tama Pom. (Żukowski).
88. *Chenopodium bonus-henricus* L. — Arch.
 Gat. śródziemn.-ir. tur.
 Przychacia w Glinkach, Krzekowie, Kluczu, Skolwinie Górnym.
- (89). *Chenopodium aristatum* L. — Efem.
 Gat. pn.ameryk. (Hegi).
 Holzfuss (1941) wymienia z terenu ul. Gdańskiej i Tamie Pom.
 jako zawleczony z nasionami soi.
90. *Atriplex hortense* L. — Erg.
 Gat. zach.azjat. (Kornaś).
 Śmietn. przy ul. Roztockiej (1962—1966), śmietn. pod Klęskowem,
 działki prac. na Niebuszewie.
91. *Atriplex nitens* Schkr. — Epek.

- Gat. tur.-wsch. (M e u s e l).
Dość licznie na miejscach zruszonych.
92. *Atriplex oblongifolium* W. K. — Epek.
Gat. tur.-wsch.śródz. (M e u s e l).
Gumieńce — licznie pod płotami przy ul. Rosenbergów, tereny port.
93. *Atriplex patula* L. — Arch.
Gat. tur.-wsch.
Tereny portowe, częsty na śmietn., przydrożach i działkach.
94. *Atriplex hastatum* L. — Epek.
Gat. tur.-wsch.śródz. (M e u s e l).
Gruzy przy Gdańskiej i tereny port.
95. *Atriplex tataricum* L. — Epek.
Gat. tur.-wsch.śródz.
Wiele egz. na jednym stanowisku na terenie portu w 1963 i 1964 r.
- (96). *Atriplex roseum* L. — Efem.
Gat. tur.-wsch.śródz.
Schmidt i Müller (1911) podają jako nierzadki.
- (97). *Atriplex laciniata* L. (*A. calotheca* Tries.) — Efem.
Gat. atlant. Schmidt.
- (98). *Atriplex säckii* Rostkovius — Efem.
Gat. atlant. (Schmidt, Müller).
- +99. *Salsola ruthenica* Iljin. — Epek.
Gat. azjat.-wsch.europ.
Częsty na piaszczystym terenie, nasypach kol., na Międzyodrze, skarpach przydrożnych w Dziewokliczu, nieużytkach w Dąbiu, Zdrojach, Podjuchach, Żydowcach i Kluczu. (Celiński).

Amaranthaceae

100. *Amaranthus caudatus* L. — Ergfgf.
Gat. tropik.-ameryk. (H e g i).
W uprawie buraków pastewnych na Krzekowie (kilka egz.).
101. *Amaranthus retroflexus* L. — Epek.
Gat. tropik.-ameryk.
Pospolity na całym terenie.
102. *Amaranthus albus* L. — Epek.
Gat. tropik.-ameryk.
Tory kol. przy Dworcu Głównym (licznie), tereny kol. w Dąbiu (licznie), w Podjuchach, tereny port.
- (103). *Amaranthus angustifolius* Lam. — Efem.
Gat. orient.
(Holzfuss 1941) przy Tamie Pom. (licznie).

- +104. *Amaranthus blitoides* S. Watson. — Epek.
(Kornaś, Leśniewiecka, Skrzywanek 1959).
Gat. pn.ameryk.
Przychacia, ogródki i chodniki przy ul. Kostrzyńskiej w Dąbiu,
na dworcu kol. w Dąbiu. (Celiński).
- +105. *Amaranthus ascendens* Lois. (*A. lividus* L. var. *ascendens* (Lois.)
Thell. — Epek.
Gat. pn.ameryk.
Cment. Centr. (licznie) oraz kwietniki. (Holzfuss).

Portulacaceae

- +106. *Portulaca oleracea* L. — Arch.-Epek..
Gat. wsch.-boreal.
Jeden egz. na terenie portu w 1964 r.
- +107. *Claytonia perfoliata* Donn. — Efem.
Gat. meksyk. (Hegi).
Cm. Centr. (licznie jako chwast). Zaobserwowany w 1964 r. Do
tej pory podany z Wrocławia (Rostański msk.).

Caryophyllaceae

108. *Tunica prolifera* (L.) Scop. — Ap. muraw. kseroterm.
Licznie na terenach piaszczystych, przeważnie kol. i port., skar-
pach drogowych, gruzach i murach.
109. *Dianthus carthusianorum* L. — Ap. murawowy.
Skarpy przydrożne w Gocławiu i Stołczynie.
110. *Dianthus arenarius* L. — Ap. leśny.
Skarpy kol. i przydrożne w Dziewokliczu.
111. *Dianthus deltoides* L. — Ap. łąkowy.
Skarpy przydrożne w Skolwinie.
112. *Gypsophila muralis* L. — Epek.
Gat. pd.-śr.-europ., zach. azjat.
Piaszczysty teren w Żydowcach i przy Cukrowni Gumieńce.
- (113). *Vaccaria pyramidata* Med. — Efem.
Gat. illir.-pannońsko-orient.
Podaje ze śmietniska przy ul. Gdańskiej Holzfuss (1937).
114. *Saponaria officinalis* L. — Ap. zarośli.
Często na gruzach, przydrożach, terenach port. i kol.
115. *Lychnis flos-cuculi* L. — Ap. łąkowy.
Gruzy przy ul. Tama Pom.
116. *Melandrium noctiflorum* L. Fr. — Epek.
Gat. wsch.śródz.
Gruzy Niebuszewo, tereny kol. w Gocławiu i Niebuszewie.

117. *Melandrium album* (Mill.) Garcke. — Ap. łąk.
Na całym terenie.
118. *Silene inflata* (Salisb.) Sm. — Ap. muraw kseroterm.
Przydroża, miedze, nieużytki, gruzy, tereny kol.- licznie.
119. *Silene dichotoma* Ehrh. — Epek.
Gat. śródz.-ir. tur.
Skarpy kol. m. Zdrojami i Dąbiem.
120. *Silene nutans* L. — Ap. suchych lasów.
Rumowiska i przydroża przy ul. Skalistej.
- (121). *Silene tatarica* Pers. — Ap. murawowy.
Winkelmann podaje z Dąbia (por. Müller 1911).
122. *Agrostemma githago* L. — Arch.
Gat. tur.-wsch.śródz.
Często w uprawach zbożowych, rzadko na gruzach i przydrożach.
123. *Moehringia trinervis* (L.) Clairv. — Ap. zaroślowy i leśny.
Gruzy i tory kol. (Müller).
124. *Arenaria serpyllifolia* L. — Ap. muraw kseroterm.
Na terenach kol. i port., na polach.
125. *Holosteum umbellatum* L. — Ap. muraw kseroterm.
Na skarpach kol. i przydrożach.
126. *Stellaria media* Vill. — Ap. łąk. i leśny.
Na całym terenie.
127. *Stellaria graminea* L. — Ap. łąk. (Arch. Buchli).
Na skarpach kol., przydrożach, gruzach Grabowa i cmentarzach.
128. *Cerastium arvense* L. — Ap. łąk i skał wapien.
Na całym terenie.
129. *Cerastium vulgatum* L. — Ap. suchych lasów (Motyka).
130. *Cerastium semidecandrum* L. — Ap. muraw kseroterm.
Skarpy kol. m. Pom. i Gum.
131. *Cerastium tomentosum* K. — Ergfgf.
Gat. śródz.
Rumowiska przy zwirowni w Żydowcach, przy ul. Tomaszewskiej, gruzy na Niebuszewie, nieużytki przy ul. Duńskiej.
132. *Cerastium viscosum* L. — Ap. zesp. leśnych.
Tereny kol. m. Pom. i Gum. Holzfuss (1937) podaje z okolic Kłęskowa.
133. *Malachium aquaticum* (L.) Fr. — Ap. wilgotnych zarośli.
Tereny port., wały stawów rybnych m. Pom. i Gum., tereny Międzyodrza.
- (134). *Sagina apetala* Ard. — Efem.
Gat. subatlant. Podany przez Aschersona i Graebnera (1898—99) oraz Müllera (1911) z okolic Kłęskowa.
135. *Sagina nodosa* (L.) Fenzl. — Ap. łąkowy.

Chodniki na Wałach Chrobrego, tereny zalewane przez Cukrownie Gumieńce.

136. *Sagina procumbens* L. — Ap. łąkowy.
Tereny port., podmokłe piaszczyste tereny na Międzyodrze, w Dąbiu, Wielgowie, Zdrojach i na polach.
137. *Scleranthus perennis* L. — Ap. wydym i piaszczysk.
Tereny kol. w Załomiu, skarpy przydrożne i nieużytki piaszczyste w Zdrojach i Żydowcach.
138. *Scleranthus annuus* L. — Arch. (Buchli).
Gat. pd.-śr.-europ. i atlant.
Licznie na terenach uprawowych i skarpach kol. — dość pospolity.
139. *Spergula arvensis* L. — Arch. (Buchli).
Gat. pd.-śr.-europ.-atlant.
Często na polach i nieużytkach.
140. *Spergula vernalis* Willd. — Ap. wydym i piaszczysk.
Przy drogach polnych w Kluczu i Mścięcinie.
141. *Spergularia rubra* (L.) Presl. — Ap. nadwodny.
Pod parkanami na Wałach Chrobrego i na terenie zalewanym przez Cukrownie.
142. *Herniaria glabra* L. — Ap. wydym i piaszczysk.
Tereny kol. w miejscach wydeptywanych, na gruzach i chodnikach.
- +143. *Herniaria hirsuta* L. — Epek.
Gat. śródziem.-zach.europ.
Tylko na terenie portu w Basenie Górniczym.

Euphorbiaceae

144. *Euphorbia exigua* L. — Arch. (Epek).
Gat. śródz.
Pole przy ul. Gołęcińskiej w Gocławiu — dość licznie.
145. *Euphorbia peplus* L. — Epek.
Gat. eurosyber.-boreoameryk.-ir. tur. (Nowiński).
Pospolity.
146. *Euphorbia helioscopia* L. — Arch.
Gat. śródz.-ir.-tur.
Pospolity prócz śmietnisk.
147. *Euphorbia cyparissias* L. — Ap. muraw kseroterm.
Tereny kol. na Międzyodrze, Niebuszewie, Zdrojach, Dąbiu, Gocławiu, Skolwinie — miejscami dość licznie.
148. *Euphorbia esula* L. — Ap. muraw kseroterm.
Gat. pontyjski.
Stacja kol. Turzyn, Niebuszewo, Gocław, Cm. Centr., pola i przychacia w Glinkach i na Gumieńcach.

- (149). *Euphorbia virgata* W. K. — Epek.

Gat. Pontyjski.

Holz f u s s (1920, 1925) podaje ze Zdrojów, Strugi i Świnoujścia. Obecnie w Szczecinie nie odnaleziony. Nie wymienia go Celiński (1964), i nie odszukała go Piotrowska (1966).

Aristolochiaceae

- +150. *Aristolochia clematitis* L. — Arch.

Gat. śródz.

Tylko na skarpie w Lasku Arkońskim przy pętli tramwajowej 3. Müller (1911) podał ze Stargardu i Smerdnicy. W Smerdnicy odszukał ten gatunek Celiński (1964).

Berberidaceae

151. *Berberis vulgaris* L. — Ap. leśny.

Skarpy kol. m. Niebuszewem i Gocławiem, Zdrojami i Podjuchami, gruzy przy ul. Tama Pom.

Ranunculaceae

152. *Nigella damascena* L. — Ergfgf.

Gat. wsch.śródz.

Śmiet. przy Roztockiej, Duńskiej, pod Klęskowem, jako chwast na działkach.

153. *Aquilegia vulgaris* L. — Ap. leśny.

Śmiet. przy ul. Tama Pom.

154. *Consolida regalis* S. P. Gray. — Arch.

Gat. śródz.-ir. tur.

Często na polach i działkach, skarpy przydrożne w Dziewokliczu.

155. *Consolida ajacis* (L.) Schur. — Ergfgf.

Gat. śródz.

Na działkach prac. na Niebuszewie jako chwast, na śmiet. Tama Pom.

- +156. *Clematis vitalba* L. — Ergfgf.

Gat. pd.europ.

Często na gruzach, przychaciach, skarpach kol. i cmentarzach.

- +157. *Clematis orientalis* L. (*C. graveolens* Lindl.) — Ergfgf.

Gat. azjat.

Skarpy kol. m. Niebuszewem i Łęknem.

158. *Myosurus minimus* L. — Ap. zesp. nadwodnych.

Tereny zalewane przez Cukrownię Gumieńce — dość licznie.

159. *Ranunculus sceleratus* L. — Ap. błotny.

Nad rowami w Dąbiu, Krzekowie, tereny port., zagłębienia na gruzach.

160. *Ranunculus arvensis* L. — Arch.
Gat. tur.-wsch.śródz.
Pola przy ul. Gołęcińskiej.
161. *Ranunculus bulbosus* L. — Ap. łąkowy.
Skarpy kol. w okolicy Turzyna, Zdrojów, gruzy na Żelechowie, przydroża w Klęskowie — dość częsty.
162. *Ranunculus repens* L. — Ap. zaroślowy i leśny.
Na całym terenie.
163. *Ranunculus lanuginosus* L. — Ap. zaroślowy.
Przydroża w Klęskowie, Glinkach, nad ściekami w Skolwinie Górnym i na dworcu kol. na Niebuszewie.
164. *Ranunculus acer* L. — Ap. łąkowy.
Sporadycznie na terenach kol., gruzach, przydrożach, cmentarzach.
165. *Ranunculus polyanthemos* L. — Ap. leśny.
Przydroże w Klęskowie.
166. *Ranunculus ficaria* L. (*Ficaria verna* H u d s.) — Ap. leśny.
Gruzy przy ul. Tama Pom., Niebuszewie, rozproszony na terenach kol.
167. *Thalictrum flexuosum* Bernh. — Ap. leśny.
Skarpa przydrożna przy Wartysławu.
- +168. *Thalictrum simplex* L. — Ap. murawowy.
Stary cmentarz w Klęskowie.
169. *Thalictrum flavum* L. — Ap. łąkowy.
Gruzy przy ul. Gdańskiej, na Bulwarze Gdańskim i na terenie portu. (M ü l l e r).

Papaveraceae

170. *Papaver argemone* L. — Epek.
Gat. wsch.śródz. (M e u s e l).
Częsty na terenach kol., skarpach drogowych.
171. *Papaver dubiu* L. — Epek.
Gat. śródz.-submedit.
Na tych samych stanowiskach.
172. *Papaver rhoeas* L. — Arch.
Gat. tur.-wsch. śródz. (M e u s e l).
Często w uprawach polowych i na terenach kol.
173. *Papaver somniferum* L. — Erg.
Gat. prawdopodobnie chiński.
Śmietniska, działki prac., tereny port.
174. *Eschscholtzia californica* C h a m. — Efem.

Gat. ameryk.

Działki na Niebuszewie jako chwast, śmietnisko przy Tama Pom.

175. *Chelidonium majus* L. — Ap. leśny.

Często na całym terenie.

- (176). *Glaucium corniculatum* (L.) Curt. — Efem.

Gat. śródz.

Podany przez Holzfussa (1937) ze Szczecina bez określenia miejsca.

- (177). *Corydalis lutea* (L.) De — Efem.

Gat. europ. (Dostal).

Holzfuss (1941) podał z terenu przy ul. Gdańskiej.

178. *Fumaria officinalis* L. — Arch.

Gat. eurosyber.-boreoameryk.-ir. tur.

Często na polach i działkach, rzadko na śmiet. i terenach kol.

Cruciferae

179. *Rorippa palustris* (Léyss.) Bess. — Ap. nadwodny.

Tereny port., nad rowami w Żydowcach, na Międzyodrze.

180. *Rorippa sylvestris* (L.) Bess. — Ap. leśny.

Dość często na wilgotnym terenie.

181. *Rorippa austriaca* (Cr.) Bess. — Epek.

Gat. ir. tur., sarmacki (Gajewski).

Dworzec kol. w Żelechowie (kilkadziesiąt egz.) grzyzy na Niebuszewie (kilka egz.).

- +182. *Rorippa armoracioides* (Tausch) Fuss. — Ap. nadwodny.

Grzyzy przy Kolumba, Łasztownia.

183. *Barbarea vulgaris* R. Br. — Ap. łąkowy.

Pola przy Duńskiej, w Klęskowie, Gocławiu, Glinkach, tereny port.

184. *Barbarea stricta* Andrż. — Ap. łąkowy.

Zsypisko ziemi przy Hucie Stołczyn.

- +185. *Arabis hirsuta* (L.) Scop. — Ap. muraw kseroterm.

Cm. Centr. (kilka egz.).

186. *Arabis arenosa* (L.) Scop. — Ap. muraw kseroterm.

Często na terenach kol., rzadziej na gruzach, murach i cmentarzach.

187. *Matthiola incana* (L.) R. Br. — Ergfgf.

Gat. śródz.

Na śmietniskach i działkach (pojedyncze egz.).

188. *Hesperis matronalis* L. — Ergfgf.

Gat. pontyjski (Meusel).

Śmiet. przy ul. Tama Pom., przydroża i przychacia w Skolwinie.

189. *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. — Arch.

- Gat. holarkt.-ir. tur.
Pospolity.
190. *Sisymbrium altissimum* L. — Epek.
Gat. tur.-wsch. śródz.
Dość często na świeżo zruszonych gruzach, nasypach kol. i na śmiet.
- (191). *Sisymbrium orientale* L. — Efem.
Gat. submediterr.-ir. tur.
Holzfuss (1937) wymienia olejarnię w Żelechowie.
192. *Sisymbrium loeselii* L. — Epek.
Gat. tur.-wsch. śródz.
Licznie na całym terenie.
193. *Descurainia sophia* (L.) Webb. — Arch.
Gat. wsch. ir. tur.
Spotykany na całym terenie.
194. *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. — Arch.
Gat. eurosyber.
Najczęściej na terenach kol.
195. *Alliaria officinalis* Andrz. — Ap. leśny.
Często na przydrożach i przychaciach w zaroślach, rzadko na terenach kol.
196. *Erysimum cheiranthoides* L. — Arch.
Gat. borealny.
Pospolity na całym terenie.
197. *Brassica napus* L. var. *biennis* (Schüb. et Mart.) Rchb. — Erg.
Gat. śródz.
Tereny port., tereny kol. na Międzyodrze, w Dąbiu, Niebuszewie.
198. *Brassica oleracea* L. — Erg.
Gat. śródz.
Spotykana na śmiet. (Müller).
199. *Brassica nigra* (L.) Koch. — Erg.
Gat. śródz.-submedit.-ir. tur. (Eig).
Gruzy przy cmentarzu (kilkanaście egz.) i przy ul. Kolumba.
- (200). *Brassica juncea* (L.) Cosson. (*B. lanceolata* Lange) — Efem.
Gat. śródz.
Holzfuss (1937) zanotował ze śmiet. przy Gdańskiej.
- (201). *Conringia orientalis* (L.) Andrz. — Efem.
Gat. śródz.
Müller, Holzfuss (1937) wymieniają z dworca kol.
- (202). *Hirschfeldia incana* (Jusl.) Lingr.-Foss. — Efem.
Gat. śródz.-ir. tur.
Śmiet. przy ul. Tama Pomorska (Holzfuss 1941).
- (203). *Erucastrum nasturtiifolium* (Poir) O. E. Schulz. — Efem.

Gat. śr. europ.

Holz f u s s (1925) zaobserwował ten gat. w Zdrojach.

204. *Erucastrum gallicum* (Willd) O. E. Schulz.

(*E. pollichii* Schimp. u. Spen.). — Epek.

Gat. zach. europ.

Na gruzach przy ul. Dąbrowskiego (kilkanaście egz.).

205. *Sinapis arvensis* L. — Arch.

Gat. submedit.-ir. tur. (E i g).

Często na polach i ogrodach.

206. *Sinapis alba* L. — Epek.

Gat. śródz.-ir. tur. (E i g).

Rzadszy od poprzedniego gatunku.

207. *Diplotaxis tenuifolia* (Juslen) D. C. — Epek.

Gat. śródz.-submedit. (M e u s e l).

Licznie na gruzach przy al. Wyzwolenia w 1964 i 65 r. i na Niebuszewie, na terenach kol. i port., rzadziej na śmietn. i przychodniach. Holz f u s s (1937) wymienia ten gatunek jako znany od 1824 r. w Świnoujściu.

208. *Diplotaxis muralis* (L.) D. C. — Dw. Epek.

Gat. śródz.-submedit. (M e u s e l).

Częstszy od poprzedniego.

Holz f u s s (1937) pisze, że po raz pierwszy spotkano ten gatunek w 1840 r. w powiecie Gryfino i Pyrzyce. Później spotykano go na stacjach kol. i śmiet.

- (209). *Eruca sativa* Cosson. — Erg.

Gat. śródz.-ir. tur.

Śmiet. przy ul. Gdańskiej (H o l z f u s s 1937).

210. *Alyssum calycinum* L. — Ap. muraw kseroterm.

Murawy przy ul. Duńskiej, tereny kol. m. Pom. i Gum., na Międzyodrze, nieużytki w Żydowcach, Dąbiu, Gocławiu.

- +211. *Alyssum montanum* L. — Ap. suchych muraw.

Murawa przy ul. Kostrzyńskiej w Dąbiu (kilka egz.) i żwirownia w Żydowcach.

212. *Lobularia maritima* (L.) Desv. — Ergfgf.

Gat. śródz.

Dworzec kol. w Żelechowie, Dziewokliczu, Zdrojach i Dąbiu.

213. *Lunaria annua* L. — Efem.

Gat. śródz. Hodowana.

Spotykana na działkach prac. jako chwast.

214. *Berteroa incana* (L.) D. C. — Epek. (Arch.).

Gat. śródz.-ir. tur.

Pospolity

215. *Erophila verna* (L.) C. A. M. — Ap. leśny.

- Gat. pd.-śr.-europ.
Suche przydroża, tereny kol. na całym.
216. *Armoracia lapathifolia* Gilib. — Erg.
Gat. pd.-wsch.-europ. i zach.azjat.
Śmiet., przychacia i gruzy.
217. *Camelina microcarpa* Andr. — Epek.-Arch.
Gat. tur.-śródz.-ir. tur.
Skarpy kol. i drogowe w Dziewokliczu (dość licznie).
218. *Camelina sativa* (L.) Cr. — Arch.
Gat. tur.-wsch.azjat.
Skarpy Szosy Poznańskiej, Kijewo.
219. *Thlaspi arvense* L. — Arch. lub Epek.
Gat. śr. i zach.azjatycki.
Pospolity na polach i działkach, rzadszy na terenach kol. i port.,
gruzach i śmiet.
220. *Cardaria draba* (L.) Desv. — Epek.
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel), (Kornaś). śródziemn. ir. tur.
Zsypiska śmieci i gruzu przy ul. Tama Pom. i Szczawiowa, przy-
droża w Stołczynie, Skolwinie, Glinkach, Żelechowie, Gumieńcach,
Grabowie, Dziewokliczu, Dąbiu, Klęskowie, Zdrojach i Żydow-
cach.
221. *Lepidium campestre* (L.) R. Br. — Efem.
Gat. europ.-atlantycki.
Teren kol. w Gocławiu Tow. (kilkanaście egz.). Celiński wy-
mienia ten gat. spoza terenu Szczecina (Binowo).
222. *Lepidium ruderales* L. — Arch.
Gat. wsch.śródz. (Meusel).
Często na gruzach, przydrożach i przychaciach.
- (223). *Lepidium perfoliatum* L. — Efem.
Gat. śródz.-ir. tur.
(Holzfuss 1937).
- +224. *Lepidium neglectum* Thell. — Epek.
Gat. boreoameryk.
Gruzy Niebuszewo i przy ul. Gdańskiej.
- +225. *Lepidium densiflorum* Schrad. (*L. apetalum* auct.) — Epek.
Gat. pn.ameryk.
Gruzy w Dąbiu, Grabowie, tory kol. m. Dąbiem i Zdrojami, Pod-
juchy. (Celiński).
- (226). *Lepidium virginicum* L. — Efem.
Gat. ameryk.
Obserwowany w Dąbiu (Holzfuss 1937 i 1941).
227. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Med. — Arch.
Gat. wsch.śródz.
Pospolity na całym obszarze.

228. *Coronopus procumbens* Gilib. — Epek. (Arch.)
 Gat. submedit. (Eig).
 Występuje na gliniastym podłożu w zach. dzielnicach miasta, np. na gruzach w Grabowie, Żelechowie, na przydrożach i przychaciach w Stołczynie i Glinkach, a nawet na bruku, m. płytami chodników i pod murami na Niebuszewie. Płatami występował na gruzach przy ul. 1 Maja i w Stołczynie.
229. *Coronopus didymus* (L.) Sm. — J. Efem.
 Gat. pd. ameryk.
 Pn. tereny Krzekowa. (Holzfuss 1937).
230. *Neslia paniculata* (L.) Desv. — Arch.
 Gat. submedit.-ir. tur. (Eig).
 Celiński (1964) wymienia z Klęskowa (b. rzadki).
231. *Bunias orientalis* L. — Epek.
 Gat. pontyjsko-pannoński (Meusel).
 Tereny kol. na Międzyodrze, Gołęcinie, Żelechowie, Żydowcach oraz przydroża w Drzetowie, Glinkach, Gołęcinie, Krzekowie i Gumieńcach. Po raz pierwszy ze Szczecina podaje go Utpadel (1885) (por. Holzfuss 1937).
232. *Rapistrum perenne* (L.) All. — Epek.
 Gat. wsch.europ.
 Dość licznie przy ul. Kolumba.
 Holzfuss (1937) obserwował ten gat. w latach 1927—1932 przy Szwedzkim Młynie k. Klęskowa.
- (233). *Rapistrum rugosum* (L.) All. — Efem.
 Gat. śródz.-submedit. (Meusel).
 Holzfuss (1937) podaje ze śmiet. przy Gdańskiej.
234. *Raphanus raphanistrum* L. — Arch.
 Gat. submedit. (Eig).
 Śmiet. przy ul. Nehringa i Tama Pom., gruzy Niebuszewo i przy ul. Dębogórskiej, tereny port. oraz uprawne.
235. *Raphanus sativus* L. — Erg.
 Gat. azjat. (Hegi).
 Przychacia na Gumieńcach, śmietn. przy Roztockiej, działki prac.

Resedaceae

236. *Reseda lutea* L. — Epek. (Arch.).
 Gat. submedit.-ir. tur.-stepowy (Eig).
 Rozproszony na terenach kol. i port., gruzach, śmiet., przydrożach całego obszaru.
237. *Reseda luteola* L. — Epek.
 Gat. submedit.-ir. tur.

Spotykany na gruzach, śmiet. terenach kol., na skarpach drogowych.

238. *Reseda odorata* L. — Ergfgf.

Gat. śródz. ir. tur.

Śmiet. przy ul. Roztockiej, przychacia przy ul. Wilczej.

Violaceae

239. *Viola odorata* L. — Ergfgf.

Gat. śródz.-submedit. (Meusel).

Na trawnikach cmentarnych, na działkach prac., w zaroślach przydomowych w Zdrojach, Żelechowie i Warszawie.

240. *Viola hirta* L. — Ap. leśny.

Skarpy kol. m. Pom. i Gum., przydroża w Zdrojach i Klęskowie.

241. *Viola sylvestris* Rchb. — Ap. leśny.

Cm. Centr. na trawnikach.

242. *Viola canina* Rchb. — Ap. piaszczysk.

Piaszczyste skarpy kol. w Dąbiu, Zdrojach, Mścięcinie, Żydowcach.

243. *Viola tricolor* L. — Arch.

Gat. wsch.śródz.

Pola uprawne, przydroża, skarpy kol. na całym terenie rozproszony.

244. *Viola arvensis* Murr. — Arch.

Gat. wsch.śródz.

Pospolity na terenach uprawnych, spotykany na terenach kol. przydrożach.

Guttiferae

245. *Hypericum perforatum* L. — Ap. muraw kseroterm.

Częsty na skarpach przydrożnych i kol., gruzach i cmentarzach.

246. *Hypericum maculatum* Cr. — Ap. łąkowy.

Skarpy Szosy Poznańskiej, nad rowami w Zdrojach i Żydowcach.

247. *Hypericum acutum* Mnch. — Ap. łąkowy.

Rowy przy torach kol. na pn. wsch. od Klęskowa.

Crassulaceae

248. *Sedum maximum* Sut. — Ap. muraw kseroterm.

Tereny kol., cmentarze, skarpy drogowe w rozproszonych stan.

249. *Sedum album* L. — Erg.

Gat. subatlant.

Skarpy kol. m. Niebuszewem i Łękem, Turzynem i Dworcem Gł., Pom. i Gum.

250. *Sedum acre* L. — Ap. muraw kseroterm.
Częsty na terenach kol., przydrożach, cmentarzach, piaszczystych nieużytkach i murach.
251. *Sedum sexangulare* L. — Ap. muraw kseroterm.
Tory kol. m. Łęknem i Dworcem Gł., piaszczyste nieużytki w Kłuczu i Kłęskowie.
252. *Sedum reflexum* L. — Ap. muraw kseroterm.
Tory kol. w Żydowcach i Mścięcinie.
253. *Sempervivum soboliferum* Sims. — Ap. kseroterm.
Cmentarze, ogródki przydomowe.

Saxifragaceae

254. *Saxifraga granulata* L. — Ap. murawowy.
Skarpy kol. m. Pom. i Gum., skarpy przy Szosie Poznańskiej, Cm. Centr.
255. *Saxifraga tridactylis* L. — Ap. muraw kseroterm.
Skarpy kol. m. Pom. i Gum. (Müller).
256. *Ribes eureum* Pursh. — Ergfgf.
Gat. pn.ameryk.
Gruzy na Niebuszewie i Pom.
257. *Philadelphus coronarius* L. — Ergfgf.
Gat. pd.-wsch.-europ.
Gruzy w Grabowie i Drzetowie.

Rosaceae

- +258. *Spiraea trilobata* L. — Epek.
Gat. azjat. (Białobok).
Spotykana na skarpach kol. i gruzach.
- +259. *Spiraea brachybotrys* Ige. — Ergfgf.
Gatunek nieznanego pochodzenia.
Piaszczyste przydroża w Dąbiu Osiedlu.
260. *Spiraea salicifolia* L. — Epek.
Gat. eurosyber.
Skarpy kol. w Drzetowie (na półn. od stacji kol. Drzetowo).
261. *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br. — Ergfgf.
Gat. azjat.
Ruiny zabudowań w Dąbiu Osiedlu, na cmentarzu w Dąbiu, w lesie nad jez. Głębokie.
262. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. — Ap. Łąkowy.
Gruzy przy ul. Gdańskiej, Szczawiowej, Tamie Pom.
263. *Rosa rugosa* Thumb. — Ergfgf.
Gat. wsch.azjat.

- Tory kol. m. Stołczynem i Skolwnem, gruzy na Niebuszewie, w Dąbiu i Zdrojach, nieużytki w Klęskowie, Podjuchach, Żydowcach, na Gumieńcach i Gocławiu.
264. *Rosa canina* L. — Ap. leśny i zaroślowy.
Skarpy kol. i drogowe, gruzy, przydroża i cmentarze na całym terenie w rozproszonych stan.
265. *Rosa dumetorum* Thuill. — Ap. leśny.
Na tych samych stanowiskach co poprzednia, ale rzadziej.
266. *Rosa rubiginosa* L. — Ap.
Skarpy Szosy Poznańskiej, przydroża i nieużytki w Stołczynie i Skolwinie.
- (267). *Rosa elliptica* Tausch. — Ap. muraw kseroterm.
Holzfuss (1924) podał z okolicy Zdrojów.
- +268. *Rosa pomifera* Herrm. — Erg.
Gat. pd.-zach.-europ.
Gruzy m. Drzetowem i Żelechowem.
269. *Rubus idaeus* L. — Ap. leśny.
Gruzy przy ul. Staszica, na Żelechowie, przy Szosie Pozn. w okolicy Ustowa, na śmiet. i działkach prac.
270. *Rubus plicatus* W. et N. — Ap. leśny.
Tory kol., przydroża i gruzy w rozproszonych stan. na całym terenie.
271. *Rubus caesius* L. — Ap. leśny.
Często na terenach kol., przydrożach i gruzach.
- +272. *Rubus odoratus* L. — Ergfgf.
Gat. pn.ameryk.
Przydroże przy ul. 1 Maja (zdziczała).
(Kownas i Sienicka, 1962).
- +273. *Rubus thyrsoides* Wimm. — Ap. leśny.
Gruzy i skarpy kol. na Niebuszewie.
274. *Fragaria vesca* L. — Ap. leśny.
Na terenach kol. i przydrożach w rozproszonych stan.
- +275. *Fragaria moschata* Duch. — Ap. leśny.
Tereny kol. m. Niebuszewem i Drzetowem.
276. *Fragaria viridis* Duch. — Ap.
Gruzy przy ul. Tama Pom., skarpy Szosy Pozn., przydroża na Gumieńcach, Kluczu, Żydowcach i Podjuchach.
- +277. *Fragaria ananassa* Duch. — Erg.
Gat. nieznanego pochodzenia.
Zdziczała z hodowli na gruzach Niebuszewa i Grabowa, śmiet. przy Duńskiej.
278. *Potentilla supina* L. — Ap. nadwodny.
Tereny port. (kilka egz.) i przy Cukrowni Gum. (kilka egz.).

279. *Potentilla norvegica* L. — Ap. nadwodny.
Tereny port., gruzy przy Gdańskiej, przydroża na wyspie Puckiej, tereny kol. na Międzyodrze.
Holzfuss (1937) pisze, że we Florze Homanna (1828—1835) był podawany z Widuchowej w pow. Gryfino, we Florze Schmidta (1840) z Gryfina, Pyrzyń, Goleniowa i okolic Stepnicy. W Szczecinie był notowany w latach 1915—1934.
280. *Potentilla intermedia* L. — Epek.
Gat. wsch.europ.
Gruzy przy ul. Kolumba.
Holzfuss (1937) wymienia z okolicy Szwedzkiego Młyna.
- +281. *Potentilla recta* L. — Epek.
Gat. tur.-wsch. (Meusel).
Skarpy Szosy Pozn. (licznie).
282. *Potentilla canescens* Bess. — Epek.
Gat. ir. tur.
Tereny kol. przy ul. Pieszej.
Holzfuss (1937 i 1941) podaje ze Szczecina.
283. *Potentilla argentea* L. — Ap. murawowy.
Tereny kol. przy ul. Pieszej i m. Dąbiem i Załomem.
- +284. *Potentilla collina* Wib. — Ap. murawowy.
Gruzy przy ul. Gdańskiej, przydroża w Dąbiu, Zdrojach i Żydowcach. (Celiński).
- +285. *Potentilla verna* L. — Ap. murawowy.
Piaszczyste tereny kol. przy Pieszej.
286. *Potentilla arenaria* Borkh. — Ap. murawowy.
Skarpy kol. m. Pom. i Gum., przydroża w Klęskowie i Podjuchach.
287. *Potentilla reptans* L. — Ap. łąkowy.
Często na terenach kol. gruzach, przydrożach, trawnikach, cmentarzach i polach.
288. *Potentilla procumbens* Sibth. — Ap. leśny.
Gat. europ.
Tereny port.
289. *Potentilla anserina* L. — Ap. zbior. nadw.
Częsty na przychaciach, nad rowami, na gruzach i śmiet. całego terenu
- +290. *Alchemilla micans* Bus. — Ap. łąkowy.
Tereny przy Hryniewieckiego.
291. *Aphanes arvensis* L. — Arch.
Gat. śródz.-atlantycki.
Dość licznie na polach.
292. *Geum urbanum* L. — Ap. leśny.
Pospolity na przydrożach, cmentarzach, przychaciach i gruzach.

293. *Agrimonia eupatoria* L. — Ap. muraw. kseroterm.
Suche skarpy kol. i drogowe.
294. *Sanguisorba minor* L. — Epek.
Gat. śródz.
Tereny kol. i przydroża m. Pom. i Gum., w Stołczynie, Gocławiu, Gołęczynie, Zdrojach, Żydowcach, Kłęskowie.
- +295. *Sanquisorba muricata* (Spach) Gremli. — Epek.
Pochodz. stepy obszaru śródz.
Tereny kol. m. Pom. i Gum.
- +296. *Cotoneaster integerrima* Med. — Efem.
Gat. górski, rosnący w Europie i na Kaukazie.
Spotykany na terenach kol. i gruzach, np. na skarpach kol. m. Niebuszewem i Łęknem.
- +297. *Crataegus intricata* Lange (*C. coccinea* L. pro p.). — Ergfgf.
Gat. pn. ameryk.
Przychacia w Żydowcach.
298. *Crataegus monogyna* Jacq. — Ap. leśny.
Gruzy, skarpy kol. i przydroża, cmentarze, przychacia w rozproszonych stan. od siewek do krzewów.
299. *Amelanchier spicata* Decaisne. — Ergfgf.
Gat. ameryk.
Tereny leśne na Głębokim.
- +300. *Amelanchier ovalis* Med. — Ergfgf.
Gat. śr. europ.
Tereny leśne na Głębokim.
301. *Pyrus communis* L. — Ergfgf.
Gat. pd.-śr.-europ.
Siewki i duże egz. na gruzach, terenach kol., przychaciach i śmiet.
302. *Malus silvestris* (L.) Mill. — Ap. leśny.
Podobnie jak poprzedni tylko rzadziej.
303. *Sorbus aucuparia* L. — Ap. leśny.
Siewki i duże egz. na terenach kol., przydrożach i gruzach w rozproszonych stan.
- +304. *Sorbus intermedia* Pers. — Ap. leśny.
Siewki i podrost na Cm. Centr., na gruzach i terenach kol., np. na Niebuszewie, przy ul. Tama Pom.
305. *Prunus spinosa* L. — Ap. leśny.
Skarpy kol. m. Turzynem i Dworcem Gł., skarpy drogowe przy ul. Nasypowej, przydroża w Skolwinie.
306. *Padus avium* Mill. — Ap. leśny.
Tereny kol. m. Pom. i Gum., m. Niebuszewem i Łęknem, zwirownia pod Kłęskowem.
307. *Padus serotina* (Ehrh) Borkh. — Erg.

Gat. pn. ameryk.

Tory kol. m. Niebuszewem i Łęknem.

308. *Cerasus mahaleb* (L.) Miller. — Erg.

Gat. pd.-wsch.-europ. i zach. azjat.

Gruzy przy ul. Tama Pom., na Niebuszewie i w Podjuchach.

Papilionaceae

309. *Genista tinctoria* L. — Ap. leśny.

Tereny kol. m. Stołczynem i Skolwinem, w zaroślach na przydrożach w Stołczynie i Glinkach.

310. *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. — Ap. leśny.

Skarpy kol. w Skolwinie, Niebuszewie, Załomie, Dąbiu i Zdrojach oraz częsty na nieużytkach.

311. *Laburnum anagyroides* Med. — Epek.

Gat. pd.-zach.-europ.

Gruzy przy Milczańskiej.

312. *Lupinus polyphyllus* Lindl. — Erg.

Gat. śródz. (E i g), boreoameryk.

Najczęściej na nasypach kol., np. w Dziewokliczu, Podjuchach, Dąbiu, Golęcinie i na Międzyodrze.

313. *Lupinus luteus* L. — Erg.

Gat. zach. submedit.-śródz. (E i g).

Pola, miedze i nieużytki w Gocławiu, Krzekowie, Kluczu, Dąbiu.

314. *Lupinus angustifolius* L. — Erg.

Gat. śródz.

Śmiet, pod Klęskowem (kilka egz.).

315. *Ononis arvensis* L. — Ap. zesp. łąkowych.

Nasypy kol. Zdroje, Dąbie, Basen Górniczy.

316. *Ononis repens* L. — Ap. zesp. łąkowych.

Tereny kol. na Międzyodrze, w Zdrojach, Żydowcach.

317. *Ononis spinosa* L. — Ap. zesp. łąkowych.

Nieużytki i skarpy w Gocławiu, Stołczynie.

318. *Medicago falcata* L. — Ap. muraw. kseroterm.

Na terenach kol. i przydrożach w rozproszonych stan.

319. *Medicago sativa* L. — Erg.

Gat. wsch. śródz.-ir. tur.

Na podobnych stan. jak poprzedni, często razem z nim.

320. *Medicago varia* Martyn. — Erg.

Gat. wsch. śródz.-ir. tur.

Nieużytki w Drzetowie, przydroża w Golęcinie i Podjuchach.

321. *Medicago lupulina* L. — muraw. kseroterm.

Pospolity na całym terenie.

- (322). *Medicago arabica* (L.) All. — Efem.

Gat. śródz.

H o l z f u s s (1937) podaje z Żelechowa (Züllchow) za Steinwedlem (1915).

323. *Medicago minima* (L.) Grufb. — Ap. muraw. kseroterm.

Tereny kol. na Międzyodrze (licznie) i żwirownia Żydowce. M ü l l e r (1911) podaje ze Zdrójów. Z Gdańska podaje S c h w a r z (1967), z Łodzi S o w a (1964) i Poznania K r a w i e c o w a (1951).

324. *Melilotus altissimus* Thuill. — Ap. łągów.

Tereny port., wzgórze w Stołczynie.

325. *Melilotus albus* Med.

Gat. tur.-wsch. śródz. (M e u s e l).

Pospolity na gruzach, terenach kol., przydrożach.

326. *Melilotus officinalis* (L.) Lam. et Thuill. — Epek.

Gat. tur.-wsch. śródz.

Jak poprzedni.

327. *Melilotus volgicus* Poir. — Epek.

Gat. pd.rosyjski (H o l z f u s s 1937).

Tory kol. m. Niebuszewem i Grabowem, gruzy przy ul. Kolumba i przy Łasztowni.

328. *Melilotus indicus* (L.) All. — Epek.

Gat. śródz. i pn.afryk.

Śmiet. przy ul. Inż. Wendy. H o l z f u s s (1937) podaje ze śmiet. przy ul. Gdańskiej, Tamie Pom. oraz ze Zdrójów i Żelechowa.

329. *Trifolium arvense* L. — Ap. muraw kseroterm. i łąkowy. Pospolity.

- +330. *Trifolium dubium* Sibth. (*T. minus* Sm.). — Ap. łąkowy.

Tory kol. i przydroża w Stołczynie, Drzetowie, Niebuszewie, Zdrojach, Podjuchach i Kluczu (C e l i ŋ s k i).

331. *Trifolium campestre* Schreb. — Ap. łąkowy.

Dość częsta na terenach kol. i przydrożach.

332. *Trifolium strepens* Cr. (*T. aureum* Poll.) — Ap. łąk. i zaroślowy.

Gruzy na Niebuszewie (kilka egz.), skarpa kol. w Podjuchach.

333. *Trifolium fragiferum* L. — Ap. łąk. i nadwod. (solniska).

Nasyp kol. przy stacji Gocław Towarowy i w Zdrojach, nasyp drogowy i teren przy moście Cłowym.

334. *Trifolium hybridum* L. — Ap. łąkowy.

Gruzy przy ul. Gdańskiej.

335. *Trifolium repens* L. — Ap. łąkowy.

Dość pospolita na przydrożach, gruzach, terenach kol. i port. na nieużytkach.

336. *Trifolium montanum* L. — Ap. suchych muraw, łąk i zarośli.

Bocznica na dworcu kol. Łekno (kilkanaście egz.), skarpy kol. m. Pom. i Gum. C e l i ŋ s k i podaje z Klęskowa.

337. *Trifolium alpestre* L. — Ap. zarośli i lasów.
Przydroża w Gołęczynie, Ossowie, Drzetowie, Dąbiu, Klęskowie.
338. *Trifolium incarnatum* L. — Erg.
Gat. wsch.śródz.
Tory kol. na dworcu Niebuszewo, po kilka egz. w 1962—1965 r.,
tereny portowe.
339. *Trifolium pratense* L. — Ap. łąkowy.
Stan.: Często na gruzach, terenach kol. i przydrożach.
340. *Trifolium striatum* L. — Epek.
Gat. submedit.
Nieużytki i murawy przy ul. Leśnej w Gocławiu (licznie).
341. *Trifolium medium* L. — Ap. suchych łąk.
Często na torach kol. i przydrożach.
- (342). *Trifolium ochroleucum* Huds.-Ap. lasów i łąk. (Schmidt).
343. *Anthyllis vulneraria* L. — Ap. muraw kseroterm.
Często na skarpach kol. i przydrożach, np. m. Turzynem i Dworcem Gł., m. Pom. i Gum., w Gocławiu, Zdrojach.
344. *Lotus uliginosus* Schk. — Ap. łąkowy.
Gruzy przy ul. Gdańskiej.
345. *Lotus corniculatus* L. — Ap. łąkowy.
Często na gruzach, terenach kol., przydrożach, trawnikach.
- (346). *Galega officinalis* L. — Ap. łąkowy.
Müller, Holzfuß (1937) śmiet. przy Gdańskiej.
347. *Robinia pseudacacia* L. — Ergfgf.
Gat. pn.ameryk.
Często na nasypach kol. i gruzach z samosiewu.
348. *Colutea arborescens* L. — Ergfgf.
Gat. śródz.
Nasyp kol. m. Niebuszewem i Łękem, Turzynem i Dworcem Gł.,
gruzy przy Mielczańskiej z samosiewu.
349. *Astragalus glycyphyllos* L. — Ap. leśny.
Dość często na terenach kol. i gruzach.
350. *Astragalus arenarius* L. — Ap. suchych lasów.
Piaszczyste nieużytki m. Żydowcami i Kluczem, zwirownia w Żydowcach.
Müller (1911) podaje ze Zdrojów, Podjuch, Klęskowa i Ossowa (Wussow).
351. *Onobrychis viciaefolia* Scop. — Erg.
Gat. śródz.-pontyjski.
Tereny kol. m. Pom. i Gum., skarpa na dworcu kol. Niebuszewo.
352. *Coronilla varia* L. — Ap. muraw kseroterm.
Dość licznie na terenach kol. na Międzyodrze (płaty), rzadziej na pozostałym terenie oraz na gruzach i przydrożach.
353. *Ornithopus sativus* L. — Erg. i Epek.

Gat. zach.śródz.

Przydroża i przychacia w Kłeszkowie, Kijewie, Mścięcinie, gruzy przy Duńskiej i Gdańskiej, śmiet. przy Tama Pom. oraz spotykana jako chwast w uprawach.

354. *Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray. — Arch. (Erg.).

Gat. śródz.-submedit. (Meusel).

Pospolita w uprawach oraz rzadziej na przydrożach, terenach kol. Celiński, Müller.

355. *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. — Arch.

Gat. submedit.-ir. tur. (Eig).

Spotykana na terenach kol. i przydrożach, częsta na polach.

356. *Vicia cassubica* L. — Ap. suchych lasów.

Gruzy przy Gdańskiej, tereny kol. m. Pom. i Gum., m. Turzy-nem i Niebuszewem, Gołecinem i Skolwinem, w Dziewokliczu, Kijewie, Kluczu, Podjuchach.

357. *Vicia cracca* L. — Ap. leśny.

Spotykana na przydrożach, gruzach, terenach kol. i w uprawach.

358. *Vicia villosa* Roth. — Erg. (Epek.).

Gat. submedit.-ir. tur.-stepowy (Eig).

Dość licznie w zbożach, poza tym na przychaciach w Skolwinie Górnym, Podjuchach, Niebuszewie, na gruzach w Dąbiu.

359. *Vicia pannonica* Cr. — Epek.

Gat. submedit. (Gajewski).

Skarpa kol. na dworcu kol. Niebuszewo.

Holz f u s s (1937) podaje ze śmiet. przy ul. Gdańskiej.

360. *Vicia sepium* L. — Ap. zaroślowy i łąkowy.

Gruzy przy Gdańskiej i Niebuszewie oraz tereny kol. i przydroża.

361. *Vicia sativa* L. — Erg.

Gat. submedit.-ir. tur. (Eig).

Tereny kol. m. Pom. i Gum., przydroża i przychacia w Skolwinie, Glinkach, Wielgowie, Podjuchach.

362. *Vicia angustifolia* L. — Arch.

Gat. śródz.-ir. tur.

Dość pospolita na terenach uprawnych, rzadziej na gruzach i przydrożach.

363. *Vicia grandiflora* Scop. — Epek.

Gat. ilirijsko-pontyjski.

Skarpy przy ul. Bogumińskiej.

- (364). *Vicia lutea* L. — Efem.

Gat. submedit. (Eig).

Siadło Dolne (H o l z f u s s 1937).

- (365). *Vicia narbonensis* L. — Efem.

Gat. śródz.-submedit. (Meusel).

Siadło Dolne (H o l z f u s s 1937).

366. *Vicia faba* L. — Erg.
 Gat. azjat.
 Śmiet. Tama Pom. i przy ul. Duńskiej, przychacia i działki w Skolwinie.
367. *Lens esculenta* Moench. — Erg.
 Gat. zach.azjat.
 Śmiet. przy ul. Gdańskiej (Holzfuss 1937).
368. *Lathyrus nissolia* L. — Arch.
 Gat. śródz.
 Holzfuss (1937) podał ze śmiet. przy Gdańskiej.
- (369). *Lathyrus hirsutus* L. — Epek.
 Gat. śródz.
 Holzfuss (1937) podał z Siadła Dolnego, gdzie występował razem z *Vicia lutea* i *V. narbonensis*.
370. *Lathyrus sylvester* L. — Ap. zaroślowy i łąk.
 Tereny kol. przy ul. Pieszaj, tory kol. m. Niebuszewem i Stołczy-
 nem, gruzy przy Gdańskiej, na Żelechowie i Niebuszewie.
371. *Lathyrus tuberosus* L. — Epek. — Arch.
 Gat. tur.-śródz.
 Skarpy kol., przydroża, na nieużytk. i gruzach.
372. *Lathyrus pratensis* L. — Ap. łąkowy i zarośli.
 Gruzy przy ul. Władysława IV, tereny kol. przy ul. Pieszaj
 i Wzgórza Hetmańskie oraz w Dąbiu, Podjuchach i Zdrojach.
- (373). *Lathyrus aphaca* L. — Efem.
 Gat. przyśródziemn.-ir. tur.
 Śmiet. przy Gdańskiej (Holzfuss 1937).
374. *Pisum sativum* L. — Erg.
 Gat. azjat.
 Śmiet. przy ul. Tama Pom., tereny port., miedze w Gocławiu,
 przydroża na Gumieńcach.
- +375. *Soja hispida* Moench. Erg.
 Gat. azjat.
 Często na terenach port.
376. *Amorpha fruticosa* L. — Ergfgf.
 Gat. pn.ameryk.
 Tereny kol. m. Gum. i Pom. (prawdopodobnie nasadzony i roz-
 przestrzeniający się).

Elaeagnaceae

377. *Elaeagnus argentea* Pursch. — Ergfgf.
 Gat. pn.ameryk.
 Tereny kol. m. Pom. i Gum., na Międzyodrze, nieużytki i przy-
 droża w Zdrojach, Podjuchach, Żydowcach i Kluczu.

378. *Hippophaë rhamnoides* L. — Ap. stromych brzegów nadmorskich
Licznie na terenach kol. Międzyodrza, skarpy Szosy Poznańskiej.
(Celiński, Müller).

Lythraceae

379. *Lythrum salicaria* L. — Ap. łąkowy.
Tereny port., gruzy przy Tama Pom., nad rowami.

Oenotheraceae

380. *Epilobium hirsutum* L. — Ap. nadwodny.
Rowy przy drogach i torach kol., np. przy Szosie Pozn., przy torach kol. m. Drzetowem i Gocławiem.
381. *Epilobium roseum* Schreb. — Ap. nadwodny.
Tory kol. m. Turzynem i Dworcem Głów., gruzy przy ul. Tama Pom.
382. *Epilobium palustre* L. — Ap. nadwodny.
Tereny kol. m. Pom. i Gum.
- +383. *Epilobium lamyi* F. Schultz. — Ap. leśny.
Tory kol. m. Turzynem i Dworcem Głów., gruzy przy ul. Tama Pom.
384. *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. — Ap. zespołów leśnych.
Dość często na gruzach, terenach kol., przydrożach, rowach, cmentarzach i polach.
385. *Oenothera biennis* L. — Ap. (Rostański 1968).
Gat. pn.ameryk.
Częsty na terenach kol., przydrożach, gruzach, nieużytkach, polach i cmentarzach.
- +386. *Oenothera rubricaulis* Klebahn. — Ap.
Rostański 1968.
Tereny port. i kol. na Międzyodrze, licznie (Celiński).
- +387. *Oenothera depressa* Greena (*Oe. hungarica* Borb.). — Epek.
Gat. pn.ameryk.
Tereny kol. na Międzyodrze, często razem z poprzednim gat., tereny port., skarpy kol. w Dziewokliczu, nieużytki przy ul. Piesszej i Hryniewieckiego. (Celiński).
388. *Oenothera parviflora* L. (*Oe. muricata* L.). — Epek.
Gat. pn.ameryk.
Tereny kol. w Dąbiu, na Międzyodrze, gruzy przy Władysława IV.
- +389. *Oenothera syrticola* Bartlett. — Epek.
Gat. pn.ameryk.
Kilka egz. na terenie kol. m. Basenem Górniczym i Podjuchami.
Celiński podaje stan. m. Nowymi Brynkami i Gryfinem.
- +390. *Oenothera ammobila* Focke. — Epek.

Gat. niestalonego pochodzenia.

Piaszczyste skarpy przy torach kol. w Dąbiu. Do tej pory podawany z Niemiec (Renner 1936—1937). Rostański w 1965 r. natrafił na ten gatunek w Białymstoku (por. Ćwikliński 1967).

391. *Circaea lutetiana* L. — Ap. leśny.

Na gruzach, terenach kol., przydrożach i cmentarzach w nielicznych egz.

Malvaceae

392. *Malva alcea* L. — Ap.

Licznie na skarpie kol. m. Pom. i Gum.

(393). *Malva moschata* L. — Efem.

Gat. przyśródz.

Holz f u s s (1937) podał z Kłęskowa.

394. *Malva sylvestris* L. — Arch.

Gat. tur.-śródz. (M e u s e l).

Tereny port., przychacia, rzadziej gruzy.

395. *Malva neglecta* Wallr. — Arch. (Epek).

Gat. tur.-wsch. śródz. (M e u s e l).

Pospolita na przychaciach, poza tym na śmiet., gruzach i terenach port.

+396. *Malva pusilla* Sm. et Sow. — Arch.

Gat. tur.-wsch. śródz.

Jedno stan. na terenach portu (śmiet. przy elewatorze), gruzy na Niebuszewie.

+397. *Malva verticillata* L. — Epek.

Gat. azjat. (D o s t a l).

Jedno stan. przy elewatorze w porcie.

398. *Althaea rosea* (L.) Cav. — Ergfgf.

Gat. tur.-wsch. śródz.*

Gruzy przy ul. Tama Pom. (M ü l l e r).

(399). *Abutilon theophrastii* Medic. (*A. avicennae* Gaertn.) — Efem.

Gat. przyśródz.-ir. tur.

Holz f u s s (1937) podał ze śmiet. przy Gdańskiej, Tamy Pom., Żelechowa i Zdrojów.

Przywleczony z nasionami oleistymi.

(400). *Hibiscus trionum* L. — Efem.

Gat. stepowy (G a j e w s k i), śródz.-ir. tur.-tropik. (E i g).

Holz f u s s (1937) podał z Żelechowa, Zdrojów, ul. Gdańskiej.

(401). *Malvastrum peruvianum* (L.) Gray. — Efem.

Gat. pd.ameryk.

* Wg artykułu w „Przekroju” z 10.XI.68 pochodzi z Małej Azji.

Holzfuss (1941) podał ze śmiet. Tama Pom.

- (402). *Anoda cristata* (L.) Schlechtend. var. *digitata* Hochr. — Efem.
Gat. ameryk. (Holzfuss 1941).

Tiliaceae

403. *Tilia cordata* Mill. — Ap. leśny.
Siewki na cmentarzach, gruzach przy ul. Tama Pom., przydrożach.
404. *Tilia platyphyllos* Scop. — Ap. leśny.
Gruzy na Żelechowie (Müller).

Linaceae

405. *Linum catharticum* L. — Ap. muraw. kseroterm.
Tereny kol. m. Pom. i Gum. (licznie).
406. *Linum usitatissimum* L. — Erg.
Gat. prawdopodobnie śródz.
Tereny port. przy magazynach, tereny kol. w Dąbiu, na Międzyodrz, przydroża wzdłuż Gdańskiej, w Stołczynie, Niebuszewie.

Oxalidaceae

407. *Oxalis acetosella* L. — Ap. leśny.
Cmentarze, rzadko na skarpach kol. wśród zarośli, np. m. Turzy-nem i Dworcem Głów.
408. *Oxalis stricta* L. — Epek.
Gat. pn.ameryk.
Często na gruzach, terenach uprawowych, cmentarzach i przydrożach.
(409). *Oxalis corniculata* L. — Epek.
Gat. zach.śródz.
Holzfuss (1937) podaje ze Szczecina.
(410). *Oxalis deppei* Lodd. — Efem.
Gatunek nieznanego pochodzenia.
Holzfuss (1941) wymienia ze śmiet. Tama Pom.

Geraniaceae

411. *Geranium pratense* L. — Ap. łąkowy.
Gruzy na Niebuszewie, tereny przy lotnisku w Dąbiu.
(412). *Geranium phaeum* L. Efem.
Gat. śr.-pd.-europ.
Holzfuss (1937) podał z Żelechowa. (Müller).
413. *Geranium sanguineum* L. — Ap. muraw kseroterm.
Tory kol. m. Dąbiem i Załomem.

- (414). *Geranium pyrenaicum* L. — Efem.
 Gat. śródz.
 Holzfuss (1937) pisze, że gat. ten od 100 lat występuje w Żelechowie.
415. *Geranium pusillum* L. — Ap.
 Dość częsty na całym terenie.
416. *Geranium molle* L. — Epek.
 Gat. śródz.-ir. tur.
 Tereny kol. m. Pom. i Gum., przydroża i przychacia w Glinkach, Gocławiu, Pomorzanach, Dąbiu i Zdrojach.
417. *Geranium robertianum* L. — Ap. leśny.
 Gruzy przy ul. Tama Pom. (kilka egz.).
418. *Erodium cicutarium* (L.) L'Hérit. — Arch.
 Gat. śródz.-submedit. (Meusel).
 Pospolicie na trawnikach, cmentarzach, polach, przydrożach i nasypach kol.

Tropaeolaceae

419. *Tropaeolum majus* L. — Ergfgf.
 Gat. pd.amer.
 Na śmiet., działkach i rzadko na gruzach.

Aceraceae

420. *Acer pseudoplatanus* L. — Ap. leśny.
 Siewki i podrost na torach kol. m. Niebuszewem i Grabowem, na Gołęcinie, w Zdrojach, Kłęskowie, gruzy przy ul. Gdańskiej, na Drzetowie i na cmentarzach.
421. *Acer platanoides* L. — Ap. leśny.
 Siewki i podrost podobnie jak poprzedni.
422. *Acer campestre* L. — Ap. leśny.
 Nieduże okazy na gruzach przy ul. Kolumba i przydroża w Kłęskowie.
423. *Acer negundo* L. — Epek.
 Gat. pn.amer.
 Siewki i podrost spotykane na gruzach, terenach kol., przydrożach, cmentarzach, np. tory kol. m. Turzynem i Wzgórzami Hetmańskimi, Niebuszewem i Stołczynem, gruzy na Niebuszewie, Żelechowie i Dąbiu.
- +424. *Acer ginnala* Maxim. — Ergfgf.
 Gat. wsch.azjat. (pn. Chiny, Mandżuria, Korea).
 Skarpy autostrady w okolicy Klucza (kilka egz. do 1,5 m wys.), gruzy przy Gdańskiej.

Hippocastanaceae

425. *Aesculus hippocastanum* L. — Ergfgf.
Gat. śródz.-bałkano-pontyjski (M e u s e l).
Liczne siewki i podrost na cmentarzach, przydrożach, śmiet.

Anacardiaceae

- +426. *Rhus typhina* L. — Ergfgf.
Gat. pn.ameryk.
Skarpy i domowy ogródek przy ul. Wartysława. (K o w n a s i S i e n i c k a, 1962).

Balsaminaceae

427. *Impatiens parviflora* D. C. — Epek.
Gat. śr.azjat.
Na ulicach pod drzewami, na gruzach i cmentarzach.
- +428. *Impatiens roylei* Walp. — Ergfgf.
Gat. azjat.
Tereny portowe (dość licznie), gruzy przy ul. Dębogórskiej, zdziczały na przychaciach, często wysiewany w ogródkach i na działkach. Rozpowszechnia się w Europie (por. J a s n o w s k i 1961).

Rhamnaceae

429. *Frangula alnus* Mill. — Ap. leśny.
Gruzy na Niebuszewie, spotykany wzdłuż torów kol.

Vitaceae

430. *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. — Ergfgf.
Gat. pn.ameryk.
Nasyp przy Gdańskiej, m. Trzynem i Dworcem Głów., gruzy na Niebuszewie, przy ul. Mielczańskiej, Dębogórskiej.

Cornaceae

431. *Cornus sanguinea* L. — Ergfgf.
Gat. śr.europ.
Tory kol. m. Turzynem i Dworcem Głów.
432. *Cornus stolonifera* Mchx. (*C. alba* auct. non L.) — Ergfgf.
Gat. pn.ameryk.
Na gruzach, terenach kol.

Araliaceae

433. *Hedera helix* L. — Ap. leśny.

Licznie na cmentarzach, rzadziej na nasypach kol., np. m. Turzy-
nem i Dworcem Głównym.

Umbelliferae

434. *Eryngium planum* L. — Ap. muraw kseroterm.
Skarpy przy ul. Wartysława.
435. *Falcaria vulgaris* Bernh. — Ap. muraw kseroterm.
Tereny port., przydroża, nasypy kol., gruzy i pola. Nieraz tworzy
płaty, np. tory kol. m. Podjuchami i Żydowcami, na Niebuszewie,
Gołecinie, Gocławiu.
436. *Aegopodium podagraria* L. — Ap. leśny.
Pospolity chwast na działkach, rzadziej w uprawach polowych,
częsty na przychaciach i cmentarzach, spotykany na gruzach.
437. *Pimpinella saxifraga* L. — Ap. muraw kseroterm.
Skarpy Szosy Pozn., tory kol. w Dziewokliczu, m. Niebuszewem
i Łękem, Dąbiem i Załomem, przydroża na Gumieńcach.
438. *Pimpinella major* (L.) Huds. — Ap. łąkowy.
Tory kol. w Kluczu i Niebuszewie. (Müller).
439. *Petroselinum sativa* Hoffm. — Erg.
Gat. pd. europ. i pn. afryk.
Śmiet., przychacia, działki, np. na Żelechowie, Pomorzanach.
440. *Selinum carvifolia*, L. — Ap. zarośli i łąk.
Rzadko, tylko nad rowami na Gumieńcach.
441. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. Ap. nadwod.
Wilgotne miejsca na gruzach, w rowach przy torach kol.
442. *Aethusa cynapium* L. — Ap. zesp. leśny (Arch).
Tereny portowe, nieużytki w Dąbiu i Żydowcach.
443. *Foeniculum capillaceum* Gilib. Erg.
Gat. śródz.-ir. tur. (Fig).
Śmiet. przy ul. Tama Pom.
444. *Heracleum sibiricum* L. Dw.-Byl. Ap. łąkowy.
W rowach przy torach kol. m. Zdrojami i Podjuchami, w Gocła-
wiu, gruzy na Niebuszewie, przy Gdańskiej, poza tym spotykany
na terenie portu, w Dąbiu i Żydowcach nad rowami (Celiński).
- +445. *Heracleum sphondylium* L. — Ap. zarośli.
Kilka egz. na terenach portu.
446. *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench. — Ap. muraw.
Tylko na terenach kol. m. Dąbiem i Załomem, w Skolwinie.
447. *Pastinaca sativa* L. — Ap. łąk.
Dość pospolity na terenach kol. i port., przydrożach i gruzach.
448. *Anethum graveolens* L. — Erg.
Gat. pd.-wschodni.
Śmiet. i działki prac. Celiński, Müller.

449. *Angelica silvestris* L. — Ap. leśny.
Nad rowami kol. m. Zdrojami i Kluczem.
450. *Archangelica litoralis* Fr. — Ap. słonorośli.
Liczne mniejsze okazy na terenie portu i pod murami przy ul. Gdańskiej.
451. *Daucus carota* L. — Ap. łąkowy.
Licznie na gruzach i terenach kol., mniej licznie na przydrożach, polach, śmiet. i przychaciach.
- (452). *Scandix pecten-veneris* L. — Epek. (Arch.).
Gat. śródz.-ir. tur.
Müller (1911) podał z Gocławia i Zdrojów.
453. *Anthriscus silvestris* (L.) Hoff. — Ap. leśny.
Licznie na przydrożach, przychaciach, rzadziej na gruzach.
454. *Conium maculatum* L. — Arch.
Gat. śródz.
Gruzy przy ul. Tama Pom. (licznie), w Dąbiu, Żydowcach i Gołębzinie.
- (455). *Coriandrum sativum* L. — Erg.
Gat. wsch. śródz., ir. tur. (E i g).
Holzfuss (1937) podał ze śmiet. w Szczecinie.
456. *Chaerophyllum temulum* L. — Ap. leśny i zar.
Skarpy kol. w Gocławiu, przydroża w Klęskowie, Podjuchach.
457. *Torilis japonica* (Houtt.) D. C. J. — Dw. Ap. widnych lasów.
Często na przychaciach, gruzach, przydrożach i śmiet.
- (458). *Torilis arvensis* (Moench) Thell. J. — Dw. Efem.
Gat. śródz.-śr. europ.
Podał Utpadel w 1873 i 1879 r. (Holzfuss 1937).

Plumbaginaceae

459. *Armeria elongata* (Hoffm.) Koch. — Ap. piaszczysk.
Pospolity na skarpach kol., starych trawnikach, cmentarzach, przydrożach i nieużytkach.

Primulaceae

460. *Primula officinalis* (L.) Hill. — Ap. łąk.
Skarpy Szosy Pozn., przydroża na Gumieńcach, Gocławiu, Gołębzinie.
461. *Primula elatior* (L.) Grufb. Ap. leśny.
Cm. Centr., tereny kol. m. Pom. i Gum.
462. *Anagallis arvensis* L. — Arch.
Gat. śródz.-submedit. (Meusel).
Często na polach, rzadziej na przydrożach, skarpach kol. i gruzach.

463. *Lysimachia nummularia* L. — Ap. zesp. łągowych.
Wilgotne miejsca na gruzach Niebuszewa, przy ul. Gdańskiej, na terenach kol. i cmentarzach.
464. *Lysimachia vulgaris* L. — Ap. zesp. łągowych i nadwodnych.
Przychacia na Glinkach, rowy na Gumieńcach, tory kol. m. Pom. i Gum.

· *Convolvulaceae*

465. *Convolvulus arvensis* L. — Arch.
Gat. śródz.-ir. tur.
Pospolity w uprawach, rzadszy na przydrożach, gruzach, terenach kol.
466. *Calystegia sepium* (L.) R. Br. Pnącz. Ap. zaroślowy i mokrych łąk.
Tereny kol. na Międzyodrze, przychacia w Stołeczynie, Gołęcinie, Warszawie, Dąbiu, Klęskowie i Żydowcach.

Cuscutaceae

467. *Cuscuta europaea* L. — Ap. zesp. leśnych i łągowych.
Na pokrzywach przy ul. Gdańskiej i przy dworcu kol. w Podjuchach.
468. *Cuscuta epithymum* (L.) Murr. — Ap. łąkowy.
Na koniczynie w Zdrojach.

Polemoniaceae

- (469). *Polemonium coeruleum* L. — Ap. łąkowy.
(Holzfuss 1937).

Hydrophyllaceae

470. *Phacelia tanacetifolia* Benth. — Erg.
Gat. pn.ameryk.
Na śmietniskach i jako chwast w uprawach i ogródkach.
- (471). *Nemophila maculata* Benth. — Efem.
Gat. pd.ameryk.
(Holzfuss 1937).

Boraginaceae

472. *Borago officinalis* L. — Epek.-Erg.
Gat. zach. śródz.
Kilka egz. w 1963—1965 r. po zsypiskach gruzu przy ul. Kolumba.
473. *Anchusa officinalis* L. Dw. Byl. — Epek. (Arch).

- Gat. wsch. śródz. (Meusel).
- Licznie na gruzach, ter. kol., przydrożach, rzadziej na polach.
474. *Lycopsis arvensis* L. — Epek. (Arch).
- Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
- Częsty w uprawach, rzadki na działkach, gruzach i śmiet.
475. *Symphytum officinale* L. — Ap. wilgotnych łąk.
- Tereny port. i na wilgotnych gruzach przy ul. Szczawiowej, Tama Pom., Gdańskiej i w rowach całego terenu.
- (476). *Symphytum asperrinum* Don. — Efem.
- Gat. zach. azjat.-ir. tur.
- (Holzfuss 1941).
477. *Echium vulgare* L. — Arch.
- Gat. stepowy, submediterr. pontyjski (Meus).
- Pospolity.
478. *Lithospermum arvense* L. — Arch.
- Gat. stepowy, śródz.-ir. tur. (Eig).
- Na polach w Glinkach, Skolwinie, na Cm. Centr.
479. *Myosotis palustris* (L.) Nathorst. — Ap. łąk.
- Rowy na Gumieńcach i Międzyodrze, w Klęskowie, Dąbiu i Zdrojach.
480. *Myosotis versicolor* (Pers) Sm. — Ap. piaszczystych muraw i lasów.
- Polą w Kijewie i Kluczu.
481. *Myosotis micrantha* Pall. — Ap. piaszczysk.
- Spotykana na piaszczystych polach w Klęskowie, Kijewie i Wielgowie.
482. *Myosotis collina* Hoffm. — Ap. muraw kseroterm.
- Dość pospolita na suchych przydrożach, pagórkach, na ugorach.
483. *Myosotis arvensis* (L.) Hill. — Ap.
- Pospolita na polach, rzadsza na przydrożach, trawnikach i cmentarzach.
484. *Cynoglossum officinale* L. — Epek.
- Gat. submedit.-kontynentalny (Meusel).
- Na gruzach, przydrożach w uprawach i na śmiet.
485. *Lappula myosotis* Mnch. — Epek.
- Gat. stepowy, wsch. tur., wsch. śródz. (Meusel).
- Cm. Centr. (Kilka egz.).
486. *Asperugo procumbens* L. — Epek.
- Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
- Cm. Centr.
- (487). *Cerintho major* L. — Efem.
- Gat. pontyjski.
- Holzfuss (1937) wymienia z ogrodu na Żelechowie.

Heliotropiaceae

- (488). *Heliotropium europaeum* L. — Efem.
Gat. przyśródz.-ir. tur.
Holzfuss (1937) podał ze śmiet. przy Gdańskiej.

Solanaceae

489. *Lycium halimifolium* Mill. — Ergl.
Gat. śródz.
Rozproszony na gruzach, przydrożach, przychaciach i nasypach kol. Największe skupiska na skarpach w dzielnicy Pomorzany.
490. *Hyoscyamus niger* L. — Arch. Epek. (Hryniewiecki).
Gat. śródz.
Gruzy i przychacia przy Gdańskiej, przy młynie w Dąbiu, śmiet przy Duńskiej i Tamie Pom.
491. *Solanum dulcamara* L. — Ap. wilgot. lasów.
Na gruzach, śmiet. i nad rowami.
492. *Solanum nigrum* L. — Arch. (Hryniewiecki).
Gat. śr. i wsch.europ.
Częsty na gruzach, mało uczęszczanych ulicach i na murach, rzadszy na terenach uprawowych, przychaciach, przydrożach i cmentarzach (Celiński, Müller).
493. *Solanum humile* Bernh. — Efem.
Gat. śr. i wsch.europ.
Przy ruinach kościoła na Pomorzanach. (Holzfuss 1941).
494. *Solanum luteum* Mill. (*S. villosum* Lam.).
Gat. wsch. śródz.
Na zsyisku ziemi przy al. Piastów w pobliżu ul. Kosynierów (1965).
495. *Solanum tuberosum* L. — Erg. (Efem.).
Gat. pd. ameryk.
Na śmiet, i gruzach, na polach jako chwast. (Müller).
496. *Solanum lycopersicum* L. — Erg.
Gat. pochodzi z Ameryki tropik.
Często na śmiet., gruzach, rzadziej na przychaciach i terenach kol.
497. *Solanum sarachoides* Sendtner. (*S. justischmidtii* E. H. L. Krause)
— Epek.
Gat. ameryk.
Jeden egz. kwitnący w wykopanym dole na śmiecie w porcie w 1964 r. Holzfuss (1937) ze śmiet. przy ul. Tama Pom.
- +498. *Physalis alkekengi* L. — Ergfgf.
Gat. przyśródz., górski.

- Pod płotem przy ul. Orzeszkowej, śmiet. przy ul. Roztockiej i Duńskiej, gruzy przy ul. Gdańskiej, przychacia w Stołczynie.
499. *Datura stramonium* L. — Epek.
Gat. meksykański.
Na śmiet. przy ul. Duńskiej, Tama Pom., pod Klęskowem, w Gołęcinie, Dąbie przy Dworcu kol., nielicznie.
500. *Petunia violacea* Lindl. — Ergfgf.
Gat. pd.ameryk.
Na terenach port. (licznie na jednym stan.).
- (501). *Nicandra physaloides* (L.) Gaertner — Efem.
Gat. neotropik.
Holzfuss (1937) wymienia ze śmiet. przy Gdańskiej, gdzie licznie występował w 1935 i 1936 r.
- (502). *Nicotiana tabacum* L. — Efem.
Gat. pd.ameryk. (Schmidt 1840).
- (503). *Nicotiana rustica* L. — Efem.
Gat. pochodzi z Meksyku (Schmidt 1840).

Scrophulariaceae

504. *Verbascum thapsus* L. — Ap. muraw kseroterm.
Rzadko na gruzach i terenach kol., np. gruzy na Niebuszewie, Drzetowie, przy ul. Gdańskiej, tereny kol. w Dąbiu.
505. *Verbascum thapsiforme* Schrad. — Ap. muraw kseroterm.
Dość licznie na gruzach, skarpach kol. i drogowych, śmiet.
506. *Verbascum phlomoides* L. — Ap.
Kilka egz. na nasypie kol. m. Gumieńcami i Przylepem. Celiński podaje jedno stan. z Dąbia.
507. *Verbascum lychnitis* L. — Ap.
Dwa egz. w pobliżu poprzedniego gatunku.
- +508. *Verbascum austriacum* Schott. — Efem.
Gat. pd.europ.
Kilkanaście egz. na terenie portu.
509. *Verbascum nigrum* L. — Ap.
Częsty na terenach kol., przydrożach i gruzach, na Międzyodrze, przy ul. Gdańskiej, na Niebuszewie, w Dąbiu, Zdrojach.
- (510). *Verbascum blattaria* L. — Efem.
Gat. śródz.-holarktyczny.
Holzfuss (1937) wymienia 1 egz.
- (511). *Verbascum virgatum* With. Byl. — Efem.
Gat. zach. śródz.
Holzfuss (1941) podał ze śmiet. przy ul. Tama Pom.
- +512. *Linaria cymbalaria* (L.) Mill. (*Cymbalaria muralis* G. M. Sch. — Ergfgf.
Gat. górski, pd.-wsch.-europ.

Murek kamienny na pl. Grunwaldzkim, gruzy przy ul. Tama Pom.
(Celiński, Żukowski 1961).

- (513). *Linaria elatine* (L.) Mill. — Arch. — Epek.

Gat. śródz.-ir. tur.

(Holzfuss 1937).

- (514). *Linaria repens* (L.) Mill. (*L. stricta* Lam et D. C.) — Epek. Efem.

Gat. śródz.-atlant.

Zbierana przez Robiena nad j. Dąbie w okolicy Dąbią (Holzfuss 1937).

- (515). *Linaria genistifolia* (L.) Mill. — Efem.

Gat. południowy, stepowy.

Holzfuss (1937) podał ze śmiet. przy ul. Gdańskiej.

516. *Linaria vulgaris* (L.) Mill. — Ap.

Pospolita.

517. *Linaria minor* L. — Epek. (Arch.).

Gat. śródz.

Na świeżych nasypach i wysypiskach gruzu na Międzyodrze, na terenach kol. w Dąbiu, Dziewokliczu, Stołczynie, na gruzach Niebuszewa, Grabowa (Celiński, Müller).

518. *Scrophularia nodosa* L. — Ap. leśny.

Tereny port. gruzy na Niebuszewie, przy Dębogórskiej, Gdańskiej, Tamie Pom., nad kanałami w Dąbiu, Gumieńcach.

519. *Veronica chamaedrys* L. — Ap. łąkowy.

Częsty na przydrożach, skarpach kol., cmentarzach.

520. *Veronica longifolia* L. — Ap. łąkowy.

Rów przy torach kol. m. Pom. i Gum. i przy ul. Gdańskiej.

521. *Veronica spicata* L. — Ap. muraw kseroterm.

Tereny przy zwirowni w Żydowcach.

522. *Veronica serpyllifolia* L. — Ap. łąkowy.

Pospolity na polach i przydrożach, rzadziej na terenach kol., gruzach i cmentarzach.

523. *Veronica arvensis* L. — Arch. (Buchli).

Gat. nie ustalonego pochodzenia.

Na polach, działkach i przydrożach, rzadko na gruzach.

524. *Veronica triphyllos* L. — Ap.

Pospolity na polach, rzadziej na gruzach i przydrożach.

525. *Veronica verna* L. — Ap. muraw kseroterm.

Gat. sarmacki (Meusel).

Tereny kol. m. Pom. i Gum., Niebuszewem i Gocławiem, pola w Wielgowie i Warszawie.

526. *Veronica persica* Poir. (*V. tournefortii* Gmel.) — Epek.

Gat. tur.-ir.-wsch. śródz.

Pospolity chwast w uprawach polowych i na działkach, spotykany na gruzach i przydrożach.

527. *Veronica polita* Fr. — Arch. Dw.
 Gat. śródz.
 Pola uprawne przy ul. Duńskiej.
528. *Veronica agrostis* L. — Ap. (Arch.).
 Pola uprawne na Warszawie.
529. *Veronica opaca* Fr. — Arch.
 Gat. śr. i pn. europ. (Nowiński).
 Pola w Kłęskowie. (Müller).
530. *Veronica hederifolia* L. — Arch. (Buchli).
 Gat. holarkt., śródz.-ir. tur.
 Pola Warszawa, Gumieniec, Gocławia, Kłęskowa i Klucza, skarpy Szosy Pozn., przydroża w Skolwinie i Krzekowie, gruzy przy ul. Gdańskiej.
- (531). *Digitalis grandiflora* Mill. (*D. ambigua* Murr.) — Ap. leśny.
 Paul (1929) podał z okolicy Kłęskowa i Żydowiec.
- (532). *Melampyrum cristatum* L. — Ap. leśny.
 Müller (1911) podał z okolicy Zdrojów i Dąbia.
533. *Melampyrum nemorosum* L. — Ap. leśny.
 Przydroża na wzgórzach w Skolwinie.
534. *Euphrasia rostkoviana* Hayne. — Ap. łąkowy.
 Tereny kol. m. Pom. i Gum., w Zdrojach i Dąbiu.
535. *Euphrasia stricta* Host. — Ap. muraw i łąk.
 Skarpy Szosy Poznańskiej, miedze w Gocławiu.
536. *Odontites rubra* Gilib. — Ap. łąkowy.
 Tereny kol. m. Pom. i Gum., w Zdrojach.
537. *Alectorolophus glaber* (Lam.) Beck. — Ap. łąkowy.
 W uprawach zbóż na Warszawie, Gołęczynie, Glinkach, Gumieńcach, Zdrojach, Kłęskowie.
538. *Alectorolophus montanus* (Saut.) Fritsch. — Ap. łąkowy.
 Rzadko na polach i przydrożach w Skolwinie.

Verbenaceae

539. *Verbena officinalis* L. — Arch. — Epek.
 Gat. śródz.
 Gruzy przy ul. Gdańskiej, przychacia na Gumieńcach, wzdłuż ul. Nehringa.

Labiatae

540. *Ajuga reptans* L. — Ap. leśny.
 Glinianki na Niebuszewie, tereny kol. na Międzyodrze, cmentarze.
541. *Ajuga genevensis* L. — Ap. łąkowy i zaroślowy.
 Skarpy kol. w Gocławiu.

542. *Scutellaria galericulata* L. — Ap. zaroślowy.
Tereny kol. m. Pom. i Gum.
543. *Marrubium vulgare* L. — Epek. (Arch. — Hryniewiecki i Meusel).
Gat. tur.-orient.-mediterr. (Meusel).
Przydroża, przychacia i gruzы w Dąbiu Osiedlu i przy ul. Kolumba. Müller.
- +544. *Sideritis montana* L. — Efem.
Gat. śródz. (sensu lato pannoński).
Skarpa kol. m. Zdrojami i Dąbiem.
545. *Nepeta cataria* L. — Epek.
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
Skarpa przy ul. Kolumba, w Zdrojach.
- (546). *Nepeta grandiflora* M. Bieberst. — Efem.
Górski, wsch. europ.
(Holzfuss 1937).
547. *Glechoma hederacea* L. — Ap. leśny.
Pospolity na polach, przydrożach, rzadko na gruzach, trawnikach.
548. *Prunella vulgaris* L. — Ap. łąkowy.
Pospolity chwast polny i ogrodowy, rzadziej na przydrożach, cmentarzach, gliniankach i terenach kol.
549. *Galeopsis tetrahit* L. — Ap. (Arch.).
Często występuje w okopowych, spotykany na gruzach i przychaciach.
550. *Galeopsis bifida* Boenn. — Ap. zesp. zaroślowych.
Dworzec kol. w Podjuchach, przychacia w Krzekowie, Zdrojach.
551. *Galeopsis speciosa* Mill. — Ap. leśny i zarośl.
Tereny uprawowe na Międzyodrze, przy Cukrowni Gumieńce, w Gocławiu.
552. *Galeopsis pubescens* Bess. — Ap. zbiorowisk zaroślowych i leśnych.
Często jako chwast w uprawach okopowych, rzadziej na gruzach.
553. *Lamium album* L. — Epek. (Arch. Hryniewiecki).
Gat. ir. tur.
Często na przychaciach, śmiet. i gruzach.
554. *Lamium purpureum* L. — Epek. (Arch. — Hryniewiecki, Buchli).
Gat. zach. azjat.
Pospolity.
555. *Lamium hybridum* Mill. — Epek.
Gat. nieznanego pochodzenia.
Działki prac. na Niebuszewie.
556. *Lamium amplexicaule* L. — Arch. (Epek.).
Gat. submedit. ir. tur. (Fig).
Pola i działki, rzadko śmiet.

557. *Stachys sylvatica* L. — Ap. leśny.
Przydroże m. Stołczynem i Skolwinem, m. Pom. i Gumieńcami.
558. *Stachys palustris* L. — Ap. zbior. łąkowych.
Na wilgotnych polach w Skolwinie, Krzekowie i Warszawie.
559. *Stachys recta* L. — Ap. muraw kserotermicz.
Skarpy kol. m. Pom. i Gum., skarpy Szosy Poznańskiej.
560. *Stachys annua* L. — Epek.
Gat. śródz.
Pola uprawne przy Bogumińskiej.
561. *Betonica officinalis* L. — Ap. łąkowy i zaroślowy.
Przydroża i skarpy przy szosie m. Skolwinem i Stołczynem.
562. *Leonurus cardiaca* L. — Epek. Erg. (Arch. — Hryniewiecki).
Gat. tur.-śródz.-submedit.
Przychacia i śmiet. w Wielgowie, Pomorzanach, Żydowcach i Krzekowie.
563. *Ballota nigra* L. — Epek. (Arch. Hryniewiecki).
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
Pospolita.
564. *Salvia pratensis* L. — Epek.
Gat. przyśródz.
Dość częsta na terenach kol. na Międzyodrze, w Dziewokliczu, m. Niebuszewem i Gocławiem, przydroża na Gumieńcach.
565. *Salvia nemorosa* L. — Efem.
Gat. ir. tur.
Tereny kol. w Podjuchach w 1958 r. (Holzfuss 1937).
566. *Salvia verticillata* L. — Epek. (Erg).
Gat. submedit.-pontyjski (Meusel).
Tory kol. m. Dziewokliczem i Szczecinem, port węglowy (kilka egz.).
567. *Salvia officinalis* L. — Ergfgf.
Gat. śródz. (Hegi).
Zdziczała na skarpach kol. m. Pom. i Gum., rozprzestrzenia się.
568. *Calamintha vulgaris* (L.) Druce. — Ap. zaroślowy.
Tereny kol. m. Pom. i Gum., trawiaste murawy przy Duńskiej, przy Milczańskiej.
569. *Calamintha acinos* (L.) Clairv. — Ap. muraw. kseroterm.
Na dworcach kol. skarpach kol. i drogowych.
570. *Hyssopus officinalis* L. — Ergfgf.
Gat. pontyjsko-śródz.
Nasyp kol. m. Turzynem i Dworcem Głów., dość licznie.
571. *Origanum vulgare* L. — Ap. muraw kseroterm.
Śmiet. przy Gdańskiej, murawy przy ul. Duńskiej, Gocławiu, Zdrojach.

572. *Thymus pulegioides* L. — Ap. muraw kseroterm.
Tereny kol. m. Pom. i Gum. Celiński.
573. *Thymus serpyllum* L. Ap. wyd. m.
Tory kol. w okolicy Załomu, Zdrójów i piaszczyste murawy
w Żydowcach.
574. *Lycopus europaeus* L. — Ap. nadwodny.
Tory kol. m. Pom. i Gum. (w rowach), w Gołęczynie i Stołczynie.
575. *Mentha rotundifolia* (L.) Huds. — Byl. Ergl.
Gat. subatlantycki.
Przychacia w Stołczynie, Skolwinie, Gumieńcach i Dąbiu. (Celiński).
- +576. *Mentha longifolia* (L.) Huds. Byl. Ap. nadwodny.
Rowy na Międzyodrze i m. Pom. i Gum.
- +577. *Mentha spicata* L. em. Huds. — Byl. Erg.
Gat. śródz.
Śmiet. pod Kłeszkowem, spotykana również jako chwast na działkach. Celiński.
578. *Mentha piperita* L. — Ap. nadwodny.
Przydroża w Glinkach, Zdrójach, Dąbiu i Wielgowie.
579. *Mentha aquatica* L. — Ap. nadwodny.
Tereny portowe.
580. *Mentha arvensis* L. Ap. wilgotnych łąk.
Pospolita w uprawach.
581. *Elsholtzia patrinii* (Lepechin) Garcke. — Ergfgf.
Gat. europ. i azjatycki.
Jedno stan. na terenie portu i na gruzach przy ul. Gdańskiej.

Plantaginaceae

582. *Plantago major* L. — J. Ap.
Pospolita
- +583. *Plantago pauciflora* Gilib. Byl. — J. Ap. zesp.
leśnych (Nowiński).
Tereny zalewane przez cukrownię, podmokłe pola w Kłeszkowie.
(Celiński).
584. *Plantago media* L. — Ap. łąkowy.
Dość częsta na suchych przydrożach i murawach.
585. *Plantago lanceolata* L. — Ap. łąkowy.
Pospolita.
586. *Plantago indica* L. — Ap. wyd. m. i piaszczysk.
Licznie na torach kol. przy ul. Władysława IV, na Międzyodrze,
nasypy drogowe przy Moście Cłowym i w Dziewokliczu.

Gentianaceae

587. *Centaureum umbellatum* Gilib. — Ap. łąkowy, (solniska).
Skarpy i rowy Szosy Pozn.

Apocynaceae

588. *Vinca minor* L. — Ap. leśny.
Cmentarze.

Oleaceae

589. *Fraxinus excelsior* L. — Ap. leśny.
Na nasypach kol. m. Drzetowem i Dworcem Głów., Zdrojami i Podjuchami, gruzy na Niebuszewie, Grabowie, Gołęcinie i rzadko na przydrożach.
- +590. *Fraxinus ornus* L. — Ergfgf.
Gat. europ.-zach. azjat.
Siewki pod okazami macierzystymi przy ul. 1 Maja.
591. *Syringa vulgaris* L. — Ergfgf.
Gat. pd.-wsch.-europ.
Na gruzach, przychaciach i cmentarzach.
592. *Ligustrum vulgare* L. — Ergfgf.
Gat. pd. europ. i zach. afrykański (Białobok).
Gruzy przy ul. Gdańskiej, na Niebuszewie, przychacia w Żydowcach, skarpy kol. m. Niebuszewem i Dworcem Głów.

Rubiaceae

593. *Sherardia arvensis* L. — Epek.
Submediterr.-ir. tur.
Potwierdziłem stan. Celińskiego na polu w Kluczu.
594. *Galium cruciata* (L.) Scop. — Efem.
Gat. przyśródz.
Kilka płatów na nieużytkach przy ul. Duńskiej.
595. *Galium verum* L. — Ap. łąkowy.
Dość często na gruzach, terenach kol. przydrożach.
596. *Galium sylvaticum* L. — Ap. leśny.
Skarpy trawiaste w Stołczynie. (Müller).
597. *Galium mollugo* L. — Ap. łąkowy.
Pospolity na nasypach kol., przydrożach, cmentarzach, rzadziej na gruzach.
598. *Galium aparine* L.
Gat. holarkt.-śródz.-ir. tur.
Pospolita.

Loganiaceae

599. *Buddleia davidii* Franch. — Ergfgf.

Gat. wsch. azjat.

Do 1960 r. licznie na gruzach m. Parkiem Żeromskiego i Al. Wyzwolenia i na Niebuszewie, obecnie po kilka egz., i na gruzach przy ul. Tama Pom.

Caprifoliaceae

- +600. *Sambucus ebulus* L. — Ergl.

Gat. śródz.

Liczenie na rumowisku przy Duńskiej.

601. *Sambucus nigra* L. — Ap. leśny.

Często na gruzach, skarpach kol., przychaciach i cmentarzach.

602. *Sambucus racemosa* L. — Neofit.

Gat. śr. europ., górski.

Tory kol. m. Turzynem i Dworcem Głównym, w okolicy dworca kol. Gumieńce, po kilka egz.

- +603. *Viburnum lantana* L. — Epek.

Gat. ir. tur.

Tory kol. m. Turzynem i Dworcem Gł. (Kownas i Sienicka).

604. *Lonicera tatarica* L. — Ergfgf.

Gat. ir. tur.

Na gruzach i terenach kol., licznie przy ul. Tama Pom.

605. *Symphoricarpus albus* (L.) Blaze. — Ergfgf.

Gat. pn. ameryk.

Na skarpach kol. przydrożach, przychaciach i gruzach.

Adoxaceae

606. *Adoxa moschatellina* L. — Ap. leśny.

Skarpy kol. w pobliżu terenów leśnych.

Valerianaceae

- (607). *Valerianella rimosa* Bastard. Arch. — Epek.

Gat. pd. i śr. europ. i pn. ameryk.

Müller (1911) podał z okolicy Kłeszkowa.

608. *Valerianella dentata* (L.) Poll. — Arch. — Epek.

Gat. śródziem.

Na polach, skarpach kol. i drogowych.

609. *Valerianella olitoria* Poll. — Arch.

Gat. wsch. europ.

Działki prac. i skarpy kol. m. Pom. i Gum.

610. *Valeriana officinalis* L. Byl. — Ap. łąkowy.

Spotykana w rowach całego terenu.

611. *Valeriana dioica* L. — Ap. łąkowy.

Na gruzach i przydrożach całego terenu.

612. *Valeriana sambucifolia* Mik. — Ap. podmokłych łąk.

Tereny kol. na Międzyodrze oraz przydroża nad Régalicą.

Dipsacaceae

613. *Dipsacus sylvester* Huds. — Arch. (Meusel).

Gat. śródz.-przyśródz. (Meusel).

Częsty na gruzach, rzadziej na przydrożach i skarpach kol.

614. *Succisa pratensis* Mnch. — Ap. łąkowy.

Trawiaste skarpy w Gocławiu.

615. *Scabiosa columbaria* L. — Ap. muraw kseroterm.

Na nasypach kol. na Międzyodrze, m. Pom. i Gum., Gocławiem i Dworcem Głów., na przydrożach Szosy Pozn., na Gumieńcach i Klęskowie.

- (616). *Scabiosa canescens* W. K. — Byl. Ap. leśny.

Müller (1911) podał ze Zdrojów.

617. *Knautia arvensis* (L.) Coult. — Ap. łąkowy.

Dość licznie na terenach kol., przydrożach, gruzach i cmentarzach.

Cucurbitaceae

618. *Cucurbita pepo* L. — Erg.

Gat. pn. ameryk., tropik.

Śmiet. przy ul. Tama Pom., przy Roztockiej, pod Klęskowem, gruzy na Niebuszewie.

619. *Bryonia alba* L. — Epek. (niekiedy Erg.).

Gat. śródz.

Gruzy na Niebuszewie, Żelechowie, przychacia w Skolwinie Górnym, żywopłoty w Kijewie, tereny portowe.

Campanulaceae

620. *Jasione montana* L. — Ap. widnych lasów.

Tereny kol. m. Dąbiem i Załomem, Pom. i Gum., skarpy i nieużytki w Klęskowie.

621. *Campanula glomerata* L. — Ap. muraw kserot.

Tereny kol. m. Pom. i Gum.

622. *Campanula rapunculoides* — Byl. Ap. zaroślowy.

Częsty na gruzach, skarpach kol. i przydrożach w zaroślach.

623. *Campanula patula* L. — Ap. łąkowy.

Skarpy Szosy Poz. w okolicy Dziewoklicza, w Kijewie i Klęskowie.

624. *Campanula rotundifolia* L. — Ap.
 Skarpy Szosy Pozn., przydroża w Skolwinie, Glinkach, Gumieńcach, Cm. Centr. tory kol. m. Niebuszewem i Gocławiem, w Kluczu, Podjuchach i Żydowcach.
625. *Phyteuma spicatum* L. — Ap. leśny.
 Trawiaste wzgórze i przydroża w Skolwinie.

Compositae

626. *Eupatorium cannabinum* L. — Ap. nadwodny.
 Gruzy przy Gdańskiej, Tamie Pom., Władysława IV, na Międzyodrze.
627. *Solidago virgo-aurea* L. — Ap. leśny.
 Gruzy przy ul. Tama Pom., tereny kol. m. Pom. i Gum. (nieczęsty).
628. *Solidago canadensis* L. — Epek. (Erg.).
 Gat. pn.ameryk.
 Dość licznie na gruzach, terenach kol., przychaciach i przydrożach.
- +629. *Solidago serotina* L. — Epek. (Erg.).
 Gát. pn.ameryk.
 Na tych samych stan., ale liczniejsza. Celiński.
630. *Bellis perennis* L. — Ap. zesp. łąkowych.
 Pospolita na cmentarzach, przydrożach, trawnikach i murawach.
- +631. *Aster lanceolatus* Willd. — Byl. Ap. aluwiiów nadrz.
 Przy torach kol. na Niebuszewie. Celiński.
- +632. *Aster novi-belgii* L. — Byl. Ergfgf.
 Gat. pn.ameryk.
 Przychacia w Skolwinie Górnym. Celiński.
- +633. *Aster tradescantii* L. Byl. Ap. aluwiiów rzecz.
 Przychacie w Mścięcinie i przy zwirowni w Żydowcach.
634. *Erigeron canadensis* L. — Epek.
 Gat. pn.ameryk.
 Pospolity.
635. *Erigeron acer* L. Dw.-Byl. Ap. muraw i suchych łąk.
 Częsty na suchych przydrożach, murawach, ugorach, terenach kol. i gruzach.
636. *Erigeron annuus* (L.) Pers. Dw.-Byl. Epek. (Erg.).
 Gat. pn.ameryk.
 Cm. Centr., gruzy w Zdrojach, Niebuszewie i Grabowie.
637. *Filago germanica* L. — Efem.
 W zbożu i na piaszczystych nieużytkach w Kijewie.
638. *Filago minima* (Sm.) Fr. — Ap. piaszczysk.
 Piaszczyste nieużytki przy ul. Łabędziej, Nasypowej i w Kijewie.

639. *Filago arvensis* L. Ap. wydm (Epek).
Tereny upraw w Gocławiu, Klęskowie i Żydowcach.
640. *Gnaphalium uliginosum* L. — Ap. wilgotnych miejsc.
Dość licznie na polach w Kluczu, Warszawie i na terenach zalewanych przez Cukrownię Gumieńce.
641. *Gnaphalium sylvaticum* L. — Ap. leśny.
Gruzy przy ul. Gdańskiej (kilka egz. w 1958—1961 r.), ugory w Klęskowie i Kijewie.
642. *Helichrysum arenarium* (L.) Moench. — Ap. wydm.
Licznie na piaszczystych nieużytkach, ugorach, terenach kol., przydrożach, rzadziej na gruzach i cmentarzach.
643. *Inula helenium* L. — Ergfgf.
Gat. azjat.
Tereny po działkach prac. przy ul. kpt. Grudzińskiego i na wzgórzach przy cegielni w Stołczynie.
- (644). *Inula salicina* L. — Ap. łąkowy.
Müller (1911).
645. *Inula britannica* L. — Ap. łąkowy.
Rowy na Międzyodrze, gruz i przychacia przy ul. Gdańskiej.
646. *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.-Byl. Efem.
Przyśródz.-ir. tur.
Przydroże przy ul. Szybowcowej w Dąbiu i przy torach kol. w Klęskowie.
647. *Xanthium strumarium* L. — Epek.
Gat. pn. ameryk.
Kilka egz. na terenach port. i na śmiet. pod Klęskowem, dość licznie w PGR Ostoja.
648. *Xanthium riparium* (Itzigs et Hertsch). — J. Epek.
Gat. ameryk.
Dość liczny na śmiet. i gruzach, przydrożach i przychaciach.
- +649. *Iva xanthiifolia* Nutt. J. — Efem.
Gat. pn. ameryk. (Heg i).
Podjuchy — na terenie dworca kol. przy placu składowania. Od 1964 istnieje na tym miejscu ogródek kolejarza i w 1965 r. rośło w nim 25 okazałych egz., traktowanych przez właściciela jako słoneczniki. Duże, rozprzestrzeniające się stanowisko występuje na przydrożu przy ul. Srebrnej nr 37 w Żydowcach, (por. Cwikliński 1965).
650. *Ambrosia psilostachya* D. C. — Byl. Epek.
Gat. pn. ameryk.
Tereny kol. w Dąbiu i na przydrożu przy drodze do Wielgowa w okolicy ul. Słupskiej. Na tych stan. tworzy dość zwarte płaty. Holzfuss podał z terenów kol. w Dąbiu od 1900 r.
651. *Ambrosia artemisiaefolia* L. (*A. elatior* L.) — J. Efem.

- Gat. pn. ameryk. (Rothmaler 1958).
Spotykany na terenach portu.
Holzfuss (1937) podał z terenu Dąbia.
- (652). *Ambrosia trifida* L. — J. Efem.
Gat. pn. ameryk.
Holzfuss (1937) podał z terenów kol. w Dąbiu, gdzie był notowany od 1900 r., obecnie nie stwierdzony.
653. *Helianthus annuus* L. — Efem.
Gat. pn. ameryk.
Na śmiet. przy ul. Tama Pom., Roztockiej i pod Klęskowem, na gruzach Niebuszewa, na nieużytkach działek prac. przy ul. Witkiewicza.
654. *Helianthus tuberosus* L. — Erg. (Epek.).
Gat. pn. ameryk.
Skarpy kol. w okolicy Pomorzan, na nieużytkach w Żydowcach, Podjuchach i Dąbiu.
- +655. *Helianthus scaberrimus* Ell. — Byl. Efem.
Gat. pn. ameryk.
Rumowisko przy ul. Szerokiej na Krzekowie.
- +656. *Helianthus serotinus* Tausch. — Byl. Efem.
Gat. pn. ameryk.
Skarpa przy Szosie Pozn. w okolicy Ustowa (płat o dużym zwarciu).
- +657. *Helianthus decapetalus* L. — Efem.
Gat. pn. ameryk.
Gruzy na Niebuszewie.
- (658). *Rudbeckia laciniata* L. — Ergfgf.
Gat. pn. ameryk.
Holzfuss (1937) podał ze śmiet. przy ul. Gdańskiej. Müller.
659. *Rudbeckia hirta* L. — Ergfgf.
Gat. pn. ameryk.
Gruzy na Niebuszewie i przy ul. Gdańskiej, śmiet. przy ul. Tama Pom. i Roztockiej — po kilka egz.
660. *Bidens melanocarpus* Wiegand. J. — Neofit.
Gat. pn. ameryk.
Wały stawów rybnych m. Pom. i Gum., tereny zalewane przez cukrownię Gumieńce, nad rowami w Podjuchach i Dąbiu.
Według Holzfusa (1937) gatunek ten został znaleziony w okolicy Szczecina przez Winkelmann'a w 1897 r.
661. *Bidens tripartitus* L. — Ap. zbior. nadwodnych.
Pospolity chwast terenów podmokłych i na gruzach, przydrożach, nad rowami.
662. *Bidens connatus* Mühlenb. — J. Neofit.
Gat. pn. ameryk.

Tereny zalewane przy Cukrowni Gumieńce.

Holz f u s s (1925 i 1937) podał z wysp na jez. Dąbie. Wg niego gatunek ten po raz pierwszy w okolicach Szczecina został stwierdzony w 1896 r.

663. *Bidens cernuus* L. — Ap. zesp. nadwodnych.
Gruzy i brzegi stawów przy fabryce sztucznego jedwabiu w Żydowcach, wały stawów rybnych m. Pom. i Gum.
664. *Galinsoga parviflora* Cav. — Epek.
Gat. tropik.-amer.
Pospolity i licznie występujący chwast na całym terenie.
665. *Galinsoga quadriradiata* Ruiz. et Pav. — J. Epek.
Gat. neotropik., pd. ameryk.
Na całym terenie, ale rzadszy od poprzedniego gat.
666. *Anthemis tinctoria* L. — Ap. muraw kseroterm.
Liczny na skarpach kol., przydrożach, i gruzach, rzadki na polach i przychaciach.
667. *Anthemis arvensis* L. — Arch. (Epek.).
Gat. śródz.-submedit. (M e u s e l).
Na polach w Gocławiu, Glinkach, Podjuchach i Klęskowie oraz na terenie portu.
- +668. *Anthemis ruthenica* M. B. — J. Epek.
Gat. pontyjski.
Tereny port. po kilka egz. w 1964 i 1965 r.
669. *Anthemis cotula* L. — J. Arch.
Gat. śródz.
Dość częsty na przychaciach.
- (670). *Anthemis mixta* (det. Scheuermann) L. — J. Arch.
Gat. śródz.
H o l z f u s s (1937) podał ze śmiet. przy ul. Gdańskiej, licznie.
- +671. *Cosmos bipinnatus* Cav. — J. Ergfgf.
Gat. tropik.-ameryk. (Meksyk, Wójcicki).
Śmiet. przy ul. Roztockiej i Tama Pom., pod płotami w Mścięcinnie i Skolwinie.
- (672). *Guizotia abyssinica* Cass. — J. Efem.
Pochodzi z Afryki tropik.
(H o l z f u s s 1937) ze śmiet. przy ul. Gdańskiej, Nadodrzańskiej, Tama Pom. oraz z Żelechowa.
673. *Achillea ptarmica* L. — Ap. łąkowy.
Gruzy przy ul. Gdańskiej i tereny kol. na Międzyodrze.
674. *Achillea salicifolia* Bess. — Byl. Ap. zaroślowy.
Celiński podaje z Kijewa, H o l z f u s s (1925) z wyspy Mieni.
- +675. *Achillea nobilis* L. — Ap. murawowy.
Celiński wymienia z suchych, luźnych zarośli w Żydowcach.

676. *Achillea millefolium* L. — Ap.
Pospolity.
677. *Matricaria chamomilla* L. — Epek. (Arch.).
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
Na polach i przychaciach, rzadko na gruzach, przydrożach, terenach kol. i śmietn.
678. *Matricaria discoidea* D. C. — Epek.
Gat. pn. ameryk. i wsch. azjat.
Licznie na przychaciach, śmiet., gruzach, przydrożach i miejscach wydeptywanych.
679. *Tripleurospermum inodorum* (Schultz) Bip. — Epek. (Arch.).
Gat. azjat.
Pospolity.
680. *Chrysanthemum segetum* L. — J. Arch. — Epek.
Gat. śródz.-ir. tur.-śródz.-atlantycki, (Meusel).
Kilka egz. na terenie portu w 1964 r. Celiński podaje z Kłucza.
681. *Chrysanthemum leucanthemum* L. — Ap. łąkowy.
Śmietniska, gruzy i przydroża.
Pojedyncze egz.
682. *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh. — Ergfgf.
Gat. śródz.
Dziczejący na działkach prac., na gruzach przy ul. Gdańskiej, przydrożach w Glinkach i Zdrojach.
- (683). *Tagetes minutus* L. (*T. glandulifera* Schrank.) — J. Efem.
Gat. pd. ameryk.
Holzfuss (1937) wymienia ze śmiet. przy ul. Tama Pom. i z ogródka przydomowego na Żelechowie.
- (684). *Anacyclus radiatus* Loisl. — J. Efem.
Gat. wsch. śródz.
Holzfuss (1937) wymienia wiele egz. ze śmietn. przy ul. Gdańskiej.
685. *Tanacetum vulgare* L. — Ap. lasów łęgowych.
Pospolity na gruzach, terenach kol., przychaciach, przydrożach i starych śmietn., rzadszy na polach.
686. *Artemisia absinthium* L. — Epek. (Erg.).
Gat. stepowy, wsch. tur. (Meusel).
Gruzy i śmietn. (często tworzy płaty), rzadziej na przychaciach i terenach kol.
687. *Artemisia vulgaris* L. — Ap.
Pospolicie.
- +688. *Artemisia austriaca* Jacq. — Byl. Epek. (Efem.).
Gat. stepowy, pontyjsko-pannoński.

- Jedno stanowisko na starych torach kol. przy ul. Pieszkiej utrzymujące się przez cały okres obserwacji (1958—1966), mimo przemarznięcia w 1963 roku, (por. Cwikliński 1965).
- +689. *Artemisia siewiersiana* Willd. — Dw. Efem.
 Gat. azjat. (Flora ZSSR).
 Przy torach kol. w Dąbiu.
690. *Artemisia campestris* L. — Ap. muraw kseroterm.
 Pospolita. (Celiński, Müller).
691. *Artemisia dracunculus* L. — Byl. Ergl.
 Gat. wieloobszarowy, pd.-wsch. Europa, Azja, Ameryka.
 Nieużytki przy ul. Przodowników Pracy w Żydowcach, przy torach kol. m. Niebuszewem i Turzynem przy ul. Pieszkiej.
- (692). *Artemisia tournefortiana* Rehb. — Byl. Efem.
 Gat. pd.-wsch.-azjat. (Holzfuss 1937).
 Podany ze śmietnisk Szczecina. (Holzfuss 1937).
- (693). *Artemisia verlotorum* Lamotte. — Byl. Efem.
 Pochodzi z Chin (Holzfuss 1937).
 Holzfuss (1937) wymienia ze śmietn. przy ul. Tama Pom. Wg niego gatunek przywleczony z nasionami roślin oleistych z Argentyny.
694. *Artemisia biennis* Willd. — Dw. Efem.
 Gat. pn. amerykański.
 Na terenie portu liczne egz. na jednym stan. Holzfuss (1941) podał ze śmietn. przy Oscwickim Łasku.
695. *Tussilago farfara* L. — Ap.
 Pospolity.
696. *Petasites officinalis* Moench. — Erg.
 Gat. zach. europ.
 Działki uprawne przy szosie m. Zdrojami i Mostem Cłowym.
697. *Petasites spurius* (Retz.) Rchb. — Ap. wyd. m.
 Nasyp kol. przy moście szosy pozn. na Regalicy i na piaszczystych brzegach Regalicy.
698. *Senecio vulgaris* L. — Ap. (Arch. — Hryniewiecki, Thellung).
 Pospolity na działkach, rzadszy na terenach kol., gruzach i śmietn.
699. *Senecio viscosus* L. — Ap. wyd. m. i piaszczysk.
 Na całym terenie.
700. *Senecio vernalis* W. K. — Epek. (Neofit).
 Gat. wsch. submediterr.-ir. tur. (Eig).
 Dość licznie na skarpach kol. i przydrożach. Według Holzfussa (1937). Utpadel stwierdził ten gatunek w Szczecinie na Grabowie w 1869 r.
701. *Senecio erucifolius* L. (*S. tenuifolius* Jacq.) — Byl. Ap. muraw kseroterm.

- Pola i ugory na wzgórzach w Stołeczynie i Skolwinie.
702. *Senecio jacobaea* L. — Ap. wilgotnych zarośli.
Na skarpach kol. na Międzyodrze i na łąkach wzdłuż Regalicy.
703. *Calendula officinalis* L. — Efem.
Gat. śródz. (Meusel).
Częsty na śmietn. i na działkach prac. jako chwast.
- +704. *Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench. — J. Ergfgf.
Gat. afryk. (Dostal).
Dziczejący w okolicy działek prac. w Golęcinie, Gocławiu i Pogodnie. (Celiński).
705. *Echinops sphaerocephalus* L. Byl. Epek. (Erg.).
Gat. ir. tur. (Gajewski).
Skarpy szosy Pozn. w okolicy Ustowa, przy ul. Pieszej, dziczejący na działkach prac., spotykany na gruzach.
706. *Carlina vulgaris* L. — Ap. murawowy.
Skarpy kol. m. Pom. i Gum., Niebuszewem i Mścięcinem, na Gumieńcach, w Dziewokliczu, na gruzach w Drzetowie, Niebuszewie, przy ul. Gdańskiej i Dębogórskiej.
707. *Arctium tomentosum* Mill. — Ap. zesp. zarośl.
Pospolity na gruzach, śmietn., przychaciach i przydrożach.
708. *Arctium lappa* L. — Arch.
Gat. euroszyberyjski.
Jak poprzedni.
709. *Arctium minus* (Hill.) Bernh. — Dw. Ap. zaroślowy.
Gruzy na Niebuszewie, Grabowie oraz na podobnych stan. jak poprzednie gatunki.
710. *Carduus nutans* L. — Dw. Epek. (Arch. — Hryniewiecki).
Gat. submediterr.-kontynentalny (Meusel).
Częsty na przydrożach i terenach kol. oraz na gruzach.
711. *Carduus crispus* L. — Epek.
Gat. śr. europ., zach. azjat. (Meusel).
Częstszy od poprzedniego gatunku na tych samych stan.
712. *Carduus acanthoides* L. — Arch.
Gat. submediterr.-europ.-kontynentalny, pontyjsko-pannoński (Meusel).
Na torach kol. Międzyodrze, i na gruzach.
713. *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop. — Arch.
Gat. euroszyber.-ir. tur.
Na przydrożach, śmietn. i gruzach oraz na ugorach.
714. *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. — Ap. łąk.
Na podmokłych terenach uprawnych, kol. i gruzach. Celiński podaje tylko z łąk.
715. *Cirsium arvense* (L.) Scop. — Ap. (Arch.).
Pospolity.

- (716). *Cirsium rivulare* (Jacq) All. — Ap. łąk.
Holzfuss (1937) podał ze Szczecina.
717. *Onopordon acanthium* L. — Arch.
Gat. wsch. śródz. (Meusel).
Rzadki śmietn. przy ul. Tama Pom., pod Klęskowem, gruzy na Niebuszewie, Żelechowie, Dąbiu, przychacia w Stołczynie, Kłuczu, Zdrojach.
- (718). *Centaurea solstitialis* L. — Dw. Efem.
Gat. śródz.-ir. tur.
Holzfuss (1937) zaznaczył, że w 1899 r. były 3 egz. przy grocie w Zdrojach. Müller.
719. *Centaurea scabiose* L. — Ap. muraw kseroterm.
Licznie na terenach kol., rzadziej na gruzach i przydrożach.
720. *Centaurea rhenana* Bor. — Ap. muraw kseroterm.
Tereny kol. na Międzyodrze, Wzgórzach Hetmańskich, przydroża w Skolwinie, Niebuszewie, na gruzach rzadki.
- +721. *Centaurea diffusa* Lam. — Dw. Epek. (Efem.).
Gat. śródz.-pontyjski.
Tereny kol. przy stacji rozdzielczej w Dąbiu. Radomski i Jasnowska (1964) wymieniają z powiatu Szczecin.
722. *Centaurea cyanus* L. — Ap.
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
Pospolity w uprawach.
723. *Centaurea jacea* L. — Ap. łąkowy.
Tereny kol. na Międzyodrze, m. Pom. i Gum., Niebuszewem i Skolwinem, w Dąbiu, Podjuchach, kluczu i Gocławiu.
- +724. *Centaurea dubia* Suter. — Był. Efem.
Gat. pontyjsko-pannoński.
W 1959 i 1960 r. występował na terenie Głównego Dworca Towarowego kilkanaście egz. Holzfuss (1937) podał ten gat. spoza Szczecina.
- +725. *Centaurea nigra* L. Był. Efem.
Gat. subatlantycki.
Szarpa kol. przy dworcu kol. Niebuszewo — kilkanaście egz. przez cały okres badań.
726. *Cichorium intybus* L. — Epek. (Arch).
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
Pospolity.
727. *Lapsana communis* L. — Ap. leśny.
Na gruzach, cmentarzach i przydrożach na całym terenie.
728. *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. et Koerte. — Ap.
Miejscami dość licznie w uprawach zbóż w Klęskowie i Kijewie.
729. *Hypochoeris radicata* L. — Ap. łąkowy.
Szarpy kol. m. Pom. i Gum., w Dziewokliczu i Klęskowie.

730. *Tragopogon pratensis* L. — Ap. łąkowy.
Częsty na przydrożach, gruzach i cmentarzach, rzadziej na trawnikach i terenach kol.
731. *Tragopogon major* Jacq. — Dw. Epek.
Gat. śródz.-pontyjski.
Gruzy przy al. Wyzwolenia, na Niebuszewie, przy Milczańskiej, przydroża w Gocławiu, na Gumieńcach, tereny kol. m. Pom. i Gum., w Dąbiu i Żydowcach.
732. *Leontodon autumnalis* L. — Ap. łąkowy.
Pospolity.
733. *Leontodon hispidus* L. — Ap. łąkowy.
Gruzy przy Gdańskiej, na Żelechowie, tereny kol. w Gołęczynie, Mścięcynie, Gumieńcach, przydroża na Gumieńcach, Krzekowie, Klęskowie i Podjuchach.
734. *Picris hieracioides* L. — Ap. murawowy.
Na terenach kol., skarpach przydrożnych, gruzach i cmentarzach.
735. *Picris echioides* L. — Efem.
Gat. śródz.
Nieużytki w Klęskowie.
736. *Chondrilla juncea* L. — (Ap. muraw kser.) Epek.
Gat. stepowy, submedit.-ir. tur.
Dość często na terenach i skarpach kol., rzadziej na gruzach i cmentarzach. Gatunek rozprzestrzeniający się.
737. *Taraxacum officinale* Web. — Ap. zbior. łąkowych.
Pospolity.
738. *Sonchus oleraceus* L. — Arch. (Hryniewiecki).
Gat. holarkt.-ir. tur.
Częsty na całym terenie.
739. *Sonchus asper*. (L.) Hill. — Arch.
Gat. holarkt.-ir. tur.
Rzadko spotykany na przychaciach, gruzach i w uprawach okopowych.
740. *Sonchus arvensis* L. — Epek. (Arch. — Hryniewiecki).
Gat. śródz. (Hegi).
Na gruzach, terenach kol., śmiet., przychaciach pospolicie.
741. *Lactuca serriola* Torner. — Dw. Epek.
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
Tereny kol. na Międzyodrze, na stacji kol. Turzyn, Niebuszewo, Dąbie, Skolwin, Gocław, Dziewoklicz i na terenach port.
742. *Lactuca sativa* L. — Ergfgf.
Na śmietn. i działkach prac.
- +743. *Lactuca virosa* L. — Efem.
Gat. wsch. śródz.

Tereny port. i kol. na Międzyodrze, nieużytki w Podjuchach i Zdrojach. Celiński.

744. *Mycelis muralis* (L.) Dum. — Był. Ap. leśny.
Na przydrożach w zaroślach, na gruzach i cmentarzach.
- (745). *Crepis foetida* L. — J. Efem.
Gat. przyśródz.-ir. tur.
Holzfuss (1937) podał z Gocławia.
- (746). *Crepis setosa* Hall. fil. — J. Dw. Arch.
Gat. pd. europ.-orient.
Holzfuss (1937) wymienia za Winkelmannem z Pomorzan.
747. *Crepis biennis* L. — Ap. łąkowy.
Na gruzach, skarpach kol. i cmentarzach.
748. *Crepis tectorum* L. — Ap.
Częsta na gruzach, terenach kol. i port., przydrożach i cmentarzach oraz w uprawach.
749. *Crepis capillaris* (L.) Wallr. J. — Dw. Arch.
Gat. subatlantycki.
Częsta na gruzach, terenach kol., przydrożach i cmentarzach.
750. *Hieracium pilosella* L. — Ap. muraw kseroterm.
Pospolity na suchych murawach, przydrożach, nieużytkach, rzadszy na terenach kol. i gruzach.
751. *Hieracium echinoides* Lumnitz. — Ap. muraw.
Skarpy kol. m. Dziewokliczem i Zdrojami, Turzynem i Wzgórzami Hetmańskimi, w Dąbiu.
752. *Hieracium laevigatum* Willd. — Był. Ap.
Tory kol. m. Niebuszewem i Grabowem.
753. *Hieracium umbellatum* L. — Ap. leśny.
Tereny kol. m. Pom. i Gum.
754. *Hieracium sabaudum* L. — Ap. zaroślowy i leśny.
Tereny kol. m. Gołęcinem i Skolwinem, zarośla w Zdrojach i Podjuchach, Cm. Centr.
- +755. *Hieracium racemosum* W. K. — Był. Ap. leśny.
Skarpy kol. na Międzyodrze.

Alismataceae

756. *Alisma plantago aquatica* L. — Ap. nadwodny.
Rowki wzdłuż torów kol. m. Pom. i Gum., tereny port., przydrożne rowy na całym terenie.

Hydrocharitaceae

757. *Elodea canadensis* Rich. — Neofit.
Gat. pn. ameryk.

Baseny przeciwpożarowe przy ul. Powstańców Wielkopolskich, Kadłubka i w stawach, kanałach, jeziorach.

Liliaceae

758. *Allium vineale* L. — Ap. muraw kseroterm.
Gruzy na Niebuszewie kilka egz.
759. *Allium sativum* L. — Erg.
Gat. azjat.
Skarpy kol. przy ogródkach w Kluczu.
760. *Allium oleraceum* L. — Epek.
Gat. śródz.
Pospolity na polach i przydrożach szczególnie w Kijewie, Klęskowie, m. Zdrojami i Dąbiem, poza tym na skarpach kol. i gruzach. Celiński, Müller.
761. *Gagea pratensis* (Pers) Dum. — Epek.
Gat. śródz.
Skarpy kol. m. Dąbiem i Zdrojami, w Dziewokliczu, Niebuszewie, murawy w Stołczynie, Pomorzanach, Warszawie, Klęskowie, Zdrojach i Kluczu.
- (762). *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers. — Byl. Ergfgf.
Gat. śródz.-pannońsko-pont. Holzfuss (1937) Müller.
763. *Ornithogalum umbellatum* L. — Epek. (Erg).
Śródziemn. pontyjski.
Skarpy kol. przy dworcu kol. na Niebuszewie, Park Żeromskiego, Cm. Centr.
764. *Scilla cernua* Red. — Byl. Ergfgf.
Gat. azjat.
Zdziczała na trawnikach przy ul. Wojska Polskiego, w parkach i na cmentarzach.
765. *Majanthemum bifolium* (L.) F. W. Schm. — Ap. leśny.
Skarpy kol. w Gocławiu, m. Turzynem i Dworcem Głównym, cmentarze.
766. *Asparagus officinalis* L. — Ap. muraw kseroterm.
Gat. azjat. (Hegi).
Śmietn. przy ul. Tama Pom., gruzy przy Dębogórskiej i na Niebuszewie (pojedyncze egz.) oraz na terenach kol., nieużytkach i na działkach prac.

Amaryllidaceae

767. *Galanthus nivalis* L. — Ap. leśny.
Dziczejący w pobliżu działek prac. przy Dworcu Niebuszewo.

Iridaceae

768. *Iris germanica* L. — Ergfgf.

Gat. śródz. (H e g i).

Śmiet. przy ul. Tama Pom., Roztockiej, Duńskiej i Nehringa, gruzy na Niebuszewie.

Juncaceae

769. *Juncus bufonius* L. — Ap. nadwodny.

Pospolity na ścieżkach, miejscach udeptywanych wilgotnych wzdłuż doliny Odry, na terenie zalewanym przez Cukrownię, na podmokłych ugorach i polach.

- (770). *Juncus macer* Gray — Byl. Epek.

Gat. pn. amer.

Holz f u s s (1937) podał z Dąbia. A s c h e r s o n - G r a e b n e r, M ü l l e r).

771. *Juncus compressus* Jacq. — Ap. łąkowy.

Częsty na wilgotnych przydrożach. C e l i Ń s k i, M ü l l e r.

772. *Juncus gerardii* Lois. — Byl. Ap. solniskowy.

Na terenie Międzyodrza. Podwórka i place składowania.

773. *Juncus effusus* L. — Ap. zesp. nadwodnych.

Tereny kol. i przydroża na Międzyodrzu.

774. *Juncus inflexus* L. — Byl. Ap. zesp. nadwodnych.

Tereny kol. m. Pom. i Gum., gruzy przy ul. Gdańskiej, przydroża nad rowami Szosy Poznańskiej.

775. *Luzula campestris* (L.) D. C. — Ap. łąkowy.

Suche przydroża, skarpy kol., cmentarze.

776. *Luzula pilosa* (L.) Willd. — Ap. leśny.

Skarpy przydrożne Szosy Pozn., Cm. Centr.

Cyperaceae

777. *Heleocharis polustris* (L.) R. et Sch. — Ap. nadwodny.

Rowki przy torach kol. m. Pom. i Gum.

- (778). *Carex davalliana* Sm. — Ap. łąk.

Podawana przez A s c h e r s o n a i G r a e b n e r a i M ü l l e r a z okolicy Zdrojów.

779. *Carex arenaria* L. — Ap. wyd. nadmorskich.

Tereny kol. w okolicy Basenu Węglowego, w Dąbiu i m. Dąbiem i Załomem.

780. *Carex ligerica* J. G a y. — Byl. Ap. piaszczysk.

Tereny kol. m. Dąbiem i Zdunowem.

781. *Carex vulpina* L. — Ap. nadwodny.

Glinianki na Niebuszewie.

782. *Carex pairaei* F. Schultz. Byl. Ap. suchych łąk.
Skarpy kol. przy Dworcu Niebuszewo.
Przydroża całego terenu i na gruzach w Drzetowie. Celiński.
783. *Carex hirta* L. — Ap. łąkowy.
Dość pospolita na przydrożach, zboczach, terenach kol., gruzach.

Gramineae

784. *Panicum miliaceum* L. — Erg.
Gat. azjat. (Hegi).
Śmietn. przy ul. Tama Pom., pod Klęskowem, przy Roztockiej.
rzadko jako chwast w uprawach, np. w Klęskowie, Goławiu.
785. *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. — Epek. (Arch).
Gat. śródz.-europ.
Stacja kol. w Dziewokliczu.
786. *Digitaria ischaemum* (Schreb) Muehlenb. — Epek.
Gat. nieustalonego pochodzenia.
Pospolity na piaszczystych polach, szczególnie w Kijewie i Klęskowie, poza tym na piaszczystych przydrożach, działkach prac. i terenach kol.
- (787). *Cynodon dactylon* Pers. Byl. Efem.
Gat. śr. europ.
Holzfuss (1941) podał z ul. Gdańskiej.
788. *Echinochloa crus-galli* (L.) B. P. — Arch.
Gat. azjat.
Pospolity chwast upraw warzywnych, występuje również na śmietn. i gruzach.
789. *Setaria glauca* (L.) P. B. — Arch.
Gat. azjat. i pd. europ.
Pospolity na polach jako chwast, rzadszy na przydrożach, terenach kol. i port., na gruzach i śmiet.
- (790). *Setaria verticillata* (L.) P. B. — Efem.
Gat. pd. europ.
Müller (1911) podał z okolicy Zdrojów a Holzfuss (1937) z Żelechowa.
791. *Setaria viridis* (L.) P. B. — Epek. (Preuss.).
Arch. (Buchli.) Gat. eurosiber., boreo-ameryk., śródz. ir. tur. Eig.
Pospolita w uprawach, na przydrożach i nierzadka na nieużytkach.
- (792). *Setaria italica* (L.) P. B. — Ergfgf.
Gat. azjat.
Holzfuss (1937) wymienia z Żelechowa, Golęcina, Zdrojów, z ul. Gdańskiej i Tama Pom.
793. *Phalaris canariensis* L. — J. Efem. (Epek).

Gat. śródz.

Śmietn. ul. Tama Pom. Nowy Świat, śmietn. przydomowe na Świerczewie.

794. *Anthoxanthum odoratum* L. — Ap. łąkowy.
Tereny kol. na Międzyodrze, na Gumieńcach i w Dąbiu, przydroża w Gocławiu.
795. *Anthoxanthum aristatum* Boiss. — J. Epek.
Gat. śródz.-submedit. (Meusel).
Licznie na polach w życie m. Kłęskowem i Kijewem. Holz f u s s (1937) podał z okolic Dąbia.
796. *Phleum boehmeri* Wib. — Ap. muraw kserot.
Skarpy przy Bogumińskiej, Kłęskowie i Zdrojach.
797. *Phleum pratense* L. — Ap. łąkowy.
Gruzy na Niebuszewie, Dąbiu, Zdrojach, śmietniska i przydroża.
798. *Phleum nodosum* L. (*Ph. pratense* var. *nodosum* (L.) Richter) — Byl. Ap. łąkowy.
Piaszczyste miejsca na Międzyodrze, przydroża i ugory w Kłęskowie, Warszawie i Skolwinie. Celiński.
799. *Alopecurus pratensis* L. — Ap. łąkowy.
Gruzy, przydroża i tereny kol.
800. *Alopecurus geniculatus* L. — Ap. nadwodny.
Tereny port. (kilka egz.), tereny zalewane przez Cukrownię.
801. *Alopecurus aequalis* Sobol. (*A. fulvus* Sm.) — Byl. — J. Ap. nadwodny.
Tereny port., glinianki przy ul. Studziennej na Golęcinie.
- (802). *Alopecurus myosuroides* Huds. — Dw. Efem.
Gat. śródz.-europ.
Holz f u s s (1937) podał ze śmietn. Müller.
- (803). *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf. — J. Efem.
Gat. śródz.-zach. europ. (Dostal).
Wedł. Holz f u s s a (1937) zbierany przez Wellmanna w 1865 r. na Żelechowie.
804. *Apera spica venti* (L.) P. B. — Arch.
Gat. euroszyberyjski.
Pospolity w uprawach zbóż, rzadko na wilgotnych terenach kol. i gruzach.
805. *Agrostis alba* L. — Ap. łąkowy.
Dość częsta na przydrożach i terenach kol.
806. *Agrostis gigantea* Gaud. — Byl. Ap.
Gruzy na Żelechowie i Pomorzanach, przydroża w Żydowcach.
807. *Agrostis stolonifera* L. — Ap. łąkowy.
Na gruzach, działkach i polach.
808. *Agrostis vulgaris* With. (*A. tenuis* Sibth., *A. capillaris* Luers.). —

- Ap. łąkowy.
Częsta na przydrożach i nieużytkach.
809. *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth. — Ap. leśny.
Pospolity.
810. *Calamagrostis canescens* (Web.) Roth. — Ap. łąkowy.
Tereny kol. na Międzyodrze.
811. *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth. — Ap. leśny.
Tory kol. m. Zdrojami i Podjuchami, przychacie w Klęskowie.
812. *Holcus lanatus* L. — Ap. łąkowy.
Gruzy na Niebuszewie, przy ul. Gdańskiej, poza tym pospolity.
813. *Deschampsia flexuosa* (L.) Trim. — Ap. leśny.
Gruzy przy ul. Tama Pom.
814. *Deschampsia caespitosa* (L.) P. B. — Ap. łąk.
Teren portu, gruzy i przychacia.
815. *Corynephorus canescens* (L.) P. B. — Ap. wyd. m.
Pospolita na piaszczystych terenach Międzyodrza, Dąbia, Klęskowa, Kijewa przy ul. Łabędziej.
816. *Avena sativa* L. — Erg. El. gen.: azjat.
Zdziczały na terenie portu, na skarpach kol., śmietn. i jako chwast w okopowych.
817. *Avena strigosa* Schreb. — Ergl.
Gat. zach.-śr.-europ.
Na przydrożach w Gocławiu.
- (818). *Avena brevis* Roth. — J. Arch.
Gat. zach. i śr. europ. (Müller, 1911).
819. *Avenastrum pubescens* (Huds.) Opiz. — Ap. suchych łąk.
Teren portu. Müller (1911) podał z okolicy Szwedzkiego Młyna koło Zdrojów.
820. *Arrhenatherum elatius* (L.) P. B. — Ap. suchych łąk.
Pospolity.
821. *Phragmites communis* Trin. — Ap. nadwodny.
Skarpa kol. m. Zdrojami i Dąbiem, poza tym na terenach kol., przydrożnych rowach i gruzach.
822. *Molinia coerulea* (L.) Moench. — Ap. łąkowy.
Trawnik przy przystanku tramwajowym przy ul. Smoleńskiej na Pomorzanach. Prawdopodobnie przywieziona z ziemią.
823. *Eragrostis minor* Host. — Epek.
Gat. pd. europ.
Na Dworcu kol. w Dąbiu, w Dziewokliczu, m. kamieniami jezdni i przy krawężnikach na ul. Kosynierów. Holzfuss (1937) wymienia z Dąbia, Klucza, Podjuch i Zdrojów.
824. *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. — J. Efem.
Gat. eurosiber.-boreoameryk.

- Gruzy przy śmietn. przy ul. Tama Pom. Holzfuss (1937) podał ze śmietn. przy ul. Gdańskiej.
825. *Koeleria glauca* (Schkuhr) D. C. — Ap. wyd. m.
Piaszczyste tereny kol. w okolicy Dąbia, Kijewa, piaszczyste nieużytki w Kijewie, Klęskowie, Żydowcach, Kluczu oraz na skar-
pach kol. i zsympiskach gruzu.
826. *Cynosurus cristatus* L. — Ap. łąkowy.
Przydroża na Warszawie, Gocławiu, Klęskowie i Stołczynie.
- (827). *Cynosurus echinatus* L. — J. — Dw. Efem.
Gat. śródz. (Dostał).
Holzfuss (1937) podał z okolicy Zdrójów.
828. *Briza media* L. — Ap. muraw kserot.
Na gruzach i przydrożach całego terenu.
829. *Dactylis glomerata* L. — Ap. suchych łąk.
Pospolita na całym terenie.
- +830. *Dactylis aschersoniana* Graebn. — Ap. leśny.
Nielicznie na terenie portu.
831. *Poa annua* L. — Ap.
Pospolita.
- (832). *Poa bulbosa* L. var. *vivipara* Koch. — Był. Ap. suchych lasów i skał.
Müller (1911) wymienia z okolicy Szwedzkiego Młyna k. Klęskowa.
833. *Poa compressa* L. — Ap. muraw kseroterm.
Pospolita na gruzach i terenach kol., rzadziej na trawnikach, cmentarzach i przychaciach.
- (834). *Poa chaixii* Will. — Erg.
Gat. śr. europ., górski.
Holzfuss (1937).
835. *Poa trivialis* L. — Ap. łąkowy.
Przydroża i pod płotami na Niebuszewie. Celiński i Müller podają z naturalnych stanowisk.
836. *Poa pratensis* L. — Ap. łąk.
Często pod płotami, na gruzach i terenach kol.
837. *Poa palustris* L. — Ap. łąk.
Na wilgotnych gruzach i w zaroślach na Międzyodrze. Celiński i Müller podają z naturalnych stanowisk.
838. *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl. — Był. Ap. solnisk nadmorskich.
Tereny port., gruz przy ul. Gdańskiej, przydroża i drogi na Międzyodrze, na terenie zalewanym przez Cukrownię Gumieńce.
- (839). *Bromus erectus* Huds. — Efem.
Gat. przyśródz.
Holzfuss (1937) podał z okolicy Klęskowa.

840. *Bromus inermis* L. — Ap. muraw kseroterm.
Często na skarpach kol. i drogowych, np. w Dziewokliczu.
841. *Bromus sterilis* L. — Arch.
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
Częstsza od poprzedniej.
842. *Bromus tectorum* L. — Epek.
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
Pospolity.
843. *Bromus arvensis* L. — Arch.
Gat. tur.-wsch. śródz.
Zsypisko śmieci i gruzu przy ul. Tama Pom. przy Gazowni.
844. *Bromus secalinus* L. — Arch.
Gat. śródz.
Częsta w uprawach zbóż.
845. *Bromus mollis* L. — Ap. łąkowy (Arch. — Buchli).
Pospolita na całym terenie.
- (846). *Bromus japonicus* Thunb. — Efem.
Gat. eurosyber.-boreoameryk.-ir. tur.
Holzfuss (1937).
- (847). *Bromus squarrosus* L. — Efem.
Gat. tur.-wsch. śródz. (Meusel).
Holzfuss (1937) podał z terenu portu.
- (848). *Bromus unioloides* (W.) Humb. — Dw. — Byl. Efem.
Gat. amerykań. (Dostal).
Holzfuss (1937) wymienia ze śmietn. przy ul. Tama Pom. i Gdańskiej.
849. *Festuca ovina* L. — Ap. wydmowy.
Pospolity na torach kol., suchych skarpach i przydrożach, pod płotami, na gruzach.
850. *Festuca duriuscula* L. — Ap. muraw kseroterm.
Skarpy dróg i kol.
851. *Festuca rubra* L. — Ap. muraw kseroterm.
Suche skarpy kol. i przydroża na całym terenie.
852. *Festuca gigantea* (L.) Vill. — Ap. łąkowy.
Cm. Centr., zarośla przy Akademickiej.
853. *Festuca pratensis* Huds. — Ap. łąkowy.
Dość pospolita na ugorach, przydrożach, terenach kol.
- (854). *Festuca sciuroides* Roth. — Efem.
Gat. śródz.
Holzfuss (1937) podał z terenu portu.
855. *Brachypodium pinnatum* (L.) P. B. — Ap. zarośli.
Nad rowami, na przydrożach i wzgórzach w Stołczynie.
856. *Lolium remotum* Schrk. — J. Arch.

- Gat. śródz. i śr. europ.
Przychacia przy ul. Chmiekowskiego, przy drogach polnych w Kłęskowie, Kluczu i Żydowcach.
857. *Lolium temulentum* L. — Arch.
Gat. śródz.
Przychacia na Pomorzanach.
Holzfuss (1937) podał ze śmietn. w Szczecinie.
858. *Lolium perenne* L. — Ap. łąkowy.
Pospolity.
859. *Lolium multiflorum* Lam. — Epek. (Erg).
Gat. śródz.-submedit. (Meusel).
Tereny port., gruzy na Drzetowie, Żelechowie i Warszawie.
Holzfuss (1937) podał ze śmietn. przy ul. Gdańskiej.
- +860. *Agropyron cristatum* (L.) Gaertner. — Byl. Efem.
Gat. pannoński.
Jeden egz. przy torach kol. m. Dąbiem i Załomem.
861. *Agropyron repens* (L.) P. B. — Ap. (Arch — Buchli).
Pospolity.
862. *Triticum vulgare* Vill. — Erg.
Gat. śr. azjat. (Szafer).
Tory kol. w porcie, śmietn. przy ul. Tama Pom.
863. *Triticum compactum* Host. — Erg.
Gat. azjat.
Tory kol. na międzyodrz.
864. *Secale cereale* L. — Erg.
Gat. azjat.
Tereny portowe, tereny kol. na Międzyodrz, śmietniska.
865. *Hordeum distichon* L. — Erg.
Gat. azjat.
Śmietn. przy ul. Tama Pom., gruzy na Niebuszewie, tereny kol. w porcie, Zdrojach, na Międzyodrz i Podjuchach.
866. *Hordeum vulgare* L. J. — Ergfgf.
Gat. afryk.
Tereny portowe.
867. *Hordeum murinum* L. — Arch.
Gat. eurosyber.-boreoameryk.-śródz. ir. tur.
Częsty na zsyppiskach gruzu i śmieci, na przychaciach, pod murami, rzadziej na terenach kol.
868. *Hordeum jubatum* L. — J. Epek.
Gat. pn. ameryk. (Hegi).
Gruzy przy ul. Gdańskiej w pobliżu Mostu Długiego, przy ul. Floriana, gruzy na Placu pod Bramą, na terenie portu, śmietn. przy ul. Duńskiej (wszędzie po kilkadziesiąt egz.). Czepita D. (msk.), Holzfuss (1937).

- (869). *Andropogon halepensis* (L.) Brot. — Byl. Efem.
 Gat. wsch. śródz. (Hegi).
 Holzfuss (1937) podał ze śmietn. przy ul. Gdańskiej.
- (870). *Andropogon sorghum* Bort. — Byl. Erg.
 Gat. pn. ameryk. (Hegi).
 (Holzfuss 1937).
- (871). *Beckmannia eruciformis* Host. — Efem.
 Gat. śródz.
 Holzfuss (1937).
872. *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. — Ap. łąk.
 Tereny kol. m. Pom. i Gum.
 Holzfuss (1937) wymienił ze Zdrojów.
873. *Zea mays* L. — Erg.
 Gat. ameryk.
 Śmietn., tereny portu oraz tereny kol. na Międzyodrze.

Palmae

- (874). *Phoenix dactylifera* L. — Efem.
 Gat. pd. azjat.
 Holzfuss (1941) notował siewki tej palmy na śmietn. przy ul. Tama Pom.

9. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI

1. W okresie od 1958—1966 roku przeprowadziłem badania roślinności synantropijnej Szczecina. W wyniku tych prac sporządziłem listę gatunków flory szczecińskiej, obejmującą 874 gatunki roślin naczyniowych.

2. Spośród 874 gatunków synantropijnych Szczecina wyróżniłem 425 apofitów (48,5%, wśród których największy udział wykazują gatunki leśne (27,7%) i gatunki łąkowe (26,8%). Tak znaczny udział apofitów we florze szczecińskiej (48,5%) wynika z bliskiego sąsiedztwa lasów i łąk.

3. Antropofity, to jest rośliny obcego pochodzenia, obejmują 449 gatunków roślin naczyniowych (51,5%). Ten stosunkowo niski procent roślin obcego pochodzenia w porównaniu z innymi miastami (Poznań 58,6%, Berlin 63%, Wrocław 70,1%) jest uwarunkowany dużym udziałem apofitów z pobliskiego otoczenia, mimo że bezwzględna liczba antropofitów nie jest mała i porównawczo przedstawia się następująco: Szczecin 449 gatunków, Poznań 341, Berlin 146, Wrocław 755 gatunków. Można więc wysunąć wniosek, że w miarę rozbudowy i technicznego rozwoju miasta maleje liczba gatunków flory synantropijnej, ale wzrasta udział antropofitów w stosunku do apofitów. To znaczy, że większość roślinności

miejscowego pochodzenia nie jest zdolna do życia w warunkach miejscowych.

4. W liczbie antropofitów flory szczecińskiej najwięcej jest epekofitów, to jest gatunków zawleczonych i już zdomowionych na siedliskach zmienionych przez człowieka (31,1%). Efemerofity, tj. gatunki niedawno zawleczone i nie zdomowiające się, stanowią 21,6%, archeofity, czyli gatunki przed i wczesnohistoryczne 18,4%, ergazjofigofity, tj. gatunki świadomie wprowadzone przez człowieka, stanowią 15,1%.

5. Największa liczba antropofitów Szczecina pochodzi z obszarów południowo-wschodniej Europy, zachodniej Azji i z terenów położonych nad Morzem Śródziemnym 49,5%. Gatunków pochodzenia amerykańskiego jest 18%, afrykańskiego 0,9% (por. tabela 2 na str. 18).

6. Poza warunkami siedliskowymi wpływ na skład flory synantropijnej wywierają szlaki komunikacyjne i ruchy ludności. Badania Holzfussa z lat trzydziestych tego stulecia wykazały, że wiele gatunków przybyło do Szczecina drogą morską. W swoich badaniach stwierdziłem, że *Iva xanthiifolia* została przywleczona z południowego wschodu transportami kolejowymi i przez przybyłą tu ludność. Również rozmieszczenie na terenie Szczecina niektórych rzadkich gatunków roślin może wskazywać na sposoby ich rozprzestrzeniania się. Tak np. *Rumex confertus*, *Ambrosia psilostachya*, *Iva xanthiifolia*, *Oenothera ammophila* występują wzdłuż torów kolejowych, natomiast *Cardaria draba* i *Hordeum jubatum* wydają się być związane z szosami.

7. Analiza flory synantropijnej Szczecina od 1840 do 1966 roku wykazała zmiany w jej składzie. Do gatunków, których obecnie nie stwierdzono, należą: *Atriplex sackii*, *Atriplex laciniata*, *Artemisia tournefortiana*, *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, *Oxyria amaranthoides*, *Polygon monspeliensis* i *Torilis arvensis*. Gatunków tych nie podawali też Müller (1911) i Holzfuss (1937 do 1941), co świadczyć może o wcześniejszym ich wyginięciu na badanym terenie. Z gatunków podawanych w latach 1900—1941 nie odnaleziono obecnie 99 gatunków. Natomiast zanotowano nowe gatunki, z których 84 można uważać za nowe dla Szczecina, a jeden (*Oenothera ammophila* Focke) za nowy gatunek dla Polski.

8. Porównanie flory Szczecina z florami 6 innych miast Polski i z florą Berlina wskazuje na największe pokrewieństwo jej do flory Gdańska. Wyrazem tego jest przede wszystkim największa liczba gatunków wspólnych dla obu miast. Flora szczecińska wykazuje też duże podobieństwo do flory Poznania, Łodzi i Wrocławia. Na podobieństwo tych flor wpływają warunki klimatyczne, edaficzne i charakter stanu technicznego tych miast oraz połączenia komunikacyjne między nimi (por. str. 26).

Najmniejsze podobieństwo występuje między florą Szczecina i Ber-

lina mimo dużych powiązań komunikacyjnych w przeszłości. Różnice w składzie gatunkowym obu flor wynikają z różnego charakteru i stanu technicznego tych miast: Szczecin jest miastem portowym z dużymi terenami zieleni, Berlin natomiast miastem śródlądowym.

PIŚMIENNICTWO

- Abromeit J., 1898—43, Flora von Ost- und Westpreussen I, II (4), Berlin — Königsberg.
- Andruszkiewicz W., 1960, Polskie porty handlowe, Wydawnictwo Morskie, Gdynia.
- Ascheron P., Graebner P., 1898—99, Flora des Nordostdeutschen Flachlandes, Berlin.
- Behrendsen W., 1896, Zur Kenntnis der Berliner Adventiflora, Verh. Bot. Verein Prov. Brandenburg, 38.
- Białobok S., 1955, Drzewoznawstwo, P.W.R.iL., Warszawa.
- Borowiec S., 1958, Gleby wysoczyzn i wzniesień okolic Szczecina, Zesz. Nauk. WSR, Szczecin (1).
- Brinken J., 1948, Okolice Szczecina pod względem geologicznym i morfologicznym, Czasopismo geograficzne XIX z. 1—4, Wrocław.
- Buchli M., 1936, Oekologie der Ackerunkräuter der Nordostschweiz, Bern.
- Celiński F., 1953 b, W obronie Puszczy Bukowej pod Szczecinem, Chronimy przyr. ojcz. 7 (11—12): 25—34, Kraków.
- Celiński F., 1956, Zabytkowe drzewa Puszczy Bukowej pod Szczecinem, Rocz. Dendr. 11: 445—460, Warszawa.
- Celiński F., 1961, Flora roślin naczyniowych Puszczy Bukowej pod Szczecinem, Spraw. Pozn. Tow. Nauk. za III i IV kwartał 1961, 2 (64): 76—78, Poznań.
- Celiński F., Kwartał Cz., 1962, Materiały florystyczne z Pomorza Szczecińskiego, Bad. Fizj. n. Polską Zach. 9: 313—316, Poznań.
- Celiński F., 1964, Rośliny naczyniowe Puszczy Bukowej pod Szczecinem, Poznań.
- Chłopowska H., 1948, Początki Szczecina, Rocz. historyczne XVIII z. 2, Poznań.
- Ćwikliński E., 1965, Rzadsze rośliny Szczecina. Fragmenta Flor. et Geob. 11 (1): 3—5.
- Ćwikliński E., 1967, Nowy dla Polski gatunek wiesiołka *Oenothera ammobila* Focke, Fragmenta Flor. et Geob. 13 (1): 51—53.
- Czeczott H., 1928, Element atlantycki we florze polskiej, Rozpr. Wydz. Mat. Przyr. PAU, 65/66, Kraków.
- Czepita D., 1962, Chwasty ogródków działkowych miasta Szczecina (msk).
- Czubiński Z., 1950, Zagadnienia geobotaniczne Pomorza, Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat. Przyr. Kom. Fizj. Bad. n. Polską Zach. 2, 4, Poznań.
- Dostal J., 1950, Klič k úplné kvetena ČSR, Praha.
- Eig A., 1931, Les éléments et les groupes phytogéographiques auxiliaires dans la flore palestinienne, Feddes Repertorium, Beihefte Bd. LXIII.
- Fijałkowski D., 1963, Zbiorowiska roślin synantropijnych miasta Chełma, Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Vol. XVII, 3, Sectio C, Lublin.
- Flora Polska I—X, 1919—1965, Kraków.
- Flora SSSR, 1934—1961, Izdat. Akad. Nauk. SSSR, I—XXVI, Moskwa — Leningrad.
- Gajewski W., 1937, Elementy flory polskiego Podola, Planta Polonica vol. V, Warszawa.

- Garcke A., 1875, Flora von Nord- u. Mittel Deutschland zum Gebrauche auf Excursionen in Schulen u. bei Selbstunterricht, Berlin.
- Gawłowska M., 1957, Badania nad rozmieszczeniem *Heracleum sphondylium* L. i *Heracleum sibiricum* L. w Polsce, Fragmenta Flor. et Geob. 3 (1), 61—68.
- Hegi G., 1908—1960, Illustrierte Flora von Mittel-Europa, T. I—VII, München.
- Heliński Z., 1962, Przeladunki w porcie szczecińskim w latach 1946—1960.
- Holzfuss E., 1933, Die Farnpflanzen Pommerns, Dohrniana 12: 19—33, Stettin.
- Holzfuss E., 1936, Die Pflanzenwelt der Schuttplätze in Pommern, Ibidem 15: 116—126.
- Holzfuss E., 1937, Beitrag zur Adventivflora von Pommern, Ibidem 16: 94—130.
- Holzfuss E., 1939, Das Igel-Kammgras *Cynosurus echinatus* L., Ibidem 19 (1): 117—118.
- Holzfuss E., 1940, Zum 100-jährigem Bestehen der Flora von Pommern und Rügen von Dr Schmidt, Ibidem. 19: (1) 119—121.
- Holzfuss E., 1941, Mitteilungen aus der Flora der Schuttplätze in Pommern, Ibidem 20: 185—187.
- Jasiewicz A., 1958, Polskie gatunki rodzaju *Melampyrum* L., Fragmenta Flor. et Geob. 4 (1—2): 17—120.
- Jasnowski M., 1961, *Impatiens Roylei* Walpers — nowy składnik lasów łągowych w Polsce, Fragmenta Flor. et Geob. 7 (1): 77—80.
- Karczmarz K. i Kuc M., 1957, Nowe stanowiska *Iva xanthiifolia* Nutt. (*Cyclachaena xanthiifolia* Fresen) w Polsce, Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska vol. XII, 3, sec. C, Lublin.
- Karczmarz K., Krzaczek T., 1960, Nowe stanowiska rzadszych roślin na Lubelszczyźnie, Fragmenta Flor. et Geob. 6 (3): 245—251.
- Kierska U., 1959, Pomniki przyrody Szczecina i okolicy, Szczecin 3: 93—104.
- Kobendza R., 1950, Roślinność Pomorza Zachodniego wraz z Ziemią Lubuską, Gospod. Wiejsk. na Ziemiach Zach. Nr 12: 1—18, Warszawa PIWR.
- Kobendza R., 1950, Krytyczny przegląd niektórych gatunków rodzaju *Lepidium* R. Br. oraz nowe gatunki dla flory polskiej, Acta Soc. Bot. Pol. 20 (2): 439—453.
- Kornaś J., 1950, Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Cz. I. Zespoły pól uprawnych, Acta Soc. Bot. Pol. 20 (2): 362—438.
- Kornaś J., 1952, Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Cz. II. Zespoły ruderalne, Acta Soc. Bot. Pol. 21 (4): 701—718.
- Kornaś J., 1953, Niektóre interesujące rośliny synantropijne znalezione w południowej Polsce w latach 1939—1952. Fragmenta Flor. et Geob. I (1): 32—41.
- Kornaś J., Leśniowska J., Skrzywanek A., 1959, Obserwacje nad florą linii kolejowych i dworców towarowych w Krakowie, Fragmenta Flor. et Geob. 5 (2): 199—216.
- Kornaś J., 1964, Z badań nad ekologią zbiorowisk segetalnych, Acta Agrob. 16: 17—27.
- Kostrowicki J., 1961, Środowisko geograficzne Polski, PWN, Warszawa.
- Kowalenko W., 1950, Starosłowińskie grody portowe na Bałtyku, Przegląd Zach. 6: 378—419.
- Kownas S., 1958, Roślinność Ziemi Szczecińskiej, Szczecin 6: 81—99.
- Kownas S., Piskorski Cz., 1958, Szczecin — miasto parków i zieleni, PWN, Poznań.
- Kownas S., 1959, Drzewa i krzewy egzotyczne w Szczecinie, Szczecin 3: 61—66.
- Kownas S., Sienicka A., 1962, Obecny stan zadrzewienia miasta Szczecina, Szczec. Tow. Nauk. Wydz. Nauk Przyr. Roln. Tom XI, z. 1.
- Kowal, T., 1953, Klucz do oznaczania nasion rodzajów *Chenopodium* L. i *Atriplex* L., Monogr. Bot. vol. I: 88.

- Kowal T., 1954, Cechy morfologiczne i anatomiczne nasion rodzaju *Amaranthus* i klucze do ich oznaczania, Monogr. Bot. vol. II: 162.
- Krawiecowa A., 1951, Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania, Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Pr. Kom. Biol. t. XIII z. I., Poznań.
- Krzaczek T., 1961, Nowe stanowiska rzadszych roślin na Lubelszczyźnie. Cz. II. et Geob. 7 (2): 299—304.
- Kuc M., 1955, *Iva xanthiifolia* Nutt. (*Cyclachena* Fresen.) w południowej Polsce, Kosmos, seria A. Biologia. Rok IV, z. 4 (5), Warszawa.
- Lencewicz S., Kondracki J., 1962, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
- Lewina R. E., 1957, Sposoby rasprostranienija plodow i siemian, Izd. Moskovsk. Uniw., Moskwa.
- Lhotska M., 1964, *Bidens frondosa* L. var. *anomala* Port. ex Fern. w českých zemích, Preslia 37: 218—219, Praha.
- Majewski P. F., 1954, Flora sredniej połowy jewropejskiej czasti SSSR, Moskwa—Leningrad.
- Malcew A. J., 1936, Sornaja rastitielnost' SSSR i miery borby s nieju, Wyd. 3, Moskwa-Leningrad.
- Marek S., 1954, Cechy morfologiczne i anatomiczne owoców rodzaju *Polygonum* L. i *Rumex* L. oraz klucze do ich oznaczania. Monogr. Bot. vol. II: 77.
- Marek S., 1958, O kilku rzadszych roślinach z terenu Wrocławia, Fragmenta Flor. et Geob. 4 (1): 121—123.
- Marsson Th. Fr., 1869, Flora von Neu-Vorpommern und Inseln Rügen u. Usedom, Leipzig.
- Mądałski J., 1954—1961, Atlas flory polskiej i ziem ościennych I—IX., PWN, Warszawa-Wrocław.
- Meusel H., 1943, Vergleichende Arealkunde, Bd. II, Berlin.
- Meusel H., 1965, Vergleichende chorologie der zentraleuropäischen Flora, Jena.
- Michalak K., 1946, Specjalizacja polskich portów morskich, Instytut Bałtycki.
- Mowszowicz J., 1955, Chwasty polne i ogrodowe, PWRiL, Warszawa.
- Mowszowicz J., 1950, Rośliny wodne i krajowe, PZWS, Warszawa.
- Mowszowicz J., 1952, Pospolite rośliny naczyniowe Polski, PWN, Warszawa.
- Mowszowicz J., 1956, *Ulmus suberosa* Moench. — wiaź korkowy w Polsce, Rocz. Dendr. 11, s. 355—359.
- Mowszowicz J., 1960, Conspectus Flora Lodziensis, Łódź. Tow. Nauk. Wydz. III. Nr 69.
- Mowszowicz J., Sowa R., 1963, Zarys roślinności synantropijnej Łodzi, Łódź. Tow. Nauk. R. XVII, 7.
- Müller W., 1911, Flora von Pommern., Stettin.
- Nowiński M., 1955, Problem chwastów i ich zwalczanie w oparciu o nauki biologiczne, Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat. Przyr., Prace Kom. Biol. t. XVIII, z. 1.
- Nowiński M., 1960, Chwasty i człowiek, Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Wydanie popularnonaukowe.
- Nowiński M., 1964, Chwasty segetalne wyspy Wolin, Pozn. Tow. Przyj. Nauk. t. XXII, z. 6.
- Piotrowska H., 1966, Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Wydz. Mat.-Przyr. 30 (4).
- Piskorski Cz., 1965, Szczecin i okolice. Przewodnik, Wyd. III, Sport i Turystyka, Warszawa.
- Prawdzie K., 1958, Charakterystyka ważniejszych elementów klimatycznych powiatu szczecińskiego, Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie nr 1: 5—33.

- Prawdziej K., 1961, Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa, Wiad. Zach., Szczecin.
- Preuss H., 1930, Apophyten und Archaeophyten in der nordwestdeutschen Flora, Feddes Repert. Beig. LXI, Dahlem — Berlin.
- Radomski J., Jasnowska J., 1964, Roślinność zbiorowisk otwartych na zachodniej krawędzi doliny dolnej Odry. Cz. I, Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie nr 17.
- Radomski J., Jasnowska J., 1965, Roślinność zbiorowisk murawowych na zachodniej krawędzi doliny dolnej Odry. Cz. II, Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie nr 19.
- Renner O., 1936—1937, Wilde *Oenothera* in Norddeutschland, Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung, Jena, Bd. 131: 184—187.
- Renner O., 1938, Alte und neue *Oenotheren* in Norddeutschland. Feddes Repertorium, Beih., Bd. C., Dahlem.
- Romer E., 1949, Regiony klimatyczne Polski, Prace Wrocł. Tow. Nauk., ser. B, 16, Kraków.
- Rostański K., 1960, Interesujące gatunki synantropijne z terenu miasta Wrocławia, Fragmenta Flor. et Geob. 6 (3): 287—301.
- Rostański K., 1961, Interesujące gatunki synantropijne z terenu miasta Wrocławia, Fragmenta Flor. et Geob. 7 (2): s. 291—298.
- Rostański K., Stachurska A., 1964, Próby wyróżnienia niektórych gatunków rodzaju *Oenothera* L. na podstawie morfologicznych cech pyłku, Opolskie Tow. Przyj. Nauk. Przyr. nr 4.
- Rostański K., 1965, Gatunki z rodzaju *Oenothera* L. na Śląsku, Fragmenta Flor. et Geob. 11 (4): 491—497.
- Rostański K., 1965, Kilka nowych taksonów rodzaju *Oenothera* L. z podrodzaju *Oenothera*, Fragmenta Flor. et Geob. 11 (4): 499—523.
- Rostański K., Flora synantropijna Wrocławia (msk.).
- Rostański K., 1968, Neofityzm występujących w Europie gatunków rodzaju *Oenothera* L. Mater. Zakł. Fitosocj. Stosow. Uniw. Warsz. Nr. 25. Warszawa — Białowieża.
- Rothmaler W., 1958, 1959, 1963. Excursionsflora von Deutschland. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin.
- Schmidt W., 1840, Flora von Pommern u. Rügen, Stettin.
- Scholz H., 1960, Die Veränderungen in der Ruderalflora Berlins.
- Schwarz Z., Szober J., 1960. Rośliny towarzyszące człowiekowi, Atlas, PZWS, Warszawa.
- Schwarz Z., 1961, Nowe i bardziej interesujące gatunki we florze synantropijnej pomorza Gdańskiego, Fragmenta Flor. et Geob. 7 (1): 59—75.
- Schwarz Z., 1967, Badania nad florą synantropijną Gdańska i okolicy.
- Sienicka A., 1959, Ciekawe drzewa i krzewy w parku im. Jana Kasprówicza i w Szczecińskim Ogrodzie Botanicznym, Szczecin 3: 67—81.
- Sienicka A., 1959, Roślinność drzewiasta Parku im. Stefana Żeromskiego, Szczecin 3: 83—91.
- Sienicka A., Kownas S., 1960, Roślinność dawnego ptasiego rezerwatu na Wyspie Mętnej (Mieni) koło Szczecina, Przyr. Polski Zach. 4 (1—4): 69—79, Poznań.
- Sowa R., 1960, Występowanie *Amaranthus blitoides* S. Watson na terenie Łodzi, Fragmenta Flor. et Geob. 6 (3): 235—238.
- Sowa R., 1962, Niektóre nowe i rzadsze rośliny synantropijne na terenie Łodzi, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. Nauk. Mat. Przyr. ser. II, z. 13: 59—81.
- Sowa R., 1962, Roślinność ruderalna miasta Łodzi (msk.).

- Sowa R., 1964, Roślinne zespoły ruderalne na terenie Łodzi, Łódz. Tow. Nauk. Nauk. Mat. Przyr. s. 1—30.
- Sowa R., 1965, Niektóre nowe i rzadsze rośliny synantropijne na terenie Łodzi, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. Wydz. III. Ser. II. z. 18: 95—111.
- Sowa R., 1966, Bardziej interesujące gatunki synantropijne na terenach kolejowych województwa łódzkiego, Fragmenta Flor. et Geob. 12 (1): 3—8.
- Sowa R., 1966, *Acroptilon repens* (L.) DC. — nowy gatunek ruderalny we florze Polskiej, Fragmenta Flor. et Geob. 12 (1): 9—11.
- Świeboda M., 1963, Rozmieszczenie *Elsholtzia Patrini* (Lep.) Garcke w Polsce, Fragmenta Flor. et Geob. 6 (4): 489—495.
- Szafer W., 1930, Element górski we florze niżu polskiego, Rozpr. Wydz. Mat. Przyr. P.A.U. Dz. B. 69 (3): 87—196.
- Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1953, Rośliny Polskie, PWN, Warszawa.
- Szafer W. (red.), 1959, Szata roślinna Polski. t. I, II, PWN, Warszawa.
- Szulczewski J., 1930, Przybysze i przybłędy w roślinności Poznania, Wyd. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. ser. B., t. V, Poznań.
- Szulczewski J., 1951, Wykaz roślin naczyniowych w Wielkopolsce dotąd stwierdzonych, Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Wydz. Mat. Przyr., Praca Biol., 12 (6): 1—87.
- Tacik T., 1960, Przyczynek do znajomości flory synantropijnej Krakowa, Fragmenta Flor. et Geob. 6 (4): 489—495.
- Terebucha F., 1948, Port Szczeciński, Czas. Geogr. T. XIX, 1—4, Wrocław.
- Trzebiński J., 1930, Rzadkie lub zawleczone rośliny w Polsce, Acta Soc. Bot. Pol. vol. VII (2), Warszawa.
- Trzcicka H., 1961, Badania nad zasięgami roślin synantropijnych. I. *Bidens melanocarpus* Vieg. w Polsce, Fragmenta Flor. et Geob. 7 (1): 161—168.
- Trzcicka H., 1963, Badania nad zasięgami roślin synantropijnych. *Rumex confertus*, Fragmenta Flor. et Geob. 9 (1): 73—84.
- Tymrakiewicz W., 1959, Atlas chwastów polnych, PWRiL, Warszawa.
- Urbański J., 1955, *Iva xanthifolia* Nutt. (Compositae) w Poznaniu, Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. z. III i IV kw. 1955, 45: 332.
- Urbański J., 1958, Materiały do znajomości flory synantropijnej m. Poznania, Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Wydz. Mat. Przyr. Kom. Fizj., Bad. Fizj. n. Polską Zach. T. IV, Poznań.
- Urbański J., 1959, Szczaw omszony (*Rumex confertus* Willd.) składnikiem flory Wielkopolskiej, Przyr. Polski Zach. R. III. (3—4) 9—10.
- Wachowiak B., 1952, Najstarszy port Szczecina, Przegląd Zach. 3—4.
- Wachowiak B., 1955, Port średniowiecznego Szczecina, Gdańsk.
- Wiśniewski J., 1965, Niektóre rzadsze chwasty powiatu łowickiego, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. Nauk. Przyr. Mat. Ser. II, z. 18: 131—134.
- Wiszniewski W., 1953, Atlas opadów atmosferycznych w Polsce 1891—1930, PIHM, Warszawa.
- Zajchowska S., 1952, Pierwotny krajobraz średniowiecznego Szczecina, Przegląd Zach. Nr 3—4.
- Zanowa M., 1962, O dwu interesujących roślinach synantropijnych w Warszawie, Wiad. Bot. 6 (1): 83—87.
- Zanowa M., 1964, Roślinność synantropijna Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem gruzowisk (msk.).
- Zaremba P., 1947, Z problemów komunikacyjnych Szczecina, Technika morza i wybrzeża Nr 1.
- Zaremba P., Orlińska H., 1965, Urbanistyczny rozwój Szczecina, Wyd. Poznańskie, Poznań.

- Żukowski W., 1959, Nowe i rzadkie gatunki synantropijne dla flory miasta Poznania, *Przyr. Polski Zach.* 3: 151—153.
- Żukowski W., 1960, Roślinność naczyniowa okolic Szczecina, *Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat. Przyr., Prace Kom. Biol.* 22 (1): 1—71.
- Żukowski W., 1960, Kilka interesujących gatunków synantropijnych z miasta Poznania, *Przyr. Polski Zach.* 3—4: 142—145.
- Żukowski W., 1961, Nowe stanowiska roślin synantropijnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski półn.-zach., *Fragmenta Flor. et Geob.* 6 (4): 481—488.
- Żukowski W., 1961, Notatki florystyczne z Pomorza Zachodniego, *Bad. Fizj. n. Polską Zach. T. VIII*, Poznań.
- Żukowski W., 1963, Nowe stanowiska rzadszych roślin na Pomorzu, *Bad. Fizj. n. Polską Zach. T. III*, Poznań.

SUMMARY

The floristic investigations on the synanthropic flora of Szczecin (Stettin in German literature) were conducted in the period 1958—1966. They were extended to "Large Szczecin" with a surface area of 250 km².

The city of Szczecin is a port situated at the mouth of the large river Odra. It occupies a surface with a varied relief, open both from the East and West, thus the conditions are favourable for the penetration of plant newcomers from all the four quarters of the world onto the area of the city. Not without significance are also the specific climatic conditions due to the situation of the city in a valley close to the sea and large water bodies. No wonder, therefore, that the flora of Szczecin has long aroused the interest of naturalists by its richness and diversity.

The aim of the present investigation was the recording of the present state of synanthropic species in Szczecin, the analysis of their origin, of the changes occurring in the specific composition of the flora over the period 1840—1966, and a comparison of the flora of Szczecin with that of six other Polish cities and of Berlin.

These studies allowed to prepare a list of species of the synanthropic flora of Szczecin comprising 874 species of vascular plants, this including 771 species collected during the investigation and 103 species quoted from the literature.

From among the 874 synanthropic species in Szczecin 425 apophytes (48,5%) were distinguished which consisted mostly of forest species (27,7%) and meadow species (26,8%). So large a contribution of apophytes to the Szczecin flora is the result of the close neighbourhood of forests and meadows.

Anthropophytes, i.e. plants of foreign origin include 449 plant species (51,5%). This relatively low percentage of foreign plants as compared with other cities (Poznań 58,6%, Berlin 63%, Wrocław 70,1%) is due to the high contribution of apophytes from the close neighbourhood, although the absolute number of anthropophytes is by no means small: Szczecin 449, Poznań 341, Berlin 146, Wrocław 755 species. Thus, the conclusion may be advanced that, with the expansion and technical development of the city, the number of species of synanthropic flora diminishes, but the percentual index of anthropophytes increases in relation to apophytes. This would mean that most of the flora of local origin is incapable of surviving in town conditions.

The anthropophytes in the Szczecin flora consist in most part of epecophytes, i.e. species brought accidentally and settled on the sites modified by man (31,1%). Ephemerophytes, recent newcomers not settled, constitute 21,6 percent, archaeop-

hytes, prehistoric and early-historic species 18.4 percent and ergasiofigophytes, species voluntarily brought by man 15.1 percent.

Most anthropophytes in Szczecin, originate from the south-east European region, western Asia and Mediterranean territories (49.5%). There are 18% species of American origin, 18.9% from Asia, 1.8% Atlantic species and only 0.9% species from Africa.

Analysis of the synanthropic flora of Szczecin over the period 1840—1966 demonstrated changes in the specific composition. The following species have not been found in the present investigation: *Atriplex säckii*, *Atriplex laciniata*, *Atriplex rosea*, *Artemisia tournefortiana*, *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, *Oxyria amaranthoides*, *Polypogon monspeliensis*, *Torilis arvensis*. Neither have the above named species been quoted by Müller (1911) or Holzfuss (1937—1941), this proving their earlier extinction on the area under study. From among the species noted in the period 1900—1941, the presence of 99 species has not at present been confirmed. On the other hand, some species new for Szczecin were recorded, one of which (*Oenothera ammophila* Focke) is new for Poland. The species no more found at present are marked in the systematic list by parentheses around the serial numbers, and new species by a cross added to the number.

The comparison of the flora of Szczecin with that of six other Polish cities and of Berlin shows the greatest similarity of this flora with that of Gdańsk, the most prominent common feature consisting in a large number of the same species in both these cities. The Szczecin flora has also a strong resemblance to the flora of Poznań, Łódź and Wrocław. The resemblance with the flora of Berlin is low. In spite of close traffic connections in the past, the differences in the specific composition of the flora of these two cities result from their different character and technical state: Szczecin is a port with extensive areas of greenery, whereas Berlin is an inland city known according to Scholz (1950) as "the concrete desert".