MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. XXXIX, 1973

MARCIN PLIŃSKI

GLONY SOLNISK PODŁĘCZYCKICH

The algae of salt marshes near Łęczyca,
Central Poland

WARSZAWA

Wydano z zasłku
Polskiej Akademii Nauk

ADRES REDAKCJI — ADRESSE DE LA RÉDACTION
WARSZAWA, AL. UJAZDOWSKIE 4

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE — WARSZAWA 1973

Wydanie I. Nakład 400 + 80 egz. Ark. wyd. 7,75. Ark. druk. 5,75 + 4
wklejki kredowe dwustronne. Papier druk. sat. III kl. 80 g. 70×100 cm.
Oddano do składu w październiku 1972 r. Podpisano do druku w kwiet-
niu 1973 r. Druk ukończono w kwietniu 1973 r. Zam. nr 2716. R-28.
Cena zł 32.—

LUBELSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE IM. PKWN W LUBLINIE

WSTĘP

Solniska, czyli tereny związane ze stałym dopływem silnie zmineralizowanych wód, obejmują w klimacie umiarkowanym albo zbiorniki wodne, albo związane z nimi zmineralizowane gleby. Opracowań naukowych dotyczących zagadnień solniskowej flory i fauny jest stosunkowo mało. Solniskami Polski zajmowali się przeważnie botanicy (Kozłowski 1890; Namysłowski 1914 a, b; Kobendza 1922; Torka 1923; Liebetanz 1925; Medwecka-Kornaś 1952; Mądalski 1954; Kornaś 1957; Piotrowska 1961; Wilkoń-Michalska 1963; Olaczek 1963; Kadłubowska i Pliński 1967; Pliński 1969).

Pierwszą pracą, traktującą o glonach solnisk z terenu Polski, jest publikacja Kozłowskiego (1890) pt. „Przyczynek do flory wodorostów z okolic Ciechocinka”. Autor podaje w tej pracy 25 gatunków solniskowych. Namysłowski (1914 a, b) opracował mikroflorę solanek karpackich z miejscowości: Kaczyka, Przebieczany, Srogów, Solec, Stanyła i Stebnik oraz podziemnych słonych źródeł okolic Wieliczki, Bochni i Kałusza. W nadziemnych solankach autor ten znalazł ogółem 58 gatunków.

Torka (1923) wyodrębnił ze solnisk pod Szubinem i Inowrocławiem 38 gatunków okrzemek. W pracy Liebetanz (1925) scharakteryzowane zostały pod względem systematyczno-ekologicznym glony słonych zbiorników wodnych okolic Inowrocławia i Słonaw. Mikroflora okolic Inowrocławia reprezentowana była przez 147 gatunków, w słonych zaś zbiornikach okolic miejscowości Słonawy wyodrębniono 190 gatunków. Doniesienia Kadłubowskiej i Plińskiego (1969) dotyczą solnisk podozorkowskich koło Łodzi.

Pragnę w tym miejscu wyrazić głęboką wdzięczność Pani Docent Dr Joannie Zofii Kadłubowskiej za wiele cennych rad i wskazówek, przeprowadzenie szeregu krytycznych dyskusji oraz sprawdzenie oznaczeń niektórych gatunków glonów.

Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Drowi Jakubowi Mowszowiczowi — Kierownikowi Katedry Systematyki i Geografii Roślin za zainteresowanie przebiegiem i postępami tej pracy.

Panu Drowi Romualdowi Olaczekowi dziękuję za wprowadzenie mnie

w teren, udostępnienie niektórych materiałów oraz sprawdzenie oznaczeń kilku roślin naczyniowych.

Dziękuję również Panu Profesorowi Drowi Feliksowi Różyckiemu za sprawdzenie rozdziału dotyczącego budowy geologicznej i genezy solnisk podłączyczych oraz Panu Mgrowi Mirosławowi Rakowskiemu za wykonanie analizy chemicznej wody z dnia 19 X 1969 roku.

CEL I METODA PRACY

Niniejsza praca stanowi dalszy ciąg badań nad poznaniem mikroflory solanek, czyli wód ze znaczną koncentracją jonów chloru i sodu. W ramach tej pracy podjęto opracowania mikroflory solanek śródlądowych, położonych w powiecie łęczyckim (rejon torfowisk pod Łęczycą).

Celem pracy było: 1) oznaczenie i opisanie glonów torfowisk podłączyczych, 2) wyróżnienie glonów występujących w niektórych zbiorowiskach i zespołach roślin naczyniowych i ramienic opisanych na tym terenie przez Olaczka (1963, 1967).

Próby glonów pobierane były w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych w następujących terminach: w roku 1968 — 14 i 29 maja, 19 czerwca, 22, 25, 27 i 29 lipca, 15 i 29 sierpnia, 21 i 22 września, 9 i 10 listopada, w 1969 roku — 25, 26 i 27 kwietnia, 7 maja, 13 i 24 czerwca, 1, 5 i 15 lipca, 14 sierpnia, 17 września, 1 i 19 października i 8 grudnia.

Zbiór glonów dokonywano siatką planktonową z gazy młyńskiej nr 25. Z płytkich zbiorników wodnych (wysychające latem, zarośnięte i nieduże zbiorniki na łąkach, zarastające doły potorfowe, płytkie rowy, rozlewiska przy źródłach) pobierano bezpośrednio próby mułu. Podczas pobierania prób każdorazowo we wszystkich stanowiskach mierzono temperaturę powietrza i wody.

Zebrany materiał opracowywano bezpośrednio po dokonaniu zbioru, następnie, w celu dalszej analizy, konserwowano w 4% roztworze formaliny, okrzemki zaś oznaczano po odpowiednim spreparowaniu i gotowaniu w stężonych kwasach nieorganicznych (Siemińska 1964).

Głony oznaczano posługując się mikroskopem typu MBB 1 wytwórni OMO przy użyciu imersji wodnej oraz pleuraksu. Wykonano preparaty w pleuraksie i w glicero-żelatynie. Mikrofotografie interesujących gatunków glonów wykonano posługując się nasadką typu Carl Zeiss Jena.

Materiał dowodowy, tj. próby glonów, mikrofotografie oraz preparaty w pleuraksie i glicero-żelatynie, został zdeponowany w Zakładzie Algologii Katedry Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego.

W celu opisanie glonów towarzyszących danym zbiorowiskom czy zespołom roślin naczyniowych i ramienic korzystano z opracowań fitosocjologicznych Olaczka (1963, 1967). Z dołów potorfowych zarastających przedstawicielami zespołu *Scirpo-Phragmitetum* oraz pokrytych gatunkami rzęś próby glonów pobierane były bezpośrednio siatką planktonową. Plechy *Cladophora fracta*, *Enteromorpha intestinalis* i *Chara his-*

pida oraz po kilka egzemplarzy *Ceratophyllum demersum* i *Elodea canadensis* pobierano z dołów potorfowych kotwicą, następnie umieszczano w słojach i utrwalano 4% formaliną na miejscu.

W przypadku prób glonów z zespołów roślin halofilnych pobierano: 1) wilgotny muł między pędami *Salicornia brachystachya*, 2) zielone plechy *Rhizoclonium* między pędami *Salicornia* oraz 3) plechy rodzaju *Vaucheria*. Część materiału z danej próby utrwalano w terenie 4% formaliną, natomiast resztę próby przywożono na żywo i w pracowni rozkładano w szalkach Petriego lub naczyniach z polistyrenu umieszczonych na podstawie z wilgotną bibułą i nakrywano je pokrywą szklaną.

Do scharakteryzowania częstości występowania glonów przyjęto skalę Starmacha (1955, s. 107). Ilościowych obliczeń szacunkowych dokonano przy powiększeniu 224 ×.

W celu dokładniejszej charakterystyki ekologicznej terenu dokonano pomiaru pH wody wytyczonych stanowisk przy pomocy uniwersalnego papierka lakmusowego oraz pH-metru typu Ba. Wykonano również oznaczenia ilości jonów Cl^- metodą Mohra (Just i Hermanowicz 1964).

Przy oznaczaniu glonów posługiwano się podstawowymi kluczami i opracowaniami monograficznymi poszczególnych jednostek taksonomicznych: *Cyanophyta* (Jelenkin 1949; Starmach 1966), *Euglenophyta* (Huber-Pestalozzi 1955; Popowa 1951), *Pyrrophyta* (Huber-Pestalozzi 1968; Kisielew 1954), *Chrysophyceae* Starmach 1968), *Bacillariophyceae* (Siemińska 1964; Zabelina i inni 1951), *Xanthophyceae* (Starmach 1968), *Chlorophyta* (Deduszenko-Szczegolewa i inni 1959; Fott i Novakova 1969; Heering 1914, 1921; Korszykow 1953; Kosinskaja 1951; Legnerova 1969, Lemmermann i inni 1915; Migula 1909; Pascher 1927; Printz 1964; Rehakova 1969; Sulek 1969; Uherkovich 1966, West W. i West G. S. 1904 - 1923), *Charophyta* (Dąbbska 1964).

Stosowane w pracy skróty:

dł.	— długość	średn.	— średnica
szer.	— szerokość	stan.	— stanowisko
isthm.	— isthmus		

CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA TERENU

Obszar badań

Teren objęty badaniem leży prawie w geometrycznym środku Polski (51°57' szerokości geograficznej północnej; 19°04' - 19°15' długości geograficznej wschodniej). Pod względem administracyjnym znajduje się w granicach powiatu łęczyckiego (woj. łódzkie).

Solniska podłęczyckie obejmują pradolinę warszawsko-berlińską na odcinku od linii łączącej miejscowości Łęczyca - Topola Królewska do linii

Stanowisko Station	Data — Date																							
	26 IX 1968			18 VII 1968			10 XI 1968			29 IV 1969			3 VII 1969			20 IX 1969								
	mg/l	Cl ⁻	pH	mg/l	Cl ⁻	pH	mg/l	Cl ⁻	pH	mg/l	Cl ⁻	pH	mg/l	Cl ⁻	pH	mg/l	Cl ⁻	pH						
1a	35		7,5	35		7,0	1028		7,0	1938		7,0	1581		7,0	2589		7,5	2316		7,5	7,5	7,0	
1b	35		7,3	35		7,0				35		7,0	35		7,0					35		7,0	7,0	7,0
1c	70		7,5	35		7,5				35		7,5	35		7,5	106		7,5		70		7,5	7,5	7,5
1d	248		7,5	106		7,5				70		7,5	70		7,5	177		7,5		106		7,5	7,5	7,5
1e	106		7,5	70		7,0				70		7,5	35		7,5	—		7,5		70		7,5	7,5	7,5
2a	2516		7,0			7,0	1028		7,0	1938		7,0	1581		7,0	2589		7,5		2316		7,5	7,5	7,5
2b	921		6,4			6,8	673		6,5	819		6,5	719		6,8	1023		6,8		969		6,8	6,8	6,8
2c	1244		7,0			7,0	780		7,0	914		7,0	884		6,8	1269		6,8		1119		6,8	6,8	6,8
2d	638		6,5			7,0	514		7,0	592		7,0	614		6,5	816		6,5		619		6,5	6,5	6,5
2e	1169		7,0			7,0	633		7,0	869		7,0	782		7,0	1238		7,0		892		7,0	7,0	7,0
2f	319		7,0			7,0	233		7,0	285		7,0	249		7,0	321		7,0		269		7,0	7,0	7,0
3a	1559		7,0			7,0	1131		7,0	1228		7,0	1108		7,0	1628		7,0		1412		7,0	7,0	7,0
3b	1669		7,0			7,0	1514		7,0	1538		7,0	1514		7,0	1669		7,0		1638		7,0	7,0	7,0
3c	1979		7,0			7,0	1673		7,0	1780		7,0	1669		7,0	1919		7,0		1850		7,0	7,0	7,0
3d	1779		7,0			7,0	1531		7,0	1592		7,0	1419		7,0	1738		7,0		1669		7,0	7,0	7,0
4a	638		6,5			7,0	514		7,0	568		7,0	497		7,0	638		7,0		603		7,0	7,0	7,0
4b	992		7,0			7,0	738		7,0	816		7,0	745		7,0	958		7,0		887		7,0	7,0	7,0
4c	2233		6,5			7,0	1985		7,0	2022		7,0	1561		7,0	2271		7,0		2129		7,0	7,0	7,0
4d	1453		7,0			7,0	921		7,0	923		7,0	852		7,0	1420		7,0		1242		7,0	7,0	7,0
4e	1169		7,0			7,0	710		7,0	1029		7,0	958		7,0	1207		7,0		1065		7,0	7,0	7,0
4f	3169		7,0			7,0	2446		7,0	2484		7,0	2306		7,0	2590		7,0		2377		7,0	7,0	7,0
4g	1410		7,0			7,0	898		7,0	1207		7,0	781		7,0	1536		7,0		1359		7,0	7,0	7,0
4h	850		6,8			6,8	401		6,8	701		6,5	745		6,5	923		6,8		745		6,5	6,5	6,5
4i	319		7,0			7,0	221		7,0	248		7,0	213		7,0	355		7,0		248		7,0	7,0	7,0
4j	280		7,0			7,0	177		7,0	248		7,0	177		7,0	284		7,0		177		7,0	7,0	7,0

5a	213	7,0	142	7,0	177	7,0	106	7,0	248	7,0	177	7,0
5b	106	7,0	106	7,0	70	7,0	106	7,0	142	7,0	106	7,0
5c	426	7,0	339	7,0	339	7,0	284	7,0	461	7,0	339	7,0
5d	70	7,0	35	7,0	35	7,0	35	7,0	106	7,0	70	7,0
5e	603	7,0	426	7,0	390	7,0	355	7,0	603	7,0	390	7,0
6a	70	8,0	35	8,0	70	8,0	35	7,0	70	7,0	70	7,0
6b	35	8,0	35	8,0	35	8,0	35	7,0	70	7,0	70	7,0
7a	284	7,5	213	8,0	213	8,0	248	7,0	284	7,0	248	7,0
7b	777	7,3	710	7,0	710	7,0	710	7,0	816	7,0	710	7,0
7c	603	7,5	426	7,5	532	7,5	426	8,0	639	8,0	568	8,0
7d	1065	7,5	639	7,5	816	7,5	603	8,0	1065	7,8	781	7,8
7e	2233	7,5	1843	7,5	1916	7,5	1809	8,0	2271	7,5	1843	7,5
7f	3686	7,6	2942	7,5	2839	7,5	2839	8,0	3686	7,5	2981	7,5
7g	1169	6,8	639	7,0	745	7,5	603	7,0	1207	7,5	852	7,5
7h	2410	7,5	1809	7,0	1774	7,0	1845	8,0	2129	7,5	2235	7,5
7i	850	7,0	674	7,0	710	7,0	674	8,0	887	7,0	816	7,0
7j	1129	7,0	781	7,0	781	7,0	816	8,0	1136	7,0	816	7,0
7k	1098	7,0	639	7,0	710	7,0	674	8,0	1029	7,0	958	7,0
7l	815	7,0	602	7,0	710	7,0	602	8,0	816	7,0	815	7,0
7m	531	7,0	390	7,0	461	7,0	355	8,0	568	7,0	532	7,0
7n	1453	7,0	958	7,0	887	7,0	781	8,0	1242	7,0	1242	7,0
7o	532	7,0	460	7,0	426	7,0	426	8,0	532	7,0	461	7,0
7p	213	7,0	177	7,0	213	7,0	177	8,0	248	7,0	213	7,0
7r	195	7,0	177	7,0	177	7,0	177	8,0	213	7,0	177	7,0
7s	177	7,0	106	7,0	177	7,0	70	8,0	213	7,0	213	7,0
7t	106	7,0	70	7,0	70	7,0	106	8,0	106	7,0	106	7,0
7u	70	7,0	70	7,0	70	7,0	70	8,0	70	7,0	35	7,0
8a	70	7,2	35	7,0	35	7,0	35	8,0	70	7,0	70	7,0
8b	70	7,5	35	7,5	35	7,5	35	7,5	35	8,0	35	8,0
8c	35	7,5	35	8,0	35	7,5	35	7,5	70	8,0	35	8,0

Analiza chemiczna wody z dnia 19 X 1969
Chemical water analysis of the 19 X 1969

Stanowisko Station	Ca ⁺⁺ (mg/l)	Mg ⁺⁺ (mg/l)	Na ⁺ (mg/l)	K ⁺ (mg/l)	SO ₄ ⁻⁻ (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	O ₂ (mg/l)
5b	77,1	24,0	59,0	10,8	345,5	120,0	9,4
2c	160,3	41,0	300,0	51,0	115,1	1170,0	7,6
4d	180,3	35,0	300,0	21,0	86,4	1300,0	9,0
7d	102,2	33,0	300,0	27,2	353,8	1080,0	1,1
7e	168,3	41,0	368,0	27,2	82,3	1700,0	—
7f	208,6	83,0	636,0	31,6	16,5	3725,0	4,2
7r	70,1	24,0	118,0	7,8	61,7	255,0	10,0
8a	95,2	76,0	232,0	24,8	12,3	70,0	18,4

łączącej Wichrów - Zawada. Badania obejmowały teren między następującymi miejscowościami: od południa — Łeczyca, Leszcze, Wilczkowice, Wilczkowice Kolonia, Wichrówek, Bronno; od północy — Topola Królewska, Błonie, Zawada. Na tym terenie wyznaczono 56 stanowisk (Ryc. 1). Na linii Wilczkowice - Błonie zaznacza się wyraźnie skomasowanie stanowisk ze względu na występujące w tej strefie najsilniejsze zasolenie.

Ukształtowanie powierzchni

Solniska podłęczyskie znajdują się na zachodnim krańcu Kotliny Warszawskiej w obszernym obniżeniu pomiędzy Wyżyną Łódzką a Wysoczyzną Kujawską, zwanym czasami Niecką Łęczycką (Lencewicz i Kondracki 1964). Jest to płaska nizina, pochylona nieznacznie ku północy, będąca terasą denudacyjną pradoliny warszawsko-berlińskiej (Lencewicz 1927). Od północy ogranicza ją równoleżnikowa bruzda pradoliny, zaś od południa krawędź wyżyny dyluwialnej na linii Bibianów - Chrząstów Stary. Płaskie dno pradoliny obecnie pocięte jest rowami, kanałami odwadniającymi oraz dolami potorfowymi, o głębokości 1 - 3 m.

Dno pradoliny położone jest na wysokości 101 - 102 m, n.p.m.; szerokość jego wynosi: między Łęczycą a Topolą 1600 m, między Wilczkowicami a Błoniem 2000 m, między Bronnem a Zawadą 1700 m. Dno pradoliny osiąga kulminację pomiędzy Wilczkowicami Starymi a wydumą w Błoniu i w tym właśnie miejscu przebiega dział wodny Bzury i Neru, czyli Wisły i Odry, nie zaznaczający się w ukształtowaniu terenu (Olaček 1963). Stoki pradoliny nie są strome, niemniej są bardzo wyraźnie zaznaczone. Jewtuchowicz (1967) uważa, że kształtowanie się morfologii badanego terenu zależało od dwóch czynników: lodowców i tektoniki.

Klimat i gleby

Opracowany teren objęty jest izotermą roczną 8°C; izoterma lipca wynosi 18°C, stycznia zaś 2°C. Amplituda temperatur w ciągu roku wy-

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk na terenie solnisk podłęczyckich

Fig. 1. Distribution of the investigated salt marshes near Łęczyca

Fot. 1. Leszcze, stanowisko (station) 2c

Fot. 2. Leszcze, stanowisko (station) 2f

Fot. 3. Błonie, stanowisko (station) 3b

Fot. 4. Wilczkowice, stanowisko (station) 4d

Fot. 5. Wilczkowice, stanowisko (station) 4c

Fot. 6. Wilczkowice, stanowisko (station) 4f

Fot. 7. *Chara hispida* L., Blonie, stanowisko (station) 7r

Fot. 8. Wichrówek, stanowisko (station) 5b

nosi około 21°C (Roczniki Meteorologiczne). Pokrywa śnieżna zalega około 40 - 60 dni; pierwsze przymrozki jesienne występują między 22 - 27 października, ostatnie zaś na wiosnę między 25 - 30 kwietnia (cyt. wg Schmucka 1959); dni z przymrozkami jest 100 - 110 w ciągu roku. Okres wegetacyjny trwa 200 - 220 dni (Roczniki Fenologiczne). Według rejonizacji rolniczo-klimatycznej Gumińskiego (1948) i Romera (1949) powiat łęczycki położony jest na południowym skraju dzielnicy środkowej, którą charakteryzuje najniższy w Polsce opad (poniżej 500 mm rocznie). Najwięcej opadów przypada na miesiące letnie, mimo to w okresie wegetacyjnym zaznacza się wyraźny niedobór wilgotności w glebie, który wyrównany bywa dopiero jesienią. Dlatego też Olszewski (1962) zalicza ten teren do regionu agroklimatycznego umiarkowanie suchego.

Znaczna część województwa łódzkiego leży na obszarze otwartym od zachodu i z tego powodu pozostaje ono pod wpływem mas powietrza, napływających z kierunków zachodnich, północno-zachodnich i południowo-zachodnich (Mowszowicz 1962).

Warstwę gleby na badanym odcinku pradoliny warszawsko-berlińskiej stanowi gruby pokład torfu, którego miąższość dochodzi do 3,45 m. Według badań Kubiaka (1960) i Olaczka (1963) największą miąższość osiąga ten pokład w pobliżu osi pradoliny, skąd ku jej brzegom stopniowo zmniejsza się ona. Pokłady torfu w pradolinie są torfami niskimi. We wschodniej części torfowisk (od drogi Łęczyca - Topola do Wilczkowic Starych, a od północy do Zawady) występuje torf trzcinowy ze stropową warstwą torfu turzycowego; ten właśnie typ torfu znajdujemy na całym obszarze solnisk w pradolinie. Obecnie torf wyeksploatowany jest w około 75%. Doły potorfowe posiadają różne rozmiary i rozmieszczone są chaotycznie. Poziom wody utrzymuje się około 0,5 m poniżej powierzchni calizny torfowej; w upalne lata wyraźnie obniża się.

Podłoże geologiczne i geneza solnisk podłęczyckich

Obecność solnisk na terenie powiatu łęczyckiego i ich geneza wiąże się ściśle ze swoistością budowy geologicznej tego obszaru. Leży on na granicy dwu struktur geologicznych: antyklinorium kujawskiego i synklinorium łódzkiego (Pożaryski 1963), będących częścią dwu wielkich jednostek geologicznych zbudowanych z utworów ery mezozoicznej, a mianowicie: antyklinorium środkowopolskiego i synklinorium szczecińsko - łódzko - miechowskiego.

Antyklinorium kujawskie Pożaryski (1952) podzielił na dwie części: wypiętrzenie kujawskie i wyniesienie kutnowskie. Wybitną cechą tego drugiego jest występowanie struktury solnej rozciągającej się od Solcy na południu aż po Izbicę na północy. Według Pożaryskiego (1964) obecność soli kamiennej w osadach cechsztynu, powoduje ich od-

mienne niż innych skał zachowanie się w procesach tektonicznych. Tam, gdzie były grube warstwy soli, nastąpiła halokineza.

Chemiczne osady cechsztynu, dające początek wysadom solnym, wypiętrzyły się ku górze dzięki głębokim dyslokacjom poprzecznym, które powstały podczas orogenezy młodokimeryjskiej na tym właśnie odcinku antyklinorium kujawskiego. Procesy wypiętrzania obejmowały okres kredowy i trzeciorzędowy (Jewtuchowicz 1967). Pożaryski (1952) przypisuje początek tworzenia się wysadów solnych lokalnym deformacjom tektonicznym wskutek pojawienia się ruchów soli. Bodźcem ich było odpowiednio duże obciążenie narastających osadów triasowych. Dzięki temu w kajprze, a może nawet w retyku, powstawały poduszki solne i przebiecia, które w obrębie starszego mezozoiku występują wzdłuż całej antykliny łączycko-klodawskiej.

Zjawisko ruchów soli znane jest również z ZSRR (Jaworski 1962) oraz NRD (Bergman 1955; Viète 1961). Mechanikę ruchu wysadów solnych próbuje wyjaśnić Griep (1958).

Według Kolago (1957) słone źródła w okolicy Łęczycy wiążą się z dyslokacjami na terenie niecki łódzkiej. Rozmieszczenie tychże źródeł, wyraźnie ukierunkowanych W-E, odzwierciedla poprzeczny kierunek uskoku.

Fot. 9. Błonie, stanowisko (station) 7o

Fot. 10. Błonie, stanowisko (station) 7c

Reasumując można stwierdzić, że solanka, pochodząca z głęboko położonych soli cechsztyńskich, przedostaje się ku powierzchni dzięki sprzyjającym warunkom tektonicznym w postaci krzyżujących się uskóków. Podobną geologię i genezę posiadają również słone źródła Ciechocinka i innych solanek kujawskich (Samsonowicz 1954).

Geneza pradoliny warszawsko-berlińskiej na odcinku między Nerem a Moszczenicą była kilkakrotnie dyskutowana (Siemiradzki i Dunikowski 1891; Lencewicz 1927; Mikołajski 1927; Samsonowicz 1928; Thomson 1947; Poborski 1957a, b).

Próbie wyjaśnienia genezy słonych torfów na odcinku pradoliny warszawsko-berlińskiej pod Łęczycą daje Olaczek (1963). Autor ten uważa, że na podstawie rozmieszczenia roślinności halofilnej można wyjaśnić genezę zasolenia tego obszaru. Stopniowe zasolenie następowało jednocześnie z akumulacją masy torfowej. Natomiast dopływ wody zasolonej odbywał się prawdopodobnie od samego dna pradoliny lub spod dolnych krawędzi stoków na linii Wilczkowice - Błonie. Ewentualne pierwotne słone źródła, które obecnie nie są czynne, leżały na poziomie niższym od aktualnego dna pradoliny. Być może dopływ słonej wody w kierunku od dna pradoliny istnieje nadal, lecz jest jednak bardzo nieznaczny.

Fot. 11. Błonie, stanowisko (station) 7i

Fot. 12. Błonie, stanowisko (station) 7f

Fot. 13. *Salicornietum brachystachyae* W. Christ 1955, Błonie, stanowisko (station) 7h

Fot. 14. *Salicornia brachystachya* (G.F.W. Meyer) König, Wilczkowice, stanowisko (station) 4d

Fot. 15. Błonie, stanowisko (station) 7g

Fot. 16. *Enteromorpha intestinalis* (L.) Greville, Błonie, stanowisko (station) 7f

Cyanophyta

Synechocystis aquatilis Sauvageau — Średn. komórki 4-6 μ (mniejsza niż podaje Starmach 1966, s. 35). Stan.: 3c*, 7h, 7p; V i VII 1969.

Synechocystis septentrionalis Skuja — Średn. komórki 12-13 μ . Stan.: 7b; 22 VII 1968.

Synechococcus aeruginosus Nägeli — Wymiary komórki: dł. 16-28 μ , szer. 7-13 μ . Stan.: 4e; 27 VII 1968.

Z polskich solnisk notowany w Słonawach.**

Synechococcus cedrorum Sauvageau — Wymiary komórki: dł. 8-11 μ , szer. 4-5 μ . Stan.: 4c; 27 VII 1968.

Z polskich solnisk notowany w Inowrocławiu i Słonawach.

Synechococcus elongatus Nägeli — Wymiary komórki: dł. 4-6 μ , szer. 2 μ . Stan.: 3c; 27 VII 1968.

Merismopedia glauca (Ehrenberg) Nägeli — Średn. komórki 4-6 μ . Stan.: 3d, 4e, 4f, 5c, 7l, 7s; nieczęsto, wiosną i latem.

Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku, Inowrocławiu i Słonawach.

Merismopedia maior (Smith) Geitler — Średn. komórki 11-13 μ . (większa niż podaje Starmach 1966, s. 72). Stan.: 3d; 27 VII 1968.

Merismopedia punctata Meyen — Średn. komórki 2-3 μ . Stan.: 2c, 3b, 4b, 4e, 4f, 5a 5b, 5c, 7d, 7f, 7k, 7l, 7n, 7r, 7s, 8a; częsta i pospolita.

Z polskich solnisk notowana w Słonawach.

Merismopedia tenuissima Lemmermann — Średn. komórki 1,5-2,0 μ . Stan.: 4e, 5c, 7b; w maju i lipcu.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.

Microcystis aeruginosa Kützinger — Średn. komórki 4-8 μ (większa niż podaje Starmach 1966, s. 78). Stan.: 2a, 2c, 2d, 4a, 4d, 4h, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 7b, 7j, 7k, 7l, 7c, 7p, 7r, 8a, 8c; pospolita.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu.

Microcystis aeruginosa f. *flos-aquae* (Wittr.) Elenkin — Średn. komórki 3-5,5 μ . Stan.: 1b, 2a, 2b, 2e, 4c, 4h, 5c, 7b, 7c, 7e, 7k, 7m, 7o, 8c; częsta w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Nie występowała na ogół w towarzystwie gatunku.

Microcystis firma (Bréb. et Lemm.) Schmidle — Średn. komórki 1-2,5 μ . Stan.: 4c; 29 V 1968.

Microcystis incerta (Lemmermann) Starmach — Średn. komórki 1-3 μ . Stan.: 2a, 2e, 4e; w maju i czerwcu.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.

* Rozmieszczenie stanowisk na ryc. 1.

** Występowanie poszczególnych gatunków glonów na terenie polskich solnisk podano na podstawie prac Kozłowskiego (1890), Namysłowskiego (1914a, b), Raciborskiego (1910-1911), Roupperta (1913), Torki (1923), Wołoszyńskiej (1912), Liebetanz (1925), Piotrowskiej (1961), Kadłubowskiej i Plińskiego (1967) i Plińskiego (1969).

- Microcystis marginata* (Menegh.) Kützing — Średn. komórki 4 - 6 μ . Stan.: 2c, 2e, 4b, 4e, 5a, 5c; od maja do lipca.
- Microcystis wesenbergii* Komarek — Średn. komórki 4 - 6 μ . Stan.: 7s; 17 IX 1969.
- Gloeocapsa cohaerens* (Bréb.) Hollerbach — Średn. komórki 3 - 6 μ . Stan.: 4e; 21 IX 1968.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Gloeocapsa limnetica* (Lemm.) Hollerbach — Średn. komórki 6 - 6 μ . Stan.: 2c, 3a, 3b; lipiec 1968.
- Gloeocapsa minima* (Keis.) Hollerbach — Średn. komórki 2 - 3 μ . Stan.: 1a, 1d, 3b, 4a, 4b, 4c, 4h, 4i, 4j, 5a, 6b, 7b, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7m, 7n, 7p, 7r, 7s, 8a; częsta w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Gatunek z rodzaju *Gloeocapsa* najliczniej reprezentowany na badanym terenie. Notowany był na stanowisku z *Enteromorpha intestinalis* (do 3700 mg/l Cl⁻).
- Gloeocapsa minor* (Kütz.) Hollerbach — Średn. komórki 3 - 4 μ . Stan.: 7f; 24 VI 1969.
- Gloeocapsa minor* f. *dispersa* (Keiss.) Hollerbach — Średn. komórki 4 μ . Stan.: 4i; 29 V 1968.
- Gloeocapsa minuta* (Kütz.) Hollerbach — Średn. komórki 4 - 6 μ . Stan.: 2c, 7b; 19 V 1968.
- Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.
- Gloeocapsa turgida* (Kütz.) Hollerbach — Średn. komórki 15 - 33 μ . Stan.: 2b, 2c, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d; 4a, 4c, 4d, 4f, 7i, 7n, 7p, 7r, 7u, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Gomphosphaeria aponina* Kützing — Wymiary komórki: dł. 11 - 14 μ , szer. 5 - 7 μ . Stan.: 2a, 3d, 4g, 4d, 4e, 4f, 5a, 5e, 7l, 7o, 7p, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Gomphosphaeria fusca* Skuja — Wymiary komórki: dł. 3 - 5 μ , szer. 3 - 4 μ . Stan.: 2b, 4c, 7b, 7d, 7e, 7n, 7o; od maja do lipca.
- Gomphosphaeria lacustris* Chodat — Wymiary komórki: dł. 2 - 3,5 μ , szer. 2 - 3 μ . Stan.: 5b, 5c, 7c, 7d, 7i, 7k, 7m; rzadko notowana w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Gomphosphaeria năgeliana* (Un.) Lemm. — Wymiary komórki: dł. 4 - 5,5 μ , szer. 2 - 5 μ . Stan.: 4c, 5c, 7c, 7l, 7m, 7p, 7r; od maja do lipca w obu sezonach.
- Gomphosphaeria pusilla* (V. Goor.) Komarek — Wymiary komórki: dł. 2 - 4 μ , szer. 1,5 - 3 μ . Stan.: 2e; 13 VI 1969; 4e; 21 IX 1968.
- Gomphosphaeria rosea* (Sn.) Lemm. — Średn. komórki 2,5 - 3,5 μ . Stan.: 7k; 27 IV 1969.
- Lyngbya aerugineo-coerulea* (Kütz.) Gomont — Wymiary komórki: dł. 2 - 5 μ . Szer. trychomu 4 - 6 μ . Stan.: 2b, 7s, 8b; we wrześniu 1968 i 1969.
- Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.
- Lyngbya aestuarii* (Mert.) Liebmann — Wymiary komórki: dł. 2,5 - 5 μ .

Szer. trychomu 13 - 15 μ . Stan.: 4b, 4e, 4f, 5a, 5e, 8b; w maju, sierpniu i wrześniu.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu.

Lyngbya bipunctata Lemm. — Wymiary komórek: dł. 4,5 - 7 μ . Szer. trychomu 1,5 μ . Szer. nitki 2 μ . Stan.: 4h; 29 VI 1968.

Lyngbya confervoides Agardh — Wymiary komórek: dł. 3 - 4 μ . Szer. trychomu 15 μ . Szer. nitki 21 μ . Szer. pochwy 3 μ . Stan.: 5c, 7l; w lipcu 1968.

Lyngbya cryptovaginata Schkorb. — Wymiary komórek: dł. 3 - 6 μ . Szer. trychomu 5 - 8 μ . Stan.: 1a, 1c, 3b, 8a; od maja do lipca.

Lyngbya halophila Hansgrig — Wymiary komórek: dł. 2 - 3 μ . Szer. trychomu 2 μ . Szer. nitki 3 - 4 μ . Stan.: 7h; 10 XI 1968.

Lyngbya hieronymusii Lemm. — Wymiary komórek: dł. 2,5 - 5 μ . Szer. trychomu 4 - 10 μ . Stan.: 2e, 3d, 4b, 4c, 4e, 5b, 7b, 7c, 7e, 7f, 7j, 7m; często w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Lyngbya holsatica Lemm. — Wymiary komórek: dł. 1,5 - 2 μ . Szer. trychomu 3,3 μ . Stan.: 5c; 29 VII 1968.

Lyngbya kossinskajae Elenkin — Wymiary komórek: dł. 3,5 - 4,5 μ . Szer. trychomu 1,5 - 2 μ . Stan.: 4a; 29 V 1968, 9 XI 1968.

Lyngbya kützingii (Kütz.) Schmidle — Wymiary komórek: dł. 1 μ . Szer. trychomu 1 - 2 μ . Stan.: 2a, 2e, 3b, 4a, 4b, 4i, 5b, 7o; częsta jako epifit na *Cladophora*.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu.

Lyngbya limnetica Lemm. — Wymiary komórek: dł. 2 - 4 μ . Szer. trychomu 1 - 1,5 μ . Stan.: 7d, 7s, 8a; w czerwcu 1968 i we wrześniu 1968, 1969.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.

Lyngbya maior Menegh. — Wymiary komórek: dł. 3 - 5 μ . Szer. trychomu 13 - 18 μ . Stan.: 2e, 2f, 3d, 4f, 8c; w próbach letnich.

Lyngbya martensiana Menegh. — Wymiary komórek: dł. 2 - 3,5 μ . Szer. trychomu 7 - 9 μ . Stan.: 1c, 2a, 2e, 4e, 4f, 7h, 7k, 7u; od kwietnia do sierpnia.

Lyngbya perelegans Lemm. — Wymiary komórek: dł. 3 - 6 μ . Szer. trychomu 1 - 2 μ . Stan.: 7b; 22 IX 1968.

Lyngbya pusilla (Rabenh.) Hansg. — Szer. nitki 1 - 1,5 μ , przegrody poprzeczne niewidoczne. Epifit na *Cladophora*. Stan.: 4i; 29 V 1968.

Lyngbya salina Kütz. — Wymiary komórek: dł. 3 - 6 μ . Szer. trychomu 12 - 14 μ . Stan.: 2a, 2e, 3b, 4b, 5e, 7g; od maja do lipca.

Oscillatoria agardhii Gomont — Wymiary komórek: dł. 3 - 4 μ . Szer. trychomu 4 - 7 μ (większa niż podaje Starmach 1966, s. 350) Stan.: 3a; 27 VII 1968.

Oscillatoria amphibia Agardh — Wymiary komórek: dł. 7 - 9 μ , (większa niż podaje Starmach 1966, s. 344). Szer. trychomu 3 - 4 μ . Stan.: 7i; 26 IV 1969.

Z polskich solnisk notowana w Srogowie.

- Oscillatoria animalis* Agardh — Wymiary komórek: dł. 3 - 5 μ . Szer. trychomu 3,5 - 4,5 μ . Stan.: 1a; 29 V 1968, 7f; 10 XI 1968.
- Ocillatoria annae* van Goor. — Wymiary komórek: dł. 2 - 4 μ . Szer. trychomu 7 - 10 μ (o 2 μ większa niż podaje Starmach 1966, s. 323) Stan.: 4c, 7h; w maju 1968 i 1969.
- Oscillatoria bornetii* (Zukal) Forti — Wymiary komórek: dł. 3 - 5 μ . Szer. trychomu 12 - 14 μ . Stan.: 26 IV 1969.
- Oscillatoria brevis* (Kütz.) Gomont — Wymiary komórek: dł. 2 - 3,5 μ . Szer. trychomu 5 - 7 μ . Stan.: 3a, 3d, 4c, 4g, 7b, 7f, 7h, 7k, 7s; częsta w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Przebieczanach, Stebniku, Ciechocinku, Inowrocławiu i Słonawach.
- Oscillatoria brevis* f. *variabilis* (Wille) Elenkin — Wymiary komórek: dł. 2 - 2,5 μ . Szer. trychomu 6 - 6,5 μ , przy ścianach poprzecznych nieznacznie wcięte. Stan.: 4b; 29 VI 1968.
- Oscillatoria chalybaea* (Mertens) Gomont — Wymiary komórek: dł. 3 - 5 μ . Szer. trychomu 8 - 11 μ . Stan.: 2d, 3d, 4c, 7f, 7h, 7k; od kwietnia do czerwca w obu sezonach wegetacyjnych oraz we wrześniu 1969.
Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach, na badanym terenie występowała dość często.
- Oscillatoria curviceps* Agardh — Wymiary komórek: dł. 4 - 5,5 μ . Szer. trychomu 10 - 13 μ . Stan.: 4c, 4d; 29 V 1968.
- Oscillatoria granulata* Gardner — Wymiary komórek: dł. 3,5 - 4 μ . Szer. trychomu 4 μ . Stan.: 1b, 1d, 2a, 3b, 3d, 5b, 5d, 7g, 7o, 7p, 7 μ ; wiosną i jesienią w obu sezonach wegetacyjnych.
- Oscillatoria griseo-violacea* Skuja — Wymiary komórek: dł. 4 - 5 μ . Szer. trychomu 4,5 - 6 μ . Stan.: 7h; 7 VI 1969.
- Oscillatoria komarovii* Anissim. — Wymiary komórek: dł. 5 - 6,5 μ . Szer. trychomu 1,5 - 2 μ . Stan.: 7r; 19 VI 1968.
- Oscillatoria laetevirens* (Crouan) Gomont — Wymiary komórek: dł. 3,5 - 4 μ . Szer. trychomu 3 - 4 μ . Stan.: 1a, 3c, 7c, 7f, 7l; wiosną i jesienią przy zasoleniu 2700 mg/l Cl⁻ w stanowisku z *Enteromorpha intestinalis*.
- Oscillatoria lauterbornii* Schmidle — Wymiary komórek: dł. 4 - 7 μ . Szer. trychomu 2 μ . Stan.: 4c, 4f, 5b, 7e, 7h; od maja do lipca.
- Oscillatoria limosa* Agardh — Wymiary komórek: dł. 3 - 4 μ . Szer. trychomu 12 - 14 μ . Stan.: 2a, 2c, 2e, 2f, 3b, 4a, 4b, 4d, 4e, 4h, 5a, 5b, 7f, 7k, 7o, 7u; często w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu.
- Oscillatoria maior* Vaucher — Wymiary komórek: dł. 5 - 6 μ . Szer. trychomu 19 - 21 μ . Stan.: 3b, 3c, 5b, 7h, 7m, 7r; od kwietnia do czerwca.
- Oscillatoria okenii* Agardh — Wymiary komórek: dł. 2,5 - 4 μ . Szer. trychomu 7 - 8 μ . Stan.: 7c; 14 V 1968.
- Oscillatoria ornata* (Kütz.) Gomont — Wymiary komórek: dł. 2 - 4 μ . Szer.

- trychomu 8 - 14 μ (mniejsza niż podaje Starmach 1966, s. 322). Stan.: 4g; 19 X 1969.
- Oscillatoria ornata* f. *planctonica* Elenkin — Wymiary komórek: dł. 3 μ . Szer. trychomu 10 μ . Stan.: 7h; 7 V 1969.
- Oscillatoria planctonica* Wołoszyn. — Wymiary komórek: dł. 3 - 5 μ . Szer. trychomu 2 μ . Stan.: 2e, 3b, 4d, 4e, 4h, 5a, 7g; nielicznie w całym okresie wegetacyjnym.
- Oscillatoria princeps* Vaucher — Wymiary komórek: dł. 5 - 6 μ . Szer. trychomu 28 - 42 μ . Stan.: 4c, 5a, 5b; w maju i lipcu.
- Oscillatoria proboscidea* Gomont — Wymiary komórek: dł. 2 - 4 μ . Szer. trychomu 12 - 13 μ . Stan.: 7l; 19 VI 1968.
- Oscillatoria pseudogeminata* G. Schmid — Wymiary komórek: dł. 1 - 3 μ . Szer. trychomu 1 - 2 μ . Stan.: 4d; 29 V 1968; 4e; 27 VII 1968; 7f; 1 X 1969.
- Oscillatoria redeckei* van Goot — Wymiary komórek: dł. 7 - 10 μ . Szer. trychomu 2 μ . Stan.: 7b; 26 IV 1969.
- Oscillatoria sancta* (Kütz.) Gomont — Wymiary komórek: dł. 4 - 5 μ . Szer. trychomu 18 - 25 μ . Stan.: 3d, 7g, 7h; wiosną i jesienią. Szerokość trychomu jest większa niż podaje Starmach (1966, s. 322).
- Oscillatoria splendida* Greville — Wymiary komórek: dł. 5 - 6 μ . Szer. trychomu 2 - 2,5 μ . Stan.: 2a, 2c, 3a, 4a, 4b, 7g, 7j, 7o; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Oscillatoria subtilissima* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 2 - 2,5 μ . Szer. trychomu 1 μ . Stan.: 1b, 1d, 2a, 2b, 2d, 2h, 2f, 5b, 7c, 7e, 7g, 7h, 7l; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Oscillatoria tarebriformis* Agardh — Wymiary komórek: dł. 4 - 5 μ . Szer. trychomu 4 - 6 μ . Stan.: 4a; 9 XI 1968; 4f; 5 VII 1969.
- Oscillatoria tenuis* Agardh — Wymiary komórek: dł. 3 - 4 μ . Szer. trychomu 6 - 8 μ . Stan.: 3c, 3d, 4e, 4h, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7h, 7k; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Srogowie, Inowrocławiu i Słonawach.
- Spirulina albida* Kolkwitz — Szer. trychomu 1 μ . Wysokość skrętu 1,5 μ . Stan.: 4f; 5 VII 1969.
- Spirulina laxissima* G.S. West — Szer. trychomu do 1 μ (nieco większa niż podaje Starmach 1966, s. 374). Wysokość skrętu 4,5 μ . Stan.: 2e; 27 VII 1968; 7e; 10 XI 1968; 7f; 14 V 1968.
- Spirulina maior* Kütz. — Szer. trychomu 1,5 - 2 μ . Wysokość skrętu 3 - 3,5 μ . Stan.: 1d, 2c, 2d, 4e, 4h, 5b, 5c, 7a, 7b, 7e, 7f, 7h, 7i, 7k; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.
- Spirulina meneghiniana* Zanardini — Szer. trychomu 1,5 μ . Wysokość skrętu 3 - 4 μ . Stan.: 7f; 10 XI 1968; 7j; 14 V 1968.
- Spirulina tenerima* Kütz. — Szer. trychomu 0,5 μ . Wysokość skrętu 1 μ . Stan.: 7f; 1 X 1969.

Spirulina tenuissima Kütz. — Szer. trychomu 1 μ . Wysokość skrętu 4 μ . Stan.: 3a, 3b; 27 VII 1968.

Z polskich solnisk notowana w Słonawach.

Pseudanabaena catenata Lauterborn — Wymiary komórek: dł. 3 - 4 μ , szer. 2 μ . Stan.: 1a, 1e, 3b, 3d, 4b, 4c, 4h, 7d, 7i, 7o, 7p, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Notowana często na całym terenie, szczególnie obficie w próbach z mulem.

Pseudanabaena minuta Skuja — Wymiary komórek: dł. 2 - 3 μ . Szer. trychomu 2 - 4 μ (nieco większa niż podaje Starmach 1966, s. 450). Stan.: 4d; 29 V 1968.

Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs — Wymiary komórek: dł. 3 - 5 μ . Szer. trychomu 4 - 5 μ . Heterocysty cylindryczne 3 - 6 μ szerokie i 10 - 14 μ długie. Spory podłużnie cylindryczne 4 - 7 μ szerokie i 38 - 50 μ długie. Stan.: 7e; 19 VI 1968.

Cylindrospermum maius Kütz. — Wymiary komórek: dł. 3 - 5 μ , szer. 3,5 - 4,5 μ . Heterocysty 7 - 9 μ długie i 4 - 5 μ szerokie, spory 22 - 25 μ długie i 12 - 13 μ szerokie. Stan.: 4f; 29 V 1968.

Cylindrospermum stagnale (Kütz.) Bornet et Flahault — Wymiary komórek: dł. 5 - 6 μ , szer. 4 - 5 μ . Heterocysty 6 μ szerokie i 10 - 11 μ długie, spory cylindryczne 14 - 15 μ szerokie i 35 - 36 μ długie. Stan.: 4b; 27 VII 1968; 7l; 19 VI 1968.

Anabaena oscillarioides Bory — Wymiary komórek: dł. 4 - 5 μ . Szer. trychomu 4 μ . Heterocysty eliptyczne 10 μ długie i 6 - 7 μ szerokie, spory cylindryczne 20 - 28 μ długie i 8 μ szerokie, pojedyncze lub po dwie razem. Stan.: 7l; 22 VII 1968.

Anabaena sphaerica Bornet et Flah. — Wymiary komórek: dł. 4 μ . Szer. trychomu 4 - 4,5 μ . Heterocysty kuliste o średnicy 6 - 6,5 μ , spory po jednej lub dwie z obu stron heterocyst, dł. 13 - 14 μ , szer. 11 μ . Stan.: 7b; 22 VII 1968. Szerokość trychomu i szerokość spory jest mniejsza niż podaje Starmach (1966, s. 482).

Anabaena variabilis Kütz. — Wymiary komórek: dł. 2,5 - 4 μ . Szer. trychomu 4 - 5 μ . Heterocysty kuliste 5 - 6 μ , spory beczułkowate 8 - 10 μ długie. Stan.: 3a, 3b, 4b, 7b, 7d, 7e, 7f, 7h, 7j; latem i jesienią.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.

Na badanym terenie szczególnie licznie występowała w stanowiskach z *Enteromorpha intestinalis*.

Anabaena variabilis f. *tenuis* Popova — Wymiary komórek: dł. 3 μ . Szer. trychomu 3 - 3,5 μ . Heterocysty 4 μ szerokie, 5 μ długie, spory eliptyczne 4 μ szerokie, 7 μ długie. Stan.: 7f; latem i jesienią.

Nodularia harveyana (Thwait.) Thuret — Wymiary komórek: dł. 3 - 4 μ . Szer. trychomu 4 - 4,5 μ . Heterocysty nieznacznie spłaszczone o średn. 4,5 μ , spory szer. 5 - 6 μ . Stan.: 7d; 10 XI 1968, 7h; 19 VI 1968; 7i; 15 VII 1969.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu.

Nostoc kihlmanii Lemm. — Kolonie makroskopowe o średn. 2 - 4 mm. Szer. trychomu 4 - 5 μ . Heterocysty kuliste średn. 5 - 7 μ . Stan.: 7t; 24 VI 1969.

Na badanym terenie notowany w strefie wysłodzonej, w skupieniach na wilgotnym mule.

Nostoc paludosum Kütz. — Kolonie mikroskopowe. Wymiary komórek: dł. 3 - 4,5 μ . Szer. trychomu 3 - 4 μ . Heterocysty kuliste średn. 4 - 5 μ . Spory eliptyczne dł. 7 - 8 μ , szer. 4,5 - 5 μ . Stan.: 5a, 5b, 6a, 7a; w maju, lipcu i październiku.

Na badanym terenie notowany jedynie w strefie wysłodzonej.

Rivularia coadunata (Somm.) Foslie — Szer. trychomu u podstawy 6 - 7 μ . Heterocysty kuliste średn. 5 - 6 μ . Stan.: 3c; 11 VI 1968.

Calothrix clavata G.S. West — Szer. trychomu u podstawy 5 μ . Heterocysty półkuliste 4 μ . Stan.: 7l, 7n, 8a; 19 VI 1968.

Calothrix fusca (Kütz.) Bornet et Flah. — Szer. trychomu u podstawy 12 - 14 μ . Heterocysty półkuliste 10 μ . Stan.: 2e; 27 VII 1968.

Z polskich solnisk notowana w Słonawach.

Calothrix fusca f. *minutissima* V. Poljanskij — Szer. trychomu u podstawy 5 - 6 μ . Stan.: 2e; 27 VII 1968.

Tolypothrix rivularis Hansgrig — Wymiary komórek: dł. 3 - 7 μ . Szer. trychomu 6 - 7 μ . Heterocysty eliptyczne 6 μ długie. Stan.: 7u; 19 VI 1968.

Euglenophyta

Euglena acus Ehr. — Wymiary komórek: dł. 109 - 155 μ , szer. 9 - 12 μ . Stan.: 2b, 2c, 2e, 3d, 4a, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5b, 5c, 5d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k, 7l, 7m, 7p, 7u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Gatunek notowany na badanym terenie bardzo często i licznie w dołach potorfowych w wodzie o pH 7 - 8. Weherle (1939) natomiast uważa, że właściwy zakres wartości pH dla jego rozwoju to 5,8 - 6,8. Według obserwacji Huber-Pestalozziego (1955) gatunek ten może też występować przy wartości pH 7,0 - 7,4 i wyższej, co potwierdzają moje obserwacje.

Z polskich solnisk dotychczas nie podawany; notowano go w Holandii w słabo mezohalinowych wodach śródlądowych (Redeke 1932). Na solniskach podłęczyskich występował także dość licznie w strefie największego zasolenia (ok. 3000 mg/l Cl⁻) na stanowisku z *Enteromorpha intestinalis*. Gatunek ten jest szeroko rozprzestrzeniony w zarastających zbiornikach wodnych. Huber-Pestalozzi (1955) podaje go, jako charakterystyczny dla stawów, rzadko zaś występujący w dużych jeziorach i dołach potorfowych. Notowano go z Polski także w rze-

- kach (Kadłubowska 1964c, Luer-Jeziorańska 1939, Wysocka 1952a, b, 1957).
- Euglena gracilis* Klebs — Wymiary komórek: dł. 41 - 52 μ , szer. 10 - 18 μ . Stan.: 4h; 29 V 1968; 7f; 14 V 1968.
- Euglena limnophila* Lemm. — Wymiary komórek: dł. 62 - 85 μ , szer. 10 - 12 μ . Stan.: 7c; 14 VI 1968.
- Euglena minima* Francé — Wymiary komórek: dł. 19 - 26 μ , szer. 7 - 8 μ . Stan.: 2e; 25 IV 1969; 4h; 29 V 1968.
- Euglena oxyuris* Schmarda — Wymiary komórek: dł. 310 - 386 μ , szer. 28 - 35 μ . Stan.: 3d, 4b, 7m; od maja do lipca.
- Euglena pisciformis* Klebs — Wymiary komórek: dł. 27 - 32 μ , szer. 8 - 10 μ . Stan.: 2c, 2e, 3a, 3b, 5c, 6a, 7b, 7c, 7d, 7g, 7i, 7j, 7k, 7u.
- Gatunek notowany szczególnie często w okolicach Błoni.
- Euglena proxima* Dang. — Wymiary komórek: dł. 65 - 72 μ , szer. 22 - 24 μ . Stan.: 7f; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Euglena spirogyra* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 75 - 83 μ , szer. 9 - 11 μ . Stan.: 2e, 3d, 7g; od maja do lipca.
- Euglena viridis* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 55 - 70 μ , szer. 13 - 14 μ . Stan.: 2d; 29 V 1968.
- Lepocinclis ovum* (Ehr.) Lemm. — Wymiary komórek: dł. 36 - 41 μ , szer. 12 - 15 μ . Stan.: 2d, 3c, 7s; w lipcu 1968 i w czerwcu 1969.
- Gatunek notowany na badanym terenie na stanowiskach z wodą o koncentracji jonów chloru od 200 do 2000 mg/l; według Huber-Pestalozziego (1955) szeroko rozprzestrzeniony w różnych biotopach, notowany nawet w wodach mezohalinowych.
- Phacus acuminatus* Stokes — Wymiary komórek: dł. 28 - 32 μ , szer. 25 - 28 μ . Stan.: 2f, 3c, 4b, 4c, 5d, 6b, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k, 7m, 7n; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Phacus brachykentron* Pochm. — Wymiary komórek: dł. 29 - 35 μ , szer. 18 - 21 μ . Stan.: 4c, 4i, 7k, 7l, 7m; w maju i czerwcu 1968.
- Phacus caudatus* Hübn. — Wymiary komórek: dł. 39 - 46 μ , szer. 19 - 23 μ . Stan.: 7h; 7 V 1968.
- Phacus curvicauda* Swirenko — Wymiary komórek: dł. 26 - 31 μ , szer. 21 - 23 μ . Stan.: 2a, 2b, 3a, 3c, 4d, 7b, 7d, 7e, 7f, 7h, 7i, 7j, 7k, 7l, 7m, 7r; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Phacus helicoides* Pochm. — Wymiary komórek: dł. 123 - 156 μ z kolcem, 106 - 125 μ bez kolca, szer. 48 - 59 μ , długość i szerokość komórki większa niż podaje Huber-Pestalozzi (1955, s. 226). Stan.: 5b; 29 V 1968; 5c; 29 VII 1968.
- Phacus longicauda* (Ehr.) Dujardin — Wymiary komórek: dł. 138 - 165 μ z kolcem, 63 - 82 μ bez kolca, szer. 52 - 74 μ . Stan.: 3d, 4a, 7b, 7m, 7p; od maja do sierpnia.
- Z polskich solnisk notowany w Słonawach.
- Phacus mirabilis* Pochm. — Wymiary komórek: dł. 28 - 39 μ z kolcem,

17 - 25 μ bez kolca, szer. 15 - 23 μ . Stan.: 2c, 2f, 3d, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 7b, 7c, 7f, 7h, 7j, 7k, 7l, 7r; od maja do sierpnia.

Notowany często i licznie w stanowiskach o wyższej koncentracji jonów chlorkowych w wodzie. Występował także w stanowisku z *Enteromorpha intestinalis*.

Phacus orbicularis Hübn. — Wymiary komórek: dł. 55 - 82 μ z kolcem, 48 - 66 μ bez kolca, szer. 35 - 48 μ . Stan.: 3d; 19 VI 1968; 7e; 19 VI 1968.

Phacus oscillans Klebs — Wymiary komórek: dł. 23 μ , szer. 9 μ . Stan.: 7f; 26 IV 1969.

Phacus platalea Drez. — Wymiary komórek dł. 54 - 63 μ z kolcem, 43 - 50 μ bez kolca, szer. 30 - 33 μ . Stan.: 7e; 14 V 1968.

Phacus pleuronectes (O.F.M.) Dujardin — Wymiary komórek: dł. 50 - 69 μ z kolcem, 40 - 55 μ bez kolca, szer. 29 - 36 μ . Stan.: 2a, 2b, 2c, 3d, 4e, 4h, 5b, 5d, 7f, 7h, 7m, 7u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowany w Inowrocławiu i Słonawach.

Na badanym terenie występował także w strefie największego zasolenia (w stanowisku z *Enteromorpha intestinalis*).

Phacus pyrum (Ehr.) Stein — Wymiary komórek: dł. 40 - 51 μ z kolcem, szer. 15 - 20 μ . Stan.: 1a, 2c, 3c, 4a, 4f, 5c, 7a, 7c, 7d, 7e, 7f, 7h, 7j, 7k, 7l, 7o, 7u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Phacus rudicula (Playf.) Pochm. — Wymiary komórek: dł. 36 - 52 μ z kolcem, 23 - 30 μ bez kolca, szer. 14 - 21 μ . Stan.: 2c, 3d, 5a, 5b, 7f, 7h, 7j; od maja do sierpnia.

Phacus tortus (Lemm.) Skv. — Wymiary komórek: dł. 73 - 91 μ z kolcem, 61 - 79 μ bez kolca, szer. 36 - 43 μ . Stan.: 5b, 7b, 7j, 7l; od maja do lipca.

Trachelomonas hispida (Perty) Stein em. Defl. — Wymiary komórek: dł. 28 - 31 μ , szer. 22 - 25 μ . Stan.: 3b, 3d, 5c, 5d, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k, 7l; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Trachelomonas oblonga Lemm. — Wymiary komórek: dł. 12 - 16 μ , szer. 10 - 12 μ . Stan.: 1d, 5d, 5e, 7c, 7f, 7j; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Trachelomonas volvocina Ehr. — Średn. komórek 10 - 22 μ . Stan.: 1c, 1e, 5d, 6b, 7d, 7f, 7j, 7k, 7l; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Pyrrophyta

Ceratium carolinianum (Bail.) Jörg. — Wymiary komórek: dł. 130 μ , szer. 86 μ . Stan.: 5b; 29 V 1968.

Ceratium cornutum (Ehr.) Clap. et Lachm. — Wymiary komórek: dł. 113 - 128 μ , szer. 78 - 81 μ . Stan.: 3d; 19 VI 1968; 7s; 19 VI 1968.

Gymnodinium aeruginosum Stein — Wymiary komórek: dł. 33 - 35 μ , szer. 24 - 25 μ . Stan.: 3d, 4i, 7h; od maja do lipca.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu.

Gymnodinium paradoxum Schilling — Wymiary komórek: dł. 35 - 42 μ ,

szer. 30 - 35 μ . Stan.: 3d, 7e, 7i, 7j, 7l, 7m; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Peridinium cinctum (O.F.M.) Ehr. — Wymiary komórek: dł. 46 - 60 μ , szer. 44 - 59 μ . Stan.: 1b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 4b, 5d, 6b, 7g, 7i, 7j, 7k, 7m, 7n; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Peridinium inconspicuum Lemm. — Wymiary komórek: dł. 18 - 23 μ , szer. 15 - 19 μ . Stan.: 3b, 4i, 5c, 7b, 7l; wiosną i jesienią.

Peridinium bipes f. *tabulatum* (Ehr.) Lef. — Wymiary komórek: dł. 40 - 51 μ , szer. 35 - 48 μ . Stan.: 1c, 2a, 2f, 4a, 4b, 4h, 7c, 7g, 7j, 7p, 8a - c; wiosną i jesienią.

Chrysophyceae

Dinobryon sertularia Ehr. — Domki 32 - 40 μ dł., 10 - 12 μ szer., średn. cyst. 14 - 16 μ . Stan.: 1e, 4e, 4h, 5d, 6a, 7n, 7p, 8b; od maja do sierpnia.

Synura uvella Ehr. — Wymiary komórek: dł. 25 - 32 μ , szer. 10 - 13 μ . Średn. kolonii 100 - 130 μ . Stan.: 4a, 4h, 4i, 5b; w maju 1968.

Bacillariophyceae

Melosira granulata (Ehr.) Ralfs — Średn. komórek 8 - 14 μ , wysokość okrywy 7 - 12 μ . Stan.: 7b; 14 V 1968.

Melosira variana Ag. — Średn. komórek 12 - 18 μ , wysokość okrywy 10 - 13 μ . Stan.: 6b, 7m, 7s; od kwietnia do lipca 1969.

Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku i Pełczyskach.

Cyclotella comta (Ehr.) Kütz. — Średn. komórek 25 - 37 μ , 13 - 15 prążków w 10 μ . Stan.: 4b, 4i, 7c, 8b; w maju i jesienią.

Cyclotella kützingiana Thw. — Średn. komórek 13 - 18 μ , 11 - 13 prążków w 10 μ . Stan.: 1d, 2e, 4b, 4g, 7b, 7n; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku.

Cyclotella meneghiniana Kütz. — Średn. komórek 15 - 23 μ , 8 prążków w 10 μ . Stan.: 3a, 3b, 3d, 4d, 5a, 5c, 7f, 7j, 7k, 7n, 7s, 7t, 7u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku, Inowrocławiu i Słonawach.

Cyclotella meneghiniana f. *plana* Fricke — Średn. komórek 18 - 20 μ , 8 prążków w 10 μ . Stan.: 7t; 17 IX 1969.

Cyclotella striata (Kütz.) Grun. — Średn. komórek 18 - 25 μ , 8 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 2b, 7e, 7f, 7h, 7j, 7k, 7m, 7n, 7p; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Stephanodiscus astraia (Ehr.) Grun. — Średn. komórek 26 - 34 μ , 9 prążków w 10 μ . Stan.: 7d, 7f, 7l; w maju i lipcu.

Stephanodiscus hantzschii Grun. — Średn. komórek 15 - 19 μ , 9 prążków

- w 10 μ . Stan.: 3a, 7d, 7f, 7j, 7l, 7n, 7t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Tabellaria flocculosa* (Roth.) Kütz. — Wymiary komórek: dł. 39 - 50 μ , 15 - 17 prążków w 10 μ . Stan.: 7h; 15 VII 1969.
- Diatoma elongatum* (Lyng.) Ad. — Wymiary komórek: dł. 47 - 81 μ , szer. 2 - 4 μ . 6 - 8 żeberk w 10 μ . Stan.: 1b, 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 3a, 3b, 3d, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4g, 4h, 4i, 4j, 5b, 5c, 5d, 7a, 7b, 7c, 7e, 7h, 7i, 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7p, 7r, 7s, 7t, 8a; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Diatoma elongatum* var. *tenue* (Ag.) V. H. — Wymiary komórek: dł. 27 - 35 μ , szer. 2 - 3 μ . Stan.: 4i, 5a, 7b, 7c, 7h, 7i; latem i jesienią.
- Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu.
- Diatoma vulgare* Bory — Wymiary komórek: dł. 31 - 48 μ , szer. 12 - 13 μ . 6 - 8 żeberk w 10 μ . Stan.: 2f, 4a, 7g; od kwietnia do lipca.
- Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu, Słonawach i Pełczyskach.
- Diatoma vulgare* var. *capitulatum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 28 - 35 μ , szer. 10 μ . Stan.: 4a, 4b, 2f; w maju i lipcu.
- Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Diatoma vulgare* var. *ehrenbergii* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 58 - 67 μ , szer. 11 μ . Stan.: 2f; 25 IV 1969.
- Diatoma vulgare* var. *productum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 42 μ , szer. 11 μ . Stan.: 4a; 7 V 1969.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Opephora martyi* Héríb. — Wymiary komórek: dł. 22 - 28 μ , szer. 5 μ . 6 prążków w 10 μ . Stan.: 5a, 5c, 7r; w lipcu, wrześniu i październiku.
- Fragilaria capucina* Desm. — Wymiary komórek: dł. 46 - 79 μ , szer. 4 μ . 14 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 2b, 1b, 2f, 4c, 4e, 4h, 5a, 5b, 5c, 5d, 7b, 7r, 7p, 8a, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Srogowie.
- Fragilaria capucina* var. *mesolepta* Rabh. — Wymiary komórek: dł. 34 μ , szer. 4 μ . Okrywy w środku nieco przewężone. Stan.: 1b, 4b, 4c, 5a, 5b; wiosną i jesienią.
- Fragilaria construens* (Ehr.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 13 - 19 μ , szer. 8 - 9 μ . 14 prążków w 10 μ . Stan.: 4h; 25 IV 1969; 6b; 7 V 1969.
- Fragilaria construens* var. *subsalina* Hust. — Wymiary komórek: dł. 18 μ , szer. 7 μ . Okrywy eliptyczne. Stan.: 4j; 29 V 1968; 6b; 7 V 1969.
- Odmiana towarzyszy gatunkowi.
- Fragilaria crotonensis* Kitt. — Wymiary komórek: dł. 66 - 89 μ , szer. 3 μ . 15 - 16 prążków w 10 μ . Stan.: 5b, 7b, 7j, 7s; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Fragilaria intermedia* Grun. — Wymiary komórek: dł. 20 - 31 μ , szer. 3 μ ,

- 10 prążków w 10 μ . Stan.: 1c, 4a, 4h, 4j, 5c, 7c, 7k, 7m, 7n, 7p, 7s, 8a;
w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Fragilaria pinnata* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 6 - 18 μ , szer. 2 - 3 μ .
10 prążków w 10 μ . Stan.: 4c; 5 VII 1969; 7t; 17 IX 1969.
- Synedra acus* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 112 - 159 μ , szer. okrywy
w części środkowej 5 μ . 12 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 2e, 2f, 4a, 4b,
4j, 5a, 5b, 5c, 7b, 7k, 7l, 7r, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku.
- Synedra amphicephala* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 34 - 56 μ , szer. 3 μ .
11 - 12 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1e, 3b, 4b, 5b, 5c, 6b, 7b, 7j, 7l;
w kwietniu i maju.
Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Synedra capitata* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 212 - 386 μ , szer. 8 - 11 μ .
9 - 10 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 1e, 4b, 4h, 4j, 5b, 5c, 7m, 7r, 7s, 8b;
od maja do lipca i we wrześniu.
Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku.
- Synedra minuscula* Grun. — Wymiary komórek: dł. 14 - 27 μ , szer. 3 μ .
15 - 16 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 1d, 2b, 2f, 3b, 4a, 4b, 4i, 4j, 6b,
7b, 7o, 7u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Synedra pulchella* (Ralfs) Kütz. — Wymiary komórek: dł. 63 - 120 μ , szer.
5 - 6 μ . 14 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b,
4c, 4e, 4f, 4h, 4i, 4j, 5a, 5b, 5d, 7b, 7d, 7e, 7g, 7i, 7j, 7k, 7l, 7m,
7n, 7o, 7s, 7t, 7u, 8a, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu, Słonawach i Pełczys-
kach.
- Synedra tabulata* (Ag.) Kütz. — Wymiary komórek: dł. 59 - 116 μ , szer.
3 - 4 μ . 9 - 10 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f,
3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4h, 4i, 4j, 5a, 5c, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g,
7h, 7i, 7j, 7k, 7l, 7m, 7o, 7p, 7s, 8a, 7u, 8b; w ciągu całego okresu
wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Kaczyce, Stanyli i Pełczyskach.
- Synedra tabulata* var. *acuminata* Grun. — Wymiary komórek: dł. 31 -
86 μ , szer. 4 - 5 μ . 13 - 14 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 2b, 2c, 4c, 4d, 4e,
5a, 7h, 7i, 7o; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Synedra tabulata* var. *parva* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 19 -
37 μ , szer. 4 - 6 μ . 17 - 18 prążków w 10 μ . Stan.: 1d, 2e, 2f, 3a, 4a,
4b, 4e, 4f, 7a, 7b, 7j; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pełczyskach.
- Synedra ulna* (Nitzsch) Ehr. — Wymiary komórek: dł. 72 - 186 μ , szer.
6 - 7 μ . 9 - 10 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f,
3a, 3b, 3c, 4d, 4e, 4f, 4h, 4i, 4j, 5b, 5c, 6b, 7a, 7b, 7h, 7j, 7k, 7m, 7n,
7p, 7r, 7s, 7t, 8a, 8b, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Słonawach.

Synedra ulna var. *biceps* (Kütz.) v. Schönf. — Wymiary komórek: dł. 112 - 139 μ , szer. 6 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 4b, 4h, 7s, 7t; w maju, czerwcu i wrześniu.

Synedra ulna var. *danica* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 108 - 156 μ , szer. 4 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 2e, 4e, 7b, 7k, 7t; wiosną i jesienią.

Asterionella formosa Hass. — Wymiary komórek: dł. 56 - 69 μ , szer. 2 μ . Stan.: 4a, 4b, 4h; 29 V 1968.

Asterionella gracillima (Hantzsch) Heib. — Wymiary komórek: dł. 59 - 67 μ , szer. 2 μ . Stan.: 3b; 11 VI 1968.

Eunotia arcus Ehr. — Wymiary komórek: dł. 37 μ , szer. 4 μ . 12 prążków w 10 μ . Stan.: 7k; 8 XII 1968.

Eunotia exiqua (Bréb.) Rabh. — Wymiary komórek: dł. 41 μ , szer. 3 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 7r; 24 VI 1969.

Gatunek rzadko notowany tylko w jednej próbie (24 VI 1969).

Eunotia gracilis (Ehr.) Rabh. — Wymiary komórek: dł. 63 - 65 μ , szer. 4 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 2c; 29 V 1968.

Eunotia lunaris (Ehr.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 72 - 139 μ , szer. 4 μ . 14 - 15 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 2c, 3a, 3d, 4b, 4e, 4h, 4i, 4j, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 7b, 7d, 7j, 7k, 7l, 7m, 7o, 7p, 7r, 7s, 7u, 8a, 8b, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Eunotia lunaris var. *capitata* Grun. — Wymiary komórek: dł. 86 μ , szer. 4 μ . Stan.: 4h; 29 V 1968.

Eunotia lunaris var. *subarcuata* (Näg.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 28 - 37 μ , szer. 3 μ . Stan.: 1b, 2c, 4b, 5d, 6a, 7g, 7p; od maja do lipca.

Cocconeis placentula Ehr. — Wymiary komórek: dł. 27 - 43 μ , szer. 14 - 26 μ , 24 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4h, 4i, 4j, 5a, 5c, 6b, 7b - s, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pelczyskach.

Cocconeis placentula var. *euglypta* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 26 - 40 μ , szer. 13 - 19 μ . 18 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 2f, 3d, 4a - j, 5a, 5c, 7b, 7d, 7f - o, 7t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Pelczyskach.

Cocconeis placentula var. *lineata* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 51 - 56 μ , szer. 34 - 38 μ . Stan.: 3d, 4a, 4c - h, 7d, 7f; od kwietnia do lipca.

Achnanthes affinis Grun. — Wymiary komórek: dł. 19 - 22 μ , szer. 3 μ . 28 prążków w 10 μ . Stan.: 3d, 5c, 7b, 7e, 7n, 7r - t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Achnanthes brevipes Ag. — Wymiary komórek: dł. 45 - 78 μ , szer. 15 - 23 μ . 8 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 2a, 2c - e, 3a, 3b, 4e, 5e, 7e - h, 7j, 7m; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowany w Srogowie, Solcu, Stanyli, Słonawach i Pelczyskach.

Achnanthes brevipes var. *intermedia* (Kütz.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 25 - 42 μ , szer. 9 - 12 μ . 9 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 2e, 3a, 3b, 4e, 7e, 7g, 7h, 7j, 7m; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowany w Słonawach.

Achnanthes delicatula (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 12 - 16 μ , szer. 5 - 7 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 7f, 1 X 1969.

Z polskich solnisk notowany w Inowrocławiu i Słonawach.

Achnanthes microcephala (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 11 - 18 μ , szer. 2 μ . 30 prążków w 10 μ . Stan.: 4e, 4h, 5a, 7g, 7r; od maja do lipca i w październiku.

Z polskich solnisk notowany w Słonawach.

Achnanthes minutissima Kütz. — Wymiary komórek: dł. 15 - 29 μ , szer. 2 - 3 μ . 33 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 1d, 2c - e, 3b, 4b, 4c, 4h, 4i, 5a, 7b, 7m, 7o, 7p; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 18 - 31 μ , szer. 5 μ . 14 - 15 prążków w 10 μ . Stan.: 2c, 3b, 4a, 4e, 4h, 4i, 5b, 7d, 7l, 7s; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Przebieczanach i Słonawach.

Mastogloia elliptica (Ag.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 36 - 51 μ , szer. 14 - 16 μ . 15 - 16 prążków w 10 μ , 7 - kamer w 10 μ . Stan.: 3a; 21 XI 1968; 7p; 19 VI 1968.

Mastogloia elliptica var. *dansei* (Thw.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 42 - 50 μ , szer. 16 - 17 μ . 15 prążków w 10 μ . Stan.: 7p; 19 VI 1968.

Mastogloia grevillei W. Sm. — Wymiary komórek: dł. 34 - 56 μ , szer. 10 - 11 μ . 9 - 10 żeberk w 10 μ , 6 kamer w 10 μ . Stan.: 2a, 2c, 2e, 3a, 3b, 3d, 5e, 7c, 7h, 7m, 7n, 7r; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku.

Mastogloia smithii Thw. — Wymiary komórek: dł. 31 - 57 μ , szer. 11 - 16 μ . 18 prążków w 10 μ , 6 - 7 kamer w 10 μ . Stan.: 2a, 2b, 2c, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4j, 5a, 5b, 5c, 7c, 7e, 7f, 7h, 7j - t, 8a; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Nie notowana w wodzie całkiem wysłodzonej (100 mg/l Cl^-).

Mastogloia smithii var. *amphicephala* Grun. — Wymiary komórek: dł. 42 - 51 μ , szer. 13 - 14 μ . 18 prążków w 10 μ . Stan.: 7k; 27 IV 1969; 7s; 19 VI 1968, 24 VI 1969.

Odmiana rzadko towarzysząca gatunkowi.

Mastogloia smithii var. *lacustris* Grun. — Wymiary komórek: dł. 47 μ , szer. 13 μ . 15 - 16 prążków w 10 μ . Stan.: 7r; 19 VI 1968.

Diploneis interrupta (Kütz.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 48 - 59 μ , szer. 19 - 23 μ , w przewężeniu 10 - 12 μ . 8 - 11 żeberk w 10 μ . Stan.: 2a, 5b, 3b, 5c, 5e, 7f, 7h, 7i, 7l, 7o, 7p, 7u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

- Z polskich solnisk notowana w Solcu, Słonawach i Pelczyskach.
- Diploneis ovalis* (Hilse) Cl. — Wymiary komórek: dł. 48 - 65 μ , szer. 18 - 26 μ . Stan.: 2a, 2c, 3b, 3d, 4e, 5b, 7r, 7t, 7u; od kwietnia do lipca.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Diploneis pseudovalis* Hust. — Wymiary komórek: dł. 19 - 25 μ , szer. 11 - 13 μ . 10 żeber w 10 μ . Stan.: 2b; 27 VI 1969.
- Amphipleura pellucida* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 80 - 101 μ , szer. 7 - 8 μ . Stan.: 3b, 4b, 4h, 4j, 5b, 5c, 7p; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Frustulia creutzburgensis* (Krasske) Hust. — Wymiary komórek: dł. 38 - 40 μ , szer. 6 - 7 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 4g; 19 X 1969; 7k; 8 XII 1969.
- Anomoeoneis sphaerophora* (Kütz.) Pfitz. — Wymiary komórek: dł. 65 - 78 μ , szer. 18 - 20 μ . 15 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 3a, 3b, 3c, 3d, 4d, 4f, 5c, 7f, 7h, 7k; od kwietnia do lipca.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pelczyskach.
- Anomoeoneis sphaerophora* var. *güntheri* O.Müll. — Wymiary komórek: dł. 37 - 56 μ , szer. 15 - 20 μ . 15 prążków w 10 μ . Stan.: 3b; 11 VI 1969; 7e, 7f; 10 XI 1968.
- Anomoeoneis sphaerophora* var. *polygramma* (Ehr.) O.Müll. — Wymiary komórek: dł. 50 - 61 μ , szer. 18 - 21 μ . 14 prążków w 10 μ . Stan.: 3d; 27 VII 1968.
- Anomoeoneis sphaerophora* var. *sculpta* (Ehr.) O.Müll. — Wymiary komórek: dł. 91 - 169 μ , szer. 30 - 48 μ . 13 - 14 prążków w 10 μ . Stan.: 3b, 3c, 3d, 4d, 4f, 4i, 5a, 7e, 7f, 7o; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pelczyskach, na badanym terenie występowała licznie.
- Stauroneis anceps* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 39 - 81 μ , szer. 4 - 10 μ . 20 prążków w 10 μ . Stan.: 4e, 5a; 9 XI 1968; 7b; 8 XII 1969; 7t; 17 IX 1969.
- Z polskich solnisk notowana w Srogowie i Solcu.
- Stauroneis legumen* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 32 - 38 μ , szer. 6 - 7 μ . 28 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 7h, 7i, 7l; od kwietnia do sierpnia.
- Stauroneis parvula* Grun. — Wymiary komórek: dł. 22 - 31 μ , szer. 6 μ . 19 prążków w 10 μ . Stan.: 4a, 4g; 25 IV 1969.
- Navicula anglica* var. *subsalsa* Grun. — Wymiary komórek: dł. 28 μ , szer. 10 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 2c; 25 IV 1969.
- Navicula bacillum* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 45 - 52 μ , szer. 13 - 16 μ . 14 - 17 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 1e, 2b, 2c, 3a, 4a, 4c, 4d, 7a, 7i, 7k, 7p; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Navicula cari* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 41 - 45 μ , szer. 7 μ . 14 prążków w 10 μ . Stan.: 4f, 4i; 29 V 1968.

- Navicula cari* var. *angustata* Grun. — Wymiary komórek: dł. 45 μ , szer. 8 μ . 3 prążki w 10 μ . Stan.: 4i; 29 V 1968.
- Navicula cincta* (Ehr.) Kütz. — Wymiary komórek: dł. 29 - 35 μ , szer. 4 - 5 μ . 12 - 13 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 2a - e, 3a, 3b, 3d, 4e - i, 5a, 5d, 7b, 7e - i, 7k - n, 7r - t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Przebieczanach i Pelczyskach.
- Navicula cincta* var. *heuflerii* Grun. — Wymiary komórek: dł. 25 - 31 μ , szer. 5 μ . 9 - 10 prążków w 10 μ . Stan.: 2d, 4f, 4g, 7b, 7f, 7h, 7l, 7t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.
- Navicula cocconeiformis* Greg. — Wymiary komórek: dł. 23 - 31 μ , szer. 9 - 12 μ . 25 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 1d, 2b, 2c, 2e, 4b, 4e, 5e, 7b, 7f, 7j, 7l, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Pelczyskach.
- Navicula crucicula* (W.Sm.) Donk. — Wymiary komórek: dł. 42 - 55 μ , szer. 15 - 16 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 3d; 27 VII 1968; 7m, 7n; 14 VIII 1969.
- Navicula cryptocephala* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 21 - 40 μ , szer. 5 - 9 μ . 16 - 18 prążków w 10 μ . Stan.: 1a - e, 2a - f, 3a - d, 4a - j, 5a - e, 6b, 7a - u, 8a, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Kaczycze, Srogowie, Solcu, Stanyli, Stebniku, Inowrocławiu, Słonawach i Pelczyskach.
- Navicula cryptocephala* var. *intermedia* Grun. — Wymiary komórek: dł. 25 - 30 μ , szer. 6 - 9 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 3b, 4a, 4h, 5a, 5b, 7g, 7i; od kwietnia do lipca i w grudniu.
- Navicula cryptocephala* var. *veneta* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 14 - 20 μ , szer. 5 μ . 16 prążków w 10 μ . Stan.: 5c, 7e - i, 7l, 7r; od kwietnia do lipca i w grudniu.
- Navicula cryptocephala* var. *lata* Porecka et Anisim. — Wymiary komórek: dł. 19 - 20 μ , szer. 6 μ . 18 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 2c, 6b, 8c; od maja do lipca.
- Navicula cuspidata* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 68 - 156 μ , szer. 18 - 30 μ . 11 - 16 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1d, 2a, 2c, 3a, 3b, 3d, 4d - h, 5b, 7g - i, 7l, 7s; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Navicula cuspidata* var. *ambigua* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 72 - 119 μ , szer. 17 - 28 μ . 17 - 18 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 2a, 4d, 4f, 5a, 7p; od kwietnia do lipca i w grudniu.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Navicula densestriata* Hust. — Wymiary komórek: dł. 12 - 27 μ , szer. 6 μ . 30 prążków w 10 μ . Stan.: 4c; 25 IV 1969; 7e; 26 IV 1969.
- Navicula dicephala* (Ehr.) W.Sm. — Wymiary komórek: dł. 28 - 35 μ , szer. 8 - 10 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 2c; 13 VI 1969; 2e; 25 IV 1969.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach.

- Navicula dicephala* var. *neglecta* (Krasske) Hust. — Wymiary komórek: dł. 27 - 31 μ , szer. 8 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 2e; 25 IV 1969; 5c; 29 VI 1968.
- Navicula digitoradiata* (Greg.) A.Sm. — Wymiary komórek: dł. 56 - 69 μ , szer. 15 - 17 μ . 8 prążków w 10 μ . Stan.: 2c, 2e, 3d, 4f; od kwietnia do lipca.
- Navicula elegans* W.Sm. — Wymiary komórek: dł. 96 - 117 μ , szer. 25 - 32 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 3d, 4f; 27 VII 1968.
Długość i szerokość komórki jest większa niż podaje Zabelina (1951, s. 339) i Siemińska (1964, s. 354).
- Navicula gastrum* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 30 - 49 μ , szer. 10 - 17 μ . 8 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 2c, 2d, 7l, 7n, 7p; w kwietniu i lipcu. Szerokość komórki jest nieco mniejsza niż podaje Zabelina (1951, s. 324) i Siemińska (1964, s. 341).
- Navicula gothlandica* Grun. — Wymiary komórek: dł. 38 - 52 μ , szer. 9 μ . 15 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 2c, 3a, 3b, 7f, 7h, 7j, 7k; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Navicula gracilis* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 40 - 59 μ , szer. 7 - 8 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 2c, 3c, 4b, 4d; od kwietnia do lipca.
- Navicula gregaria* Donk. — Wymiary komórek: dł. 16 - 28 μ , szer. 6 - 7 μ . 18 prążków w 10 μ . Stan.: 2b, 2f, 3a, 3c, 3d, 4e, 4f, 5a, 5c, 5f, 7f, 7h, 7j, 7k, 7m; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pełczyskach.
- Navicula halophila* (Grun.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 31 - 68 μ , szer. 9 - 11 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 2a - c, 3a - d, 4a - c, 5b - d, 7g, 7h, 7j - n, 7p; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Navicula hungarica* Grun. — Wymiary komórek: dł. 23 - 30 μ , szer. 6 - 7 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1e, 2a - c, 3a, 4e, 4f, 5c, 7a, 7b, 7e - j, 7r; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pełczyskach.
- Navicula hungarica* var. *capitata* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 16 - 27 μ , szer. 5 - 7 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 1d, 2e - f, 3a, 4d - f, 4i, 5c, 5d, 7f, 7h, 7i, 7m, 7p, 7s; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Navicula inflata* Donk. — Wymiary komórek: dł. 20 - 26 μ , szer. 5 - 6 μ . 20 prążków w 10 μ . Stan.: 2b, 3c, 3d, 4d, 7h, 7n, 7t, 8b; wiosną i jesienią.
Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Navicula lanceolata* (Ag.) Kütz. — Wymiary komórek: dł. 38 - 53 μ , szer. 7 - 10 μ . 13 prążków w 10 μ . Stan.: 5c, 7b, 7k, 7s, 8a, 8b; od kwietnia do lipca i we wrześniu.
Z polskich solnisk notowana w Solcu i Stanyli.
- Navicula longirostris* Hust. — Wymiary komórek: dł. 16 - 19 μ , szer. 3 μ . Stan.: 5c; 29 VII 1968.

- Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Navicula menisculus* Schum. — Wymiary komórek: dł. 22 - 37 μ , szer. 8 - 10 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 2c, 2d, 4c, 4g, 4i; od kwietnia do lipca.
- Navicula menisculus* var. *meniscus* (Schum.) Hust. — Wymiary komórek: dł. 33 - 50 μ , szer. 15 μ . 8 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 2c, 4c; w kwiecieniu i czerwcu.
- Navicula minuscula* Grun. — Wymiary komórek: dł. 10 μ , szer. 4 μ . Stan.: 4e; 29 V 1968.
- Gatunek notowany jedynie w próbie z dnia 29 V 1968.
- Navicula oblonga* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 80 - 135 μ , szer. 15 - 20 μ . 6 - 8 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 2b, 2d, 2e, 3a - d, 4a - d, 4f, 5b, 5c, 5e, 7h, 7j - r, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Navicula oblonga* var. *subcapitata* Pant. — Wymiary komórek: dł. 80 - 120 μ , szer. 15 - 19 μ . 6 - 7 prążków w 10 μ . Stan.: 4a; 21 IX 1968; 5b; 29 VII 1968.
- Navicula peregrina* (Ehr.) Kütz. — Wymiary komórek: dł. 86 - 129 μ , szer. 21 - 28 μ . 5 - 6 prążków w 10 μ . Stan.: 2a - e, 3a - d, 4a - g, 5a - c, 7b, 7e - n, 7p, 7s - u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Solcu, Stanyli, Słonawach i Pełczyskach. Na badanym terenie występowała szczególnie licznie w zbiornikach z podwyższoną koncentracją jonów chlorkowych w wodzie (1200 - 3500 mg/l Cl^-).
- Navicula peregrina* f. *angusta* Kolbe. — Wymiary komórek: dł. 56 - 89 μ , szer. 8 - 12 μ . 6 prążków w 10 μ . Stan.: 2b - d, 3a, 3b, 7c, 7f, 7i - k; od maja do lipca.
- Navicula peregrina* var. *kefvingensis* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 65 - 69 μ , szer. 12 μ , 8 prążków w 10 μ . Stan.: 2c; 13 VI 1969; 3a; 8 XII 1969.
- Navicula peregrina* var. *lanceolata* Skv. — Wymiary komórek: dł. 38 - 51 μ , szer. 9 - 10 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 2c, 4f, 7g; w kwietniu, maju i październiku.
- Navicula placentula* (Ehr.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 38 - 60 μ , szer. 15 - 26 μ . 6 - 8 prążków w 10 μ . Stan.: 4c, 4f, 7u; w maju i kwietniu.
- Navicula placentula* f. *lanceolata* Grun. — Wymiary komórek: dł. 44 μ , szer. 16 μ . 7 prążków w 10 μ . Stan.: 4f; 29 V 1968.
- Navicula placentula* f. *rostrata* Mayer — Wymiary komórek: dł. 40 - 45 μ , szer. 15 - 16 μ . 8 - 9 prążków w 10 μ . Stan.: 2f; 29 V 1968.
- Navicula protracta* Grun. — Wymiary komórek: dł. 26 - 31 μ , szer. 8 - 10 μ . 18 prążków w 10 μ . Stan.: 3a, 3d, 4f, 5a, 7b, 7i, 7j; w lipcu, październiku i grudniu.
- Navicula pupula* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 26 - 35 μ , szer. 8 μ . 22 prążki w 10 μ . Stan.: 1a, 2b, 2c, 2e, 4a, 4c, 4i, 7d, 7m, 7r; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

- Navicula pupula* var. *aquaeductae* (Krasske) Hust. — Wymiary komórek: dł. 25 - 27 μ , szer. 4 μ . 22 prążki w 10 μ . Stan.: 2b, 4a; 27 IV 1969; 7k; 8 XII 1969.
Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Navicula pupula* var. *capitata* Hust. — Wymiary komórek: dł. 26 - 31 μ , szer. 8 μ . 23 prążki w 10 μ . Stan.: 7f, 7g, 7l, 7n; w czerwcu, lipcu i wrześniu.
- Navicula pygmaea* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 23 - 38 μ , szer. 11 - 18 μ . 25 - 26 prążków w 10 μ . Stan.: 3a; 8 XII 1969; 7f; 1 X 1969, 8 XII 1969.
Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.
- Navicula radiosa* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 55 - 76 μ , szer. 12 - 15 μ . 10 - 11 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 1c, 2b, 2c, 2e, 2f, 3a - d, 4a, 4b, 4e - j, 7f, 7h, 7k - n, 7p - u, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Navicula radiosa* var. *tenella* (Bréb.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 26 - 38 μ , szer. 5 - 6 μ . 16 prążków w 10 μ . Stan.: 4h; 29 V 1968.
- Navicula rhynchocephala* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 39 - 53 μ , szer. 10 - 12 μ . 10 - 12 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 1e, 2a - c, 3a - d, 4a, 4e, 4f, 5c, 7b, 7d - p, 7u, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.
- Navicula rostellata* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 40 - 51 μ , szer. 9 - 10 μ . 10 - 11 prążków w 10 μ . Stan.: 4e, 7p; 1 VII 1969.
- Navicula salinarum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 25 - 36 μ , szer. 9 - 12 μ . 14 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 3b, 3c, 4e, 4f, 7e - i; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Przebieczanach, Solcu, Stebniku, Inowrocławiu, Słonawach i Pełczyskach.
- Navicula spicula* (Dickie) Cl. — Wymiary komórek: dł. 50 - 91 μ szer. 7 - 12 μ . 26 prążków w 10 μ . Stan.: 3a, 3c, 4c, 7f, 7h; od kwietnia do lipca i w październiku.
- Navicula viridula* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 47 - 62 μ , szer. 10 - 12 μ . 10 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1d, 2a - f, 3a, 3b, 3d, 4a - f, 5a, 5d, 5e, 7b, 7d, 7e, 7j, 7k, 7o, 7s, 7u, 8a - c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pełczyskach.
- Navicula viridula* f. *capitata* Mayer. — Wymiary komórek: dł. 51 - 55 μ , szer. 10 μ . 10 prążków w 10 μ . Stan.: 2c; 25 IV 1969; 4f; 29 V 1968; 7t; 19 VI 1968.
- Navicula viridula* var. *slesvicensis* (Grun.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 30 - 41 μ , szer. 10 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 4a; 29 V 1968.
Z polskich solnisk notowana w Przebieczanach, Inowrocławiu i Słonawach.

Navicula vulpina Kütz. — Wymiary komórek: dł. 69 - 76 μ , szer. 14 μ .
10 prążków w 10 μ . Stan.: 1b; 21 IX 1968.

Z polskich solnisk notowana w Kaczyce i Przebieczanach.

Pinnularia globiceps var. *krookei* Grun. — Wymiary komórek: dł. 26 μ , szer. 6 μ . 16 prążków w 10 μ . Stan.: 4f; 29 V 1968.

Pinnularia maior (Kütz.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 150 - 236 μ , szer. 27 - 35 μ . 6 - 7 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 2a - e, 3a, 3b, 3d, 4b - i, 5a - e, 6a, 7a, 7b, 7i - r, 7u, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pełczyskach.

Pinnularia maior var. *lacustris* Meist. — Wymiary komórek: dł. 168 - 175 μ , szer. 37 μ . 7 prążków w 10 μ . Stan.: 4i; 29 V 1968; 7i; 8 XII 1969.

Pinnularia maior var. *paludosa* Meist. — Wymiary komórek: dł. 179 μ , szer. 38 μ . 7 prążków w 10 μ . Stan.: 7t; 19 VI 1968.

Pinnularia microstauron (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 27 - 49 μ , szer. 8 - 9 μ . 10 - 11 prążków w 10 μ . Stan.: 1d, 2c, 4e, 4h, 4i, 5a, 5c, 7g; od kwietnia do lipca oraz w październiku i listopadzie.

Pinnularia microstauron var. *brebissonii* f. *diminuta* Grun. — Wymiary komórek: dł. 32 - 35 μ , szer. 9 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 2f; 9 XI 1968; 4a; 25 IV 1969. Długość i szerokość komórki jest większa niż podaje Zabelina (1951, s. 350) i Siemińska (1964, s. 367).

Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr. — Wymiary komórek: dł. 60 - 138 μ , szer. 14 - 27 μ . 6 - 8 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 1e, 2a - d, 3a, 4a, 4d, 4g, 4h, 5a, 5d, 5e, 6a, 7b, 7e, 7h, 7i, 7l, 7m, 7o, 7n, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Kaczyce, Przebieczanach, Srogowie, Stanyli i Stebniku.

Neidium affine (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 28 - 69 μ , szer. 6 - 15 μ . 23 prążki w 10 μ . Stan.: 1a, 1e, 2a - d, 3a - d, 4a, 4c, 4e, 4f, 5a - c, 6a, 7b, 7g, 7j, 7k, 7m, 7r, 7n; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Neidium affine var. *amphirhynchus* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 32 - 41 μ , szer. 12 - 13 μ . 23 prążki w 10 μ . Stan.: 1b; 25 IV 1968.

Neidium dubium (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 39 μ , szer. 15 μ . 20 prążków w 10 μ . Stan.: 7n; 7 V 1969.

Z polskich solnisk notowane w Pełczyskach.

Caloneis amphisbaena (Bory) Cl. — Wymiary komórek: dł. 40 - 75 μ , szer. 23 - 28 μ . 16 - 18 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 2a - c, 3a, 3d, 4c, 4e - i, 7e - h, 7k; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu, Ciechocinku i Pełczyskach.

Caloneis silicula (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 33 - 72 μ , szer. 8 - 15 μ . 16 - 17 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 2a - d, 3c, 4d - g, 5a, 7b, 7h, 7i, 7k - m; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

- Caloneis silicula* var. *peisonis* Hust. — Wymiary komórek: dł. 45 - 86 μ , szer. 10 - 16 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 2c, 3b - d, 7h, 7i, 7k; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Odmiana notowana rzadziej od gatunku.
- Gyrosigma acuminatum* (Kütz.) Rabh. — Wymiary komórek: dł. 148 - 156 μ , szer. 18 - 19 μ . 18 prążków w 10 μ . Stan.: 2c; 11 VI 1968; 2d; 25 IV 1969.
- Z polskich solnisk notowana w Kaczyce, Przebieczanach, Stebniku i Pelczyskach.
- Gyrosigma acuminatum* var. *curtum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 65 - 72 μ , szer. 14 - 15 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 2d; 25 IV 1969.
- Gyrosigma spenceri* (W.Sm.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 96 μ , szer. 14 μ . 18 prążków w 10 μ . Stan.: 7t; 17 IX 1969.
- Z polskich solnisk notowana w Solcu i Słonawach.
- Gyrosigma spenceri* var. *nodiferum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 71 μ , szer. 11 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 7s, 7t; 17 IX 1969.
- Amphora coffeaeformis* Ag. — Wymiary komórek: dł. 29 - 48 μ , szer. 12 - 18 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 2a - c, 2e, 3a, 3d, 4c - f, 5e, 7b - m; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pelczyskach.
- Amphora coffeaeformis* var. *acutiuscula* (Kütz.) Hust. — Wymiary komórek: dł. 49 - 55 μ , szer. 19 μ . 14 prążków w 10 μ . Stan.: 2c, 3a, 4c, 4d - f, 7e, 7g - i; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Amphora commutata* Grun. — Wymiary komórek: dł. 65 - 80 μ , szer. 25 - 31 μ . 10 - 11 prążków w 10 μ . Stan.: 3a, 3c, 3d, 4a, 4c - f, 7f - k, 7o; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pelczyskach.
- Amphora delicatissima* Krasske — Wymiary komórek: dł. 8 - 15 μ , szer. 4 - 6 μ . Stan.: 2f, 3b, 4e, 7d; od maja do lipca i we wrześniu.
- Amphora holsatica* Hust. — Wymiary komórek: dł. 39 - 44 μ , szer. 19 - 22 μ . 14 prążków w 10 μ . Stan.: 5e; 7 V 1969; 7o; 24 VI 1969.
- Amphora ovalis* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 79 - 91 μ , szer. 40 - 56 μ . 10 - 12 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 4i, 7r, 7u, 8a, 8c; wiosną i jesienią.
- Z polskich solnisk notowana w Przebieczanach, Słonawach i Pelczyskach.
- Amphora ovalis* f. *gracilis* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 31 - 40 μ , szer. 12 μ . 12 prążków w 10 μ . Stan.: 4e; 29 V 1968; 8b; 17 IX 1969.
- Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku i Inowrocławiu.
- Amphora ovalis* var. *pediculus* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 15 - 30 μ , szer. 8 - 12 μ . 14 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 1d, 2e, 4d, 4e, 4h, 4i, 5a, 7b, 7i, 7k - n, 7p, 7t, 7u, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.
- Amphora perpusilla* Grun. — Wymiary komórek: dł. 5 - 8 μ , szer. 4 μ .

- Stan.: 7f; 1 X 1969. Dł. komórek jest mniejsza niż podaje Zabelina (1951, s. 419) i Siemińska (1964, s. 424).
- Amphora veneta* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 26 - 42 μ , szer. 12 - 15 μ . 20 prążków w 10 μ . Stan.: 2a - d, 3a, 3b, 4c, 4f, 7e, 7h - l; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Cymbella affinis* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 30 - 65 μ , szer. 10 - 12 μ . 10 - 11 prążków w 10 μ . Stan.: 4h, 5a - c, 7m, 7r, 7s, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Cymbella aspera* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 132 - 243 μ , szer. 22 - 45 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 5a; 15 VII 1969.
- Cymbella cistula* (Hemp.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 89 - 118 μ , szer. 28 - 33 μ . 8 prążków w 10 μ . Stan.: 5e; 7 V 1969; 7p; 7r; 19 VI 1968.
- Cymbella cymbiformis* (Ag.? Kütz.) V.H. — Wymiary komórek: dł. 35 - 76 μ , szer. 11 - 13 μ . 8 - 10 prążków w 10 μ . Stan.: 4b, 4d, 4e, 4j, 5b, 5c, 7l, 7r, 7s, 7u; od maja do lipca oraz jesienią.
- Cymbella helvetica* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 86 - 91 μ , szer. 13 - 15 μ . 10 prążków w 10 μ . Stan.: 1e; 25 VII 1968; 4h; 29 V 1968.
- Cymbella lanceolata* (Ehr.) V.H. — Wymiary komórek: dł. 106 - 205 μ , szer. 29 - 34 μ . 10 - 11 prążków w 10 μ . Stan.: 2c, 2f, 3d, 7m, 7r, 7u; od maja do lipca oraz jesienią.
- Cymbella lata* var. *minor* Mölder — Wymiary komórek: dł. 18 - 25 μ , szer. 8 μ . 13 prążków w 10 μ . Stan.: 7s; 17 IX 1969.
- Cymbella leptoceros* (Ehr.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 42 - 56 μ , szer. 10 μ . 10 prążków w 10 μ . Stan.: 5c; 29 VII 1968.
- Cymbella microcephala* Grun. — Wymiary komórek: dł. 15 - 21 μ , szer. 3 μ . Stan.: 7r; 19 VI 1968.
- Cymbella parva* (W.Sm.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 56 - 63 μ , szer. 10 μ . 10 prążków w 10 μ . Stan.: 4h; 29 V 1968; 7m; 22 IX 1968, 27 IV 1969.
- Cymbella prostrata* (Berkel.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 30 μ , szer. 12 μ . 17 prążków w 10 μ . Stan.: 7m; 27 IV 1969.
- Cymbella pusilla* Grun. — Wymiary komórek: dł. 24 - 35 μ , szer. 6 μ . 16 prążków w 10 μ . Stan.: 2d, 4a, 4e, 4i, 7b, 7h, 7n; od kwietnia do lipca oraz we wrześniu i listopadzie.
- Cymbella ventricosa* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 12 - 30 μ , szer. 5 - 10 μ . 15 - 17 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 1d, 2c, 2f, 3c, 3d, 4b, 4d, 4e, 5a - c, 7b - d, 7i, 7j, 7n - u, 8a, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Z polskich solnisk notowana w Pelczyskach.
- Gomphonema acuminatum* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 43 - 68 μ , szer. 7 - 10 μ . 10 - 12 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 1e, 4b, 4e, 4h, 4j, 5b - d, 7b, 7p - t, 8b, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku.
- Gomphonema acuminatum* var. *brébissonii* (Kütz.) Cl. — Wymiary ko-

- mórek: dł. 72 μ , szer. 12 μ . 10 prążków w 10 μ . Stan.: 7s; 24 VI 1969.
- Gomphonema acuminatum* var. *coronatum* (Ehr.) W.Sm. — Wymiary komórek: dł. 53 - 86 μ , szer. 9 - 11 μ . 10 - 12 prążków w 10 μ . Stan.: 4b, 4e, 5c, 7b, 7h, 7s, 7n, 8b, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Gomphonema acuminatum* var. *trigonocephalum* (Ehr.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 56 - 79 μ , szer. 10 - 11 μ . 10 - 12 prążków w 10 μ . Stan.: 7r; 19 VI 1968.
- Gomphonema angustatum* (Kütz.) Rabh. — Wymiary komórek: dł. 19 - 38 μ , szer. 6 - 9 μ , 12 - 13 prążków w 10 μ . Stan.: 1a - c, 2b, 2c, 2e, 3b, 3d, 4b, 4d, 4e, 4h, 4i, 5b, 5d, 7b, 7i, 7j, 7m, 7p, 7r; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Kaczyce, Srogowie i Pelczyskach.
- Gomphonema angustatum* var. *productum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 28 - 31 μ , szer. 7 - 8 μ . 12 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 2b, 4i, 5b, 7j, 7s, 7t; od kwietnia do września.
- Z polskich solnisk notowana w Pelczyskach.
- Gomphonema angustatum* var. *undulatum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 29 μ , szer. 8 μ . 10 prążków w 10 μ . Stan.: 4i; 9 XI 1968.
- Gomphonema augur* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 28 - 35 μ , szer. 10 - 11 μ . 12 prążków w 10 μ . Stan.: 4e, 29 V 1968; 7r; 24 VI 1969; 7t; 17 IX 1969.
- Gomphonema capitatum* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 36 - 51 μ , szer. 13 - 14 μ . 10 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 1d, 2f, 4b, 4d, 4e, 4h, 5c, 7b, 7m, 7s, 7u, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Gomphonema constrictum* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 42 - 55 μ , szer. 12 - 14 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 2c, 4b, 4j, 5b, 5c, 7b, 7r, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Gomphonema constrictum* var. *capitatum* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 48 μ , szer. 12 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 4b; 25 IV 1969.
- Gomphonema gracile* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 43 - 61 μ , szer. 7 - 8 μ , 10 - 13 prążków w 10 μ . Stan.: 4e; 29 V 1968; 7p; 19 VI 1968; 7r; 24 VI 1969.
- Gomphonema intricatum* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 37 - 61 μ , szer. 6 - 9 μ . 8 - 10 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 4c, 5c, 8b; w czerwcu, lipcu i listopadzie.
- Gomphonema intricatum* var. *pumilum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 26 μ , szer. 5 μ . 7 prążków w 10 μ . Stan.: 8b; 19 VI 1968.
- Gomphonema intricatum* var. *vibro* (Ehr.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 96 μ , szer. 11 μ . 9 prążków w 10 μ . Stan.: 4c; 25 IV 1969.
- Gomphonema lanceolata* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 43 - 61 μ , szer. 9 μ . 12 prążków w 10 μ . Stan.: 2b, 5e, 6a, 7o, 8a; w maju i listopadzie.
- Gomphonema longiceps* Ehr. — Wymiary komórek: dł. 61 - 80 μ , szer. 10 - 12 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 5e; 15 VII 1969; 7o; 14 V 1968.

- Gomphonema longiceps* var. *montanum* (Schum.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 62 μ , szer. 9 μ . 10 prążków w 10 μ . Stan.: 8a; 19 VI 1968.
- Gomphonema longiceps* var. *subclavatum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 39 - 51 μ , szer. 9 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 4b; 9 XI 1968.
- Gomphonema olivaceum* (Lyngb.) Kütz. — Wymiary komórek: dł. 18 - 22 μ , szer. 6 - 10 μ . 11 - 13 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 2b, 4c, 4e, 7b, 7h, 7l - n, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku.
- Gomphonema olivaceum* var. *calcareum* Cl. — Wymiary komórek: dł. 41 - 67 μ , szer. 10 - 12 μ . 12 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 2b, 3c, 4d, 4j, 5a, 5b, 5e, 6b, 7j, 7n, 7s, 7u, 8a; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Gomphonema olivaceum* var. *minutissimum* Hust. — Wymiary komórek: dł. 13 μ , szer. 4 μ . 16 prążków w 10 μ . Stan.: 7h, 7t; 17 IX 1969.
- Gomphonema parvulum* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 15 - 25 μ , szer. 5 - 7 μ . 14 - 15 prążków w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 1d, 2b, 2c, 2e, 3a, 3c, 4a, 4b, 4e, 4f, 4h, 4i, 5a - e, 6a, 7a, 7b, 7d, 7e, 7g - u, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pełczyskach.
- Gomphonema parvulum* var. *micropus* (Kütz.) Cl. — Wymiary komórek: dł. 19 - 21 μ , szer. 5 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 7j; 26 IV 1969.
Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Gomphonema parvulum* var. *subellipticum* Cl. — Wymiary komórek: dł. 9 - 11 μ , szer. 4 μ . 11 prążków w 10 μ . Stan.: 7j; 26 IV 1969.
- Amphiprora paludosa* W.Sm. — Wymiary komórek: dł. 48 - 96 μ , szer. 20 - 42 μ , w przewężeniu 14 - 22 μ . 20 - 22 prążki w 10 μ . Stan.: 2a - c, 2e, 3a - d, 4a - i, 5b, 5c, 5e, 7a, 7b, 7d - t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Epithemia argus* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 46 - 81 μ , szer. 8 - 11 μ . 2 żebra w 10 μ , 11 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 7a; 10 XI 1968; 8b; 19 VI 1968.
- Epithemia sorex* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 36 - 45 μ , szer. 12 μ . 5 - 6 żeber w 10 μ , 12 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 5b; 15 VII 1969; 7d; 10 XI 1969.
- Epithemia turgida* (Ehr.) Kütz. — Wymiary komórek: dł. 130 - 195 μ , szer. 15 - 18 μ . 3 - 5 żeber w 10 μ , 8 - 9 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 1c, 2c, 2f, 4e, 4i, 5a - s, 7c, 7l, 7m, 7r, 7s, 7u, 8a, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Epithemia turgida* var. *capitata* Fricke — Wymiary komórek: dł. 163 μ , szer. 15 μ . 3 żebra w 10 μ , 8 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 7k; 8 XII 1969.
- Epithemia zebra* (Ehr.) Kütz. — Wymiary komórek: dł. 33 - 118 μ , szer. 7 - 13 μ . 2 - 4 żebra w 10 μ , 4 - 8 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 1a - e,

- 2a - e, 3a - d, 4a - f, 4h - j, 5a - e, 7b - d, 7h, 7k - u, 8a - c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Epithemia zebra* var. *porcellus* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 35 - 81 μ , szer. 7 - 10 μ . 2 - 4 żebra w 10 μ , 4 - 8 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 1b, 2e, 3a, 3d, 4e, 4h, 4i, 5c, 7b, 7r, 7u, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Epithemia zebra* var. *saxonica* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 18 - 59 μ , szer. 8 - 10 μ . 2 - 3 żebra w 10 μ , 4 - 7 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 1a, 1c, 3a - d, 4b, 4e, 4i, 5a, 5b, 7b, 7r, 7u, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Rhopalodia gibba* (Ehr.) O.Müll. — Wymiary komórek: dł. 86 - 240 μ , szer. 18 - 27 μ . 6 - 8 żeber w 10 μ , 12 - 14 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 3a, 3c, 4a, 4b, 4d, 4e, 4h - j, 5a - e, 7a, 7k - n, 7p - u, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Rhopalodia gibba* var. *ventricosa* (Ehr.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 23 - 40 μ , szer. 25 - 32 μ . 6 - 8 żeber w 10 μ , 12 - 14 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 5c; 7 V 1969; 7r; 19 VI 1968.
- Rhopalodia gibberula* (Ehr.) O.Müll. — Wymiary komórek: dł. 39 - 51 μ , szer. 20 - 24 μ . 3 - 4 żebra w 10 μ , 15 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 2c; 11 VI 1968; 7p; 19 VI 1968.
- Z polskich solnisk notowana w Kaczyce, Srogowie i Słonawach.
- Rhopalodia musculus* (Kütz.) O.Müll. — Wymiary komórek: dł. 28 - 49 μ , szer. 19 - 25 μ . 3 - 4 żebra w 10 μ , 14 rzędów areol w 10 μ . Stan.: 3d, 7j, 7u; w maju i lipcu.
- Hantzschia amphioxys* (Ehr.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 35 - 80 μ , szer. 9 - 12 μ . 5 - 8 punktów grzebienia w 10 μ , 14 - 17 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 4a, 4h, 5d, 7j, 7u; w kwietniu i maju.
- Z polskich solnisk notowana w Kaczyce, Przebieczanach, Solcu, Stannyli, Stebniku i Inowrocławiu.
- Hantzschia amphioxys* f. *capitata* O.Müll. — Wymiary komórek: dł. 55 - 70 μ , szer. 10 - 12 μ . 5 - 8 punktów grzebienia w 10 μ , 14 - 17 prążków w 10 μ . Stan.: 1d, 2c, 4f, 5b, 7g - j, 7u; wiosną i jesienią.
- Hantzschia amphioxys* var. *maior* Grun. — Wymiary komórek: dł. 190 - 250 μ , szer. 15 - 16 μ . 5 punktów grzebienia w 10 μ , 12 - 15 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 2b, 5a, 7u; w maju i listopadzie.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Hantzschia amphioxys* var. *vivax* (Hantzsch) Grun. — Wymiary komórek: dł. 165 μ , szer. 8 μ . 6 punktów grzebienia w 10 μ , 13 prążków w 10 μ . Stan.: 4i; 29 V 1968; 7m; 27 IV 1969.
- Hantzschia elongata* (Hantzsch) Grun. — Wymiary komórek: dł. 170 - 215 μ , szer. 9 - 10 μ . 5 punktów grzebienia w 10 μ , 12 prążków w 10 μ . Stan.: 2e, 5a, 5b, 7u; w maju i listopadzie.
- Bacillaria paradoxa* Gmelin — Wymiary komórek: dł. 72 - 118 μ , szer.

- 5 - 6 μ . 6 - 7 punktów grzebienia w 10 μ , 20 - 24 prążków w 10 μ . Stan.: 3c, 3d, 4d, 4e, 7j; od czerwca do września.
- Nitzschia acicularis* W.Sm. — Wymiary komórek: dł. 62 - 78 μ , szer. 4 μ . 17 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 1d, 3a, 3b, 4b, 4c, 5b - d, 7c, 7i, 7k - m, 7r; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku, Inowrocławiu i Słonawach.
- Nitzschia acuta* Hantzsch — Wymiary komórek: dł. 145 μ , szer. 45 μ . 6 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 4d; 29 V 1968.
- Nitzschia amphibia* Grun. — Wymiary komórek: dł. 49 - 53 μ , szer. 4 μ . 7 punktów grzebienia w 10 μ , 15 - 17 prążków w 10 μ . Stan.: 7m; 19 X 1969; 7o; 1 VII 1969.
- Nitzschia apiculata* (Grun.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 38 - 45 μ , szer. 6 μ . Stan.: 7f; 22 VII 1968; 26 IV 1969.
- Z polskich solnisk notowana w Przebieczanach, Srogowie, Inowrocławiu, Słonawach i Pelczyskach.
- Nitzschia capitellata* Hust. — Wymiary komórek: dł. 51 - 58 μ , szer. 4 μ . 11 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 2a, 7g, 7h, 7t; od kwietnia do lipca i w październiku.
- Nitzschia clausii* Hantzsch — Wymiary komórek: dł. 28 - 53 μ , szer. 3 - 5 μ . 10 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 2a - c, 3a, 3d, 4e - g, 4i, 5d, 7i, 7t, 7u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Nitzschia closterium* (Ehr.) W.Sm. — Wymiary komórek: dł. 48 - 126 μ , szer. 3 - 4 μ . 12 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 4f; 9 XI 1968; 7f; 10 XI 1968.
- Nitzschia commutata* Grun. — Wymiary komórek: dł. 62 - 70 μ , szer. 9 - 11 μ . 7 - 8 punktów grzebienia w 10 μ , 20 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 4f, 5e, 7g, 7h; wiosną i jesienią.
- Z polskich solnisk notowana w Pelczyskach.
- Nitzschia dissipata* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 19 - 33 μ , szer. 4 μ . 6 - 8 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 2a, 2f, 4d, 4i, 5a, 7r, 8a; wiosną i w listopadzie.
- Nitzschia fasciculata* Grun. — Wymiary komórek: dł. 74 μ , szer. 6 μ . 7 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 2a; 25 VII 1968.
- Nitzschia filiformis* (W.Sm.) Hust. — Wymiary komórek: dł. 32 - 70 μ , szer. 4 - 5 μ . 8 - 10 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 1c, 2a - s, 3a, 3d, 4c, 4f, 5d, 5e, 7b, 7e, 7g, 7h, 7k - m, 7p, 7r, 7t, 7u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Nitzschia frustulum* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 36 - 51 μ , szer. 4 μ . 9 - 10 punktów grzebienia w 10 μ , 20 prążków w 10 μ . Stan.: 1b, 2a, 4c, 4d, 7h, 7r; od kwietnia do lipca oraz w listopadzie.
- Z polskich solnisk notowana w Stanyli i Stebniku.
- Nitzschia frustulum* var. *perminuta* Grun. — Wymiary komórek: dł. 31 μ , szer. 3 μ , 13 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 7r; 24 VI 1969.

- Nitzschia frustulum* var. *subsalina* Hust. — Wymiary komórek: dł. 16 - 28 μ , szer. 3 μ . 15 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 4d, 4e, 7r; w maju, czerwcu i listopadzie.
- Nitzschia gandersheimiensis* Krasske — Wymiary komórek: dł. 62 - 75 μ , szer. 4 μ . 8 - 9 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 3b, 3d, 4f, 4g, 5a, 7j, 7k; od kwietnia do lipca oraz we wrześniu. Długość komórek jest większa niż podaje Siemińska (1964, s. 525).
- Nitzschia gracilis* Hantzsch — Wymiary komórek: dł. 72 - 88 μ , szer. 3 - 4 μ . 12 - 15 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 4b; 25 IV 1969; 7m; 27 IV 1969.
- Nitzschia hantzschiana* Rabh. — Wymiary komórek: dł. 36 - 42 μ , szer. 3 - 4 μ . 7 - 8 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 1b, 4f, 7b, 7n; w maju, lipcu i wrześniu.
- Nitzschia hungarica* Grun. — Wymiary komórek: dł. 47 - 73 μ , szer. 6 - 8 μ . 7 - 8 punktów grzebienia w 10 μ , 16 - 17 prążków w 10 μ . Stan.: 2a, 2b, 2e, 4a, 4f, 5e, 7f - h; w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Z polskich solnisk notowana w Solcu, Stanyli, Inowrocławiu, Słonawach i Pełczyskach.
- Nitzschia hybrida* Grun. — Wymiary komórek: dł. 66 - 81 μ , szer. 8 μ . 8 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 7b; 8 XII 1969.
Gatunek na badanym terenie notowany jedynie w próbach mułu.
- Nitzschia kützingiana* Hilse — Wymiary komórek: dł. 18 μ , szer. 4 μ . 14 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 4c; 9 XI 1968.
- Nitzschia linearis* W.Sm. — Wymiary komórek: dł. 98 - 125 μ , szer. 5 - 6 μ . 8 - 11 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 1a, 1b, 2b, 2e, 4d, 4f - h, 5a, 5d, 5e, 7b, 7h, 7l, 7m, 7s; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Nitzschia microcephala* Grun. — Wymiary komórek: dł. 15 - 17 μ , szer. 4 μ . 13 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 7u; 7 V 1969.
- Nitzschia obtusa* W.Sm. — Wymiary komórek: dł. 120 - 138 μ , szer. 8 - 9 μ . 5 - 8 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 2b, 2c, 3d, 5a, 7i, 7k, 7r, 7n, w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Nitzschia obtusa* var. *scalpelliformis* Grun. — Wymiary komórek: dł. 59 - 82 μ , szer. 5 - 6 μ . 5 - 8 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 4d, 4h, 7t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Nitzschia palea* (Kütz.) W.Sm. — Wymiary komórek: dł. 31 - 48 μ , szer. 4 - 5 μ , 11 - 13 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 1a - d, 2b - s, 3a, 3c, 3d, 4a - h, 5a, 5c - s, 6a, 7a, 7b, 7d - u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Solcu.
- Nitzschia palea* var. *capitata* Wisl. et Poretzky — Wymiary komórek: dł. 20 μ , szer. 3,5 μ . 10 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 7s; 17 IX 1969.
- Nitzschia parvula* Levis — Wymiary komórek: dł. 32 μ , szer. 5 μ . 6 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 7t; 17 IX 1969.

- Nitzschia recta* Hantzsch — Wymiary komórek: dł. 73 - 89 μ , szer. 7 μ .
7 - 8 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 1b, 2b, 2f, 5a, 7b, 7h, 7f, 7u;
w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Nitzschia sigma* (Kütz.) W. Sm. — Wymiary komórek: dł. 96 μ , szer. 7 μ .
8 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 4c, 4f, 4g; 29 V 1968.
- Nitzschia sigmoidea* (Ehr.) W. Sm. — Wymiary komórek: dł. 210 - 480 μ ,
szer. 8 - 13 μ . 5 - 7 punktów grzebienia w 10 μ , 23 - 26 prążków w
10 μ . Stan.: 1a, 2a, 2b, 2d, 2e, 3a - d, 4a - j, 5b, 5e, 7a - e, 7h - n, 8a;
w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Nitzschia stagnorum* Rabh. — Wymiary komórek: dł. 39 - 51 μ , szer. 8 -
10 μ . 8 - 9 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 2b - d, 2f, 4e, 4g, 5d, 7b,
7e - h, 7l, 7s, 7t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Nitzschia sublinearis* Hust. — Wymiary komórek: dł. 58 μ , szer. 5 μ .
13 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 7h; 17 IX 1969.
- Nitzschia thermalis* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 68 - 92 μ , szer. 7 - 9 μ .
8 - 9 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 2a - c, 2d, 3d, 4a, 4e, 5d, 5e,
6b, 7e, 7h - m; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Srogowie i Pełczyskach.
- Nitzschia thermalis* var. *minor* Hilse — Wymiary komórek: dł. 28 - 57 μ ,
szer. 6 - 8 μ . 12 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 7h; 17 IX 1969;
7m; 27 IV 1969.
Z polskich solnisk notowana w Pełczyskach.
- Nitzschia trybionella* Hantzsch — Wymiary komórek: dł. 100 μ , szer. 29 μ .
7 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 2a; 25 VII 1968.
Z polskich solnisk notowana w Przebieczanach, Stebniku, Słonawach
i Pełczyskach.
- Nitzschia vermicularis* (Kütz.) Grun. — Wymiary komórek: dł. 216 - 300 μ ,
szer. 7 μ . 8 - 10 punktów grzebienia w 10 μ . Stan.: 4d; 9 XI 1968; 5c;
29 VII 1968.
Z polskich solnisk notowana w Kaczyce i Solcu.
- Nitzschia vitrea* Norman — Wymiary komórek: dł. 98 - 176 μ , szer. 9 -
12 μ . 4 - 7 punktów grzebienia w 10 μ , 20 prążków w 10 μ . Stan.: 2b,
2d, 2e, 3b, 3d, 4c, 4e - g, 5b, 5e, 7f - l, 7t; w ciągu całego okresu wege-
tacyjnego.
Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pełczyskach.
- Nitzschia vitrea* var. *salinarum* Grun. — Wymiary komórek: dł. 42 - 55 μ ,
szer. 8 - 9 μ . 5 - 7 punktów grzebienia w 10 μ , 26 prążków w 10 μ .
Stan.: 2a, 2b, 4g, 7g, 7h; we wrześniu i październiku.
Z polskich solnisk notowana w Solcu, Inowrocławiu i Pełczyskach.
- Surirella angustata* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 26 - 33 μ , szer. 5 - 7 μ .
6 - 8 kanalików skrzydełek w 10 μ . Stan.: 2b; 27 VII 1968, 5a; 29 V 1968.
- Surirella biseriata* Bréb. — Wymiary komórek: dł. 103 μ , szer. 41 μ .
16 kanalików skrzydełek w 10 μ . Stan.: 5c; 15 VII 1969.

Surirella ovalis Bréb. — Wymiary komórek: dł. 36 - 51 μ , szer. 13 - 17 μ . 19 - 30 kanalików skrzydełek w 10 μ . Stan.: 2b, 4i, 5b, 5d, 5e; w maju i lipcu.

Z polskich solnisk notowana w Słonawach i Pełczyskach.

Surirella ovata Kütz. — Wymiary komórek: dł. 23 - 56 μ , szer. 10 - 14 μ . 4 - 6 kanalików skrzydełek w 10 μ . Stan.: 2a, 3d, 4a, 4f; od kwietnia do lipca.

Z polskich solnisk notowana w Przebieczanach, Srogowie, Solcu, Stannyli, Inowrocławiu, Słonawach i Pełczyskach.

Surirella ovata var. *pinnata* (W.Sm.) Hust. — Wymiary komórek: dł. 28 μ , szer. 11 μ . 5 kanalików skrzydełek w 10 μ . Stan.: 4f; 29 V 1968.

Z polskich solnisk notowana w Kaczyce.

Campylodiscus clypeus Ehr. — Wymiary komórek: średn. okrywy 90 - 180 μ . 1 - 2 żebra w 10 μ . Stan.: 3b, 3c, 3d, 4b, 4d, 4e, 5c, 7f, 7h; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowano w Słonawach odmianę *Campylodiscus clypeus* var. *minor* Liebetanz.

Campylodiscus clypeus var. *bicostata* (W.Sm.) Hust. — Średn. okrywy 98 - 120 μ . Stan.: 3d; 5 VII 1969.

Xanthophyceae

Mischococcus tenuissimus (Printz) Pascher — Średn. komórek 3 μ . Stan.: 4b; 29 V 1968.

Ophiocytium arbuscula (A. Braun) Rabh. — Wymiary komórek: dł. 45 - 80 μ , szer. 3 - 5 μ . Stan.: 3b; 11 VI 1968; 4a, 4b; 9 XI 1968.

Ophiocytium cochleare A. Braun — Wymiary komórek: dł. 110 - 155 μ , szer. 5 - 7 μ . Stan.: 1b, 2a - c, 2e, 3b, 3c, 4a - c, 4h - j, 5c, 5e, 6a, 6b, 7e, 7h, 7k, 7m, 7o - r, 7t, 7u, 8b, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Ophiocytium gracillimum Borzi — Wymiary komórek: dł. 45 - 80 μ , szer. 3 μ . Stan.: 1b; 21 IX 1968; 7b; 8 XII 1969.

Ophiocytium lagerheimii Lemm. — Wymiary komórek: dł. 115 μ , szer. 5 μ . Kolec 30 μ długi. Stan.: 7k; 27 IV 1969.

Ophiocytium parvulum A. Braun — Wymiary komórek: dł. 180 - 230 μ , szer. 7 - 10 μ . Stan.: 3b, 3d, 4a, 4c, 5a; od maja do lipca oraz w listopadzie.

Tribonema sp. — Stan.: 1a, 1c, 2b, 2e, 4b, 5a, 5c, 6a, 6b, 7o - r; od kwietnia do czerwca.

Vaucheria hamata Walz. — Szer. nitek plechy 50 - 68 μ . Oogonium dł. 90 - 100 μ , szer. 65 - 75 μ . Stan.: 7f; 19 X 1968, 1 X 1969.

Vaucheria sessilis D.C. — Szer. nitek plechy 40 - 60 μ . Oospora dł. 58 - 85 μ , szer. 52 - 60 μ . Stan.: 1a; 13 VI 1969.

Vaucheria terrestris Lyngbye em. Walz. — Szer. nitek plechy 40 - 50 μ .

Oogonium dł. 75 - 98 μ , szer. 60 - 75 μ . Stan.: 7f; 22 IX 1968, 25 IX 1968, 19 X 1968, 17 IX 1969, 1 X 1969.

Chlorophyta

Chlamydomonas angulosa Dill. — Wymiary komórek: dł. 18 μ , szer. 12 μ . Stan.: 1e; 25 IV 1969; 5c; 15 VII 1969.

Carteria multifilis (Fres.) Dill. — Wymiary komórek: dł. 12 - 16 μ , szer. 10 - 14 μ . Stan.: 7f, 19 X 1969; 7j; 1 VII 1969.

Z polskich solnisk notowana w Słonawach.

Pandorina morum (Müll.) Bory — Średn. komórek 8 - 16 μ . Stan.: 1e, 2b, 2f, 3b, 3c, 4c, 4f, 4h, 5a - d, 6a, 7b, 7c, 7e, 7i - m, 7r; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Eudorina elegans Ehr. — Średn. komórek 15 - 20 μ . Stan.: 1b, 1d, 1f, 2a, 2b, 2e, 2f, 3c, 4c, 4d, 4h, 6a, 7c - e, 7g, 7i - l, 7t, 7u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Volvox aureus Ehr. — Średn. komórek 6 - 7 μ . Stan.: 8c; 19 VI 1968.

Pediastrum angulosum (Ehr.) Menegh. — Wymiary komórek: brzeżne — dł. 19 μ , szer. 20 μ , środkowe — dł. 18 μ , szer. 18 μ . Stan.: 5c; 7 V 1969.

Pediastrum biradiatum Meyen — Wymiary komórek: brzeżne — dł. 15 μ , szer. 14 μ , środkowe — dł. 13 μ , szer. 14 μ . Stan.: 5c; 7 V 1969.

Pediastrum boryenium (Turp.) Menegh. — Wymiary komórek: brzeżne — dł. 13 - 20 μ , szer. 12 - 19 μ , środkowe — dł. 10 - 15 μ , szer. 8 - 16 μ . Stan.: 1b, 1d, 1e, 2f, 4a, 4d, 4h, 4i, 7d, 7g, 7k; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu.

Pediastrum duplex Meyen — Wymiary komórek: brzeżne — dł. 18 - 20 μ , szer. 18 - 20 μ , środkowe — dł. 18 μ , szer. 19 μ . Stan.: 4a; 29 V 1968; 5b; 29 V 1968, 15 VII 1969.

Pediastrum tetras (Ehr.) Ralfs — Wymiary komórek: brzeżne — dł. 10 μ , szer. 11 μ , środkowe — dł. 8 μ , szer. 9 μ . Stan.: 5a, 5c, 7p; w maju i lipcu.

Dictyosphaerium ehrenbergianum Naeg. — Wymiary komórek: dł. 6 - 9 μ , szer. 4 - 6 μ . Stan.: 4b, 4e, 4h, 5a, 7e, 7m, 7o, 7r; od maja do lipca.

Dictyosphaerium pulchellum Ward. — Średn. komórek: 4 - 6 μ . Stan.: 7m; 19 VI 1968.

Chlorella vulgaris Beijerinck — Średn. komórek 6 - 8 μ . Stan.: 1c, 1d, 4g, 5b, 5d, 7h, 7p; od maja do sierpnia.

Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Słonawach.

Chlorella sp. — Stan.: 2e, 5c, 6b, 7d, 7f, 7t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Oocystis lacustris Chodat — Wymiary komórek: dł. 8 - 10 μ , szer. 5 - 6 μ . Stan.: 4h, 7l, 7m, 7n; w maju.

Oocystis marssonii Lemm. — Wymiary komórek: dł. 15 μ , szer. 8 μ . Stan.: 7m; 19 VI 1968.

- Oocystis parva* W. et G.S. West. — Wymiary komórek: dł. 6 μ , szer. 3 μ . Stan.: 5c; 29 VII 1968.
- Oocystis solitaria* Wittrock in Wittr. et Nords. — Wymiary komórek: dł. 21 - 22 μ , szer. 11 μ . Stan.: 7l, 7p, 8c; w maju i czerwcu.
- Eremosphaera gigas* (Arch.) Fott et Kalina (= *Oocystis gigas* Arch.) — Wymiary komórek: dł. 42 - 45 μ , szer. 33 - 35 μ . Stan.: 3a; 27 VII 1968; 8a; 19 VI 1968.
- Oonephris obesa* (West.) Fott (= *Oocystis gigas* f. *minor* W. et G.S. West.) — Wymiary komórek: dł. 18 μ , szer. 13 μ . Stan.: 2c; 27 VII 1968.
Gatunek notowany jedynie w próbie z dnia 27 VII 1968.
- Kirchneriella contorta* (Schmidle) Bohl. — Wymiary komórek: dł. 8 - 10 μ , szer. 1 μ . Stan.: 5c; 29 VII 1968.
- Kirchneriella lunaris* (Kirchn.) Moeb. — Wymiary komórek: dł. 7 - 8 μ , szer. 4 μ . Stan.: 7s; 17 IX 1969.
- Tetraëdron incus* (Teiling) G.M. Smith — Wymiary komórek: średn. 24 - 31 μ . Stan.: 4i, 4j, 5a, 7h, 7t; w maju, czerwcu i wrześniu.
- Tetraëdron limneticum* Borge — Średn. komórek bez wyrostów 11 μ , dł. wyrostów 25 μ . Stan.: 5b; 15 VII 1969.
- Tetraëdron minimum* (A. Br.) Hansg. — Średn. komórek 9 - 15 μ . Stan.: 4a, 5c, 7r; w czerwcu i lipcu.
Z polskich solnisk notowany w Inowrocławiu.
- Ankistrodesmus bibraianus* (Reinsch) Korš. — Wymiary komórek: dł. 28 - 30 μ , szer. 5 μ . Stan.: 5b; 29 V 1968.
- Ankistrodesmus falcatus* (Corda) Ralfs — Wymiary komórek: dł. 38 - 46 μ , szer. 2 - 3 μ . Stan.: 1b, 1c, 3b, 3c, 4a, 4i, 5a - c, 6a, 7f, 7g, 7k - m, 7r, 7s, 8a - c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowany w Inowrocławiu.
- Ankistrodesmus gracilis* (Reinsch) Korš. — Wymiary komórek: dł. 25 - 32 μ , szer. 3 μ . Stan.: 1b; 25 IV 1969; 5b; 29 V 1968.
- Ankistrodesmus spiralis* (Turn.) Lemm. — Wymiary komórek: dł. 36 - 41 μ , szer. 2 μ . Stan.: 5c; 29 VII 1968; 7t; 17 IX 1969.
- Scenedesmus acuminatus* (Lagerh.) Chod. — Wymiary komórek: dł. 12 - 21 μ , szer. 3 - 5 μ . Stan.: 3b, 4b, 4e, 5b, 5c, 6a, 7e, 7g, 7j, 7k, 7n - r, 7u, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowany w Inowrocławiu.
- Scenedesmus acutiformis* Schröder — Wymiary komórek: dł. 12 - 15 μ , szer. 3 - 4 μ . Stan.: 2c, 5a, 5b, 7e, 7j - m, 7r, 7s, 8a, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Scenedesmus acutus* Meyen — Wymiary komórek: dł. 7 - 13 μ , szer. 3 - 5 μ . Stan.: 1b, 1d, 1e, 2c, 3c, 4c, 4d, 4e, 5b, 5c, 7b, 7j, 7p, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowany w Słonawach.
- Scenedesmus arcuatus* Lemm. — Wymiary komórek: dł. 6 - 14 μ , szer. 3 - 6 μ . Stan.: 5a; 29 V 1968; 5b, 5c; 15 VII 1969; 7j; 19 VI 1968.

- Scenedesmus armatus* var. *bicaudatus* (Guglielmetti-Printz) Chod. — Wymiary komórek: dł. 10 μ , szer. 3,5 μ . Stan.: 7t; 17 IX 1969.
- Scenedesmus brevispina* (G.M. Smith) Chod. — Wymiary komórek: dł. 14 μ , szer. 5 μ . Stan.: 7r; 19 VI 1968.
- Scenedesmus ecornis* (Ralfs) Chod. — Wymiary komórek: dł. 7 - 15 μ , szer. 3 - 6 μ . Stan.: 1b, 2f, 3a, 3b, 3c, 4e, 4f, 5c, 7f, 7k, 7o - u, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Z polskich solnisk notowany w Inowrocławiu i Słonawach.
- Scenedesmus ecornis* var. *disciformis* Chod. — Wymiary komórek: dł. 8 - 11 μ , szer. 3 - 5 μ . Stan.: 7n; 17 IX 1969.
Z polskich solnisk notowany w Inowrocławiu i Słonawach.
- Scenedesmus incrassatulus* Bohlin — Wymiary komórek: dł. 22 μ , szer. 5,5 μ . Stan.: 2d; 27 VII 1968.
- Scenedesmus nanus* Chod. — Wymiary komórek: dł. 6 - 7 μ , szer. 3 μ . Stan.: 3a, 4b, 7b, 7u; w maju, wrześniu i grudniu.
- Scenedesmus nanus* var. *spinosus* Hortob. — Wymiary komórek: dł. 6 - 7 μ , szer. 2,5 μ . Stan.: 7u; 17 IX 1969.
- Scenedesmus opolensis* P. Richt. — Wymiary komórek: dł. 18 - 21 μ , szer. 6 μ . Stan.: 4b, 7j; w lipcu.
- Scenedesmus quadricauda* (Turp.) Bréb. — Wymiary komórek: dł. 10 - 18 μ , szer. 4 - 6 μ . Stan.: 1b - s, 2b, 3a - d, 4a, 4b, 4d - i, 5a - c, 7a - u; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Ze solnisk w Inowrocławiu i Słonawach notowane odmiany: *S. quadricauda* v. *quadrispina* Smith. *S.q.* var. *Westii* Smith, *S.q.* var. *dispar* Bréb., *S.q.* var. *asymetrica* Liebetanz.
- Scenedesmus quadricauda* var. *quadrispina* (Chod.) G.M. Smith. — Wymiary komórek: dł. 11 μ , szer. 4 μ . Stan.: 1b; 25 IV 1969.
Z polskich solnisk notowany w Inowrocławiu i Słonawach.
- Crucigenia quadrata* Morren — Średn. komórek 4 - 6 μ . Stan.: 3b; 27 VII 1968.
- Crucigenia rectangularis* (A. Br.) Gay — Wymiary komórek: dł. 4 - 6 μ , szer. 4 - 5 μ . Stan.: 2c, 3b, 5a, 4b, 5c, 7n; od maja do lipca.
- Coelastrum microporum* Naeg. — Wymiary komórek: średn. 15 - 21 μ . Stan.: 1d, 5c, 6a, 7g, 7n, 7p, 8b; od kwietnia do września.
- Coelastrum proboscideum* Bohl. — Średn. komórek 10 - 13 μ . Stan.: 7p; 1 VII 1969.
- Ulothrix tenerrima* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 7 - 8 μ , szer. 8 μ . Stan.: 3c, 4a, 7m; od kwietnia do września.
Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu.
- Ulothrix* sp. — Stan.: 1b, 2b, 4a, 6b, 7l, 7t, 8c; od kwietnia do września.
- Microspora* sp. — Stan.: 1b, 2c, 2e, 3d, 4c, 4f, 4j, 7p, 7r, 8a, 8c; od maja do października.
- Enteromorpha intestinalis* (L.) Greville — Wymiary komórek: 7 - 18 $\times$ $\times$ 9 - 18 μ . Stan.: 2c, 7e, 7f, 7i, 7j; od maja do września.

- Z polskich solnisk notowana w Ciechocinku, Inowrocławiu, Słonawach i Kołobrzegu.
- Enteromorpha plumosa* Kütz. — Wymiary komórek: 12 - 15 × 21 - 27 μ . Stan.: 7f; od maja do lipca.
- Enteromorpha salina* Kütz. — Wymiary komórek: 9 - 11 × 11 - 13 μ . Stan.: 7f; od maja do sierpnia.
- Z polskich solnisk notowana w Inowrocławiu i Kołobrzegu.
- Enteromorpha tubulosa* J.G. Agardh — Wymiary komórek: 9 - 14 × 10 - 14 μ . Stan.: 7e, 7f, 7k; od czerwca do października.
- Chaetophora elegans* (Roth.) Agardh — Wymiary komórek: szer. 7 - 10 μ . Stan.: 5c, 6a; 7 V 1969.
- Chaetophora incrassata* (Hudson) Hazen — Wymiary komórek: szer. 6 - 8 μ . Stan.: 4h; 29 V 1968.
- Stigeoclonium* sp. — Stan.: 1e, 4a, 4b, 5c, 5d, 7h, 7s; wiosną i jesienią.
- Coleochaete* sp. — Stan.: 7r; 22 IX 1968; 24 VI 1969.
- Cladophora fracta* Kütz. — Wymiary komórek: szer. 50 - 95 μ . Stan.: 1a, 1b, 1e, 2a - f, 3a - d, 4a - c, 4h, 4i, 5a, 7b, 7h, 7j, 7k, 7m - r, 7u, 8a, 8b, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Gatunek na badanym terenie występuje w postaci gęstych watowatych skupień na powierzchni wody.
- Rhizoclonium hieroglyphicum* (C.A. Ag.) Kütz. — Wymiary komórek: szer. 20 - 30 μ . Stan.: 2a, 4f, 7f, 7h; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Z polskich solnisk notowano w Solcu, Stanyli, Stebniku *Rhizoclonium riparium* Roth.
- Oedogonium macrandrium* Wittrock. — Wymiary komórek: dł. 52 - 60 μ , szer. 15 - 18 μ . Oogonium: dł. 38 - 42 μ , szer. 49 - 53 μ . Stan.: 4i; 29 V 1968.
- Bulbochaete* sp. — Stan.: 3a, 3c; 11 VI 1968; 6a; 7 V 1969.
- Spirogyra* sp. — Stan.: 1b, 1e, 2b - f, 3b - d, 4a, 4b, 4d - f, 4h, 5a - d, 7b, 7e, 7h - r, 7u, 8a, 8c; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Zygnema* sp. — Stan.: 4i, 7d, 7l, 7p, 7u, 8b; od kwietnia do czerwca.
- Mougeotia* sp. — Stan.: 1b, 1e, 2d, 2f, 3a - d, 4a - e, 4h, 4i, 5a - d, 7b, 7d, 7e, 7h - n, 7u, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Closterium acerosum* (Schr.) Ehr. — Wymiary komórek: dł. 318 μ , szer. 28 μ , szer. końca 6 μ . Stan.: 2c; 29 V 1968.
- Closterium acerosum* var. *elongatum* Bréb. — Wymiary komórek: dł. 480 - 518 μ , szer. 30 μ , szer. końca 6 μ . Stan.: 4f, 7m; w maju.
- Z polskich solnisk notowana w Słonawach.
- Closterium aciculare* T. West. — Wymiary komórek: dł. 405 μ , szer. 5 μ . Stan.: 4d; 27 VII 1968.
- Closterium acutum* (Lyngb.) Bréb. — Wymiary komórek: dł. 140 - 180 μ , szer. 7 μ . Stan.: 7p; 1 VII 1969; 8b; 19 VI 1968.

- Closterium calosporum* Wittr. — Wymiary komórek: dł. 98 - 105 μ , szer. 12 - 13 μ , szer. końca 2,5 μ . Stan.: 7n; 19 VI 1968.
- Gatunek na badanym terenie notowany w próbie z dnia 19 VI 1968.
- Closterium ehrenbergii* Menegh. — Wymiary komórek: dł. 310 - 400 μ , szer. 60 - 72 μ , szer. końca 11 μ . Stan.: 2f, 3c, 4b, 4h, 5d, 7e, 7j; od maja do lipca.
- Closterium leibleinii* Kütz. — Wymiary komórek: dł. 105 - 180 μ , szer. 16 - 24 μ . Stan.: 2b, 2c, 3a - c, 5e, 7b, 7d, 7e, 7h - r, 7t; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Closterium lunula* (Müll.) Nitzsch. — Wymiary komórek: dł. 510 μ , szer. 62 μ . Stan.: 7e; 19 VI 1968.
- Closterium moniliferum* (Bory) Ehr. — Wymiary komórek: dł. 170 - 235 μ , szer. 30 - 42 μ , szer. końca 8 μ . Stan.: 2f, 3a, 3d, 4c, 4i, 5a, 7e, 8a; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Closterium pritchardianum* Arch. — Wymiary komórek: dł. 410 μ , szer. 36 μ , szer. końca 7,5 μ . Stan.: 2a; 13 VI 1969; 2c; 9 XI 1968.
- Gatunek na badanym terenie rzadko notowany.
- Closterium* sp. — Stan.: 4e, 5c, 5d, 7j, 7k, 7m, 7s; od kwietnia do września.
- Pleurotaenium truncatum* (Bréb.) Naeg. — Wymiary komórek: dł. 260 - 315 μ , szer. 53 - 58 μ . Stan.: 7m; 27 IV 1969.
- Cosmarium botrytis* Menegh. — Wymiary komórek: dł. 65 - 78 μ , szer. 52 - 60 μ , isthm. 17 - 20 μ . Stan.: 1d, 2a, 2c, 3a - c, 4a, 4d, 4l, 5a - d, 7b - e, 6a, 7k - n, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Cosmarium granatum* Bréb. — Wymiary komórek: dł. 26 - 31 μ , szer. 19 - 24 μ , isthm. 6 - 8 μ . Stan.: 2b, 3d, 5c, 7b, 7d, 7k, 7p, 8c; od lipca do października.
- Cosmarium humile* var. *striatum* (Boldt) Schmidle — Wymiary komórek: dł. 15 - 17 μ , szer. 14 - 17 μ , isthm. 5 μ . Stan.: 2b, 2e, 3a - d, 4b, 5c, 4h - n, 8a, 8b; w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
- Cosmarium meneghini* Bréb. — Wymiary komórek: dł. 13 - 20 μ , szer. 10 - 15 μ , isthm. 3 - 5 μ . Stan.: 5a, 7c - e, 7k - o, 7u, 8c; od maja do lipca.
- Cosmarium ornatum* Ralfs — Wymiary komórek: dł. 35 μ , szer. 35 μ , isthm. 10 μ . Stan.: 7m; 22 IX 1968.
- Cosmarium pseudonitidulum* var. *validum* West W. et. G.S. — Wymiary komórek: dł. 70 μ , szer. 56 μ , isthm. 20 μ . Stan.: 8b; 19 VI 1968.
- Cosmarium reniforme* (Ralfs) Arch. — Wymiary komórek: dł. 65 μ , szer. 53 μ , isthm. 18 μ . Stan.: 8b; 19 VI 1968.
- Cosmarium* sp. — Stan.: 5c, 7j, 7r, 8c; od czerwca do września.
- Staurostrum gracile* Ralfs — Wymiary komórek: dł. 28 - 35 μ , szer. 45 - 60 μ , isthm. 8 - 9 μ . Stan.: 4b, 5a; 29 V 1968.
- Staurostrum granulosum* (Ehr.) Ralfs — Wymiary komórek: dł. 31 μ , szer. 30 μ , isthm. 12 μ . Stan.: 8b; 19 VI 1968.

- Staurostrum paradoxum* Meyen — Wymiary komórek: dł. 28 - 30 μ , szer. 48 - 52 μ , isthm. 9 - 10 μ , Stan.: 8b; 22 IX 1968.
- Staurostrum turgescens* De Not. — Wymiary komórek: dł. 32 μ , szer. 29 μ , isthm. 10 μ . Stan.: 8b; 19 VI 1968.
- Staurostrum* sp. — Stan.: 4e, 7d, 7k - n, 7r, 7s, 7u, 8b, 8c; od kwietnia do września.
- Euastrum dubium* Näg. — Wymiary komórek: dł. 30 μ , szer. 21 μ , isthm. 7 μ . Stan.: 7s; 17 IX 1969.

Charophyta

- Chara vulgaris* L. — Łęganie: dł. 740 - 755 μ , szer. 420 - 450 μ , plemnie: średn. 250 - 260 μ . Stan.: 4a, 5d, 7t; od czerwca do sierpnia.
- Chara hispida* L. — Łęganie: dł. 1000 - 1200 μ , szer. 580 - 630 μ , plemnie: średn. 480 - 510 μ . Stan.: 1b, 3a, 3c, 4d, 4j, 5c, 7n, 7r, 7s; od maja do września.
- Gatunek notowany na badanym terenie bardzo często, szczególnie w zbiornikach z wodą o mniejszej koncentracji jonów chlorkowych (do 1800 mg/l Cl^-).

UWAGI O GATUNKACH RZADKICH I CIEKAWYCH

Lyngbya confervoides Ag. Gatunek występujący rzadko na badanym terenie, w wodzie zawierającej 400 - 700 mg/l Cl^- , w postaci krzaczkowatych skupień zabarwionych ciemnozielono. Uważany za gatunek pospolity w morzach i zasolonych wodach śródlądowych (Starmach 1966). Z Bałtyku podawany jako rzadki gatunek litoralny, przyczepiony do kamieni (Lakowicz 1929). Na podstawie dostępnej mi literatury uważam, że z terenu Polski nie notowany.

Pseudanabaena minuta Skuja. Gatunek notowany jedynie na jednym stanowisku (4d) przy zawartości 800 - 1500 mg/l Cl^- . Występował tam dość licznie w postaci pojedynczych trychomów różnej długości. Na podstawie dostępnej mi literatury uważam, że z terenu Polski nie notowany.

Anabaena variabilis Kütz. Gatunek szczególnie częsty w wodzie o większej koncentracji jonów Cl^- (1000 - 3000 mg/l). Bardzo licznie, charakteryzując się dużą zmiennością, wystąpił późną wiosną 1969 roku, na stanowisku z *Enteromorpha intestinalis* (7f). Notowany często w wodach słodkich i słabo zasolonych (Starmach 1966) oraz morskich (Lakowicz 1929, Remane 1958). Fierdingstad (1969) podaje go również jako gatunek towarzyszący *Enteromorpha intestinalis*.

Achnanthes brevipes Ag. Gatunek występujący często na badanym terenie, licznie notowany w stanowiskach o wyższej koncentracji jo-

nów Cl^- w wodzie. Podawany jako częsty w wodach słonawych i morskich (Kolbe 1927, Scheele 1956, Hustedt 1957). Krasske (1927) notuje go również na tężniach. Z Polski notowany w solniskach (Namysłowski 1914a, b; Liebetanz 1925; Kadłubowska i Pliński 1967; Pliński 1969) oraz w Zatoce Gdańskiej (Rumek 1948).

Achnanthes brevipes var. *intermedia* (Kütz.) Cl. Na badanym terenie odmiana liczniejsza od gatunku, notowana już przy 400 mg/l Cl^- w wodzie. Zaobserwowano dość częste formy teratologiczne. Z Polski notowana w Słonawach (Liebetanz 1925). Odmiana ta traktowana jest jako specyficznie słonawowodna (Kolbe 1927); Cleve (cyt. za Kolbem 1927) zaś podaje ją z typowo morskich stanowisk.

Diploneis interrupta (Kütz.) Cl. Gatunek wyraźnie przywiązany do wody z wyższą koncentracją jonów chlorkowych (177 - 3600 mg/l Cl^-). Charakteryzuje się małą zmiennością morfologiczną. Z Polski notowany w solniskach (Namysłowski 1914a, b; Liebetanz 1925, Kadłubowska i Pliński 1967; Pliński 1969) oraz w Zatoce Gdańskiej (Rumek 1948). Hustedt (1957) charakteryzuje go jako euryhalinowy mezohalob występujący na wybrzeżach morskich, natomiast Krasske (1927) stwierdza jego obecność na tężniach.

Anomoeoneis sphaerophora (Kütz.) Pfitz. Na badanym terenie gatunek notowany często; podawany również licznie ze stanowisk z wodą słodką (Kadłubowska 1961). Prócz gatunku zanotowano obecność odmian *A. sphaerophora* var. *güntheri* O.Müll., *A. sphaerophora* var. *polygramma* (Ehr.) O.Müll.; obie te odmiany na podstawie dostępnej mi literatury uważam za nowe dla Polski. Stwierdzona trzecia odmiana *A. sphaerophora* var. *sculpta* (Ehr.) O.Müll. reprezentowana była najliczniej. W trakcie obserwacji zwrócono uwagę na dużą zmienność morfologiczną oraz istnienie szeregu form przejściowych między poszczególnymi odmianami i gatunkiem.

Frustulia creuzburgensis (Krasske) Hust. Gatunek ten opisał Krasske (1927) i włączył do rodzaju *Navicula*. Rewizji tego gatunku dokonał Hustedt (1957), umieszczając go w rodzaju *Frustulia* ze względu na budowę węzłów biegunowych i szczeliny. Przez Hustedta (1957) określony został jako euryhalinowy mezohalob. Na badanym terenie zanotowano jego obecność w niewielu stanowiskach o zawartości jonów chloru w wodzie od 1000 do 1500 mg/l. Na podstawie dostępnej mi literatury uważam, że jest to nowy gatunek dla flory Polski.

Navicula crucicula (W.Sm.) Donk. Gatunek występujący nielicznie

w stanowiskach z koncentracją jonów chloru od 500 do 1800 mg/l. Na podstawie dostępnej mi literatury nie podawany z Polski.

Navicula digitoradiata (Greg.) A.Sm. Gatunek ten notowany był w wodzie z koncentracją jonów chloru od 1200 do 3600 mg/l. Na badanym terenie występował dość często, lecz w nielicznych stanowiskach. Z Polski notowany na wielu stanowiskach z wodą słodką (Wołoszyńska 1922; Cabejszek 1935; Kukucz 1937; Starmach 1939; Skalska 1966; Bohr 1967). Głównie rozprzestrzeniony jest w ujściach rzek Pankow 1965; Klock 1930). Notowany też jest w Bałtyku i określany jako α -mezohalob (Simonsen 1962).

Navicula elegans W.Sm. Gatunek notowany tylko na dwóch stanowiskach. Według niektórych autorów (Beger 1966) zaliczany jest do euhalobów, zaś na opracowanym terenie był notowany przy znacznie niższym zasoleniu (1500 - 3600 mg/l Cl^-). Z Polski notowany był w sesto- nie Białej Przemszy (Starmach 1939), potoku Piekienik koło Jabłonki (Starmach 1961) oraz w osadach Zalewu Wiślanego (Brockmann 1954).

Navicula protracta Grun. Gatunek notowany nieczęsto; występował już na stanowisku z wodą o koncentracji jonów chloru 106 mg/l. Na podstawie dostępnej mi literatury podawany z Zatoki Gdańskiej (Rumek 1948), czyli nowy dla śródlądowej flory Polski.

Navicula salinarum Grun. Gatunek charakterystyczny dla solnisk — euryhalinowy mezohalob (Kolbe 1927; Hustedt 1957). Budde (1933) podaje go jako charakterystyczny dla subasocjacji *Navicula salinarum-Melosira nummuloides*, występująca w przedziale zasolenia 5000 - 12000 mg/l Cl^- . Częsty na polskich solniskach (Namysłowski 1914; Liebetanz 1925; Kadłubowska i Pliński 1967; Pliński 1969). Na opracowywanym terenie notowany już na stanowiskach z wodą o koncentracji jonów chloru około 650 mg/l. Gatunek trudny do odróżnienia od *Navicula cryptocephala* Kütz., a szczególnie jej odmian.

Navicula spicula (Dickie) Cl. Gatunek interesujący ze względu na morfologię; na badanym terenie notowany w nielicznych stanowiskach z wodą o koncentracji jonów chloru powyżej 1000 mg/l. Jergaszew (1968) notował jego obecność w Azji przy 300 mg/l Cl^- . Na podstawie dostępnej mi literatury gatunek nowy dla flory Polski.

Caloneis silicula var. *peisonis* Hust. Odmiana ta jest podobna do *C. silicula* var. *gibberula* (Kütz.) Grun. Różni się od niej klinowatymi końcami, które są dzióbkowato wyciągnięte. W zbiorach znaleziono for-

my, u których środkowe wyrzucenie było nieco mniejsze od biegunowych. Na badanym terenie notowana w stanowiskach z wodą o koncentracji jonów chloru powyżej 200 mg/l. Na podstawie dostępnej mi literatury — odmiana nowa dla flory Polski.

Do rzadkich i godnych uwagi gatunków i odmian rodzaju *Amphora* należą: *A. coffeaeformis* Ag., *A. coffeaeformis* var. *acutiuscula* (Kütz.) Hust., *A. commutata* Grun., *A. delicatissima* Krasske, *A. holsatica* Hust., *A. perpusilla* Grun., *A. veneta* Kütz. Żaden z tych gatunków nie był notowany na badanym terenie na stanowisku z wodą wysłodzoną (poniżej 400 mg/l Cl^-). *Amphora coffeaeformis* uważana przez wielu autorów (Budde 1933; Blumina 1957) za gatunek przywiązany do wyższej koncentracji soli na badanym terenie notowana była nawet na stanowiskach z wodą o koncentracji jonów chloru wynoszącej 380 mg/l. Na podstawie dostępnej mi literatury nowymi dla flory polskiej są: *Amphora coffeaeformis* var. *acutiuscula*, *A. delicatissima*, *A. holsatica*. Gatunek *Amphora veneta* Hustedt (1957) uważa za indyferentny oligohalob, ale nie limnobiont, natomiast przez innych autorów (Zabielina 1951; Siemińska 1964) podawany jest również jako słodkowodny.

Amphiprora paludosa W.Sm. Na badanym terenie gatunek notowany często na stanowiskach z wodą o koncentracji jonów chloru od 250 do 3600 mg/l. Gatunek charakteryzuje się dużą zmiennością morfologiczną i dlatego często mylony z *Amphiprora alata* (Scheele 1956, Pliński 1969). Zmienność ta, spowodowana, być może, słabym wysyceniem skorupki krzemionką, przejawia się szczególnie w zarysie linii dzielącej oraz w stosunku długości do szerokości. Z Polski notowany w Inowrocławiu, Słonawach (Liebetanz 1925) oraz Zatoce Gdańskiej (Rumek 1948).

Bacillaria paradoxa Gmelin. Gatunek, mimo że podawany z sestonu Wisły i Białej Przemszy (Starmach 1939) oraz Noteci i Kanału Bydgoskiego (Siemińska 1964), czyli wód słodkich, na badanym terenie nie był notowany w wodach o koncentracji jonów chloru poniżej 800 mg/l Cl^- . Caspers i Schulz (1964) podają jego stanowisko, gdzie zawartość Cl^- sięgała 400 mg/l. Foged (1948) określa ten gatunek jako krenoksenowy (źródłany) i występujący jedynie w czystych źródłach; jednak w wodach zanieczyszczonych jest on też bardzo częsty (Hustedt 1957). Trahms (1939) uważa go za formę morską. Notowany jest w Zatoce Gdańskiej (Rumek 1948) i Bałtyku (Pankow 1965), natomiast Kolkwitz (1950) podaje go ze stanowiska o koncentracji jonów chloru wynoszącej zaledwie 30 mg/l. Kolbe (1932) uważa, że gatunek ten może żyć tak w wodach słodkich, jak i morskich. Hustedt (1957 i Simonsen (1962) określają go jako euryhalinowy mezo-halob.

Nitzschia closterium (Ehr.) W.Sm. Gatunek notowany na badanym terenie tylko na dwóch stanowiskach (4f i 4t) o największym stężeniu Cl^- . Na podstawie dostępnej mi literatury uważam, że jest to nowy gatunek dla wód śródlądowych Polski; notowany był w Zatoce Gdańskiej (Rumek 1948).

Nitzschia hybrida Grun. Na badanym terenie tylko dwa stanowiska w granicach koncentracji jonów chloru od 700 do 1100 mg/l Cl^- . Według dostępnej mi literatury notowany był jedynie w Zatoce Gdańskiej (Rumek 1948); jest to gatunek nowy dla śródlądowej flory Polski.

GLONY TOWARZYSZĄCE ZESPOŁOM ROŚLIN NACZYNIOWYCH I RAMIENIC

Nasze wiadomości o zespołach glonów słodkowodnych są bardzo skąpe (Thunmark 1945; Hadač 1948; Margalef 1947, 1949; Nygaard 1949; Symoens 1951; Bohr 1962, 1967; Starmach 1961, 1962, 1969). Kornaś (1957) proponuje, aby wyróżniać: 1) synuzje, 2) zbiorowiska związane oraz 3) zespoły samodzielne w skupieniach. Większość zbiorników wodnych zawiera niewątpliwie samodzielne zespoły glonów. Są nimi glony planktonowe stawów i jezior oraz glony osiadłe na dnie potoków i rzek pozbawionych z reguły roślin wyższych (Starmach 1963).

Pankin (1945) uważa, że o zespołach glonów można mówić jedynie wtedy, gdy nie występują one w towarzystwie roślin wyższych. W przeciwnym przypadku istnieją tylko przywiązane zespoły glonów. Na opracowanym terenie zwrócono uwagę jedynie na glony towarzyszące zespołom roślin wyższych i ramienic.

Zbiorowisko *Chara hispida* L. Po raz pierwszy podane z terenów podlęczyckich przez Olaczka (1963). Należy do zbiorowisk pionierskich, zarastających stopniowo młode doły potorfowe. Jest pospolite na badanym terenie, występuje w dołach średniej głębokości (40 - 100 cm) o dnie, na którym zalega osad torfowy. Zbiorowisko co roku odnawia się w tym samym miejscu. Intensywny rozwój *Chara hispida* L., z wytworzeniem organów rozmnażania płciowego notowano od czerwca do sierpnia, później plechy rozkładały się i zalegały na dnie. Zbiorowisko to ubogie jest w gatunki makrofity; oprócz *Chara hispida* występuje niekiedy w nie-dużej ilości *Lemna minor*. Nie natrafiłem na obecność *Chara hispida* w dużych dołach potorfowych, natomiast stwierdziłem jej obecność w małych, niezarastających dołach. Wybiera ona zasadniczo miejsca płytkie i z reguły zajmuje północno-zachodnie części dołów potorfowych.

W wyniku zarastania dołów gatunek ten wypierany jest najczęściej przez *Phragmites communis* albo przez innych przedstawicieli *Scirpetum maritimi* (*Bulboschoenus maritimus*, *Schoenoplectus tabernemontani*).

Tabela 1 - Table 1

Glony towarzyszące płatom *Chara hispida* L.Algae occurring with patches of *Chara hispida* L.

Gatunek - Species	Data - Date															
	1968								1969							
	29.05.	11.06.	11.06.	19.06.	19.06.	25.07.	29.07.	22.08.	25.08.	9.11.	24.06.	24.06.	24.06.	1.07.	15.07.	17.09.
	Stanowisko								Station							
	4j	3a	3c	7n	7r	1b	5e	7r	7s	4d	7n	7r	7s	7n	5e	7s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Merismopedia glauca</i> /Ehr./Näg.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
<i>Merismopedia punctata</i> Meyen	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	+
<i>Merismopedia tenuissima</i> Lemm.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Microcystis aeruginosa</i> Kütz.	.	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Microcystis aeruginosa</i> f. <i>flos-aquae</i> /Wittr./Elenkin	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gloeocapsa minima</i> /Keis./Holl.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	.	+
<i>Gloeocapsa turgida</i> /Kütz./Holl.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	+	1	.	+	.	.	.
<i>Gomposphaeria aponina</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gomposphaeria fusca</i> Skuja	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Gomposphaeria năgeliana</i> /Un./Lemm.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lyngbya aerugineo - coerulea</i> /Kütz./Gom.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Lyngbya confervoides</i> Agardh	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lyngbya holsatica</i> Lemm.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lyngbya limnetica</i> Lemm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Oscillatoria grănulata</i> Gard.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria limosa</i> Agardh	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria maior</i> Vaucher	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria subtilissima</i> Kütz.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
<i>Pseudanabaena catenata</i> Lauter.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Anabaena variabilis</i> Kütz.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Calathrix clavata</i> G.S.West	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Euglena acus</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Euglena pisciformis</i> Klebs	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Lepocinclis ovum</i> /Ehr./Lemm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Phacus acuminatus</i> Stok.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Phacus curvicauda</i> Swirenko	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus mirabilis</i> Pochm.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Peridinium inconspicuum</i> Lemm.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Peridinium cinctum</i> /O.F.M./Ehr.	.	.	1	+	.	.	.	2	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Peridinium</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Melosira varians</i> Ag.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Cyclotella kützingeriana</i> Thw.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Cyclotella meneghiniana</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	+
<i>Cyclotella striata</i> /Kütz./ Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Stephanodiscus hantzschii</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.
<i>Diatoma elongatum</i> /Lyngb./ Ag.	1	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
<i>Opephora martyi</i> Herib.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.
<i>Fragilaria capucina</i> Desm.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	2	.	.	.	.	.
<i>Fragilaria construens</i> var. <i>subsalina</i> Hust.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Fragilaria crotonensis</i> Kitt.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Fragilaria intermedia</i> Grun.	+	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Synedra acus</i> Kütz.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Synedra capitata</i> Ehr.	+	.	.	.	.	1	.	.	+	.	+	.	.	.	+	+
<i>Synedra pulchella</i> /Ralfs/ Kütz.	1	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.

Tabela 1 ed - Table 1 contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Synedra tabulata</i> /Ag./Kätz.	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+
<i>Synedra ulna</i> /Nitzsch./Ehr.	2	.	.	2	2	1	2	.	.	1	1	.	1	1	.	.
<i>Synedra ulna</i> var. <i>biceps</i> /Kätz./v. Schönf.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Eunotia exigua</i> /Bréb./Rab.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Eunotia lunaris</i> /Ehr./Grun.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	2	.	1	.	.	.
<i>Cocconeis placentula</i> Ehr.	1	.	2	1	2	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> /Ehr./Cl.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Achnanthes affinis</i> Grun.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	1
<i>Achnanthes microcephala</i> /Kätz./Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Rhoicosphenia curvata</i> /Kätz./Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Mastogloia grevillei</i> W.Sm.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.
<i>Mastogloia smithii</i> Thw.	.	+	1	3	2	.	2	5	1	+	.	.	.	1	1	+
<i>Mastogloia smithii</i> var. <i>amphicephala</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Diploneis ovalis</i> /Hilse/ Cl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Amphipleura pellucida</i> Kätz.	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> /Kätz./Pfitz.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> var. <i>sculpta</i> /Ehr./O.Müll.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Navicula cinota</i> /Ehr./Kätz.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Navicula cryptocephala</i> Kätz.	3	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Navicula cryptocephala</i> var. <i>weneta</i> /Kätz./Grun.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula cuspidata</i> Kätz.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.
<i>Navicula gastrum</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Navicula gregaria</i> Donk.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Navicula halophila</i> /Grun./Cl.	.	+	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	3	+	.
<i>Navicula hungarica</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Navicula hungarica</i> var. <i>capitata</i> /Ehr./Cl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.
<i>Navicula lanceolata</i> /Ag./Kätz.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Navicula oblonga</i> Kätz.	.	1	+	.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Navicula peregrina</i> /Ehr./Kätz.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.
<i>Navicula pupula</i> Kätz.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Navicula radiosa</i> Kätz.	3	.	1	.	2	1	2	2	.	1	1	.	.	.	2	.
<i>Navicula rhynchocephala</i> Kätz.	.	+	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula viridula</i> Kätz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.
<i>Navicula</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Pinnularia maior</i> /Kätz./Cl.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.
<i>Neidium affine</i> /Ehr./Cl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Caloneis silicula</i> var. <i>peisonis</i> Hust.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.
<i>Amphora commutata</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Amphora holsatica</i> Hust.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.
<i>Amphora ovalis</i> Kätz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
<i>Amphora ovalis</i> var. <i>pediculus</i> Kätz.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Amphora veneta</i> Kätz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.
<i>Amphora</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
<i>Cymbella affinis</i> Kätz.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	1	.	.	.	.	.	+
<i>Cymbella cymbiformis</i> /Ag.? Kätz./V.H.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Cymbella lanceolata</i> /Ehr./V.H.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Cymbella lata</i> var. <i>minor</i> Milder	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Cymbella leptoceros</i> /Ehr./Grun.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cymbella microcephala</i> Grun.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cymbella pusilla</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Cymbella ventricosa</i> Kätz.	.	.	1	1	.	2	1	.	1	1	2	.	.	.	.	+
<i>Cymbella</i> sp.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gomphonema acuminatum</i> Ehr.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.
<i>Gomphonema acuminatum</i> var. <i>brebissonii</i> /Kätz./Cl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.

Tabela 1 cd - Table 1 contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Gomphonema acuminatum</i> var. <i>coronatum</i> /Ehr./ W. Sm	.	.	.	.	.	1	1	.	.	+	.	1	.	.	.
<i>Gomphonema angustatum</i> /Kütz./Rabh.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.
<i>Gomphonema acuminatum</i> var. <i>trigonocephalum</i> /Ehr./Grun.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gomphonema augur</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Gomphonema capitatum</i> Ehr.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	+	.	.	.
<i>Gomphonema constrictum</i> Ehr.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Gomphonema gracile</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Gomphonema olivaceum</i> /Lyngb./Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Gomphonema olivaceum</i> var. <i>calcareum</i> Cl.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.
<i>Gomphonema parvulum</i> /Kütz./Grun	.	.	.	2	.	3	2	.	.	.	.	2	2	2	.
<i>Gomphonema</i> sp.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	2	.	.	.
<i>Amphiprora paludosa</i> W.Sm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	2	.	+
<i>Epithemia turgida</i> /Ehr./Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Epithemia zebra</i> /Ehr./Kütz.	2	1	1	2	3	1	2	.	1	.	1	2	1	.	4
<i>Epithemia zebra</i> var. <i>porcellus</i> /Kütz./Grun.	.	+	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Epithemia zebra</i> var. <i>saxonica</i> /Kütz./Grun	.	1	+	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Rhopalodia gibba</i> /Ehr./O.Müll.	1	+	+	+	2	.	1	3	1	1	1	.	.	.	2
<i>Rhopalodia gibba</i> var. <i>ventricosa</i> /Ehr./Grun.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia acuta</i> Hantzsch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia dissipata</i> /Kütz./Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.
<i>Nitzschia filiformis</i> /W.Sm./Hust.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Nitzschia frustulum</i> /Kütz./Grun.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1	.	1	.	.	.
<i>Nitzschia frustulum</i> var. <i>perminuta</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Nitzschia frustulum</i> var. <i>subsalina</i> Hust.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.	.
<i>Nitzschia linearis</i> W.Sm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.
<i>Nitzschia obtusa</i> W.Sm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.
<i>Nitzschia obtusa</i> var. <i>scalpelliformis</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Nitzschia palea</i> /Kütz./ W.Sm.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	.	1	.	.	1
<i>Nitzschia palea</i> var. <i>capitata</i> Wisl. et Poretz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Nitzschia sigmoidea</i> /Ehr./W.Sm.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.
<i>Nitzschia stagnorum</i> Rabh.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Nitzschia vermicularis</i> /Kütz./Grun.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	2	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Campylodiscus clypeus</i> Ehr.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ophiocyrtium cochleare</i> A. Braun	+	.	+	.	.	+	.	1	.	.	+	.	2	.	.
<i>Tribonema</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
<i>Chlamydomonas</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Pandorina morum</i> /Müll./Bory	.	.	.	1	.	.	+	3	.	.	.	2	.	1	.
<i>Pediastrum boryanum</i> /Turp./Menegh.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Pediastrum tetras</i> /Ehr./Ralfs	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Dictyosphaerium ehrenbergianum</i> Naeg.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Oocystis lacustris</i> Chodat	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oocystis</i> sp.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Kirchneriella lunaris</i> /Kirchn./Moebl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
<i>Kirchneriella contorta</i> /Schmidle/Bohl.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Tetraëdron incus</i> /Teiling/G.M. Smith	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Tetraëdron minimum</i> /A.Br./Hansg.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	+
<i>Ankistrodesmus falcatus</i> /Corda/Ralfs	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Ankistrodesmus spiralis</i> /Turn./Lemm.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Scenedesmus acuminatus</i> /Lagern./Chod.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Scenedesmus acutus</i> Meyen	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Scenedesmus arcuatus</i> Lemm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Scenedesmus brevispina</i> /G.M. Smith./Chod.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Scenedesmus eocornis</i> /Ralfs/ Chod.	.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	+
<i>Scenedesmus quadricauda</i> /Turp./Bréb.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.	.	.	.

Tabela 1 od - Table 1 contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Scenedesmus</i> sp.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Crucigenia rectangularis</i> /A.Br./Gay	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Coelastrum microporum</i> Naeg.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ulothrix</i> sp.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Microspora</i> sp.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Coleochaete</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.
<i>Cladophora fraeta</i> Kütz.	.	1	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Oedogonium</i> sp.	.	1	.	.	.	1	1	1	+	1	.	.	.	.	.	.
<i>Bulbochaete</i> sp.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Spirogyra</i> sp.	+	.	3	2	1	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Mougeotia</i> sp.	.	5	4	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Closterium leibleinii</i> Kütz.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Closterium</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	5
<i>Cosmarium botrytis</i> Menegh.	.	1	1	1	1	.	1	2	.	1	.	.	.	1	.	2
<i>Cosmarium</i> sp.	.	.	1	3	3	.	2	2	.	1	1	1	.	2	+	1
<i>Staurostrum</i> sp.	.	.	.	+	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	+
<i>Euastrum dubium</i> Nag.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+

Olaček (1963) określa zbiorowisko *Chara hispida* z terenów podłęczyckich jako fragment zespołu *Charetum crinitae* F. Fukarek 1961, facja z *Chara hispida* F. Fukarek 1961.

Tabela 1 zawiera glony towarzyszące płatom *Chara hispida*. Najczęściej występowały *Synedra ulna*, *Epithemia zebra*, *Rhopalodia gibba*, *Mastogloia smithii*, *Cymbella ventricosa*, *Cocconeis placentula*, *Cosmarium botrytis*, *Spirogyra* sp., *Mougeotia* sp., *Oedogonium* sp., *Cosmarium* sp.

Zbiorowiska rzęs należące do związku *Lemnion minoris* W. Koch et Tüxen 1954 są zbiorowiskami pionierskimi, to też one jako pierwsze zasiedlają powierzchnię wody. Występują najczęściej w towarzystwie zespołów szuwarowych, przez które w wyniku spływania zbiornika są wypierane. Zbiorowiska rzęs traktowano jako halofobne (Fröde 1958); okazało się jednak, że lepiej rozwijają się (*Lemna minor*) w wodzie o słabym stężeniu soli — szczególnie chlorków (Remane i Lässig 1960).

Na terenie solnisk podłęczyckich występują one w dołach potorfowych. Zbiorowiska te są prymitywne i ubogie florystycznie. Zauważono pewną gradację dominacji poszczególnych gatunków reprezentujących ten związek. Szereg dołów pokrywał zwarty „kożuch” *Lemna minor*, czasami z domieszką *Spirodela polyrrhiza*, inne natomiast pokrywał „pokład” złożony z *Lemna trisulca*, która wypełniała cały zbiornik aż do dna; w jeszcze innych dołach z *Lemna trisulca* na powierzchni wody wystąpił *Hydrocharis morsus-ranae*.

Do badań algologicznych wybrano małe zbiorniki, które charakteryzowały się mniejszą zmiennością warunków siedliskowych, gdyż płyty tych zbiorowisk w dużych dołach czy stawach są przemieszczane w wy-

Tabela 2 - Table 2

Glony dołów potońowych pokrytych Lemna minor L. i Spirodela polyrrhiza /L./ Schleiden
 Algae of peat excavations covered with Lemna minor L. and Spirodela polyrrhiza /L./ Schleiden

Gatunek - Species	Data - Date													
	1968							1969						
	11.06.	14.06.	9.11.	9.11.	9.11.	10.11.	25.04.	25.04.	25.04.	26.04.	13.06.	13.06.	8.12.	
	Stanowisko							Station						
	2e	7c	1d	2e	2f	7a	1d	2e	2f	7a	2e	2f	7a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Microcystis aeruginosa Kütz.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	
Gloeocapsa minima /Keis./Holl.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	
Oscillatoria limosa Agardh.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	
Oscillatoria subtilissima Kütz.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Spirulina maior Kütz.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	
Euglena acus Ehr.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	
Euglena minima France	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	
Phacus pyrum /Ehr./Stein.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	
Diatoma elongatum /Lyngb./Ag.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	+	.	.	
Diatoma vulgare Bory	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	
Synedra tabulata /Ag./Kütz.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	
Synedra ulna /Nitzsch/Ehr.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	+	.	
Cocconeis placentula Ehr.	.	1	+	+	+	.	.	+	.	.	.	1	.	
Achnanthes minutissima Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	
Navicula bacillum Ehr.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	
Navicula cincta /Ehr./Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.	
Navicula cryptocephala Kütz.	.	1	1	+	1	.	.	1	.	1	1	.	+	
Navicula dicephala /Ehr./W.Sm.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	
Navicula hungarica Grun.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	
Navicula hungarica var. capitata /Ehr./Cl.	.	.	+	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	
Navicula rhynchocephala Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	
Pinnularia maior /Kütz./Cl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	
Pinnularia microstaurum /Ehr./Cl.	+	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	
Pinnularia viridis /Nitzsch /Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	
Amphora ovalis var. pediculus Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	
Amphora sp. div.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	
Cymbella ventricosa Kütz.	.	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	
Gomphonema capitatum Ehr.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Gomphonema parvulum /Kütz./Grun.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	
Amphiprora paludosa W.Sm.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	
Epithemia argus Kütz.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	
Epithemia zebra /Ehr./Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	
Hantzschia amphioxys /Ehr./Grun.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	
Nitzschia palea /Kütz./W.Sm.	.	.	1	.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	
Nitzschia sigmoidea /Ehr./W.Sm.	.	.	.	+	.	+	.	+	+	+	+	.	.	
Nitzschia stagnorum Rabh.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	
Ophiocytium cochleare A. Braun	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	
Tribonema sp.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	
Pediastrum boryanum /Turp./Menegh.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	
Chlorella vulgaris Beijerinck	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Scenedesmus quadricauda /Turp./Bréb.	.	.	.	.	1	+	.	.	+	.	+	1	.	
Cladophora fracta Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
Oedogonium sp. div.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
Spirogyra sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	
Mougeotia sp.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	
Closterium moniliferum /Bory/Ehr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	

Tabela 3 - Table 3

Glony dołów potorfowych z *Lemna trisulca* L. i *Hydrocharis morsus-ranae* L.
 Algae of peat excavations with *Lemna trisulca* L. and *Hydrocharis morsus-ranae* L.

Gatunek - Species	Data - Date							
	1968				1969			
	14.05.	25.07.	29.07.	25.04.	25.04.	29.05.	1.07.	
	Stanowisko				Station			
	7g	1e	5c	1e	7g	5c	7g	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Merismopedia punctata</i> Meyen	.	.	+	.	1	.	.	
<i>Microcystis aeruginosa</i> Kütz.	.	.	.	.	.	+	.	
<i>Microcystis marginata</i> /Menegh./Kütz.	.	.	+	.	.	.	.	
<i>Gloeocapsa minima</i> /Keis./Holl.	.	.	.	.	1	.	.	
<i>Lyngbya martensiana</i> Menegh.	.	+	.	.	.	.	.	
<i>Oscillatoria planctonica</i> Wołoszyn.	+	.	.	.	.	.	.	
<i>Oscillatoria splendida</i> Grev.	+	.	.	.	.	.	.	
<i>Oscillatoria</i> sp.	.	1	.	.	.	.	.	
<i>Pseudanabaena catenata</i> Lauterb.	.	+	.	.	.	.	.	
<i>Anabaena</i> sp.	.	1	.	.	.	.	.	
<i>Euglena acus</i> Ehr.	1	.	.	.	.	.	.	
<i>Euglena pisciformis</i> Klebs	.	.	.	.	+	.	.	
<i>Euglena spirogyra</i> Ehr.	+	.	.	.	.	.	.	
<i>Euglena</i> sp.	.	.	.	+	+	.	.	
<i>Trachelomonas volvocina</i> Ehr.	.	+	.	.	.	.	.	
<i>Peridinium cinctum</i> /O.F.M./Ehr.	.	.	.	.	1	.	.	
<i>Peridinium bipes</i> f. <i>tabulatum</i> /Ehr./Lef.	1	.	.	.	.	+	.	
<i>Dynobryon sertularia</i> Ehr.	.	+	.	.	.	.	.	
<i>Diatoma elongatum</i> /Lyngb./Ag.	.	.	1	.	.	.	.	
<i>Diatoma vulgare</i> Bory	.	.	.	.	.	.	+	
<i>Fragilaria intermedia</i> Grun.	.	+	.	.	.	.	.	
<i>Synedra amphicephala</i> Kütz.	.	.	.	+	.	+	.	
<i>Synedra capitata</i> Ehr.	+	.	.	.	.	.	.	
<i>Synedra pulchella</i> /Ralfs/Kütz.	.	.	.	.	.	.	+	
<i>Synedra tabulata</i> /Ag./Kütz.	1	.	1	.	.	.	.	
<i>Synedra ulna</i> /Nitzsch /Ehr.	.	+	2	1	.	.	.	
<i>Cocconeis placentula</i> Ehr.	.	1	2	1	.	.	+	
<i>Achnanthes microcephala</i> /Kütz./Grun.	.	.	.	.	.	.	+	
<i>Mastogloia smithii</i> Thw.	.	.	.	1	.	.	.	
<i>Diploneis interrupta</i> /Kütz./Cl.	.	.	.	.	.	+	.	
<i>Navicula bacillum</i> Ehr.	.	.	.	+	.	.	.	
<i>Navicula cincta</i> /Ehr./ Kütz.	.	.	.	.	.	.	+	
<i>Navicula cryptocephala</i> Kütz.	.	.	.	+	1	1	.	
<i>Navicula cryptocephala</i> var. <i>intermedia</i> Grun.	.	.	.	.	+	.	.	
<i>Navicula hungarica</i> Grun.	.	.	.	.	.	+	.	
<i>Navicula hungarica</i> var. <i>capitata</i> /Ehr./Cl.	.	.	.	.	.	1	.	
<i>Navicula radiosa</i> Kütz.	.	+	1	1	.	.	.	
<i>Navicula rhynchocephala</i> Kütz.	.	.	.	.	.	+	.	
<i>Pinnularia microstauron</i> /Ehr./Cl.	.	.	.	.	.	+	.	
<i>Neidium affine</i> /Ehr./Cl.	.	.	.	1	.	.	.	
<i>Caloneis amphisbaena</i> /Bory/Cl.	.	.	.	.	.	+	.	

Tabela 3 cd - Table 3 conti

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Amphora veneta</i> Kütz	.	.	1	.	.	.	.
<i>Cymbella helvetica</i> Kütz.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Cymbella ventricosa</i> Kütz.	.	.	1	.	.	.	.
<i>Gomphonema acuminatum</i> Ehr.	.	.	1	+	.	.	.
<i>Gomphonema acuminatum</i> var. <i>coronatum</i> /Ehr./W.Sm.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Gomphonema capitatum</i> Ehr.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Gomphonema parvulum</i> /Kütz./Grun	.	.	1	.	1	.	.
<i>Epithemia turgida</i> /Ehr./Kütz.	.	+	1	.	.	.	.
<i>Epithemia zebra</i> /Ehr./Kütz.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Epithemia zebra</i> var. <i>saxonica</i> /Kütz./Grun.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Hantzschia amphioxys</i> f. <i>capitata</i> O.Müll.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Nitzschia acicularis</i> W.Sm.	.	+	1	.	.	.	.
<i>Nitzschia filiformis</i> /W.Sm./Hust.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Nitzschia palea</i> /Kütz./W.Sm.	.	.	1	.	+	.	.
<i>Chlamydomonas</i> sp.	.	.	.	+	+	.	.
<i>Pandorina morum</i> /Müll./Bory	.	.	+	.	.	.	.
<i>Eudorina elagans</i> Ehr.	.	+	.	.	+	.	.
<i>Pediastrum boryanum</i> /Turp./Menegh.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Chlorella</i> sp.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Oocystis parva</i> W.et G.S.West.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Ankistrodesmus falcatus</i> /Corda/Ralfs	.	+	+	+	+	.	.
<i>Scenedesmus acuminatus</i> /Lagerh./Chod.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Scenedesmus eornis</i> /Ralfs/Chod.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Scenedesmus quadricauda</i> /Turp./Breb.	.	+	.	.	+	+	.
<i>Crucigenia rectangularis</i> /A.Br./Gay	.	.	+	.	.	.	.
<i>Coelastrum microporum</i> Naeg.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Stigeoclonium</i> sp.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Oedogonium</i> sp.	.	+	1	.	.	.	.
<i>Spirogyra</i> sp.	.	+	2	.	.	.	.
<i>Mougeotia</i> sp.	.	+	.	.	.	1	.
<i>Cosmarium</i> sp.	.	.	2	.	.	.	.

niku zmian kierunku wiatru. Rzęsa rozwijała się przede wszystkim w miejscach dobrze naświetlonych, żyznych, o grubym pokładzie mułu na dnie. Według Olaczka (1963) *Lemna minor* na terenie solnisk podlęczyckich ma charakter halofitu indyferentnego i występuje masowo także w zbiornikach wód słonawych, gdzie często poprzedza zespół *Scirpetum maritimi*.

Doły potorfowe, całe zarośnięte przez *Lemna minor* lub *Lemna trisulca* charakteryzowały się małą zawartością tlenu (do 1,1 mg/l O₂). Być może, że to jest powodem dużego ubóstwa gatunków glonów w tego typu zbiornikach. Zauważono pewną gradację w ilości gatunków glonów w poszczególnych zbiornikach. Najuboższą florę glonów notowano w dołach potorfowych, których cała powierzchnia pokryta była zwartym „kożuchem” *Lemna minor* (tab. 2); więcej gatunków stwierdzono w dołach *Hydrocharis morsus-ranae* i *Lemna trisulca* (tab. 3); dużo gatunków glonów, chociaż występujących rzadko, notowano w dołach z *Lemna trisulca* (tab. 4).

Tabela 4 - Table 4

Glony w skupiskach *Lemna trisulca* L.Algae of concentrations of *Lemna trisulca* L.

Gatunek - Species	Data - Date															
	1968								1969							
	11.06.	29.07.	21.09.	21.09.	9.11.	10.11.	10.11.	26.04.	26.04.	7.05.	13.06.	13.06.	13.06.	5.07.	15.07.	
	Stanowisko								Station							
	3d	5a	1d	5e	4a	7b	7c	7c	7e	6b	1c	2b	2d	3b	5d	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<i>Merismopedia punctata</i> Meyen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Microcystis aeruginosa</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Microcystis aeruginosa</i> f. <i>flos-aquae</i> /Wittr./ Elenkin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gloeocapsa minima</i> /Keis/ Holl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.
<i>Gomphosphaeria fusca</i> Skuja	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gomphosphaeria lacustris</i> Chodat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gomphosphaeria năgeliana</i> /Un./Lemm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lyngbya cryptovaginata</i> Schkorb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria animalis</i> Agardh	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria granulata</i> Gardner	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria princeps</i> Vaucher	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria splendida</i> Greville	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria subtilissima</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Spirulina maior</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Pseudanabaena catenata</i> Lauter.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Nostoc paludosum</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Euglena acus</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Euglena pisciformis</i> Klebs.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus mirabilis</i> Pochm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus orbicularis</i> Hăbn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus pleuronectes</i> /O.F.M./ Dujardin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus pyrum</i> /Ehr./Stein.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Trachelomonas hispida</i> /Perty/Stein em. Defl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Trachelomonas oblonga</i> Lemm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Trachelomonas volvocina</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ceratium cornutum</i> /Ehr./Clap.et Laehm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Peridinium cinctum</i> /O.F.M./Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Dynobryon sertularia</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Melosira varians</i> Ag.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cyclotella kützingiana</i> Thw.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cyclotella meneghiniana</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Diatoma elongatum</i> /Lyngb./Ag.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	.	.	.
<i>Fragilaria capucina</i> Desm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Fragilaria construens</i> /Ehr./Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Fragilaria construens</i> var. <i>subsalina</i> Hust.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Fragilaria intermedia</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Synedra amphicephala</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Synedra pulchella</i> /Ralfs/ Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Synedra tabulata</i> /Ag./Kütz.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Synedra ulna</i> /Nitzsch /Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Eunotia lunaris</i> /Ehr./Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cocconeis placentula</i> Ehr.	1	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> /Ehr./Cl.	.	3	4	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Tabela 4 ed - Table 4 contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Achnanthes affinis</i> Grun.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Achnanthes minutissima</i> Kütz.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Mastogloia smithii</i> Thw.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Diploneis interrupta</i> /Kütz./Cl.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> /Kütz./Pfitz.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> var. <i>sculpta</i> /Ehr./O.Müll.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula cincta</i> /Ehr./Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Navicula cocconeiformis</i> Greg.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula cryptocephala</i> Kütz.	+	+	2	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula cuspidata</i> Kütz.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula gregaria</i> Donk	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula halophila</i> /Grun./Cl.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula hungarica</i> Grun.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Navicula hungarica</i> var. <i>capitata</i> /Ehr./Cl.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula oblonga</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Navicula radiosa</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.
<i>Navicula rhynchocephala</i> Kütz.	+	.	.	.	.	.	1	.	+	.	+	.	.	.	.
<i>Navicula salinarum</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula viridula</i> Kütz.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Pinnularia maior</i> /Kütz./Cl.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Pinnularia viridis</i> /Nitzsen /Ehr.	.	+	.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	+
<i>Caloneis silicula</i> var. <i>peisonis</i> Hust.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.
<i>Amphora commutata</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Amphora ovalis</i> Kütz.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Amphora ovalis</i> var. <i>pediculus</i> Kütz.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cymbella ventricosa</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gomphonema acuminatum</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
<i>Gomphonema acuminatum</i> var. <i>coronatum</i> /Ehr./W.Sm.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Gomphonema angustatum</i> /Kütz./Rabh.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	2
<i>Gomphonema angustatum</i> var. <i>productum</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Gomphonema constrictum</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
<i>Gomphonema lanceolata</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gomphonema olivaceum</i> /Lyngb./Kütz.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.
<i>Gomphonema olivaceum</i> var. <i>calcareum</i> Cl.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.
<i>Gomphonema parvulum</i> /Kütz./Grun.	.	.	1	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	2
<i>Gomphonema</i> sp. div.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Amphiprora paludosa</i> W.Sm.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Epithemia turgida</i> /Ehr./Kütz.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Epithemia zebra</i> /Ehr./Kütz.	1	1	1	+	.	+	1	+	.	.	.	+	1	.	1
<i>Epithemia zebra</i> var. <i>porcellus</i> /Kütz./Grun.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Epithemia zebra</i> var. <i>saxonica</i> /Kütz./Grun.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Rhopalodia gibba</i> /Ehr./O.Müll.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia acicularis</i> W.Sm.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia filiformis</i> /W.Sm./Hust.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Nitzschia palea</i> /Kütz./W.Sm.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia sigmoidea</i> /Ehr./W.Sm.	+	.	.	.	.	.	1	.	+	.	+	.	.	.	.
<i>Nitzschia thermalis</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia</i> sp. div.	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Surirella ovata</i> Kütz.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Campylodiscus clypeus</i> Ehr.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ophiooetyum cochleare</i> A.Braun	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	2	.	.	.
<i>Tribonema</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	4	.	.	.
<i>Pandorina morum</i> /Müll./Bory	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	1
<i>Eudorina elegans</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.
<i>Pediastrum boryanum</i> /Turp./Menegh.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Tabela 4 ca - Table 4 contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Chlorella</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Oocystis</i> sp. div.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Scenedesmus acutus</i> Meyen.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Scenedesmus quadricauda</i> /Turp./Bréb.	.	.	1	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cocciastrium microporum</i> Naeg.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ulothrix</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Cladophora fracta</i> Kütz.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.
<i>Oedogonium</i> sp. div.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	1
<i>Spirogyra</i> sp. div.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1
<i>Mougeotia</i> sp. div.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	2
<i>Closterium ehrenbergii</i> Menegh.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Cosmarium botrytis</i> Menegh.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cosmarium</i> sp. div.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Większość stanowisk, z których pobierano próby do badania glonów, znajdowała się w dołach zarastających w mniejszym lub większym stopniu przedstawicielami zespołu *Scirpo-Phragmitetum* W.Koch 1926. Zespół ten nadaje piętno roślinności w pradolinie. Na wschód od Łęczycy nie ma ani jednego dołu potorfowego, w którym nie występowałby ten zespół lub jego fragment. Według Olaczka (1967) odznacza się on wielkim dynamizmem i wypiera wcześniej powstałe w wodach dołów potorfowych zbiorowiska roślin zanurzonych. Zespół ten występuje na terenach z największą koncentracją soli, jak i na terenach pozbawionych soli.

Niezarośnięte jeszcze przez zespół *Scirpo-Phragmitetum* części dołów potorfowych wypełnione były najczęściej „kożuchami” *Cladophora fracta*. Wśród najliczniej występujących gatunków glonów towarzyszących *Cladophora fracta* (tab. 5) były następujące: *Cocconeis placentula*, *Synedra tabulata*, *Spirogyra* sp., *Mougeotia* sp., *Cosmarium* sp., *Diatoma elongatum*, *Oedogonium* sp., *Epithemia zebra*, *Synedra pulchella*, *Ophiocytium cochleare*. *Cladophora fracta* była też częsta między pędami oczeretów.

W zespole *Scirpo-Phragmitetum*, w warstwie roślin zanurzonych (np.: *Lemna trisulca*), pływających na powierzchni wody jak *Lemna minor* oraz częściowo wynurzonych jak *Sagittaria sagittifolia* — według Oberdorfera (1957) gatunek charakterystyczny dla zespołu — glony reprezentowane były nielicznie (tab. 6).

W częściach dołów niezarośniętych przedstawicielami zespołu *Scirpo-Phragmitetum*, zanotowano 29 VII 1968 r. pływające po powierzchni wody plechy *Oscillatoria princeps* (tab. 7).

Zanotowano również glony towarzyszące rogatekowi sztywnemu (*Ceratophyllum demersum* — tab. 8), który obrosnięty był przez *Chaetophora incrassata*, oraz moczarcze kanadyjskiej (*Elodea canadensis* — tab. 9).

Tabela 5 - Table 5

Glony towarzyszące *Cladophora fracta* Kütz. w zespole *Scirpo-Phragmitetum* Koch 1926Algae occurring with *Cladophora fracta* Kütz. in the association *Scirpo-Phragmitetum* Koch 1926

Gatunek - Species	Data - Date															
	1968															
	1969															
	29.05.	29.05.	29.05.	29.05.	11.06.	19.06.	19.06.	19.06.	19.06.	22.07.	27.07.	27.07.	26.08.	13.08.	1.07.	
	Stanowisko - Station															
	4a	4b	4h	4i	3b	7h	7k	8a	8o	7b	4b	3b	7j	3b	7o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<i>Synechocystis septentrionalis</i> Skuja	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Merismopedia punctata</i> Meyen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Merismopedia tenuissima</i> Lemm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Microcystis aeruginosa</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	1	.
<i>Microcystis aeruginosa</i> f. <i>flos-aquae</i> /Wittr./Elenk.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.
<i>Microcystis</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.
<i>Gloeocapsa limnetica</i> /Lemm./Holl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Gloeocapsa minima</i> /Keiss./Holl.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.
<i>Gloeocapsa minor</i> f. <i>dispersa</i> /Keiss./Holl.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gomphosphaeria aponina</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Gomphosphaeria fusca</i> Skuja	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Gomphosphaeria</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lyngbya aestuarii</i> /Mert./Liebm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Lyngbya cryptovaginata</i> Schkorb.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lyngbya kossinskajae</i> Elenkin	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lyngbya kützingeri</i> /Kütz./Schmidle	2	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Lyngbya maior</i> Menegh.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lyngbya pusilla</i> /Rabh./Hansg.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.
<i>Lyngbya salina</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.
<i>Oscillatoria chalybaea</i> /Mert./Gom.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria limosa</i> Ag.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.
<i>Oscillatoria</i> sp. div.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cylindrospermum</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Anabaena sphaerica</i> Born. et Flah.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
<i>Anabaena</i> sp. div.	.	.	+	.	.	1	2	1	.	1	+	+	.	.	.	.
<i>Nodularia harveyana</i> /Thwait./Thuret	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Calothrix clavata</i> G.S. West	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Calothrix</i> sp.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Euglena acus</i> Ehr.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
<i>Euglena minima</i> Franco	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Euglena pisciformis</i> Klebs.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
<i>Euglena</i> sp. div.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus acuminatus</i> Stokes.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus brachykentron</i> Pochm.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus curvicauda</i> Swiren.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus longicauda</i> /Ehr./Duj.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus mirabilis</i> Pochm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Phacus pyrum</i> /Ehr./Stein	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phacus tortus</i> /Lemm./Skv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Trachelomonas volvocina</i> Ehr.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Gymnodinium aeruginosum</i> Stein	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Peridinium cinctum</i> /O.F.W./Ehr.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	1	.	.	.	.	.
<i>Peridinium inconspicuum</i> Lemm.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.

Tabela 5 cd - Table 5 contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Peridinium bipes f. tabulatum</i> /Ehr./Lef.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Synura uvella</i> Ehr.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cyclotella meneghiniana</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Diatoma elongatum</i> /Lyngb./Ag.	.	.	1	3	1	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.
<i>Diatoma elongatum</i> var. <i>tenue</i> /Ag./V.H.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Fragilaria crotonensis</i> Kitt.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
<i>Synedra acus</i> Kütz.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.
<i>Synedra amphicephala</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Synedra minuscula</i> Grun.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Synedra pulchella</i> /Halle/Kütz.	3	3	.	2	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	3
<i>Synedra tabulata</i> /Ag./Kütz.	.	.	2	2	1	.	+	1	.	2	2	.	2	1	.
<i>Synedra ulna</i> /Nitzsch/Ehr.	.	1	5	.	.	2	2	3	2	.	.	.	.	1	.
<i>Synedra ulna</i> var. <i>biceps</i> /Kütz./v. Schönf.	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Asterionella formosa</i> Hass.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Eunotia lunaris</i> /Ehr./Grun.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Eunotia lunaris</i> var. <i>subarcuata</i> /Näg./Grun.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cocconeis placentula</i> Ehr.	1	.	.	1	2	.	1	.	2	2	2	2	2	3	2
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> /Ehr./Cl.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Achnanthes brevipes</i> Ag.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Achnanthes microcephala</i> /Kütz./Grun.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Achnanthes minutissima</i> Kütz.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+
<i>Rhoicosphenia curvata</i> /Kütz./Grun.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Mastogloia smithii</i> Thw.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	+	.	1	1	.
<i>Navicula cocconeiformis</i> Greg.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula cryptocephala</i> Kütz.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	2	1
<i>Navicula cryptocephala</i> var. <i>intermedia</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula cuspidata</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Navicula gothlandica</i> Grun.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula halophila</i> /Grun./Cl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	1	.	.
<i>Navicula hungarica</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Navicula lanceolata</i> /Ag./Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula peregrina</i> /Ehr./Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Navicula radiosa</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.
<i>Navicula rhynchocephala</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Navicula viridula</i> Kütz.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Navicula viridula</i> var. <i>slesvicensis</i> /Grun./Cl.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Pinnularia maior</i> /Kütz./Cl.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Caloneis amphibiaena</i> /Bory/Cl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Caloneis silicula</i> /Ehr./Cl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Amphora coffeaeformis</i> Ag.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
<i>Amphora delicatissima</i> Krasske	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Amphora ovalis</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Amphora veneta</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Cymbella ventricosa</i> Kütz.	.	.	4	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
<i>Gomphonema angustatum</i> /Kütz./Rabh.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Gomphonema parvulum</i> /Kütz./Grun.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
<i>Amphiprora poludosa</i> W.Sm.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	1	.	1	1
<i>Epithemia turgida</i> /Ehr./Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.
<i>Epithemia zebra</i> /Ehr./Kütz.	1	+	.	.	.	1	3	2	.	2	1	.	2	.	.
<i>Epithemia zebra</i> var. <i>porcellus</i> /Kütz./Grun.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
<i>Epithemia zebra</i> var. <i>saxonica</i> /Kütz./Grun.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.
<i>Rhopalodia gibba</i> /Ehr./O.Mall.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Hantzschia amphioxys</i> /Ehr./Grun.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia acicularis</i> W.Sm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Nitzschia amphibia</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Nitzschia palea</i> /Kütz./W.Sm.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	1	1	1	.	.

Tabela 5 cd - Table 5 contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Nitzschia sigmoidea</i> /Ehr./W.Sm.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.
<i>Campylodiscus clypeus</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.
<i>Ophiocytium cochleare</i> A.Braun	1	1	1	1	.	.	+	.	1	.	1	.	.	2	+
<i>Tribonema</i> sp.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Pandorina morum</i> /Müll./Bory	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.
<i>Eudorina elegans</i> Ehr.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Volvox aureus</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Pediastrum boryanum</i> /Turp./Menegh.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oocystis lacustris</i> Chodat	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oocystis</i> sp. div.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Eremosphaera gigas</i> /Arch./Pott et Kalina	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Tetradon incus</i> /Teiling/G.M.Smith	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ankistrodesmus falcatus</i> /Corda/Ralfs	.	.	.	2	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.
<i>Scenedesmus acuminatus</i> /Lagerh./Chod.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.
<i>Scenedesmus acutiformis</i> Schröder	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
<i>Scenedesmus ecornis</i> /Ralfs /Chod.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	1	+
<i>Scenedesmus quadricauda</i> /Turp./Bréb.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
<i>Crucigenia quadrata</i> Morren	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Crucigenia rectangularis</i> /A.Br./Gay	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Ulothrix</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
<i>Cladophora fracta</i> Kütz.	3	2	3	4	4	4	2	3	3	2	3	3	2	2	3
<i>Rhizoclonium hieroglyphicum</i> /Ag./Kütz.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oedogonium</i> sp. div.	.	.	+	.	2	.	2	.	2	.	1	.	.	.	.
<i>Spirogyra</i> sp. div.	.	.	3	.	2	1	3	2	2	.	3	3	.	1	.
<i>Mougeotia</i> sp. div.	.	.	2	4	3	.	3	2	.	2	4	.	.	.	.
<i>Closterium leibleinii</i> Kütz.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Cosmarium botrytis</i> Menegh.	.	.	+	.	1	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Cosmarium meneghini</i> Bréb.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
<i>Cosmarium</i> sp. div.	.	.	3	2	1	.	2	2	2	.	2	2	.	.	.
<i>Staurostrum</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.

Na terenach najbardziej zasolonych zwracano uwagę na glony tworzące następującym zespołom roślin naczyniowych:

1) *Salicornietum brachystachyae* = *Salicornietum patulae* (A. Schulz 1939), W. Christ. 1955. Notowana facja degradacji tego zespołu (Olaczek 1963) występuje na obszarze najsilniej zasolonego torfu w okolicach wsi Wilczkowice Stare, Błonie i Zawada. Płaty tego zespołu wykształcają się na nagim torfie. W czasie posuchy letniej powierzchnia torfu pokryta jest błyszczącymi kryształkami soli. W płatach tego zespołu zdecydowanie dominuje *Salicornia brachystachya*, stałą zaś domieszkę stanowią *Spergularia salina*, *Puccinellia distans* i *Glaux maritima*.

Oznaczono glony występujące w wilgotnym mule między *Salicornia brachystachya* (tab. 10) oraz płaty, gdzie między pędami *Salicornia brachystachya* notowano obecność zielonych nitkowatych *Rhizoclonium* (tab. 11). Oba biotopy charakteryzowały się pewnym podobieństwem gatunków glonów. (*Navicula cincta* z odmianą *heufleriana*, *Amphora coffeaeformis*, *Nitzschia vitrea* var. *salinarum*, *Nitzschia clausii*). W pierwszym przy-

Tabela 6 - Table 6

Glony występujące w warstwie z *Lemna trisulca* L. i *Sagittaria sagittifolia* L.
w zespole *Scirpo-Phragmitetum* W.Koch 1926

Algae occurring in the layer with *Lemna trisulca* L. and *Sagittaria sagittifolia* L.
in the association *Scirpo-Phragmitetum* W.Koch 1926

Gatunek - Species	Data - Date						
	1968					1969	
	11.06.	11.06.	11.06.	21.09.	9.11.	5.07.	5.07.
	Stanowisko - Station						
	3b	3d	3d	3b	1c	3b	3d
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Lyngbya cryptovaginata</i> Schkorb	.	.	.	.	+	+	.
<i>Lyngbya hieronymusii</i> Lemm.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria brevis</i> /Kütz./Gom.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Oscillatoria chalybaea</i> /Mertens/Gom.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Oscillatoria granulata</i> Gard.	.	.	+	.	+	.	.
<i>Pseudanabaena catenata</i> Lauter.	.	.	+	.	.	.	.
<i>Euglena acus</i> Ehr.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Euglena oxyuris</i> Schwarda	.	.	+	.	.	.	.
<i>Phacus longicauda</i> /Ehr./Dujardin	.	+	.	.	.	.	.
<i>Phacus pleuronectes</i> /O.F.M./Dujardin	.	+	.	.	.	.	.
<i>Trachelomonas hispida</i> /Perty/ Stein Defl.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Trachelomonas volvocina</i> Ehr.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Gymnodinium aeruginosum</i> Stein	.	4	.	.	.	.	.
<i>Peridinium cinctum</i> /O.F.M./Ehr.	.	+	.	.	+	.	.
<i>Diatoma elongatum</i> /Lyngb./Ag.	+	+	+	.	.	.	.
<i>Synedra pulchella</i> /Ralfs/Kütz.	.	+	+	.	.	+	.
<i>Synedra tabulata</i> /Ag./Kütz.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Synedra ulna</i> /Nitzsch/Ehr.	+	.	.	.	.	+	.
<i>Eunotia lunaris</i> /Ehr./Grun.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Cocconeis placentula</i> Ehr.	.	+	.	+	+	+	.
<i>Achnanthes affinis</i> Grun.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Achnanthes brevipes</i> Ag.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Rhoicosphenia curvata</i> /Kütz./Grun.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Mastogloia grevillei</i> W.Sm.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Mastogloia smithii</i> Thw.	1	+	.	.	.	.	.
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> var. <i>sculpta</i> /Ehr./ O.Müll.	+	.	.	+	.	.	.
<i>Navicula cincta</i> /Ehr./Kütz.	+	.	.	.	.	+	.
<i>Navicula cryptocephala</i> Kütz.	+	1	.	.	+	.	.
<i>Navicula cuspidata</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Navicula peregrina</i> /Ehr./Kütz.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula radiosa</i> Kütz.	.	1	.	+	.	.	.
<i>Pinnularia maior</i> /Kütz./Cl.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Neidium affine</i> /Ehr./Cl.	+	.	.	.	.	.	+
<i>Amphora commutata</i> Grun.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Cymbella lanceolata</i> /Ehr./V.H.	+	.	.	.	.	+	.
<i>Gomphonema angustatum</i> /Kütz./Rabh.	.	+	.	.	+	.	.
<i>Amphiprora paludosa</i> W.Sm	.	.	+	.	.	.	1
<i>Epithemia zebra</i> /Ehr./Kütz.	.	2	.	2	+	.	.
<i>Nitzschia filiformis</i> /W.Sm./Hust.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia palea</i> /Kütz./W.Sm.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Nitzschia sigmoidea</i> /Ehr./W.Sm.	.	.	.	.	.	.	1

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Campylodiscus clypeus</i> Ehr.	.	.	+	+	.	.	.
<i>Campylodiscus clypeus</i> var. <i>bicostata</i> /W.Sm./Bust.	.	.	.	.	.	.	2
<i>Chlorella</i> sp.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Scenedesmus quadricauda</i> /Turp./Bréb.	1	.	+	+	+	+	.
<i>Microspora</i> sp.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Cladophora fracta</i> Kütz.	2	.	.	.	.	.	.
<i>Oedogonium</i> sp.	.	.	1	.	.	.	.
<i>Spirogyra</i> sp.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Mougeotia</i> sp.	.	.	1	.	.	.	.
<i>Closterium ehrenbergii</i> Menegh.	.	.	+	.	.	.	.

Tabela 7 - Table 7

Glony towarzyszące skupieniom *Oscillatoria princeps* Vaucher
w zespole *Scirpo-Phragmitetum* W.Koch 1926

Algae occurring in the aggregations of *Oscillatoria princeps* Vaucher
in the association *Scirpo-Phragmitetum* W.Koch 1926

Gatunek - Species	Data - Date	
	1968	
	29.07.	29.07.
	Stanowisko - Station	
	4h	41
1	2	3
<i>Microcystis aeruginosa</i> Kütz	1	.
<i>Oscillatoria princeps</i> Vaucher	4	5
<i>Nostoc paludosum</i> Kütz	+	.
<i>Phacus mirabilis</i> Pochm.	.	+
<i>Synedra capitata</i> Ehr.	.	+
<i>Fragilaria</i> sp.	.	3
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> /Ehr./Cl.	3	.
<i>Rhizosolenia curvata</i> /Kütz./Grun.	.	+
<i>Mastogloia smithii</i> Thw.	.	+
<i>Navicula cryptocephala</i> Kütz.	1	1
<i>Navicula cuspidata</i> Kütz.	.	+
<i>Navicula oblonga</i> Kütz.	.	4
<i>Navicula oblonga</i> var. <i>subcapitata</i> Pant.	.	1
<i>Pinnularia maior</i> /Kütz./Cl.	+	.
<i>Pinnularia viridis</i> /Nitzsch /Ehr.	+	.
<i>Cymbella affinis</i> Kütz.	.	+
<i>Cymbella cymbiformis</i> /Ag? Kütz./V.H.	.	3
<i>Cymbella ventricosa</i> Kütz.	.	1
<i>Gomphonema olivaceum</i> var. <i>calcareum</i> Cl.	+	.
<i>Epithemia turgida</i> /Ehr./Kütz.	+	1
<i>Epithemia zebra</i> /Ehr./Kütz.	.	1
<i>Pediastrum duplex</i> Meyen	.	+
<i>Scenedesmus quadricauda</i> /Turp./Bréb.	.	2

Głony towarzyszące *Ceratophyllum demersum* L.Algae occurring with *Ceratophyllum demersum* L.

Gatunek - Species	Data - Date
	29.05.1968
	Stanowisko - Station
	4h
1	2
<i>Lyngbya bipunctata</i> Lemm.	+
<i>Diatoma elongatum</i> /Lyng./Ag.	1
<i>Synedra ulna</i> /Nitzsch./Ehr.	+
<i>Cocconeis placentula</i> Ehr.	+
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> /Ehr./Cl.	+
<i>Gomphonema parvulum</i> /Kütz./Grun.	+
<i>Scenedesmus acutus</i> Meyen	+
<i>Chaetophora incrassata</i> /Hudson/Hazen	2
<i>Cladophora fracta</i> Kütz.	+
<i>Spirogyra</i> sp.	1
<i>Microgeotia</i> sp.	+
<i>Closterium ehrenbergii</i> Menegh.	+
<i>Cosmarium</i> sp. 13	+

padku liczba gatunków była 100% większa niż w drugim. Na wilgotnym torfie między solirodkiem zanotowano szereg gatunków mezohalinowych, np.: *Synedra pulchella*, *Amphora coffeaeformis*, *Amphiprora paludosa*, *Navicula peregrina*, *Amphora commutata*, *Nitzschia closterium*, *Navicula salinarum*.

2) *Spergulario-Puccinellietum distantis* Feekes 1936. Na terenie solnisk podłęczyckich jest to najpospolitszy zespół halofilny; płaty jego wykształcają się na torfach zasolonych wzdłuż dróg i w miejscach wypasanych. Jak stwierdza Olaczek (1963) roślinność w tym zespole układa się zwykle w dwie warstwy. Na niższą składa się *Spergularia salina*, tworząca nierzadko gęste, jasnozielone „dywany” oraz *Juncus ranarius*, *Glaux maritima*, *Potentilla anserina* i *Atriplex hastatum* var. *salinarum*. W sąsiedztwie takiego zespołu, w specyficznych warunkach ekologicznych (łagodnie opadające brzegi wypłyconego dołu o zasoleniu 2700 - 3600 mg/l Cl⁻ jesienią pojawiały się *Vaucheria terrestris* i *V. hamata*. Łącznie z nimi licznie występowała *Atriplex hastatum* var. *salinarum* (tab. 12). Wśród glonów towarzyszących zanotowano obecność szeregu gatunków halofilnych.

W strefie najsilniejszego zasolenia notowano obecność *Enteromorpha intestinalis* w dołach, które zarastały przedstawicielami zespołu *Scirpetum maritimi* (W.Christ. 1934) Tx. 1937. Zespół ten w okolicach Łęczycy występuje wąskimi pasmami wzdłuż brzegów zbiorników z wodą zasolo-

Tabela 9 - Table 9

Glony towarzyszące *Elodea canadensis* Rich.
Algae occurring with *Elodea canadensis* Rich.

Gatunek - Species	Data - Date
	7.05.1969
	Stanowisko - Station
	5c
1	2
<i>Microcystis aeruginosa</i> f. <i>flos-aquae</i> /Wittr./Elenk.	2
<i>Gomphosphaeria naegeliana</i> /Un./Lemm.	1
<i>Phacus pyrum</i> /Ehr./Stein	1
<i>Trachelomonas oblonga</i> Lemm.	1
<i>Fragilaria intermedia</i> Grun.	1
<i>Eunotia lunaris</i> /Ehr./Grun.	1
<i>Navicula cryptocephala</i> Kütz.	2
<i>Navicula cryptocephala</i> var. <i>veneta</i> /Kütz./Grun.	+
<i>Navicula radiosa</i> Kütz.	2
<i>Pinnularia maior</i> /Kütz./Cl.	2
<i>Gomphonema acuminatum</i> Ehr.	1
<i>Gomphonema parvulum</i> /Kütz./Grun.	2
<i>Epithemia zebra</i> /Ehr./Kütz.	2
<i>Rhopalodia gibba</i> /Ehr./ O.Müll.	2
<i>Rhopalodia gibba</i> var. <i>ventricosa</i> /Ehr./Grun.	+
<i>Tribonema</i> sp.	2
<i>Pediastrum biradiatum</i> Meyen	1
<i>Coelastrum microporum</i> Naeg.	1
<i>Chaetophora elegans</i> /Roth./Agardh	+
<i>Stigeoclonium</i> sp.	1
<i>Oedogonium</i> sp.	1
<i>Closterium</i> sp. div.	2
<i>Cosmarium</i> sp. div.	2

ną (Olaczek 1963). Z glonów towarzyszących *Enteromorpha intestinalis* (tab. 13) najliczniej reprezentowane były następujące gatunki: *Anabaena variabilis*, *Phacus orbicularis*, *Navicula cryptocephala*, *N. salinarum*, *N. peregrina*, *Anomooneis sphaerophora* var. *sculpta*, *Amphiprora paludosa*, *Amphora commutata*, *Amphora coffeaeformis*, *Campylodiscus clypeus*. Duża obecność halofitów wśród wyżej wymienionych gatunków tłumaczy się tym, że na badanym terenie plechy *Enteromorpha intestinalis* notowane były w strefie o największym stężeniu chlorków bo 1500 - 3600 mg/l jonów.

Zespoły i zbiorowiska roślin wyższych i ramienic na badanym terenie opisane zostały przez R. Olaczka (1963, 1967). Korzystałem również z prac Oberdorfera (1957, 1962), Scamoniego (1967) i Wilkoń-Michalskiej (1962, 1963).

Tabela 10 - Table 10

Glony występujące na wilgotnej glebie w zespole

Salicornietum brachystachyae = Salicornietum patulae /A.Schulz 1939/ W.Christ.1955

Algae occurring on the wet soil in the association

Salicornietum brachystachyae = Salicornietum patulae /A.Schulz 1939/ W.Christ.1955

Gatunek - Species	Data - Date				
	1968			1969	
	29.05.	29.05.	9.11.	19.10.	19.10.
	Stanowisko - Station				
	4f	4f	4f	2a	4f
1	2	3	4	5	6
Merismopedia punctata Meyen	.	+	.	.	.
Gloeocapsa turgida /Kütz./Holl.	.	+	.	.	.
Lyngbya martensiana Menegh.	.	1	.	+	.
Oscillatoria limosa Agardh.	.	.	.	+	.
Euglena gracilis Klebs	.	.	5	.	.
Synedra pulchella /Ralfs./Kütz	.	.	.	.	+
Cocconeis placentula Ehr.	1	.	.	.	.
Mastogloia smithii Thw.	.	.	1	.	.
Anomooneis sigmaerophora var. sculpta /Ehr./O. Müll.	.	.	.	.	1
Navicula cari Ehr.	+	.	.	.	.
Navicula cincta /Ehr./ Kütz.	2	.	.	3	.
Navicula cincta var. heuflerii Grun.	1	.	.	.	.
Navicula cryptocephala Kütz.	.	4	1	.	+
Navicula cuspidata Kütz	+	.	.	.	.
Navicula cuspidata var. ambigua /Ehr./Cl.	1	.	.	.	.
Navicula gregaria Donk.	.	.	.	.	+
Navicula hungarica Grun.	2	1	.	.	+
Navicula peregrina /Ehr./Kütz.	.	3	.	+	1
Navicula peregrina var. lanceolata Skv.	.	+	.	.	.
Navicula placentula /Ehr./Grun.	.	3	.	.	.
Navicula placentula f. lanceolata Grun.	.	2	.	.	.
Navicula protracta Grun.	.	.	.	.	+
Navicula rhynchocephala Kütz.	.	.	+	.	+
Navicula salinarum Grun.	.	.	.	.	+
Navicula viridula Kütz.	2	3	.	.	.
Funularia maior /Kütz./Cl.	2	.	.	.	.
Neidium affine /Ehr./Cl.	.	.	.	.	+
Caloneis amphisbaena /Bory/Cl.	.	+	.	.	+
Caloneis silicula var. peisonis Hust.	.	+	.	.	+
Amphora coffeaeformis Ag.	.	3	.	.	4
Amphora commutata Grun.	.	+	.	.	3
Gomphonema parvulum /Kütz./Grun.	2	.	.	.	.
Amphiprora paludosa W.Sm.	.	3	.	.	.
Epithemia zebra /Ehr./Kütz.	2	.	.	.	.
Hantzschia amphioxys f. capitata O.Müll.	1	.	.	.	.
Nitzschia clausii Hantzsch.	.	.	.	1	.
Nitzschia closterium /Ehr./W.Sm	.	.	5	.	.
Nitzschia filiformis /W.Sm./Hust.	.	2	.	.	.
Nitzschia linearis W.Sm.	1	+	.	.	.
Nitzschia sigmoidea /Ehr./W.Sm.	2	.	.	.	.
Nitzschia vitrea var. salinarum Grun.	.	.	.	3	.

Tabela 11 - Table 11

Głony watowatych skupień Rhizoclonium w zespole

Salicornietum brachystachyae = Salicornietum patulae /A.Schulz 1939/ W.Christ 1955

Algae of the cottony aggregations of Rhizoclonium in the association

Salicornietum brachystachyae = Salicornietum patulae /A.Schulz 1939/ W.Christ 1955

Gatunek - Species	Data - Date				
	1968		1969		
	25.09.	14.08.	17.09.	19.10.	19.10.
	Stanowisko - Station				
	7h	7h	7h	2b	7h
1	2	3	4	5	6
Navicula cineta /Ehr./Kütz.	1	+	1	+	+
Navicula cineta var.heuflerii Grun.	.	+	+	.	+
Amphora coffeaeformis Ag.	+	.	+	.	.
Gomphonema olivaceum /Lyngb./Kütz.	.	+	.	.	.
Gomphonema olivaceum var.minutissimum Hust.	.	+	+	.	.
Nitzschia capitellata Hust.	.	.	.	.	+
Nitzschia clausii Hantzsch	.	.	.	+	.
Nitzschia commutata Grun.	.	.	+	.	.
Nitzschia hungarica Grun.	1	3	1	.	+
Nitzschia hybrida Grun.	.	.	.	.	+
Nitzschia stagnorum Rabh.	.	+	.	.	1
Nitzschia sublinearis Hust.	.	.	+	.	.
Nitzschia thermalis var.minor Hilse	.	+	1	.	.
Nitzschia vitrea Norman	.	+	.	.	1
Nitzschia vitrea var.salinarum Grun.	.	+	+	3	.
Vaucheria sp.	.	.	.	.	+

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

1. Na terenie solnisk podłęczyczkich oznaczono następujące liczby jednostek systematycznych glonów:

rodzaj gatunek odmiana forma

<i>Cyanophyta</i>	18	89	—	6
<i>Euglenophyta</i>	4	27	—	—
<i>Pyrrophyta</i>	3	6	—	1
<i>Chrysophyceae</i>	2	2	—	—
<i>Bacillariophyceae</i>	35	171	77	7
<i>Xanthophyceae</i>	4	9	—	—
<i>Chlorophyta</i>	35	72	7	—
<i>Charophyta</i>	1	2	—	—

2. Wśród oznaczonych glonów stwierdzono następujące gatunki nowe dla flory Polski: *Lyngbya confervoides* Ag., *Pseudanabaena minuta* Skuja, *Frustulia creuzburgensis* (Krasske) Hustedt, *Navicula crucicula* (W.Sm.) Dank., *Navicula spicula* (Dickie) Cl., *Amphora delicatissima* Krasske,

Tabela 12 - Table 12

Glony towarzyszące *Vaucheria terrestris* Lyng. em. Walz.
w zespole *Spergulario - Puccinellietum distantis* Feekes 1936
Algae occurring with *Vaucheria terrestris* Lyng. em. Walz.
in the association *Spergulario - Puccinellietum distantis* Feekes 1936

Gatunek - Species	Data - Date						
	1968			1969			
	22.09.	25.09.	19.10.	14.08.	17.09.	1.10.	19.10.
	Stanowisko - Station						
	7f	7f	7f	7f	7f	7f	7f
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Lyngbya hieronymusii</i> Lemm.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Oscillatoria brevis</i> /Kütz./Gom.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria laetevirens</i> /Cron./Gom.	.	.	.	+	.	+	.
<i>Oscillatoria pseudogeminata</i> G.Schmid	+	.	.	+	.	.	.
<i>Spirulina tenerima</i> Kütz.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Anabaena</i> sp.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Pseudanabaena catenata</i> Lauterb.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Cyclotella</i> sp.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Synedra tabulata</i> /Ag./Kütz.	1	.	.	.	.	.	.
<i>Achnanthes brevipes</i> Ag.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Achnanthes brevipes</i> var. <i>intermedia</i> /Kütz./Cl.	.	.	.	.	+	.	.
<i>Achnanthes delicatula</i> /Kütz./Grun.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> var. <i>sculpta</i> /Ehr./O.Müll.	+	2	2	1	2	3	1
<i>Navicula cincta</i> /Ehr./Kütz.	1	.	1	2	.	.	2
<i>Navicula cincta</i> var. <i>heuflierii</i> Grun.	.	.	.	1	.	.	.
<i>Navicula cryptocephala</i> Kütz.	.	+	1	+	+	.	+
<i>Navicula peregrina</i> /Ehr./Kütz.	1	2	2	+	1	2	.
<i>Navicula pygmaea</i> Kütz.	.	3	1	.	.	.	.
<i>Navicula rhynchocephala</i> Kütz.	.	1	.	.	.	.	.
<i>Navicula salinarum</i> Grun.	+	1	1	+	.	1	+
<i>Amphora coffeaeformis</i> Ag.	+	1	.	.	+	.	.
<i>Amphora perpusilla</i> Grun.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Amphora veneta</i> Kütz.	1	.	.	.	+	.	.
<i>Nitzschia hungarica</i> Grun.	+	.	.	+	.	.	.
<i>Nitzschia palea</i> /Kütz./W.Sm.	1	+	+	.	.	+	.
<i>Nitzschia stagnorum</i> Rabh.	+	+	.	+	.	.	.
<i>Nitzschia vitrea</i> var. <i>salinarum</i> Grun.	+	.	.	1	.	.	4
<i>Campylodiscus clypeus</i> Ehr.	.	.	+	.	1	+	.
<i>Vaucheria hamata</i> Walz.	.	.	+	.	.	+	.
<i>Vaucheria terrestris</i> Lyngb. em. Walz.	+	+	+	+	+	+	+
<i>Chlorella</i> sp.	.	.	+	.	.	.	+
<i>Rhizoclonium hieroglyphicum</i> /Ag./Kütz.	.	.	.	.	+	.	1
<i>Cosmarium</i> sp. div.	.	.	.	.	+	.	.

Amphora holsatica Hust. Podano również kilka gatunków glonów nowych dla flory śródlądowej Polski. Praca niniejsza wzbogaca florę glonów regionu łódzkiego (K a d ł u b o w s k a 1952, 1959, 1960a, b, 1961 - 1964a - d; Pliński 1969, 1970a, b) o szereg nowych gatunków.

Glony towarzyszące plechom *Enteromorpha intestinalis* /L./ Greville
 Algae occurring with thalli of *Enteromorpha intestinalis* /L./ Greville

Gatunek - Species	Data - Date										
	1968					1969					
	14.05.	19.06.	22.07.	21.09.	10.11.	26.04.	7.05.	24.06.	1.07.	19.10.	8.12.
	Stanowisko					Station					
	7f	7f	7f	7f	7f	7f	7f	7f	7f	7f	7f
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Synechococcus cedrorum</i> Sauvag.	.	+	.	.	.	3	.	.	.	.	.
<i>Gloeocapsa minima</i> /Keis./Holl.	2	.	1	1	3	2	.	+	+	.	.
<i>Gloeocapsa turgida</i> /Kütz./Holl.	1	.	+	.	.	+	1	4	.	.	.
<i>Oscillatoria amphibia</i> Agardh	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria animalis</i> Agardh	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
<i>Oscillatoria chalybaea</i> /Mertens/Gom.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.
<i>Oscillatoria granulata</i> Gardner	+	.	1	.	.	3	+	.	+	.	.
<i>Oscillatoria okenii</i> Agardh	.	.	.	+	+	2	.	+	.	.	.
<i>Oscillatoria splendida</i> Greville	.	.	.	.	+	.	.	1	+	.	.
<i>Oscillatoria tenuis</i> Agardh	+	.	.	+	.	.	.	.	4	.	7f
<i>Oscillatoria</i> sp. div.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Spirulina maior</i> Kütz.	.	+	.	.	1	.	3	+	3	.	.
<i>Pseudanabaena catenata</i> Lauterb.	+	+	.	.	2	.	1	+	.	.	.
<i>Anabaena variabilis</i> Kütz.	+	+	.	2	1	+	+	2	2	.	+
<i>Anabaena variabilis</i> f. <i>tenuis</i> Popov.	.	+	.	1	1	1	1	1	1	.	.
<i>Anabaena</i> sp.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Nostoc paludosum</i> Kütz.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Nodularia harveyana</i> /Thwait./Thuret	.	.	.	1	.	.	+	.	1	.	.
<i>Euglena acus</i> Ehr.	.	1	2	.	1	.	+	.	2	1	1
<i>Euglena pisciformis</i> Klebs	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.
<i>Euglena proxima</i> Dang	.	.	.	+	+	.	1	.	5	+	.
<i>Euglena spirogyra</i> Ehr.	+	+	.	+	.	.	1	.	+	.	.
<i>Phacus curvicauda</i> Swir.	+	.	.	.	+	.	+	.	2	.	.
<i>Phacus mirabilis</i> Pochm.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Phacus orbicularis</i> Hübner.	+	.	+	+	1	.	1	2	1	+	.
<i>Phacus oscillans</i> Klebs	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Phacus pleuronectes</i> /O.F.M./Dujardin.	1	.	.	1	.	2	.	+	+	.	+
<i>Phacus pyrum</i> /Ehr./Stein	+	+	+	.	.	2	+	+	1	+	.
<i>Phacus</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Trachelomonas hispida</i> /Perty/Stein em. Defl.	+	+	.	+	.	1	2	+	4	+	.
<i>Trachelomonas oblonga</i> Lemm.	+	+	.	+	.	1	.	+	3	+	1
<i>Trachelomonas volvocina</i> Ehr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Cyclotella comta</i> /Ehr./Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Cyclotella kützingiana</i> Thw.	.	+	.	.	.	+	.	.	+	.	.
<i>Cyclotella meneghiniana</i> Kütz.	+	+	.	+	.	.	1	1	1	.	1
<i>Cyclotella striata</i> /Kütz./Grun.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
<i>Stephanodiscus astraia</i> /Ehr./Grun.	.	.	.	1	.	.	+	+	1	.	.
<i>Synedra pulchella</i> /Ralfs./Kütz.	+	.	+	1	.	+	.	.	.	.	.
<i>Synedra tabulata</i> /Ag./Kütz.	4	+	+	2	2	+	3	+	+	+	1
<i>Synedra tabulata</i> var. <i>parva</i> /Kütz./Grun.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cocconeis placentula</i> Ehr.	+	+	.	+	2	+	1	+	+	1	+
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> /Ehr./Cl.	1	+	.	+	+	1	+	.	.	.	.
<i>Achnanthes brevipes</i> Ag.	+	.	.	1	.	.	.	+	1	.	.
<i>Achnanthes brevipes</i> var. <i>intermedia</i> /Kütz./Cl.	+	+	+	1	+	+	.	+	.	+	+
<i>Achnanthes minutissima</i> Kütz.	.	+	.	1	.	+	1	+	.	.	.

Tabela 13 cd - Table 13 contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> /Kütz./Pfitz.	+	.	+	+	.	.	+	+	+	.	+
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> var. <i>sculpta</i> /Ehr./Müll.	2	3	+	1	2	2	3	3	3	2	3
<i>Stauroneis anceps</i> Ehr.	1	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Navicula cocconeiformis</i> Greg.	.	.	+	.	.	1	.	.	+	.	5
<i>Navicula cryptocephala</i> Kütz.	4	1	2	4	3	4	2	4	3	1	2
<i>Navicula cryptocephala</i> var. <i>intermedia</i> Grun.	+	+	.	+	+	.	1	.	+	.	+
<i>Navicula cryptocephala</i> var. <i>veneta</i> /Kütz./Grun.	.	1	.	+	+	.	1	.	+	+	.
<i>Navicula gregaria</i> Donk.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	1
<i>Navicula hungarica</i> Grun.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Navicula hungarica</i> var. <i>capitata</i> /Ehr./Cl.	+	.	+	+	.	+	.	.	1	1	1
<i>Navicula peregrina</i> /Ehr./Kütz.	2	1	3	+	3	2	2	3	3	2	2
<i>Navicula pygmaea</i> Kütz.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	+
<i>Navicula rhynchocephala</i> Kütz.	2	1	.	+	.	1	1	2	2	1	1
<i>Navicula salinarum</i> Grun.	1	+	1	2	2	+	+	+	1	+	1
<i>Navicula spicula</i> /Diekie/Cl.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.
<i>Caloneis amphisbaena</i> /Bory/Cl.	.	.	+	1	+	.	+	+	.	+	.
<i>Amphora coffeaeformis</i> Ag.	+	.	+	+	+	+	.	.	+	.	+
<i>Amphora commutata</i> Grun.	+	.	.	1	1	+	.	.	+	+	1
<i>Amphora ovalis</i> var. <i>pediculus</i> Kütz.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
<i>Cymbella ventricosa</i> Kütz.	+	.	.	+	.	.	.	1	+	.	.
<i>Gomphonema angustatum</i> /Kütz./Rabh.	1	.	.	+	.	.	+	1	1	.	+
<i>Gomphonema parvulum</i> /Kütz./Grun.	+	.	+	+	1	.	.	+	.	+	.
<i>Amphiprora paludosa</i> W.Sm.	+	1	+	.	1	+	+	1	1	1	1
<i>Epithemia zebra</i> /Ehr./Kütz.	.	+	.	.	.	+	.	1	.	1	.
<i>Nitzschia apiculata</i> /Greg./Grun.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia closterium</i> /Ehr./W.Sm.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.
<i>Nitzschia dissipata</i> /Kütz./Grun.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.
<i>Nitzschia obtusa</i> W.Sm.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.
<i>Nitzschia palea</i> /Kütz./W.Sm.	.	1	+	.	1	.	+	.	.	.	.
<i>Nitzschia sigmoidea</i> /Ehr./W.Sm.	.	+	+	1	.	.	+	.	1	+	.
<i>Campylodiscus clypeus</i> Ehr.	1	.	+	1	1	.	+	.	1	.	1
<i>Chlamydomonas</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Carteria multifilis</i> /Fres./Dill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
<i>Oocystis</i> sp. div.	.	.	.	+	.	1	.	.	+	.	.
<i>Ankistrodesmus falcatus</i> /Corda/Ralfs	.	+	.	.	1	1	+	.	1	.	1
<i>Scenedesmus acuminatus</i> /Lagerh./Chod.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
<i>Scenedesmus quadricauda</i> /Turp./Bréb.	+	.	+	+	1	1	.	+	+	.	1
<i>Ulothrix</i> sp.	.	.	+	.	.	1	.	.	+	1	.
<i>Cladophora fracta</i> Kütz.	.	+	+	+	+	+	.	+	+	+	.

3. Na podstawie przeprowadzonych badań nie udało się zaobserwować zróżnicowania siedliskowego glonów. Nie stwierdzono również wyraźnego przywiązania poszczególnych gatunków glonów do określonego zakresu stężenia jonów chloru. Na badanym terenie, przy stosunkowo słabym stężeniu jonów Cl^- notowano obecność szeregu licznie występujących form mezohalinowych, euhalinowych czy podawanych w literaturze jako występujące również w morzu.

Stwierdzono, że w stanowiskach z wodą o wyższej koncentracji jonów

chloru (ponad 2400 mg/l) zaznacza się znikomy udział gatunków sinic, euglenin, bruzdnic, złotowiciowców, różnowiciowców i zielenic, chociaż niektóre gatunki z wyżej wymienionych grup notowane były często np.: *Euglena acus* Ehr., *Scenedesmus quadricauda* (Trup.) Bréb., *Scenedesmus acuminatus* (Lagerh.) Chod. Z *Desmidiaceae*, w wodzie z wyższą koncentracją jonów chlorkowych, notowano jedynie *Closterium acerosum* var. *elongatum* Bréb., *Closterium leibleinii* Kütz., *Cosmarium botrytis* Menegh., *Cosmarium humile* var. *striolatum* (Boldt) Schmidle, *Cosmarium meneghini* Bréb.

Większość gatunków glonów była wspólna dla opracowanych zespołów i zbiorowisk roślin naczyniowych i ramienic; są to formy ubikwistyczne. W zależności od położenia zbiornika wodnego na terenie torfowisk, bez względu na jego charakter, notowano obecność pewnych form wspólnych; były to gatunki halofilne. W solniskowych zespołach roślin wyższych glony halofilne były reprezentowane znacznie liczniej niż w innych.

4. W niniejszej pracy przedstawiono spis glonów typowego torfowiska niskiego (pH 7 - 8), podczas gdy publikacje o glonach torfowisk Polski obejmowały torfowiska wysokie (Gołowiń 1964; Kadłubowska 1952; Krawiecowa 1954; Rumek 1946; Rypowa 1927; Wasyluk 1957, 1961).

5. Większość gatunków glonów notowana była na badanym terenie rzadko. Licznie i często na całym prawie terenie występowały następujące gatunki: *Merismopedia punctata* Meyen, *Microcystis aeruginosa* Kütz., *Gloeocapsa minima* (Keis.) Hollerb., *Euglena acus* Ehr., *Phacus acuminatus* Stokes, *Phacus mirabilis* Pochm., *Cyclotella meneghiniana* Kütz., *Diatoma elongatum* (Lyngb.) Ag., *Fragilaria capucina* Desm., *Synedra pulchella* (Ralfs) Kütz., *Synedra ulna* (Nitzsch.) Ehr., *Eunotia lunaris* (Ehr.) Grun., *Cocconeis placentula* Ehr., *Cocconeis placentula* var. *euglypta* (Ehr.) Cl., *Achnanthes brevipes* Ag. (nieczęsto), *Achnanthes brevipes* var. *intermedia* (Kütz.) Cl., *Mastogloia smithii* Thw., *Navicula cincta* (Ehr.) Kütz., *Navicula cryptocephala* Kütz., *Navicula cuspidata* Kütz., *Navicula hungarica* var. *capitata* (Ehr.) Cl., *Navicula oblonga* Kütz., *Navicula peregrina* (Ehr.) Kütz., *Navicula radiosa* Kütz., *Navicula rhynchocephala* Kütz., *Navicula viridula* Kütz., *Pinnularia maior* (Kütz.) Cl., *Pinnularia viridis* (Nitzsch) Ehr., *Neidium affine* (Ehr.) Cl., *Caloneis amphisbaena* (Bory) Cl., *Amphora commutata* Grun. (częsta, ale nielicznie notowana), *Amphora ovalis* var. *pediculus* Kütz., *Cymbella ventricosa* Kütz., *Gomphonema acuminatum* Ehr., *Gomphonema angustatum* (Kütz.) Rabh., *Gomphonema olivaceum* var. *calcareum* Cl., *Gomphonema parvulum* (Kütz.) Grun., *Amphiprora paludosa* W.Sm., *Epithemia turgida* (Ehr.) Kütz., *Epithemia zebra* (Ehr.) Kütz., *Epithemia zebra* var. *saxonica* (Kütz.) Grun., *Rhopalodia gibba* (Ehr.) O.Müll., *Nitzschia acicularis* W.Sm., *Nitzschia filiformis* (W.Sm.) Hust., *Nitzschia palea* (Kütz.) W.Sm., *Nitz-*

schia sigmoidea (Ehr.) W.Sm., *Pandorina morum* (Müll.) Bory, *Eudorina elegans* Ehr., *Scenedesmus acuminatus* (Lagerh.) Chod., *Scenedesmus quadricauda* (Turp.) Bréb., *Cladophora fracta* Kütz., *Oedogonium* sp., *Spirogyra* sp., *Mougeotia* sp., *Closterium leibleinii* Kütz., *Cosmarium botrytis* Menegh. i *Cosmarium meneghinii* Bréb.

Zakład Algologii

Katedra Systematyki i Geografii Roślin

Uniwersytetu Łódzkiego *

* Aktualny adres autora: Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, Gdynia, Czołgistów 46.

SUMMARY

There are few papers dealing with algae of the Polish inland saline waters (Kozłowski 1890; Namysłowski 1914a, b; Torka 1923; Liebetanz 1922; Kadłubowska and Pliński 1967; Pliński 1969). The present study aimed at determination and description of algae living in mostly exploited saline peat-bogs of the Łęczyca vicinity. Algae accompanying patches of *Chara hispida*, aggregations of *Cladophora fracta* and *Oscillatoria princeps*, as well as those occurring in some associations and communities of vascular plants described by Olaczek (1963 and 1967) were also taken in account (see Tables 1-13).

Samples of algae were collected during two vegetative seasons (from May 14, 1968 up to Nov. 10, 1968 and from April 25, 1969 up to Dec. 8, 1969) from 56 stations chosen on the investigated area. Sampling was done by use of the plankton net of mill gauze No. 25. *Cladophora fracta*, *Enteromorpha intestinalis*, *Chara hispida*, *Ceratophyllum demersum* and *Elodea canadensis* were collected from peat excavations by means of anchor, then placed in jacks and immediately conserved in 4% formalin. From halophilous associations there were sampled: thalli of *Vaucheria*, wet slime between the shoots of *Salicornia brachystachya* and green thalli of *Rhizoclonium* between them. A part of each sample was conserved at once in formalin, the remaining part was taken in vivo to the laboratory and put on Petri or polystyrene dishes on a tray with wet blotting paper, then covered with a glass cover. To the material for diatom analysis the treatment was used described by Siemińska (1964).

The determined taxa were arranged according to the work "Flora słodkowodna Polski" (The freshwater flora of Poland; see Starmach 1966-1968 and Siemińska 1964). Each species was characterized by measurements of cell length (dł.*), width (szer.*) and diameter (średn.*) as well as by other diagnostic characters, its distribution on the investigated area by its stations and the date of collecting. (stan.*). Algal flora of salt marshes of Łęczyca was compared to that of other Polish saline areas. In the chapter embracing pages 53-57 habitats and stations of 26 taxa in Poland are given.

The frequency of each algal taxon listed on Tables 1-13 is marked there according to the scale of Starmach (1955 p. 107) shown below:

- + — denotes taxa the individuals of which appeared singly, not in each slide,
- 1 — 1-6 individuals of the given taxon on three analysed strips of each slide,
- 2 — 7-16 individuals on the above strips of each slide,
- 3 — 17-30 " " " " "
- 4 — 31-50 " " " " "

* Abbreviations used in the Polish text.

5—the given taxon dominates: more than 50 individuals on three analysed strips of each slide.

Most species of algae found in associations or communities of vascular plants, as well as those in the patches of *Clara hispida* proved to be common in the investigated communities. The presence of common halophilous species depended on the situation of water reservoirs on the peatbog area. In the associations of vascular saline plants halophilous algae were more abundant than in other communities.

In his investigations the author did not succeed in observing any habitat differentiation of algae. It was not clearly stated that certain species of algae showed a preference for certain concentrations of chlorides.

In habitats with comparatively low concentration of Cl^- there were found numerous, abundantly represented meso- and euhaline species, as well as some species known from the literature as living in the sea.

In water with higher concentrations of Cl^- (more than 2400 mg/l the presence of *Cyanophyta*, *Euglenophyta*, *Pyrrophyta*, *Chrysophyceae*, *Xanthophyceae* and *Chlorophyta* species was rather rare, although some of them proved to be frequent, e.g. *Euglena acus* Ehr., *Scenedesmus quadricauda* (Turp.) Breb. and *S. acuminatus* (Lagerh.) Chod.

On the investigated area there were determined 476 taxons belonging to the following taxonomical units:

	species	variety	form
<i>Cyanophyta</i>	89	—	6
<i>Euglenophyta</i>	27	—	—
<i>Pyrrophyta</i>	6	—	1
<i>Chrysophyceae</i>	2	—	—
<i>Bacillariophyta</i>	171	77	7
<i>Xanthophyceae</i>	9	—	—
<i>Chlorophyta</i>	72	7	—
<i>Charophyta</i>	2	—	—

Among determined algae there were found 7 species new for the flora of Poland, namely: *Lyngbya confervoides* Ag., *Pseudanabaena minuta* Skuja, *Frustula creuzburgensis* (Krasske) Hust., *Navicula crucicula* (W.Sm.) Donk., *Novicula spicula* (Dickie) Cl., *Amphora delicatissima* Krasske, *Amphora holsatica* Hust.

Moreover, there were found a few species new for inland Poland and also some new for the Łódź district.

Laboratory of Algology
Department of Plant Taxonomy and Geography
University of Łódź, Łódź*

* Present address: Institute of Oceanography, Gdańsk University, Gdynia, Czołgistów 46, Poland.

LITERATURA

- Beger H., 1966, Leitfaden der Trink- und Brauchwasserbiologie, VEB, G. Fischer Ver. Jena, pp. 360.
- Bergmann E., 1955, Über den tieferen Untergrund Brandenburgs, Die Erde 1.
- Blumina L. S., 1957, Vodorosli solenych Sol-Ileckich ozer, Bot. Žur. 42 (6):912 - 916.
- Bohr R., 1962, Socjologiczne badania perifitonu roślinnego w jeziorze Mamry, Stud. Soc. Sci. Tor., Sec. D, 6 (1):1 - 44.
- Bohr R., 1967, Zbiorowiska glonów perifitonowych jezior Polski północnej, Zesz. Nauk. Uniw. M. K. Toruń, Nauk. Mat.-Przyr. Biol. X, 17:33 - 104.
- Brockmann C., 1954, Die Diatomeen in den Ablagerungen der ostpreussischen Haffe, Meyniana 3:1 - 95.
- Budde H., 1933, Die algenflora westfalischer Salinen und Salzgewässer, 2 Teil. Arch. Hydrobiol. 25 (2):305 - 325.
- Cabejszek I., 1935, Przyczynek do znajomości okrzemek Białej Przemszy i jej dorzecza na terenie pustyni Błędowskiej. Arch. Hydrob. i Ryb. 9 (3 - 4):170 - 184.
- Caspers H. u. Schulz H., 1964, Die biologischen Verhältnisse der Elbe bei Hamburg. Beitrag zu einer Diskussion der Gütewertung, Arch. Hydrobiol. 60 (1):53 - 88.
- Dąbwska I., 1964, *Charophyta* — Ramienice, PWN, Warszawa, pp. 126.
- Deduszenko-Szczegolewa N. T., Matwienko A. M., Szkorbатов L. A., 1959, Zielenyje wodorosli (*Chlorophyta: Volvocineae*), Opriedielitiel priesnowodnych wodoroslej SSSR, Moskwa - Leningrad, 8, pp. 230.
- Fierdingstad E., 1969, Cell Dimensions and Taxonomy of *Anabaena variabilis* Kütz. (*Cyanophyceae*), Schweiz. Zeitsch. Hydrol. 31 (1):59 - 80.
- Foged N., 1948, Diatoms in water-courses in Funen - VI. Dansk. bot. Ark., 12:1 - 110.
- Fott B., Novakowa M., 1969, A monograph of the genus *Chlorella*. The fresh water species, Academia, Prague, pp. 10 - 74.
- Fröde E. T., 1958 Die Pflanzengesellschaften der Insel Hiddensee, Wiss. Zeitschr. d. Univ. Greifswald 7 (3/4).
- Gołowin S., 1964, Glony torfowiska Chlebowo (pow. Oborniki, woj. poznańskie), Fragm. Flor. Geobot. 10:121 - 161.
- Griep K., 1958, Salz-Spiegel und Salzbut auf dem Lande und unter dem Meere, Abh. Naturw. Ver. Bremen 35 (2).
- Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegl. Meteorol. i Hydrolog. 1:7 - 20.
- Hadač E., 1948, Společenstva řas, [in:] Klika J. Rostlinna socjologie (Fytocoenologie) 289 - 292 Melantrich.
- Heering W., 1914, *Chlorophyceae*, Die Süßwasser-Flora Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, Pascher A. 6, pp. 1 - 103.

- Heering W., 1921. *Chlorophyceae*. Die Süßwasser-Flora Deutschlands. Oesterreichs und der Schweiz, Pascher A., 7, p. 1 - 103.
- Huber-Pestalozzi G., 1955, Das Phytoplankton des Süßwassers. *Euglenophyceen*, Stuttgart, 4.
- Huber-Pestalozzi G., 1968, Das Phytoplankton des Süßwassers. *Cryptophyceae, Chloromonadophyceae, Dinophyceae*, Stuttgart, 3, pp. 322.
- Hustedt F., 1957 Die Diatomeenflora des Fluss-Systems der Weser im Gebiet der Hansestadt Bremen, Abh. naturw. Ver. Bremen, 34 (3):181 - 440.
- Jaworski A., 1962, Wpływ współczesnych ruchów pionowych struktur solnych na rzeźbę terenu, *Geologia za granicą* 3 (4):61 - 65.
- Jelenkin A. A., 1949, Siniezielenije wodorosli SSSR, Moskwa - Leningrad, Akad. Nauk. SSSR, 2, p. 998 - 1908.
- Jergaszew A. E., 1968, Flora wodoroslej Kollektornogrienażnoj sieti Golodniej stepi i jej znaczenie, Iz. „Fan”, Taskient, pp. 251.
- Jewtuchowicz S., 1967, Geneza pradoliny warszawsko-berlińskiej między Nirem i Moszczenicą *Prace geograf.*, 62:1 - 102.
- Just J., Hermanowicz W., 1964, Fizyczne i chemiczne badanie wody do picia i potrzeb gospodarczych, PZWL, Warszawa, pp. 311.
- Kadłubowska J. Z., 1952, Desmidie torfowiska na Marysinie III, *Acta Soc. Bot. Pol.* 21 (3):425 - 434.
- Kadłubowska J. Z., 1959, O odchyleniach w przebiegu koniugacji *Spirogyra majuscula* Kütz., *Acta Soc. Bot. Pol.* 28:745 - 747.
- Kadłubowska J. Z., 1960a, Gatunki rodzaju *Spirogyra* występujące w zbiornikach wodnych Łodzi i okolicy, *Fragm. Flor. Geobot.* 6 (3):221 - 226.
- Kadłubowska J. Z., 1960b, Glony sztucznych term w Łodzi i Pabianicach, *Pol. Arch. Hydrob.* 8:223 - 233.
- Kadłubowska J. Z., 1961, Glony zbiorników wodnych Łodzi i okolicy Ł.T.N., *Wydz. III*, 71:1 - 164.
- Kadłubowska J. Z., 1962, Nowe gatunki glonów występujące w zbiornikach wodnych Łodzi, *Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., Nauki Mat.-Przyr. ser. II*, 13:49 - 58.
- Kadłubowska J. Z., 1963, *Spirogyra elliptica* Jao — nowy gatunek skrzętnicy dla Polski oraz inne skrzętnice nowe dla Łodzi, *Fragm. Flor. Geobot.* 9 (1):163 - 165.
- Kadłubowska J. Z., 1964a, *Spirogyra ternata* Ripart i *Spirogyra Fuellebornii* Schmidle — nowe dla flory Polski gatunki oraz dalsze skrzętnice z terenu Łodzi, *Fragm. Flor. Geobot.* 10 (3):577 - 584.
- Kadłubowska J. Z., 1964b, Okrzemki rzeki Pilicy i ich znaczenie w ocenie czystości wody, *Ł.T.N. Wydz. III*, 97:1 - 48.
- Kadłubowska J. Z., 1964c, Okrzemki rzeki Pilicy i ich znaczenie w ocenie czystości wody, cz. II, Mikroflora rzeki Pilicy, *Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., Nauk. Mat.-Przyr. ser. II*, 16:93 - 150.
- Kadłubowska J. Z., 1964d, Okrzemki rzeki Pilicy i ich znaczenie w ocenie czystości wody, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
- Kadłubowska J. Z., Pliński M., 1967, Okrzemki mezoalinalnych wód w Pełczyskach koło Ozorkowa, VII Zjazd Hydrobiol. Pol. Streszcz. referatów.
- Kisielew I. A., 1954, Pirofitowije wodorosli. Opriedielitel priesnowodnych wodoroslej SSSR, Moskwa, VI, pp. 211.
- Klock W., 1930, Phytoplanktonuntersuchungen in Brackwassergebiet der Unterwarnow, *Int. Ref. ges. Hydrobiol.* 23:305 - 416.
- Kobendza R., 1922, Solanki i roślinność halofitowa w Zgłowiączce na Kuja-wach, *Kosmos* 47 (1 - 3):52 - 59.
- Kolago C., 1957, Geologiczne regiony wód mineralnych Polski, *Przeg. Geol.* 5 (3):118 - 125.

- Kolbe R. W., 1927, Zur Ökologie, Morphologie und Systematik der Brackwasser-diatomeen. Die Kieselalgen des Sperenberger Salzgebietes, Pflanzenforschung, 7:1 - 146.
- Kolbe R. W., 1932, Grundlinien einer allgemeinen Ökologie der Diatomeen, Ergebn. Biol. 8:221 - 354.
- Kolkwitz R., 1950, Ökologie der Saprobien. Über die Beziehungen der Wasserorganismen zur Umwelt. Schriftenreihe des Ver. f. Wasser-, Boden- und Luft-hygiene in Berlin - Dahlem, Stuttgart 4:1 - 64.
- Kornaś J., 1957, Zbiorowiska roślin zarodnikowych i ich klasyfikacja, Wiad. Bot. 1:3 - 18.
- Korszykow O. A., 1953, Wyznacznik prisnowodnych wodorostej Ukrainy RSR, Kyjew, V, pp. 437.
- Kosinskaja E. K., 1951, Diesmidiewyie wodorosli (*Desmidiaceae*) j ewropejskogo siewiera SSSR, Sporow. rastienija, Moskwa, 7:481 - 712.
- Kozłowski W., 1890, Przyczynek do flory wodorostów z okolic Ciechocinka, Pam. Fizjogr. 10:245 - 259.
- Krasske G., 1927, Diatomeen deutscher Solquellen und Gradierwerke, Arch. Hydrobiol. 18 (2):252 - 272.
- Krawiecowa A., 1954, Bielawskie Błoto — ginące torfowisko atlantyckie Pomorza, Ochr. Przyr. 22:67 - 159.
- Kubiak W., 1960, Analiza hydrograficzna odcinka pradoliny między Bzurą a Nierem (maszynopis).
- Kukucz J., 1937, Zarys biologii stawku w Ogrodzie botanicznym w Krakowie, Prace Rolniczo-Leśne, PAU, 24:1 - 147.
- Lakowitz K., 1929, Die Algenflora der gesamten Ostsee, Gdańsk, pp. 474.
- Legnerova J., 1969, The systematics and ontogenesis of the genera *Ankistrodesmus* Corda and *Monoraphidium* gen. nov., Academia, Prague, pp. 75 - 144.
- Lemmermann E., Brunnthaler J. u. Pascher A., 1915, *Chlorophyceae*. Pascher A. Die Süßwasser-Flora Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, V, pp. 1 - 250.
- Lencewicz S., 1927, Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla, Prace Państw. Inst. Geol. 2 (2):67 - 220.
- Lencewicz S., Kondracki J., 1964, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, pp. 486.
- Liebetanz B., 1925, Hydrobiologische Studien an Kujawischen Brackwasser, Bull. Intern. Ac. Sci. Kraków, ser. B, 1 - 2:1 - 116.
- Luer-Jeziorańska A., 1939, Materiały do flory planktonu rzeki Jeziorzki, Planta Polonica, 8 (2):1 - 42.
- Margalef R., 1947, Limnosociologia, Monografias de Ciencias Modernas 10:1 - 93.
- Margalef R., 1949, Las asociaciones de algas en las aguas dulces de pequeño volumen del Noreste de España, Vegetatio 1:258 - 284.
- Mądałski J., 1954, Nowe stanowisko halofitów i innych roślin zebranych w okolicach Łęczycy, Fragm. Flor. Geobot. 1:69 - 80.
- Medwecka-Kornaś A., 1952, Rezerваты stepowe nad dolną Nidą, Chrońmy Przyr. Ojcz. 8 (6):3 - 20.
- Migula W., 1909, Algen. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, Berlin, II, 1, pp. 918.
- Mikołajski J., 1927, O powstaniu tzw. pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Bad. geogr. nad Polską pn.-zach. 2/3.
- Mowszowicz J., 1962, Zarys zagadnień fizjograficzno-florystycznych województwa łódzkiego, Ł.T.N. Wyd. III, 80:1 - 44.
- Namysłowski B., 1914a, Nieznane solniskowe mikroorganizmy z głębi wielkiej kopalni, Bull. Intern. Ac. Sci., Kraków: 88 - 104.

- Namysłowski B., 1914b, Mikroorganizmy galicyjskich szczaw i solanek, Spraw. Kom. Fizjogr. AU, 48:80 - 106.
- Nygaard G., 1949, Hydrobiological studies on some Danish ponds and lakes, Kong. Danske Vid. Selsk. 7:1 - 263.
- Oberdorfer E., 1957, Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Pflanzensoziologie 10:1 - 564.
- Oberdorfer E., 1962, Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und die angrenzenden Gebiete, Stuttgart, Ver. E. Ulmer, pp. 987.
- Olaczek R., 1963, Zbiorowiska roślinne torfowisk niskich okolic Łęczycy, Łódź (maszynopis).
- Olaczek R., 1967, Zespoły szuwarowe i turzycowe dolin Bzury i Zianu. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. Nauk. Mat.-Przyr. ser. II, 23:75 - 99.
- Olśzewski T., 1962, Rejony rolnicze północnego obszaru województwa łódzkiego. L.T.N. Wyd. III, pp. 151.
- Pankin W., 1945, Zur Entwicklungsgeschichte der Algensoziologie und zum Problem der „echten“ und „zugehörigen“ Algengesellschaften. Arch. Hydrobiol. 41:92 - 111.
- Pankow H., 1965, Beitrag zur Kenntnis der Kieselalgenflora der Peene. Arch. Hydrobiol., 61 (2):205 - 214.
- Pascher A., 1927, Volvocales. Die Süßwasser-Flora Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. IV, pp. 1 - 506.
- Piotrowska H., 1961, Roślinność solniskowa pod Kołobrzegiem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 17 (4):24 - 28.
- Pliński M., 1969, Okrzemki słonego źródła w Pelczyskach pod Ozorkowem, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. Nauk. Mat.-Przyr. ser. II, 31:123 - 136.
- Pliński M., 1970a, Skład jakościowy i ilościowy glonów rzeki Sokołówki (ok. Łodzi) w cyklu rocznym, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. Nauk. Mat.-Przyr. ser. II, 36:63 - 74.
- Pliński M., 1970b, Glony źródeł i stawów w Rogoźnie pod Domaniewiczami w pow. łowickim Ziemi Łódzkiej, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. Nauk. Mat.-Przyr. ser. II, 36:75 - 88.
- Poborski J., 1957a, O wstępnych badaniach struktury solnej pod Łęczycą, Inst. Geol., Biul. 105 (1):161 - 186.
- Poborski J., 1957b, Cechszyńska struktura solna Izbica - Łęczycą. Przegl. Geol. 5 (1):31 - 32.
- Popowa T. G., 1951, Jewglenowyje (*Euglenineae*) jewropiejskiego siewiera SSSR, Sporow. rastienija, Moskwa 7:165 - 414.
- Pożaryski W., 1952, Podłoże mezozoiczne Kujaw, Państw. Inst. Geol., Biul. 55:3 - 62.
- Pożaryski W., 1963, Jednostki geologiczne Polski, Przegl. Geol. 11 (1):4 - 10.
- Pożaryski W., 1964, Zarys tektoniki paleozoiku i mezozoiku Niżu Polskiego, Kwart. geol. 8 (1):1 - 41.
- Printz H., 1964, Die Chaetophorales der Binnengewässer, Verl. dr W. Junk, Den Haag, Oslo, pp. 376.
- Raciborski M., 1910 - 1911, Phycotheca polonica. cz. I, II, III, Kosmos 35:80 - 89, 1001 - 1006, 36:987 - 994.
- Redeke H. C., 1932, Abriss der regionalen Limnologie der Niederlande, Hydrobiol. Club Amsterdam, 1.
- Rehakova H., 1969, Die Variabilität der Arten der Gattung Oocystic, A. Braun, Academia, Prague, pp. 145 - 169.
- Remane A., Lüssing G., 1960, Einwirkungen des Salzgehaltes auf Vermehrung und Wachstum bei *Lemna minor*, Kieler Meeresforsch. 16 (2):221 - 228.

- Remane A. u. Schlieper C., 1958, Die Biologie des Brackwassers. Binnengewässer 22:1 - 384.
- Romer E., 1949, Regiony klimatyczne Polski, W.T.N., Prace ser. B, 16:1 - 26.
- Rouppert K., 1913, O dwu planktonowych okrzemkach (*Chaetoceros Zachariasii* i *Attheya Zachariasii*), Rozp. Wydz. Mat. Przyr. Ak. Um. ser. III, B, 13:291 - 310.
- Rumek A., 1946, Okrzemki torfowiska w Borku Fałęckim koło Krakowa, Mat. Fizjogr. Kraju PAU, 2:1 - 36.
- Rumek A., 1948, Lista gatunków fitoplanktonu powierzchniowego Zatoki Gdańskiej, Biul. Mors. Labor. Ryb. w Gdyni 4:139 - 141.
- Rypowa H., 1927, Glony jezior torfowych tzw. „sucharów” w okolicach Wigier, Arch. Hydrobiol. i Ryb. 2:41 - 66.
- Samsonowicz J., 1928, O solankach w pow. łączyskim i o ich związku z budową podłoża czwartorzędowego, Pos. Nauk. PIG. 19 - 20.
- Samsonowicz J., 1954, Wyniki hydrogeologiczne dwu głębokich wierceń w Ciecchocinku, Inst. Geol., Biul. 91:1 - 39.
- Scamoni A., 1967, Wstęp do fitosocjologii praktycznej, PWRiL, Warszawa, pp. 247.
- Scheele M., 1956, Verbreitung und Ökologie der Kieselalgen der Werra mit besonderer Berücksichtigung der Halophyten, Arch. Hydrobiol. 51 (4):425 - 456.
- Schmuck A., 1959, Zarys klimatologii Polski, PWN, Warszawa, pp. 160.
- Siemińska J., 1964, *Bacillariophyceae* — Okrzemki, Flora Ślaskowa. Pol. VI, pp. 610.
- Siemiradzki J. i Dunikowski E., 1891, Szkic geologiczny Królestwa Polskiego, Galicji i krajów przyległych, Pamiętnik Fizjogr. 11.
- Simonsen R., 1962, Untersuchungen zur Systematik und Ökologie der Bodendiatomeen der westlichen Ostsee, Int. Rev. d. ges. Hydrobiol., Syst. Beih. 1:1 - 144.
- Skalska T., 1966, Występowanie okrzemek w źródle w Dubiu, Acta Hydrobiol. 8, suppl. 1:311 - 319.
- Starmach K., 1939, Badania sestonu górnej Wisły i Białej Przemszy, Spr. Kom. Fizjogr. 73:1 - 145.
- Starmach K., 1955, Metody badania planktonu, PWRiL, Warszawa, pp. 135.
- Starmach K., 1961, Zbiorowiska glonów w potoku Piekienik koło Jabłonki, Acta Hydrobiol. 3 (2 - 3):143 - 150.
- Starmach K., 1962, Badania zbiorowisk organizmów wodnych (maszynopis).
- Starmach K., 1963, Rośliny słodkowodne, PWN, Warszawa, Flora Ślaskowa. Pol. 1, pp. 271.
- Starmach K., 1966, *Cyanophyta* — Sinice, *Glaucophyta* — Glaukofity, Flora Ślaskowa. Pol., PWN, Warszawa, II, pp. 807.
- Starmach K., 1968, *Chrysophyceae* — Złotowiciowce oraz Wiciowce bezbarwne — *Zooflagellata* wolnożyjące, Flora Ślaskowa. Pol., 5, pp. 598.
- Starmach K., 1968, *Xanthophyceae* — Różnowiciowce, Flora Ślaskowa. Pol., PWN, Warszawa — Kraków, VII, pp. 394.
- Starmach K., 1969, Glony źródeł na wybrzeżu morskim w Chłapowie, Fragm. Flor. Geobot. 15 (4):503 - 511.
- Sulek J., 1969, Taxonomische Übersicht der Gattung *Pediastrum* Meyen, Academia, Prague, pp. 197 - 261.
- Symoens J. J., 1951, Esquisse d'un système des associations algales d'eau douce, Intern. Ver. Limnol. 9:395 - 408.
- Thomson P. W., 1947, Geologische Beobachtungen aus dem Warthegebiet, Geol. Fören. Stockholm. Förh. 69.
- Thunmark S., 1945, Zur Soziologie des Süßwasserplanktons, Folia Limnol. Scandinav. 3:1 - 66.

- Torka V., 1923, Diatomeen einiger salzhaltiger Orte Polens, Deutsche wissensch. Zeitschr. f. Polen, 1:79 - 80.
- Trahms O. K., 1939, Beiträge zur Ökologie küstennaher Brackwasser, Arch. Hydrobiol. 35 (4):529 - 551.
- Uherkovich G., 1966, Die *Scenedesmus* - Arten Ungarns, Akademia Kiadó, Budapest, pp. 173.
- Viete G., 1961, Über junge Tektonik in Mitteldeutschland, Rep. VI. INQUA Congress, Warszawa 1961.
- Wasylik K., 1957, Desmidiaceae in der westlichen Hälfte der Puszty Niepolomickiej, Fragm. Flor. Geobot. 3 (1):153 - 169.
- Wasylik K., 1961, Glony torfowisk wysokich Kotliny Nowotarskiej ze szczególnym uwzględnieniem desmidiaceae, Fragm. Flor. Geobot. 7 (1):215 - 288.
- Wehrle E., 1939, Zur Kenntnis der Algen im Naturschutzgebiet Weingarten Moor bei Karlsruhe a. Rh. Beitr. naturkundl. Forsch. Südwestdeutschl. 4.
- West W. & West G. S., 1904 - 1923, A monograph of the British *Desmidiaceae*, 1 - 5, Roy. Soc., London.
- Wilkoń-Michalska J., 1962, Rezerwat halofitów w Ciechocinku i jego znaczenie, Chronimy Przyr. Ojcz. 13:6 - 17.
- Wilkoń-Michalska J., 1963, Halofity Kujaw, Studia Soc. Sci. Toruń, sec. D (Botanika), 7 (1):1 - 121.
- Wołoszyńska J., 1912, Plankton jezior i stawów kujawskich, Roczn. Tow. Przyj. Nauk. Poznań 38:127 - 143.
- Wołoszyńska J., 1922, Zimowa flora wigierskich źródeł morenowych, Kosmos 47 (1 - 3):305 - 326.
- Wysocka H., 1952a, Glony Wisły na odcinku Warszawy, cz. I, Seston, Acta Soc. Bot. Pol. 20 (1):69 - 118.
- Wysocka H., 1952b, Glony Wisły na odcinku Warszawy, cz. II, Perifiton, Acta Soc. Bot. Pol. 21:369 - 400.
- Wysocka H., 1957, Próba zastosowania metody płytek szklanych w biologiczno-sanitarnej analizie wody, Prace Inst. Gospodar. Komunal. 4 (4):13 - 29.
- Zabielina M. M., Kisielew I. A., Proszkina-Ławrienko A. I., Szyszukowa W. S., 1951, Diatomowe wodorosli. Opredelitel priesnowodnykh wodoroslej SSSR, Moskwa, 4, pp. 619.

TABLICA I — PLATE I

1. *Merismopedia punctata* Meyen, 2. *Lyngbya confervoides* Agardh, 3. *Pseudanabaena minuta* Skuja

TABLICA II — PLATE II

4. *Achnanthes brevipes* var. *intermedia* Ag., 5. *Mastogloia smithii* Thw., 6. *Diploneis interrupta* (Kütz.) Cl., 7. *Anomoeoneis sphaerophora* var. *sculpta* (Ehr.) O. Müll.)

8. *Navicula elegans* W. Sm., 9. *Navicula digitoradiata* (Greg.) A.Sm., 10. *Navicula salinarum* Grun., 11. *Navicula spicula* (Dickie) Cl., 12. *Navicula peregrina* (Ehr.) Kütz., 13. *Navicula cuspidata* Kütz.

TABLICA IV — PLATE IV

14. *Amphiprora paludosa* W.Sm., 15. *Caloneis silicula* var. *peisonis* Hust., 16. *Bacillaria paradoxa* Gmelin, 17. *Amphora commutata* Grun., 18. *Rhopalodia musculus* (Kütz.) O. Müll.

19. *Eacillaria paradoxa* Gmelin, 20. *Nitzschia vitrea* var. *salinarum* Grun., 21. *Nitzschia obtusa* var. *scalpelliformis* Grun., 22. *Nitzschia sigma* (Kütz.) W.Sm., 23 i 24. *Campylodiscus clypeus* Ehr.

TABLICA VI — PLATE VI

25. *Enteromorpha intestinalis* (L.) Greville, 26. *Enteromorpha plumosa* Kütz.

TABLICA VII — PLATE VII

27. *Chaetophora elegans* (Roth.) Agardh, 28. *Enteromorpha tubulosa* Agardh,
29. *Oedogonium macrandrium* Wittr.

TABLICA VIII — PLATE VIII

30. *Closterium pritchardianum* Arch., 31. *Pleurotaenium truncatum* (Bréb.) Naeg.,
32. *Cosmarium reniforme* (Ralfs) Arch.

SPIS TREŚCI

Wstęp	3
Cel i metoda pracy	4
Charakterystyka fizjograficzna terenu	5
Spis oznaczonych gatunków i odmian	19
Uwagi o gatunkach rzadkich i ciekawych	53
Głony towarzyszące zespołom roślin naczyniowych i ramienic	57
Podsumowanie wyników	76
Summary	82
Literatura	84