MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. XLV, 1974

WITOLD BERDOWSKI

FLORA MCHÓW I ZBIOROWISKA MSZAKÓW
MASYWU ŚLĘŻY

Moss flora and *Bryophyta* communities
of the Ślęża massif

Redaktor *M. Kostyniuk*

WARSZAWA

Wydano z pomocą finansową
Polskiej Akademii Nauk

KOMITET REDAKCYJNY — COMITÉ RÉDACTION
M. Kostyniuk (Warszawa), A. Gajewska (Warszawa)

ADRES REDAKCJI — ADRESSE DE LA RÉDACTION
WARSZAWA, AL. UJAZDOWSKIE 4

WSTĘP

Rejon Śląży przedstawia bardzo dużą wartość pod względem historycznym. Góra Śląża znana była bowiem już w czasach przedhistorycznych jako Święta Góra Słowian i stanowiła kolebkę kultury łużyckiej. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z epoki kamiennej. Z tego okresu oraz z okresu starożytnego (1300 r. p.n.e.) pochodzą bezcenne znaleziska, jak np. kolumna sobótczańska, fragmenty kamiennych kręgów kultowych na Śląży, Raduni i Wieżycy, granitowe rzeźby (dzik, mnich i in.) i ślady kamieniołomów (Cehak-Hołubowiczowa 1958). Jednym z pierwszych plemion osiadłych w tych okolicach było słowiańskie plemię Ślążan, którego nazwa pochodzi od góry Śląży. Od nazwy plemienia zaś powstała w XI w. nazwa dla całej krainy — Śląsk. Wpływ człowieka na florę masywu Śląży, w tym też i na jego brioflorę, datuje się więc już od najdawniejszych czasów.

Masyw Śląży, wielokrotnie podawany przez briologów niemieckich jako teren występowania interesujących, a nieraz bardzo rzadkich gatunków mchów, nie doczekał się jeszcze szczegółowego, monograficznego opracowania. Brioflora tego obszaru, podobnie jak całego Śląska, jest zbędna fragmentarycznie.

Celem niniejszej pracy było dokładne zbadanie flory mchów całego masywu Śląży, ustalenie możliwie pełnej listy florystycznej, analiza ekologiczna i fitosocjologiczna zbiorowisk mszaków i ich zeleżności od zbiorowisk roślin naczyniowych oraz przedstawienie zmian brioflory, jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat na tym terenie wskutek gospodarki człowieka.

Opracowany obszar leży między potokami: Czarna Woda (na zachodzie i północy) i Oleszna (na południu i wschodzie). Obejmuje on główny trzon masywu: górę Ślążę z przylegającymi wzgórzami: Wieżycą, Stolną i Gozdnicą oraz pasmo wzgórz serpentynitowych od Raduni przez Góry Oleszeńskie do Gozdnika. Zachodnią i północną granicę jego stanowią osiedla: Sady, Chwałków, Strzeblów i Sobótka. Granica wschodnia biegnie wzdłuż potoku Oleszna, zaś południowa i zachodnia dochodzi do wsi: Ślupice, Uliczno, Jażwina, Jędrzejowice i Wiry.

Mapa 1. Masyw Ślęży
Ślęża massif

Pragnę serdecznie podziękować Kierownikowi Zakładu Morfologii i Systematyki Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego Pani Prof. Dr A. Krawiecowej za cenną pomoc i opiekę podczas wykonywania pracy. Wyrażam również dużą wdzięczność Pani Prof. Dr I. Rejment-Grochowskiej oraz Panu Doc. Dr S. Markowi za życzliwe rady i krytyczną ocenę pracy. Dziękuję ponadto Panu Doc. Dr S. Lisowskiemu za sprawdzenie zielnika mchów i okazaną mi dużą pomoc w zakresie literatury, a Pani Dr I. Kuczyńskiej za przejrzenie i ocenę tabel fitosocjologicznych. Pan Dr W. Koła sprawdził mi oznaczenia wątrobowców, a Pan Dr J. Fabiszewski oznaczenia porostów.

Najstarsze notatki o florze mchów Śląska sięgają lat siedemdziesiątych XVIII w. Z tego czasu pochodzą wzmianki H. G. v. Mattuschka, a nieco późniejsze Ludwiga, Starcke'go, Seligera i Wejgla (Limpricht 1876).

Pierwsze dane dotyczące rejonu Śląży spotykamy w roku 1855 w pracy Mildego zawierającej spis mchów zebranych ze Śląska. Podaje on 25 gatunków z okolic Górki, Doliny Sulistrowickiej i Śląży. Ten sam badacz w pracy „Übersicht der in Schlesien bisher beobachteten Laubmoose” (1857) zamieszcza jeden z najstarszych wykazów mchów Śląska obejmujący aż 347 gatunków. Wśród nich jest 39 mchów ze Śląży i okolic, zebranych głównie przez autora oraz wcześniejszych florystów jak: Göppert, Albertini i Wichura, np. *Tetraplodon angustatus* już w roku 1837 zaobserwowany został na ślęży przez Wichurę.

Najwięcej mchów z masywu Śląży (58 gat., z czego 25 nowych dla Śląży) podaje Milde w dziele „Brynologia Silesiaca” (1869). W sumie, w ciągu wieloletnich badań (1855-1871) stwierdził on na badanym terenie 97 gatunków, z których wymienić należy rzadkie: *Brachythecium geheebii*, *Grimmia mühlenbeckii*, *Schistostega osmundacea*, *Tetraplodon angustatus*, *T. mnioides*, *Ulotia americana*.

W latach następnych (1873-1904) na polu briologii działał na Śląsku nauczyciel szkoły średniej z Bolesławca G. K. Limpricht, który w swoich pracach (1873, 1876, 1890-1904) wymienia ze Śląży dalszych 10 nie podawanych uprzednio gatunków, a wśród nich: *Bryum cuspidatum*, *Dicranum fulvum*, *Grimmia incurva*.

Ponadto szereg nie publikowanych dotychczas, dalszych gatunków mchów pochodzących z terenu Śląży (29) znajduje się w zielniku briologicznym Instytutu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, między nimi nie odnalezione obecnie: *Brachythecium plumosum*, *Eurhynchium striatum*, *Hymenostomum rostellatum*, *Philonotis fontana*, *Pterigoneurum cavifolium* i *Pylaisia polyantha*. Ogółem w zielniku jest 74 gat. z masywu Śląży zbierane głównie przez: Schulzego (w latach 1868-1879, 38 gat.), Kerna (1877-1912, 33 gat.) i Uechtritzów (1817-1873), z których Max prawdopodobnie pracował tu najwcześniej. Już bowiem w roku 1817 zebrał on ze skał granitowych na Śląży *Grimmia apocarpa*.

Późniejsi briologowie Migula (1904) i Schafran (1957-1961) wymieniając w swoich dziełach syntetycznych najrzadsze gatunki ze Śląży, opierali się wyłącznie na pracach wyżej wymienionych badaczy niemieckich.

W roku 1957 S. Lisowski w publikacji zielnikowej „Bryotheca Polonica” („Mchy masywu Sobótki”) wydaje materiały 25 gat. z bardzo rzadkimi: *Polytrichum decipiens* i *Rhabdoweisia crispata*.

Na ogólną liczbę 145 gatunków i odmian mchów podanych z opraco-

wanego terenu, odnaleziono 103 gatunków. Wiele z nich (53) spotkano m. in. na tych samych stanowiskach i siedliskach, gdzie przetrwały sto lub więcej lat, np. *Distichium capillaceum* na murze kaplicy na szczycie Ślęży, *Fissidens osmundoides* w Dolinie Sulistrowickiej i koło Górki, czy *Thamnium alopecurum* w potoku koło Górki. Część podanych gatunków (23) znaleziono na innych stanowiskach (23), co do pozostałych nie można było tego stwierdzić, pochodzą bowiem z nieokreślonych bliżej stanowisk, np. „masyw Ślęży” czy „Sobótka”. Nie odnaleziono 42 gatunków, natomiast stwierdzono występowanie 73 taksonów nie notowanych dawniej; tak więc flora mchów badanego terenu wynosi obecnie 218 jednostek systematycznych (tab. 1).

Tabela 1 - Table 1

Historia badań briologicznych w masywie Ślęży

The history of the bryological investigations in the Ślęża massif

Autor Author	Data publikacji lub zbioru Date of publication or collection	Liczba taksonów Number of taxa				Najbardziej interesujące gatunki Most interesting species
		Ogółem Total	Nie podawane uprzednio Not reported before	Obecnie: At present:		
				Odnalezione Recovered	Nieodnalezione Not recovered	
J. Milde	1855-1871	97	97	67	30	<i>Pohlia elongata</i> , <i>Tetraplodon angustatus</i> , <i>T. mnioides</i> , <i>Grimmia mühlenbeckii</i> , <i>Uloa americana</i> .
K.G.Limpricht	1873-1904	26	8	2	6	<i>Dicranum fulvum</i> , <i>Grimmia incurva</i> .
F.Kern	1914	1	1	1	-	-
Materiały ze zbiorów zielnikowych /nie publikowane/ Materials in herbarium collections /not published yet/	1817-1917	74	29	23	6	<i>Ditrichum tenuifolium</i> , <i>Hymenostomum rostellatum</i> .
S.Lisowski	1957	25	10	10	-	<i>Polytrichum decipiens</i> , <i>Rhabdoweisia crispata</i> .
W.Berdowski	1963-1969	176	73	-	-	<i>Campylium polygamum</i> , <i>Rhacomitrium lanuginosum</i> , <i>Rh. ramulosum</i> , <i>Rh. sudeticum</i> .

Razem
Total

218 103 42

II. FIZJOGRAFIA TERENU

1. Położenie

Wąski pas Przedgórze Sudeckiego, przylegającego od południowego zachodu do Sudetów posiada przebieg NW—SE. Tworzy on rozległą równinę z charakterystycznymi, stromo wyrastającymi, izolowanymi wzgórzami. Do najwyższych z nich należy grupa Ślęży oddzielona od najwyższego pasma Sudetów — Gór Sowich — płaszczyzną o około 25 km szerokości. Od Wrocławia jest ona oddalona o 35 km w kierunku południowo-zachodnim, zaś od Świdnicy o 15 km w kierunku wschodnim. Widzia-

na od strony Wrocławia ma kształt wielkiego, nagle wysterczającego stożka, wyraźnie dominującego nad innymi wzniesieniami na przedpolu sudeckim. Kulminację tego masywu stanowi góra Ślęza wznosząca się na 718 m n.p.m.; ponieważ pozostałe na Przedgórzu Sudeckim wzgórza dochodzą najwyżej do 473 m wysokości (Wzgórza Strzelińskie), przeto duża wysokość względna masywu Ślęży, wynosząca około 250 m, a w samym masywie około 500 m, nadaje całemu temu terenowi charakter górski (K o s t r o w i e c k i 1968).

Grupa Ślęży składa się z dwóch pasm:

1. część północna obejmuje Ślężę, która na północny-wschód przedłuża się następującymi pagórami: Wieżycą, 415 m n.p.m. (dawna nazwa Góra Kościuszki), Stolną, 371 m n.p.m. (dawn. Góra Strzegomiańska), Gozdnicą, 316 m n.p.m. (dawn. Góra Anielska),

2. część południowa jest znacznie niższa. W skład jej wchodzi: Radunia, 573 m n.p.m. (dawn. Sępia), pasmo niewysokich, kopulastych pagórków zwanych Górami Oleszeńskimi, 352-389 m n.p.m. (dawn. Wzgórze Olszańskie oraz Gozdnik, 315 m n.p.m. (dawn. Góra Winna). Na zachodzie część ta kończy się Górami Kielczańskimi, 466 m n.p.m.

Rozpiętość całego masywu południkowo wynosi około 10 km, równoleżnikowo, zaś część centralna mierzy około 6 km, razem natomiast z passem południowym około 18 km.

Wspomniane dwie części są oddzielone Przełęczą Tąpadła (384 m n.p.m.) przechodzącą ku wschodowi w szeroką Dolinę Sulistrowicką, w której położone są wsie Sulistrowiczki i Sulistrowice (dawn. Sinostrowiczki i Sinostrowice).

2. Warunki geologiczne

Pod względem geologicznym grupę Ślęży budują cztery rodzaje skał: granit, gabra, amfibolit i serpentynit (mapa 2).

Najwyższe wzniesienie — Ślęza — jest utworzone z gabry i granitu. Skały gabry, najbardziej odporne, zajmują większą część góry: całe południowe i wschodnie zbocza oraz szczyt, do wysokości 560 m na stoku północno-zachodnim. Granit z żyłami kwarcowymi buduje północno-zachodni stok do 560 m wysokości.

W północno-wschodniej partii masywu Ślęży (Wieżycza, Stolna i Gozdnica) występują skały zmetamorfizowane — amfibolity, powstałe z przeobrażenia diabazów.

W skład południowej części masywu: Radunia, Góry Oleszeńskie, Gozdnik, wchodzi serpentynity — skały zasadowe o barwie zielonkawej i dużej ilości związków magnezu. Zajmują one tu obszar 80 km² tworząc największe skupienie w Sudetach.

Dzięki wielkiej odporności wszystkich tych skał, cały masyw przeciwstawiał się większej erozji i denudacji, temu też zawdzięcza on swoje kontrastowe wyniesienie nad otaczającą równinę (M a j e r o w i c z 1963).

podczas intruzji magm gabrowych, przy udziale dużej ilości pary wodnej (G a w e ł 1957).

Wiek tych skał nie jest jeszcze dokładnie znany, a okres ich powstania bardzo różnie określany: na koniec syluru (K o s t r o w i c k i 1968) bądź na okres prekambryjski (O b e r c 1958).

Najmłodsze skały grupy Śleży, masy granitowe, wytworzyły się w drugiej fazie hercyńskich ruchów górotwórczych w górnym karbonie. Wtedy to nastąpiły obfite wylewy magmy granitowej, która wdarła się do szczelin istniejących już skał gabra.

Dzisiejsze Przedgórze Sudeckie, a wraz z nim grupa Śleży, zostało odcięte od Sudetów, z którymi łączyło się dawniej w jeden łańcuch górski, dopiero podczas przeobrażeń trzeciorzędowych, tzw. dyslokacją brzeżną (K o s t r o w i c k i 1968). Wtedy również uformowane zostały główne zarysy stoków Śleży. Powstałym w ten sposób grzbietom masywu śleżańskiego ostateczny kształt nadał później lodowiec.

W epoce lodowej, gdy szczyt Śleży był wyniesiony jako nunatak nad lądolodem prawdopodobnie ponad 70 m (S z c z e p a n k i e w i c z 1958), nastąpiło nagromadzenie przez lodowiec odłamów skalnych tworzących dziś rumowiska na wschodnim i zachodnim zboczu góry. W niektórych miejscach głazowiska takie występują szczególnie licznie, sięgając od podnóża aż po sam szczyt góry; stanowią one dogodne podłoże dla rozwoju mchów naskalnych.

Miedzy skałami budującymi badany masyw istnieją znaczne różnice pod względem składu chemicznego (tab. 2, wg P e n d i a s a i M a c i e j e w s k i e g o 1959). W szczególności odnosi się to do serpentynitów. Różnice dotyczą przede wszystkim zawartości związków magnezu (MgO) i soli zasadowych (Ca, K, Na). Duża ilość magnezu (do 39⁰/o), a zwłaszcza duży nadmiar magnezu w stosunku do wapnia zarówno w skałach, jak i w glebach z nich powstałych, powoduje oligotrofizm podłoża i oddziałuje bardzo szkodliwie na rozwój roślin. Wymienione właściwości spowodowały, że serpentynity należą do najmniej żyznych rodzajów skał w masywie Śleży. Ze względu na małą przepuszczalność wodną są one zaliczane do skał najsuchszych. W przeciwieństwie do serpentynitów, reszta skał tego rejonu posiada bardzo niską zawartość soli magnezowych, znacznie większą zaś związków zasadowych, co stwarza lepsze warunki dla vegetacji roślin.

Wszystkie skały badanego terenu mają jednak niewielką ilość wapnia, w związku z tym gleby, które z nich powstały, są przeważnie kwaśne i nie odznaczają się dużą żyznością. Ma to również swoje odzwierciedlenie w przewodze mchów acidofilnych.

Na Śleży, powyżej 500 m, występują gleby o niewykształconym profilu. Są to gleby płytkie, czasami z większymi odłamkami rumoszu skalnego. W szczelinach skalnych i na skałach dość często spotyka się warstwę humusu z pewną domieszką zwietrzeliny. Podobny typ gleb szkie-

Tabela 2 — Table 2

Skład chemiczny skał masywu Ślęży
Chemical composition of rocks in the Ślęża massif

Rodzaj skał Kind of rocks	Granit Granite		Gabro Gabbro		Amfibolit Amphibolite		Serpentynit Serpentine marble	
Odczyn skał Reaction of rocks	Kwaśne Acid		Obojętne Neutral				Zasadowe Alkaline	
Nr analizy No. of analyse	356	357	396	397	402	403	411	413
SiO ₂	72,03	71,60	50,20	46,50	54,02	50,16	40,66	36,50
Al ₂ O ₃	14,63	15,09	15,60	20,76	13,67	14,07	1,14	1,59
Na ₂ O	4,51	4,17	2,79	2,48	4,72	4,09	0,28	0,63
CaO	1,73	1,90	13,68	11,70	7,09	11,11	1,52	1,73
FeO	1,97	1,97	5,37	4,87	7,54	7,77	3,50	1,70
MnO	śl.	—	0,15	0,08	0,05	0,20	—	—
TiO ₂	0,15	śl.	0,38	0,15	1,28	1,35	śl.	—
K ₂ O ₅	3,74	3,84	0,07	0,06	0,27	0,31	—	—
P ₂ O ₅	0,22	0,12	0,48	0,20	0,18	0,14	—	0,23
S	0,07	0,04	—	—	—	—	—	0,02
MgO	0,24	0,48	8,94	8,63	7,11	7,05	39,12	35,79
Fe ₂ O ₃	0,37	0,53	2,70	2,89	3,58	4,21	7,30	7,39
Cr ₂ O ₃	—	—	—	—	—	—	0,76	0,75
NiO	—	—	—	—	—	—	0,11	0,27

Analizy wykonali — Analyses have been made up by:

nr 356 — Sobórka, anal. (anal.)	A. Eyme, przel.,	(recounted)	H. Pendias,
nr 357 — Chwałków	„ K. Klüss,	„	J. Onzol,
nr 396 — Sobórka	„ Prac. Geoch. Inst. Geogr.	„	S. Maciejewski,
nr 397 —	„	„	„
nr 402 —	„	„	„
nr 403 —	„	„	„
nr 411 — Tapadla	„ F. Szumlas,	„	„
nr 413 — Gózdnik	„ A. Eyme.		

letowych, lecz zmieszanych z lessami, znajduje się na podłożu serpentynitowym w szczytowych częściach Gór Oleszeńskich. Gleby powstałe na serpentynitach są płytkie, posiadają znaczną ilość części szkieletowych i uważane są za zbyt suche dla rozwoju roślin (Musierowicz 1958). W obszarach położonych niżej 250 m n.p.m. spotyka się żyzniejsze wkładki lessowe, które jednak ze względu na małą powierzchnię nie odgrywają większej roli.

3. Stosunki klimatyczne

Rejon Ślęży wyróżnia się dużą odrębnością klimatyczną w porównaniu z Krainą Wrocławsko-Opolską, do której został zaliczony przez Romera (1949). Klimat ten ma właściwości zbliżone do górskiego, co wyraźnie odbija się na szacie roślinnej, a zwłaszcza na florze mchów.

Występuje tu znacznie wyższa suma opadów niż w Kotlinie Wrocławskiej, czy na Przedgórzu Sudeckim (tab. 3), a ilość dni burzowych największa na terenie Polski, a nawet Europy (K o s i b a 1948). Od tych cech klimatu wywodzi się prawdopodobnie nazwa góry, która pochodzi (nazwa) od staropolskiego: „ślągwa”, „ślęganina” itp. co oznacza deszcz, miejsce wilgotne itp. (S e m k o w i c z 1949).

Największa ilość opadów atmosferycznych przypada na okres wzmożonej wegetacji roślinnej (V-VIII), minimum natomiast na miesiące zimowe (I, II). Tego rodzaju rozkład opadów jest korzystny dla rozwoju roślinności. Istnieje też wyraźne zróżnicowanie w ilości opadów w zależności od wysokości i ekspozycji.

Średnie temperatury podane ze stacji w Sobótce (tab. 5) wskazują na duży wpływ klimatu oceanicznego: lata są tu chłodne i stosunkowo długie, a zimy niezbyt mroźne i krótkie.

T a b e l a 3 — T a b l e 3

Średnie miesięczne sumy opadów na Ślężę
Mean monthly sums of precipitation on the Ślęża mountain peak

Miesiące Months		Lata — Years									
		1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
I		16	—	20	38	29	7	30	64	40	69
II		22	—	33	45	36	30	40	61	33	38
III		27	—	44	58	28	37	44	44	49	37
IV		32	52	57	48	16	54	86	20	63	55
V		76	67	84	106	162	92	255	73	115	100
VI		76	58	84	27	106	93	128	107	88	146
VII		136	162	136	137	48	40	92	149	84	113
VIII		75	126	152	40	85	404	89	140	110	99
IX		5	53	25	70	154	15	44	21	126	78
X		11	111	50	64	35	123	8	96	61	48
XI		46	31	66	68	55	83	53	70	46	75
XII		61	19	67	25	18	37	44	47	89	23

Stacja Weather station	Wys. n.p.m. Height a. s. l.	Średnie roczne sumy opadów Mean yearly sums of precipitation									
		1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Ślęża	718	583	—	818	723	772	1015	913	892	904	881
Sobótka	200	390	531	640	510	—	717	681	568	559	648
Strzegom	230	550	691	613	544	703	771	666	730	723	717

Temperatura i opady uzależnione są w dużej mierze od kierunku i rodzaju wiatrów. W okolicach Ślęzy wyraźnie dominują wiatry północno-zachodnie i w mniejszym stopniu południowo-wschodnie (S c h m u c k 1952). One decydują o klimacie tego masywu. Pierwszy typ wiatrów, wiejący od Atlantyku, przeważający w lecie, przynosi liczne deszcze i burze;

Tabela 4 — Table 4

Liczba dni z burzą (średnie z okresu 1891-1925)
 Number of stormy days (mean for the period 1891-1925)

Stacja Weather station	Wys. n.p.m. Height a.s.l.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	R
Sobótka	200	0,4	0,5	0,7	3,2	6,9	7,1	8,4	5,7	2,2	0,8	0,3	0,3	36,5
Śnieżka	1605	0,2	0,1	0,4	1,1	6,2	7,0	7,8	5,2	1,9	0,2	0,0	0,0	31,0

Tabela 5 — Table 5

Średnie temperatury dla stacji Sobótka (200 m n.p.m.)
 Mean air temperature on the weather station in Sobótka (200 m a.s.l.)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	R
-1,3	-0,8	2,7	7,5	12,7	15,6	17,5	16,7	13,2	8,5	2,9	0,2	7,9

drugi natomiast jest bezdeszczowy. Minimalny udział wiatrów z kierunków: N, NE i E jest jeszcze jednym dowodem zależności klimatu Śląska, a w tym i Śląży, od wpływów oceanicznych.

Wiatry północno-zachodnie wywierają decydujący wpływ na mikroklimat szczytu zachodniego tzw. Olbrzymków, gdzie skrapla się znaczna ilość nasiennych opadów atmosferycznych, co potęguje górski charakter klimatu i stwarza korzystne warunki dla rozwoju roślin górskich. Tam właśnie znaleziono duże skupienie mchów górskich, a nawet wysokogórskich.

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ

Dominującym zbiorowiskiem roślinnym na terenie masywu Śląży jest las, który pokrywa przeszło połowę badanej powierzchni. Obszary bezleśne stanowią: pola uprawne grupujące się u podnóży wzgórz w pobliżu osiedli, łąki, pastwiska, a częściowo również murawy kserotermiczne.

Zbiorowiska leśne reprezentują głównie lasy iglaste: świerczyny i bory sosnowe. Sztuczne drzewostany świerkowe, wprowadzone przez człowieka, nie wykazujące właściwego dynamizmu rozwojowego, zajmują powierzchnię przekraczającą połowę ogólnej powierzchni leśnej masywu Śląży. Sadzone lasy świerkowe spotyka się na wszystkich wzgórzach wchodzących w skład grupy Śląży, a największe ich partie występują na Śląży i Raduni. Runo, podobnie jak podszycie, jest tu często niewykształcone, a dno lasu, pod zwartym okapem koron drzew, silnie zacienione i pokryte grubą warstwą igliwia. Jedynie w miejscach przerzedzonych, bardziej świetlistych, spotkać można pojedyncze okazy *Vaccinium vitis-*

idaea, *Oxalis acetosella*, a z mchów *Ceratodon purpureus*, *Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* i *Hypnum cupressiforme*. Więcej gatunków mchów występuje w tym zbiorowisku na głazach i kamieniach; obok wymienionych (*Ceratodon*, *Hypnum*) rosną tu m. in.: *Grimmia hartmanii*, *Hedwigia albicans*.

Drugie pod względem zajmowanego obszaru zbiorowisko to bór sosnowy. Jest on zlokalizowany w niższych położeniach centralnej części masywu, którą opasuje dookoła oraz na wzgórzach serpentynitowych, gdzie pod szczytem Raduni znajduje się najwyższe jego stanowisko (ok. 500 m). W drzewostanie, obok *Pinus silvestris*, rosną: *Quercus robur*, *Betula verrucosa*, a gdzieniegdzie *Larix decidua* i *Picea excelsa*. W niezbyt bogatym runie leśnym najczęściej występują *Vaccinium myrtillus* i *Calamagrostis arundinacea*. Mszaki są tu reprezentowane głównie przez: *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum attenuatum*, a w miejscach wilgotniejszych *Leucobryum glaucum*, z porostów natomiast (Fabiszewski 1963) spotyka się: *Lecanora subfusca*, *Lecidea scalaris*, *Parmelia physodes* i inne.

Bór mieszany zajmujący m. in. niższe położenia na zboczach Raduni, Gozdnicy i Stolnej jest bardzo zbliżony składem do boru sosnowego, zwłaszcza w miejscach gdzie przewagę osiąga sosna. Tu warstwę najwyższą, obok sosny, świerka, brzozy i dębu szypułkowego, budują: *Fagus silvatica*, *Populus tremula*, *Quercus sessilis* i *Tilia cordata*. W bujnym podszyciu dominują: *Quercus sessilis*, *Corylus avellana*, *Frangula alnus*, zaś w runie *Pteridium aquilinum*, *Convallaria maialis*, *Vaccinium myrtillus* i *Calamagrostis arundinacea*. Warstwa mszysta jest tu wykształcona podobnie jak w borze sosnowym.

Lasy liściaste badanego terenu reprezentują dąbrowy i buczyny. Lasy dębowe mają charakter kserotermicznych, świetlistych dąbrów, porastających przede wszystkim szczytowe partie suchych wzgórz południowego pasma (Radunia, Góry Oleszeńskie) oraz południowo-zachodnie zbocze Wieżycy. Głównym składnikiem drzewostanu jest dąb bezszypułkowy o karłowatej postaci. Są to lasy mało zwarte, widne, z panującymi w runie gatunkami kserotermicznymi, jak: *Asperula tinctoria*, *Hypericum montanum*, *Euphorbia cyparissias*, *Potentilla alba*; gdzieniegdzie występują łąny *Calamagrostis arundinacea*, a niekiedy dno lasu jest całkowicie pozbawione roślin.

Lasy bukowe, które dawniej panowały w całym masywie, obecnie należą do rzadkości. Na podłożu serpentynitowym czystych drzewostanów bukowych brak zupełnie, a buk rośnie tu pojedynczo jako domieszka ją się na zachodnim i południowo-zachodnim stoku Ślęży, lecz nie przedstawiają bogatego zbiorowiska. Poza bukiem, w warstwie drzew sporadycznie spotyka się: *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, a w runie: *Anemone ranunculoides*, *Asperula odorata*, *Carex silvatica*, *Dryopteris filix-mas*,

Milium effusum i inne. Najbogatsza buczyna porasta południowo-wschodnie zbocza Wieżycy, gdzie oprócz wymienionych poprzednio gatunków, rosną: *Acer pseudoplatanus*, *Carpinus betulus*, *Adoxa moschatellina*, *Corydalis cava*, *Daphne mezereum*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis* i inne. Z roślin zarodnikowych w lasach bukowych bardzo liczne są porosty nadrzewne, np.: *Graphis scripta*, *Phlyctis argena*, *Pertusaria amara* (Fabiszewski 1963).

W szczytowych częściach Ślęży i Raduni występują bardzo małe, lecz interesujące fragmenty lasów liściastych mieszanych. W zbiorowisku takim leżącym pod szczytem Ślęży, przeważają wiekowe drzewa: *Ulmus scabra*, *Acer pseudoplatanus*, *A. platanoides*, *Fagus silvatica*, w runie: *Asarum europaeum*, *Asperula odorata*, *Luzula nemorosa* i *Urtica dioica*. Opisany fragment lasu o charakterze pierwotnym wyróżnia się, jako jedyny na całym badanym obszarze, dobrze rozwiniętą brioflorą epifityczną. Wyłącznie tutaj znaleziono większość mchów nadrzewnych masywu Ślęży. Ponadto na tym małym terenie rośnie wiele rzadkich na Ślęży, a nawet na Śląsku porostów (Fabiszewski 1963). Mniejszy udział w tym zbiorowisku mają wątrobowce, z których pospolity jest tylko *Metzgeria furcata* (Kola 1963).

Poza wymienionymi zbiorowiskami, w niższych położeniach, najczęściej nad potokami, znajdują się małe partie zarośli olszynowych z *Alnus glutinosa* i *A. incana*.

Pojedynczo, przeważnie na brzegach lasów, spotyka się sztucznie wprowadzone, egzotyczne gatunki drzew, i mianowicie: *Acer dasycarpum*, *Pinus banksiana*, *Pseudotsuga taxifolia*, *Quercus rubra* i *Taxodium distichum*.

Niewielki procent ogólnej powierzchni zajmują wyręby, gdzie gatunkami panującymi, czasami rosnącymi masowo, są *Calamagrostis epigeios* lub *Rubus idaeus*. Mchy występują tu najczęściej na próchniejących pniakach; na ziemi niekiedy znajdowano *Ceratodon purpureus*.

Uboga, w ogólnym zarysie, roślinność naczyniowa masywu Ślęży ma charakter niżowy. Pionowe granice występowania gatunków niżowych są jednak znacznie przesunięte w górę w porównaniu z Przedgórzem Sudeckim (Fiek 1881). Do górskiej flory, z roślin naczyniowych, należy niewielka grupa gatunków, np.: *Abies alba*, *Acer pseudoplatanus*, *Alnus incana*, *Asplenium septentrionale*, *Aruncus silvester*, *Fagus silvatica*, *Festuca silvatica*, *Galium rotundifolium*, *Gentiana praecox* ssp. *carpatica*, *Gymnadenia conopsea*, *Lilium martagon*, *Lysimachia nemorum*, *Petasites albus*, *Prenanthes purpurea*, *Sambucus racemosa*, *Thesium alpinum* i *Tofieldia calyculata*.

Różnice w budowie geologicznej wpływają na pewną odrębność roślinną Ślęży i pasma południowego zbudowanego z serpentynitów. Na podłożu serpentynitowym, gdzie stwierdzono znacznie mniejszą liczbę roślin naczyniowych, koncentruje się więcej gatunków rzadkich, ściśle przy-

wiązanych do tego podłoża. Wśród nich dużą wartość posiada przede wszystkim flora szczelin skalnych, gdzie grupują się b. rzadkie, nieraz na jedyńych stanowiskach w Polsce, paprocie serpentynitowe: *Asplenium adiantum-nigrum*, *A. adulterinum*, *A. cuneifolium*, *A. onopteris*. Większe skupienie tych gatunków przypada na podszczytowe stoki Gozdnika i Raduni (Karpowicz 1963).

Na łąkach rezerwatu „Łąki Sulistrowickie”, u podnóża Raduni, również rośnie szereg interesujących gatunków, m.in.: *Carex davalliana*, *Dianthus superbus*, *Gladiolus paluster*, *Iris sibirica*, *Rosa gallica*, *Trollius europaeus*, *Trifolium rubens* (Berdowski 1965, 1966).

Oprócz wyżej wymienionych na uwagę zasługują: nowy dla flory Polski *Galium valdepilosum* z Raduni (Kucowa i Mądalski 1964) oraz rzadkie: *Carex humilis* z Gozdnika i przyległych terenów, *Callitriche stagnalis* ze Ślęzy i Raduni (Mądalski 1961, Kuźniewski 1962), *Sorbus torminalis* z Wieżycy (Karpowicz 1960).

IV. METODY BADAŃ

Badania terenowe przeprowadzono w latach 1963-1970. Początkowo polegały one na opracowaniu florystycznym, później fitosocjologicznym zarówno roślinności naczyniowej, jak i mchów. W trakcie prac fitosocjologicznych kierowano się, ogólnie stosowaną, metodą Braun-Blanqueta. W wyborze płatów główną uwagę zwracano na ich jednorodność. Wielkość płatów wahała się od powierzchni małych, np. 20 cm × 30 cm (w zbiorowiskach naskalnych lub szczelinach skalnych), poprzez wielkości np. 1 × 1 m, 2 m × 4 m (na łąkach, drogach leśnych) do dużych płatów o powierzchniach 100 m² i jeszcze większych (w lasach i na polach). Powierzchnie płatów zdjęć naskalnych były nieduże ze względu na brak na tym terenie potężniejszych ścian i bloków skalnych pokrytych roślinnością zarodnikową.

Systematykę i nomenklaturę fitosocjologiczną przyjęto wg Matuszkiewicza (1967), a w wypadku zbiorowisk polnych i kserotermicznych wg Kornasia (1968). Przy opracowaniu niektórych zbiorowisk łąkowych (łąki trzęślicowe, turzycowe) oparto się w zasadzie na pracy autora z tego terenu (Berdowski 1965). Bliższa obserwacja dynamizmu rozwojowego łąk trzęślicowych, przeprowadzona w ciągu ostatnich kilku lat, pozwoliła uznać zbiorowisko zaliczone poprzednio do związku *Molinion* za zespół *Molinietum medioeuropaeum*. Podstawą tego była m.in. duża ekspansja, bardzo rzadkich wówczas, gatunków właściwych *Molinietum* jak: *Gladiolus paluster*, *Iris sibirica* i *Scorzonera humilis*.

Podczas badań nad roślinnością zmurszałych pniaków zdjęcia fitosocjologiczne wykonywano na najbardziej typowych powierzchniach, tzn. na powierzchniach cięcia, gdzie za jeden płat przyjęto całą powierzchnię.

Dlatego też w nagłówkach tabeli tego zbiorowiska podano tylko średnicę zbutwiałych pniaków. Wyróżniono tu trzy stopnie butwienia pniaków, a za kryterium przyjęto (za Rejment-Grochowską 1950) wielkość powierzchni zbutwiałej; mianowicie:

- 1° — 1/3 pow. pniaka jest zbutwiała
- 2° — 2/3 " " " " "
- 3° — cała powierzchnia pniaka jest zbutwiała

W wypadku rozmieszczenia poziomego granicę między poszczególnymi wzgórzami wyznaczały przełęczce, natomiast górna granica podnórza wahała się na poziomach od 220 do 290 m n.p.m, w zależności od warunków geomorfologicznych, np. wysokość 280 m stanowi podszczytowe partie najniższych wzgórz (Goźdnik, Goźdnica), na tej również wysokości leży wieś Sulistrowiczki, którą zaliczono do podnóża. Przyjęto następujące górne granice podnóża w okolicach: Będkowic — 220 m, Górki i Przemiłowa — 240 m, Słupic, Strzegomian i Sulistrowic — 260 m, Tąpa-deł — 280 m oraz Sulistrowiczek — 290 m.

Analizując rozmieszczenie pionowe zastosowano podział na pasy wysokościowe co 100 m, od 300 m wzwyż. Przy zaliczaniu mchów do wydzielonych pasów pod uwagę brano ich udział jakościowy, tzn. liczbę gatunków, a nie liczbę stanowisk gatunku na poszczególnych wysokościach.

Podział i analizę gatunków górskich podano w oparciu o prace następujących autorów: Lisowskiego i Kornasia (1966), Lisowskiego (1959, 1961, 1965, 1966), Kuca (1956, 1964), Szafrana (1957, 1961) Limprichta (1876, 1890-1904), Mildego (1869), Moenkemeyera (1927), oraz Pilousa i Dudy (1960). Wymienione prace były również podstawą do uznania mchów za rzadkie na Śląsku lub w Polsce i do opracowania ich rozmieszczenia.

W części ekologicznej grupy edaficzne wyodrębniono za Borosem (1968) i Kucem (1964), zaś podziału na typy ekologiczne dokonano na podstawie Gamsa (1932), a częściowo również Jasnowskiego (1958) i Kuca (1964). W kwalifikowaniu mchów do typu ekologicznego brano pod uwagę częstość występowania gatunku w odpowiadającym temu typowi siedlisku.

W niektórych tabelach i diagramach przedstawiających zależność występowania mchów od rodzaju podłoża (skały, drewno, ziemia) do gatunków naskalnych włączano również mchy rosnące na humusie naskalnym, a nie spotykane m innych podłożach. Natomiast gatunki, które rosły na glebie naskalnej i na ziemi zaliczono do naziemnych.

Układ systematyczny i nomenklaturę mchów przyjęto głównie wg dzieła Podperry, „*Conspectus moscorum europaeorum*” (1954). Przy oznaczaniu posługiwano się przede wszystkim kluczami Moenkemeyera (1927) i Szafrana (1957, 1961); korzystano bardzo często z materiałów porównawczych wydanych w „*Bryotheca Polonica*” oraz z bo-

gatyh zbiorów zielnikowych. Nazewnictwo roślin naczyniowych przyjęto wg klucza „Rośliny Polskie” — Szafra, Kulczyńskiego i Pawłowskiego (1953). Nazwy gatunkowe, zarówno roślin zarodnikowych, jak i naczyniowych, zgodnie z postanowieniami kongresów botanicznych, pisano małą literą.

Pojęcie „stanowisko” traktowano w bardzo wąskim ujęciu przyjmując je jako wystąpienie.

W odniesieniu do gatunków rzadkich podano w wykazie systematycznym ich dokładne rozmieszczenie w Polsce lub na Śląsku.

Cały materiał dokumentacyjny z masywu Ślęży złożono w Zielniku Instytutu Botanicznego Uniwersytetu im. B. Bieruta we Wrocławiu.

V. FLORA MCHÓW MASYWU ŚLĘŻY I JEJ ANALIZA

Jak podano w części wstępnej, brioflora masywu Ślęży składa się obecnie z 218 taksonów; ujęte są one w poniższym „Wykazie systematycznym”.

1. WYKAZ SYSTEMATYCZNY

Objaśnienie skrótów

Am.	— <i>Amphinereidia</i> ,	ok.	— około,
b.	— bardzo,	pd.	— południowy (-a, -e),
Brch.	— <i>Bryochamaephytia</i> ,	pod.	— podawany,
Chasm.	— <i>Chasmophytia</i> ,	pn.	— północny (-a, -e),
c. spor.	— ze sporogonami	R.	— Radunia,
Dol. Sul.	— Dolina Sulistrowicka,	rez.	— rezerwat,
Ek.	— typ ekologiczny,	S.	— Stolna,
Ep.	— <i>Epipetria</i> ,	Sc.	— Sulistrowice,
Epiph.	— <i>Epiphytia</i> ,	Sch.	— Schulze,
Ex.	— <i>Exochomophytia</i> ,	Sob.	— Sobótka,
G.	— Gozdnicza,	st.	— stok,
Gk.	— Gozdnik,	stan.	— stanowisko,
G.O.	— Góry Oleszeńskie,	ster.	— bez sporogonów,
Gór.	— Górką,	Strz.	— Strzeblów,
Hel.	— <i>Helophytia</i> ,	Sul.	— Sulistrowiczki,
K.	— Kern,	Szafr.	— Szafran,
k.	— koło,	Śl.	— Ślęża,
Limpr.	— Limpricht,	Ue.	— Uechtritz (Max i Rudolf),
Lis.	— Lisowski,	W.	— Wieżyca,
Lith.	— <i>Lithophytia</i> ,	wsch.	— wschodni (-a, -e),
Ł.S.	— Łąki Sulistrowickie,	Xg	— <i>Xerogeophytia</i> ,
Md.	— Milde,	zach.	— zachodni (-a, -e),
gat.	— gatunek,	zb.	— zbocze,
Ner.	— <i>Nereidia</i>	(320)	— Liczby w nawiasach oznaczają wysokość n.p.m. w metrach

Sphagnaceae

Sphagnum subsecundum Nees.—1 stan., w wilgotnym rowie na pn. st. góry (340). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Sphagnum recurvum P. Beauv. — 1 stan., R.: na wilgotnym humusie w lesie świerkowym, zb. pn. (440). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Sphagnum compactum D.C. (= *Sph. rigidum* Schimp.) — podany z Dol. Sul. przez Md., 1860 i 1869. Gat. niżowy.

Sphagnum squarrosum Crome — niezbyt częsty. Śl.: w niedużym zabagnieniu przydrożnym na pd. st. (500) oraz w rozlewiskach — st. pd. (400); pn. i pn.-zach. (260-320). G.O.: na wilgotnym humusie w borze sosnowym na pd.-wsch. od Sul. (310). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Sphagnum fimbriatum Wils. — b. rozproszony. Śl.: w rozlewisku na pn. st. (300) R.: na zatorfieniu śródleśnym u podnóża góry (zb. pd.-zach.) w pobliżu Tapadeł (320); na wilgotnej łące, na pd. od wsi Sul. (280). Notowany również przez Md., 1860 z Dol. Sul.; Md., 1869 i Limpr., 1876 z Sob. Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Sphagnum girgensohnii Russ. — Śl. (2 stan.): na wilgotnym humusie wśród skał gabra w lesie świerkowym, st. pn.-wsch. (670); w rozlewisku na zb. pn. (300). R. (2 stan.); w borze świerkowym, st. pn. (400) oraz w rozlewisku w lesie świerkowym, zb. pn.-zach. (380). Ek.: *Hel.* Gat. ogólnogórski.

Sphagnum robustum Röhl. — gat. rzadki. Śl. (2 stan.): w rozlewisku na st. pn. wśród *Sph. squarrosum* (300) i na podmokłej łące w rez. Ł.S. na pn.-wsch. st. R. (320). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Sphagnum nemoreum Scop. (= *Sph. acutifolium* Nees.) — najczęstszy z rodzaju *Sphagnum*. Śl.: na wilgotnym humusie wśród głazów gabra w lesie świerkowym na pn.-zach. zb. (670); w rozlewiskach: u podnóża góry, na pd.-zach. zb. (380); pn. (400). Pospolity na pn. zb. R. w lesie świerkowym (300-400) oraz na podmokłej łące, na pd. od Sul. (300); w wilgotnych partiach łąk trzęślicowych w rez. Ł.S. (320). Podany też z Dol. Sul. (Md., 1860). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Sphagnum palustre L. — nieczęsty, przeważnie na mokrych brzegach strumyków. Śl.: st. pd. (440). S.: st. wsch. (300) oraz na wilgotnej łące w rez. Ł.S. (340). Pod.: Md., 1860, Dol. Sul. Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Andreaeaceae

Andreaea rupestris Hedw. — podany ze szczytu Ślęży przez Mildego (1857). Gat. wysokogórski.

Andreaea petrophila Ehrh. — Śl.: dość częsty na skałach i głazach gabra w partii szczytowej (500-718); również na głazach granitowych, st. pn. (430) i pn.wsch. (380). G.: na głazach amfibolitu pod szczytem (300). Podany z Sobótki (Md., 1869 i Sch., 1872 — zielnik). Jest częstym składnikiem naskalnego zbiorowiska — zbior. *Cynodontium polycarpum*. Ek.: *Ep.* Gat. wysokogórski.

for. *acuminata* Podp. — Śl.: na głazie gabra na szczycie (710) skąd podawany jest też przez Lisowskiego, 1957. Ek.: *Ep.*

Diphysciaceae

Diphyscium sessile Lindb. — na rozproszonych stan. na skarpach przydrożnych i drogach leśnych, zwłaszcza w lasach bukowych. Śl.: st. pn.-wsch., przy żółtym szlaku turystycznym, ster. (420), det. Lis.; powyżej Górki (260); st. pd.-zach. (460). W.: st. zach. (360); powyżej Górki (240). Wiele razy podawany z tego terenu: Md. 1857, Śl., głązy na przedgórzu; Sob.: Md., 1855, Md. 1869 i z zielnika (K., 1877); Lis., 1957, zbocze W., powyżej górki (370). Ek.: Brch. Gat. ogólnogórski.

Buxbaumiaceae

Buxbaumia aphylla Hedw. — b. rzadko, 1 stan. w niewielkiej ilości okazów na wsch. zb. W., na ziemi w lesie sosnowym (320). Notowany dwukrotnie przez Md., 1857, 1869 ze szczytu Śl. oraz zbierany przez K., 1912 z okolic Strz. (zielnik). Ek.: Brch. Gat. niżowy.

Buxbaumia indusiata Brid. (= *B. viridis* (Moug.) Brid.) — podawany przez Mildego, 1859, 1869 i Limprichta, 1896-1904 z masywu Ślęży (leg. Wichura). Gat. górski (reglowy).

Polytrichaceae

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. (= *Catharinaea undulata* Web. et Mohr) — gatunek pospolity w całym masywie, zwłaszcza częsty w lasach i na skarpach przy drogach leśnych. (38 stan.). Podany z zielnika, K., 1905, przy drodze powyżej parku w Górcie. Ek.: Brch. Gat. niżowy.

var. *minor* Web. et Mohr — w jednym miejscu i b. nielicznie: na gliniastej skarpie w nieczynnym kamieniołomie k. wsi Przemiłów (250). Ek.: Xg.

Pogonatum nanum P. Beauv. — podawany przez Md., 1857 (Sc.) i z zielnika, K., 1902 (na ziemi k. Strzegomian). Gat. niżowy.

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. — Śl.: na drogach leśnych, na pn. st. (440, 430). Pod. z zielnika, K., 1912 (droga powyżej Górki). Ek.: Xg. Gat. niżowy.

Pogonatum urnigerum (L.) P. Beauv. — podany przez Mildego, 1857, z Sobótki. Gat. ogólnogórski.

Polytrichum decipiens Limpr. — Śl.: występuje na humusie wśród głązów gabra — na szczycie (710), w lesie świerkowym na st. pd.-zach. (690); w lesie mieszanym, st. pn. (650, 600) i pn.-wsch. (480-620). Na Ślęży znaleziony pierwszy raz przez Lisowskiego, 1957, na pn. zb. wśród głązów gabra w lesie mieszanym.

Mech w Polsce b. rzadki, dotychczas opisany z kilku stan.: z Sude-tów — Góry Stołowe, Śnieżnik Kłodzki (Lis., 1959), Karkonosze (Limpr., 1895) — oraz z Gór Świętokrzyskich i Tatr (Lis., 1959). Ek.: Ex. Gat. górski (? reglowy).

Polytrichum attenuatum Menz. (= *P. formosum* Hedw.) — jest jednym z najpospolitszych mchów na badanym terenie. Rośnie na wszyst-

Mapa 3. Rozmieszczenie bardzo rzadkich w Polsce gatunków mchów

Distribution of moss species very rare in Poland

1 — *Ditrichum tenuifolium*; 2 — *Grimmia mühlenbeckii*; 3 — *Isopterygium elegans* var. *nanum*; 4 — *Polytrichum decipiens*; 5 — *Rhabdoweisia crispata*; 6 — *Tetraplodon angustatus*

kich wysokościach i wzgórzach masywu, najczęściej w lasach i na skar-
pach leśnych. Ek.: Brch. Gat. niżowy.

Polytrichum gracile Sm. — tylko 2 stan. Śl.: na mokrej ścieżce leśnej,
st. pd.-zach. (320). Na zabagnionej łące na pd. od wsi Sul. (290). Podany
z Dol. Sul. przez Md., 1860. Ek.: Hel. Gat. niżowy.

Polytrichum commune Hedw. — w wilgotnych rowach przy drogach
leśnych (2 stan.). Śl.: st. pn.-wsch. (440). G.: st. zach. (240). Ek.: Hel.
Gat. niżowy.

Polytrichum juniperinum Hedw. — b. rozproszony i nieczęsty gat. Śl.: na suchych skałach pokrytych zwietrzeliną, st. zach. (600); na drodze leśnej, st. pd.-zach. (320). Na murawach kserotermicznych na szczycie R. (570) i Gk. (315). W.: na piaszczystej skarpie pod szczytem (410); na ziemi w lesie bukowym, st. wsch. (360); na drodze k. schroniska turystycznego, na pd. st. G. (280). Pod.: masyw Śl., 1910, (zielnik), podpis nieczytelny. Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

Polytrichum strictum Sm. — Śl.: w wilgotnym rowie na zb. pn. (430). R.: na podmokłej łące w pobliżu rez. Ł.S. wśród *Sphagnum nemoreum* (300). Pod.: Md., 1860, Dol. Sul., zielnik, K., 1886, las k. Tąpadeł. Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Polytrichum piliferum Hedw. — dość częsty lecz na rozproszonych stan., na wszystkich wzgórzach. Występuje na skałach, murawach kserotermicznych, b. rzadko w szczelinach skalnych, na murach, skarpach. (12 stan.) Podany z zielnika, K., 1886, w lesie k. Tąpadeł. *Lith.* Gat. niżowy.

Schistostegaceae

Schistostega osmundacea Mohr — podany z Sobótki przez Mildego, 1871 i Limprichta, 1876. Na Śląsku rzadki: Góry Izerskie, Karkonosze, okolice Bolesławca, Bystrzycy Kł. (Limpr., 1876); Góry Stołowe (Lisowski, Szwejkowski, 1957) oraz Góry Bialskie (Lisowski 1959 a). Gat. ogólnogórski.

Georgiaceae

Georgia pellucida Rab. — występuje rzadko na zbutwiałych pniakach, w szczelinach skalnych oraz na ziemi w lasach. Śl.: pod szczytem (700), st. pn. (380). R.: w lesie świerkowym, st. pn. (400-500). S.: st. pn.-wsch. (350) i pn. (340). Pod. z zielnika: K., 1886 (Sob., zmurzałe drewno); Sch., 1973, 1879, (k. Tąpadeł). Ek.: *Epiph.* Gat. niżowy.

Fissidentaceae

Fissidens bryoides Hedw. — 2 stan. na Śl.: na gliniastym brzegu potoku, st. pd. (420) i w wilgotnym rowie przy żółtym szlaku turystycznym (440). Ek.: *Xg.* Gat. niżowy.

var. *intermedius* Ruthe — 1 stan., w szczelinie skalnej (serpentynit) k. wsi Przemiłów na zb. Gk. (260). Ek.: *Chasm.*

Fissidens osmundoides Hedw. — 2 stan. na wilgotnych brzegach strumyków. R.: w rez. Ł.S. (295) i powyżej wsi Górka (240). Kilka razy podawany: Md., 1857 (w potoku k. Górki), Md., 1869, 1870 (Dol. Sul.), Limpr., 1876 (Górka, Dol. Sul.). Ek.: *Xg.* Gat. ogólnogórski.

Fissidens adiantoides Hedw. — Śl.: na brzegu strumyka, st. pd. (360). R.: pospolity na łąkach w zespole *Molinietum medioeuropaeum* oraz w zbiorowisku ze zw. *Caricion davallianae* w rez. Ł.S. (300-400) i powyżej

rez. (400). Na zatorfieniu leśnym k. Tapadeł (340). Na brzegu strumyka k. Tapadeł (300). Pod.: Md., 1857 (leśne potoki na Śl. i w jej otoczeniu); Md., 1860 (Dol. Sul.); z zielnika: Ue. 1863 (Gk.); K., 1886 (brzeg strumyka k. Tapadeł). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Fisidens cristatus Wils. — na badanym terenie rośnie wyłącznie w szczelinach skalnych na podłożu serpentynitowym. Wchodzi tu w skład zespołu *Asplenietum cuneifolii* jako lokalnie wyróżniający gat. R.: pod szczytem, st. pd. (560); st. pn.-wsch. (480). Gk. pod szczytem (310); w nieczynnym kamieniołomie k. wsi Przemiłów (260). G.O.: powyżej Sc. (300). Podany również z serpentynitów: Md., 1869 (Sc.); Limpr., 1876 (Sc.); zielnik, K., 1886 (Sob.). Ek.: *Chasm.* Gat. górski (reglowy).

Fissidens taxifolius Hedw. — b. rzadki, najczęściej na gliniastej ziemi. Śl.: st. pd.-zach. (600). R.: w rez. Ł.S. (320). Gk.: st. pd.-zach. (300). Sc.: na brzegu potoku (240). Pod.: Md., 1857 (Sc.) Ek.: *Xg.* Gat. niżowy.

Ditrichaceae

Pleuridium subulatum (Hedw.) Lindb. — na jednym lecz obfitym stan. R.: na gliniastym brzegu strumyka w rez. Ł.S. (295), c. spor Pod.: Md., 1869 i Limpr., 1876 (okolice Sc.). Ek.: *Xg.* Gat. niżowy.

Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe. (= *Leptotrichum pallidum* Hampe) — podawany przez: Md., 1857 (R.); Md., 1869 (Sob., Gór.); z zielnika, Sch., 1878 (k. Będkowic). Gat. niżowy.

Ditrichum tenuifolium Lindb. (*Trichodon cylindricus* (Hedw.) Schimp.) — na polach w dwóch miejscach. R.: u podnóża góry, st. pn.-wsch., na pd. od Sul. (300). Strz.: niedaleko kamieniołomów (180), ster. Pod. z zielnika, Baumgart (G., 310) bez daty. Gat. b. rzadki, ze Śląska wymieniany z niewielu miejsc: Jelenia Góra, Karkonosze, Kudowa, Góry Sowie (Limpr., 1876). W Polsce rośnie ponadto w okolicach: Zielonej Góry, Żagania (Limpr., 1876), w Jurze Krakowsko-Wieluńskiej (Szafr., 1955), na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim (Szafr., 1957), w okolicach Krakowa (Szafr., 1961) oraz w Tatrach (Kuc, 1964). Ek.: *Xg.* Gat. niżowy.

Ceratodon purpureus Brid. — b. częsty na skałach, drogach leśnych, spróchniałym drewnie, murach. Rośnie prawie we wszystkich siedliskach, na każdym wzgórzu. Na słabo spróchniałych pniakach tworzy inicjalne zbiorowisko: *Ceratodon purpureus*—*Hypnum cupressiforme* rozwijające się na ich powierzchniach cięcia. (54 stan.). Ek.: *Ep.*, *Epiph.*, *Xg.*, *Chasm.*, *Ex.*, *Lith.*, *Brch.*, Gat. niżowy.

for. *obtusifolia* (Limpr.) Mnk. — 4 stan. wyłącznie na skałach. Śl.: szczyt (718); w lesie świerkowym, st. pd.-zach. (700). R.: pod szczytem, st. pd.-wsch. (560.) Pod.: Lis., 1957, na głazach gabra w lesie świerkowym, st. pn. — Śl. (550). Ek.: *Ep.*

for. *brevifolia* (Milde) Mnk. — 1 stan. S.: na ziemi w lesie świerkowym pod szczytem góry, st. zach. (360). Ek.: *Brch.*

Distichium capillaceum (Hedw.) Br. eur. — tylko 1 stan. Śl.: na murze kaplicy, na szczycie (710). Z tego miejsca wielokrotnie podawany: Md., 1855, 1857, 1869; z zielnika, K., 1877; Lis., 1957. Ek.: *Ex.* Gat. ogólnogórski.

Dicranaceae

Amphidium mougeotii Schimp. — pod.: Limpr., 1873 (Sob.). Gat. ogólnogórski.

Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Br. eur. — na kilku stan. W szczelinach skalnych i na skałach pod szczytem Ślęży (640-710). Wszędzie obficie zarodnikuje. Pod.: Md., 1871 (Śl.); Lis., 1957 (skały gabra na Śl.). Ek.: *Ep.*, *Chasm.* Gat. wysokogórski.

Rhabdoweisia crispata Kindb. (= *Rh. denticulata*) Brid. (Br. eur.) — 2 stan. w b. wilgotnych szczelinach skalnych. Śl.: st. pd. (700); st. zach. (680). Pod.: Lis., 1957 (jw). Mech b. rzadki w Polsce: Karkonosze, Góry Izerskie (Limpr., 1876), Kotlina Kłodzka (Limpr., 1890), Bieszczady Zach. (Lis., 1956). Ek.: *Chasm.* Gat. wysokogórski.

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. — 1 stan. G.: w małych ilościach na głazach amfibolitu pod szczytem (315). Poza Śląskiem gdzie, jak podaje Limpr., 1876, jest rozpowszechniony, z Polski znany tylko z Pojezierzy (Szafr., 1957; Lis., 1961) oraz z wyżyn południowych (Kuc, 1964). Ek.: *Ep.* Gat. niżowy.

Dicranella schreberi Schimp. — 2 stan. Śl.: na wilgotnej skarpie przydrożnej, st. pn. (240) i na gliniastym brzegu potoku w pobliżu Sc. (220). Na Śląsku rzadki: okolice Zgorzelca, Jeleniej Góry, Dzierżoniowa, Wałbrzycha (Szczawno, Sokołowsko), k. Wrocławia (Limpr., 1876). Ek.: *Xg.* Gat. niżowy.

Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. — 2 stan. R.: na gliniastej skarpie w lesie sosnowym na pn. od Słupic (280). Na polu powyżej Sul., w pobliżu rez. Ł.S. (290). Ek.: *Xg.* Gat. niżowy.

Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp. — pod.: Md., 1855, 1869 (odłogi k. Górki). Gat. niżowy.

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. — b. pospolity w całym masywie, zwłaszcza masowo występuje na poboczach dróg leśnych gdzie jest gat. budującym zbiorowisko: *Dicranella heteromalla*-*Polytrichum attenuatum*. Pod.: zielnik, K., 1894, 1912 (Sob.) Ek.: *Xg.*, *Ex.*, *Brch.* Gat. niżowy.

Dicranodontium denudatum (Brid.) Hag. — występuje sporadycznie na głazach i zmurszałym drewnie. Śl.: st. pn.-wsch. (700), pd.-zach. (650). G.: szczyt (316). Pod.: Md., 1869 (przedgórze k. Sob.). Ek.: *Ep.*, *Epiph.* Gat. górski (reglowy).

Cynodontium polycarpum (Ehrh.) Schimp. — Śl.: na skałach i głazach gabra w partii szczytowej, miejscami masowo (550-718); na głazach granitowych, st. pn. (430). W.: na ziemi w lesie liściastym, st. pd.-wsch. (400). Pod.: Md., 1855 (na skałach Śl.); Md., 1857 i z zielnika, Ue., bez

Mapa 4. Rozmieszczenie bardzo rzadkich na Śląsku gatunków mchów

Distribution of moss species very rare in Silesia

1 — *Amblystegium varium*; 2 — *Brachythecium geheebii*; 3 — *Campyllum polygamum*; 4 — *Dicranella schreberi*; 5 — *Eurhynchium schleicheri*; 6 — *Grimmia trichophylla*; 7 — *Racomitrium sudeticum*

daty (Sob.); Lis., 1957 (Śl., st. zach. na skałach w lesie świerkowym). Ek.: *Ep.* Gat. wysokogórski.

var. *strumiferum* (Ehrh.) Schimp. — znacznie rzadszy od gat. macierzystego. Śl.: na głazach gabra w części szczytowej (600-718) oraz na głazach granitowych, st. pn. (430). Występuje zawsze z gatunkiem. Pod.: Md., 1857, 1869 (Sob.). Ek.: *Ep.*

Dicranum fulvum Hook. — podany dwa razy przez Limprichta, 1873, 1876, ze szczytu Śl. i kamiennych ogrodzeń w Górcie. Na Śląsku rzadki:

Mapa 5. Rozmieszczenie niektórych gatunków wysokogórskich

Distribution of some high alpine moss species

- 1 — *Andreaea petrophila*; 2 — *Cynodontium polycarpum*; 3 — *C. polycarpum* var. *strumiferum*; 4 — *Rhabdoweisia fugax*; 5 — *Rhacomitrium lanuginosum* 6 — *Rh. ramulosum*

Bolesławiec, Jelenia Góra, Lwówek, Góry Wałbrzyskie (Książ), Góry Stołowe (Błędne Skały) (Limpr., 1876). Gat. górski (reglowy).

Dicranum scoparium Hedw. — pospolity gat. leśny, b. często występuje tu również na humusie naskalnym (44 stan.). Pod.: z zielnika, Wicherura, 1855 (Sob.). Ek.: *Ep.*, *Epiph.*, *Ex.*, *Brch.* Gat. niżowy.

Dicranum undulatum Ehrh. — rośnie najczęściej w borach sosnowych i mieszanych: na pn. zb. R. (400); w rez. Ł.S. (300-340); na pd.-wsch. od Sul. (310) oraz na wilgotnym humusie wśród skał gabra w lesie

świerkowym pod zach. szczytem Śl. (600); na polanie śródleśnej, wsch. st. R. (360); w rowie przydrożnym, na brzegu lasu sosnowego powyżej Sc. (260). Pod.: Md., 1855, 1860 (Dol. Sul.). Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

Dicranum bonjeani De Not. — 2 nieliczne stan. Śl.: w rozlewisku, st. pn. (300). R.: na brzegu potoku płynącego przez zatorfienie śródleśne na pd.-zach. zb. (360). Pod.: Limpr., 1873 (Dol. Sul.). Ek. *Hel.* Gat. niżowy.

Dicranum spurium Hedw. — 1 stan. R.: w suchym borze sosnowym na Ślęży (4 stan.), Raduni (6 stan.), Wieżycy (3 stan.) i Górach Oleszeńskich (1 stan.). Wszędzie występuje w niedużych ilościach i ster.

Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske — niezbyt częsty gat. epifityczny i epiksyliczny, spotykany również na podłożu skalnym. Rośnie na Ślęży (4 stan.), Raduni (6 stan.), Wieżycy (3 stan.) i Górach Oleszeńskich (1 stan.). Wszędzie występuje w niedużych ilościach i ster. Ek.: *Ep.*, *Epiph.* Gat. niżowy.

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske — na badanym terenie porasta głównie skały i głazy. Śl.: wiele stan. na głazach gabra i granitu na wysokościach 380-600; znajdowany również na korze drzew w partii szczytowej (700-710). R.: sporadycznie na głazach serpentynitu, st. pn. (300). W.: masowo rośnie na skałach amfibolitu w lesie bukowym na st. pn.-wsch i wsch. (360-410). S.: st. pd.-wsch. (300). Pod.: Md., 1855, 1857, 1859, 1860 (Dol. Sul.); z zielnika, Sch., 1868 (Sob.); Lis., 1957 (Śl.: na głazach gabra, st. zach. (550). Ek.: *Ep.* Gat. górski (regłowy).

Leucobryum glaucum (Hedw.) Schimp. — częsty, lecz tylko w niższych partiach wzgórz w borach sosnowych gdzie jest gat. wyróżniającym ze społ. *Leucobryo-Pinetum*; występuje ponadto na skarpach na brzegach lasów oraz pojedynczo na drogach leśnych, ścieżkach i łąkach. Śl. (5 stan.) na wysokościach 240-380. R.: (6 stan.) na wys. 280-340. G.O.: (4 stan.) na wys. 300-360. Pod.: Md., 1855, 1860 (Dol. Sul.). Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

Encalyptaceae

Encalypta vulgaris Hedw. (= *E. extinctoria* Sw.) — 2 stan. Śl.: na gliniastej skarpie, st. pn., przy niebieskim szlaku turystycznym (300) i na st. pn.-wsch. (380). Pod.: z zielnika, K., 1877 (Śl.) i Sch., 1877 (Strz.), na murach. Ek.: *Xg.* Gat. niżowy.

Encalypta ciliata Hedw. — podawany przez Mildego, 1855, ze szczytu Ślęży oraz, 1857, 1869, z Sobótki. Gat. górski (regłowy).

Encalypta contorta Lindb. (= *E. streptocarpa* Hedw.) — rośnie w wielu miejscach i w b. małych ilościach, ster. Śl.: na głazie gabra i na murze (schronisko, kaplica) na szczycie (710-718). R.: w szczelinach skał serpentynitowych, szczyt (570). W.: w szczelinach baszty na szczycie (415). Strz.: na murze wiaduktu w pobliżu stacji kolejowej (180). Pod.: Md., 1869 (Sob.); Lis., 1957 (na murze kościoła na szczycie Śl.). Ek.: *Er.* Gat. ogólnogórski.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. — podawany z Sobótki przez Mildego, 1869. Gat. ogólnogórski.

Hymenostomum rostellatum (Brid.) Schimp. — zbierany z Tapadeł przez Kerna, 1887 (okaz w zielniku). B. rzadki w Polsce: okolice Wrocławia, Zielonej Góry (Limpr., 1876); Jura Krakowsko-Częstochowska (Krupa, 1855, cyt. Kuc, 1964) i Wyżyna Sandomiersko-Opatowska (Kuc, 1964). Gat. niżowy.

Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Br. — podawany z Doliny Sulistrowickiej przez Mildego, 1855, 1857 i z Raduni (okaz w zielniku, etykieta bez autora i daty). Gat. niżowy.

Weisia wiridula (L.) Hedw. — podany z Raduni przez Mildego, 1869. Gat. niżowy.

Didymodon rigidulus Hedw. — pod.: Md., 1855 (na murach w Górcie) Md., 1857 (przed Sobótką); Md., 1869 (Górka). Gat. reglowy.

Erythrophyllum rubellum (Hoffm.) Loeske — 3 stan. Śl.: na głazach gabra: szczyt (710), st. pd. (420) oraz na murze kaplicy (710) — to stan. po remoncie kaplicy zostało zniszczone. Wszędzie obficie zarodnikuje. Pod.: Md., 1855 (szczyt Śl.). Ek.: Ep. Gat. niżowy.

Barbula unguiculata Hedw. — 1 stan., kilka okazów. Na gliniastym brzegu potoku, wśród *Amblystegium varium*, na zach. od Sul. (290). (det. Lis.). Ek.: Xg. Gat. niżowy.

Phascum acaulon L. (= *Ph. cuspidatum* Hedw.) — 2 stan., na polach w pobliżu Górki (200) i w Sobótce (180). Ek.: Xg. Gat. niżowy.

Pottia truncatula Lindb. — występuje nielicznie w niższych położeniach, głównie na polach: na pd. od Sul. (290); zach. od Tapadeł (280); pn. od Sul. (220), pn. od Gór (190-210); pn. od Sob. i w Strz. (180). Poza tym znaleziony na gliniastej ścieżce w lesie bukowym powyżej Górki (230) i na skarpie k. Sc. (220). Pod. z zielnika, Ue., 1863 (Świątniki); K., 1912 (Sob., pole). Ek.: Xg. Gat. niżowy.

Pottia intermedia (Turn.) Fűr. — pod.: Md., 1855 (Gór.); Limpr., 1873 (Sob.) Gat. niżowy.

Pterigoneurum cavifolium Jur. (= *P. ovatum* (Hedw.) Dix. — zbierany przez Baumgarta, 1917, z muru w Strzeblowie (okaz w zielniku) Gat. niżowy.

Tortula muralis Hedw. — spotykany dość często na murach i w szczelinach murów; Śl.: kaplica na szczycie (710). S.: na kamiennym brzegu strumyka, st. pn. (220). G.: dom poprawczy (220). Gór.: zamek (230). Na głazach serpentynitu na Gk. i w Tomicach (170). Na kamiennych ogrodzeniach w Gór. (180-220). Na murach: w Karolinie (200); Sob. (180-200); Strz. (180). Liczne okazy w zielniku: Sch., 1877; K., 1905 (szczyt Śl., na gabro); Bartsch, bez daty (masyw Śl.). Ek.: Ex. Gat. niżowy.

Syntrichia subulata (Hedw.) Web. et Mohr — podany ze szczytu Ślęży przez Mildego, 1855. Gat. niżowy.

Syntrichia ruralis Brid. — rośnie na niewielu stan. Śl.: na zacienionych głazach gabra na szczycie pod wieżą widokową, b. licznie (718); na murze kaplicy (710) i schroniska na szczycie (705). R.: na głazach serpentynitu pod szczytem (560); st. pd. (540). W.: u nasady pnia dębu, st. pd. (410). Strz.: na murze starego ogrodzenia (180). Pod.: Md., 1855 (szczyt Śl.). Ek.: *Ep. Gat. niżowy*.

Grimmiaceae

Grimmia apocarpa Hedw. — 3 stan. Śl.: na murze kaplicy (710); na suchych głazach gabra, st. pn. (280). Sc.: na suchym głazie w potoku (220). Pod.: Md., 1855 (szczyt Śl.); z zielnika: Ue., 1817 (na skałach Śl.); Sch., 1873 (Sob.); Bartsch, bez daty (Sob.) Ek.: *Ep. Gat. ogólnogórski*.

Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. — pod.: Md., 1857, 1869 (Śl.); z zielnika, K., 1886, 1887 (skały gabra powyżej Tapadeł). *Gat. ogólnogórski*.

Grimmia incurva Schwaegr. — pod.: Limpr., 1890 (na skałach Ślęży), na zachód od szczytu (700). Na Śląsku b. rzadki: Karkonosze, Góry Izerskie (Limpr., 1876). *Gat. wysokogórski*.

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. — na głazach w szczytowych partiach wzgórz: Śl. — pospolity na wys. 550-710. Poza tym na pojedynczych stan. R.: st. pd. (560). W.: st. pn.-wsch. (380). G.: st. zach. (300). Na kamieniu przydrożnym w Tomicach (170). Ek.: *Ep. Gat. niżowy*.

Grimmia trichophylla Grev. — 3 stan. na głazach gabra na Śl.: w partii szczytowej (705); st. pn.-wsch. (590); st. pn. (550). Pod.: Lis., 1957 (Śl.). Na Śląsku rzadki: Bolesławiec, Lwówek, dolina jeleniogórska (Limpr., 1876). Ek.: *Ep. Gat. ogólnogórski*.

Grimmia mühlenbeckii Schimp. — 2 stan. w niewielkiej liczbie okazów na szczycie Śl. (718, 710). Często podawany: Md., 1868, 1869 (szczyt Śl.); Limpr., 1876, 1890 (Sob., R.); z zielnika, Sch., 1868 (R.); Sch., 1873, 1878 (szczyt Śl.); K., 1877 (pod szczytem Śl.); Ansorge, 1878 (Śl.). Na Śląsku rzadki: okolice Bolesławca, Wrocławia, Złotoryji, w Górach Izerskich, Sowich, Wałbrzyskich i w Karkonoszach (Limpr. 1876). W Polsce notowany: w Tatrach, na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim (Szafr., 1957). Ek.: *Ep. Gat. ogólnogórski (?)*.

Grimmia hartmanii Schimp. — najczęstszy z rodzaju *Grimmia* na badanym terenie. Występuje na skałach i głazach na Ślęży (6 stan.) Raduni (4 stan.), Wieżycy (3 stan.), Stolnej (2 stan.) i Gozdniczy (1 stan.). Pod.: Md., 1869 (Śl.); z zielnika, Sch., 1887 (szczyt Śl.). Lis., 1957 (zach. st. Śl.). Ek.: *Ep. Gat. ogólnogórski*.

Rhacomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. — pospolity tylko na Ślęży (380-718); szczególnie na skałach gabra w partii szczytowej (700-718). Poza tym spotkany na głazach amfibolitu pod szczytem Gozdniczy (300). Pod.: Md., 1855 (Śl.); Md., 1869 (Sob.); z zielnika, K., 1877 (szczyt Śl.); Sch., (Śl.), 1879; Lis., 1957 (Śl.). Ek.: *Ep. Gat. ogólnogórski*.

Mapa 6. Rozmieszczenie niektórych gatunków ogólnogórskich

Distribution of some mountain moss species

- 1 — *Dicranella subulata*; 2 — *Diphyscium sessile*; 3 — *Distichium capillaceum*; 4 — *Fissidens osmundoides*; 5 — *Grimmia hartmanii*; 6 — *Sphagnum girgensohnii*

Racomitrium sudeticum Br. eur. — 1 stan. Śl.: na głazach gabra pod szczytem zach., b. nielicznie wśród *Rh. heterostichum* i *Rh. lanuginosum* (600). Na Śląsku rzadki: Karkonosze, Góry Izerskie, Śnieżnik Kłodzki (Limpr., 1876); Góry Kaczawskie: Połom i Okole (Md., 1859). Ek.: Ep. Gat wysokogórski.

Racomitrium ramulosum Lindb. (= *Rh. microcarpum* Brid.) — 3 stan. Śl.: na głazach gabra w części szczytowej (710); na szczycie zach. (660); poniżej szczytu zach. (600). Na Śląsku rzadki: Góry Izerskie, Karkono-

sze, Góry Wałbrzyskie, wzgórze kłodzkie, Śnieżnik Kłodzki (Limpr., 1876), Góry Kaczawskie (Lis., 1956a) i Góry Stołowe (Lis., 1963). Ek.: Ep. Gat. wysokogórski.

Rhacomitrium canescens (Hedw.) Brid. — 2 stan. na suchych zboczach w nieczynnych kamieniołomach k. wsi Przemiłów (240) i w Strz. (180). Ek.: Lith. Gat. niżowy.

Rhacomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid (= *Rh. hypnoides* Lindb.) — znaleziony tylko na Ślęży gdzie porasta głazy gabra i granitu (430-710). Masowo rośnie na nasłonecznionych głazach na szczycie zach. (Olbrzymki) i w jego pobliżu tworząc najczęściej jednogatunkowe skupienia (600-660), c. spor. Ek.: Ep. Gat. wysokogórski.

Funariaceae

Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid. — 3 stan., na podłożu gliniastym. Sul.: w wilgotnym rowie przy szosie (290). Na dnie nieczynnego kamieniołomu w Przemiłowie (240). Sob.: na polu w pobliżu stacji kolejowej (180), c. spor. Ek.: Xg. Gat. niżowy.

Entostodon fascicularis (Hedw.) C. Müll. — podany z Sobótki przez Mildego, 1869. Gat. niżowy.

Funaria hygrometrica Hedw. — na rozproszonych stan. Śl.: na murze schroniska na szczycie (705); na gliniastych skarpach: st. pn. (440); pn.-wsch. (380). R.: obficie na skarpach i brzegach strumyków w rez. Ł.S. (310-330). Na polach: na pd.-zach. od Gór. (190) i na wsch. od Sob. (180). Ek.: Xg. Gat. niżowy.

Splachnaceae

Tetraplodon angustatus (Hedw.) Br. eur. — znaleziony tylko na Ślęży w jednym miejscu: na odchodach złożonych na głazach gabra, nieco poniżej szczytu zach, na jego pd.-zach. zb., ster. (650). Rośnie tu w towarzystwie m.in.: *Rhacomitrium heterostichum*, *Rh. lanuginosum*, *Pohlia nutans*. Pod.: Md., 1857 (Sob.); Md., 1869 (pod szczytem Śl., między skałami gabra (leg. Wichura, 1837): Limpr., 1876 (ok. 60 m od szczytu Śl.) (704); Migula, 1904 (Sob.); z zielnika, Sch., 1872 (szczyt Śl., (704). Mech b. rzadki w Polsce: na Śląsku, poza wymienionym stan., występuje jeszcze tylko w Karkonoszach: Duży Kocioł Śnieżny (Limpr., 1876); ponadto znany z niewielu miejsc: Babia Góra (Limpr., 1876), Tatry (Limpr., 1895, Lis., 1959, Lis., 1965), Okręg Łysogórski: Łysica (Szafr., 1957) i ok. 4 km za Łysicą (Kuc, 1964). Ek.: Ex. Gat. wysokogórski.

Tetraplodon mnioides (Hedw.) Br. eur. (= *T. bryoides* Lindb.) — podany przez Mildego, 1859, 1869 (Sob.; Limprichta, 1876, 1895 (szczyt Śl.) i Migulę, 1904 (Śl.). B. rzadki w Polsce: Karkonosze (Limpr., 1876) i Tatry (Limpr., 1895, Lis., 1959). Gat. wysokogórski.

Pohlia elongata Hedw. — pod.: Md., 1855, 1857, 1869, (Sob., Gór.) oraz z zielnika, Md., bez daty (Gór.). Gat. wysokogórski.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. — pospolity na całym terenie masywu. B. często spotykany na skarpach leśnych, zbutwiałym drewnie i skałach. Bierze udział w tworzeniu zbiorowiska *Pohlia nutans-Dolichotheca sillesiaca* porastającego silnie spróchniałe pniaki oraz jest częstym składnikiem zbiorowiska naskalnego (zbior. *Cynodontium polycarpum*) i po boczach dróg leśnych (zbior. *Dicranella heteromalla-Polytrichum attenuatum*). Pod.: z zielnika, K., 1886 (skały powyżej Tapadeł.) Ek.: *Ep.*, *Epiph.*, *Xg.*, *Chasm.*, *Ex.*, *Brch.*, Gat. niżowy.

Mniobryum albicans (Wahl.) Limpr. — sporadycznie w miejscach wilgotnych. Śl.: na drogach leśnych, st. pn. (430), pn.-zach. (300). S.: na mokrej drodze, st. pd. (320), w rowie przydrożnym st. wsch. (280). Sul.: na brzegu rowu z wodą, przy szosie (300). Sc.: na gliniastym brzegu potoku (230). Ek.: *Hel.* Gat. ogólnogórski.

Bryum cuspidatum Schimp. (= *B. affine* Lindb.) — podany ze skał między Ślężą, a Radunią przez Limprichta, 1876. Gat. niżowy

Bryum capillare Hedw. — na rozproszonych stan., najczęściej na podłożu skalnym. Rośnie na Ślęży (3 stan.), Raduni (3 stan.), Wieżycy (4 stan.), Stolnej (1 stan.), Gozdniku (1 stan.) i w Strzeblowie (1 stan.). Ek.: *Ep.*, *Chasm.* Gat. niżowy.

var. *flaccidum* Br. eur. — występuje w podobnych siedliskach jak gat.; spotykany również na drzewach i polach (tu formy zmarniałe). Ślęza — 6 stan., Wieżyca — 1 stan., Stólna — 3 stan., sporadycznie (1 stan.) na Gozdnicy, Gozdniku, k. Sulistrowic i w Sobótce. Ek.: *Ep.*

Bryum alpinum Brid. — pod.: Md., 1857, 1869 (kaplica na szczycie Śl.); Limpr., 1895 (Sob.). Gat. górski (reglowy).

Bryum ventricosum Dicks. — znaleziony na kilku stan. gdzie występuje obficie, ster. R.: na zabagnieniu śródleśnym wśród trzcin na pd.-zach. zb. (360); na wilgotnej łące, st. pn.-wsch. (360); pospolity w rez. Ł.S. w wilgotnych partiach łąk turzycowych (320-340) oraz na kamieniu w potoku i na jego brzegu (300). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Bryum turbinatum (Hedw.) Schwaegr. — pod.: Md., 1857, 1869 (Sc., Sob.). Gat. niżowy.

Bryum cirrhatum Hoppe et Hornsch. — pod.: Md., 1869 (między Ślężą, a Radunią). Gat. niżowy.

Bryum caespiticium Hedw. — na badanym terenie występuje rzadko. Śl.: na murze kaplicy na szczycie (710); na drodze leśnej, st. pd.-zach. (320). R.: na suchej skarpie w lesie sosnowym w rez. Ł.S. (320). S.: na głazach amfibolitu pod szczytem, st. zach. (360). Gk.: na murawie kserotermicznej na szczycie (315). Gdzieniegdzie na polach: na pn.-zach. od Przemysłowa (320), w Górcie (200). Częsty na murach w Strzeblowie (180). Ek.: *Xg.* Gat. niżowy.

var. *kunzei* Warnst. — 1 stan. Na suchej, mineralnej ziemi w amfiteatrze u podnóża Gozdnika, st. pd. (280). Ek.: *Lith*.

Bryum argenteum Hedw. — rośnie często w miejscach synantropijnych: na polach, drogach i ścieżkach leśnych, murach, kamiennych ogrodzeniach itp. na Ślęży (5 stan.), Raduni (1 stan.), Wieżycy (1 stan.), w Górcie (5 stan.), Strzeblowie (3 stan.), k. Słupic (1 stan.) i Chwałkowie (2 stan.). Najwyższe stan.: na murze kaplicy na szczycie Ślęży (710). Pod.: Md., 1855 (Górka). Ek.: *Xg.*, *Ex.*, *Lith*. Gat. niżowy.

Mniaceae

Mnium hornum Hedw. — pospolicie jedynie na Ślęży (14 stan.) oraz powyżej Górki (4 stan.), gdzie występuje na wilgotnych skarpach przydrożnych na brzegach lasów. Ponadto rozproszony na Raduni (1 stan.), Wieżycy (2 stan.), Stolnej (3 stan.). Pod.: Md., 1869 (masyw Śl.); z zielnika, K., 1904 (Sob.); Lis., 1957 (pn. zb. Śl.). Ek.: *Brch*. Gat. niżowy.

Mnium stellare Hedw. — niewiele stan. na Ślęży i Wieżycy. Śl.: na zacienionych skałach gabra na szczycie pod wieżą widokową (718); na murze kaplicy i głazach w partii szczytowej (710). W.: na skarpie przydrożnej w lesie sosnowym u podnóża góry, st. zach. (250. Pod.): Md., 1857, 1869 (Sob.). Ek.: *Ep*. Gat. niżowy.

Mnium spinosum Schwaegr. — na 2 lecz obfitych stan. na Ślęży: na humusie wśród głazów gabra w lesie liściastym na szczycie poniżej kaplicy (710); w lesie świerkowym na pn. zb. (650). Pod.: Md., 1871 (Sob.); z zielnika, Sch., 1873 (szczyt Śl.); Lis., 1957, (Śl.), st. pn. (550). Ek.: *Brch*. Gat. Górski (reglowy).

Mnium spinulosum Br. eur. — w podobnych miejscach jak gat. poprzedni lecz jeszcze rzadszy. Śl.: na humusie wśród głazów gabra w lesie liściastym pod szczytem (710); między wielkimi blokami skalnymi na st. pn. i pn.-wsch. (650, 600). Pod.: Md., 1869 (pod szczytem Śl.); Limpr., 1895 Śl.); Lis., 1957 (Śl., na humusie wśród skał gabra). Ek.: *Brch*. Gat. górski (reglowy).

Mnium cuspidatum Hedw. — w masywie Ślęży nieczęsty. Śl.: na szczycie w lesie liściastym (700); na głazach gabra, st. zach. (600). R.: na brzegu lasu liściastego, st. pd. (420). W.: w runie lasu bukowego: st. zach. (340); pn.-zach. (320). Pod.: z zielnika, Sch., 1868 (Gór.); Sch., 1872 (szczyt Śl.). Ek.: *Brch*. Gat. niżowy.

Mnium affine Bland. — rozproszony na wszystkich wzgórzach masywu z wyjątkiem Gozdnika. Występuje najczęściej na ziemi w runie leśnym. Najwyższe stan.: na drodze leśnej, na pn. zb. Ślęży (440). Ek.: *Brch*. Gat. niżowy.

Mnium seligeri Jur. — spotykany rzadko w wilgotnych miejscach. R.: na łące w zespole *Molinietum medioeuropaeum* w rez. Ł.S. (340), w rozlewisku, w lesie świerkowym na pn. zb. (300). Sob.: w podmokłych zarostach na pd.-zach. od osiedla (180). Ek.: *Hel*. Gat. niżowy.

Mapa 7. Rozmieszczenie niektórych gatunków reglowych

Distribution of some subalpine forest moss species

- 1 — *Brachythecium reflexum*; 2 — *Dicranodontium denudatum*; 3 — *Isopterygium elegans*;
 4 — *Mnium spinosum*; 5 — *M. spinulosum*; 6 — *Paraleucobryum longifolium*; 7 — *Thamnium
 alopecurum*

Mnium rostratum Web. et Mohr — dość rzadki gat., rośnie zazwyczaj z *Mnium affine*. Śl.: na zacienionych głazach pokrytych humusem, w lesie świerkowym, st. pn.-zach. (700). R.: w runie lasu sosnowego u podnóża, st. pd. (350); trafia się na śródleśnych łąkach trzęślicowych w rez. Ł.S. (300-340). W.: masowo na humusie wśród głazów amfibolitu i na płytkiej glebie naskalnej w lesie bukowym, st. pn.-wsch. (400); w runie lasu bukowego na wsch. zb. (300). G.: na zmurszałym drewnie, st. pn. (300). Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

Mnium undulatum Hedw. — rozproszony w niższych położeniach masywu. Śl.: w rozlewisku w lesie sosnowym, st. pd.-zach. (300). R. na wilgotnej łące trzęslicowej w rez. Ł.S. (340). S.: w rozlewiskach: st. pd. (320); pn.-wsch. (250). Pod.: z zielnika, Sch., 1871 (Sob.). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Mnium punctatum Hedw. — najczęściej rośnie na mokrych głazach i gliniastych brzegach potoków. Śl.: na zacienionych skałach gabra, st. pn.-zach. (700); na brzegu potoku, st. pn. (400); na wilgotnych skarpach przydrożnych: st. pn. (380); zach. (300); na głazie w potoku powyżej Górki (250). R.: na głazach, st. pd. (400); na zatorfieniu śródleśnym powyżej Tapadeł (320); na brzegach strumyków w rez. Ł.S. (320). W.: na ziemi w buczynie, st. pn.-wsch. (360). Na wilgotnej łące w pobliżu Uliczna (210). Ek.: *Ep.*, *Brch.* Gat. niżowy.

Bartramiaceae

Bartramia ithyphylla Brid. — pod.: Md., 1855 (szczyt Śl.); Md., 1857, 1869 (Sob.). Gat. ogólnogórski.

Bartramia halleriana Hedw. — pod.: Md., 1857, 1869 (Sob.); z zielnika, Sch., 1877 (szczyt Śl.). Gat. ogólnogórski.

Bartramia pomiformis Hedw. — 1 stan. Śl.: na gliniastej skarpie przydrożnej, st. półn. (450). Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

Philonotis fontana Brid. — pod.: z zielnika, Sch., 1871 (masyw Ślęży). Gat. ogólnogórski.

Philonotis calcarea Schimp. — 1 stan. Na brzegu strumyka w Sul. (260). Pod.: Md., 1860 (Dol. Sul.); Md., 1869 (k. Sob.); z zielnika, R. Fritze, 1860 (Dol. Sul.). Ek.: *Hel.* Gat. górski (reglowy).

Aulacomniaceae

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. — rozproszony na 3 wzgórzach masywu. Występuje przeważnie na silnie zbutwiałych pniakach: w borze sosnowym na wsch. zb. S. (340); masowo na całym pn. zb. G. (230-310) oraz powyżej Słupic (320). Poza tym zbierany ze szczelin skalnych na pn. st. R. (480), skarp (jw.), skał serpentynitu, st. pd. (440) i między głazami amfibolitu w lesie dębowym na pd.-zach. zb. W. (400). Ek.: *Ep.*, *Epiph.* Gat. niżowy.

Aulacomnium palustre Schwaegr. — rzadki. Śl.: na wilgotnym brzegu strumyka, st. pd. (450). R.: b. licznie na łąkach trzęslicowych w rez. Ł.S. (320-340) oraz na pd. od Tapadeł (260). Pod.: Md., 1860 (Dol. Sul.); z zielnika, Sch., 1878 (Sob.). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Orthotrichaceae

Ulotia ludwigii Brid. (= *U. coarctata* (P. Beauv.) C. Jensen) — pod. Md., 1857, 1869 (Sob.). Gat. górski (reglowy).

Uloa americana (P. Beauv.) Limpr. — pod.: z Sobótki przez Mildego, 1857, 1869 i Limprichta, 1876. W Polsce rzadki: na Śląsku rozproszony — dolina jeleniogórska, Kamienna Góra, Strzelin, k. Wałbrzycha (Książ), dolina Bystrzycy (k. Barda), Góry Kaczawskie (Bolesławiec, Lwówek, Połom, Wleń) (Limpr., 1876) — ponadto znany z okolic Cieszyna (Limpr., 1876). Gat. ogólnogórski.

Orthotrichum anomalum Hedw. — występuje nielicznie na 3 stan. Śl.: na murze kaplicy na szczycie (710). S.: na kamiennym brzegu strumyka, st. pdn. (240). Na suchym głazie serpentynitu w strumyku k. Sc. (230). Pod.: Md., 1857 (Sob.); z zielnika, bez daty i autora (Sob.). Ek.: Ep. Gat. niżowy.

Orthotrichum striatum Hedw. — kilka okazów na 1 stan. Na korze przydrożnej czereśni w pobliżu Górki (190). Pod.: Md., 1857 (Sob.) Ek.: Epiph. Gat. niżowy.

Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl. — pod.: Md., 1857, 1869 (Sob.); z zielnika, K., 1877 (Sob.); Md., 1855 (drzewa k. Górki) Gat. niżowy.

Orthotrichum affine Brid. (= *O. octoblefare* Brid.) — 2 stan. R.: na korze dębu przy drodze leśnej, st. pd.-zach. (300). Na korze jabłoni w Sul. k. przystanku PKS. (280). Ek.: Epiph. Gat. niżowy.

Orthotrichum stramineum Hornsch. — pod.: Md., 1869 (Sob.) Gat. niżowy.

Orthotrichum diaphanum Brid. — 2 stan. Na korze jabłoni w Sul. razem z *O. affine* (280). Na głazie granitowym w lesie bukowym powyżej Górki (240). Ek.: Ep., Epiph. Gat. niżowy.

Hedwigiaceae

Hedwigia albicans Lindb. (= *H. ciliata* Br. eur.) — najpospolitszy z mchów epilitycznych, rośnie na wszystkich rodzajach skał w całym masywie (19 stan.). Pod.: Md., 1855 (Śl.); z zielnika, K., 1886 (na skałach serpentynitowych Sob.); Bartsch, bez daty (masyw Śl.). Ek.: Ep. Gat. niżowy.

for. *secunda* Med. — 3 stan. Śl.: st. zach. (600). W.: st. pd. zach. (400). S.: st. pdn. (300). Pod.: Lis., 1957 (Śl.). Ek.: Ep.

Leucodontaceae

Leucodon sciurioides (Hedw.) Schwaegr. — 1 stan. Śl.: tylko kilka gałązek na korze jaworu na szczycie k. schroniska (705). Pod.: z zielnika, Sch., 1878 (szczyt Śl.). Ek.: Epiph. Gat. niżowy.

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. — 2 stan. Śl.: na głazach gabra, st. pn.-wsch. (600). G.O.: na głazach serpentynitu powyżej Sc. (340). Wielokrotnie podawany z Sobótki, Raduni i Ślęży przez: Md., 1857, 1869; Limpr., 1873; z zielnika, Bryotheca Silesiaca, 1877, Sch., K., bez dat. Ek.: Ep. Gat. niżowy.

Neckeraceae

Homalia trichomanoides Br. eur. — 1 stan. Śl.: u nasady pnia buka w lesie bukowym, st. pd.-zach. (320). Pod.: z zielnika, Sch., 1873 (Sob.). Ek.: *Epiph.* Gat. niżowy.

Neckera pennata Hedw. — pod.: Md., 1869 (Sob.); z zielnika, K., 1878 i Sch., 1873, 1878 (Sob.: na drzewach). Gat. górski (reglowy).

Neckera crispa Hedw. — pod.: Md., 1869 (Sob.). Gat. ogólnogórski.

Neckera complanata (Hedw.) Hüb. — na korze jaworu i wiazu na szczycie Śl. (710). Pod.: Md., 1869 (Śl.). Ek.: *Epiph.* Gat. niżowy.

Thamniaceae

Thamnium alopecurum (Hedw.) Br. eur. — 1 stan. Na wilgotnym, częściowo zanurzone w wodzie kamieniu w potoku k. Górki (320). Podany również z Górki przez Mildego, 1857, 1869 i Schulzego, 1871 (okaz w zielniku). Ek.: *Am.* Gat. górski (reglowy).

Lembophyllaceae

Isothecium myurum Brid. — rzadki na Śl. i W., na dwóch podłożach. Śl.: na korze jaworu i głazach gabra na szczycie (710). W.: na głazach amfibolitu w zespole *Melico-Fagetum*: st. pn.-wsch. (380); wsch. (340); zach. (300, 250). Pod.: z zielnika, Sch., 1867, 1873, 1877 (Sob.); 1878 (szczyt Śl.); K., 1905 (na skałach, pn.-wsch. st. Śl. (600). Ek.: *Ep.* Gat. niżowy.

Isothecium myosuroides Brid. — podany z Sobótki przez Limprichta, 1873. Gat. wysokogórski.

Fontinalaceae

Fontinalis antipyretica Hedw. — mech potokowy, charakterystyczny dla pasa euhydrobiontów. Śl.: st. pn., (260). R.: st. pd. (340). Pospolity w Potoku Sulistrowickim (260-300). S.: st. wsch. (300). Powyżej Górki (220-240). Pod.: Md., 1860 (Dol. Sul.); z zielnika, Sch., 1877, 1878 (k. Sul., między Śl., a R.); K., 1886, 1913 (masyw Śl.). Ek.: *Ner.* Gat. niżowy.

Climaciaceae

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr — spotykany przeważnie na wilgotnych łąkach. Śl.: na b. wilgotnej ścieżce leśnej, st. pd.-zach. (320). R.: na łąkach w zespole *Molinietum medioeuropaeum* w rez. Ł.S. (320-340) oraz na pd. od Sul. (300). Sul.: w podmokłym rowie przy szosie (290); na mokrych łąkach na pd. od wsi (290) Sob.: na wilgotnej łące na pd.-zach. od osiedla (190). Pod.: Md., 1860 (Dol. Sul.) Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Leskeaceae

Leskeella nervosa Loeske (= *Leskea nervosa* Myrin) — w kilku różnych siedliskach. Śl.: na korze starych drzew, na murze kaplicy i na

szczycie góry (710); na korze zbutwiałego pniaka, st. pd.-zach. (660). Pod.: Md., 1869 (Sob.); z zielnika, Sch., 1873, 1878 (skały na szczycie Śl.); Lis., 1957 (mur kaplicy na szczycie Śl.). Ek.: *Ep.*, *Epiph.* Gat. ogólnogórski.

Thuidiaceae

Anomodon rugelii (C. Müll.) Kreisl. — 1 stan. Na korze jaworu na szczycie Śl. (710). Ze szczytu pod. przez Md., 1871 i Limpr., 1876 (skały). Ek.: *Epiph.* Gat. górski (reglowy).

Anomodon attenuatus Hüb. — rzadki na skałach i drzewach. Śl.: na korze drzew (jawor, wiąz) na szczycie (710). W.: na zacienionym głazie amfibolitu pod szczytem, st. pn. (400). Sc.: na suchych kamieniach w potoku wśród *Grimmia apocarpa* (230). Gór.: na korze dębu przy szlaku turystycznym (230). Ek.: *Ep.*, *Epiph.* Gat. niżowy.

Heterocladium heteropterum (Bruch.) Br. eur. — w b. małych ilościach na 2 stan. Śl.: na głazie gabra na szczycie (710). R.: na skale (serpentyt) w świetlistej dąbrowie pod szczytem (560). Pod.: Md., 1869 (pod szczytem Śl. (650); z zielnika, Sch., 1867 (skały na pn.-wsch. zb. Śl.). Ek.: *Ep.* Gat. górski (reglowy).

Thuidium delicatulum Mitt. — tylko w rez. Ł.S.: na zatorfionej łące w zbiorowisku ze zw. *Eriophorion latifolii* (310) oraz na łąkach trzęślicowych w zespole *Molinietum medioeuropaeum* (320-340). Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

Thuidium tamariscifolium (Hedw.) Lindb. — na rozproszonych stan. na ścieżce leśnej, st. pd.-zach. (380). R.: na zatorfieniu śródleśnym powyżej Tąpadeł (340). Na zabagnionych łąkach: na pn.-zach. od Słupic (260) i w pobliżu Strzegomian (260). Pod.: K., 1914 (podmokła łąka k. Strzegomian). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Thuidium tamariscifolium (Hedw.) Lindb. — na rozproszonych stan. Śl.: w lesie świerkowym niedaleko strumyka, st. pd. (500); jw. u podnóża góry (380); częsty w rozlewiskach: st. pd. (400); pn. (300); (260); pn.-zach. (250); na humusie wśród głazów granitowych w lesie świerkowym, st. pn. (280). R.: w runie boru mieszanego, st. pn. (360). W.: w lesie sosnowym razem z *Atrichum undulatum*, st. zach. (250) S.: w rozlewisku na zb. pd. (320); na brzegu strumyka, st. pn.-wsch. (260). Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

Thuidium abietinum Br. eur. (= *Abietinella abietina* C. Müll.) — 1 stan. Śl.: na mineralnej ziemi na głazie gabra w partii szczytowej, obok kaplicy (710). Ek.: *Ex.* Gat. niżowy.

Amblystegiaceae

Cratoneurum filicinum (Hedw.) Roth — rośnie głównie w potokach i na podmokłych łąkach w niższych położeniach. R.: st. pd.-zach. (360-380); masowo w zbiorowisku ze zw. *Caricion davallianae* w rez. Ł.S. (320-330); tu również w strumykach na kamieniach i na gliniastych ich brzegach

(300-340). W potokach: k. Słupic (280); Sul. (280); Sc. (220). Na łące turzycowej na pd.-wsch. od Sob. Pod.: Md.; 1857, 1869 i z zielnika, Sch., 1878 (Sc.). Ek.: *Am.*, *Hel.* Gat. niżowy.

Campylium stellatum (Hedw.) Lang. — 1 stan. R.: na zatorfionej łące wśród *Carex davalliana* w rez. Ł.S. (310). Pod.: Md., 1855, 1860 (Dol. Sul.). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Campylium polygamum (Bruch. et Schimp.) Bryhn. — jak gat. poprzedni, z którym rośnie. Na Śląsku rzadki: Bolesławiec, Leśnica, Miękinia, Strzegom, Syców, Wrocław (Limpr., 1876). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Hygroamblystegium irriguum Loeske (= *H. tenax* Jennings) — na 2 stan. Na zalewanych głazach w potokach: Sc. (230); k. Gór. (240) Pod.: Md., 1869 (Jaźwina). Ek.: *Am.* Gat. niżowy.

Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske — rzadki gat. epifityczny. Na buku w pobliżu Gór. (220) oraz na korze ściętego pniaka k. Sc. (210). Pod.: Md., 1855 (na drzewach w Gór.); Md., 1857, 1859 (Sob.); z zielnika, Sch., 1872, 1875 (Sob.); Md., 1869 (Jaźwina). Ek.: *Epiph.* Gat. górski (reglowy.)

Amblystegium serpens (Hedw.) Br. eur. — występuje przeważnie na murach: kaplicy na szczycie Śl. (710); baszty na szczycie W. (415) oraz w Gór. (220-240) i Sob. (180-200). Poza tym spotykany: na powalonej kłodzie. pd-zach. zb., Śl. (400); na kamiennym brzegu strumyka, pd. st. S. (240); w szczelinach skał amfibolitu pod szczytem G. (310). Ek.: *Ex.* Gat. niżowy.

Amblystegium juratzkanum Schimp. — dość częsty, gat. Rośnie na Ślęży (5 stan.), Raduni (3 stan.), Wieżycy (2 stan.), Gozdniczy (1 stan.) i u podnóża wzgórz (5 stan.). Pod.: z zielnika, K., 1878 (Sob.). Ek.: *Epiph.* Gat. niżowy.

Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. — 1 stan. Na gliniastym brzegu w Potoku Sulistrowickim na zach. od Sul. (290). Na Śląsku b. rzadki: Strzegom, Góry Kaczawskie, okolice Wrocławia (Limpr., 1876). Ek.: *Xg.* (?). Gat. niżowy.

Amblystegium riparium Br. eur. — 1 stan. Na zabagnionej łące wśród *Typha latifolia* na wsch. od Nasławic (150). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Acrocladium cuspidatum Lindb. — nierzadki, najczęściej na mokrych łąkach, wilgotnych rowach i ścieżkach leśnych. Ślęża — 4 stan., Radunia — 5 stan., Stolna — 1 stan. podnóże — 2 stan. Pod.: Md., 1860 (Dol. Sul.); z zielnika, Sch., 1878 (zbocza Śl.). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Lindb. — 1 stan. W rowie z wodą przy szosie w Sul. (280). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. — występuje w niewielu miejscach. Na skałach: w partii szczytowej Śl. (705) oraz na st. pd-zach. (660). Na zbutwiałym drewnie: st. zach. (650) oraz pd-zach. (660) na Śl.; pn.-wsch. zb. S. (280). Pod.: Md., 1855 (Śl.); Md., 1857 (Sob.). Ek.: *Epiph.* Gat. ogólnogórski.

Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst. — 2 stan. Na zatorfionych łąkach: w rez. Ł.S. (310) i powyżej Słupic (270). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Mnk. var. *polycarpus* (Bland.) Mnk. for. *gracilescens* Mnk. — 2 stan. Na łące turzycowej razem z *D. intermedius* w rez. Ł.S. (310) oraz na brzegu wilgotnej łąki na zach. od Sob. (200). Pod.: Md., 1860 (Dol. Sul.). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Drepanocladus capillifolius Warnst. — na jednym, lecz obfitym stan. W wodzie na bagnistej łące na pn.-wsch. od Sob. (180). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Brachytheciaceae

Homalothecium sericeum (Hedw.) Br. eur. — Śl.: na głazach gabra na szczycie k. wieży widokowej (718) i pod szczytem, st. pd. (690); na korze starych drzew i murze kaplicy (710); na korze murszejącego pnika, st. pd.-zach. (660). Na murach w Gór. (200) i Sob. (180). Pod.: Lis., 1957 (Śl.). Ek.: *Ep.*, *Epiph.* Gat. niżowy.

Camptothecium nitens Schimp. — rzadki na wilgotnych łąkach turzycowych: w rez. Ł.S. (310); na pn.-wsch. od Słupic (270); na pd. od Tapa-deł (260). Pod.: Md., 1857, 1860, (Sob.); z zielnika, K., 1913 (łąka powyżej Strzegomian). Ek.: *Hel.* Gat. niżowy.

Brachythecium geheebii Milde — 2 stan. Śl.: na głazach gabra: st. pn. (700) i niżej, w lesie mieszanym skąd podaje go również Lis., 1957. Jest to stan. na północnej granicy zasięgu tego rzadkiego gat. Pod.: Md.: 1871 (szczyt Śl.); Limpr., 1876, 1904 (głazy gabra na szczycie Śl.); z zielnika, Sch., 1872 (Sob.) Na Śląsku rzadki: Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Wałbrzyskie (gdzie został po raz pierwszy znaleziony i opisany przez Mildego w r. 1868 jako *Brachythecium laetum*), Kotlina Kłodzka (Limpr., 1876); Góry Kaczawskie: Miłek (Wilczyńska, mskr.), Góry Bialskie (Lis., 1959a). Ek.: *Ep.* Gat. ogólnogórski.

Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) Br. eur. — rozproszony na Ślęży (4 stan.), Raduni (3 stan.), Gozdniczy (2 stan.); Gozdniku (2 stan.). Rośnie najczęściej na zbutwiałym drewnie. Ek.: *Ep.*, *Epiph.* Gat. niżowy.

Brachythecium albicans (Hedw.) Br. eur. — spotykany przeważnie na suchych drogach i ścieżkach leśnych na Ślęży (7 stan.), Raduni (2 stan.), Wieżycy (1 stan.), Gozdniku (1 stan.) oraz na podnóżu (4 stan.). Ek.: *Lith.*, *Brch.* Gat. niżowy.

var. *julaceum* Warnst. — 2 stan. Gk.: na głazach pod szczytem (310). Na suchym głazie w potoku k. Sc. (230). Ek.: *Ep.*

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Br. eur. — b. pospolity, wielopodłożowy gat.; jako jedyny występuje we wszystkich wyróżnionych siedliskach; rośnie na wszystkich wzgórzach i wysokościach (44 stan.) Ek.: *Ep.*, *Epiph.*, *Chasm.*, *Ex.*, *Brch.* Gat. niżowy.

var. *turgescens* Limpr. — 2 stan. Na zatorfionych łąkach: w rez. Ł.S. (320) i na pd.-wsch. od Sob. (190). Ek.: *Hel*.

Brachythecium rivulare (Bruch.) Br. eur. — rzadki, Śl.: na głazach w potokach: st. pd. (410); pn.-zach., powyżej wsi Biała (200); w rozlewisku, st. pn.-zach. (250). R.: w potoku, st. pn. (380). Częsty w potokach k. Gór. (240). Na gliniastym brzegu potoku w Sc. (210). Sob.: w olszynie na pn.-wsch. od osiedla (180). Ek.: *Am*. Gat. ogólnogórski.

Brachythecium reflexum Br. eur. — na niewielu stan. Śl.: pospolity na humusie wśród głazów gabra w lesie liściastym razem z *Mnium spinosum* na szczycie góry obok kaplicy (710); na korze drzew w partii szczytowej (710); na korze zbutwiałego pniaka, st. pd.-zach. (660); na głazie gabra w lesie mieszanym, st. pn. (620). Pod.: Md., 1871 (Sob.); Lis., 1957 (pn. st. Śl.). Ek.: *Ep.*, *Epiph.*, *Brch*. Gat. górski (reglowy).

Brachythecium starkei Br. eur. — 1 stan. Śl.: na głazie gabra w lesie mieszanym, st. pn. (600). Pod.: Md., 1871 (Sob.); Limpr 1904 (Śl.). Ek.: *Ep*. Gat. niżowy.

Brachythecium velutinum (Hedw.) Br. eur. — gat. o szerokiej skali ekologicznej, pospolity na całym terenie (35 stan.). Rośnie w warstwie mszystej w lasach, na skałach, w szczelinach skalnych, skarpach i drogach leśnych, na pniach żywych drzew i zbutwiałym drewnie. Ek.: *Ep.*, *Epiph.*, *Chasm.*, *Brch*. Gat. niżowy.

Brachythecium plumosum (Hedw.) Br. eur. — zbierany przez Baumgarta, 1912, na wilgotnych głazach gabra na Ślęży (270), okaz w zielniku. Gat. ogólnogórski.

Brachythecium populeum (Hedw.) Br. eur. — nierzadki gat., występuje głównie na skałach i głazach; zdarza się również na spróchniałym drewnie i na murach (12 stan.). Pod.: z zielnika, Sch., 1877 (masyw Ślęży). Ek.: *Ep*. Gat. niżowy.

for. *subfalcatum* Mnk. — na suchym głazie serpentynitu w nieczynnym kamieniołomie na zb. Gk. w pobliżu wsi Przemiłów. Ek.: *Ep*.

Scleropodium purum Limpr. — dość częsty na drogach i brzegach lasów w niższych położeniach na Ślęży (2 stan.), Raduni (6 stan.), Stolnej (1 stan.), Gozdnicy (1 stan.) i koło Górki (3 stan.). Najwyższe stan.: w wilgotnym rowie na brzegu lasu, na pd.-zach. zboczu Ślęży. (500). Ek.: *Brch*. Gat. niżowy.

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout. — 3 stan. Śl.: na humusie na głazie gabra w otwartym miejscu na szczycie w pobliżu kaplicy (710). Gór.: w suchych zaroślach wśród traw na nasypie przy szosie (200); na wilgotnym brzegu pola przy tej samej szosie lecz bliżej Sob. (200). Ek.: *Brch*. Gat. niżowy.

Eurhynchium stokesii Br. eur. var. *gracilescens* Warnst. — częsty na ścieżkach i drogach leśnych (nie występuje tylko na Wieżycy). Ek.: *Brch*. Gat. niżowy.

Eurhynchium swartzii (Turn.) Warnst. — w masywie Ślęży nie wy-

stępuje często. Śl.: na brzegu lasu bukowego, st. pn. (400); na zacienniej drodze wśród lasu świerkowego, st. pn. (300). Na łące k. Uliczna (200). Strzegomiany: w olszynie na pn.-wsch. od wsi (200). Sporadycznie występuje na polach: Sul. (290); Przemiłów (230); Sc. (220); Sob. (220); Gór. (190). Pod.: Limpr., 1873 (bloki skalne na Śl.); Limpr., 1878 (Śl.); Limpr., 1895 (Sob.); z zielnika, Sch., 1872, 1877 (Gór.) Ek.: Brch. Gat. niżowy.

Eurhynchium schleicheri Lorentz (*E. swartzii* (Turn.) Warnst. var. *abbreviatum* Mnk.) — 1 stan. Gór.: trawiaste zbocze k. stawu (210). Na Śląsku rzadki: Myślibórz, pow. Jawor (Limpr., 1876), Góry Stołowe (Lis., 1959b). Ek.: Brch. Gat. niżowy.

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. — znaleziony przez Kerna, 1898, na zaciemionych blokach skalnych pod szczytem Ślęży (okaz w zielniku). Gat. niżowy.

Eurhynchium zetterstedtii Stoerm. — rzadki. Śl.: Na brzegu lasu świerkowego, st. pd. (450). S.: na korze zbutwiałego pniaka w borze mieszanym, st. wsch. (340). G.: na humusie wśród głazów amfibolitu pod szczytem (290) oraz w runie boru mieszanego na st. zach, gdzie jest pospolity (280). Ek.: Erch. Gat. niżowy.

Platyhypnidium rusciforme (Neck.) Flsch. — gat. potokowy, nieczęsty w masywie Ślęży; rośnie przeważnie z *Fontinalis antipyretica* na głazach zanurzonych lub spryskiwanych wodą. Śl.: st. pn.-zach. powyżej wsi Biała (230). R.: w Potoku Sulistrowickim u podnóża góry (300-320). W pobliżu Gór. (220). Pod.: Md., 1860 z zielnika, Sch., 1863, 1877, 1878 (Dol. Sul.); Limpr., 1873, 1876 (Sob.). Ek.: Ner., Am. Gat. niżowy.

Entodontaceae

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (= *Entodon schreberi* (Wild.) Mnk.) — pospolity gatunek leśny, znamienny składnik lasów iglastych, rzadziej mieszanych i liściastych (35 stan.). Pod.: Md., 1855 (Dol. Sul.); z zielnika, bez daty i autora (skały pod szczytem Ślęży). Ek.: Brch. Gat. niżowy.

Pterigynandrum filiforme Hedw. — rzadki gat. epifityczny. Śl.: w partii szczytowej (700-710). Gór.: na buku (220). Znaleziony też na głazach amfibolitu w lesie bukowym na zach. zb. W. (350). Pod.: Md., 1869 (Sob.); z zielnika, Sch., 1877 (szczyt Śl.). Ek.: Epiph. Gat. ogólnogórski.

Plagiotheciaceae

Plagiothecium undulatum Br. eur. — 2 stan. R.: w lasach świerkowych — pod szczytem, st. pn. (540) i niżej, liczne stan! (400) Pod.: Md., 1857 (R.); Md., 1869 (Sob.); z zielnika, Ue., bez daty (masyw Śl.) Ek.: Brch. Gat. górski (reglowy).

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Br. eur. — niezbyt rzadki lecz rozproszony na Ślęży (5 stan.), Raduni (6 stan.), Wieżycy (1 stan.), Stolnej (1 stan.), Gozdnicy (1 stan.). Spotykany najczęściej w lasach liściastych, szczególnie w świetlistej dąbrowie pod szczytem Raduni. Pod.: z zielnika, Sch., 1873 (Sob.); K., 1905 (k.Sc.); Md., bez daty (Sob.). Ek.: Brch. Gat. niżowy.

Plagiothecium curvifolium Schlieph. — częsty w lasach: w runie mszystym, na drogach i ścieżkach, skarpach, zbutwiałym drewnie, pniach żywych drzew oraz na humusie wśród skał i głazów. Rośnie na wszystkich wzgórzach z wyjątkiem Gozdnika (26 stan.); nie występuje również u podnóża wzgórz. Pod.: Lis., 1957 (na humusie między skałami serpentynitu na szczycie Raduni (570)). Ek.: *Epiph. Chasm., Ex., Brch.* Gat. niżowy.

Plagiothecium laetum Br. eur. — rozmieszczony podobnie jak gat. poprzedni; częsty też na skałach; nie występuje w Górach Oleszeńskich (27 stan.). Pod.: Lis., 1957, głazy gabra w lesie świerkowym na zach. zb. Ślęży (520). Ek.: *Ep., Epiph., Chasm., Ex., Brch.* Gat. niżowy.

Plagiothecium platyphyllum Mnk. — częsty zwłaszcza na glebie skalnej w cienistych lasach i na wilgotnych skarpach przy drogach leśnych (20 stan.). Ek.: *Chasm., Brch.* Gat. niżowy.

Plagiothecium roeseanum Br. eur. — 1 stan. W.: na ziemi w lesie bukowym, st. wsch. (340). Pod.: Md., 1869 (Jaźwina); Limpr., 1876 (Śl.). Ek.: Brch. Gat. niżowy.

Isopterygium elegans (Hook.) Lindb. — na kilku niezbyt licznych stan. Śl.: w szczelinach skalnych, kilkanaście metrów poniżej szczytu (705); na zacienionych skałach gabra pod szczytem zach. (600); na suchych głazach granitowych, st. pn. (400). S.: na głazach amfibolitu pokrytych humusem, st. pn. (300). Gór.: na gliniastej skarpie w pobliżu stawu (210). Ek.: *Ep.* Gat. górski (reglowy).

var. *nanum* (Jur.) Möller — na jednym, lecz obfitym stan. G.: na wilgotnych, zacienionych skałach amfibolitu pod szczytem (316). Ze Śląska podawany: Bolesławiec, Lwówek, Karkonosze (Limpr., 1876, Limpr., 1904), a z terenu Polski poza wymienionymi stan. nie znany (Szafr., 1961). Ek.: *Ep. Dolichotheca silesiaca* Flsch. (= *D. seligeri* (Brid.) Loeske) — najczęstszy gat. epiksyliczny; porasta pniaki w ostatnim stadium butwienia gdzie tworzy zbiorowisko *Pohlia nutans-Dolichotheca silesiaca*. W masywie Ślęży rośnie wyłącznie na próchniejącym drewnie. Rozproszony na wszystkich wzgórzach z wyjątkiem Gozdnika gdzie nie występuje (11 stan.). Pod.: Md., 1869 (Jaźwina). Ek.: *Epiph.* Gat. niżowy.

Hypnaceae

Platygyrium repens Br. eur. — występuje rzadko na korze żywych, czasami spróchniałych pni. Śl.: na korze *Acer platanoides* na szczycie

(710); na korze spróchniałej kłody pod szczytem, st, pd. (700) R.: na szyi korzeniowej dębu, st. pd.-zach. (560); na korze przydrożnego dębu, st. pd.-zach. (300). Gór.: na korze spróchniałego pniaka (220). Ek.: *Epiph.* Gat. niżowy.

Pylaisia polyantha (Hedw.) Br. eur. — podany z „drogi sulistrowickiej” na szczyt Ślęży przez Kerna, 1905 i Mildego, bez daty (okazy w zielniku). Gat. niżowy.

Hypnum cupressiforme Hedw. — najpospolitszy mech na badanym terenie, spotykany najczęściej na podłożu skalnym (68 stan.). Pod.: z zielnika, Sch., 1866 (Sob.), 1877 (szczyt Śl.); mur w Strz. Ek.: *Ep.*, *Epiph.*, *Chasm.*, *Brch.*, Gat. niżowy.

var. *filiforme* Brid. — rozproszony na korze żywych drzew. Śl.: na korze jaworu i wiązu na szczycie (710). R.: u nasady pnia dębu pod szczytem (570). W.: jw. pd.-zach. (400). S.: jw. st. pd.-wsch. (280). G.: w dolnej części pnia wiązu kilka metrów od szczytu, st. wsch. (310) oraz dębu, st. pd. (300). Gór.: liczne stan. na korze dębu (320). Ek.: *Epiph.*

var. *lacunosum* Brid. — 3 stan. R.: na brzegu boru sosnowego w pobliżu rez. Ł.S. (310). G.: na skarpie przydrożnej przy szlaku turystycznym w pobliżu Schroniska Dolnego na st. pd.-wsch. (260). Gk.: w szczelinie skalnej powyżej Przemysłowa (260). Ek.: *Brch.*

var. *lacunosum* for. *pinetorum* Loeske — gdziekolwiek w lasach iglastych. Śl.: na humusie wśród głazów gabra w lesie świerkowym, st. zach. (600); na brzegu lasu świerkowego, st. pd. (380). R.: na ziemi w borze sosnowym w pobliżu rez. Ł.S. (300). W.: w runie lasu sosnowego, st. pd. (370). Ek.: *Brch.*

var. *uncinatum* Br. eur. — 3 stan. Śl.: na głazie gabra, st. pn.-zach. (660). R.: na ziemi w borze mieszanym, st. pn. (420). Gór.: na ścieżce leśnej (240). Ek.: *Brch.*

Hypnum ericetorum Loeske — rozproszony zwłaszcza na płytkiej glebie naskalnej. Śl.: na humusie wśród zacienionych głazów gabra, st. zach. (620); na suchych głazach granitowych w lesie świerkowym st. pd. (400). W.: wśród głazów amfibolitu w świetlistej dąbrowie, st. pd.-zach. (380); w runie lasu sosnowego, st. pn. (370). S.: na próchniejącym pniaku, st. pd.-zach. (340) i korzeniu sosny st. pd. (320). G.: na humusie wśród głazów pod szczytem (316). Strz. na suchym zb. w starym kamieniołomie (180). Pod.: Lis., 1957 (w lesie sosnowym) na W. (320). Ek.: *Ex.* Gat. niżowy.

Hypnum arcuatum Lindb. — dość rzadki, w masywie Ślęży rośnie na wilgotnych drogach leśnych lub w rowach, w niższych położeniach. Śl.: st. pd.-zach. (380, 320); pn.-zach. (300-310); pn. (300). S.: wśród lasu świerkowego, st. pdn. (320); u podnóża góry, st. pd. (300). Pod.: z zielnika, K., 1906 (Gór.) Ek.: *Hel.* Gat. ogólnogórski.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. — 1 stan. Śl.: nielicznie w lesie świerkowym w partii szczytowej (710). Pod.: Md., 1857, 1869 (Sob.). Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. — b. rzadki, znaleziono tylko kilka gałązek wśród innych gat. na 1 stan. R.: w szczelinie skał serpentynitowych pod szczytem, st. zach. (570). Pod.: z zielnika, K., 1910 (las powyżej Sul.). Ek.: *Chasm.* Gat. ogólnogórski.

Rhytidiaceae

Loeskeobryum brevirostre (Schwaegr.) Flsch. (= *Hylocomium brevirostre* Br. eur.) — pod.: Limpr., 1873 (skały gabra na Śl.); 1876, 1905 (Sob.); z zielnika, Sch., 1872 (masyw Ślęży). Na Śląsku rzadki: Góry Kaczawskie (Lis., 1956b), Góry Wałbrzyskie (Książ), Śnieżnik Kłodzki (Limpr., 1876). Gat. górski (reglowy).

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. — 1 stan. Śl.: na suchej polanie zboczowej, st. zach. (420). Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. — w miejscach trawia-
stych na kilku b. licznych stan. R.: na łąkach trzęślicowych w rez. Ł.S.
(300-340); na łące śródleśnej powyżej rez., st. pd. wsch. (380). G.: na
pastwisku poniżej Schroniska Dolnego (260); na łące u podnóża góry,
st. pn. (200). Na suchych łąkach w pobliżu Uliczna (200). Ek.: *Brch.* Gat.
niżowy.

Hylocomiaceae

Hylocomium splendens (Hedw.) Br. eur. — na badanym terenie wy-
stępuje rzadko. Śl.: w borze mieszanym, st. pn. (320). R.: na łąkach
trzęślicowych wśród młodego lasu sosnowego oraz w lesie w rez. Ł.S.
(310-340). Gór.: na trawiastym zboczu przy szosie w pobliżu wsi (200).
Pod.: z zielnika, Sch., 1886, Ue., bez daty, (Sob.). Ek.: *Brch.* Gat. niżowy.

2. ANALIZA SIEDLISKOWA

Wymienione w „Wykazie systematycznym” taksony zebrano w na-
stępujących siedliskach: skały, szczeliny skalne, skały pokryte glebą, la-
sy (na ziemi), żywe drzewa, zbutwiałe drewno, rozlewiska, drogi i ścież-
ki leśne, skarpy, wilgotne rowy, potoki, łąki, murawy kserotermiczne,
pola, mury.

Analizując występowanie mchów w poszczególnych grupach siedli-
skowych (tab. 6) podkreślić należy bardzo dużą rolę form naskalnych
(62). Wynika to ze zróżnicowania warunków ekologicznych skał jak: od-
mienna ekspozycja, różne oświetlenie, wilgotność, obecność podłoża skal-
nego na różnych wysokościach, zwłaszcza w szczytowych partiach wzgórz
itp. Wśród mchów naskalnych wymienić należy epility obligatoryczne,

jak np. *Andreaea petrophila*, gatunki z rodzaju *Grimmia*, *Hedwigia albicans*.

W szczelinach skalnych spotkano 29 gatunków i odmian mchów, z których zdecydowaną większość stanowią gatunki o szerokiej skali

Tabela 6 — Table 6

Występowanie mchów w wyróżnionych siedliskach
Occurrence of mosses in the habitats distinguished

Siedliska Habitats	Liczba taksonów Number of taxa	Liczba taksonów występujących: Number of taxa occurring:			Ogólna liczba stanowisk Total number of localities
		wyłącznie w tym siedlisku exclusively in this habitat	na jednym stanowisku in one locality	na większej ilości stan. in more than one locality	
Skąły Rocks	62	21	6	15	264
Szczeliny skalne Rock fissures	29	3	2	1	52
Skąły pokryte glebą Rocks covered with soil	28	1	1	—	90
Mury Walls	23	1	1	—	61
Żywe drzewa Living trees	29	8	5	3	64
Zbutwiałe drewno Rotten wood	33	1	—	1	105
Lasy (na ziemi) Forests (ground layer)	51	10	6	4	198
Łąki Meadows	40	9	4	5	81
Murawy kserotermiczne Xerothermic grassland	21	4	3	1	31
Potoki Streams	31	9	5	4	59
Rozlewiska Flood waters	21	—	—	—	38
Wilgotne rowy Wet fosses	14	3	2	1	18
Drogi i ścieżki leśne Wood roads and paths	32	1	—	1	115
Skarpy Escarps	36	3	2	1	143
Pola Fields	16	2	—	2	39

ekologicznej; najbardziej typowymi mchami szczelin skalnych w masywie Ślęży są: *Fissidens cristatus* i *Rhabdoweisia fugax*.

Płytkie gleby naskalne należy traktować jako siedlisko przejściowe między naskalnym, a naziemnym. Dużą liczbę rosnących tu mchów spotyka się na ziemi w lasach jak również na skałach. Najpospolitsze w tym siedlisku to: *Dicranum scoparium*, *Plagiothecium platyphyllum*, *Polytrichum attenuatum* i *P. decipiens*.

Zbliżone siedlisko reprezentują stare mury (domy, baszty, kamienne ogrodzenia itp.), na których najliczniej występują: *Tortula muralis*, *Ceratodon purpureus*, *Amblystegium serpens* i *Bryum argenteum*.

Bardzo słabo wykształcona jest brioflora epifityczna. Do obligatorycznych epifitów w masywie Ślęży należą: *Amblystegiella subtilis*, *Orthotrichum affine*, *O. striatum*, zaś przywiązane tylko do tego podłoża są: *Hypnum cupressiforme* var. *filiforme* i *Neckera complanata*.

Znaczna stosunkowo liczba gatunków właściwych jest dla zbutwiałego drewna (33). W tym siedlisku bardzo dużą rolę spełniają: *Pohlia nutans*, *Ceratodon purpureus*, *Hypnum cupressiforme* oraz, spotykany wyłącznie na spróchniałych pniakach, *Dolichotheca silesiaca*.

W zbiorowiskach leśnych badanego terenu mchy naziemne nie odgrywają większej roli. Należy tu 51 taksonów, co w porównaniu z powierzchnią zajęta przez lasy jest liczbą bardzo małą, świadczącą o zniszczeniu tych zbiorowisk. Najczęstszymi gatunkami leśnymi są: *Polytrichum attenuatum*, *Leucobryum glaucum*, *Pleurozium schreberi* i in.: wyłącznie w tym zbiorowisku znaleziono 10 gatunków (np. *Plagiothecium undulatum*, *Mnium spinosum*, *M. spinulosum*).

Na uwagę zasługuje dość liczna grupa mchów zebranych ze zbiorowisk łąkowych (40 gat.), które zajmują w masywie Ślęży nieznaczną powierzchnię.

Murawy kserotermiczne nie posiadają bogatej flory mchów, a większość gatunków rośnie na pojedynczych stanowiskach. Do częstszych należą tu: *Polytrichum piliferum*, *Brachythecium rutabulum*, *Ceratodon purpureus*, zaś *Rhacomitrium canescens* występuje wyłącznie w tym siedlisku.

Mchy potoków skupiają 31 taksonów, z których przewagę osiągają formy znalezione na brzegach potoków (23); mniejszą, lecz bardziej jednolitą grupę tworzą mchy porastające głązy w potokach (11).

W rozlewiskach dominują przede wszystkim torfowce — *Sphagnum* sp. div. oraz *Mnium undulatum* i *Thuidium tamariscifolium*.

Na drogach i ścieżkach leśnych zebrano 32 formy; przeważnie są to mchy wszędobylskie, jedynie *Pogonatum aloides* rośnie tylko w tym zbiorowisku.

Na skarpach towarzyszących najczęściej drogom leśnym znaleziono 36 taksonów, wśród których duży udział mają gatunki leśne.

Niewielkie ilości mchów spotykano na polach (16) i w wilgotnych

Tabela 7 — Table 7

Występowanie mchów na czterech rodzajach podłoża

Occurence of mosses on four kinds of substratum

Podłoża Substrata	Liczba taksonów Number of taxa		Liczba taksonów występujących na: Number of taxa occurring on:	
	Ogółem Total	Wy- łącznie Exclu- sively		
Skąły Rocks	85	39	jednym podłożu one substratum only	121
Ziemia Soil	115	73		
Żywe drzewa Living trees	29	8		
Zbutwiałe drewno Rotten wood	33	1		
Skąły + ziemia Rocks + soil	35	18	2 podłoża substrata	36
Skąły + żywe drzewa Rocks + living trees	20	7		
Skąły + zbutwiałe drewno Rocks + rotten wood	21	2		
Ziemia + żywe drzewa Soil + living trees	11	—		
Ziemia + zbutwiałe drewno Soil + rotten wood	24	7		
Żywe drzewa + zbutwiałe drewno Living trees + rotten wood	15	2		
Skąły + ziemia + żywe drzewa Rocks + soil + living trees	11	—	3 podłoża substrata	8
Skąły + ziemia + zbutwiałe drewno Rocks + soil + rotten wood	17	6		
Skąły + żywe drzewa + zbutwiałe drewno Rocks + living trees + rotten wood	13	2		
Ziemia + żywe drzewa + zbutw. drewno Soil + living trees + rotten wood	11	—		
Skąły + ziemia + żywe drzewa + zbutwiałe drewno Rocks + soil + living trees + rotten wood	11	11		

rowach przydrożnych (14); z tym ostatnim siedliskiem związane są: *Calliergon cordifolium*, *Polytrichum commune*.

Gatunkami najbardziej rozpowszechnionymi w wielu siedliskach są: *Brachythecium rutabulum* (15 siedlisk), *Hypnum cupressiforme* (11) i *Brachythecium velutinum* (10).

Badane siedliska reprezentują 4 rodzaje podłoża, a mianowicie: skały, ziemia, kora żywych drzew i zbutwiałe drewno. Do gatunków poli-edaficznych należy 11 mchów (tab. 7).

Podział briocenologiczny Gamsa

Na podstawie pracy Gamsa „Bryo-cenology” (Moos-Societies), 1932 wydzielono w brioflorze badanego terenu 10 typów ekologicznych: *Epipetria*, *Epiphytia*, *Bryochamaephytia*, *Chasmophytia*, *Exochomophytia*, *Xerogeophytia*, *Lithophytia*, *Amphinereidia*, *Nereidia* i *Helophytia*.

Tabela 8 — Table 8

Typy briocenologiczne Gamsa
Types of bryocenoses of Gams

Typ briocenologiczny Type of bryocenoses	Ogólna liczba taksonów Total number of taxa	Należące do: Belonging to:	
		jednego one	wielu numerous
		typów ekologicznych ecological types	
<i>Epipetria</i>	51	33	18
<i>Bryochamaephytia</i>	47	34	13
<i>Helophytia</i>	31	30	1
<i>Epiphytia</i>	31	15	16
<i>Xerogeophytia</i>	21	17	4
<i>Exochomophytia</i>	16	8	8
<i>Chasmophytia</i>	14	4	10
<i>Lithophytia</i>	6	3	3
<i>Amphinereidia</i>	5	3	2
<i>Nereidia</i>	2	1	1

Typy: *Epipetria*, *Epiphytia*, *Nereidia* i *Amphinereidia* tworzą razem kompleksowy typ ekologiczny *Adnata* obejmujący mchy związane z twardym podłożem; należą tu 73 taksony; do *Radicantia* składającego się z pozostałych typów, związanych z glebą, wchodzi 116 taksonów.

Najliczniejszym z typów ekologicznych okazał się typ *Epipetria*, który obejmuje gatunki rosnące na skałach i głazach. Z 51 form zaliczonych do tej grupy, 33 występuje wyłącznie w typie *Epipetria*, a 18 pozostałych wchodzi również w skład innych typów, z którymi *Epipetria* tworzy liczne przejścia (tab. 9).

Do typu *Bryochamaephytia* (s.s.) należą mchy występujące w mniej lub bardziej zwartych zbiorowiskach roślin wyższych; na badanym terenie są to lasy, łąki, murawy kserotermiczne, ścieżki leśne, brzegi lasów itp. Ta grupa mchów liczy 47 taksonów. Za najbardziej typowe briochamefity uznać trzeba: *Buxbaumia aphylla*, *Dicranum spurium*, *D. undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Leucobryum glaucum* i *Pleurozium schreberi*.

Helophytia, określane przez Gamsa jako formy rosnące na glebach bardzo wilgotnych albo okresowo zalewanych, mogące tworzyć torf, w masywie Ślęży zajmują następujące siedliska: wilgotne łąki trzęślicowe, mokre łąki turzycowe, rowy z wodą, zabagnienia, częściowo też brzegi potoków. Stanowią one b. odrębną grupę, na co wskazuje ich słabe powiązania z innymi typami. Z 31 taksonów tylko *Cratoneurum filicinum* włączono, poza *Helophytia*, do *Amphinereidia*; pozostałe należą tylko do *Helophytia*, z których wymienić można: *Aulacomnium palustre*, *Polytrichum gracile*, *P. commune*, *P. strictum*, *Philonotis calcarea*, *Sphagnum* sp. div.

W przeciwieństwie do opisanego, typ *Epiphytia*, do którego zaliczono gatunki żywych drzew i próchniejącego drewna jest mniej jednolity, posiada w swoim składzie wiele obcych form i w związku z tym jest mało reprezentatywny.

W skład *Xerogeophytia* wchodzi mchy roczne i dwuletnie. Występują one w takich siedliskach jak: brzegi strumyków, rowów, gliniaste skarpy przydrożne oraz miejsca przekształcone przez człowieka, pokryte roślinnością synantropijną, a więc: drogi, ścieżki leśne, pola, ugory itp. Najwięcej mchów z tej grupy znaleziono na polach (np. *Dicranella subulata*, *Ditrichum tenuifolium*, *Phascum acaulon*) oraz na wilgotnych, gliniastych brzegach strumyków (np. *Barbula unguiculata*, *Dicranella schreberi*, *Pleuridium subulatum*).

Exochomophytia reprezentują grupę mchów na płytkich glebach naskalnych (*Polytrichum decipiens*, *Thuidium abietinum*), starych murach (*Distichium capillaceum*) oraz ekskrementach zwierząt złożonych wśród skał. Najbardziej typowym jest tu nitrofilny *Tetraplodon angustatus*.

Chasmophytia, czyli mchy rosnące w szczelinach skalnych, mają wiele powiązań z *Epipetria* i *Bryochamaephytia*. W związku z tym cały ten typ należy uważać jako przejściowy między wymienionymi. Na 14 gatunków zaliczonych do *Chasmophytia* tylko 4 ograniczone są wyłącznie do szczelin skalnych.

Do *Lithophytia* należą formy spotykane w miejscach otwartych na podłożu mineralnym. W masywie Ślęży są to najczęściej: suche, nieosłonięte skały oraz strome ścianki i zbocza nieczynnych kamieniołomów, z charakterystycznymi gatunkami: *Bryum caespiticium* var. *kunzei*, *Polytrichum piliferum* i *Rhacomitrium canescens*.

Typ *Amphinereidia* tj. grupa mchów okresowo zanurzonych w wo-

T a b e l a 9 - T a b l e 9
 Gatunki należące do kilku typów briocenoekologicznych Gamse
 The species belonging to several bryocenoecological types of Gamse.

Typ briocenoekologiczny Bryocenoecological type		Epiphetria	Epiphytia	Bryochamaeaphytia	Chasomophytia	Xerochomophytia	Xerogeoaphytia	Lithophytia	Amphimeretidia	Kereldia	Holophytia	Grupy przejściowe pomiędzy: Groups transitional between:
Gatunek moss Species of moss		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Isomodon attenuatus</i>		+	+									Epiphetria - Epiphytia
<i>Brachythecium salebrosum</i>		+	+									
<i>Dicranodontium denudatum</i>		+	+									Epiphetria - Bryochamaeaphytia Epiphetria - Chasomophytia Bryochamaeaphytia - Lithophytia Amphimeretidia - Kereldia
<i>Hemalothecium sericeum</i>		+	+									
<i>Leskeella nervosa</i>		+	+									Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia - Xerogeoaphytia Xerochomophytia - Lithophytia Epiphetria-Epiphytia-Bryochamaeaphytia-Xerochomophytia Epiphetria - Epiphytia -
<i>Orthodicranum montanum</i>		+	+									
<i>Orthotrichum diaphanum</i>		+	+									Epiphetria - Bryochamaeaphytia Epiphetria - Chasomophytia Bryochamaeaphytia - Chasomophytia Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia Epiphetria - Bryoch. - Chasom. - Xer. Epiphetria - Bryoch. - Chasom. - Xer. - Lith.
<i>Malum punctatum</i>		+	+									
<i>Bryum capillare</i>		+	+									Epiphetria - Bryochamaeaphytia Epiphetria - Chasomophytia Bryochamaeaphytia - Chasomophytia Bryochamaeaphytia - Lithophytia Amphimeretidia - Kereldia
<i>Rhabdoweisia fugax</i>		+	+									
<i>Plagiothecium platyphyllum</i>		+	+									Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia - Xerogeoaphytia Xerochomophytia - Lithophytia Epiphetria-Epiphytia-Bryochamaeaphytia-Xerochomophytia Epiphetria - Epiphytia -
<i>Brachythecium albicans</i>		+	+									
<i>Platyphnidium rusciforme</i>		+	+									Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia - Xerogeoaphytia Xerochomophytia - Lithophytia Epiphetria-Epiphytia-Bryochamaeaphytia-Xerochomophytia Epiphetria - Epiphytia -
<i>Cratoneurum filicinum</i>		+	+									
<i>Brachythecium reflexum</i>		+	+									Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia - Xerogeoaphytia Xerochomophytia - Lithophytia Epiphetria-Epiphytia-Bryochamaeaphytia-Xerochomophytia Epiphetria - Epiphytia -
<i>Dicranella heteromalla</i>		+	+									
<i>Bryum argenteum</i>		+	+									Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia - Xerogeoaphytia Xerochomophytia - Lithophytia Epiphetria-Epiphytia-Bryochamaeaphytia-Xerochomophytia Epiphetria - Epiphytia -
<i>Dicranum scoparium</i>		+	+									
<i>Brachythecium velutinum</i>		+	+									Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia - Xerogeoaphytia Xerochomophytia - Lithophytia Epiphetria-Epiphytia-Bryochamaeaphytia-Xerochomophytia Epiphetria - Epiphytia -
<i>Hypnum cupressiforme</i>		+	+									
<i>Plagiothecium curvicolium</i>		+	+									Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia - Xerogeoaphytia Xerochomophytia - Lithophytia Epiphetria-Epiphytia-Bryochamaeaphytia-Xerochomophytia Epiphetria - Epiphytia -
<i>Plagiothecium laetum</i>		+	+									
<i>Brachythecium rutabulum</i>		+	+									Epiphetria - Epiphytia - Bryochamaeaphytia Bryochamaeaphytia - Xerochomophytia - Xerogeoaphytia Xerochomophytia - Lithophytia Epiphetria-Epiphytia-Bryochamaeaphytia-Xerochomophytia Epiphetria - Epiphytia -
<i>Pohlia nutans</i>		+	+									
<i>Ceratodon purpureus</i>		+	+									Xer. - Lith.
		12	16	13	10	8	4	3	2	1	1	

dzie lub rosnących na spryskiwanych gładziach w potokach jest tu słabo reprezentowana przez *Hygroamblystegium irriguum* i *Thamnium alopecurum*.

Do *Nereidia* — zbiorowisk pokrywających kamienie stale zanurzone w wodzie potoków — wchodzi tylko dwa gatunki: *Platyhypnidium rusticiforme* i *Fontinalis antipyretica*.

Minimalna liczba mchów w ostatnich dwóch typach jest wynikiem bardzo słabego wykształcenia zbiorowisk potokowych na badanym terenie.

Najmniej jednolitymi typami ekologicznymi, w których spotyka się największy procent mchów z innych grup, są: *Chasmophytia*, *Exochomophytia* oraz *Epiphytia*, natomiast *Helaphytia* i *Xerogeophytia* wykazują największą odrębność (tab. 9).

Wszędobylskimi gatunkami w masywie Ślęży, występującymi w wielu typach briocenologicznych, są: *Ceratodon purpureus* (7 typów), *Pohlia nutans* (6), *Brachythecium rutabulum* i *Plagiothecium laetum* (5). Wskazuje to na bardzo szeroką skalę ekologiczną wymienionych gatunków.

Zależność występowania mchów od odczynu podłoża

W zależności od odczynu podłoża mchy badanego terenu różnicują się na trzy grupy: 1) związane z podłożem kwaśnym (*acidophilae*), w szczególności krzemianolubne (*calcifugae*); 2) związane z podłożem zasadowym (*basiphilae*) z dużą przewagą gatunków wapieniolubnych (*calciphilae*) oraz 3) nie posiadające wartości wskaźnikowej (*indiferentes*) ze względu na szeroką skalę odczynu podłoża, na którym występują.

Charakter skał badanego terenu i typ gleb sprawiają, że prawie połowa mchów to gatunki kwasolubne. Grupa ta reprezentowana jest przez formy naskalne (np. *Grimmia mühlenbeckii*, *Rhabdoweisia fugax*) oraz leśne (*Buxbaumia aphylla*, *Hylocomium splendens*, *Plagiothecium undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Pitlum crista castreensis*). Część mchów acidofilnych znaleziono na łąkach i w rozlewiskach (*Aulacomnium palustre*, *Sphagnum* sp. div.), niektóre na drogach leśnych (*Eurhynchium Stokesii* ar. *gracilescens*), zbutwiałym drewnie (*Aulacomnium androgynum*), w wilgotnych rowach (*Polytrichum commune*) i na skarpach (*Bartramia pomiformis*).

Wśród charakterystycznych gatunków krzemianolubnych również przeważają epity (*Andreaea petrophila*, *Grimmia trichophylla*, *Hedwigia albicans*, *Heterocladium heteropterum*, *Paraleucobryum longifolium*, *Rhacomitrium lanuginosum* i *Rh. ramulosum*), pozostałe rosną w lasach i na skarpach (*Dicranum spurium*, *Polytrichum attenuatum*, *Diphyscium sessile*, *Mnium hornum*), na suchych zboczach (*Polytrichum juniperinum*, *P. piliferum*, *Rhacomitrium canescens*), zbutwiałym drewnie (*Georgia pellucida*), wilgotnych łąkach i drogach (*Polytrichum gracile*) i polach (*Ditrichum tenuifolium*).

T a b e l a 10 - T a b l e 10

Występowanie niektórych gatunków bazofilnych i acidofilnych na różnych rodzajach skał
Occurrence of some basiphilous and acidophilous species on various kinds of rocks

G a t u n k i Species of mosses	występujące na skałach: reaction of the rocks:			U w a g i Remarks
	kwaśnych acid	obojętnych neutral	zasadowych basio	
1. <i>Orthotrichum diaphanum</i>	granit	gabro		basiphilae
2. <i>Encalypta contorta</i>		"		"
3. <i>Erythrophyllum rubellum</i>		"		"
4. <i>Homalothecium sericeum</i>		gabro, amfibolit		acidophilae
5. <i>Dicranodontium denudatum</i>		" "		"
6. <i>Isoetecium myurum</i>		" "		"
7. <i>Dicranoweisia cirrata</i>		amfibolit		"
8. <i>Pterigynandrum filiforme</i>		" "		"
9. <i>Aulacomnium androgynum</i>			serpentyt	"
10. <i>Andreaea petrophila</i>	granit	gabro, amfibolit		"
11. <i>Polytrichum piliferum</i>	"	" "		"
12. <i>Racomitrium heterostichum</i>	"	" "		"
13. <i>Antitrichia curtipendula</i>		gabro	serpentyt	"
14. <i>Heterocladium heteropterum</i>		"	"	"
15. <i>Orthodicranum montanum</i>		"	"	"
16. <i>Syntrichia ruralis</i>		"	"	"
17. <i>Grimmia hartmanii</i>	granit	gabro, amfibolit	"	"
18. <i>Hedwigia albicans</i>	"	" "	"	"
19. <i>Paraleucobryum longifolium</i>	"	" "	"	"
20. <i>Plagiothecium laetum</i>	"	" "	"	"
21. <i>Pohlia nutans</i>	"	" "	"	"

ad 1-4 gatunki uważane za bazofilne
regarded as basiphilous species

ad 5-16 gatunki uważane za acidofilne
regarded as acidophilous species

ad 17-21 gatunki nie posiadające żadnej wartości wskaźnikowej
the species of no indicating value

mają szerszą skalę ekologiczną
having greater ecological range of tolerance

W grupie briofitów zasadolubnych liczne są mchy związane z reguły z podłożem wapiennym. Porastają one głównie skały lub ich szczeliny (*Ctenidium molluscum*, *Encalypta contorta*, *Erythrophyllum rubellum*, *Fissidens cristatus*, *Homalothecium sericeum*, *Syntrichia ruralis*). Poza skałami gatunki należące do tej grupy spotkano jeszcze: na humusie naskalnym (*Thuidium abietinum*), na zatorfionych łąkach (*Bryum ventricosum*, *Cratoneurum filicinum*, *Drepanocladus intermedius*), na brzegach strumyków i w wilgotnych rowach (*Bryum ventricosum*, *Cratoneurum filicinum*, *Mniobryum albicans*, *Philonotis calcarea*), na głazach leżących w potokach (*Thamnium alopecurum*), trawiastych zboczach (*Eurhynchium schleicheri*), murach (*Distichium capillaceum*, *Homalothecium sericeum*, *Syntrichia ruralis*) i żywych drzewach (*Neckera complanata*).

W skład gatunków obojętnych wchodzi najczęściej epifity (przeważnie obligatoryczne) oraz niektóre mchy wielopodłożowe (np. *Brachythecium* sp. div., *Ceratodon purpureus*).

Skały masywu Ślęży zawierają niewielką ilość wapnia i dlatego zastanawiające jest występowanie dość licznych gatunków kalcofilnych, tym bardziej, że na tym samym podłożu rośnie szereg mchów unikających siedlisk wapiennych, przywiązanych do skał krzemianowych np. *Hedwigia albicans* lub nawet typowy kalcifug — *Racomitrium lanuginosum*. Dla wyjaśnienia tego zjawiska zbadano pehametrem glebowym

Helliga pH humusu pod wybranymi rodzajami skał. Stwierdzono, że w przeważającej większości humus ma odczyn kwaśny, jedynie pod mchami bazofilnymi, w tym klicofilnymi, niezależnie od typu skały, pH jest większe od 7. Widocznie istnieją dodatkowe czynniki (rodzaj ściółki, wpływ gatunków) modyfikujące odczyn humusu, zaś typ skały nie ma tu decydującego znaczenia.

W zależności od rodzaju skał mchy ślązańskie podzielić można na cztery grupy:

1) żyjące na wszystkich typach skał, większość tworzą tu gatunki acidofilne,

2) występujące na skałach kwaśnych i obojętnych gdzie dominują również mchy acidofilne,

3) rosnące tylko na skałach obojętnych; z przewagą gatunków kwasolubnych; spotyka się w tej grupie też formy bazofilne,

4) znalezione na podłożu obojętnym i zasadowym; mało jest tu mchów właściwych skałom zasadowym, najwięcej zaś obojętnych.

3. ROZMIESZCZENIE POZIOME

Spośród siedmiu jednostek geomorfologicznych, na jakie podzielono badany masyw, najwięcej mchów występuje na Ślęży (tab. 11). Góra ta dominuje wyraźnie nad innymi również pod względem atrakcyjności wegetacyjnych tu form. Przyczyny tego należy szukać w bardzo rozległej powierzchni Ślęży oraz w jej interesującej budowie morfologicznej. Poza tym jest ona najwyższym wzniesieniem masywu górującym nad drugim co do wysokości — Radunią — o około 150 m.

Na Ślęży rośnie 127 taksonów, tj. przeszło 72% ogólnej ich liczby; z nich 31 występuje wyłącznie na tym wzgórzu. Tu spotkano większość bardziej interesujących gatunków: znaczną część mchów górskich oraz wiele rzadkich związanych głównie z podłożem skalnym. Na skałach, w szczelinach skalnych, na humusie wśród skał i głazów w szczytowych partiach Ślęży skupia się liczna grupa rzadkich w Polsce i na Śląsku gatunków jak: *Brachythecium geheebii*, *Grimmia mühlenbeckii*, *G. trichophylla*, *Polytrichum decipiens*, *Rhabdoweisia crispata*, *Rhacomitrium sudeticum* i *Tetraplodon angustatus*.

Mniej mchów znaleziono na górze Raduni i przyległych, słabo wyodrębnionych pagórkach (90 taksonów). Na tym obszarze najlepsze warunki rozwoju znajdują gatunki łąkowe, grupujące się na łąkach u podnóży góry, głównie zaś w rezerwacie łąkowym „Łąki Sulistrowickie”. Wyłącznie dla Raduni właściwych jest 11 gatunków, z których przeszło połowa rośnie w zbiorowiskach łąkowych, np. *Campylium stellatum*, *Drepanocladus intermedius*, czy rzadki na Śląsku — *Campylium polygamum*.

Na pozostałych wzgórzach zebrano znacznie mniejsze ilości mchów

Tabela 11 — Table 11

Rozmieszczenie poziome mchów z uwzględnieniem wyróżnionych siedlisk
 The horizontal distribution of mosses in the habitats distinguished

Siedliska Habitats	Jednostki geomorfologiczne Geomorphological units						Podnóże (290)
	Granit Gabro Granite Gabbro	Serpentynit Serpentine marble		Amfibolit Amphibolite			
	Ślęża (718)	Radunia (573)	G. Olesz. (389)	Wieżyca (415)	Stolna (371)	Gozdnica (316)	
Skąły Rocks	48	29	9	19	9	17	16
Szczeliny skalne Rock fissures	15	9	9	3	—	2	2
Skąły pokryte glebą Rocks covered with soil	22	8	—	6	5	9	2
Mury Walls	18	—	—	3	3	2	12
Żywe drzewa Living trees	16	8	—	6	6	7	8
Zbutwiałe drewno Rotten wood	20	15	2	3	14	6	1
Lasy (na ziemi) Forests (ground layer)	24	27	13	28	13	10	6
Łąki Meadows	—	30	—	1	—	2	18
Murawy kserotermiczne Xerothermic grassland	4	5	4	1	—	2	1 2
Potoki Streams	10	12	—	—	4	—	18
Rozlewiska Flood waters	10	12	—	—	2	—	1
Wilgotne rowy Wet fosses	7	—	—	—	3	1	5
Drogi i ścieżki leśne Wood roads and paths	23	6	12	6	14	7	4
Skarpy Escarps	21	13	8	15	4	3	12
Pola Fields	—	3	—	—	—	—	14
Ogólna liczba taksonów Total number of taxa	127	90	32	51	42	41	86

Wieżyca — 51 taksonów, Stolna — 42, Gozdnicza — 41, Góry Oleszeńskie łącznie z Gozdnikiem — 32; przeważnie są to gatunki pospolite.

Na obszarze podnóża mchy rosną przede wszystkim nad potokami, na polach i suchych, trawiastych zboczach (razem 86 taksonów). Wśród nich spotyka się gatunki rzadkie: *Amblystegium varium*, *Dicranella schreberi*, *Ditrichum tenuifolium* i *Eurhynchium schleicheri*.

Rozmieszczenie mchów przywiązanych do wyróżnionych siedlisk nie jest na poszczególnych wzgórzach jednakowe (tab. 11). Na Ślęży zdecydowanie przeważają gatunki naskalne, znaleziono tu również większą liczbę taksonów na murach (schronisko i kaplica); gatunków leśnych jest mniej, a zupełnie brak łąkowych.

Odwrotnie jest na Raduni, na której jak wspomniano dominują mchy łąkowe, natomiast ze względu na brak zabudowań (murów), nie są reprezentowane formy związane z tym typem siedliska. Na zboczach Raduni pola uprawne sięgają najwyżej; rosną na nich nieliczne gatunki mchów.

Na Górach Oleszeńskich wraz z Gozdnikiem nie znaleziono ani jednego gatunku epifitycznego, co wiąże się z charakterem zbiorowisk leśnych tego pasma.

4. ROZMIESZCZENIE PIONOWE. UDZIAŁ GATUNKÓW GÓRSKICH

Ze względu na niewielkie wyniesienie wzgórz masywu ślęzańskiego nad poziom morza oraz rzadkość występowania wielu gatunków, układ pionowy mchów posiada niejednokrotnie cechy przypadkowości. Rozmieszczenie mchów na poszczególnych wysokościach uzależnione jest głównie od czynników edaficznych, a nie klimatycznych, np. tylko w pasie ponad 700 m rośnie część gatunków epifitycznych ponieważ na tej właśnie wysokości znalazły one odpowiednie podłoże i siedlisko w postaci starych okazów jaworów i klonów stanowiących fragment naturalnego lasu. Ponadto prawie wszystkie formy spotkane wyłącznie w pasach 500-600, 600-700 i powyżej 700 m występują na pojedynczych stanowiskach.

Najniżej (300-400) kończą swój zasięg pionowy mchy związane z polami. Nieco wyżej (do 500 m) dochodzą mchy potokowe i łąkowe. Liczba briochamefitów leśnych maleje do 400 m wraz ze wzrostem wysokości. Gatunki epifityczne dominują w najwyższym pasie, tj. w szczytowej partii Ślęży. Formy naskalne spotyka się najczęściej na wysokościach: ponad 700 m, 600-700 m i 300-400 m. Przewaga epilitów w dwóch pierwszych poziomach uwarunkowana jest czynnikami klimatycznymi, podczas gdy w pasie 300-400 m warunkami siedliskowymi; na tej bowiem wysokości znajdują się szczyty lub partie przyszczytowe wielu wzgórz z licznymi wychodniami skalnymi i głazami. Są to: Gozdnik (315), Gozdnica (316), Stolna (371), Góry Oleszeńskie (358, 382, 389) i Wieżyca (415).

Duże zagęszczenie gatunków mchów obserwujemy (tab. 12) w najniższych poziomach: poniżej 300 m i 300-400 m, wyżej ich ilość maleje. W pasie 500-600 m występuje najmniejsza liczba form. Przyczyną tego

Tabela 12 — Table 12

Rozmieszczenie pionowe mchów z uwzględnieniem wyróżnionych siedlisk

Vertical distribution of mosses in the habitats distinguished

Siedliska Habitats		Pasy wysokościowe — Altitudinal zones					
		300	300-400	400-500	500-600	600-700	700
Skąły		20	31	23	21	27	31
Rocks							
Szczeliny skalne		4	11	5	6	5	11
Rock fissures							
Skąły pokryte glebą		7	14	9	12	16	7
Rocks covered with soil							
Mury		14	—	3	—	—	18
Walls							
Żywe drzewa		11	14	4	5	—	15
Living trees							
Zbutwiałe drewno		8	20	12	6	14	4
Rotten wood							
Lasy (na ziemi)		18	35	23	10	9	4
Forests (ground layer)							
Łąki		21	28	1	—	—	—
Meadows							
Murawy kserotermiczne		14	6	1	5	—	3
Xerothermic grasslands							
Potoki		22	14	6	—	—	—
Streams							
Rozlewiska		6	17	3	2	—	—
Flood waters							
Wilgotne rowy		8	4	4	1	—	—
Wet fosses							
Drogi i ścieżki leśne		11	27	16	—	—	2
Wood roads and paths							
Skarpy		23	21	20	2	1	—
Escarps							
Pola		16	3	—	—	—	—
Fields							
Liczba	ogólna — total	69	67	75	44	51	75
teksonów	znalezionych wyłącznie						
Number	w jednym pasie	21	17	6	1	2	9
of taxa	found only in one zone						

jest prawdopodobnie mniej niektórych siedlisk, zazwyczaj bogatych w mchy (np. drogi leśne, zbutwiałe drewno) na tej wysokości. Od 600 m wzwyż liczba mchów ponownie wzrasta. Duży procent gatunków, zwłaszcza niżowych, na wys. powyżej 700 m tłumaczyć można udziałem mchów synantropijnych żyjących w siedliskach sztucznych, wprowadzonych przez człowieka, np. na murach.

Szczegółowa analiza rozmieszczenia pionowego brioflory pozwala na wyróżnienie w masywie Ślęży trzech grup gatunków:

- 1) występujące tylko w szczytowych partiach i nie schodzące poniżej 500 m,
- 2) rosnące u stóp masywu i nie przekraczające 500 m,
- 3) znajdowane na wszystkich wysokościach.

W skład pierwszej grupy (24 formy) wchodzi gatunki, które, z wyjątkiem *Ctenidium molluscum* i *Heterocladium heteropterum*, spotykane są tylko na Ślęży. Są to przeważnie mchy górskie, rzadkie lub bardzo rzadkie na niżu, związane tu głównie ze skałami gabra. Do najbardziej typowych w tej grupie należą: *Brachythecium geheebii*, *Grimmia mühlenbeckii*, *Rhabdoweisia fugax* i inne.

Trzon grupy drugiej (87 form) stanowią mchy pospolite na niżu, przy czym duża ich część posiada na badanym terenie tylko granicę edaficzną np. mchy rosnące na polach, w potokach, a częściowo na łąkach. Do najpospolitszych należą: *Acrocladium cuspidatum*, *Cratoneurum filicinum*, *Dolichotheca silesiaca*, *Fontinalis antipyretica*, *Leucobryum glaucum*, *Pottia truncatula*.

Mchy ubikwistyczne, rosnące od podnóży wzgórz do najwyższych partii masywu, tworząc grupę obejmującą 15 gatunków. Są to w większości formy pospolite zarówno na niżu, jak i w górach, np. *Brachythecium rutabulum*, *B. velutinum*, *Ceratodon purpureus*, *Hypnum cupressiforme*, *Pohlia nutans*.

Udział mchów górskich

O swoistych cechach brioflory masywu Ślęży świadczy duża rola, jaką odgrywają w niej gatunki górskie, które stanowią prawie trzecią część mchów zebranych na badanym terenie (ok. 32%).

W skład elementu górskiego zaliczono gatunki, które rosną w górach a na niżu nie są notowane, dalej gatunki, które schodzą z gór na niż, gdzie są rzadkie, oraz gatunki, które na niżu są dość pospolite, lecz w górach posiadają główne ośrodki występowania.

W masywie Ślęży taksony o zasięgu ograniczonym na terenie Polski wyłącznie do obszarów górskich (łuku sudecko-karpackiego) są nieliczne. Są to: *Bartramia halleriana*, *Grimmia incurva*, *Rhabdoweisia fugax* i *Tetraplodon mniioides* (tab. 13). Największą część elementu górskiego stanowią mchy spotykane poza górami rzadko, a nawet bardzo rzadko (48 taksonów); wśród nich jest kilka gatunków znanych ponadto tylko z Gór

Tabela 13 - Table 13

Gatunki górskie masywu Ślęży
Mountain species in the Ślęża massif

G a t u n k i Species of moss	Występowanie na niżu Occurrence in lowland			Stanowiska położone na wys. n.p.m. Height of localities a.s.l.
	Brak Lack	Rzadko Rarely	Często Often	
I. Wysokogórskie: <u>High mountain species:</u>				
<i>Andreaea rupestris</i>		+		718
<i>Tetraplodon mnioides</i>	+			718
<i>Cynodontium polycarpum</i> var.		+		430-718
<i>Cynodontium polycarpum</i>		+		400-718
<i>Andreaea petrophila</i>		+		300-718
<i>Andreaea petrophila</i> for.		+		710
<i>Rhabdoweisia fugax</i>		+		640-710
<i>Rhacomitrium ramulosum</i>		+		600-710
<i>Rhacomitrium lanuginosum</i>		+		430-710
<i>Rhabdoweisia crispata</i>	+			680-700
<i>Tetraplodon angustatus</i>		+		650
<i>Rhacomitrium sudeticum</i>		+		600
<i>Grimmia incurva</i> +	+			-
<i>Pohlia elongata</i> +		+		-
II. Ogólnogórskie: <u>General mountain:</u>				
<i>Bartramia halleriana</i>	+			718
<i>Bartramia ithyphylla</i>		+		718
<i>Grimmia mühlenbeckii</i>		+		710-718
<i>Rhacomitrium heterostichum</i>			+	300-718
<i>Grimmia hartmanii</i>		+		260-718
<i>Encalypta contorta</i>		+		180-718
<i>Distichium capillaceum</i>		+		710
<i>Leskeella nervosa</i>			+	660-710
<i>Grimmia apocarpa</i>			+	220-710
<i>Pterigynandrum filiforme</i>			+	220-710
<i>Grimmia trichophylla</i>			+	550-705
<i>Drepanocladus uncinatus</i>			+	280-705
<i>Brachythecium geheebii</i>		+		620-700
<i>Sphagnum girgensohnii</i>			+	300-670
<i>Ctenidium molluscum</i>		+		570
<i>Diphyscium sessile</i>		+		260-460
<i>Mniobryum albicans</i>			+	230-430
<i>Brachythecium rivulare</i>			+	180-410
<i>Grimmia ovalis</i>		+		400
<i>Hypnum arcuatum</i>			+	300-380
<i>Fissidens osmundoides</i>		+		240-295
<i>Dicranella subulata</i>		+		280-290
<i>Brachythecium plumosum</i>		+		270
<i>Amphidium mougeotti</i> +		+		-
<i>Isoetecium myosuroides</i> +		+		-
<i>Neckera crispa</i>		+		-
<i>Philonotis fontana</i> +			+	-
<i>Pogonatum urnigerum</i> +			+	-
<i>Tortella tortuosa</i> +		+		-
<i>Uloa americana</i>		+		-
III. Regłowe: <u>Lower mountain:</u>				
<i>Encalypta ciliata</i>		+		718
<i>Bryum alpinum</i>		+		710
<i>Anomodon rugelii</i>		+		710
<i>Mnium spinosum</i>		+		650-710
<i>Brachythecium reflexum</i>		+		620-710
<i>Mnium spinulosum</i>		+		600-710
<i>Heterocladium heteropterum</i>		+		560-710
<i>Polytrichum decipiens</i>		+		480-710
<i>Paraleucobryum longifolium</i>		+		300-710
<i>Isopterygium elegans</i>		+		220-705
<i>Dicranodontium denudatum</i>		+		316-700
<i>Fissidens cristatus</i>		+		260-560
<i>Plagiothecium undulatum</i>		+		400-540
<i>Isopterygium elegans</i> var.		+		316
<i>Philonotis calcarea</i>			+	260
<i>Thamnum alopecurum</i>		+		230
<i>Amblystegiella subtilis</i>		+		210-220
<i>Buxbaumia indusiata</i> +		+		-
<i>Didymodon rigidulus</i> +			+	-
<i>Loeskeobryum brevirostre</i> +		+		-
<i>Neckera pennata</i>			+	-
<i>Dicranum fulvum</i> +		+		-
<i>Uloa ludwigii</i> +		+		-

+ - gatunki nieodnalezione, brak danych dotyczących wysokości
species not recovered now, data dealing with their altitude
are lacking

Tabela 14 - Table 14

Występowanie gatunków górskich w wyróżnionych siedliskach.
Occurrence of mountain species in the habitats distinguished.

Siedliska Habitats	Liczba gatunków Number of species			
	Wysoko- górskie High moun- tain ssp.	Ogólno- górskie General moun- tain	Reglowe Lower moun- tain	Razem Total
skały: ogółem rocks: total number	7*	10	6	23*
gabro	7*	9	4	20
gabbro				
granit	4	2	2	6
granite				
amfibolit	1	3	3	7
amphibolite				
serpentyt	-	2	2	4
serpentine				
marble				
szczeliny skalne rock fissures	3	3	2	8
skały pokryte glebą rocks covered with soil	2	1	3	6
las / na ziemi /: forests / on the soil /:				
ogółem total number	1	2	4	7
liściaste hardwood for.	1	1	3	5
iglaste coniferous for.	-	1	4	5
mieszane mixed forests	-	-	1	1
żywe drzewa leaving trees	-	2	4	6
zbutwiałe drewno rotten wood	-	2	2	4
potoki: ogółem torrents: total species	-	3	2	5
głazy w potoku stones	-	1	1	2
brzeg potoku shore	-	3	1	4
mury walls	-	4	-	4
skarpy escarps	-	2	1	3
rozlewiska flood waters	-	2	-	2
drogi i ścieżki leśne roads and woodpaths	-	2	-	2
pola fields	-	1	-	1
murawy kserotermiczne xerothermic turfs	-	-	-	-
łąki meadows	-	-	-	-
wilgotne rowy wet fosses	-	-	-	-

* - + forma

Świętokrzyskich: *Brachythecium geheebii*, *Heterocladium heteropterum*, *Polytrichum decipiens*, *Tetraplodon angustatus*. Do grupy trzeciej należą 15 gatunków górskich na niżu mniej lub bardziej pospolitych, np.: *Leskeella nervosa*, *Pterigynandrum filiforme*, *Rhacomitrium heterostichum*.

Przeważająca liczba mchów omawianej grupy związana jest z podłożem skalnym (24) i występuje na wszystkich rodzajach skał budujących masyw Ślęży (tab. 14). Rosną one zarówno na silnie nasłonecznionych i suchych skałkach (np. *Andreaea petrophila*), jak również w miejscach zacienionych i wilgotnych (np. *Paraleucobryum longifolium*), w szczelinach skalnych (*Fissidens cristatus*, *Rhabdoweisia fugax*, *Rh. crispata*), rzadziej na murach (*Distichium capillaceum*) lub na głazach w potokach (*Thamnium alopecurum*). Szereg mchów górskich to gatunki naziemne: związane z siedliskami bardzo wilgotnymi (*Brachythecium rivulare*, *Mniobryum albicans*), spotykane na brzegach dróg leśnych (*Diphyscium sessile*), na polach (*Dicranella subulata*) bądź na humusie, najczęściej wśród głazów gabra w lesie (*Mnium spinosum*, *M. spinulosum*, *Polypodium decipiens*). Pozostałe porastają korę żywych drzew lub zbutwiałe drewno.

Z trzech grup wysokościowych (tab. 13) najliczniejszą okazała się grupa gatunków ogólnogórskich (30). Fakt ten oraz obecność dość znacznej, jak na tę wysokość, liczby taksonów mchów wysokogórskich (14) najlepiej świadczą o górskim charakterze brioflory masywu Ślęży.

Ryc. 1. Zależność występowania gatunków górskich od wzniesienia n.p.m.
Dependence of occurrence of mountain moss species on the altitude a.s.l.

Przeszło połowa form górskich najlepsze warunki rozwoju znajduje w granicach 600-718 m n.p.m. (ryc. 1), a więc na wysokościach odpowiadających częściowo regłowi dolnemu w Sudetach. Wiele gatunków gór-

skich na badanym terenie posiada obniżoną, nieraz bardzo znacznie, swoją dolną granicę występowania, np. *Cynodontium polycarpum*: notowany w Tatrach na wys. 1120-1670 (Lisowski 1959), w Gorcach — 1150 (Lisowski i Kornaś 1966), w Bieszczadach Zach. — 1200-1348 (Lisowski 1960), w masywie Ślęzy rośnie na wysokości 410-718 m n.p.m.; *Cynodontium polycarpum* var. *strumiferum*: w Bieszczadach Zach. — 1180-1348, na Ślęzy — 430-718; *Tetraplodon angustatus*: w Tatrach — 1580-2000, w Alpach — 900-2400 (Gams 1957), a na Ślęzy — 650 m n.p.m.

Niektóre gatunki górskie schodzą niekiedy jeszcze niżej (tab. 13) i spotykane są na wysokościach: 220-230 m n.p.m., np. *Amblystegiella subtilis*, *Isopterygium elegans*, *Thamnium alopecurum*, a nawet niżej np. *Brachythecium rivulare* (180 m n.p.m.).

1 stanowisko — ■

Ryc. 2. Ilościowe rozmieszczenie pionów mchów wysokogórskich
Quantitative vertical distribution of alpine mosses

Mchy wysokogórskie pojawiają się już powyżej 300 m, np. *Andreaea petrophila* lub 400 m, np. *Cynodontium polycarpum*, *Racomitrium lanuginosum*. Pionowe rozmieszczenie ilościowe (po dodaniu wszystkich stanowisk gatunków wysokogórskich) wskazuje na ich wyraźne zagęszczenie w najwyższych poziomach (ryc. 2). Duże skupienie mchów wysokogórskich, poza samym szczytem Ślęży, znajdujemy na tzw. szczycie zachodnim (Olbrzymki), w jego pobliżu oraz, w mniejszym stopniu, na północno-wschodnim zboczu Ślęży (mapa 5, ryc. 3). W tych też miej-

Ryc. 3. Rozmieszczenie stanowisk gatunków wysokogórskich w szczytowych partiach Ślęży

Distribution of sites with high alpine species on the highest part of the Ślęża Mt.

scach notujemy największe zagęszczenie form górskich bo ponad 10 stanowisk (mapa 8). W przypadku Olbrzymków tłumaczyć to można warunkami mikroklimatycznymi, o czym wspomniano już w rozdz. „Stosunki klimatyczne”, natomiast występowanie licznych gatunków górskich na stoku północno-wschodnim wynika m.in. z dogodnych warunków ekologicznych (wilgotne bloki skalne w zacienionym, wysokopiennym lesie pokryte bujną roślinnością zarodnikową). W jednej i drugiej części czynnikiem warunkującym rozwój gatunków górskich jest obecność górskiego podłoża w postaci dużych bloków skalnych.

Najmniej mchów górskich obserwuje się na wys. 500-600 m, jednak procent gatunków górskich (w stosunku do ogólnej liczby) jest tu znacznie wyższy niż w pasach poniżej 300 m, 300-400 m i 400-500 m. Począwszy od najniższego pasa wysokościowego procent taksonów górskich wyraźnie wzrasta: poniżej 300 m — 13%, 300-400 m — 14%, 400-500 m — 20%, 500-600 m — 27%, 600-700 m — 43%, powyżej 700 m — 37%.

Z 44 taksonów górskich, znalezionych w okresie badań, aż 35 rośnie na najwyższym wzniesieniu masywu, tj. na Ślęży (ryc. 4); tu też znajdują się stanowiska wszystkich mchów wysokogórskich oraz 10 gatunków ogólnogórskich i reglaowych spotykanych wyłącznie na tym wzgórzu. Liczby mchów górskich na pozostałych wzgórzach są niewielkie: na Raduni — 11, Wieżycy i Stolnej — 6, Gozdnicy — 5, a na Górach Oleszeńskich i Gozdniku — tylko 2 gatunki. U podnóża masywu zebrano 11 gatunków górskich; z nich na żadnym z wymienionych wzniesień nie spotkano *Amblystegiella subtilis*, *Philonotis calcarea* i *Thamnium alopecurum*.

Mapa 8. Zagęszczenie gatunków górskich: 1 — ponad 10 stanowisk; 2 — 5-10 stanowisk; 3 — 1-5 stanowisk; 4 — brak

Density of mountain species: 1 — more than 10 sites; 2 — 5-10 sites; 3 — 1-5 sites; 4 — none

Do najpospolitszych mchów w obrębie elementu górskiego, na omawianym terenie, należą: *Grimmia hartmanii*, *Cynodontium polycarpum* i *Paraleucobryum longifolium*. Najrzadszymi, posiadającymi tylko po 1 stanowisku są: *Anomodon rugelii*, *Ctenidium molluscum*, *Distichium capillaceum*, *Philonotis calcarea*, *Rhacomitrium sudeticum* i *Tetraplodon angustatus* (por. mapy 3-8). 23 gatunki górskie, podawane dawniej z masywu Ślęży, obecnie nie zostały odnalezione.

Ryc. 4. Poziome rozmieszczenie gatunków górskich
Horizontal distribution of mountain species

5. ANALIZA GEOGRAFICZNA FLORY MCHÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTU OCEANICZNEGO

Rozmieszczenie geograficzne mchów nie jest dotychczas w dostatecznym stopniu zbadane. Obok terenów bardzo dobrze opracowanych pod tym względem, są obszary słabo poznane lub nawet takie, z których brak jeszcze zupełnie danych briologicznych. Dodatkowe trudności wynikają ze stosowania różnych, niekiedy krańcowo odmiennych, kryteriów podziału na elementy geograficzne. Klasycznymi przykładami tych rozbieżności są m. in. gatunki: *Thuidium abietinum*, *Rhabdoweisia fugax* i *Mnium undulatum*. Poglądy briologów na ich przynależność do elementów geograficznych podano w zestawieniu (str. 65).

Z wymienionych powodów analiza geograficzna mchów w tej pracy dotyczy tylko nielicznej grupy bardziej interesujących gatunków, zwłaszcza oceanicznych i potraktowana jest wyłącznie przykładowo.

Za Lisowskim (1961) wyróżniono następujące grupy: euatlantycką (centrum: przyatlantyckie obszary Europy), subatlantycką (Europa; centrum: Europa zach., tereny o cechach oceanicznych), euryatlantycką (przyatlantyckie tereny Europy i Ameryki pn.) i suboceaniczną.

Z grupy euatlantyckiej w masywie Ślęzy znajdujemy tylko jeden gatunek: *Hymenostomum rostellatum*.

Grupa subatlantycka reprezentowana jest przez: *Eurhynchium schleicheri*, *E. striatum*, *Heterocladium heteropterum*, *Neckera crispa*, *Physcomitrium pyriforme*, *Pogonatum nanum*, *Rhabdoweisia fugax* i *Ulata americana*.

Poglądy briologów na przynależność niektórych mchów
do elementów geograficznych

<i>Thuidium abietinum</i>	<i>Rhabdoweisia fugax</i>	<i>Mnium undulatum</i>
holarktyczny —	europajsko-afrykański — Pilous, Duda	kosmopolityczny —
Herzog (1932), Kuc (1964);	(1960);	Pierrot (cyt. Kuc 1964),
cyrkumborealny —	alpejsko-borealny	holarktyczny, gr. eu-
Allorge (cyt. Kuc 1964);	— Amann (cyt. Kuc 1964);	rosyberyjska (Kuc 1964);
cyrkumborealny, gr. kontynentalna —	atlantycki — m.in. Kuc (1964), Boros (1968);	cyrkumborealny, gr. śródziemnomorsko-atlantycka — Boros (1968);
Boros (1968);		oceaniczny, gr. euryatlantycko-śródziemnomorska — Karczmarsz (1963).
śródziemnomorsko-środkowo-azjatycki — Szafran (1955);		
pontyjski — Grimme (cyt. Kuc 1964).		

Do grupy euryatlantyckiej należą: *Diphyscium sessile*, *Fissidens taxifolius*, *Hypnum ericetorum*, *Isothecium myosuroides*, *Loeskeobryum brevistre*, *Schistostega osmundacea* i *Thuidium tamariscifolium*.

Najwięcej przedstawicieli z mchów oceanicznych posiada grupą suboceaniczną, w skład której wchodzi aż 20 gatunków. Są to: *Aulacomnium androgynum*, *Buxbaumia indusiata*, *Campylium polygamum*, *Dicranum fulvum*, *D. spurium*, *Eurhynchium stokesii*, *Fissidens adiantoides*, *F. bryoides*, *F. cristatus*, *Leucobryum glaucum*, *Mnium hornum*, *Orthotrichum diaphanum*, *O. lyellii*, *O. striatum*, *Plagiothecium undulatum*, *Platygyrium repens*, *Racomitrium heterostichum*, *Scleropodium purum*, *Syntrichia subulata* i *Thamnium alopecurum*.

Większość mchów atlantyckich rośnie w zbiorowiskach leśnych (np. *Hypnum ericetorum*), część zasiedla skały (np. *Heterocladium heteropterum*, *Racomitrium heterostichum*) lub wilgotne szczeliny skalne (*Fissidens cristatus*); pozostałe występują na korze drzew jako epifity (np. *Orthotrichum striatum*) na murszejących pniakach jako epiksylity (np. *Aulacomnium androgynum*), bądź na wilgotnych łąkach (*Campylium polygamum* czy na głazach w potokach (*Thamnium alopecurum*).

Z mchów subarktycznych ze Ślęży notowane są trzy gatunki: *Racomitrium sudeticum*, *Tetraplodon angustatus* i *T. mnioides*.

Do elementu śródziemnomorskiego należą: *Entostodon fascicularis* i *Hymenostomum microstomum*.

Gatunki kosmopolityczne, występujące w rejonie Ślęży, to: *Bryum*

argenteum, *Ceratodon purpureus*, *Funaria hygrometrica* i *Hypnum cupressiforme*.

Jako przykłady innych elementów geograficznych wymienić można: z elementu pankontynentalnego: *Grimmia pulvinata*, *Hedwigia albicans* i *Polytrichum piliferum*;

z elementu holarktycznego: *Drepanocladus intermedius* i *Rhacomitrium canescens*;

z elementu borealnego: *Bryum capillare*, *Dicranum scoparium* i *Orthodicranum montanum*;

z elementu eurozjatycko-afrykańskiego: *Pogonatum aloides*;

z elementu eurazjatyckiego: *Homalia trichomanoides*,

z elementu europejskiego: *Brachythecium geheebii* i *Ulota ludwigii*.

6. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NA BRIOFLORĘ

Jednym z ważniejszych czynników wywierających duży wpływ na szatę roślinną, w tym także na brioflorę, jest działalność człowieka.

Ze względu na możliwość porównania wyników prac dawniejszych z obecnymi, masyw Ślęży stanowi bardzo dobry obiekt, na którym prześledzić można tę zależność.

Działalność człowieka na tym terenie sięga najdawniejszych czasów, kiedy to — już w starożytności — odbywały się liczne praktyki religijne (C e h a k-H o ł u b o w i c z o w a 1958). Prawdopodobnie panowały tu górskie lasy reglowe, składające się głównie z buku i jawora, które stopniowo wycinano i w ostatnim czasie zastąpiono przez sadzone świerczyny. W ten sposób znikło wiele roślin górskich, zubożała również bardzo brioflora epifityczna.

W porównaniu z badaniami autorów niemieckich sprzed około stu lat stwierdzić można brak szeregu gatunków mchów górskich: *Andreaea rupestris*, *Bartramia halleriana*, *B. ithyphylla*, *Bryum alpinum*, *Grimmia incurva*, *G. ovata*, *Pohlia elongata*, *Tetraplodon mnioides* i innych (tab. 13, tab. 15).

Wprowadzenie lasów wyłącznie iglastych na miejsce liściastych, co często było dawniej praktykowane, wpływało na wilgotność podłoża i powietrza. Pociąga to za sobą słabszy rozwój brioflory, w szczególności mchów epifitycznych i epiksylicznych, z których nie odnaleziono: *Buxbaumia indusiata*, *Neckera pennata*, *Pylaisia polyantha*, *Orthotrichum lyellii*, *O. stramineum* i *Ulota ludwigii* przystosowanych do dużej wilgotności powietrza (G a m s 1932). Dowodem osuszania się klimatu badanego terenu jest zniknięcie wielu podawanych uprzednio mchów przywiązanych do wilgotnych siedlisk, np.: *Brachythecium plumosum*, *Bryum turbinatum*, *Eurhynchium striatum*, *Philonotis fontana* i *Sphagnum rigidum*.

Sztuczne lasy świerkowe były często atakowane przez kornika i wycinane. Po wycięciu lasów wyginęła również część mchów epifitycznych,

Tabela 15 - Table 15

Wykaz nie-odnalezionych gatunków mchów, podawanych z masywu Ślęży przez bryologów niemieckich

List of the species of mosses given by German bryologists from Ślęża massif, not recovered now by the author

Nazwa gatunku Species name	Stanowisko Locality	Wzniesienie n.p.m. Height a.s.l.	Nazwisko zbieracza Collector's name
<i>Andreaea rupestris</i>	Ślęża, szczyt	718	Md.
<i>Syntrichia subulata</i>	" "	718	Md.
<i>Bartramia ithyphylla</i>	" "	718	Md.
<i>Encalypta ciliata</i>	" "	718	Md.
<i>Bartramia halleriana</i>	" " Sobótka	718	Md., Sch.
<i>Tetraplodon mnioides</i>	" "	718	Md., Limpr.
<i>Dicranum fulvum</i>	" " Górką	718	Limpr.
<i>Bryum alpinum</i>	" " kaplica na szczycie	710	Md., Limpr.
<i>Grimmia incurva</i>	" skały pod szczytem	-	Limpr.
<i>Eurhynchium striatum</i>	" cieniaste skały	700	Kern
<i>Grimmia ovalis</i>	" powyżej Tapadeł	400	Kern
<i>Brachythecium plumosum</i>	" wilgotne głązy gabra	270	Baumgart
<i>Buxbaumia indusiata</i>	" "	-	Md., Limpr.
<i>Loeskeobryum brevirostre</i>	" "	-	Limpr., Sch.
<i>Schistostega osmundacea</i>	" "	-	Md., Limpr.
<i>Bryum cirrhatum</i>	między Ślężą, a Radunią	-	Md.
<i>Bryum cuspidatum</i>	" "	-	Limpr.
<i>Orthotrichum lyellii</i>	Ślęża, Górką, na drzewach	-	Kern
<i>Ditrichum pallidum</i>	" Radunia, Gozdnicza, Będk	-	Sch.
<i>Weisia viridula</i>	Radunia	-	Md.
<i>Hymenostomum microstomum</i>	" Dol.Sulistrowicka	-	Md., zielnik
<i>Sphagnum compactum</i>	" "	-	Md.
<i>Pylaisia polyantha</i>	"droga sulistrowicka"	-	Kern, Md.
<i>Pogonatum nanum</i>	Sulistrowice, Strzegomiany	-	Kern, Md.
<i>Bryum turbinatum</i>	" " Sobótka	-	Md.
<i>Hymenostomum rostellatum</i>	Tapadła, na ziemi	-	Kern
<i>Pterigoneurum cavifolium</i>	Strzeblów, na murze	-	Baumgart
<i>Dicranella rufescens</i>	Górką, odłogi	-	Md.
<i>Pohlia elongata</i>	" Sobótka	-	Md.
<i>Pottia intermedia</i>	" "	-	Md., Limpr.
<i>Didymodon rigidulus</i>	" przed Sobótką	-	Md.
<i>Amphidium mougeotii</i>	Sobótka	-	Limpr.
<i>Entostodon fascicularis</i>	" "	-	Md.
<i>Isotrichum myosuroides</i>	" "	-	Limpr.
<i>Neckera crispata</i>	" "	-	Md.
<i>Neckera pennata</i>	" "	-	Kern, Sch.
<i>Orthotrichum stramineum</i>	" "	-	Md.
<i>Pogonatum urnigerum</i>	" "	-	Md.
<i>Tortella tortuosa</i>	" "	-	Md.
<i>Ulotia americana</i>	" "	-	Md., Limpr.
<i>Ulotia ludwigii</i>	" "	-	Md.
<i>Philonotis fontana</i>	masyw Ślęży	-	Sch.

Objaśnienia skrótów:

Explanation of abbreviations:

Będk.	-	Będkowice,
Limpr.	-	Limpricht,
Md.	-	Milde,
Sch.	-	Schulze.

jak np.: *Amphidium mougeotii*, *Dicranum fulvum* i *Neckera crispata*, które rosły na zacienionych skałach lub głązach.

Niszczenie brioflory powodują również różne zabiegi gospodarcze, jak budownictwo, zakładanie kamieniołomów itp. Wzmianki historyczne donoszą o wielokrotnym wznoszeniu w szczytowej partii Ślęży zamku i kaplicy kilkakrotnie burzonych. Obecna forma tej kaplicy pochodzi z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku (1851), a więc z okresu, kiedy posiadamy już pierwsze dane bryologiczne z badanego terenu i możliwość uchwycenia zmian. W ostatnim stuleciu zbudowano tu schronisko turystyczne, a niedawno (1958) przekątnikową stację telewizyjną. Wymienio-

ne czynności oraz prowadzone od dłuższego czasu przez naukowców niemieckich, a następnie polskich, prace archeologiczne, przyczyniły się do zdewastowania szczytowej partii góry z najbardziej interesującą brioflorą. Wiele rzadkich, ostatnio nie odnalezionych mchów posiadało jedyne stanowiska właśnie na szczycie Ślęży. Z tego miejsca notowane były: *Andreaea rupestris*, *Bartramia halleriana*, *B. ithyphylla*, *Bryum alpinum*, *Encalypta ciliata*, *Syntrichia subulata* i *Tetraplodon mnioides* (tab. 15).

Atrakcyjny teren wycieczek turystycznych, korzystny klimat, a przede wszystkim bliskość większych osiedli miejskich, jak Wrocław, Świdnica, Dzierżonów sprzyjało i sprzyja masowemu rozwojowi turystyki w masywie Ślęży, co jeszcze bardziej przyczynia się do niszczenia roślinności.

Zmiany we florze mchów, spowodowane ingerencją człowieka, dają się zauważyć nawet w ostatnim okresie. W trakcie prowadzenia prac terenowych, podczas remontu schroniska turystycznego i renowacji starych murów otaczających kaplicę na szczycie Ślęży, przestały istnieć stanowiska wielu mchów zbieranych tu w 1966 roku: *Encalypta contorta*, *Erythrophyllum rubellum*, *Funaria hygrometrica*, *Homalothecium sericeum*, *Syntrichia ruralis*, a częściowo również obfite stanowisko górskiego gatunku — *Distichium capillaceum*. W związku z tym nie istnieją już płaty, w których wykonano kilka zdjęć fitosocjologicznych (25a, 25b, 25c).

Synantropizacja odbija się ujemnie na charakterze zbiorowisk roślinnych. Najwięcej roślin zawleczonych obserwujemy na coraz liczniej uczęszczanych drogach i ścieżkach leśnych (z mchów np. *Bryum caespiticium*) oraz na polanie szczytowej (np. *Bryum argenteum* i *Funaria hygrometrica*).

Wpływ działalności człowieka na przyrodę jest powodem znacznego zubożenia flory i zniszczenia zbiorowisk roślinnych masywu Ślęży. Ze 103, podawanych z tego terenu, gatunków mchów, pomimo dokładnych poszukiwań, nie znaleziono w czasie badań aż 42 gatunków (tab. 15). Większość z nich na Ślęży prawdopodobnie już nie występuje. Niektóre były podawane ze stanowisk bliżej nieokreślonych, np. „Sobótka” (=stara nazwa góry, a jednocześnie nazwa osiedla) co utrudniło ich odszukanie (np. *Entostodon fascicularis*, *Isothecium myosuroides* i *Pogonatum urnigerum*). Spośród 42 mchów nieodnalezionych obecnie w masywie Ślęży tylko 15 posiada dokumentację w bogatych zbiorach zielnikowych Instytutu Botanicznego.

Biorąc pod uwagę plan turystycznego zagospodarowania rejonu Ślęży, który przewiduje m.in. budowę tamy w pobliżu Sulistrowiczek, wyciągów narciarskich, sieci nowych dróg kołowych, schronisk, hoteli itp., należy przewidywać dalsze, poważne zniszczenie szaty roślinnej tego interesującego terenu.

Analizowane zbiorowiska mszaków podzielono na trzy grupy:

- A) wchodzące w skład zbiorowisk roślin naczyniowych, z którymi są nierozdzielnie związane, wskutek czego rozpatrywane są na ich tle;
- B) odrębne skupienia mszaków pozostające jednak pod bezpośrednim wpływem roślin naczyniowych, tzw. zbiorowiska związane;
- C) zbiorowiska stanowiące krótkotrwałe stadia sukcesyjne.

A. UDZIAŁ MCHÓW W ZBIOROWISKACH ROŚLIN NACZYNIOWYCH

Na podstawie badań fitocjologicznych wyróżniono 10 zespołów względnie zbiorowisk roślin naczyniowych, których systemtyka przedstawia się następująco:

- Klasa *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. 1939
- Rząd *Vaccinio-Piceetalia* Br.-Bl. 1939
- Związek *Dicrano-Pinion* Libb. 1933
- 1. Zespół *Leucobryo-Pinetum* Mat. 1962
- Klasa *Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieg. 1937
- Rząd *Fagetalia silvaticae* Pawł. 1928
- Związek *Fagion silvaticae* R.Tx. et Diem. 1936
- 2. Zespół *Melico-Fagetum* Lohm. ap. Seibert 1954
- Rząd *Quercetalia pubescentis* Br.-Bl. 1931
- 3. Zespół *Potentillo albae-Quercetum* Libb. 1933
- Klasa *Plantaginetea maioris* R.Tx. et Prsg. 1950
- Rząd *Plantaginetalia maioris* R.Tx. (1947) 1950
- Związek *Polygonion avicularis* Br.-Bl. 1931
- 4. Zespół *Sagino-Bryetum* Diem., Siss. et Westh. 1940
- Klasa *Scheuchzerio-Caricetea fusce* Nordh. 1936
- Rząd *Caricetalia davallianae* Br.-Bl. 1949
- Związek *Caricion davallianae* Klika 1934
- 5. Zbiorowisko *Juncus articulatus*
- Klasa *Molinio-Arrhenatheretea* R.Tx. 1937
- Rząd *Molinietalia* Koch 1926
- Związek *Molinion* Koch 1926
- 6. Zespół *Molinietum medioeuropaeum* Koch 1926
- Rząd *Arrhenatheretalia* Pawł. 1928
- 7. Zbiorowisko *Trifolium dubium*
- Klasa *Festuco-Brometea* R.Tx. 1951
- Rząd *Festuco-Sedetalia* R.Tx. 1951
- 8. Zbiorowisko *Festuca pallens*
- Klasa *Asplenietea rupestris* Br.-Bl. 1934
- Rząd *Androsacetalia vandellii* Br.-Bl. 1926
- Związek *Androsacion vandellii* Br.-Bl. 1926

9. Zespół *Asplenietum cuneifolii* Gaubl. 1954

Klasa *Rudero-Secalieta* Br.-Bl. 1936

Rząd *Secali-Violetalia arvensis* Siss. (1943 ap Br.-Bl. et Tx.) 1946

Związek *Secalion* (Luquet 1926) Br.-Bl. 1931

10. Zbiorowisko *Centaurea cyanus*

1. Lasy iglaste

Zbiorowiska lasów iglastych, pomimo że zajmują ok. 80% powierzchni masywu Ślęży, pod względem fitosocjologicznym nie przedstawiają dużej wartości. Są to sztuczne lasy świerkowe, pozbawione runa i podszycia, bądź bardzo zniszczone bory sosnowe i mieszane.

Zespół *Leucobryo-Pinetum* Mat. 1962 (tab. 16)

Płaty należące do zespołu *Leucobryo-Pinetum* są bardzo zubożałe. Gatunki wyróżniające geograficznie ten zespół: *Fagus silvatica*, *Deschampsia flexuosa*, *Leucobryum glaucum* i *Hypnum cupressiforme* nie odgrywają dużej roli. Poza roślinami charakterystycznymi klasy *Vaccinio-Piceetea*, najwyższy stopień stałości fitosocjologicznej, z gatunków towarzyszących, posiadają tylko: *Calamagrostis arundinacea* i *Pteridium aquilinum*. W drzewostanie, obok gatunków charakterystycznych związku *Dicrano-Pinion* (*Pinus silvestris*) spotyka się najczęściej: *Picea excelsa* i *Quercus sessilis*.

W warstwie mchów na uwagę zasługują jedynie wymienione już gatunki wyróżniające zespół, z których *Leucobryum glaucum* związany jest najsilniej z opisywanym zbiorowiskiem, zaś *Hypnum cupressiforme* wchodzi również w skład wielu innych zbiorowisk roślinnych, a w borach nie wykazuje optimum swojego występowania. Oprócz tych mchów rośnie tu kilku gatunków, powszechnie uważanych za borowe, zaliczanych przez niektórych badaczy do charakterystycznych klasy *Vaccinio-Piceetea* (*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum attenuatum*). Szeregu innych gatunków związanych z tą klasą nie ujęto w zdjęciach fitosocjologicznych, ponieważ występują niezmiernie rzadko, nieraz na 1 stanowisku lub wchodzą do innych zbiorowisk. Są to: *Dicranum undulatum* (char. zw. *Dicrano-Pinion*), *Mnium spinosum*, *Plagiothecium undulatum*, *Sphagnum girgensohnii* (char. zw. *Vaccinio-Piceion*) oraz *Ptilium crista castrensis* (char. klasy *Vaccinio-Piceetea*).

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych

- 148a — Radunia, zbocze pd.-wsch., bór sosnowy na północ od Słupic (290 m n.p.m.),
- 167 — Radunia, pn.-zach. zbocze góry (400 m n.p.m.),
- 168 — Radunia, kilkanaście metrów na pd. od zdjęcia poprzedniego
- 169 — Góry Oleszeńskie, bór sosnowy na pd.-wsch. od Sulistrowiczek i na wsch. od rezerwatu „Łąki Sulistrowickie”, oddział 102 (310 m n.p.m.),
- 170 — Góry Oleszeńskie, kilkadziesiąt metrów na pn. od zdjęcia poprzedniego (300 m n.p.m.),

- 171 — Radunia, bór u podnóża góry, na pd. od Sulistrowiczek, obok rezerwatu (310 m n.p.m.),
- 172 — Słęża, zbocze pd.-wsch., w pobliżu szosy, na pn. od Sulistrowiczek (280 m n.p.m.),
- 173 — Słęża, na pn.-wsch. od zdjęcia poprzedniego, tj. w kierunku Będkowic (280 m n.p.m.),
- 174 — Słęża, kilkadziesiąt metrów na pn. od zdj. 173, po drugiej stronie drogi leśnej (280 m n.p.m.),
- 175 — Słęża, na wsch. od zdjęć 173 i 174 (280 m n.p.m.),
- 177 — Góry Oleszeńskie, na pd.-wsch. od Sulistrowiczek, w pobliżu Przełęczy Słupickiej (330 m n.p.m.),
- 179 — Słęża, stok pn.-zach. powyżej Chwałkowa (240 m n.p.m.).

2. Lasy liściaste

Zespół *Melico-Fagetum* Lohm. ap Seibert 1954 (tab. 17)

Jak już wspomniano w ogólnym opisie florystycznym, fragmenty lasów bukowych zachowały się w masywie tylko w kilku miejscach. Pod względem fitosocjologicznym są to zbiorowiska przeważnie bliżej nieokreślone, bardzo ubogie, pozbawione runa leśnego.

Najbardziej interesujące partie buczyn, reprezentujące zespół *Melico-Fagetum*, porastają północno-wschodnie zbocza Wieżycy.

W runie leśnym dominują wyraźnie gatunki charakterystyczne zespołu: *Asperula odorata* i *Melica uniflora*. Duży stopień stałości wykazują również gat. char. innych jednostek fitosocjologicznych z tej klasy, np.: *Anemone nemorosa*, *Galeobdolon luteum* czy *Melica nutans*.

W drzewostanie, oprócz *Fagus silvatica* i *Acer pseudoplatanus*, często spotyka się *Tilia platyphyllos* i *Carpinus betulus*.

Mchy w opisanym zespole odgrywają minimalną rolę, warstwa mszyska bardzo często jest zupełnie niewykształcona. Z występujących tu gatunków mchów wymienić można tylko: *Atrichum undulatum* — charakterystyczny rzędu *Fagetalia* oraz, najczęściej występujący, pospolity gatunek — *Hypnum cupressiforme*. Mchy epifityczne, zwykle rozwinięte w tego typu zbiorowiskach leśnych, w badanym zespole również ograniczone są do znikomych ilości obrastających najniższe części pni buków oraz ich korzenie (*Brachythecium velutinum*, *Hypnum cupressiforme*). Stosunkowo najwięcej mchów rośnie tu na rozproszonych mniejszych głazach i skałach. Są to jednak przeważnie gatunki epilityczne związane przede wszystkim z podłożem skalnym, mniej zaś ze zbiorowiskiem roślin wyższych, w których się znajdują. Do najczęstszych należą: *Paraleucobryum longifolium* i *Isothecium myurum*.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych

- 49 — Wieżyca, partia szczytowa, kilkanaście metrów na wschód od baszty szczytowej (410 m n.p.m.),
- 50 — Wieżyca, kilkanaście metrów niżej,

- 51 — Wieżyca, na wschód od zdjęcia poprzedniego,
- 52-53 — Wieżyca, pod szczytem góry, na stromym zboczu o wystawie pn.-wsch.,
- 55 — Wieżyca, cienisty las bukowy na stoku pn.-wsch. powyżej czarnego szlaku turystycznego (380 m n.p.m.),
- 56 — Wieżyca, zbocze pn.-wsch., cienisty las bukowy, ok. 100 m ponad czarnym szlakiem turystycznym,
- 57 — Wieżyca, kilkadziesiąt metrów na północ od poprzednich zdjęć,
- 58 — Wieżyca, łagodniejsze zbocze o wystawie pn.-wsch. (380 m n.p.m.),
- 59 — Wieżyca, w pobliżu szlaku turystycznego, na stoku pn. (340 m n.p.m.),
- 60 — Wieżyca, cienisty las bukowy na stromym zboczu półn. (360 m n.p.m.),
- 61-62 — Wieżyca, zbocze o ekspozycji pn.-wsch. (360 m n.p.m.).

Zespół *Potentillo albae-Quercetum* Libb. 1933 (tab. 18)

Fragmentarycznie wykształcony zespół *Potentillo albae-Quercetum* skupiony jest w szczytowych partiach Raduni (460-570 m n.p.m.), przeważnie na pd.-zach. stoku góry. Ma on charakter bardzo świetlistej dąbrowy gdzie zwarcie drzewostanu waha się od 30-70%.

W warstwie drzew dominuje *Quercus sessilis* o charakterystycznym, karłowatym pokroju; mimo znacznego wieku drzewa osiągają wysokość ok. 7 m i średnicę kilku do kilkunastu centymetrów.

Głównymi gatunkami w warstwie zielnej są: *Potentilla alba*, *Hypericum montanum* i *Poa nemoralis*. Wszystkie wymienione w drugiej grupie gatunki (tab. 18) należy uważać za lokalnie charakterystyczne ze-
społu.

Wśród roślin towarzyszących pewną rolę odgrywają gatunki należące do klasy *Festuco-Brometea* i rzędu *Festuco-Sedetalia* (*Euphorbia cyparissias*, *Dianthus carthusianorum*, *Anthericum ramosum*, *Ceratodon purpureus*, *Koeleria pyramidata* i *Phleum boehmeri*); spotyka się tu również gatunki borowe z klasy *Vaccinio-Piceetea* (*Vaccinium myrtillus*, i *Deschampsia flexuosa*). Obecność tych roślin w świetlistej dąbrowie spowodowana jest bliskim sąsiedztwem zbiorowiska z klasy *Festuco-Brometea* i borów.

Warstwa „d”, w skład której wchodzi mchy i porosty, w zespole *Potentillo albae-Quercetum* rozwinięta jest bardzo nierównomiernie: w niektórych miejscach brak jej zupełnie, gdzie indziej pokrywa powierzchnię płatu w 25%. Uwagę zwracają tutaj mchy: *Dicranum scoparium*, *Ceratodon purpureus*, *Brachythecium velutinum*, *Polytrichum attenuatum* i *Plagiothecium denticulatum* oraz porosty z rodzaju *Cladonia*. Gatunkiem najbardziej przywiązany do tego zespołu i występującym w masynie najczęściej w świetlistej dąbrowie jest *Plagiothecium denticulatum*.

W porównaniu z zespołem buczyny, *Melico-Fagetum*, udział mchów w omawianym zbiorowisku jest nieco większy, dotyczy to przede wszystkim współczynnika pokrycia poszczególnych gatunków mchów. Przyczyną tego jest prawdopodobnie słabo zwarte runo leśne (40-70%), które

T a b e l a 16 - T a b l e 16

LEUCOBRYO - PINETUM MAT. 1962

Nr kolejny zdjęcia - Successive number of record Nr zdjęcia w terenie - Field number of record Data - Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	c Presence degree
Wysokość n.p.m. - Altitude - m		169	171	170	179	178a	148a	175	168	174	172	177	167	
Ekspozycja - Exposure		16	16	16	18	17	26	17	7	17	17	18	7	
Nachylenie stoku - Inclination of slope		VII	VII	VII	VII	VII	VI	VII	VIII	VII	VII	VII	VIII	
Zwarcie warstwy a - Density of a - %		69	69	69	69	69	60	69	68	69	69	69	69	
Zwarcie warstwy b - Density of b - %		310	310	300	240	280	290	280	400	280	280	330	400	
Zwarcie warstwy c ₁ - Density of c ₁ - %		N	NE	N	NW	SE	-	SE	NW	SE	SE	NW	NW	
Zwarcie warstwy c ₂ - Density of c ₂ - %		2	2	3	5	2	5	1	25	3	2	10	20	
Zwarcie warstwy d - Density of d - %		50	60	60	55	80	60	80	80	85	40	40	70	
pH gleby - pH of soil		5	40	5	35	5	-	5	20	-	10	10	40	
Powierzchnia zdjęcia - Surface of record - m ²		50	60	60	70	85	65	70	70	40	40	70	50	
Ogólna liczba gatunków - Total number of species		-	20	60	40	40	-	20	40	60	20	20	60	
Liczba gatunków roślin naczyniowych - Number of species of vascular plants		40	10	20	10	1	3	1	3	-	-	5	-	
Liczba gatunków mchów - Number of moss species		4,0	4,5	5,0	4,5	4,5	4,5	5,0	5,5	4,0	4,0	5,0	5,0	
		100	80	60	60	100	48	80	100	100	50	80	100	
		17	16	13	15	15	12	9	13	12	9	8	7	
		12	14	11	13	14	11	8	11	12	9	7	7	
		5	2	2	2	1	1	1	2	-	-	1	-	
D r z e w a - T r e e s														
Pinus silvestris +	a	3.3	4.4	4.4	4.4	2.2	4.4	2.2	3.3	2.2	2.2	3.2	4.3	V
Quercus sessilis	a	.	.	.	.	4.4	.	4.4	.	4.4	.	.	.	II
Quercus sessilis	b	.	.	.	.	1.1	.	1.2	2.2	.	.	.	3.3	III
Quercus sessilis	c	+	.	.	.	+	.	+	+	+	+	+	+	IV
Picea excelsa	a	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	I
Picea excelsa	b	+	.	.	.	.	.	.	1.1	.	1.1	.	.	II
Picea excelsa	c	+	.	+	+	.	.	+	.	.	+	+	.	III
Fagus silvatica ++	a	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	2.2	.	.	I
Fagus silvatica	b	1.1	3.3	1.2	3.3	.	.	.	.	.	1.1	.	.	III
Fagus silvatica	c	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I
Betula verrucosa	a	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1.2	.	I
Frangula alnus	c	.	+	+	1.1	+	.	+	+	.	.	.	.	III
Sorbus aucuparia	c	.	+	+	.	+	+	.	.	+	.	.	.	III
Padus avium	c	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	I
sporadyczne - sporadic species		Acer pseudoplatanus, c 173/+, Carpinus betulus, c 172/+, Quercus robur, a 172/1.2/, b 179/+, c 172/+/.												
Gatunki wyróżniające zespół - Differential species of the association														
Deschampsia flexuosa	d	1.2	+.2	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	II
Leucobryum glaucum	d	+.2	1.2	1.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Hypnum cupressiforme	d	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	I
Gatunki charakterystyczne rzędu - Species characteristic of the order - Vaccinio-Piceetalia I klasy - and the class - Vaccinio-Piceetalia														
Vaccinium myrtillus		2.3	2.2	3.3	4.4	4.4	.	4.4	2.2	2.2	3.2	4.4	1.2	V
Vaccinium vitis-idaea		.	+	+	.	.	2.2	.	.	.	.	+	.	II
Gatunki towarzyszące - Accompanying species														
Calamagrostis arundinacea		2.2	3.3	2.2	+.2	2.2	+	1.2	3.2	1.2	1.2	1.1	3.3	V
Pteridium quilinum		.	2.3	4.4	3.3	3.3	.	2.3	3.3	4.4	2.2	2.3	4.4	V
Majanthemum bifolium		.	+	.	.	+	.	+	+	+	.	.	+	III
Rubus sp.		1.2	+	.	1.1	+	.	.	.	.	+	.	.	III
Convallaria maialis		.	1.1	1.1	.	1.2	.	.	.	3.2	.	.	.	II
Pleurozium schreberi	d	.	1.2	2.2	1.2	.	.	.	.	.	.	1.1	.	II
Deschampsia caespitosa		.	.	.	.	.	3.3	.	2.2	.	.	.	1.2	II
Dicranella heteromalla	d	+.1	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	I
Luzula nemorosa		.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	I
Hieracium aurorum		.	.	.	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	I
Hypericum perforatum		.	.	.	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	I
sporadyczne - sporadic species:		Atrichum undulatum, d 169/+.1/, Calluna vulgaris 179/+, Carex pallescens 169/+, Dicranum scoparium, d 169/2.2/, Dryopteris spinulosa 169/+, Festuca ovina 179/+, Galium rotundifolium 148a/+, G. verum 148a/+, Melampyrum pratense 179/+, Molinia caerulea 168/+, Phegopteris polypodioides 169/+, Plagiothecium curvifolium, d 168/+, Poa nemoralis 169/1.2/, Pohlia nutans, d 168/1.1/, Polytrichum attenuatum, d 169/2.3/, Rubus idaeus 148a/+, Scorzonera humilis 171/+, Sieglingia decumbens 179/+,												

+ - gatunki charakterystyczne związku - species characteristic of the alliance - Dicrano-Pinion,

++ - gatunki wyróżniające zespół - differential species of the association - Leucobryo-Pinetum.

MELICO - FAGETUM LOHM. AP. SEIBERT 1954

/F/ - gatunki charakterystyczne związku - Species characteristic of the alliance - Fagion silvaticae
/G/ - " " " " " " " " " " - Carpinion

1 - las liściasty - hardwood forest; m - las mieszany - mixed forest; so - las sosnowy - pine forest;
św - las świerkowy - spruce forest.

umożliwia rozwój mchom. Do mchów wspólnych obu zbiorowiskom leśnym należą: *Atrichum undulatum*, *Brachythecium velutinum* i *Polytrichum attenuatum*.

Rola epifitów, podobnie jak w buczynie, jest minimalna; u nasady pni, na szyjach korzeniowych rzadko występują: *Hypnum cupressiforme*, *Orthodicranum montanum* i *Platygyrium repens*, natomiast na gałązkach i korze karłowatych, często krzaczastych dębów rośnie dosyć często porost — *Parmelia physodes*.

Również nieliczne są mchy w innych siedliskach w obrębie tego zespołu, a mianowicie: na zmurszałych pniakach (*Brachythecium salebrosum*, *Dolichotheca silesiaca* i *Orthodicranum montanum*) i głazach (*Bryum capillare*, *Hedwigia albicans*, *Heterocladium heteropterum*, *Hypnum cupressiforme* oraz porost — *Parmelia incurva*.)

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych

Wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne wykonane zastały w szczytowych partiach Raduni (500-570 m n.p.m.) na zboczach: południowym, południowo-wschodnim i wschodnim w lesie dębowym. Poszczególne płyty tego zespołu nie wykazują dużych różnic fizjonomicznych i w związku z tym nie zostały wyszczególnione.

3. Drogi leśne

Zespół *Sagino-Bryetum* Diem., Siss. et Westh. 1940 (tab. 19)

Zespół *Sagino-Bryetum*, właściwy drogom i ścieżkom leśnym, zlokalizowany jest przeważnie na zboczach w centralnej części masywu Ślęży. Występuje on tutaj głównie na drogach o zbliżonym charakterze, tj. o średnio rozwiniętej pokrywie roślinności, często użytkowanych, dostępnych dla wozów. Szerokość badanych dróg wynosi zwykle ponad 2 metry. Brano pod uwagę środkowy fragment drogi, bez tzw. poboczy, które są porośnięte innego typu roślinnością, ściślej związaną z sąsiadującym zbiorowiskiem i mniej narażoną na działanie mechaniczne.

W zespole *Sagino-Bryetum* znaczny udział mają mszaki, szczególnie mchy, których zanotowano tu aż 23 gatunki przy 30 gatunkach roślin naczyniowych. Mszaki są bowiem bardziej odporne na wpływ czynników mechanicznych jak: częste wydeptywanie, zgniatanie, ścieranie itd. Ponadto, dzięki swoim małym rozmiarom, mogą zajmować siedliska (np. między kamieniami, żwirem, wśród gęstych kępek roślin naczyniowych itp.), w których są bezpieczniejsze, chronione przed urazami mechanicznymi.

Na drogach tego typu dużą przewagę osiągają gatunki charakterystyczne jak: *Sagina procumbens* (char. zesp.), *Plantago maior* (char. zw. *Polygonion avicularis*) i *Poa annua* (char. rz. *Plantaginetalia maioris* i kl. *Plantaginetea maioris*).

W obrębie zespołu wyróżniono dwa podzespoły: z *Ceratodon purpu-*

reus i z *Hypnum arcuatum*. Pierwszy z nich zasiedla miejsca niezacienione, suche lub średnio wilgotne; dominują tu gatunki o charakterze kserotermicznym: *Ceratodon purpureus*, *Pohlia nutans*, *Brachythecium albicans* i *Achillea millefolium*. Drugi zajmuje zdecydowanie wilgotne partie dróg i składa się wyłącznie z mchów: *Hypnum arcuatum*, *Mniobryum albicans*, *Polytrichum gracile*, *Climacium dendroides* i *Acrocladium cuspidatum*.

Fot. 1. Droga leśna porośnięta przez zespół *Sagino-Bryetum* (na zboczu Ślęży)
Forest road covered by the *Sagino-Bryetum* ass. (on slope of Ślęża)

Z rosnących na drogach gatunków mchów tylko nieliczne nawiązują do zbiorowisk roślin wyższych, przez które przebiegają te drogi. Duża część dróg masywu Ślęży biegnie wśród lasów iglastych, a jedynie *Brachythecium albicans* i *Pohlia nutans* w słabym stopniu uważać można za właściwe tym zbiorowiskom. Wyłącznie na drogach w lasach liściastych spotkano *Brachythecium velutinum*.

Zespół *Sagino-Bryetum* dotychczas podawany był ze starych schodów kamiennych, szczelin płyt chodnikowych itp. (Matuszkiewicz 1967), z ogrodzeń, ze starych murów, z poboczy torów itp. (Urbanek-Rutowicz 1969). Występowanie tego zespołu w masywie Ślęży na drogach i ścieżkach leśnych świadczy o jego szerszej skali ekologicznej.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych

- 8 — Stolna, zacieniona, kamienista droga (szer. ok. 3 m) wśród lasu świerkowego na pd. stoku góry (320 m n.p.m.), zdjęcie wykonane w środkowej partii drogi,
- 16 — Ślęza, środek drogi leśnej (szer. ok. 2 m) biegnącej lasem liściastym mieszanym na pn. stoku (440 m n.p.m.),
- 28 — Ślęza, wilgotna droga przechodząca przez wysokopienny las świerkowy na pn.-zach. zboczu (100 m n.p.m.),
- 36 — Góry Oleszeńskie, sucha ścieżka leśna w lesie sosnowym przy niebieskim szlaku turystycznym powyżej Sulistrowic (360 m n.p.m.),
- 63 — Ślęza, cienista droga wśród boru sosnowego u podnóża góry przy czarnym szlaku turystycznym, stok pd.-zach. (320 m n.p.m.), na brzegach tej drogi rosną drzewa liściaste: *Carpinus betulus* i *Tilia cordata*,
- 64 — Ślęza, jak poprzednio, lecz kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku przystanku PKS „Ślęza”; droga suchsza, a na jej brzegach: świerk, olcha, grab.
- 65 — Ślęza, nieco bliżej przystanku niż zdjęcie 64 (SSW),
- 66 — Ślęza, obok zdjęcia 65,
- 109 — Ślęza, jezdnia droga w cienistym lesie świerkowym przy czarnym szlaku turystycznym na pn. wystawie góry (300 m n.p.m.), po bokach drogi duże koleiny,
- 124 — Ślęza, mniej uczęszczana droga leśna na pd.-zach. zboczu (320 m n.p.m.),
- 126 — Ślęza, środek kamienistej drogi; stok pd.-zach. (400 m n.p.m.), na brzegach: z jednej strony młodnik modrzewiowy, z drugiej las bukowy,
- 139 — Ślęza, droga kołowa, rzadko eksploatowana na pn. zboczu góry: (440 m n.p.m.),
- 154 — Radunia, gliniasta droga biegnąca przez las sosnowy na pn.-zach. od Słupic (300 m n.p.m.),

Drogi rzadziej używane przez pojazdy posiadają zbliżony skład jakościowy jednak ilościowo górę biorą rośliny naczyniowe nad malejącą grupą roślin zarodnikowych.

Na drogach i ścieżkach leśnych przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszego rośliny naczyniowe odgrywają pierwszorzędną rolę wypierając mszaki i uniemożliwiając ich rozwój. Oto przykład zdjęcia fitosocjologicznego z drogi zarośniętej, mało używanej, wykonanego na pd.-zach. zboczu Ślęzy (ok. 520 m n.p.m.): wilgotna droga leśna o szer. 1,5 m, biegnąca wśród młodego lasu mieszanego; płat 1,5×5 m, ogólne pokrycie — 100%:

<i>Festuca heterophylla</i>	4.4	<i>Lysimachia nummularia</i>	+
<i>Poa pratensis</i>	3.3	<i>Hypericum maculatum</i>	+
<i>Milium effusum</i>	+	<i>Rumex acetosa</i>	+
<i>Myosotis palustris</i>	+	<i>Carex flava</i>	+
<i>Holcus lanatus</i>	+	<i>Carex fusca</i>	+
<i>Ranunculus repens</i>	+	<i>Carex pallescens</i>	+
<i>Dactylis glomerata</i>	+	<i>Carex leporina</i>	+
<i>Cirsium palustre</i>	+	<i>Atrichum undulatum</i>	d
<i>Cynosurs cristatus</i>	+	<i>Hypnum cupressiforme</i>	d
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+		+
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+		+

Na drogach najsilniej eksploatowanych spotykamy najodporniejsze na wpływy zewnętrzne rośliny: *Ceratodon purpureus*, *Poa annua* i *Plantago maior*.

4. Łąki

Zbiorowiska łąkowe na badanym terenie dzielą się na trzy grupy:
1) łąki rajgrasowe (zbiorowisko *Trifolium dubium* z rzędu *Arrhenathe-*

Tabela 20 - Table 20

ZBIOROWISKO JUNCUS ARTICULATUS - JUNCUS ARTICULATUS COMMUNITY

Nr kolejny zdjęcia - Successive number of record	1	2	3	4	5	6	7	
Nr zdjęcia w terenie - Field number of record	3a	44a	50a	11a	45a	10a	46a	
Data - Date	14	28	28	14	28	14	28	
	lipiec - July-1961							
Wysokość npm - Altitude - m	295	325	325	295	325	295	325	
Pokrycie warstwy c - Cover of c - %	100	80	90	90	100	95	100	
Pokrycie warstwy d - Cover of d - %	50	70	40	70	60	90	30	
pH gleby - pH of soil	6,0	7,0	6,5	6,5	6,0	7,0	6,5	
Powierzchnia zdjęcia - Surface of record - m ²	1	1	1	1	1	1	1	
Ogólna liczba gatunków - Total number of species	16	15	16	13	17	16	15	
Liczba gatunków roślin naczyniowych - Number of species of vascular plants	10	11	13	9	15	14	13	
Liczba gatunków mchów - Number of moss species	6	4	3	4	2	2	2	
Gatunki charakterystyczne związku - Species characteristic of the alliance - Caricetalia davallianae i rzędu - and the order - Caricetalia davallianae								
<i>Eriophorum latifolium</i>	.	2.2	1.1	1.1	+	1.1	+	V
<i>Carex davalliana</i>	1.1	.	3.3	.	1.1	1.1	4.3	IV
<i>Melecocheris pauciflora</i>	4.3	+	2.2	1.2	3.3	.	.	IV
<i>Drepanocladus intermedius</i>	1.1	1.1	.	1.1	.	.	.	III
<i>Campyllum stellatum</i>	.	/+.	.	.	.	/+.	.	II
<i>Carex flava</i>	+	.	.	.	.	.	.	I
Gatunki charakterystyczne klasy - Species characteristic of the class - Scheuchzerio-Caricetea fuscae								
<i>Juncus articulatus</i>	2.2	1.2	3.2	5.4	2.4	2.2	2.2	V
<i>Carex fusca</i> /Of/	.	3.3	1.1	+.2	1.1	+	1.2	V
<i>Campyllum polygamum</i>	3.3	4.3	1.1	.	.	4.3	3.2	IV
<i>Campothecium nitens</i>	+	.	.	2.2	.	2.2	+	III
<i>Thuidium delicatulum</i>	1.1	.	1.1	.	.	.	.	II
sporydyczne - sporadic species: <i>Agrostis canina</i> 46a/+, <i>Carex stellulata</i> /Of/ 11a /+2., <i>Pedicularis silvatica</i> 45a/1.1/.								
Gatunki towarzyszące - Accompanying species								
charakterystyczne klasy - species characteristic of the class - Molinio-Arrhenatheretea								
<i>Sanguisorba officinalis</i>	.	+	+	.	+	+	+	IV
<i>Briza media</i>	+	.	.	.	.	+	1.2	III
<i>Salix rosmarinifolia</i>	.	+	.	.	+	.	.	II
<i>Gentiana pneumonanthe</i> /N/	.	.	.	+	+	.	.	II
<i>Molinia coerulea</i> /N/	.	.	.	.	.	+	+	II
sporydyczne - sporadic species: <i>Centaurea jacea</i> 50a/+, <i>Clinacium dendroides</i> , d 45a/+, <i>Lysimachia vulgaris</i> 45a/+, <i>Serratula tinctoria</i> /N/ 50a/+, <i>Succisa pratensis</i> /N/ 10a/+/.								
inne - other species								
<i>Cretoneurum filicinum</i>	2.2	1.1	3.3	4.4	4.4	2.3	.	V
<i>Potentilla erecta</i>	1.1	+	+	.	+	1.1	+	V
<i>Carex panicea</i>	.	1.1	+	+	2.2	.	+	V
<i>Phragmites communis</i>	1	1.1	+	1.1	.	2.1	+	V
<i>Melecocheris uniglumis</i>	1.1	2.2	.	1.1	3.3	4.4	+	V
<i>Tofieldia calyculata</i>	.	+	1.1	.	.	.	+	III
<i>Acrocladium cuspidatum</i>	.	.	.	+	.	.	.	II
<i>Ranunculus nemorosus</i>	+	.	.	.	.	.	+	II
sporydyczne - sporadic species: <i>Agrostis alba</i> 50a/+, <i>Carex montana</i> 45/+/., <i>Linum catharticum</i> 10a/+/.								

Of - gatunki charakterystyczne rzędu - species characteristic of the order - Caricetalia fuscae,

N - gatunki charakterystyczne zespołu - species characteristic of the association - Molinietum medioeuropaeum.

T a b e l a 21 - T a b l e 21

MOLINIETUM MEDIOEUROPÆUM KOCH 1926

Brzeczowy zapis - Successive number of record	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Brzeczowy zapis w terenie - Field number of record	37a	40a	41a	4a	31a	39a	25a	27a	16a	23a	24a	5a	3a	42a		
Data - Date	23	24	28	12	21	23	21	21	16	17	20	13	12	28		
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pokrycie warstwy c - Cover of c - %	100	75	100	95	100	90	90	100	80	90	100	80	70	100		
Pokrycie warstwy d - Cover of d - %	45	35	70	10	1	2	5	5	85	100	100	70	41	25		
Powierzchnia zapisu - Surface of record - m ²	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
pH gleby - pH of soil	7,0	6,5	6,5	7,0	6,5	6,5	7,0	7,0	6,5	7,0	6,5	7,0	7,0	6,5		
Ogólna liczba gatunków - Total number of species	30	24	28	30	33	29	25	26	28	29	35	39	24	25		
Liczba gatunków roślin naczyniowych - Number of species of vascular plants	28	21	24	26	31	25	22	23	25	22	30	30	21	20		
Liczba gatunków mchów - Number of moss species	2	3	2	4	2	4	3	3	3	7	5	9	3	5		
Gatunki charakterystyczne zespołu - Species characteristic of the association - i związku - and the alliance - Molinion																
Molinia caerulea	+	3,3	2,3	1,2	+	+	2,2	1,2	+2	1,2	+	+	+	+		V
Gentiana pneumonanthe	+	2,2	+	2,2	+	+	1,2	1	+	+	+	+	+	+		V
Laserpitium pratense	+1	+	+	1	+	+	+1	+	+	+	+	+	+	1,2		V
Serratula tinctoria	1,2	+	1,2	+	+	+	+	+	+	+	1,2	+	2,1	+		IV
Galium boreale	+	+	1,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		III
Scorzonera humilis	+	+	+	1	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+		II
Buccica pratensis	+	1,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Dianthus superbus	+	+	+	+	+	+	+	+	+2	+	+	+	+	+		II
Gelium carvifolia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		I
sporadyczne - sporadic species																
Gatunki charakterystyczne rzędu - Species characteristic of the order - Molinietales																
Sanguisorba officinalis	1,2	1,2	+	2,2	2,2	2,2	+1	1,2	+2	+2	+	+	+	+		V
Juncus effusus	+	2,2	+	+	+	+2	+	+	+	+	+2	2,2	+	+		II
Lychnis vulgaris	+	+	+	+	+	1,2	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Philipendula ulmaria	+	+	+	+	+	+	+	1,2	+	+	+	+	+	+		II
Equisetum palustre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		I
sporadyczne - sporadic species																
Gatunki charakterystyczne klasy - Species characteristic of the class - Molinio-Arrhenatheretea																
Briza media	2,2	+	+	2,2	2,2	+	4,3	3,2	2,2	+2	2,1	1,2	1,2	+		V
Centaurea jacea /A/	4,3	1,2	3,2	1	2,2	+	1,2	+	2,2	1	+2	+	+	+		IV
Leontodon hispidus	+	+	+	+	+2	+	1,1	+	+2	+	+1	+	+	+		IV
Holcus lanatus	+	+	+	1,2	+	1,2	+	1,2	+	5,4	4,3	4,3	+	+		III
Plantago lanceolata	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		III
Achillea millefolium /A/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+2	+	1,2	2,2		III
Ranunculus acris	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Prunella vulgaris	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Arrhenatherum elatius /A/	+	+	+	+	+2	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Olinacium dendroideum	+	+	+	+2	1,2	+	+	1,2	1,2	+	+	+	+	+		II
Cynosurus cristatus /A/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1,2	+	+	+		II
Anthoxanthum odoratum	+	+	+	1,2	+	+	+	+	+	+	+2	+	+	+		II
Cardamine pratensis	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		I
Rumex acetosa	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		I
Agrostis vulgaris	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2,2	2,2	+	+		I
Stellaria graminea /A/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		I
sporadyczne - sporadic species																
Gatunki towarzyszące - Accompanying species																
Potentilla erecta	+	1,2	+	2,1	+	2,2	1,1	+	+	+	+	1,2	+	1,2		V
Festuca ovina	2,2	+	2,2	+	4,3	+	+	+	+	+	1,2	3,2	1,2	3,3		V
Agrostis alba	+2	+	+	+	2,2	3,2	+	+	+	1	+	1,2	1	+		IV
Sieglingia decumbens	1,2	+	+	1,2	+	+	+	+	1,2	1,2	1,2	+	+	+		IV
Potentilla alba	2,2	+	+	1,2	2,2	+	+	+	+	3,2	3,3	+	3,2	1		IV
Rhytidadelphus aquarrosus	+	+	1,2	1,2	+	+	1,2	+	1,2	3,3	+	2,3	+	+		III
Ranunculus nemorosus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		III
Anacamptis palustre	1	2,2	+	+	+	2,2	+	+	+	2,2	4,4	3,3	+	2,2		III
Centaurea oxylepis	+	+	3,2	+	2,2	+	+	+	+	+	1,2	1,2	+	+		III
Acrocladium cuspidatum	+	2,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		III
Philipendula hexapetala	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2,1	+		III
Calluna vulgaris	+	+	+	1,2	+	+	+	+	+	+	+	+	2,2	+		III
Luzula multiflora	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1,2	+	+	+		III
Pimpinella saxifraga	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		III
Hieracium umbellatum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Eccleria pyramidata	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Convallaria maialis	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Pleuroxylum schreberi	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Estonica officinalis	3,3	+	+	+	+	+	+	+	4,4	+	2,2	2,2	+	+		II
Juncus articulatus	+	1,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1,2		II
Juncus articulatus	+	2,1	+	3,2	+	3,2	2,2	4,3	+	+	+	+	+	+		II
Galium verum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Peucedanum cervaria	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Campanula glomerata	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Hylocomium splendens	+	+	4,4	+	+	+	+	+	+	4,4	2,2	1	+	+		II
Phragmites communis	+	+	+	1,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1		II
Hieracium aurorum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Thymus pulegioides	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Thuidium delicatulum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Scleropodium purum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Galium palustre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Mnium rostratum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Leucobryum glaucum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1,2	+	+	+	+		II
Dicranum scoparium	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
Carex sp.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		II
sporadyczne - sporadic species:																
2x - Carex pallescens 5a/+, 24a/+, Cuscuta epithymum 24a/+, 31a/+, Dianthus undulatus, d 24a/+, 39a/+, Pissidens adiantoides, d 25a/+, 42a/+, Prunella grandiflora 16a/+, 31a/+,																
1x - Anemone nemorosa 27a/+, Anthericum ramosum 16a/4.2/, Campanula rotundifolia 42a/+, Carex acutiformis 42a/+, C.fusca 5a/+, C.panicea 42a/+, Hypericum maculatum 24a/+, Molampyrum nemorosum 31a/+, Mnium undulatum, d 5a/+, Orchis latifolia 42a/+, O.maculata 4a/+, Polygala vulgaris 3a/+, Tofieldia calyculata 16a/+, Vaccinium myrtillus 5a/+,																

A - gatunki charakterystyczne rzędu - species characteristic of the order - Arrhenatheretalia.

retalia), 2) łąki trzęślicowe (zespół *Molinietum medioeuropaeum*), 3) łąki turzycowe (zbiorowisko *Juncus articulatus* ze związku *Caricion davallianae*).

Zbiorowisko *Juncus articulatus*
ze związku *Caricion davallianae* (tab. 20)

Zbiorowisko z *Juncus articulatus* ograniczone jest bardzo do małych skrawków powierzchni położonych w rezerwacie „Łąki Sulistrowickie”. Na tego typu łąkach dominują: nadający piętno całemu zbiorowisku *Juncus articulatus* oraz liczne gatunki niskotorfowiskowe, charakterystyczne związku *Caricion davallianae*, rzędu *Caricetalia davallianae* (*Eriophorum latifolium*, *Carex davalliana*, *Drepanocladus intermedius* i inne) i klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* (*Carex fusca*, *Camptothecium nitens* i *Thuidium delicatulum*).

Poprzez liczne gatunki z klasy *Molinio-Arrhenatheretea* (np. *Sanguisorba officinalis*), a zwłaszcza z zespołu *Molinietum medioeuropaeum* (*Gentiana pneumonanthe*, *Serratula tinctoria*, *Molinia coerulea*, *Succisa pratensis*) zbiorowisko *Juncus articulatus* nawiązuje do zespołu *Molinietum*.

Wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne wykonano w rezerwacie „Łąki Sulistrowickie” na wys. ok. 300 i 330 m n.p.m. w pobliżu przepływających przez rezerwat małych strumyków.

Zespół *Molinietum medioeuropaeum* Koch. 1926 (tab. 21)

Czołową rolę w tym zbiorowisku łąkowym odgrywa silna grupa gatunków z zespołu *Molinietum medioeuropaeum* i związku *Molinion*, w której na pierwszy plan wysuwają się: *Laserpitium prutenicum*, *Gentiana pneumonanthe*, *Molinia coerulea*, *Serratula tinctoria* i *Galium boreale*. Z pozostałych gatunków właściwych zespołowi: *Dianthus superbus*, *Gladiolus paluster* i *Iris sibirica*, posiadające I i II stopień stałości, są obecnie znacznie bardziej rozpowszechnione niż w czasie kiedy wykonywano zdjęcia fitosocjologiczne. Bardzo liczne są też gatunki z rzędu *Molinietalia* (np. *Sanguisorba officinalis*, *Juncus effusus* i *Lysimachia vulgaris*) i klasy *Molinio-Arrhenatheretea* (np. *Briza media*, *Centaurea jacea*, *Leontodon hispidus* i *Holcus lanatus*).

Roślinność zielna nie tworzy tu zbyt wysokich muraw, niemniej odznacza się większym bogactwem florystycznym od zbiorowiska *Trifolium dubium*.

Łąki trzęślicowe zajmują mały teren i są zlokalizowane u podnóża góry Raduni, głównie w rezerwacie „Łąki Sulistrowickie”, gdzie wykonano wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne (300-340 m n.p.m.).

Zbiorowisko *Trifolium dubium*
z rzędu *Arrhenatheretalia* (tab. 22)

Łąki rajgrasowe tworzą płaty z bujnie rozwiniętą roślinnością zielną, której zwarcie jest bardzo duże i wynosi średnio 90-100%. Z roślin charakterystycznych związku i rzędu dominują: *Arrhenatherum elatius*, *Trifolium dubium*, *T. repens* i *Achillea millefolium*. Pozostałe gatunki ze związku i rzędu występują znacznie rzadziej i posiadają niskie stopnie stałości. Dużą przewagę osiągają gat. char. kl. *Molinio-Arrhenatheretea*: *Holcus lanatus* i *Equisetum palustre*. Omawiane zbiorowisko występuje w niższych położeniach, głównie w południowej partii masywu (mapa 10).

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych

- 145 — Gozdnicza, u podnóża góry w pobliżu drogi leśnej na pd.-zach. stoku (220 m n.p.m.),
- 148 — łąka rajgrasowa na pd.-zach. od Słupic i wsch. od Uliczna mniej więcej pośrodku między tymi osiedlami (210 m n.p.m.),
- 149 — kilkanaście metrów na południe od zdjęcia 148,
- 150 — jak wyżej,
- 151-152 — łąka w pobliżu Uliczna,
- 156 — Sucha łąka poniżej rezerwatu „Łąki Sulistrowickie” na południe od wsi Sulistrowiczki (290 m n.p.m.),
- 157 — na południe od zdjęcia poprzedniego.

Udział mchów w zbiorowiskach łąkowych kształtuje się bardzo różnorodnie i jest uzależniony w dużej mierze od stopnia wilgotności gleb. Najmniej mchów występuje na łąkach rajgrasowych (tab. 23), najsuchszych z trzech omawianych typów. Wegetuje tu tylko kilka gatunków o dosyć szerokiej skali ekologicznej, a z nich jedynie *Brachythecium rutabulum* wykazuje wyższy stopień stałości.

Wiele mchów rośnie na wilgotnych łąkach w zespole *Molinietum medioeuropaeum*. Obok 14 gatunków objętych zdjęciami fitosocjologicznymi na łąkach trzęślicowych występują jeszcze 4 dalsze gatunki: *Mnium affine*, *M. seligeri*, *Sphagnum nemoreum* i *Sph. palustre*. Największy udział w budowie tego zespołu z mchów biorą: *Rhytidiadelphus squarrosus*, *Aulacomnium palustre*, *Acrocladium cuspidatum* oraz gat. char. kl. *Molinio-Arrhenatheretea*: *Climacium dendroides*. Ponieważ łąki trzęślicowe graniczą przeważnie z borem sosnowym tworząc często duże polany śródleśne, daje się tu zauważyć znaczny procent mchów niełąkowych, zwłaszcza acidofilnych gatunków leśnych jak np.: *Dicranum scoparium*, *D. undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi* czy *Scleropodium purum*.

Bardzo dużą rolę odgrywają mchy w najwilgotniejszym zbiorowisku łąkowym, ze związku *Caricion davallianae*, którego bardzo małe fragmenty rozwijają się w miejscach zatorfionych, na podłożu obojętnym lub słabo kwaśnym (pH = 5,5-7,0). Ogólna liczba wegetujących tu mchów (8)

Tabela 22 - Table 22

ZBIOROWISKO TRIFOLIUM DUBIUM - TRIFOLIUM DUBIUM COMMUNITY

Nr kolejny zdjęcia - Successive number of record	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr zdjęcia w terenie - Field number of record	152	156	151	145	157	150	149	148	
Data - Date	26	26	26	20	26	26	26	26	
	czerwiec - June - 1968								
Wysokość n.p.m. - Altitude - m	210	230	210	220	230	210	220	210	
Pokrycie warstwy c - Cover of c - %	100	95	90	100	100	100	90	100	
Pokrycie warstwy d - Cover of d - %	20	1	5	-	41	35	-	-	
pH gleby - pH of soil	6,5	6,5	6,0	6,5	6,0	6,0	6,0	7,0	
Powierzchnia zdjęcia - Surface of record - m ²	4	6	4	9	1	4	1	1	
Łączna liczba gatunków - Total number of species	23	20	17	12	22	16	22	21	
Liczba gatunków roślin naczyniowych - Number of species of vascular plants	20	18	16	12	20	14	22	21	
Liczba gatunków mchów - Number of moss species	2	2	1	-	2	2	-	-	
Gatunki charakterystyczne związku - Species characteristic of the alliance - Arrhenatherion + rzędu - and the order - Arrhenatheretalia									
Trifolium dubium	+	+	3,3	.	+	+	2,3	1,2	V
Trifolium repens	1,2	+	.	.	+	+	1,2	+	IV
Achillea millefolium	.	+	.	.	+	+	.	+	III
Arrhenatherum elatium ⁺	.	.	.	4,4	.	.	2,2	3,4	III
Bellis perennis	+	.	.	.	+	.	.	.	II
Chrysanthemum leucanthemum	.	2,2	.	1,2	+	.	.	.	II
Taraxacum officinale	.	+	.	.	+	.	.	.	II
Mercurialis perennis ⁺	.	.	.	.	+	.	1,2	+	II
Galium mollugo ⁺	.	.	.	.	+	1,2	+	.	II
Phleum pratense	1,2	.	+	.	.	.	.	.	II
Cynosurus cristatus	.	1,2	.	+	.	.	.	.	II
Crepis biennis ⁺	.	.	.	.	1	.	.	+	II
Alchemilla pastoralis	+	.	.	.	.	.	.	.	I
Campanula patula	.	.	.	.	.	.	.	+	I
Gatunki charakterystyczne klasy - Species characteristic of the class - Molinio-Arrhenatheretea									
Molcus lanatus	2,3	3,3	1,2	1,2	5,5	4,4	2,2	3,4	V
Equisetum palustre /N/	1,2	+	1,2	.	1,2	.	+	+	IV
Poa pratensis	.	+	.	.	.	.	+	+	IV
Cerastium vulgatum	.	+	.	.	.	.	+	+	IV
Lychnis flos-cuculi /N/	3,3	.	2,3	.	.	.	.	.	II
Alopecurus pratensis	+	.	.	.	.	.	+	+	II
Cirsium oleraceum /N/	+	.	.	.	.	.	+	+	II
Ranunculus acer	.	.	.	.	.	.	+	+	II
Dactylis glomerata	.	.	.	2,3	.	.	+	+	II
Juncus effusus /N/	1,3	.	1,3	.	.	.	.	.	II
Fumaria vulgaris	.	+	.	.	1,2	.	.	.	II
Rumex acetosa	.	.	+	.	.	.	+	+	II
Anthoxanthum odoratum	.	.	.	.	.	1,2	+	+	II
Plantago lanceolata	.	.	.	.	.	.	+	1,2	II
sporadyczne - sporadic species									
Lathyrus pratensis 151/+, Lolium perenne 152/+, Lotus uliginosus 157/+, /N/, Polygonum bistorta 151/+, Sanguisorba officinalis 145/+, /N/, Trifolium pratense 152/+.									
Gatunki towarzyszące - Accompanying species									
Ranunculus repens	3,4	3,3	2,4	.	1,2	1	+	2,3	V
Agrostis alba	+	+	.	.	+	+	+	+	IV
Brachythecium rutabulum	2,2	+	1,2	.	+	3,3	.	.	IV
Rumex acetosella	+	+	.	.	1,2	.	.	.	III
Glechoma hederacea	+	.	.	.	.	.	+	+	II
Lotus corniculatus	+	.	+	.	.	.	.	.	II
Hypochaeris radicata	.	2,2	.	.	+	.	.	.	II
Sagina procumbens	.	+	.	.	+	.	.	.	II
Atrichum undulatum	.	+	.	.	+	.	.	.	II
Veronica chamaedrys	.	.	.	.	.	2,2	+	.	II
Vicia sativa	.	.	.	.	.	.	1,2	+	II
sporadyczne - sporadic species:									
Aegopodium podagraria 149/+, Agropyron repens 157/+, Anemone nemorosa 148/+, Carex panicea 145/+, Eriophorum stokesii var. gracilescens, d 150/+, Festuca rubra 145/+, Hypericum maculatum 145/2,2/, Lysimachia nummularia 148/+, Mniun punctatum, d 152/+, Myosotis arvensis 152/+, M. collina 156/+, Oxalis acetosella 157/2,2/, Pimpinella saxifraga 148/+, Rumex crispus 151/+, Salix alba 151/+, Trifolium hybridum 151/+, Tripleurospermum inodorum 157/+, Veronica serpyllifolia 152/+.									

M - gatunki charakterystyczne rzędu - species characteristic of the order - Molinietales.

Tabela 23 - Table 23

Udział mchów w zbiorowiskach łąkowych

Participation of mosses in meadow communities

Gatunek mchu Moss species	Arrhenatheretalia	Molinietum rediosurop.	Caricion davallianae
<i>Brachythecium rutabulum</i>	IV		
<i>Atrichum undulatum</i>	II		
<i>Burhynchium stokesii</i> var. <i>gracilescens</i>	I		
<i>Mnium punctatum</i>			
<i>Aulacomnium palustre</i>		III	
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>		III	
<i>Dicranum scoparium</i>		II	
<i>Hylocomium splendens</i>		II	
<i>Leucobryum glaucum</i>		II	
<i>Mnium rostratum</i>		II	
<i>Fleurozium schreberi</i>		II	
<i>Scleropodium purum</i>		II	
<i>Dicranum undulatum</i>		I	
<i>Mnium undulatum</i>		+	
<i>Mnium affine</i>		+	
<i>Mnium seligeri</i>		+	
<i>Acrocladium cuspidatum</i>		III	II
<i>Thuidium delicatulum</i>		II	II
<i>Climacium dendroides</i>		II	I
<i>Fissidens adiantoides</i>		I	+
<i>Sphagnum nemoreum</i>		+	+
<i>Sphagnum palustre</i>		+	+
<i>Cratoneurum filicinum</i>			V
<i>Campylium polygamum</i>			IV
<i>Campithecium nitens</i>			III
<i>Drepanocladus intermedius</i>			III
<i>Campylium stellatum</i>			II
<i>Bryum ventricosum</i>			+
<i>Drepanocladus aduncus</i> var. <i>gracilescens</i>			+
<i>Sphagnum robustum</i>			+

+ - wystąpienia poza zdjęciami fitosocjologicznymi
beyond the phytosociological
records

Ryc. 5. Występowanie mchów w zbiorowiskach łąkowych
Occurrence of mosses in meadow communities

jest wprawdzie mniejsza niż na łąkach trzęślicowych, jednak biorąc pod uwagę rolę i charakter rosnących na nich gatunków, pierwsze miejsce trzeba przyznać łąkom turzycowym. W skład bogato rozwiniętej warstwy mszystej wchodzi: *Cratoneurum filicinum* oraz wiele mchów charakterystycznych: *Drepanocladus intermedius*, *Campylium stellatum* (char. zw. *Caricion davallianae*), *Campothecium nitens*, *Campylium polygamum* i *Thuidium delicatulum* (char. kl. *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*) — ryc. 5.

5. Murawy kserotermiczne

Zbiorowisko *Festuca pallens* z rzędu *Festuco-Sedetalia* (tab. 24)

Murawy kserotermiczne reprezentują zbiorowisko *Festuca pallens* z rzędu *Festuco-Sedetalia* i klasy *Festuco-Brometea*. Tworzy ono niewielkie, nasłonecznione polanki leżące w szczytowych partiach wzgórz serpentynitowych: Gozdnika, Raduni i Gór Kielczańskich sąsiadujących z badanym terenem.

Zbiorowisko z *Festuca pallens* przedstawia murawy niezbyt wysokie dochodzące najwyżej do 40 (50) cm wys. Decydującą rolę w jego budowie odgrywają trawy: *Festuca pallens* (V st. stałości), *Phleum boehmeri* (IV) i *Poa compressa* (III). Najwyższe stopnie stałości z gatunków charakterystycznych osiągają jeszcze: *Ceratodon purpureus* (char. rz.) — V, *Euphorbia cyparissias* — V i *Dianthus carthusianorum* — IV (char. kl.).

Oprócz gatunków charakterystycznych z klasy *Festuco-Brometea*, nadających piętno temu zbiorowisku, rosną też inne, przywiązane do suchych siedlisk jak np. *Arenaria serpyllifolia*, *Thymus pulegioides* oraz sukulenty: *Sedum acre*, *S. maximum*.

Ponieważ opisywanie murawki prawie wszędzie kontaktują bezpośrednio ze świetlistą dąbrową, znajdujemy tu kilka gatunków charakterystycznych zespołu *Potentillo albae-Quercetum* i rzędu *Quercetalia pubescentis*: *Geranium sanguineum*, *Hypericum montanum*, *Potentilla alba* i *Trifolium alpestre*.

Z aspektów sezonowych w zbiorowisku *Festuca pallens* wymienić należy: wczesnowiosenny, gdy kwitną pięciorniki (*Potentilla heptaphylla* i *P. arenaria*) oraz letni, nadany zbiorowisku przez kwitnące: *Dianthus carthusianorum*, *Euphorbia cyparissias* i *Veronica spicata*, jak również przez sinozielone kępy *Festuca pallens*.

Udział mchów w tym zbiorowisku jest bardzo mały; z sześciu bytujących tu gatunków tylko jeden — *Ceratodon purpureus*, charakterystyczny rzędu *Festuco-Sedetalia*, występuje często. Jest on obecny we wszystkich zdjęciach, nie wykazuje jednak dużego pokrycia. Pozostałe mchy: *Hypnum cupressiforme*, *Polytrichum juniperinum*, *Bryum caespiticium*, *Brachythecium albicans* i *Dicranum scoparium*, pojawiają się tu sporadycznie.

Tabela 24 - Table 24

ZBIOROWISKO *FESTUCA PALLENS* - *FESTUCA PALLENS* COMMUNITY

Nr kolejny zdjęcia - Successive number of record	1	2	3	4	5	Presence degree
Nr zdjęcia w terenie - Field number of record	74	78	79	80	68	
Data - Date	5	6	6	6	4	
lipiec - July - 1967	340	570	570	570	315	
SW S S S -	87	8	8	8	-	
Wysokość n.p.m. - Altitude - m	40	25	45	35	-	s t a l o s c
Ekspozycja - Exposure	100	60	65	50	80	
Nachylenie stoku - Inclination of slope	3	5	21	5	20	
Pokrycie warstwy c - Cover of c	30	48	30	30	10	
Pokrycie warstwy d - Cover of d	23	23	23	20	18	
Powierzchnia zdjęcia - Surface of record - m ²	22	21	22	17	13	s t a l o s c
Ogólna liczba gatunków - Total number of species	1	2	1	3	5	
Liczba gatunków roślin naczyniowych - Number of species of vascular plants						
Liczba gatunków mchów i porostów - Number of species of moss and Lichens						
Gatunki charakterystyczne rzędu - Species characteristic of the order - Festuco-Sedetalia						V III II
Ceratodon purpureus d	+	+	+	+	2.2	
Trifolium arvense	.	.	.	.	.	
Sedum acre	.	.	+	+	.	
Gatunki charakterystyczne klasy - Species characteristic of the class - Festuco-Brometea						V V IV IV III III III II II II I
<i>Festuca pallens</i>	2.2	+	2.2	3.4	2.2	
<i>Euphorbia cyparissias</i>	1	+	+	2.2	+	
<i>Dianthus carthusianorum</i>	+	1.2	+	+	.	
<i>Phleum boeumeri</i>	4.4	+	1.2	+	.	
<i>Poa compressa</i>	+	.	+	.	2.2	III III III II II II I
<i>Potentilla heptaphylla</i>	.	+	2.2	+	.	
<i>Veronica spicata</i>	.	+	+	.	2.2	
<i>Filipendula hexapetala</i>	+	.	.	+	.	
<i>Potentilla arenaria</i>	3.3	.	.	.	5.5	
<i>Ajuga genevensis</i>	.	+	.	.	+	II II II I I
<i>Helianthemum ovatum</i>	1.2	.	.	.	.	
<i>Centaurea rhanana</i>	+	.	.	.	.	
Gatunki towarzyszące - Accompanying species						
<i>Galium verum</i>	+	2.2	1	+	+	V IV III III III III II II II II II II
<i>Achillea millefolium</i>	.	+	+	+	+	
<i>Thymus pulegioides</i>	3.3	+	3.2	.	.	
<i>Veronica arvensis</i>	+	+	.	.	.	
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	3.3	+	3.2	.	.	
<i>Viscaria vulgaris</i>	+	.	1.2	+	.	III II II II II II II II II II II II
<i>Agrostis vulgaris</i>	.	+	+	.	.	
<i>Geranium sanguineum</i>	.	+	+	.	.	
<i>Sedum maximum</i>	.	+	+	.	.	
<i>Allium montanum</i>	.	.	+	+	.	
<i>Potentilla alba</i>	.	.	+	+	.	II II II II II II II II II II II II
<i>Cladonia</i> sp. d	.	.	.	.	+	
<i>Hypnum cupressiforme</i> d	.	.	.	+	+	
sporadyczne - sporadic species:						
<i>Alectorolophus glaber</i> 74/+, <i>Asperula tinctoria</i> 80/+, <i>Asplenium septentrionale</i> 80/+, <i>Avenastrum pubescens</i> 74/+, <i>Brachythecium albicans</i> d 78/+, <i>Briza media</i> 74/+, <i>Bryum caespitium</i> d 68/+, <i>Calamagrostis epigeios</i> 68/1.3/, <i>Dicranum scoparium</i> d 80/+, <i>Euphrasia rostkoviana</i> 74/+, <i>Genista tinctoria</i> 74/+, <i>Hypericum montanum</i> 68/+, <i>H. perforatum</i> 79/+, <i>Laserpitium latifolium</i> 78/+, <i>Lotus corniculatus</i> 68/2.2/, <i>Luzula campestris</i> 68/+, <i>Plantago lanceolata</i> 78/+, <i>Polytrichum juniperinum</i> d 68/1.2/, <i>Sagina procumbens</i> 78/+, <i>Senecio jacobaea</i> 68/+, <i>Thesium alpinum</i> 80/+, <i>Trifolium alpestre</i> 79/+, <i>T. campestre</i> 74/+, <i>Verbascum nigrum</i> 78/+, <i>Veronica chamaedrys</i> 78/+, <i>Vicia cracca</i> 74/+,						

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych

- 68 — Gozdnik, murawa kserotermiczna na szczycie góry,
 74 — Góry Kielczańskie, słoneczna polana zboczowa powyżej Gogołowa przy żółtym szlaku turystycznym (340 m n.p.m.),
 78 — Radunia, murawa na szczycie (570 m n.p.m.),
 79 — Radunia, poniżej zdjęcia 78, na stoku południowym,
 80 — Radunia, sucha polana wśród świetlistej dąbrowy (570 m n.p.m.),

Fot. 2 Zbiorowisko *Festuca pallens* z rzędu *Festuco-Sedetalia* na szczycie Raduni
Festuca pallens community of the order *Festuco-Sedetalia* on the summit of Radunia

Fot. 3. Fragment zespołu *Asplenietum cuneifolii* z widocznym *Asplenium adiantum-nigrum* pod szczytem Raduni
 A patch of the *Asplenietum cuneifolii* ass. near the summit of Radunia with *Asplenium adiantum-nigrum*

Zespół *Asplenietum cuneifolii* Gaubl. 1954 (tab. 25)

Zespół *Asplenietum cuneifolii*, opisany po raz pierwszy przez Gauchera (cyt. Oberdorfer 1957) z północnej Bawarii, w masywie Ślęży wykształcony jest fragmentarycznie i obejmuje 27 gat. Występowanie jego ograniczone jest tu wyłącznie do podłoża serpentynitowego. Jak podaje Matuszkiewicz (1967) jest to jedyna w Polsce lokalizacja zespołu *Asplenietum cuneifolii*.

Tabela 25 - Table 25

ASPLENIETUM CUNEIFOLII GAUCL. 1954

Nr kolejny zdjęcia - Successive number of record Nr zdjęcia w terenie - Field number of record Data - Date	1	2	3	4	5	6	7	Presence degree
lipiec - July - 1967	67	70	82	69	85	81	84	
Wysokość npm. - Altitude - m	4	6	4	6	6	6	6	
Ekspozycja - Exposure	260	310	570	315	480	570	560	
Pokrycie ogólne - Total plant cover - %	SW	N	W	NW	NE	S	S	
Pokrycie warstwy o - Cover of o - %	90	100	25	50	42	20	20	
Pokrycie warstwy d - Cover of d - %	80	90	10	50	40	20	20	
Powierzchnia zdjęcia - Surface of record - dm ²	40	60	20	5	5	1	3	
Ogólna liczba gatunków - Total number of species	2	12	8	8	10	12	12	
Liczba gatunków roślin naczyniowych - Number of species of vascular plants	10	11	9	6	5	3	3	
Liczba gatunków mchów i porostów - Number of species of moss and Lichens	6	4	5	2	2	2	2	
	4	7	4	4	3	1	1	
Gatunki charakterystyczne zespołu - Species characteristic of the association								
D. Fissidens cristatus d	2.1	+	.	.	+	.	+	III
Asplenium cuneifolium	5.5	.	2.2	.	3.3	.	.	III
Gatunki charakterystyczne związku - Species characteristic of the alliance - Androsacion vandellii - i rzędu - and the order - Androsacetalia vandellii								
Asplenium onopteris	+	5.5	.	.	.	.	.	II
Asplenium adiantum-nigrum	.	+	.	3.3	.	.	.	II
Asplenium septentrionale	.	.	2.2	.	.	2.2	.	II
Gatunki charakterystyczne klasy - Species characteristic of the class - Asplenietea rupestris								
Polypodium vulgare	.	.	+	.	.	1.2	1.2	III
Asplenium trichomanes	.	.	.	.	1.3	.	2.2	III
Gatunki towarzyszące - Accompanying species								
Hypnum cupressiforme d	.	+	1.2	+	1.2	.	.	III
Bryum capillare d	3.3	.	+	.	.	.	.	II
Festuca pallens	+	.	.	+	.	.	.	II
Ceratodon purpureus d	.	4.4	2.2	.	.	.	.	II
Cladonia chlorophaea d	.	+	.	+	.	.	.	II
Brachythecium velutinum d	.	+	.	.	+	.	.	II
sporadyczne - sporadic species: Achillea millefolium 70/+, Atrichum undulatum, d, 70/+, Brachythecium albicans, d, 67/1.1/, E. rutabulum, d, 70/+, Campanula rotundifolia 82/+, Ctenidium molluscum, d, 82/+, Encalypta contorta, d, 81/+, Hypericum montanum 70/+, Hypnum cupressiforme var. lacunosum, d, 67/1.1/, Pimpinella saxifraga 67/+, Poa compressa 67/+, Pohlia nutans, d, 69/2.2/, Polytichum piliferum, d, 69/+, Sedum sexangulare 67/+.								

Asplenietum cuneifolii rośnie w płytkich szczelinach wypełnionych znaczną ilością humusu, przeważnie w miejscach odsłoniętych. Otoczenie skał, w szczelinach których rozwija się omawiany zespół, jest bardzo różnorodne. Przeważnie są to suche murawy szczytowe (Gozdnik, czę-

Fot. 4. Fragment zespołu *Asplenietum cuneifolii* z widocznym *Asplenium septentrionale* pod szczytem Raduni

A patch of the same association near the summit of Radunia with *Asplenium septentrionale*

ściowo Radunia), niekiedy świetlista, karłowata dąbrowa (Radunia), zaś w jednym przypadku nieczynny kamieniołom (Gozdnik, powyżej Przełomu).

W skład zespołu najczęściej wchodzi paprocie serpentynitowe: *Asplenium cuneifolium* (char. zesp.), *A. onopteris*, *A. adiantum-nigrum* (char. zw. *Androscacion vandellii*), a z pozostałych gat. char.: *Asplenium septentrionale* (char. zw.), *A. trichomanes* i *Polypodium vulgare* (char. klasy *Asplenietea rupestris*).

Wśród 13 mchów, ze znacznym udziałem występują dwa gatunki: *Hypnum cupressiforme* i *Fissidens cristatus* (III st. stałości). Podczas gdy pierwszy jest gatunkiem wszechobecnym, rosnącym w większości zbitych zbiorowisk, to *Fissidens cristatus* bardzo silnie wyodrębnia zespół *Asplenietum cuneifolii* i poza nim nie jest w masywie Ślęży spotykany. Dlatego mech ten uznano jako lokalnie wyróżniający zespół paproci serpentynitowych. Podobnie *Ctenidium molluscum* związany jest tylko z tym zespołem, lecz występuje tu w minimalnych ilościach. Nieco częstsze są: *Ceratodon purpureus*, *Bryum capillare* i *Brachythecium velutinum*.

- 67 — Gozdnik, płytka szczelina skalna w otwartym miejscu na stromej ścianie nieczynnego kamieniołomu, w pobliżu wsi Przemiłów, na pd.-zach. zboczu góry (260 m n.p.m.),
- 69 — Gozdnik, szczelina skał serpentynitowych na szczycie (315 m n.p.m.),
- 70 — Gozdnik, poniżej zdjęcia 69, pod szczytem (310 m. n.p.m.),
- 81 — Radunia, szczelina skalna w świetlistym lesie dębowym, pod szczytem góry, stok południowy (570 m n.p.m.),
- 82 — Radunia, niewielka szczelina skalna wśród dużych bloków serpentynitowych w świetlistej dąbrowie, stok zachodni (570 m n.p.m.),
- 84 — Radunia, jak zdjęcie 82, stok południowy (560 m n.p.m.),
- 85 — Radunia, szczelina skalna w zacienionym miejscu w lesie dębowym, stok północno-wschodni (480 m n.p.m.).

Istnieją wyraźne różnice w składzie roślinności szczelin skalnych na podłożu serpentynitowym i gabra. Na serpentynitach dominantami są rośliny naczyniowe, z których na pierwszy plan wysuwają się paprocie. Szczeliny skalne wśród głazów gabra, w szczytowej partii Słęzy, są znacznie głębsze, lecz posiadają mniejszą ilość humusu. W związku z tym gromadzą się tu przeważnie mszaki, tworząc często jednogatunkowe skupienia (zwłaszcza wątrobowce), natomiast roślinność wyższa nie ma dobrych warunków rozwoju.

Fot. 5. Głębokie szczeliny skał gabra pod szczytem Słęzy
Deep srevices in gabra rocks near the summit of Słęża

Najgłębiej (ok. 1 m), gdzie dochodzi tylko niewielka ilość promieni świetlnych, spotkano wątrobowce: *Diplophyllum albicans*, *Lepidozia reptans* oraz mech *Isopterygium elegans*. Na mniejszych głębokościach (ok. 50 cm) rosną, oprócz wymienionych, *Cynodontium polycarpum*, *Georgia pellucida*, *Plagiothecium denticulatum*, *Pl. laetum* i wątrobowce: *Calypogeia meylani* oraz *C. trichomanis*; bardzo płytko występują: *Brachythecium velutinum*, *Rhabdoweisia crispata*, *Rhabdoweisia fugax*, *Pl. curvifolium* i inne (ryc. 6).

Ryc. 6. Występowanie mszaków w szczelinach skał gabra w zależności od ich głębokości

Occurrence of mosses in the rock fissures of gabbro on dependent from depth of fissures

W szczelinach skał amfibolitu znaleziono tylko kilka gatunków mchów, np. *Amblystegium serpens* i *Brachythecium velutinum*, skały granitowe zaś tworzą nieliczne załomy, które najczęściej są pozbawione roślinności.

Najpospolitszymi w masywie Ślęży gatunkami szczelinowymi, występującymi między skałami gabra, amfibolitu i serpentynitu, są: *Brachythecium velutinum*, *Ceratodon purpureus* i *Pohlia nutans* (tab. 26).

Tabela 26 - Table 26

Zależność brioflory szczelin skalnych od rodzaju skały
Dependence of bryoflora of the rock fissures
on the kind of rocks

Rodzaj skały Kind of rock	Gabro Gabbro	Amfibolit Amphibolite	Serpentyt Serpentine marble
Gatunek mchu Moss species			
<i>Bryum capillare</i> var. <i>flaccidum</i>	+		
<i>Cynodontium polycarpum</i>	+		
<i>Dicranum scoparium</i>	+		
<i>Fissidens taxifolius</i>	+		
<i>Georgia pellucida</i>	+		
<i>Isoeterygium elegans</i>	+		
<i>Plagiothecium curvifolium</i>	+		
<i>Pl. denticulatum</i>	+		
<i>Pl. platyphyllum</i>	+		
<i>Rhabdoweisia crispata</i>	+		
<i>Rh. fugax</i>	+		
<i>Rhacomitrium heterostichum</i>	+		
<i>Plagiothecium laetum</i>	+	+	
<i>Brachythecium velutinum</i>	+	+	+
<i>Ceratodon purpureus</i>	+	+	+
<i>Pohlia nutans</i>	+	+	+
<i>Amblystegium serpens</i>		+	+
<i>Atrichum undulatum</i>			+
<i>Aulacomnium androgynum</i>			+
<i>Brachythecium albicans</i>			+
<i>B. rutabulum</i>			+
<i>Bryum capillare</i>			+
<i>Otenidium molluscum</i>			+
<i>Encalypta contorta</i>			+
<i>Fissidens bryoides</i> var. <i>intermedius</i>			+
<i>P. cristatus</i>			+
<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>lacunosum</i>			+
<i>Hypnum cupressiforme</i>			+
<i>Polytrichum piliferum</i>			+

7. Pola

Zbiorowisko *Centaurea cyanus* ze związku *Secalione* (tab. 27)

Zbiorowisko segetalne ze związku *Secalione* rozmieszczone jest w niższych położeniach, u podnóży wzgórz i obejmuje uprawy pszenicy i owsa. Otacza ono od północy Ślęzę w pobliżu wsi: Biała, Chwałków i Górka, występuje również na zboczach Raduni koło Tapadeł oraz na południe od Sulistrowiczek i na północ od Słupic.

Zachwaszczenie pól tego rejonu jest niewielkie, liczba gatunków w poszczególnych zdjęciach wynosi 19-30, a większość z nich stanowią chwasty obligatoryczne.

Najważniejszą rolę w zbiorowisku odgrywają: z gat. char. zw. *Secalione-Centaurea cyanus* (IV st. stałości), rzędu *Secali-Violetalia arvensis* — *Myosotis arvensis* (V), *Spergula arvensis* (V), *Polygonum tomentosum* (IV) i klasy *Rudero-Secalietea* — *Tripleurospermum inodorum* (V) i *Polygonum aviculare* (IV).

Na 73 rośliny naczyniowe w zbiorowisku tym stwierdzono zaledwie 8 gatunków mchów, które, poza *Ceratodon purpureus* (III) i *Bryum argenteum* (II), występują sporadycznie.

Również na polach, lecz poza zdjęciami fitosocjologicznymi, żyje jeszcze kilka innych gatunków mchów jak: *Brachythecium albicans*, *Bryum*

EBIOROWISKO CENTAUREA CYANUS - CENTAUREA CYANUS COMMUNITY

So. - gatunki charakterystyczne związku - species characteristic of the alliance - Scleranthion
T. - " " " " " " " " " " - Triticion

capillare, *Dicranella subulata*, *Ditrichum tenuifolium*, *Funaria hygrometrica*, *Phascum acaulon*, *Physcomitrium pyriforme* i *Pohlia nutans*; na brzegach pól — *Cirriphyllum piliferum*. Prawie wszystkie one, podobnie jak gatunki objęte tabelą, występują na niewielu stanowiskach i w bardzo małej ilości okazów. Z ostatnio wymienionych mchów, tylko 2 gatunki: *Ditrichum tenuifolium* i *Phascum acaulon* związane są wyłącznie ze zbiorowiskiem segetalnym.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych

- 71 — Przemilów, pole w pobliżu wsi, przy drodze prowadzącej do Księginic (230 m n.p.m.),
- 72 — Przemilów, kilkanaście metrów dalej od zdjęcia 71 w kierunku Księginic (230 m n.p.m.),
- 101 — Radunia, pole u podnóża góry, st. pn.-zach., przy niebieskim szlaku turystycznym (380 m n.p.m.),
- 104 — Górka, pole w pobliżu wsi (210 m n.p.m.),
- 105 — Chwałków, na południe od osiedla, u podnóża Ślęzy (200 m n.p.m.),
- 106 — na pd.-zach. od zdjęcia poprzedniego, w pobliżu wsi Biała,
- 110-111 — Sulistrowiczki, pola na południe od wsi (290 m n.p.m.),
- 119 — Słupice, na zachód od osady (250 m n.p.m.).

B. ZWIĄZANE ZBIOROWISKA MSZAKÓW

Wśród związanych zbiorowisk mszaków wydzielono następujące:

1. na skałach
 - zbiorowisko *Cynodontium polycarpum* z dwoma wariantami:
z *Hedwigia albicans* i z *Rhacomitrium lanuginosum*
 - zbiorowisko *Paraleucobryum longifolium*
2. na butwiejących pniakach
 - zbiorowisko *Ceratodon purpureus*-*Hypnum cupressiforme*
 - zbiorowisko *Lophocolea heterophylla*
 - zbiorowisko *Pohlia nuntans*-*Dolichotheca silesiaca*
3. na brzegach dróg leśnych
 - zbiorowisko *Dicranella heteromalla*-*Polytrichum attenuatum* z dwoma wariantami:
z *Mnium hornum* i z *Leucobryum glaucum*

Zbiorowiska potokowe i epifityczne na badanym terenie rozwinięte są bardzo słabo.

1. Zbiorowiska epilityczne

Jak już podano w części ogólnej, w skład masywu Ślęzy wchodzi cztery rodzaje skał: kwaśna — granit, obojętne — gabbro i amfibolit oraz skała zasadowa — serpentynit. Pod względem zajmowanej powierzchni

T a b e l a 28 - T a b l e 28
 Udział mchów w wyróżnionych zbiorowiskach roślin naczyniowych
 Participation of mosses in the vascular plants communities distinguished

Z b i o r o w i s k a C o m m u n i t i e s	L a s y F o r e s t s	Drugi leśne Wood- paths	Ł a k i M e a d o w s	Mura- wy Turfa	Szcze- liny skalne rock fissu- res	Pola Piel- da					
Liczba zdjęć fitosocjolog. Number of phytosoc. record	12	13	14	13	14	7	8	5	7	9	
Liczba gat. roślin nacz. Number of species of vascular plants	26	48	61	30	77	27	59	48	13	72	
Numer tabeli Table number	16	17	18	19	21	20	22	24	25	27	
Gatunki mchów Moss species	Wyróżnione jednost- ki fitosocjolog. Phytosociological units distin- guished	Leucobryo - Pinetum	Melico - Fagetum	Potentillo albae - Quercetum	Sagino - Bryetum	Molinietum medicuropaeum	Zbiorowisko ze związku Community of the alian- ce-Caricion davallianae	Zbiorowisko z rzędu Community of the order Arrhenatheretalia	Zbiorowisko z rzędu Community of the order Festuco - Sedetalia	Asplenietum cuneifolii	Zbiorowisko ze związku Community of the alian- ce - Secalione
Plagiothecium curvifolium	I										
Pleurozium schreberi	II					II					
Leucobryum glaucum	II					II					
Mnium hornum		I									
Plagiothecium denticulatum				II							
Syntrichia ruralis				I							
Dicranella heteromalla	I	I									
Polytrichum attenuatum	I	I		II							
Dicranum scoparium	I	I		II							
Pohlia nutans	I	I									
Atrichum undulatum	I	I		I							
Brachythecium velutinum											
Ceratodon purpureus				II							
Hypnum cupressiforme	I	II		II							
Brachythecium albicans				IV							
Polytrichum juniperinum				IV							
Bryum caespiticium				II							
Brachythecium rutabulum				I							
Bryum argenteum				I							
Eurhynchium stokesii var. gracilescens				I							
Pottia truncatula				II							
Eurhynchium Swartzii											
Amblystegium juratzkanum											
Fissidens cristatus											
Bryum capillare											
Otenidium molluscum											
Encalypta contorta											
Hypnum cupressiforme var. lacunosum											
Polytrichum piliferum											
Hypnum arcuatum											
Mnium affine											
Mniobryum albicans											
Pogonatum aloides											
Polytrichum gracile											
Acrocladium cuspidatum											
Climacium dendroides											
Aulacomnium palustre											
Rhytidiadelphus squarrosus											
Hylacomium splendens											
Mnium rostratum											
Scleropodium purum											
Dicranum undulatum											
Fissidens adiantoides											
Mnium undulatum											
Thuidium delicatulum											
Cratoneurum filicinum											
Campylium polygamum											
Campythecium nitens											
Drepanocladus intermedius											
Campylium stellatum											
Mnium punctatum											
Liczba gatunków mchów Number of moss species	9	7	7	20	14	8	4	6	13	8

Mapa 9. Rozmieszczenie wyróżnionych zbiorowisk roślin naczyniowych

1 — zesp. *Asplenietum cuneifolii*; 2 — zesp. *Leucobryo-Pinetum*; 3 — zesp. *Melico-Fagetum*; 4 — zesp. *Molinietum medioeuropaeum*; 5 — zesp. *Potentillo albae-Quercetum*; 6 — zesp. *Sagino-Bryetum*; 7 — zbior. ze związku *Caricion davallianae*; 8 — zbior. ze związku *Secalion*; 9 — zbior. z rzędu *Arrhenateretalia*; 10 — zbior. z rzędu *Festuco-Sedetalia*

Distribution of the described communities of vascular plants:

1 — *Asplenietum cuneifolii*; 2 — *Leucobryo-Pinetum*; 3 — *Melico-Fagetum*; 4 — *Molinietum medioeuropaeum*; 5 — *Potentillo albae-Quercetum*; 6 — *Sagino-Bryetum*; 7 — community of the alliance *Caricion davallianae*; 8 — community of the alliance *Secalion*; 9 — community of the order *Festuco-Sedetalia*

(mapa 2) najmniej udział posiadają tu amfibolity (Wieżyca, Gozdnicza, Stolina), gabra i granit reprezentowane są w mniej więcej jednakowym stosunku, zaś przeważa nad nimi serpentynit.

Zbiorowiska naskalne włączono do związanych zbiorowisk mszaków, ponieważ rozwijają się one na skałach położonych w lasach.

T a b e l a 29 - T a b l e 29

Zależność występowania mchów naskalnych od rodzaju skały

Dependence of the occurrence of epilithic mosses upon kind of rocks

Rodzaj skały Kind of rock	Kwaśne Acid	Obojętne Neutral	Zasadowe Basic
	Granit	Gabro	Serpentynit
Gatunek mchu Species of moss	Granite	Gabbro	Amphibolite Serpentine marble
Orthotrichum diaphanum	+		
Andreaea petrophila for.acuminata		+	
Brachythecium geheebii		+	
Brachythecium reflexum		+	
Brachythecium starkei		+	
Bryum argenteum		+	
Drepanocladus uncinatus		+	
Encalypta contorta		+	
Erythrophyllum rubellum		+	
Grimmia mühlenbeckii		+	
Grimmia trichophylla		+	
Homalothecium sericeum		+	
Hypnum cupressiforme var.uncinatum		+	
Leskeella nervosa		+	
Mnium stellare		+	
Rhabdoweisia lagax		+	
Rhacomitrium ramulosum		+	
Rhacomitrium sudeticum		+	
Dicranodontium denudatum			+
Hedwigia albicans for.secunda		+	+
Isoetecium myurum		+	+
Mnium cuspidatum		+	+
Amblystegium juratzkanum		+	+
Bryum caespiticium		+	+
Dicranoweisia cirrata		+	+
Isopterygium elegans var.nanum		+	+
Pterigynandrum filiforme		+	+
Aulacomnium androgynum			+
Brachythecium albicans var.julaceum			+
Brachythecium populeum for.subfulcata			+
Orthotrichum anomalum			+
Tortula muralis			+
Cynodontium polycarpum	+	+	
Cynodontium polycarpum var.strumiferum	+	+	
Isopterygium elegans	+	+	
Rhacomitrium lanuginosum	+	+	
Andreaea petrophila	+	+	+
Rhacomitrium heterostichum	+	+	+
Antitrichia curtipendula		+	+
Ceratodon purpureus for.obtusifolia		+	+
Grimmia apocarpa		+	+
Heterocladium heteropterum		+	+
Mnium punctatum		+	+
Orthodicranum montanum		+	+
Syntrichia ruralis		+	+
Anomodon attenuatus			+
Brachythecium rutabulum			+
Brachythecium velutinum			+
Bryum capillare var.flaccidum			+
Brachythecium populeum	+	+	+
Brachythecium salebrosum	+	+	+
Bryum capillare	+	+	+
Grimmia pulvinata	+	+	+
Polytrichum piliferum		+	+
Ceratodon purpureus	+	+	+
Dicranum scoparium	+	+	+
Grimmia hartmanii	+	+	+
Hedwigia albicans	+	+	+
Hypnum cupressiforme	+	+	+
Paraleucobryum longifolium	+	+	+
Plagiothecium laetum	+	+	+
Fohlia nutans	+	+	+
Razem Total	15	47	28

Zdecydowana większość epilitów porasta skały gabra (47 taks.). Najmniej mchów (15) znaleziono na podłożu granitowym (tab. 29). Przyczyny tego należy szukać prawdopodobnie w mniejszej ilości wychodni skał i głazów granitowych rozproszonych najczęściej w cienistych lasach,

przeważnie świerkowych, na północno-zachodnim stoku Ślęży. Ponadto tylko jedna ekspozycja (NW) i brak skałek granitowych w szczytowych partiach wzgórz, wpływają na mniejszą różnorodność brioflory. Dominują tu mchy rosnące na wszystkich czterech rodzajach skał, np.: *Ceratodon purpureus*, *Grimmia hartmanii*.

Skały serpentynitowe żywią w stosunku do zajmowanego terenu, nie-dużą ilość epilitów (29). Tłumaczyć to można m.in. suchością i oligotrofizmem podłoża, jak również tzw. kompleksem serpentynitowym nie sprzyjającym rozwojowi roślinności (Sarosiek 1964). Zauważono, że niektóre osobniki *Hedwigia albicans* pochodzące z podłoża serpentynitowego wykazywały karłowatość w porównaniu z okazami zebranymi z innych skał. Wyłącznie na serpentynitach znaleziono m. in. *Orthotrichum anomalum*, *Tortula muralis* oraz, uważany za gatunek acidofilny, *Aulacomnium androgynum*.

Obserwując sukcesje mchów na skałach stwierdzono, że gatunkami pionierskimi są najczęściej: *Grimmia pulvinata* i inne gatunki z tego rodzaju, *Hedwigia albicans*, *Ceratodon purpureus* i *Hypnum cupressiforme*. Zasiedlają one początkowo spękania skalne, a później wchodzi na powierzchnię skały. Natomiast na skałach pokrytych pewną ilością gleby zjawiają się pospolite gatunki naziemne, jak: *Polytrichum attenuatum*, *Mnium hornum*, *M. rostratum* i *Pleurozium schreberi*, obok których występują niekiedy mchy epilityczne: *Cynodontium polycarpum*, *Paraleucobryum longifolium* i inne.

Skład jakościowy brioflory skał i głazów uzależniony jest też częściowo od zbiorowisk roślin wyższych, np. na skałach w lasach liściastych bardzo często występuje *Hypnum cupressiforme*, w lesie bukowym *Isoetes myurum* i *Paraleucobryum longifolium*, a w lasach świerkowych *Ceratodon purpureus* i *Grimmia hartmanii*.

Na ogólną liczbę 62 form naskalnych 21 należy do grupy mchów związanych wyłącznie z tym podłożem, np.: *Brachythecium geheebii*, *Cynodontium polycarpum* i *Heterocladium heteropterum*, a przede wszystkim epility obligatoryczne (*Andreaea petrophila*, gat. z rodzaju *Grimmia* i inne).

Bardzo duży udział w tej grupie mają mchy przywiązane do siedlisk kwaśnych. Zasiedlają one nie tylko skały kwaśne, lecz są pospolite również na skałach obojętnych, a nawet zasadowych. Ma to związek m. in. z tym, że duża ilość skał leży wśród lub w bezpośrednim sąsiedztwie acidofilnych zbiorowisk roślin wyższych, jak: las świerkowy, bór sosnowy, bór mieszany itp.

Zbiorowisko *Cynodontium polycarpum* (tab. 30)

Zbiorowisko to, przywiązane głównie do niezacienionych skał gabra, zlokalizowane jest przede wszystkim w szczytowej partii Ślęży oraz na szczycie zachodnim (Olbrzymki), sporadycznie trafia się na amfibolicie

Fot. 6. Zbiorowisko *Cynodontium polycarpum* na głazie gabra pod szczytem Ślęży
Cynodontium polycarpum community on a gabbro boulder near the summit of Ślęża

(Gozdnica) i granicie (Ślęża). Najczęściej występuje ono na wysokościach: 600-700 m n.p.m., chociaż niekiedy spotyka się znacznie niżej (300 m n.p.m.). Zbiorowisko to porasta głazy znajdujące się w miejscach otwartych, w świetlistych lasach iglastych i mieszanych lub też w miejscach nieco zacienionych, lecz nie bardzo wilgotnych. Główny zrząd zbiorowiska stanowią gatunki wysokogórskie: *Cynodontium polycarpum*, *Andreaea petrophila*, *Rhacomitrium lanuginosum* i *Rh. sudeticum*. Poza nimi dużą rolę odgrywają tu *Pohlia nutans* i *Rhacomitrium heterostichum*.

W obrębie zbiorowiska *Cynodontium polycarpum* różnicują się dwa warianty: 1) wariant z *Hedwigia albicans* (*Hedwigia albicans*, *Ceratodon purpureus*), bardziej suchy, światłolubny związany zazwyczaj ze skałami naświetlonymi lub położonymi w widnych partiach lasów; 2) wariant z *Rhacomitrium lanuginosum* (*Rhacomitrium lanuginosum*, *Tritomaria quinquedentata*) porastający głazy na zachodnim szczycie Ślęży w miejscach cienistych, nie wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Rhacomitrium lanuginosum występuje masowo na dużych blokach skalnych tworząc w miejscach odsłoniętych jednogatunkowe skupienia, wśród których spotkano okazy zarodnikujące. Gatunek ten wytwarza w Polsce sporogony bardzo rzadko (S z a f r a n 1957), wobec czego na-

Fot. 7. Zbiorowisko *Cynodontium polycarpum* wariant z *Racomitrium lanuginosum*
na zachodnim szczycie Ślęży

Cynodontium polycarpum community, variant with *Racomitrium lanuginosum*
on the western summit of Ślęza

leży wnioskować, że znajduje on w tym siedlisku optymalne warunki życiowe.

Zbiorowisko *Cynodontium polycarpum*, o nieco zmienionym składzie gatunkowym, spotyka się również na głazach narzutowych leżących w zachodniej Polsce (Krawiec 1938). Występują tu liczne gatunki wyróżniające to zbiorowisko (*Andreaea petrophila*, *Racomitrium heterostichum*, *Hedwigia albicans*, *Ceratodon purpureus*, *Grimmia pulvinata* i *Racomitrium sudeticum*) oraz gatunki towarzyszące (*Hypnum cupressiforme*, *Grimmia hartmanii* i *Dicranum scoparium*).

Nr kolejny zdjęcia - Successive number of record Nr zdjęcia w terenie - Field number of record Data - Date	1 19 16 VII 66 590 NE 81	2 22 16 VII 66 620 NE 81	3 29 16 VII 66 300 NE 81	4 15 25 VII 66 718 E 81	5 40 115 VII 66 600 W 81	6 14 22 VII 67 600 W 81	7 24 10 VII 66 380 NE 81	8 130 16 VII 66 718 W 81	9 130 46 VII 68 600 NE 81	10 23 46 VII 68 650 NE 81	11 129 44 VI 68 600 W 81	12 128 44 VI 68 600 W 81	13 132 44 VI 68 650 W 81	14 131 44 VI 68 650 W 81	15 133 44 VI 68 650 W 81	16 133 44 VI 68 650 W 81	17 32 44 VII 66 380 W 81	18 31 44 VII 66 380 W 81	19 12 44 VII 66 380 W 81	20 33 44 VII 66 380 W 81	21 30 44 VII 66 380 W 81	22 54 44 VII 66 380 W 81	Presence degree a b c
Wysokość nrm - Altitude - m	19	22	29	15	40	115	14	24	130	130	129	128	132	131	133	133	32	31	12	33	30	54	
Ekspozycja stoku - Exposure of slope	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VII	VII	VII	VII	VII	V	
Wzgórze - Hill +	66	66	66	66	66	67	66	66	66	66	68	68	68	68	68	68	66	66	66	66	66	67	
Rodzaj skały - kind of rock ++	590	620	300	718	600	600	380	718	600	600	600	650	600	600	650	650	380	380	380	380	400	400	
Nachylenie skały - Inclination of rock	NE	NE	E	E	W	W	NE	NE	W	NE	N	SE	SE	SE	SE	SE	NE	NE	S	NE	NE	NE	
Pokrycie - Total cover - %	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	W	W	W	W	W	W	
Powierzchnia zdjęcia - Surface of record - dm ²	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	
Liczba gatunków - Number of species	10	9	9	6	3	5	4	4	6	4	5	6	8	4	4	5	2	5	7	6	5	5	
Zbiorowisko - Community	C y n o d o n t i u m p o l y c a r p u m																						Paraleucobryum longifolium
Variant - Variant	z - with - Hedwigia albicans typowy z - with - Rhaconitrium																						
Gatunki wyróżniające Zbiorowisko Cynodontium polycarpum - Differential species of Cynodontium polycarpum community	1,2	+	+	1,2	+	+	3,3	3,3	+	5,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	III
Cynodontium polycarpum	1,2	+	+	1,2	+	+	3,3	3,3	+	5,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	III
Pohlia nutans	1,2	+	+	1,2	+	+	3,3	3,3	+	5,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	III
Andreaea petrophila	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Rhaconitrium heterostichum	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Polytrichum decipiens	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Grimmia pulvinata	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Rhaconitrium sudeticum	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Hedwigia albicans	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Ceratodon purpureus	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Rhaconitrium lanuginosum	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Tricoma quinquedentata	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Paraleucobryum longifolium	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Isotrichum myurum	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Gatunki towarzyszące - Accompanying species	+	+	+	+	+	+	3,3	3,3	+	2,2	+	2,2	+	1,2	2,2	+	+	+	+	+	+	+	III
Hymnum cupressiforme	2,2	+	1,2	2,2	3,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Grimmia hartmannii	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Cladonia chlorophaea	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Barbilophozia barbata	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Plagiothecium laetum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Cladonia sp.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Dicranum scoparium	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Cephalozella starkei	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
sporaliczne - sporadic species:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Abhytægium juratzkanum 12/+/+, Bryum capillare var. flaccidum 54/+/+, Cladonia pyxidata 54/+/+, Cladonia 22/+/+, Cynodontium polycarpum var. strumiferum 22/+/+, Parmelia saxatilis 24/+/+, Polytichum attenuatum 128/+/+.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II

Objaśnienia - Explanations:

+ Ga - Gozdnicza, Śl - Śląska, W - Wieleśnica;

++ a - amfibolit - amphibolite, g - gabbro - gabbro, gr - granit - granite, s - serpentynit - serpentinite marble.

Zbiorowisko *Paraleucobryum longifolium* występuje wyłącznie na skałach amfibolitu znajdujących się w lesie liściastym w podszczytowych partiach Wieżycy (360-400 m n.p.m.). Ma ono charakter zbiorowiska cieniolubnego, znacznie wilgotniejszego, związanego bardziej z fitoklimatem leśnym. Jego skład florystyczny jest uboższy od zbiorowiska *Cynodontium polycarpum*. Gatunkowi panującemu — *Paraleucobryum longifolium*, który wykazuje zarówno duży stopień stałości, jak i obfite pokrycie, towarzyszy *Isothecium myurum*. Te dwa gatunki przewodnie zachowują się podobnie w zbiorowiskach głazów narzutowych zachodniej Polski (Krawiec 1938), gdzie również rosną tylko w cienistych lasach. Z gatunków wspólnych obydwu zbiorowiskom największy stopień stałości posiadają: *Hypnum cupressiforme* i *Grimmia hartmanii*.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych

Zbiorowisko *Cynodontium polycarpum*

- 14 — Słęża, głaz granitowy w świetlistej partii lasu świerkowego, niedaleko drogi na stoku pn.-wsch. (380 m n.p.m.),
- 18 — Słęża, duży głaz gabra na zboczu o wystawie pn.-wsch. (NNE), zdjęcie wykonano na bardzo stromej powierzchni,

Fot. 8 Zbiorowisko *Paraleucobryum longifolium* na głazie amfibolitu na zboczu Wieżycy

Paraleucobryum longifolium community on an amphibolite boulder on the Wieżycza slope

- 19 — Słęża, głaz gabra w lesie mieszanym na pn.-wsch. stoku, ekspozycja zdjęcia — północna (590 m n.p.m.),
- 22 — Słęża, nieco wyżej jak zdjęcie 19, w świetlistym lesie świerkowym, ekspozycja zdjęcia — północna,
- 23 — Słęża, skała gabra w widnej partii lasu świerkowego pod szczytem góry, st. północny (650 m n.p.m.),
- 24 — Słęża, suchy głaz gabra w otwartym miejscu na szczycie koło wieży widokowej, ekspozycja zdjęcia — północna (718 m n.p.m.),
- 25 — Słęża, obok zdjęcia poprzedniego, eksp. zdj. — wschodnia,
- 29 — Gozdnicza, głaz amfibolitu w prześwietlonym borze mieszanym pod szczytem góry, stok wschodni (300 m n.p.m.).
- 40 — Słęża, duży blok skalny (gabro) poniżej Olbrzymków, na jego zachodniej wystawie; eksp. zdj. — pn.-zach. (600 m n.p.m.),
- 115 — Słęża, w pobliżu zdjęcia 40; eksp. zdj. — zachodnia,
- 128 — Słęża, głaz średnio zacieniony, dane jak zdj. 40,
- 129, 130 — Słęża, jak poprzednio, lecz na bardziej nachylonej powierzchni dużych bloków skalnych w miejscu świetlistym,
- 131-133 — Słęża, w partii podszczytowej Olbrzymków, na stoku pd.-wsch. (SSE); eksp. zdjęć: 131 — południowa, 132 — pd.-zach., 133 — południowa; (650 m n.p.m.),

Zbiorowisko *Paraleucobryum longifolium*

- 12 — Wieżyca, średniej wielkości głaz amfibolitu na zboczu góry o wystawie południowej, w lesie mieszanym niedaleko żółtego szlaku turystycznego; eksp. zdj. — wschodnia (380 m n.p.m.),
- 30 — Wieżyca, wilgotny głaz amfibolitu w lesie bukowym pod szczytem, stok północny (400 m n.p.m.),
- 31 — Wieżyca, duży głaz amfibolitu z niewielką ilością humusu w cienistej partii lasu bukowego na zboczu pn.-wsch.; eksp. zdj. — północna (300 m n.p.m.),
- 32, 33 — Wieżyca, j.w.; eksp. zdj. — północna,
- 54 — Wieżyca, mały głaz amfibolitu w zespole *Melico-Fagetum* pod szczytem góry, stok pn.-wsch.

2. Zbiorowiska epiksyliczne (tab. 31)

Wśród mszaków porastających rozkładające się drewno (badano tylko ścięte, butwiejące pniaki) wyróżniono trzy zbiorowiska: 1) *Ceratodon purpureus-Hypnum cupressiforme*, 2) *Lophocolea heterophylla*, 3) *Pohlia nutans-Dolichotheca silesiaca*.

W masywie Słęży sukcesje na butwiejących pniakach przebiegają nieco inaczej niż na innych terenach. Z powodu niskiej wilgotności powietrza zróżnicowanie próchniejących pniaków jest znacznie mniejsze i w związku z tym można wyodrębnić tylko trzy stopnie w zależności od wielkości powierzchni zbutwiałej. Obserwowano również wiele pniaków z zahamowanym procesem butwienia, najczęściej w początkowym stadium, lub pniaków suchych, zupełnie nie murszejących.

Drewno o inicjalnych stopniach butwienia (pierwszym i częściowo drugim) jest zasiedlane przez zbiorowisko *Ceratodon purpureus-Hypnum cupressiforme*, gdzie obok gatunków budujących wchodzi *Brachythecium rutabulum*. Często pierwszym gatunkiem pionierskim na powierzchni

Fot. 9. Epiksyliczne zbiorowisko *Lophocolea heterophylla* na powierzchni cięcia pniaka na zboczu Gozdnicy

Epixylic *Lophocolea heterophylla* community covering the cut surface of a stump on the Gozdnicza slope

cięcia jest *Hypnum cupressiforme*, a nieco później pojawia się, tworzący małe kępki, *Ceratodon purpureus*. Tu spotykamy też kilka mszaków rosnących na drewnie w innych stadiach butwienia (*Amblystegium juratzkanum*, *Brachythecium salebrosum*, *Ptilidium pulcherrimum* czy *Pohlia nutans*, *Dolichotheca silesiaca*), jednak ich rola jest minimalna. Z powodu małej liczby gatunków epifitycznych brak, notowanych zwykle w tym stadium (np. w Beskidzie Śląskim — Rejment-Grochowska 1950 i w Górach Kaczawskich — Wilczyńska mskr.), epifitów pozostających po ścięciu pnia na korze i przechodzących później na powierzchnię cięcia. Nie ma tu ponadto, pionierskiego dla butwiejącego drewna, zwłaszcza dla powierzchni cięcia, wątrobowca — *Lophocolea heterophylla*.

Zbiorowisko *Lophocolea heterophylla*, w którym wyraźnie dominuje wymieniony gatunek, występuje dopiero na drewnie bardziej zbutwiałym (drugi stopień). Towarzyszą mu sporadycznie m. in. mchy wyróżniające zbiorowisko *Ceratodon-Hypnum cupressiforme* (*Ceratodon purpureus*) i zbiorowisko *Pohlia-Dolichotheca* (*Pohlia nutans*) nadając przejściowy charakter między tymi dwoma zbiorowiskami. Zbliżone zbiorowiska opisała uprzednio z Beskidu Śląskiego Rejment-Grochowska w 1950 (zbiorowisko *Lophocolea heterophylla-Brachythecium* z 1°

Fot. 10. Epiksyliczne zbiorowisko *Pohlia nutans*-*Dolichotheca silesiaca* na zboczu Gozdnicy

Epixylic community of *Pohlia nutans*-*Dolichotheca silesiaca* on the Gozdnicza slope

murszenia i zbiorowisko *Lophocolea heterophylla*-*Nowellia curvifolia* z 2°), a z rezerwatu „Lubsza” na Opolszczyźnie Berdowski i Koła w 1971 (zbiorowisko *Hypnum cupressiforme*-*Lophocolea heterophylla* z 1° murszenia).

Zbiorowisko *Pohlia nutans*-*Dolichotheca silesiaca* pokrywa silnie zbutwiałe pniaki (ostatni stopień). Jest to zbiorowisko epiksyliczne, najbagatsze w gatunki, gdzie obok grupy mchów wyróżniających (*Pohlia nutans*, *Dolichotheca silesiaca*, *Dicranella heteromalla*, *Aulacomnium androgynum* i *Georgia pellucida*) duży stopień stałości osiąga *Hypnum cupressiforme* właściwy początkowym stopniom butwienia. Dochodzą tu gatunki występujące na drewnie o różnych stopniach butwienia oraz pochodzące z dna lasu mchy humusolubne: *Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum attenuatum* i inne, jak również rośliny naczyniowe: *Dryopteris spinulosa*, *Rubus idaeus* i *Vaccinium myrtillus*.

Ze względu na znikomą liczbę powalonych kłód, zbiorowiska mszaków na nich rosnące są słabo rozwinięte. Ich skład gatunkowy niewiele różni się od opisanych. Gdziekolwiek na powierzchni kory spotyka się jeszcze gatunki epifityczne (np. *Platygyrium repens*).

T a b e l a 31 - T a b l e 31

ZBIOROWISKA RPIKSYLICZNE - RPIKSYLIOUS COMMUNITIES: ZBIOROWISKO CERATODON PURPUREUS - HYPNUM CUPRESSIFORME
CERATODON PURPUREUS - HYPNUM CUPRESSIFORME COMMUNITY

ZBIOROWISKO LOPHOCOLEA HETEROPHYLLA
LOPHOCOLEA HETEROPHYLLA COMMUNITY

ZBIOROWISKO POHLIA NUTANS - DOLICHOETHECA SILESIIACA
POHLIA NUTANS - DOLICHOETHECA SILESIIACA COMMUNITY

Nr kolejny zdjęcia - Successive number of record Nr zdjęcia w terenie - field number of record Data-date																				C
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wysokość n.p.m. - Altitude - m	33	20	117	17	4	6	142	107	21	4	2	5	3	121	125	4	3			o
Ekspozycja stoku - Exposure of slope	22	46	11	46	15	20	7	16	8	15	15	15	15	11	11	4	8			o
Stopień rozkładu pnia - Degree of decomposition of the trunk	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII	V			o
Pokrycie - Total cover - %	66	66	67	66	66	66	66	67	66	66	66	66	66	66	66	67	67			o
Średnica pnia - Diameter of trunk - cm	480	590	450	460	340	350	380	600	400	350	340	320	420	400						o
Liczba gatunków - Total number of species	NE	NE	S	N	E	W	NW	NE	N	E	NE	E	NE	E	SW	N				o
	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3			o
	5	10	20	10	40	5	15	40	40	20	90	100	100	100	100	100				o
	50	40	20	35	35	40	30	30	30	30	50	50	30	55	40	40				o
	2	4	2	2	2	1	1	2	4	2	9	7	4	6	4	3				o
ZBIOROWISKO - Community																				o
Gatunki wyróżniające zbiorowisko - Differential species of the community - Ceratodon - Hypnum																				o
Ceratodon purpureus																				o
Hypnum cupressiforme																				o
Brachythecium rutabulum																				o
Gatunki wyróżniające zbiorowisko - Differential species of the community - Lophocolea heterophylla																				o
Lophocolea heterophylla																				o
Gatunki wyróżniające zbiorowisko - Differential species of the community - Pohlia-Dolichotheca																				o
Pohlia nutans																				o
Dolichotheca silesiaca																				o
Dicranella heteromalla																				o
Aliacomitium androgynum																				o
Georgella pellucida																				o
Gatunki towarzyszące - Accompanying species																				o
Brachythecium velutinum																				o
Brachythecium salebrosum																				o
Amblystegium juratzkanum																				o
Dicranum scoparium																				o
Ptilidium pulcherrimum																				o
Plagiothecium curvifolium																				o
Polytrichum juniperinum																				o
Plagiothecium laetum																				o
Polytrichum attenuatum																				o
Dryopteris spinulosa																				o
Rubus idaeus																				o
Vaccinium vitis idaea																				o

- 2 — Stolna, silnie zbutwiały pniak w borze mieszanym z udziałem świerka, na wschodnim zboczu (340 m n.p.m.),
- 3 — Stolna, obok zdjęcia 2,
- 4 — Stolna, pniak w lesie świerkowym (350 m n.p.m.),
- 5 — Stolna, jak wyżej,
- 6 — Stolna, pniak świerka w początkowym stadium butwienia (350 m n.p.m.).
- 17 — Ślęza, bardzo słabo spróchniały pniak w zacienionym lesie świerkowym (460 m n.p.m.),
- 20 — Ślęza, pniak w lesie liściastym z domieszką świerka, stok północno-wschodni (590 m n.p.m.),
- 21 — Ślęza, nieco wyżej od zdjęcia poprzedniego (600 m n.p.m.),
- 35 — Stolna, słabo spróchniały pniak na brzegu lasu sosnowego, stok południowy (300 m n.p.m.),
- 39 — Ślęza, pniak w pierwszym stadium butwienia na północno-wschodnim zboczu (480 m n.p.m.),
- 42-43 — Radunia, pniaki na brzegu lasu świerkowego, stok północny (400 m n.p.m.),
- 107 — Ślęza, pniak świerka w lesie świerkowym na stoku północno-zachodnim (380 m n.p.m.),
- 117 — Ślęza, jak wyżej, stok południowy (450 m n.p.m.),
- 121 — Słupice, rozkładający się pniak w lesie sosnowym powyżej wsi (320 m n.p.m.), obok na butwinie już z runa leśnego, gatunki roślin naczyniowych: *Oxalis acetosella* i *Vaccinium myrtillus*,
- 125 — Ślęza, zbutwiały pniak buka w lesie bukowym na stoku o ekspozycji południowo-zachodniej (420 m n.p.m.),
- 142 — Wieżyca, świeży pniak o rozpoczynającym się procesie rozkładu, na brzegu lasu sosnowego, stok zachodni (300 m n.p.m.),

3. Zbiorowiska skarp przydrożnych

- Roślinność zarodnikowa rozwijająca się na gliniastych brzegach lasów i na poboczach dróg leśnych nie wykazuje w masywie Ślęży dużego zróżnicowania. Skarpy śródleśne ciągnące się wzdłuż dróg i ścieżek leśnych, najliczniejsze są na stokach Ślęży i Wieżycy.

Roślinami pionierskimi są tu zwykle mchy ortotropowe: *Dicranella heteromalla*, *Atrichum undulatum* i *Polytrichum attenuatum* oraz gdzieśniedzie *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* i wątrobowiec *Cephalozia bicuspidata*. W dalszym etapie zarastania dochodzą: *Pohlia nutans*, *Plagiothecium* sp. div., wątrobowiec *Pellia epiphylla* i inne gatunki.

Na takich utrwalonych skarpach występuje zbiorowisko *Dicranella heteromalla*-*Polytrichum attenuatum* (tab. 32) składające się z mchów (18 gat.) z niewielką domieszką innych roślin (5 gat. wątrobowców, 4 gat. roślin naczyniowych i porostu).

W obrębie tego zbiorowiska istnieją pewne różnice florystyczne, na podstawie których wyodrębnić można dwie grupy gatunków: 1) na skarpach znajdujących się na brzegach lasu liściastego, najczęściej bukowego, spotkano m. in. *Mnium hornum*, *Plagiothecium laetum* i *Diphyscium sessile*; 2) na poboczach dróg wśród lasu iglastego: *Leucobryum glaucum*

Table 32 - Table 32

ZBBIOROWISKO DICRANELLA HETEROMALLA - POLYTRICHUM ATTENUATUM
DICRANELLA HETEROMALLA - POLYTRICHUM ATTENUATUM COMMUNITY

Nr kolejny zdjęcia - Successive number of record		Nr zdjęcia w terenie - Field number of record		Data - Date	
Wysokość npm - Altitude - m					
Ekspozycja stoku - Exposure of slope					
Zbiornikowe roślin naczyniowych - Community of vascular plants					
Pokrycie - Total cover - %					
Powierzchnia zdjęcia - Surface of record - dm ²					
Liczba gatunków - Total number of species					
Wariant - Variant					
Gatunki wyróżniające zbiorowisko - Differential species of the community -					
Diceranella heteromalla					
Polystichum attenuatum					
Gatunki wyróżniające wariant z - Differential species of the variant with - Mniun hornum					
Mniun hornum					
Pleurothecium laetum					
Lepidostia reptans					
Diphysoium sessile					
Gatunki wyróżniające wariant z - Differential species of the variant with - Leucobryum Glaucum					
Leucobryum Glaucum					
Pleurozium schreberi					
Gatunki towarzyszące - Accompanying species					
Pohlia nutans					
Atrichum undulatum					
Hypnum cupressiforme					
Placidia sp.					
Pleurothecium platyphyllum					
Pleurothecium curvifolium					
Geratodon purpureus					
Stellaria media					
Diplophyllum albidum					
Brachythecium rutabulum					
sporaiczne species: Brachythecium albicans 15/+, Bryum capillare 140/+, Calypogeia meylanii 176/+, Cephalozia bicuspidata 176/+, Convallaria malalis 14/+, Diceranella subulata 155/+, Galeobdolon luteum 144/+, Lophozia ventricosa 144/+, Mniun punctatum 140/+, Oxalis acetosella 140/+, Phaeopteris polypodioides 140/+,					

Objaśnienia - Explanations

+ - l - las liściasty - hardwood forest; m - las mieszany - mixed forest; i - las iglasty - coniferous forest

i *Pleurozium schreberi*. Uwidacznia się tu wpływ zbiorowiska leśnego na skład florystyczny skarp na jego brzegach.

Na skarpach zarośniętych, gdzie przeważają rośliny naczyniowe rosną już tylko nieliczne gatunki mchów: *Brachythecium rutabulum*, *Cirriphyllum piliferum* i *Dicranum scoparium*.

Z poboczy dróg regionu łódzkiego Urbanek-Rutowicz (1969) opisała bardzo podobne zbiorowisko (*Dicranella heteromalla*-*Pohlia nutans*), w którym poza gatunkami budującymi, osiagającymi V stopień stałości, występują tylko rośliny naczyniowe. Z gatunków wspólnych obu zbiorowiskom należy wymienić: z mchów *Dicranella heteromalla* i *Pohlia nutans*, a z roślin naczyniowych *Stellaria media* i *Oxalis acetosella*.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych zbiorowiska
Dicranella heteromalla-*Polytrichum attenuatum*

- 1 — Wieżyca, skarpa przydrożna w lesie bukowym na zboczu góry o ekspozycji północnej (310 m n.p.m.),
- 7 — Stolina, gliniasta skarpa na stoku o wystawie zachodniej (350 m n.p.m.),
- 13 — Ślęza, niska skarpa w lesie mieszanym na północno-wschodnim stoku (NNE, 380 m n.p.m.),
- 15 — Ślęza, świeża skarpa w zacięzionym lesie świerkowym na północno-wschodnim zboczu góry (480 m n.p.m.),
- 26 — Ślęza, skarpa przy ścieżce wśród młodego lasu bukowego na stoku północnym (290 m n.p.m.),
- 34 — Wieżyca, skarpa pod szczytem góry (SW) w świetlistym lesie dębowym (400 m n.p.m.),
- 103 — Górka, gliniasta skarpa przydrożna na brzegu starego lasu bukowego powyżej wsi (240 m n.p.m.),
- 112 — Ślęza, silnie zacięziona, utrwalona skarpa na brzegu młodnika bukowego przy żółtym szlaku turystycznym, stok południowo-zachodni (460 m n.p.m.),
- 113 — Ślęza, nieco wyżej od zdjęcia poprzedniego (470 m n.p.m.),
- 118 — Radunia, skarpa na brzegu wysokopiennego lasu świerkowego na północ od Słupic (290 m n.p.m.),
- 123 — Sulistrowice, piaszczysta skarpa przy wykopie w zaroślach w podliżu wsi (220 m n.p.m.),
- 140 — Ślęza, skarpa w młodniku bukowym na północnym stoku (380 m n.p.m.),
- 141 — Ślęza, skarpa przy drodze w lesie mieszanym na północno-wschodnim zboczu góry (280 m n.p.m.),
- 144 — Wieżyca, skarpa przy ścieżce w lesie bukowym pod szczytem, stok północny (400 m n.p.m.),
- 155 — Radunia, skarpa powyżej Słupic, na brzegu lasu świerkowego (280 m n.p.m.),
- 176 — Góry Oleszeńskie, pobocze drogi na brzegu lasu świerkowego przy niebieskim szlaku turystycznym, po drugiej stronie drogi las mieszany; na południe od Sulistrowic (360 m n.p.m.).

4. Zbiorowiska epifityczne

Duże zmiany w drzewostanie, zniszczenie pierwotnych lasów, z których zachowały się tylko niewielkie fragmenty i w związku z tym niekorzystna zmiana mikroklimatu, wpłynęły ujemnie na rozwój zbiorowisk epifitycznych. Jeszcze w ubiegłym stuleciu (1855-1878) na korze drzew

znajdowano tu interesujące gatunki epifityczne jak: *Neckera pennata*, *Orthotrichum lyellii* i *O. stramineum*, a zwłaszcza *Ulotia ludwigii*.

Obecnie dobre warunki rozwoju dla roślinności epifitycznej istnieją tylko w bardzo małej partii lasu liściastego o charakterze pierwotnym w szczytowej części Ślęży. Tutaj, na kilku starych jaworach, wiązach i klonach skupia się prawie połowa gatunków nadrzewnych, w tym zdecydowana większość epifitów, z zebranych na całym badanym terenie.

T a b e l a 33 - T a b l e 33

Przykłady kilku zdjęć fitosocjologicznych zbiorowisk epifitycznych
Some examples of the phytosociological records of the epiphytic communities

Nr kolejny zdjęcia - Successive number of record	1	2	3	4
Nr zdjęcia w terenie - Field number of record	137	135	22a	136
Data - Date	4	4	16	4
Wysokość n.p.m. - Altitude - m	710	710	710	710
Gatunek drzewa - Tree species	K	W	J	J
Srednica pnia - Diameter of trunk - cm	40	80	100	85
Wysokość zdjęcia od ziemi - Height above ground level	100	180	60	120
Ekspozycja zdjęcia - Exposure of record	NW	NW	N	N
Pokrycie ogólne - Total cover - %	55	60	100	70
Powierzchnia zdjęcia - Surface of record - dm ²	12	12	10	16
Liczba gatunków - Number of species	5	5	4	4
<i>Bryum capillare</i> var. <i>flaccidum</i>	+	+	.	+
<i>Pterigynandrum filiforme</i>	2.2	.	4.5	.
<i>Homalothecium sericeum</i>	.	3.3	.	3.3
<i>Neckera complanata</i>	.	+	.	2.2
<i>Parmelia physodes</i>	3.3	.	.	.
<i>Orthodicranum montanum</i>	+	.	.	.
<i>Platygyrium repens</i>	+	.	.	.
<i>Leskeella nervosa</i>	.	1.2	.	.
<i>Madotheca platyphylla</i>	.	+	.	.
<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>filiforme</i>	.	.	3.3	.
<i>Brachythecium reflexum</i>	.	.	+	.
<i>Paraleucobryum longifolium</i>	.	.	+	.
<i>Lepraria aeruginosa</i>	.	.	.	+

Objaśnienia - Explonations :

J - *Acer pseudoplatanus*, K - *Acer platanoides*, W - *Ulmus scabra*

Najobfitsze stanowiska mają w tej partii: *Anomodon attenuatus*, *A. rugelii*, *Homalothecium sericeum*, *Pterigynandrum filiforme* i *Bryum capillare* var. *flaccidum*; rzadziej rosną: *Brachythecium reflexum*, *Hypnum cupressiforme* var. *filiforme*, *Isothecium myurum*, *Leskeella nervosa*, *Leucodon sciuroides*, *Neckera complanata*, *Orthodicranum montanum*, *Paraleucobryum longifolium* i *Platygyrium repens*. W tabeli 33 podano przykłady kilku zdjęć fitosocjologicznych wykonanych na drzewach w tym fragmencie lasu.

Na pozostałym terenie epifity porastają nasadowe części drzew, rzadko sięgają powyżej 40-50 cm (najczęściej *Hypnum cupressiforme* var. *filiforme*).

Zależność występowania mchów nadrzewnych od gatunku drzewa

Dependence of the occurrence of the epiphytic mosses upon the species of tree

Gatunek drzewa Tree species		Acer pseudoplatanus	Ulmus	Ulmus scabra	Quercus sessilis	Fagus sylvatica	Acer platanoides	Quercus robur	Ulmus campestris	Pinus silvestris	Malus domestica	Cerasus avium	Betula verrucosa	Alnus glutinosa	Liczba gat. drzew Total number of trees
Gatunek mchu Moss species															
Mchy epifityczne rosnące w masywie Słęży wyłącznie na korze żywych drzew Epiphytic mosses of Słęża massif growing exclusively on the bark of living trees															
Hypnum cupressiforme var. filiforme		+	+		+			+	+						5
Amblystegiella subtilis					+							+			2
Neckera complanata		+	+												2
Orthotrichum affine					+										1
Anomodon rugelii		+									+				2
Homalia trichomanoides					+										1
Leucodon sciurioides		+													1
Orthotrichum striatum												+			1
Mchy epifityczne rosnące w masywie Słęży w dwóch siedliskach Epiphytic mosses of Słęża massif growing in two habitats															
Pterigynandrum filiforme		+	+		+		+								4
Anomodon attenuatus		+	+				+	+							3
Platygyrium repens					+		+	+							3
Paraleucobryum longifolium		+	+												2
Isotrichum myurum		+													1
Orthotrichum diaphanum											+				1
Mchy zaliczane do epifitów, rosnące w ma- sywie Słęży w wielu siedliskach The mosses treated yet like epiphytes growing in various habitats in the Słęża massif															
Orthodicranum montanum			+		+	+	+								4
Bryum capillare var. flaccidum		+	+		+	+									3
Homalothecium sericeum		+	+												2
Leskeella nervosa			+			+	+								2
Brachythecium reflexum		+													1
Mchy nieepifityczne rosnące w masywie Słęży w wielu siedliskach Unepiphytic mosses growing in various habitats in the Słęża massif															
Hypnum cupressiforme			+		+	+				+			+		5
Plagiothecium curvifolium					+					+					3
Plagiothecium laetum				+				+		+					3
Amblystegium juratzkanum									+		+				2
Brachythecium velutinum					+										2
Brachythecium rutabulum					+				+						1
Ceratodon purpureus													+		1
Hypnum ericetorum										+					1
Mnium hornum														+	1
Syntrichia ruralis			+		+										1
Ogólna liczba gatunków mchów Total number of moss species		11	11	9	5	5	5	4	3	3	3	2	2	1	

me). Wyjątkowo spotkano na korze dębów na wysokości ok. 3 m i wyżej gatunek nieepifityczny — *Plagiothecium laetum*. W dolnych partiach drzew, na szyjach korzeniowych rosną: *Amblystegiella subtilis*, *Brachythecium velutinum* i *Platygyrium repens* oraz mchy wchodzące tu przeważnie z dna lasu: *Brachythecium rutabulum*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pl. laetum* i inne.

Na wolno stojących, drzewach owocowych (jabłonie, czereśnie) występują w bardzo małych ilościach: *Amblystegium juratzkanum*, *Orthotrichum affine*, *O. diaphanum* i *O. striatum*.

Liczne epifity są skupione na korze *Acer pseudoplatanus* i *Ulmus scabra*, mniej na *Quercus sessilis*, *Acer platanoides*, większość zaś gatunków nieepifitycznych porasta korę *Ulmus campestris*, *Pinus silvestris* i *Betula verrucosa*, jak również *Quercus sessilis*, który obok typowych epifitów żywi też kilka mchów wielopodłożowych (tab. 34).

Z mchów zebranych z kory żywych drzew tylko 8 gatunków związanych jest wyłącznie z tym podłożem, lecz poza *Hypnum cupressiforme* var. *filiiforme* są to mchy posiadające pojedyncze stanowiska. Z pozostałych niektóre należą do grupy epilito-epifitów, a reszta to gatunki o znacznie szerszej skali ekologicznej.

5. Zbiorowiska potokowe

Mchy towarzyszące strumykom, w masywie Słęży nie odgrywają dużej roli. Większość gatunków spotykamy najczęściej w górnym biegu strumyków, w lasach, natomiast w partiach u podnóży wzgórz, w miejscach bardziej odsłoniętych, mszaków brak lub występują tylko sporadycznie.

Wśród brioflory występującej w łóżysku potoku (tab. 35) możemy wyodrębnić trzy grupy: 1) mszaki stale żyjące w wodzie; w grupie tej bardzo często powtarzają się, rosnące razem, dwa mchy: *Fontinalis antipyretica* i *Platyhypnidium rusciforme*; gdzieś tam towarzyszą im: *Brachythecium rivulare* i wątrobowiec *Scapania undulata*; 2) znajdowane na głazach okresowo zalewanych lub spryskiwanych wodą. Najbardziej typowymi przedstawicielami tego ugrupowania, obejmującego znacznie większą liczbę gatunków, są: *Cratoneurum filicinum*, *Brachythecium rivulare*, *Thamnum alopecurum* i *Hygroamblystegium irriguum*. Tutaj również spotykane są mchy o szerokiej skali ekologicznej, np.: *Brachythecium rutabulum* i *Hypnum cupressiforme*; 3) porastające suche głazy leżące poza zasięgiem wody; są one najmniej związane z tym zbiorowiskiem; w ogólnej analizie nie zaliczano ich do zbiorowisk potokowych.

Podobny, pasowy układ roślinności potokowej opisany został przez Kr u j e n s t e r n a (1945), który wyróżnia za d u R i e t z e m cztery pasy: stale zanurzone w wodzie (euhydrobionty), wodne, niekiedy wysychające (hydroamfibionty), lądowe, czasami zanurzone (geoamfibionty) i lądowe, rosnące na suchych głazach (geobionty). Ponieważ różnice między drugą a trzecią grupą na badanym terenie nie zarysowują się, uwzględniono tylko trzy pasy.

Ponadto wyróżniono oddzielną grupę mchów, występującą na wilgotnych, gliniastych brzegach potoków. Z gatunków, które były już notowane w poprzednich grupach znajdujemy tu: *Cratoneurum filicinum*,

Brachythecium rivulare, *Bryum ventricosum* i *Mnium hornum*. Wśród dużej liczby spotkanych w tej grupie mchów (23 gat.) wyłącznie z tym siedliskiem związane są: *Amblystegium varium*, *Barbula unguiculata*, *Dicranella schreberi*, *Fissidens osmundoides*, *Philonotis calcarea* i *Pleuridium subulatum*.

T a b e l a 35 - T a b l e 35

Występowanie mchów w potokach
Occurrence of mosses in the torrents

Gatunek mchu Species of moss	Koryto potoku Bed of the torrent			Brzeg potoku Shore
	Pod wodą Under the wa- ter	Osłaga- lewane Perio- dically lying under water	Suche głazy Dry stones	
<i>Fontinalis antipyretica</i>	+			
<i>Platyhypnidium rusciforme</i>	+	+		
<i>Brachythecium rivulare</i>	+	+		
<i>Cratoneurum filicinum</i>	+	+		
<i>Hygroamblystegium irriguum</i>		+		+
<i>Plagiothecium platyphyllum</i>		+		
<i>Thamnium alopecurum</i>		+		
<i>Brachythecium rutabulum</i>		+	+	
<i>Hypnum cupressiforme</i>		+	+	
<i>Bryum ventricosum</i>		+		+
<i>Mnium hornum</i>		+		+
<i>Mnium punctatum</i>		+		+
<i>Anomodon attenuatus</i>			+	
<i>Brachythecium albicans</i>			+	
<i>Brachythecium populeum</i>			+	
<i>Grimmia apocarpa</i>			+	
<i>Orthotrichum anomalum</i>			+	
<i>Amblystegium varium</i>				+
<i>Aulacomnium palustre</i>				+
<i>Barbula unguiculata</i>				+
<i>Brachythecium velutinum</i>				+
<i>Ceratodon purpureus</i>				+
<i>Dicranella heteromalla</i>				+
<i>Dicranella schreberi</i>				+
<i>Dicranum bonjeani</i>				+
<i>Fissidens adiantoides</i>				+
<i>Fissidens bryoides</i>				+
<i>Fissidens osmundoides</i>				+
<i>Fissidens taxifolius</i>				+
<i>Funaria hygrometrica</i>				+
<i>Mniobryum albicans</i>				+
<i>Philonotis calcarea</i>				+
<i>Pleuridium subulatum</i>				+
<i>Scleropodium purum</i>				+
<i>Sphagnum palustre</i>				+
<i>Thuidium tamariscifolium</i>				+

Niektóre mchy rosnące w maszywie Ślęży tylko na mokrych głazach w potokach (*Brachythecium rivulare*, *Hygroamblystegium irriguum* i *Thamnium alopecurum*) gdzie indziej są pospolite na wilgotnych skalach; dlatego też trzeba je traktować jako przejściowe między zbiorowiskami potokowymi a naskalnymi.

Pod względem fitosocjologicznym, wg podziału H ü b s c h m a n a (1957) w potokach masywu Ślęży spotykamy gatunki reprezentujące dwie klasy zespołów: *Fontinaletea antipyreticae* z gatunkami chrakterystycznymi — *Fontinalis antipyretica*, *Hygroamblystegium irriguum* i

Udział mchów w wyróżnionych zbiorowiskach mszaków

Participation of mosses in the bryophyte communities distinguished

Siedliska zbiorowisk Habitats of the communities		Skaly Rocks	Mury Walls	Kora żywych drzew Living trees	Zbut- wiałe drewno Rotten wood	Brzegi dróg Kra- sarskie	Potoki Tor- rents
Nr tabeli Table number		30	37	33	31	32	35
Liczba zdjęć fitosocjologicznych Number of phytosoc. records		22	15	4	16	16	-
Gatunki mchów Moss species	Wyróżnione zbiorowiska mszaków Bryophyte communities distinguished	1/ Cynodontium polycarpum 2/ Paraleucobryum longifolium	1/ Tortula muralis 2/ Syntrichia ruralis		1/ Ceratodon - Hypnum 2/ Lophocolea heterophylla 3/ Pohlia - Dolichotheca	Dicranella heteromalla - Polytrichum attenuatum	
Andresaea petrophila		III					
Cynodontium polycarpum		III					
Hedwigia albicans		III					
Grimmia hartmanii		II					
Racomitrium heterostichum		II					
Cynodontium polycarpum var. strumiferum		I					
Grimmia pulvinata		I					
Polytrichum decipiens		I					
Racomitrium sudeticum		I					
Racomitrium lanuginosum		I					
Andresaea petrophila for. acuminata		+					
Antitrichia curtipendula		+					
Brachythecium albicans var. julaceum		+					
Brachythecium populeum for. subfalcata		+					
Brachythecium geheebii		+					
Brachythecium starkei		+					
Ceratodon purpureus for. obtusifolia		+					
Dicranoweisia cirrata		+					
Grimmia trichophylla		+					
Hedwigia albicans for. secunda		+					
Heterocladium heteropterum		+					
Hypnum cupressiforme var. uncinatum		+					
Isopterygium elegans var. nanum		+					
Mnium cuspidatum		+					
Rhabdoweisia fugax		+					
Racomitrium ramulosum		+					
Bryum argenteum		+	III				
Tortula muralis		+	III				
Encalypta contorta		+	I				
Erythrophyllum rubellum		+	I				
Grimmia apocarpa		+	+				
Orthotrichum anomalum		+	+				
Distichium capillaceum		+	+				
Paraleucobryum longifolium		II		+			
Isothecium myurum		I		+			
Anomodon attenuatus		+		+			
Orthotrichum diaphanum		+		+			
Pterigynandrum filiforme		+		+			
Brachythecium salebrosum		+			I		
Dicranodontium denudatum		+			+		
Drepanocladus uncinatus		+			+		
Syntrichia ruralis		+	I	+			
Brachythecium populeum		+	+		+		
Brachythecium reflexum		+		+	+		
Orthodictyon montanum		+		+	+		
Amblystegium serpens		+	+	+	+		
Bryum capillare var. flaccidum		I	I	+	+		
Homalothecium sericeum		+	I	+	+		
Leskeella nervosa		+	+	+	+		
Brachythecium rutabulum		+	I	+	I	I	+
Brachythecium velutinum		+	+	+	I	I	+
Ceratodon purpureus		I	II	+	II	II	+
Hypnum cupressiforme		II	I	+	III	II	+
Plagiothecium laetum		I		+	I	II	
Amblystegium juratzkanum		I		+	I	+	
Aulacomnium androgynum		+			I	+	
Pohlia nutans		III			III	III	
Dicranum scoparium		I			I	+	
Polytrichum attenuatum		I			I	IV	
Mnium punctatum		+				I	+
Bryum caespiticium		+	+			I	
Bryum capillare		+	+			+	
Mnium stellare		+	+			+	
Polytrichum piliferum		+	+			+	
Isopterygium elegans		+				+	
Mnium hornum				+	+	II	+
Plagiothecium platyphyllum					+	I	+
Funaria hygrometrica			I			+	+
Plagiothecium curvifolium				+	I	+	+
Dicranella schreberi						+	+
Brachythecium albicans			+			I	
Pleurozium schreberi					+	I	
Polytrichum juniperinum					+	+	
Amblystegiella subtilis				+			
Anomodon rugelii				+			
Homalia trichomanoides				+			
Hypnum cupressiforme var. filiforme				+			
Leucodon sciuroides				+			
Neckera complanata				+			
Orthotrichum affine				+			
Orthotrichum striatum				+			
Hypnum ericetorum				+	+		
Platygyrium repens				+	+		
Dolichotheca silesiaca					II		
Georgia pellucida					I		
Eurhynchium swartzii					+		
Eurhynchium zetterstedtii					+		
Mnium rostratum					I		
Dicranella heteromalla						V	+
Atrichum undulatum						II	
Leucobryum glaucum						II	
Dicranella subulata						I	
Diphyscium sessile						+	
Atrichum undulatum var. minor						+	
Bartramia pomiformis						+	
Encalypta vulgaris						+	
Eurhynchium stokesii var. gracilescens						+	
Hypnum cupressiforme var. lacunosum						+	
Plagiothecium denticulatum						+	
Pottia truncatula							+
Amblystegium varium							+
Aulacomnium palustre							+
Barbula unguiculata							+
Brachythecium rivulare							+
Bryum ventricosum							+
Cratoneurum filicinum							+
Dicranum bonjeani							+
Fissidens adiantoides							+
Fissidens bryoides							+
Fissidens oamundoides							+
Fissidens taxifolius							+
Fontinalis antipyretica							+
Hygroamblystegium irriguum							+
Mniobryum albicans							+
Philonotis calcarea							+
Platyhypnidium rusciforme							+
Pleuridium subulatum							+
Scleropodium purum							+
Sphagnum palustre							+
Thamnum alopecurum							+
Thuidium tamariscifolium							+
R a z e m T o t a l		64	23	29	33	36	31

+ — wystąpienia poza zdjęciami fotosocjologicznymi lub w zbiorowiskach gdzie zdjęć nie wykonywano
sites found apart from the phytosoc. records or in those communities, where no stand table has been made

Platyhypnidium rusciforme oraz klasę *Brachythecietea plumosi* z *Brachythecium rivulare* i *Scapania undulata*. Zbiorowisk występujących na badanym terenie nie można było zakwalifikować do żadnej z tych klas.

C. ZBIOROWISKA INICJALNE

Do zbiorowisk inicjalnych stanowiących krótkotrwale stadia sukcesyjne zaliczono ugrupowania mszaków porastające mury starych ogrodzeń, domów, wiaduktów itp. Spotyka się tu dwa zbiorowiska: 1) *Tortula muralis* i 2) *Syntrichia ruralis* (tab. 37).

Tabela 37 - Table 37

ZBIOROWISKO TORTULA MURALIS I ZBIOROWISKO SYNTRICHIA RURALIS
TORTULA MURALIS COMMUNITY AND SYNTRICHIA RURALIS COMMUNITY

Nr kolejny zdjęcia Successive number of record Nr zdjęcia w terenie Field number of record Data Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Presence degree I II III IV V
	149	151	165	164	150	148	62b	62a	152	146	147	166	25c	25d	25a	
	20	20	7	7	20	20	19	19	20	20	20	7	16	16	16	
	VI	VI	VIII	VIII	VI	VI	V	V	VI	VI	VI	VIII	VII	VII	VII	
	63	68	63	63	68	63	67	67	63	68	68	68	66	66	66	
Wysokość n.p.m. Altitude m	180	180	200	200	180	180	180	180	220	200	200	710	705	705	705	Presence degree I II III IV V
Powierzchnia zdjęcia Surface of record dm ²	8	6	8	4	6	6	4	6	6	12	8	4	9	4	2	
Liczba gatunków Total number of species	4	4	3	2	2	2	3	4	3	2	2	2	3	2	3	
Zbiorowisko - Community	T o r t u l a m u r a l i s S y n t r i c h i a															
Gatunki wyróżniające zbiorowisko - Differential species of the community - Tortula muralis	2.3 1.2 3.3 4.4 . 3.4 4.4 . 2.2 4.4 2.2 + + 1.2 5.5 . . + . 5.5 2.2 5.5 + . 2.2 2.2 + + + + 2.2 . 1.2 + 2.2 . 1.2 . 1.2															
Gatunki wyróżniające zbiorowisko - Differential species of the community - Syntrichia ruralis	 3.3 2.2 3.3 + + .															
Gatunki towarzyszące Accompanying species	 5.5 . . . 2.2 4.4 1.1															

W zbiorowiskach tych występują dwa gatunki charakterystyczne zespołu *Sagino-Bryetum*: *Bryum argenteum* i *Funaria hygrometrica*, a poza zdjęciami jeszcze *Eryum caespitium*. Jednakże ze względu na zupełny brak w tych miejscach roślin naczyniowych, charakterystycznych zesp. i wyższych jednostek fitosocjologicznych, traktuje się je tu jako oddzielne zbiorowisko mszaków.

Zbiorowisko *Tartura muralis* z gatunkami: *Tortula muralis*, *Bryum argenteum*, *Ceratodon purpureus* i *Hypnum cupressiforme* zajmuje niższe położenia (180-220 m n.p.m.) i występuje na starych murach w osiedlach u podnóża wzgórz, zwłaszcza często spotyka się na kamiennych ogrodzeniach kamieniołomów, w pobliżu stacji kolejowej w Strzeblowie.

rubellum i *Funaria hygrometrica*) skupia się wyłącznie na murze schroniska i kaplicy na szczycie Ślęży.

Poza gatunkami objętymi tabelą fitosocjologiczną na murach, kamiennej obudowie strumyków, basztach itp. rośnie jeszcze 11 gatunków mchów (np. *Brachythecium albicans*, *B. populeum*, *Distichium capillaceum*, *Leskeella nervosa* i *Orthotrichum anomalum*), z których tylko *Distichium capillaceum* występuje wyłącznie w tym siedlisku.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych

Zbiorowisko *Tortula muralis*

- 62 a, b, — Sobótka, na murze domu w pobliżu Rynku (180 m n.p.m.),
- 146 — Gozdnicza, na kamiennym ogrodzeniu Zakładu Poprawczego u podnóża góry, stok północno-wschodni (200 m n.p.m.),
- 147 — Górka, na murze w pobliżu cmentarza (200 m n.p.m.),
- 148-151 — Strzeblów, ogrodzenie kamieniołomów w pobliżu stacji kolejowej (180 m n.p.m.),
- 152 — Strzeblów, na murze wiaduktu koło stacji kolejowej (180 m n.p.m.),
- 164-166 — Sobótka, mury starych ogrodzeń przy ulicy Świdnickiej (200 m n.p.m.).

Zbiorowisko *Syntrichia ruralis*

- 25 a, b — Ślęża, na murze schroniska turystycznego na szczycie (705 m n.p.m.),
- 25 c — Ślęża, na murze ogrodzenia kaplicy, szczyt (710 m n.p.m.),

VII. PODSUMOWANIE

1. Brioflora masywu Ślęży liczy obecnie 201 gatunków wraz z licznymi odmianami i formami, co stanowi prawie połowę gatunków mchów znanych ze Śląska (Limpricht 1876, podaje 464 gat.). W porównaniu z liczbami mchów występującymi na znacznie większych terenach, np. na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej (Kuc 1959), w Pieninach (Szafrań 1952), na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (Karczmarsz 1963) i in. (tab. 38) jest to liczba duża, wynosząca około 32% brioflory całej Polski.

2. Z mchów bardzo rzadkich w Polsce notowano na badanym terenie:

Ditrichum tenuifolium, *Grimmia mühlenbeckii*, *Hymenostomum rostellatum*, *Isopterygium elegans* var. *nanum*, *Polytrichum decipiens*, *Rhabdoweisia crispata*, *Tetraplodon angustatus*, *T. mnioides*, *Ulota americana*. Najbliższe stanowiska większości tych gatunków znajdują się przeważnie dopiero w Karkonoszach lub w Kotlinie Kłodzkiej.

Do rzadkich na Śląsku należą: *Amblystegium varium*, *Brachythecium geheebii*, *Campylium polygamum*, *Dicranella schreberi*, *Dicranum fulvum*, *Eurhynchium schleicheri*, *Grimmia incurva*, *G. trichophylla*, *Loeskeobryum brevirostre*, *Rhacomitrium sudeticum* i *Schistostega osmundacea*.

Mapa 10. Rozmieszczenie wyróżnionych zbiorowisk mszaków

Distribution of the bryophyte communities described in the present paper

- 1 — *Cynodontium polycarpum*; 2 — *Paraleucobryum longifolium*; 3 — *Tortula muralis*; 4 — *Syntrichia ruralis*; 5 — *Dicranella heteromalla*-*Polytrichum attenuatum*; 6 — *Ceratodon purpureus*-*Hypnum cupressiforme*; 7 — *Lophocolea heterophylla*; 8 — *Pohlia nutans*-*Dolichotheca silesiaca*

Pomimo że Śląsk uważany jest za jeden z najlepiej zbadanych bryologicznie regionów Polski (S z a f r a n 1957), w czasie badań prowadzonych w latach 1963-1969 znaleziono w masywie Ślęży 73 taksony nowe dla tego terenu. Niektóre z nich zasługują na szczególną uwagę, np. mchy wysokogórskie — *Racomitrium lanuginosum*, *Rh. ramulosum* i *Rh. sudeticum* oraz gatunki rzadkie — *Isopterygium elegans* var. *nanum*, *Campylium polygamum*, *Dicranella schreberi* *Eurhynchium schleicheri*.

Tabela 38 — Table 38

Porównanie liczby mchów masywu Ślęży z innymi terenami w Polsce
Comparison of the number of mosses of the Ślęża massif with those
of some Poland's regions

Teren Region	Liczba Number of:		
	gatunków species	rodzajów genera	rodzin families
Masyw Ślęży (Berdowski)	201	92	36
Wyżyna Sandomiersko-Opatowska (Kuc 1959)	183	79	32
Pieniny (Szafran 1952)	196	84	33
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (Karczmarsz 1963)	197	83	34
Gorce (Lisowski i Kornaś 1966)	234	99	38
Wolin (Lisowski 1961)	246	95	38
Bieszczady (Lisowski 1960)	252	99	36
Wyżyna Śląska (Kuc 1956)	260	99	38
Jura Krakowsko-Wieluńska (Szafran 1955)	278	106	38
Cała Polska (wg Szafrana 1957, 1961; nieco zmienione i uzupełnione)	630	154	48
The whole Poland			

4. Trzecią część mchów masywu stanowią gatunki górskie, w tym wiele wysokogórskich. Wskazuje to wyraźnie na górski charakter brioflory. Przeprowadzona dokładna analiza ogólnego rozmieszczenia gatunków górskich pozwoliła na wyróżnienie, obok dotychczas uznawanych 2 grup mchów (wysoko- i ogólnogórskich), trzecią grupę obejmującą gatunki reglowe. Prześledzono również występowanie mchów górskich na niżu tj. (za S z a f e r e m 1930) poza łukiem sudecko-karpackim.

5. Na podstawie badań ekologicznych wydzielono 15 grup siedliskowych mchów oraz 10 typów briocenologicznych Gamsa i stwierdzono zdecydowaną przewagę form związanych z podłożem skalnym; scharakteryzowano również grupy edaficzne, wśród których dużą przewagę osiągały gatunki acidofilne.

6. Porównanie obecnego składu brioflory masywu Ślęży ze stanem sprzed około stu lat wykazało bardzo duże zmiany spowodowane zabiegami gospodarczymi. Szczegółowa analiza mchów nie odnalezionych potwierdziła ujemny wpływ działalności człowieka na roślinność badanego terenu.

7. Rola, jaką odgrywają mchy w zbiorowiskach roślin naczyniowych (tab. 28) jest bardzo różna. Najwięcej gatunków znaleziono w zespole *Sagino-Bryetum*, jednak znaczna ich część przechodzi tu z innych zbiorowisk, przede wszystkim z przyległych lasów. Dużą odrębność wykazuje natomiast skład brioflory w zbiorowisku ze związku *Caricion davallianae*. Również znaczny udział mają mchy w zespole *Asplenietum cuneifolii*.

Niewielkie ilości mchów spotkano w zbiorowiskach leśnych, bardzo mało rośnie na polach.

8. Ze zbiorowisk związanych najbogatszymi w mchy są zbiorowiska naskalne i występujące na brzegach dróg leśnych. Wśród wyróżnionych i opisanych po raz pierwszy zbiorowisk mszaków wymienić należy: zbiorowisko *Cynodontium polycarpum* i zbiorowisko *Paraleucobryum longifolium*.

9. Zróżnicowanie geologiczne masywu Ślęży na część północną, zbudowaną ze skał kwaśnych (granitu) i obojętnych (gabra i amfibolitu) oraz na część południową złożoną z zasadowych serpentynitów, znajduje potwierdzenie zarówno w składzie brioflory, w szczególności w udziale gatunków górskich, jak i w występowaniu zbiorowisk roślin naczyniowych oraz mszaków. Z 10 zbiorowisk roślin naczyniowych, tylko jedno (zespół *Melico-Fagetum*) nie występuje na podłożu serpentynitowym, zaś 5 zbiorowisk związanych jest wyłącznie z tą częścią (mapa 9). Są to zespoły *Asplenietum cuneifolii*, *Molinietum medioeuropaeum*, *Potentillo albae-Quercetum*, zbiorowisko ze związku *Caricion davallianae* oraz zbiorowisko z rzędu *Festuco-Sedetalia*.

Fot. 11. Głazowisko pod zachodnim szczytem Ślęży — miejsca występowania wielu wysokogórskich mchów (m.in. *Tetraplodon angustatus*)

Stone agglomeration near the western summit of Ślęza, where many alpine moss species occur, among others *Tetraplodon angustatus*

W partii północnej reprezentowane są wszystkie wyróżnione zbiorowiska mszaków (mapa 10), natomiast w części południowej dobrze wykształcone są tylko: zbiorowisko *Dicranella heteromalla*-*Polytrichum attenuatum* na poboczach dróg leśnych oraz zbiorowiska *Lophocolea heterophylla* i *Pohlia nutans*-*Dolichotheca silesiaca* na zbutwiałym drewnie.

Wymienione partie masywu różnią się występowaniem 73 form mchów, z których 55 właściwych jest partii północnej, a tylko 18 południowej. Część północna charakteryzuje się obecnością bardziej interesującej brioflory. Do mchów częstych zalicza się tu: *Andreaea petrophila*, *Cynodontium polycarpum*, *Rhacomitrium heterostichum* i inne nie spotykane w części południowej.

Pasma południowe, uboższe pod względem briologicznym, posiada, w przeciwieństwie do roślin naczyniowych, niewielką liczbę form rzadkich (mapy 3, 4). Wyraźne różnice między tymi obszarami zaznaczają się również w udziale gatunków górskich (mapy 5-8). Na wzgórzach serpentynitowych rośnie ich znacznie mniej, mniejsze jest też zagęszczenie stanowisk mchów górskich, a przede wszystkim brak form wysokogórskich.

10. W związku z projektowaną w najbliższym czasie budową Dolnośląskiego Parku Kultury i Wypoczynku „Ślęza”, który obejmie prawie cały masyw Ślęży, zagrożone są stanowiska bardzo rzadkich gatunków mchów grupujących się przede wszystkim w szczytowych partiach Ślęży oraz duża kolonia mchów wysokogórskich znajdująca się w okolicach zachodniego szczytu Ślęży (tzw. Olbrzymków).

Szczegółowe opracowanie obecnej szaty roślinnej masywu Ślęży stanowi podstawę do śledzenia zmian, jakie zajdą tu pod wpływem masowej turystyki.

*Zakład Morfologii i Systematyki Roślin
Uniwersytetu Wrocławskiego*

SUMMARY

The Ślęza massif in the Sudetes foothills, about 25 km distant from the Sude-
tes consists of two ranges: 1) the northern one consisting of gabbro, granite and
amphibolite with its highest peak Ślęza and the elevated points Wieżyca, Gozdnicza
and Stolna and 2) the southern range which includes the serpentinite hills Góry
Kielczańskie, Radunia, Góry Oleszeńskie and Gozdnik (map 1, Table 2).

Bryological investigation were performed in the environs of Ślęza more than
100 years ago; they were, however, incomplete.

A specific trait of the bryophyte flora of this territory is the important con-
tribution of alpine species reaching almost 1/3 of all the moss species found. To
the alpine species found here belong: 1) species not found on the lowland, 2) species
rare or very rare beyond the mountains and 3) species rather common on the low-
land, but having their main distribution centres in the mountains. According to
their distribution in the mountains the alpine species may be classified to three
groups: those of subalpine forests, common alpine and high alpine.

More than half of the alpine species find the most favourable conditions of
development at an altitude exceeding 600 m a.s.l. at a height correspon-
ding partly to the lower subalpine zone in the Sudetes (Fig. 1). Many alpine mos-
ses in the Ślęza massif have a greatly reduced range of occurrence, this concerns
particularly the high alpine species such as *Cynodontium polycarpum* or *Tetraplo-
don angustatus*. Alpine mosses are most dense on the Ślęza and Radunia peaks,
the northwestern slope of Ślęza and on what is called the western peak (Olbrzymki)
(Map 8, Fig. 3). On the western peak a large colony of high alpine mosses is also
found (Fig. 3). The accumulation of many mountain plants on the western peak is
probably due to the microclimatic conditions of this habitat. Most of the alpine
mosses are associated with the rock substrate since they occur on rocks and boul-
ders, in rock crevices and on walls (Table 14).

According to detailed analysis of the vertical distribution of the bryoflora
(Table 12), three groups of species may be distinguished in the Ślęza massif: 1) those
occurring only on the peaks and not descending below 500 m a.s.l., including about
24 taxons; most of these species are alpine, only rarely or very rarely found on the
lowland; 2) mosses growing at the foot of the massif, which do not reach higher
than 500 m a.s.l. (87 taxons); the main part of this group consists of mosses com-
mon to the lowlands, and for many of them the border line here is only edaphic,
for instance mosses growing in torrents and on fields; 3) mosses found at all altitudes
from the foothills to the highest parts; they are usually taxons common to the
lowlands and the mountains know as ubiquitous mosses.

Particular attention was devoted to the bryophyte communities which were
classified into three groups: 1) those included in vascular plant communities with
which they are inseparably bound, therefore they should be studied against this

background; 2) separate bryophyte accumulations, remaining, however, under the influence of vascular plant communities and dependent on them called "associated bryophyte communities"; 3) communities which constitute short-lasting stages in the succession.

As regards the first group, their contribution in the following 10 associations or communities of vascular plants was studied in detail: in forests in *Leucobryo-Pinetum* (Table 16), *Melico-Fagetum* (Table 17) and *Potentillo albae-Qeurtetum* (Table 18); on forest paths in *Sagino-Bryetum* (Table 19); on meadows in *Molinietum medioeuropaeum* (Table 21), in the community *Juncus articulatus* from the alliance *Caricion davallianae* (Table 20) and community *Trifolium dubium* from the order *Arrhenatheretalia* (Table 22); in xerothermic grasslands — in the community *Festuca pallens* from the order *Festuco-Sedetalia* (Table 24); in rock crevices — in *Asplenietum cuneifolii* (Table 25); and on fields in the community *Centaurea cyanus* from the alliance *Secalio* (Table 27).

The role played by mosses in these communities varies widely (Table 23). A small group of mosses is specific for forest communities, besides they show here the lowest degree of phytosociological constancy. In the association *Leucobryo-Pinetum* two moss species are found which distinguish this association: *Leucobryum glaucum* and *Hypnum cupressiforme*. In the remaining two associations worth noting is only *Atrichum undulatum* as characteristic for the order *Fagetalia silvaticae*. A very large group of mosses belongs among the components of the association *Sagino-Bryetum*. Mostly, however, they are species derived from other communities, above all from forests.

The *Sagino-Bryetum* association (Table 19) occurs on roads with a moderately developed vegetal cover and rather frequently used. In this association bryophytes, particularly mosses constitute almost 50 per cent of all the plants. Within the association two subassociations can be distinguished: 1) with *Ceratodon purpureus*, 2) with *Hypnum arcuatum*. The first occupies unshaded, dry or moderately moist sites with xerothermic species prevailing such as *Ceratodon purpureus*, *Achillea millefolium*, *Pohlia nutans*, *Brachythecium albicans*. The second grows on permanently moist segments of roads and consists exclusively of mosses.

The contribution of mosses to meadow communities (fig. 5, Table 23) varies and is largely dependent on the degree of soil moisture. Mosses are least abundant on rye-grass meadows, the driest of the three meadow types discussed. Here only a few moss species survive with a broad ecological scale. Numerous mosses grow in the association *Molinietum medioeuropaeum*; *Rhytidiadelphus squarrosus*, *Aulacomnium palustre* and *Acrocladium cuspidatum* exhibit here a rather high degree of constancy (III). An important role is played by mosses in the moistest meadow community, *Juncus articulatus* of the alliance *Caricion davallianae*, although the number of mosses here is smaller than in *Molinia* meadows. The richly developed moss layer of this community consists of numerous moss species characteristic for the given alliance and order and exhibiting a high degree of constancy such as: *Drepanocladus intermedius*, *Campylium stellatum* (characteristic for alliance), *Campylium polygamum*, *Camptothecium nitens* and *Thuidium delicatulum* (characteristic for class).

Interesting is the association of serpentinitic ferns — *Asplenietum cuneifolii* (Table 25) occurring in the Ślęza massif only on the serpentinitic substrate. As reported by Matuszkiewicz (1963), it is the sole site in Poland where this association occurs.

Asplenietum cuneifolii grows in shallow crevices filled with large amounts of earth. It is composed mainly of ferns of the genus *Asplenium*: *A. cuneifolium*, *A. onopteris*, *A. adiantum-nigrum*, *A. septentrionale* and *A. trichomanis*. From among the mosses occurring here worth noting is *Fissidens cristatus* which is

strongly bound with *Asplenietum* and does not grow outside it in the Słęża massif. Therefore this moss is considered to locally distinguish the association *Asplenietum cuneifolii*.

From among the "associated communities" the following were distinguished: on rocks *Cynodontium polycarpum* and *Paraleucobryum longifolium* communities; on rotting three communities: *Ceratodon-Hypnum*, *Lophocolea heterophylla* and *Pohlia nutans-Dolichotheca*; on the forest roadsides the community *Polytrichum attenuatum*.

The community *Cynodontium polycarpum* (Table 30) is mainly associated with the unshaded gabbro rocks. It may be considered as alpine since its main part consists of high alpine species such as *Cynodontium polycarpum*; *Andreaea petrophila* and *Racomitrium lanuginosum*. Within the community *Cynodontium polycarpum* two variants were distinguished: 1) with *Hedwigia albicans*, dry, photophilous and 2) with *Racomitrium lanuginosum* growing on boulders not directly exposed to sunrays.

The *Paraleucobryum longifolium* community (Table 30) grows exclusively on amphibolite rocks in deciduous forests. It is sciophilous in character, growing on much moister sites than the *Cynodontium polycarpum* community which is associated rather with the forest phytoclimate.

The community *Ceratodon purpureus-Hypnum cupressiforme* is found on stumps in the initial stage of rotting (table 31); frequently the first pioneer species entering a felling is *Hypnum cupressiforme*, somewhat later *Ceratodon purpureus* appears. On more decomposed wood the *Lophocolea heterophylla* community thrives in which this dominating species is accompanied by mosses distinguishing the two remaining epixylic communities. The community *Pohlia nutans-Dolichotheca silesiaca* overgrows decayed stumps on which the cut surface is completely rotten. This epixylic community is richest in species, beside epixylites proper, it includes mosses from the forest floor as well as vascular plants.

The community *Dicranella heteromalla-Polytrichum attenuatum* (Table 32) occurs on stabilized sloping road banks at the edge of forests. Within this community two variants have been distinguished: with *Mnium hornum*, found on escarpments at the edge of deciduous forests, most frequently of fageta; 2) with *Leucobryum glaucum* on roadsides in coniferous forests. The influence of the forest community on the floristic composition on the slopes at its edge is visible.

Epiphytic communities (Tables 33, 34) of mosses growing in torrents (Table 35) are poorly developed on the territory investigated. Communities overgrowing old walls are transient stages of succession. To these belong the communities *Torula muralis* and *Syntrichia ruralis* (Table 37). The former occupies lower places and is localised in foothill settlements; the latter grows exclusively on the higher part of Słęża on the walls of the hospice and chapel.

The geological differences in the northern and southern parts of the Słęża massif are manifested in the bryoflora composition, particularly in the contribution of alpine species as well as in the occurrence of the vascular plants and bryophyte communities. Of the ten distinguished vascular plant communities on the serpentinite substrate only the *Melico-Fagetum* association is absent, and five communities are associated exclusively with this massif (map 9). In the northern part all bryophyte communities are represented (Map 10). On the southern side the only well developed communities are those on escarpments and mouldy stumps. In these two parts 73 taxons were noted, 55 of which are specific to the northern side and 18 the southern. The northern part moreover, is characterized by a more interesting bryoflora with a large number of rare moss species (Maps 3, 4). Marked differences between these areas are noted also as regards the contribution of

mountain mosses (Maps 5-8). On the serpentinite hills they are less abundant, sites with mountain mosses are less frequent and the high alpine forms absent.

The bryoflora of the Śląża massif comprises at present 218 taxonomic units including 201 species. As compared with the bryoflora of much larger territories, for instance the Sandomierz-Opatów Upland, Pieniny, Łęczyń-Włodawa Lakeland, this number is very high amounting to 32 per cent of the bryoflora of Poland (Table 38).

*Department of Plant Morphology and Systematics,
Institute of Botany and Biochemistry,
Wrocław University,
Wrocław, Kanonia 6/8*

LITERATURA

- Abramowa A., Sawicz-Lubickaja L., Smirnowa Z., 1961, *Oprideieli-tiel listostwiennych mchow Arktiki SSSR*, Moskwa-Leningrad.
- Berdowski W., 1965, Flora rezerwatu „Łąki Sulistrowickie”, *Acta Universita-tis Wratislaviensis, Prace Botaniczne* 6: 107-140.
- Berdowski W., 1966, „Rezerwat „Łąki Sulistrowickie” koło Sobótki na Dolnym Śląsku, Chrońmy Przyr. Ojcz. 22 (1): 43-45.
- Berdowski W., 1970, Mchy rezerwatu „Kamień Śląski” na Opolszczyźnie, *Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne* 11: 29-36.
- Berdowski W., 1971, W sprawie ochrony roślinności masywu Ślęży, Chrońmy Przyr. Ojcz. 27 (5): 46-50.
- Berdowski W., mskr., Nowe stanowiska rzadkich gatunków mchów na Dol-nym Śląsku.
- Berdowski W., Koła Wł., 1971, Zbiorowiska mszaków i ich sukcesje w re-zerwacie bukowym „Lubsza”, powiat Brzeg, *Acta Universitatis Wratislaviens-isis, Prace Botaniczne* 12: 45-68.
- Boros A., 1968, *Bryogeographie und Bryoflora Ungars*, Akademiai Kiado, Bu-dapest.
- Cehak-Hołubowiczowa H., 1958, Ślęża i jej okolice w dziesięciolecie pol-skich badań archeologicznych, Ślęża 1, PWN, Warszawa.
- Celiński F., 1962, Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem, *Monogr. Bot.* 13, suppl.
- Czubiński Z., 1950, Zagadnienia geobotaniczne Pomorza, *Bad. fizjogr. n. Pol-ską zach.* 2 (4): 439-658.
- Duda J., 1951, Společenstva Bryophyt na piskovcovych skalách v Beskydach, *Prirodovedsky Sbornik Ostravske'ho Kraje, Acta Rer. Natur. Distr. Ostrav.* 12: 323-334.
- Fabiszewski J., 1963, Porosty epifityczne masywu Ślęży, *Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne* 1: 229-282.
- Faliński J. B., 1961, Roślinność dróg leśnych w Białowieskim Parku Narodo-wym, *Acta Soc. Bot. Pol.* 30 (1): 163-185.
- Fiek J., 1881, *Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Anteils*, Breslau.
- Fukarek F., 1967, *Fitosocjologia*, PWRiL, Warszawa.
- Gams H., 1932, *Bryo-Cenology (Moss-Societies)*, Rozdz. 12: 323-366 [w:] *Manual of bryology*, red. F. Verdoorn, Hague.
- Gams H., 1957, *Kleine Kryptogamenflora*, 4, Die Moos- und Farnpflanzen, Stuttgart.
- Gawel A., 1957, Nefryt z Jordanowa na Dolnym Śląsku, *Przegląd Geologiczny* 7: 299-303.

- Grynia M., 1962, Łąki trzęślicowe Wielkopolski, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Nauk Roln. i Leśn., Wyd. Nauk Roln. i Leśn. 13 (2).
- Herzog Th., 1926, Geographie der Moose, Jena.
- Herzog Th., 1932, Geographie, Rozdz. 10: 273-293 [w:] Manual of bryology, red. F. Verdoorn, Hague.
- Hübschmann A., 1957, Zur Systematik der Wassermoosgesellschaften, Mitt. d. Flor. soz. Arbeitsg. 6/7, Stolzenau/Weser.
- Jasnowski M., 1958, Mszaki w rezerwacie „Cisowy Jar” na Mazurach, Ochr. Przyr. 25: 248-267.
- Karczmarsz K., 1963, Mchy zebrane na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, Fragm. Flor. et Geobot. 9 (1): 117-150.
- Karczmarsz K., 1963a, Mchy Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Ann. Univ. M.C. Skłod. 18 (C): 367-410.
- Karpowicz W., 1960, Naturalne stanowisko brekiny pod Sobótką w województwie wrocławskim, Chrońmy Przyr. Ojcz. 16 (1): 40.
- Karpowicz W., 1963, Paprocie na serpentynitach w Polsce, Fragm. Flor. et Geobot. 9 (1): 35-58.
- Kern F., 1914, Varzeichnis der Moosarten, die seit dem Erscheinen der Limprichtschen Werke in Schlesien entdeckt worden sind, Jahres Berich d. Schles. Gesellsch. für vaterländische Cultur 91: 65-72.
- Koła Wł., 1963, Wątrobowce masywu Ślęży, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace botaniczne 1: 193-228.
- Koppe L., 1929, Das montane Element in der Moosflora von Schleswing-Holstein, Ann. Bryol. 2: 1-32, Hague.
- Kornaś J., 1957, Zbiorowiska roślin zarodnikowych i ich klasyfikacja, Wiad. Bot. 1 (1-2): 3-18.
- Kornaś J., 1968, Zespoły roślinne Gorców, II, Zespoły synantropijne, Fragm. Flor. et Geobot. 14 (1): 83-124.
- Kosiba A., 1948, Klimat ziem śląskich, Wyd. Inst. Śląsk., Wrocław-Warszawa.
- Kostrowicki J., 1968, Środowisko geograficzne Polski, PWN, Warszawa.
- Kovacs M., 1962, Die Moorigen Ungarns, Verlag der Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest.
- Kuc M., 1956, Mchy Wyżyny Śląskiej (Okręg Wapienia Muszlowego), Acta Soc. Bot. Pol. 25 (4): 629-673.
- Kuc M., 1959, Mchy Wyżyny Sandomiersko-Opatowskiej, Fragm. Flor. et Geobot. 5 (1): 129-150.
- Kuc M., 1959a, Mchy północnej części pasma Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Fragm. Flor. et Geobot. 5 (3): 443-470.
- Kuc M., 1964, Briogeografia wyżyn południowych Polski, Monogr. Bot. 17.
- Kucowa I., Mądalski J., 1964, Nowe stanowiska *Galium valdepilosum* H. Braun w Polsce, Fragm. Flor. et Geobot. 10 (1): 3-8.
- Kuźniewski E., 1962, Notatki florystyczne ze Śląska, Cz. II, Kwartalnik Opolski, Zesz. Przyr. 2: 77-80.
- Krawiec F., 1938, Flora epilityczna głazów narzutowych Zachodniej Polski, Prace Kom. Mat.-przyr., Pozn. Tow. Przyj. Nauk 9 (B/2): 9-262.
- Krusenstjerna E., 1945, Bladmossvegetation och Bladmossflora i Uppsala-trakten, Acta Phyt. Suecica, 19: 1-250. Uppsala.
- Książkiewicz M., 1947, Zarys budowy geologicznej Sudetów i ich przedgórze, Wiad. Muzeum Ziemi 3, Warszawa.
- Limpricht K. G., 1873, Nachträge zu Milde's Bryologia Silesiaca, Jahres-Bericht d. Schles. Gesellsch. für vaterländische Cultur, 50: 124-140.
- Limpricht K. G., 1876, Laubmoose und Lebermoose, [w] Kryptogamenflora von Schlesien 1: 29-224, red. F. Cohn.

- Limpricht K. G., 1890-1904, Die Laubmoose, [w] Kryptogamenflora Deutschland 2 (1-3), red L. Rabenhorst, Leipzig.
- Linckh L., 1928, Geologischen Karte von Preussen, Zoboten Erläuterungen zur geologischen Karte von Preussen, Blatt Zobten, Berlin.
- Lisowski S., Zielnik Mchów Polski (Bryotheca Polonica), Ser. B., Wyd. PAN, Poznań:
- 1956a, Fasc. V, Nr 151-175, Mchy Gór Kaczawskich.
 - 1956a, Fasc. VI, Nr 176-200, Mchy Gór Kaczawskich.
 - 1957, Fasc. XVI, Nr 426-450, Mchy masywu Sobótki.
 - 1959a, Fasc. XLV, Nr 1151-1175, Mchy Gór Bialskich.
 - 1959b, Fasc. XLVI, Nr 1176-1200, Mchy Gór Stołowych.
- Lisowski S., 1956b, Mchy Bieszczadów Zachodnich, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 17 (3): 109-199.
- Lisowski S., 1958, Wykaz gatunków mchów wydanych w Zielniku Mchów Polski (Fasc. I-XLI), Poznań.
- Lisowski S., 1959, Materiały do bryoflory Tatr, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 21 (2): 23-149.
- Lisowski S., 1961, Bryoflora wyspy Wolin, Bad. fizjogr. n. Polską zach. 8: 137-193.
- Lisowski S., 1965, Materiaux bryologiques des Tatres, Bull. de la Soc. des Amis des Sc. et des Lettr. de Poznań, Ser. D: 123-146.
- Lisowski S., 1966, Charakterystyka briologiczna wysokogórskich zespołów murawowych Tatr Zachodnich, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 26 (5): 213-248.
- Lisowski S., Kornaś J., 1966, Mchy Gorców, Fragm. Flor. et Geobot. 12 (1): 41-114.
- Lisowski S., Szweykowski J., 1957, Zielnik Mchów Polski (Bryotheca Polonica) Ser. B., Fasc. XXX, Nr 776-800, Mchy Gór Stołowych, Wyd. PAN, Poznań.
- Majerowicz A., 1963, Granit okolicy Sobótki i jego stosunek do osłony w świetle badań petrograficznych, Archiwum Mineralogiczne 24 (2): 127-239.
- Matuszkiewicz Wł., 1967, Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski, Rozdz. 13: 175-229, [w] Wstęp do fitosocjologii praktycznej, red. A. Scamoni, PWRL, Warszawa.
- Maǳalski J., 1961, Notatki florystyczne ze Śląska, Cz. I, Kwartalnik Opolski, Zesz. Przyr. 1: 60-72.
- Migula M., 1904, Kryptogamenflora von Deutschland Deutsch-Österreich und der Schweiz. 1, Moose, [w] Flora von Deutschland, red. Thome.
- Milde J., 1855, Bemerkungen über schlesische Cryptogamen, Jahres Bericht d. Schles. Gesellsch. für vaterländische Cultur 32: 64-71.
- Milde J., 1857, Übersicht in der Schlesien bisher beobachteten Laubmoose, Ibidem 34: 64-77.
- Milde J., 1859, Mitteilungen über die schlesische Moos-Flora, Ibidem 36: 56-60.
- Milde J., 1860, Bericht über eine im Auftrage des Präsidii unternommene naturwissenschaftliche Reise nach Niederschlesien, Ibidem 37: 37-51.
- Milde J., 1868, Über einige neue Funde aus dem Gebiete der schlesischen Moos-Flora, Ibidem 45: 101-103.
- Milde J., 1869, Bryologia silesiaca, Laubmoos-Flora von Nord Mittel-Deutschland, Leipzig.
- Milde J., 1870, Verzeichnis neuer Standorte, Jahres Bericht d. Schles. Gesellsch. für vaterländische Cultur 47: 120-124.
- Milde J., 1871, Neue Standorte schlesischer Moose und Farne, Ibidem 48: 121-130.

- Moenkemeyer W., 1927, Die Laubmoose Europas [w] Kryptogamenflora 4: 1-956, red. L. Rabenhorst Leipzig.
- Musierowicz A., 1958, Gleboznastwo szczegółowe, PWRL, Warszawa.
- Oberc J., 1958, Problematyka naukowa i przebieg XXX Zjazdu PTG w Dusznikach Zdroju, Rocznik PTG 27: 227-253.
- Oberdorfer E., 1957, Süddeutsche Pflanzengesellschaften [w] Pflanzensozologie 10, Jena.
- Ochsner F., 1955, Das ozeanische Element in der schweizerische Moosflora ein Beitrag zu seiner Aufgliederung, Mitteil. d. Thüring Bot. Ges 1 (1-3), Jena.
- Pawłowski B., Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., 1959, Przegląd zbiorowisk roślinnych, lądowych i słodkowodnych, Rozdz. 5: 229-484 [w] Szata roślinna Polski, red Wł. Szafer, PWN, Warszawa.
- Pendias H., Maciejewski S., 1959, Zbiór analiz chemicznych skał magmowych i metamorficznych Dolnego Śląska, Inst. Geolog. Prace 24: 1-136, Warszawa.
- Pilous Z., Duda J., 1960, Klíč k určování mechorostů ČSR, Praha.
- Podpěra J., 1954, Conspectus muscorum europaeorum, Práce Česk. Akad. Věd, Praha.
- Rejment-Grochowska I., 1950, Czynniki ekologiczne i rozmieszczenie geograficzne wątrobowców Beskidu Śląskiego, Wyd. Śl. PAU, Prace Biol. Śląskie 2: 1-72, Kraków.
- Rejment-Grochowska I., 1966, Wątrobowce (*Hepaticae*), 1, Flora Polska Rośliny zarodnikowe Polski i Ziemi Ościennych, PWN, Warszawa.
- Romer E., 1949, Regiony klimatyczne Polski, Prace Wrocł. Tow. Naukowego 16 (B): 5-26.
- Rospond S., 1951, Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej, Wrocław-Warszawa.
- Sarosiek J., 1964, Ekologiczna analiza gleb serpentynowych z Dolnego Śląska, Monogr. Bot. 18.
- Sarosiek J., Sadowska A., 1961, Ekologia roślin gleb serpentynitowych, Wiad. Bot. 5 (1): 73-86.
- Scamoni A., 1967, Wstęp do fitosocjologii praktycznej, PWRiL, Warszawa.
- Schmuck A., 1952, Rola wiatru w klimacie Dolnego Śląska, Czasopismo Geogr. 21/22: 449-458.
- Semkowicz Wł., 1949, Góra Sobótka i jej zabytki polskie, Inst. Zach., Poznań-Wrocław.
- Szafer Wł., 1930, Element górski we florze niżu polskiego, Bull. Intern. de l'Acad. Pol. des Sc. et des Lettr. Ser. B, Cracovie.
- Szefer Wł., Kulczyński S., Pawłowski B., 1953, Rośliny Polskie, PWN, Warszawa.
- Szafran B., 1952, Mszaki Pienin, Ochr. Przyr. 20: 89-117.
- Szafran B., 1955, Mchy Jury Krakowsko-Wieluńskiej z uwzględnieniem rezerwatów przyrody, Ibidem 23: 213-254.
- Szafran B., 1957, 1961, Mchy, 1, 2, Flora Polska, Rośliny zarodnikowe Polski i Ziemi Ościennych, PWN, Warszawa.
- Szczepankiewicz S., 1958, Peryglacyjny rozwój stoków masywu Słęży, Biul. Peryglacj. 6: 81-93.
- Szweykowski J., 1951, Rozmieszczenie zbiorowisk mszaków w potokach Gór Stołowych, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 13 (3): 143-189.
- Tobolewski Z., 1953, Porosty, Klucz do oznaczania pospolitych gatunków krajowych, PWN, Warszawa.

- Tüxen R., 1955, Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften, Mitt. d. Flor-Soz. Arbeits. 5, Stolzenau/Weser.
- Urbanek-Rutowicz H., 1969, Udział i rola diagnostyczna mszaków oraz stosunki florystyczno-fitosocjologiczne w przewodnich zespołach roślinnych regionu łódzkiego i jego pobrzeży, Uniwersytet Łódzki.
- Warnstorf C., 1911, *Sphagnales-Sphagnaceae (Sphagnologia universalis)*, Das Pflanzenreich, Regni vegetabilis conspectus, Leipzig.
- Wilczyńska W., mskr., Flora mchów i zbiorowiska mszaków Gór Kaczawskich.
- Wiszniewski W., 1953, Atlas opadów atmosferycznych w Polsce 1891-1950, Prace PIHM, Warszawa.

SPIS TREŚCI

Wstęp	3
I. Historia badań briologicznych w masywie Ślęży	5
II. Fizjografia terenu	6
1. Położenie	6
2. Warunki geologiczne	7
3. Stosunki klimatyczne	10
III. Ogólna charakterystyka szaty roślinnej	12
IV. Metody badań	15
V. Flora mchów masywu Ślęży i jej analiza	17
1. Wykaz systematyczny	17
2. Analiza siedliskowa	44
Podział briocenologiczny Gamsa	48
Zależność występowania mchów od odczynu podłoża	51
3. Rozmieszczenie poziome	53
4. Rozmieszczenie pionowe. Udział gatunków górskich	55
5. Analiza geograficzna flory mchów ze szczególnym uwzględnieniem elementu oceanicznego	64
6. Wpływ działalności człowieka na brioflorę	66
VI. Zbiorowiska mszaków	69
A. Udział mchów w zbiorowiskach roślin naczyniowych	69
1. Lasy iglaste	70
Zespół <i>Leucobryo-Pinetum</i>	70
2. Lasy liściaste	71
Zespół <i>Melico-Fagetum</i>	71
Zespół <i>Potentillo albae-Quercetum</i>	72
3. Drogi leśne	73
Zespół <i>Sagino-Bryetum</i>	73
4. Łąki	76
Zbiorowisko <i>Juncus articulatus</i>	77
Zespół <i>Molinietum medioeuropaeum</i>	77
Zbiorowisko <i>Trifolium dubium</i>	78
5. Murawy kserotermiczne	81
Zbiorowisko <i>Festuca pallens</i>	81
6. Szczeliny skalne	84
Zespół <i>Asplenietum cuneifolii</i>	84
7. Pola	88
Zbiorowisko <i>Centaurea cyanus</i>	88
B. Związane zbiorowiska mszaków	89

1. Zbiorowiska epilityczne	86
2. Zbiorowiska epiksyliczne	98
3. Zbiorowiska skarp przydrożnych	102
4. Zbiorowiska epifityczne	104
5. Zbiorowiska potokowe	107
C. Zbiorowiska inicjalne	109
VII. Podsumowanie	110
Summary	115
Literatura	119