MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. LIX, 1979

HALINA PIĘKOS-MIRKOWA

PAPROCIE
Z GRUPY *DRYOPTERIS DILATATA*
W POLSCE

The ferns of
the *Dryopteris dilatata* complex in Poland

Redaktor: Z. Podbielkowski

WARSZAWA

Wydano z pomocą finansową
Polskiej Akademii Nauk

Praca pod redakcją K. Rostańskiego

KOMITET REDAKCYJNY

Z. Podbielkowski (Warszawa), K. Rostański (Katowice)
A. Gajewska (Warszawa)

RADA REDAKCYJNA

W. Matuszkiewicz (Warszawa), R. Olaczek (Łódź),
Z. Podbielkowski (Warszawa), A. Gajewska (Warszawa)

ADRES REDAKCJI: Al. Ujazdowskie 4; 00-478 Warszawa

© Copyright by Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Warszawa 1979

ISBN 83-01-01153-X
ISSN 0077-0655

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	5
II. Historia badań	6
III. Materiał i metody	8
IV. Analiza cech taksonomicznych	12
A. Kłacze	13
B. Łuski	13
C. Liść	15
D. Komórki szparkowe	22
E. Ogruczenie	24
F. Włoski wydzielnicze	26
G. Zarodniki	26
H. Gametofit	30
I. Dane cytologiczne	31
V. Identyfikacja i klasyfikacja	31
VI. Klucz do oznaczania gatunków	34
VII. Taksony	34
VIII. Rozmieszczenie i warunki występowania gatunków grupy <i>Dryopteris dilatata</i>	44
IX. Zestawienie wyników	65
Summary	67
Literatura	72

I. WSTĘP

W ostatnich 25 latach paprocie stały się przedmiotem intensywnych i wielokierunkowych studiów (Jermy, Crabbe, Thomas 1973; Wagner 1974). Między innymi wiele prac poświęcono europejskim i północnoamerykańskim przedstawicielom grupy *Dryopteris dilatata*, zwanej także w literaturze grupą *Dryopteris spinulosa* (np. Domin 1942; Walker 1955, 1959, 1961; Britton 1962, 1967, 1968, 1972; Widén, Sarvela, Ahti 1967, i in.). Do grupy tej należą w Europie Środkowej 3 gatunki: *D. carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs [= *D. spinulosa* (O. F. Müller) Watt], *D. dilatata* (Hoffm.) A. Gray, em. S. Walker* oraz niedawno wyróżniona *D. assimilis* S. Walker**. Jak wykazały badania cytogenetyczne (Walker 1955, 1959, 1961), są to gatunki blisko spokrewnione, co znajduje wyraz także w ich cechach morfologicznych. Należąca do tej grupy do niedawna jeszcze *D. cristata*, spokrewniona z *D. carthusiana*, nie jest obecnie zaliczana do omawianego kompleksu w jego ścisłym ujęciu, ze względu na wyraźnie odrębną morfologię liści i skulpturę zarodników (Britton 1972; Piękoś 1975).

Taksony grupy *D. dilatata* były traktowane przez różnych autorów bądź to w randze odmian, bądź to podgatunków, czy też gatunków. Wokół taksonów omawianej grupy narosła w ciągu lat bogata i skomplikowana sinonimika, a problemy nomenklatury dotąd jeszcze nie zostały ostatecznie rozwiązane. Liczne badania z cytotaksonomii, genetyki i chemotaksonomii rzuciły światło na problem pokrewieństwa i ewolucyjnego różnicowania się taksonów w grupie *D. dilatata* oraz stosunku taksonów europejskich do północnoamerykańskich. Mimo to identyfikacja gatunków z grupy *D. dilatata* jest często trudna, ponieważ gatunki te wykazują dużą morfologiczną zmienność, łatwo krzyżują się, a cechy którymi

* Ostatnio wielu autorów używa dla tego taksonu nazwy *D. austriaca* (Jacq.) Woyнар.

** Według najnowszych danych prawidłowa nazwa powinna być *D. expansa* (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy (por. Fraser-Jenkins, Jermy 1977).

różnią się są dość subtelne. To spowodowało, że *D. carthusiana* i *D. dilatata* bywały niejednokrotnie w naszych zielnikach mylone pomiędzy sobą, a nawet z *Athyrium filix-femina*.

Wzmiankę o występowaniu na terenie Polski trzeciego z gatunków, *D. assimilis*, podali dotąd jedynie Simon i Vida (1966) oraz Piękoś i Passakas (1973). *D. assimilis*, opisana w randze gatunku w 1961 r. przez Walkera, nie była dotąd u nas odróżniana od blisko z nią spokrewnionej *D. dilatata*. Między innymi rysunki *D. dilatata* podane przez W. Karpowicz (1972) oraz w „Atlasie flory polskiej i ziem ościennych” (Mądalski 1954), przedstawiają w rzeczywistości *D. assimilis*. W tej sytuacji istniała uzasadniona potrzeba podjęcia u nas badań nad wspomnianą grupą. Prowadzono je w latach 1971-1974.

Celem niniejszej pracy była rewizja taksonomiczna krajowych materiałów zielnikowych oraz opracowanie rozmieszczenia i warunków występowania *D. carthusiana*, *D. dilatata* s. str. i *D. assimilis* w Polsce. Ponadto przeprowadzono porównawcze studia morfologiczne wymienionych 3 gatunków, analizę zmienności niektórych cech oraz oceniono wartość taksonomiczną tych cech. Analiza taka wydawała się być potrzebna, ponieważ w licznych pracach dotyczących grupy *D. dilatata*, jakie dotąd ukazały się, najwięcej uwagi poświęcono analizie cytogenetycznej i badaniom z zakresu chemotaksonomii, zaniedbując nieco studia morfologiczne i traktując morfologiczną zmienność omawianych gatunków jedynie w sposób opisowy.

Pracę wykonałam w Zakładzie Systematyki Roślin Naczyniowych Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Pragnę podziękować Panu prof. drowi A. Jasiewiczowi za zasugerowanie mi tematu pracy i pomoc podczas jej realizacji. Dziękuję również Panom: dr S. Walkerowi za rewizję moich oznaczeń niektórych okazów *Dryopteris assimilis* oraz za wskazówki dotyczące badań cytologicznych, doc. dr K. Rostańskiemu, dr T. Tacikowi i mojemu mężowi Z. Mirkowi za cenne uwagi, a doc. dr L. Stuchlikowi za przedyskutowanie niektórych zagadnień z zakresu mikroskopii skaningowej. Ponadto winna jestem wdzięczność Paniom: mgr T. Passakas za współpracę w badaniach cytologicznych, mgr B. Bzowskiej za pomoc techniczną, a Panu mgr M. Bzowskiemu za wykonanie punktowych mapek rozmieszczenia. Dziękuję również Kierownikom Zielników krajowych i zagranicznych oraz wszystkim, którzy zechcieli mi wypożyczyć swoje prywatne zbiory.

Wszystkie elektronogramy zarodników paproci wykonano w Pracowni Mikroskopii Elektronowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie. Za umożliwienie mi badań przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego chciałabym gorąco podziękować Kierownictwu Pracowni oraz szczególnie Panom: A. Reńskiemu i H. Bilskiemu.

II. HISTORIA BADAŃ

Dryopteris carthusiana została opisana w 1786 r. przez Villarsa jako *Polypodium carthusianum*. Następnie w 1795 r. Hoffmann opisał *Polypodium dilatatum* (dzisiejsza *D. dilatata* s. str.). Nomenklatura,

ranga i pozycja tych dwu taksonów budziły przez długie lata wiele nieporozumień. W miarę jak zmieniały się koncepcje ujmowania rodzajów i w zależności od tego jaką wartość nadawano poszczególnym cechom, omawiane taksony zaliczano do następujących rodzajów: *Polypodium*, *Polystichum*, *Nephrodium*, *Lastrea*, *Thelypteris* i *Dryopteris*. W starszej literaturze polskiej znajdujemy omawiane gatunki pod nazwami rodzajowymi *Aspidium* (np.: Fiek 1881, Kotula 1889-90, Szafer, Kulczyński, Pawłowski 1924) i *Polystichum* (np.: Berdau 1890, Sagorski, Schneider 1891). Obecnie przynależność tych gatunków do rodzaju *Dryopteris* nie budzi już wątpliwości. Wyjątek stanowi tu „Flora Bułgarii” (1963), gdzie gatunki te zaliczone są do rodzaju *Nephrodium*. Wspomniane wyżej taksony były traktowane w dziewiętnastowiecznych „Florach” jako odmiany (np.: Berdau 1890, Kotula 1889-90, Sagorski, Schneider 1891) lub jako podgatunki (np.: Luerksen 1889, Ascherson, Graebner 1896-98). W obrębie omawianych taksonów opisano w tym okresie szereg jednostek niższej rangi, biorąc za podstawę najczęściej różnice w morfologii liści i ogroczoleniu.

W latach pięćdziesiątych naszego stulecia obok danych morfologicznych dużą rolę w systematyce paproci zaczynają odgrywać dane cytologiczne. W tych latach podjęto szeroko zakrojone badania cytogenetyczne nad europejskimi i północnoamerykańskimi przedstawicielami grupy *D. dilatata* (Walker 1955, 1959, 1961; Britton 1962, 1967, 1968, 1972). Efektem tych badań było m. in. wykrycie 2 cytotypów *D. dilatata*, z których diploidalny został podniesiony przez Walkera (1961) do rangi gatunku i nazwany *D. assimilis*. Takson ten, jak okazało się, był już w 1857 r. wyróżniony przez Moore'a na podstawach morfologicznych, jako *Lastrea dilatata* var. *alpina*. Badania cytogenetyczne przyczyniły się do wąskiego ujmowania gatunków w grupie *D. dilatata*, tendencji powszechnej dziś zresztą w całej grupie paproci.

Ostatnio dużą rolę w systematyce paproci przywiązuje się do cech morfologii zarodników, a zwłaszcza skulptury perisporu studiowanej w skaningowym mikroskopie elektronowym. Wśród tego typu prac kilka poświęcono wyłącznie grupie *D. dilatata* (Crabbe, Jermy, Walker 1970; Britton 1972; Piękoś 1975).

Interesujące wyniki w grupie *D. dilatata* przyniosły również badania chemotaksonomiczne (Hegnauer 1961; Wieffering, Fikenscher, Hegnauer, 1965; Widèn, Sorsa, 1966, 1969, Widèn 1969; Sorsa, Widèn 1968; Widèn, Sorsa, Sarvela 1970).

Z prac systematycznych poświęconych wyłącznie grupie *D. dilatata* należy wymienić opracowanie zmienności czeskich taksonów z okolic Mělnika oraz ich mieszkańców (Domin 1942), jak również studia nad tą grupą paproci w Finlandii (Widèn, Sarvela, Ahti 1967). Ponadto po 1961 r. ukazało się kilka prac cytotaksonomicznych poświęco-

nych wyłącznie *D. assimilis* i *D. dilatata* oraz ich mieszańcom (Döpp, Gätzi 1964; Gätzi 1966; Nannfeldt 1966; Simon, Vida 1966; Crabbe, Jermy, Walker 1970; Benl, Eschelmüller 1970; Piękoś 1974; Nardi 1976).

III. MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono na materiałach zielnikowych oraz na żywych okazach zebranych w terenie i hodowanych na działce doświadczalnej Instytutu Botaniki PAN w Krakowie.

Przejrzone materiały obejmują łącznie około 3100 arkuszy zielnikowych, z czego około 1500 przypada na zbiory z terenu Polski. Poniżej podano wykaz Zielników, z których pochodziły zbadane materiały, wraz ze skrótami nazw Zielników instytucji według Index Herbariorum (1974). Gwiazdkami zaznaczono w wykazie skróty tych Zielników, których brak w Index Herbariorum. Zielniki prywatne zaznaczono skrótami według pierwszych liter imion i nazwisk ich właścicieli.

- A. J. — Zielnik prof. A. Jasiewicza (Kraków)
- A. J. K. — Zielnik prof. prof. A. Medweckiej-Kornaś i J. Kornasia (Kraków)
- A. P. — Zielnik dr A. Pacyny (Kraków)
- *BIA — Zielnik Zakładu Badania Lasów Pierwotnych IBL w Białowieży
- B. P. — Zielnik prof. B. Pawłowskiego (Kraków)
- *GDU — Zielnik Zakładu Ekologii Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
- H. P. — Zielnik własny
- H. T. T. — Zielnik dr dr H. i T. Tacików (Kraków)
- H. U. — Zielnik mgr H. Urbanika (Kraków)
- J. M. — Zielnik prof. J. Mądalskiego (Wrocław)
- K. G. — Zielnik doc. K. Grodzińskiej (Kraków)
- K. N. — Zielnik dr K. Nowaka (Ożarów Mazowiecki)
- KRA — Zielnik Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
- KRAM — Zielnik Instytutu Botaniki PAN w Krakowie
- K. T. — Zielnik dr K. Towpasz (Kraków)
- KTU — Zielnik Instytutu Botaniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- K. Z. — Zielnik prof. K. Zarzyckiego (Kraków)
- LBL — Zielnik Zakładu Systematyki i Geografii Roślin Instytutu Biologii UMCS w Lublinie
- LOD — Zielnik Zakładu Botaniki Instytutu Botaniki i Zoologii Uniwersytetu w Łodzi
- M. — Zielnik doc. J. Misiewicza (Słupsk)
- M. G. — Zielnik dr M. Guzikowej (Kraków)
- *MGS — Zielnik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
- *OLS — Zielnik Zakładu Botaniki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
- POZ — Zielnik Zakładu Taksonomii Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu w Poznaniu
- R. O. — Zielnik dr R. Ochryy (Kraków)
- *SN — Zielnik Zakładu Botaniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie
- TRN — Zielnik Zakładu Systematyki i Geografii Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu w Toruniu

- U. A. Z. — Zielnik dr dr U. i A. Zająców (Kraków)
WA — Zielnik Zakładu Systematyki i Geografii Roślin Instytutu Botaniki Uniwersytetu w Warszawie
*WRS — Zielnik Pracowni Atlasu Flory Polskiej Instytutu Botaniki PAN (Wrocław)
WRSŁ — Zielnik Instytutu Botaniki i Biochemii Uniwersytetu we Wrocławiu
W. Ż. — Zielnik prof. W. Żukowskiego (Poznań)
Z. M. — Zielnik mgr Z. Mirka (Kraków)

Ponadto dla celów porównawczych wykorzystano w pracy materiały zielnikowe Instytutu Botaniki im. Komarowa AN ZSRR w Leningradzie (LE), Uniwersytetu w Pradze (PRC), Muzeum Narodowego w Pradze (PR), Instytutu Botaniki SAV w Bratysławie (BRA), Muzeum Narodowego w Bratysławie (BR), Muzeum Historii Naturalnej w Budapeszcie (BP), Instytutu Botaniki Uniwersytetu w Bernie (BERN), Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie (S) oraz Muzeum Botanicznego Uniwersytetu w Helsinkach (H).

Okazy żywe, w liczbie 131, zebrano z 25 stanowisk — głównie w Polsce południowej — i hodowano w wyrównanych warunkach na działce doświadczalnej w Krakowie w ciągu kolejnych 4 lat. Co roku z danego okazu hodowanego zbierano po 3-4 liście do zielnika i wykonywano pomiary wybranych cech. Ponadto w ciągu całego sezonu wegetacyjnego prowadzono obserwacje okazów hodowanych na działce oraz obserwacje w terenie w warunkach naturalnych. Dodatkowo zebrano również do hodowli i do zielnika próbki populacji *D. assimilis* z 3 stanowisk z Tatr.

Początkowo w badaniach uwzględniono 35 cech. W trakcie dalszej pracy odrzucono 7 cech, które okazały się bez znaczenia dla rozróżniania 3 omawianych gatunków (np. kąty ustawienia odcinków liściowych),

Cechy, które mierzono lub oceniano w inny sposób, jak również stosunki pomiędzy cechami, zestawiono poniżej:

- 1 — długość blaszki liściowej
- 2 — długość ogonka liściowego
- 3 — maksymalna szerokość blaszki liściowej
- 4 — długość najniższego odcinka 1. rzędu
- 5 — szerokość najniższego odcinka 1. rzędu
- 6 — długość trzeciego od dołu odcinka 1. rzędu
- 7 — szerokość trzeciego od dołu odcinka 1. rzędu
- 8 — długość podstawowego dolnego odcinka 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu
- 9 — długość kolejnego drugiego dolnego odcinka 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu
- 10 — długość podstawowego górnego odcinka 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu
- 11 — długość łusek
- 12 — szerokość łusek

- 13 — długość zarodników
- 14 — szerokość zarodników
- 15 — stosunek długości blaszki do długości ogonka
- 16 — stosunek długości blaszki do jej maksymalnej szerokości
- 17 — stosunek długości podstawowego dolnego odcinka 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu do długości najniższego odcinka 1. rzędu
- 18 — stosunek długości podstawowego dolnego odcinka 2. rzędu do długości podstawowego górnego odcinka 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu
- 19 — stosunek długości do szerokości najniższego odcinka 1. rzędu
- 20 — stosunek długości do szerokości trzeciego od dołu odcinka 1. rzędu
- 21 — długość komórek szparkowych
- 22 — barwa liści
- 23 — barwa łusek
- 24 — barwa zarodników
- 25 — ogruczolenie zawijek
- 26 — ogruczolenie liści
- 27 — skulptura zarodników
- 28 — gęstość łusek na ogonku liściowym

Cechy wielkości (nr 1-10) nie miały większego znaczenia dla rozróżniania omawianych gatunków. Posłużyły one jedynie do obliczenia stosunków (cechy nr 15-20), te bowiem najlepiej charakteryzowały niektóre właściwości kształtu blaszek liściowych omawianych gatunków. Dla tych cech podano ich wartości ekstremalne (min.-max.) oraz obliczono średnie arytmetyczne cech z ich błędem ($M+m$), odchylenie standardowe (σ) i współczynniki zmienności (V). Wyniki zestawiono w tabeli 1. Różnice pomiędzy omawianymi gatunkami pod względem wymienionych cech, jak również kierunek ich zmienności, zilustrowano przy pomocy wieloboków frekwencji (ryc. 2-4, 6, 7) oraz diagramu rozrzutu (ryc. 5).

Szczególną uwagę poświęcono zarodnikom, ponieważ okazało się, że cechy barwy i skulptury zarodników mają znaczenie diagnostyczne w grupie *Dryopteris dilatata*. Zarodniki badano zarówno w mikroskopie świetlnym, jak i w elektronowym mikroskopie skaningowym. Pomiary długości i szerokości zarodników wykonano w mikroskopie świetlnym na materiale acetolizowanym. Zarodniki do badań w mikroskopie skaningowym uzyskano z okazów zielnikowych pochodzących z 11 stanowisk z Polski. Dojrzałe, nie acetolizowane zarodniki przyklejano pastą z koloidalnego srebra na mosiężne krążki, napyłano węglem i złotem w napyłarce próżniowej JEE-4B JEOL, a następnie przeglądano w elektronowym mikroskopie skaningowym JSM S1. Mikrofotografie wykonano na filmie „Fortepan” przy powiększeniach 180-6000 $\times$. Pomiary długości komórek szparkowych wykonano na materiale żywym i zielnikowym.

Do badań kariologicznych pobierano próbki z okazów wysadzonych na działce doświadczalnej Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Chro-

Tabela 1 — Table 1

Wartości skrajne (min., max.), wartość średnia (M), odchylenie standardowe (σ) i współczynnik zmienności (V) badanych cech gatunków z grupy *Dryopteris dilatata*
 Extreme values (min., max.), mean value (M), standard deviation (σ) and coefficient of variability (V) of the examined characters of the species of the *Dryopteris dilatata* complex

Cecha Character	Gatunek Species	Min.-Max.	M $\pm$ m	σ	V	Liczba okazów Number of spe- cimens
Stosunek długości blaszki do długo- ści ogonka	<i>D. carthusiana</i>	0,81-2,33	1,22 $\pm$ 0,33	0,27	22,30	74
	<i>D. dilatata</i>	0,98-2,49	1,64 $\pm$ 0,04	0,37	22,70	68
Ratio of the length of lamina to length of petiole	<i>D. assimilis</i>	1,04-2,80	1,52 $\pm$ 0,04	0,35	23,14	64
Stosunek długości blaszki do szero- kości blaszki	<i>D. carth. var. exaltata</i>	1,23-2,61	1,76 $\pm$ 0,03	0,28	15,75	100
	<i>D. carth. var. elevata</i>	1,75-4,26	2,68 $\pm$ 0,09	0,62	23,03	49
Ratio of the length of lamina to width of lamina	<i>D. dil.</i>	0,95-3,15	1,70 $\pm$ 0,05	0,43	25,32	66
	<i>D. ass.</i>	1,05-2,44	1,44 $\pm$ 0,04	0,28	19,57	61
Stosunek długości podstawowego dolnego odcinka 2. rzędu do długości najniższego odcin- ka 1. rzędu	<i>D. carth.</i>	0,26-0,50	0,40 $\pm$ 0,006	0,06	14,27	100
	<i>D. dil.</i>	0,19-0,53	0,35 $\pm$ 0,008	0,08	21,74	99
	<i>D. ass. (herb)</i>	0,33-0,61	0,49 $\pm$ 0,006	0,06	12,81	100
Ratio of the length of proximal basi- copic pinnule to length of basal pinna	<i>D. ass. (T. pop)</i>	0,38-0,57	0,47 $\pm$ 0,006	0,04	9,25	59
Stosunek długości podstawowego dolnego odcinka 2. rzędu na najniż- szym odcinku 1. rzędu do długości podstawowego górnego odcinka	<i>D. carth.</i>	1,16-2,06	1,56 $\pm$ 0,02	0,19	12,24	100
	<i>D. dil.</i>	0,97-2,83	1,71 $\pm$ 0,04	0,40	23,30	100
2. rzędu	<i>D. ass. (herb)</i>	1,81-3,38	2,28 $\pm$ 0,03	0,27	11,69	99
Ratio of the length of proximal basi- copic pinnule to length of proxi- mal acroscopic pinnule on basal pinna	<i>D. ass. (T. pop)</i>	1,61-2,90	2,12 $\pm$ 0,03	0,23	10,52	45

Cecha Character	Gatunek Species	Min.-Max.	M m	σ	V	Liczba okazów Number of spe- cimens
Stosunek długości do szerokości naj- niższego odcinka 1. rzędu	<i>D. carth.</i>	1,25-2,16	1,61 $\pm$ 0,02	0,21	13,25	101
	<i>D. dil.</i>	1,31-3,18	1,93 $\pm$ 0,04	0,39	19,83	95
Ratio of the length of basal pinna to width of basal pinna	<i>D. ass. (herb)</i>	1,09-2,37	1,50 $\pm$ 0,02	0,22	14,36	97
	<i>D. ass. (T. pop)</i>	1,22-2,50	1,52 $\pm$ 0,03	0,19	11,79	45
Stosunek długości do szerokości środkowego od- cinka 1. rzędu	<i>D. carth.</i>	1,61-3,16	2,42 $\pm$ 0,03	0,32	13,36	101
	<i>D. dil.</i>	1,77-4,12	3,07 $\pm$ 0,05	0,47	14,64	97
Ratio of the length of median pinna to width of median pinna	<i>D. ass. (herb)</i>	1,58-3,72	2,63 $\pm$ 0,04	0,35	21,23	97
	<i>D. ass. (T. pop)</i>	2,06-3,08	2,45 $\pm$ 0,03	0,22	9,02	53

(herb) = okazy zielnikowe z terenu Polski (herbarium specimens from different parts of Poland).
(T. pop) = populacja z Tatr (population from the Tatra Mts.).

mosomy liczone w stożkach wzrostu korzeni. Preparaty wykonano metodą rozgniotów. Stożki wzrostu korzeni traktowano 0,5% roztworem kolchicyny przez 2-3 godzin, a następnie utrwalano w mieszaninie alkoholu absolutnego i kwasu octowego lodowatego w stosunku 3:1 oraz barwiono orceiną.

Materiał do badań gametofitów 3 gatunków z grupy *D. dilatata* pochodził z 10 stanowisk w Polsce: z terenu Tatr, z Pasma Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim, z Gór Świętokrzyskich i ze Śląska. Hodowlę gametofitów prowadzono na szlakach Petriego w temperaturze pokojowej. Zarodniki wysiewano w pierwszych dniach marca na ziemię torfową uprzednio wysterylizowaną, a następnie podlewano pożywką Knoppa i obserwowano kolejne stadia rozwoju gametofitów.

Mapki rozmieszczenia dla gatunków z grupy *D. dilatata* wykonano metodą punktową, wyłącznie na podstawie zrewidowanych materiałów zielnikowych.

IV. ANALIZA CECH TAKSONOMICZNYCH

W niniejszym rozdziale zestawiono cechy podane w literaturze jako ważne dla identyfikacji gatunków z grupy *D. dilatata*. W świetle własnych badań przeprowadzonych zarówno na materiale zielnikowym, jak i żywym, omówiono zmienność tych cech, dyskutując ich wartość taksonomiczną.

Fot. A. Pachowski

Fot. 1. Fotografie okazów zielnikowych: 1 — *Dryopteris carthusiana* var. *elevata*. Biała k. Tucholi, na brzegu jeziora Ryjki, 26 VII 1968, lg. M. Ceynowa, TRN; 2 — *D. c.* var. *exaltata* ($2n=164$). Lubin, w *Pino-Quercetum* z domieszką świerka, 31 VIII 1971, lg. H. Piękoś, HP 111/71; 3 — *D. c.* var. *exaltata* ($2n=164$), Ojców, w lesie sosnowym na południowych stokach Złotej Góry, 17 X 1970, lg. H. Piękoś, HP 26/70

Phot. 1. Photographs of herbarium specimens: 1 — *Dryopteris carthusiana* var. *elevata*. Biała near Tuchola, on bank of Ryjki Lake, 26 VII 1968, lg. M. Ceynowa, TRN; 2 — *D. c.* var. *exaltata* ($2n=164$). Lubin, in oak-pine-spruce forest, 31 VIII 1971, lg. H. Piękoś, HP 111/71; 3 — *D. c.* var. *exaltata* ($2n=164$). Ojców, in pine forest, on southern slopes of Złota Góra Mt, 17 X 1970, lg. H. Piękoś, HP 26/70

Tablica II — Plate II

Fot. A. Pachowski

Fot. 2. Fotografie okazów zielnikowych: 1— *Dryopteris dilatata*. Beskid Wyspowy: Łopień, w *Fagetum carpaticum*, 8 VII 1971, lg. H. Piękoś, HP 84/71; 2 — *D. dilatata* ($2n=164$). Niepołomice k. Bochni, w lesie sosnowym sadzonym na siedlisku *Tilio-Carpinetum*, 1 X 1971, lg. H. Piękoś, HP 116/71

Phot. 2. Photographs of herbarium specimens: 1 — *Dryopteris dilatata*. The Wyspowy Beskid range: Łopień Mt, in *Fagetum carpaticum*, 8 VII 1971, lg. H. Piękoś, HP 84/71; 2 — *D. dilatata* ($2n=164$). Niepołomice near Bochnia, in pine forest in *Tilio-Carpinetum* habitat, 1 X 1971, lg. H. Piękoś, HP 116/71

Fot. 3. Fotografie okazów zielnikowych: 1 — *Dryopteris assimilis* ($2n=82$). Tatry Wysokie: Morskie Oko, w *Piceetum tatricum myrtilletosum*, 26 IX 1970, lg. H. Piękoś, HP 12/70; 2 — *D. assimilis*. Bieszczady Zachodnie: Jasiołek, w buczynie, 10 VIII 1892, lg. Wołoszczak, KRAM; 3 — *D. assimilis* ($2n=82$). Góry Świętokrzyskie: Łysica, 320 m, w buczynie, 4 IX 1970, lg. H. Piękoś, HP 6/70

Phot. 3. Photographs of herbarium specimens: 1 — *Dryopteris assimilis* ($2n=82$). The High Tatra Mts: Morskie Oko Lake, in *Piceetum tatricum myrtilletosum*, 26 IX 1970, lg. H. Piękoś, HP 12/70; 2 — *D. assimilis*. The Western Bieszczady range: Jasiołek Mt, in beechwood, 10 VIII 1892, lg. Wołoszczak, KRAM; 3 — *D. assimilis* ($2n=82$). Świętokrzyskie (Holy Cross) Mts, Łysica Mt, 320 m a.s.l., in beechwood, 4 IX 1970, lg. H. Piękoś, HP 6/70

Fot. A. Pachonński

Tablica IV — Plate IV

Fot. A. Pachonński

Fot. 4. Łuski nasadowej części ogonka liściowego *Dryopteris carthusiana* (szereg górny), *D. dilatata* (szereg środkowy) i *D. assimilis* (szereg dolny). Pow. 2×
 Phot. 4. Basal scales on petioles of *Dryopteris carthusiana* (upper row), *D. dilatata* (middle row) and *D. assimilis* (lower row) AU×2

A. Kłącze

Większość autorów podaje jako istotną różnicę pomiędzy *D. carthusiana* a dwoma pozostałymi gatunkami, tj. *D. dilatata* i *D. assimilis*, występowanie poziomego kłącza u tego pierwszego gatunku oraz pionowego lub rzadziej ukośnego u obu pozostałych (np. Crabbe, Jermey, Walker 1970). W materiale z Polski cecha ta sprawdza się, niemniej jednak spotyka się sporadycznie w zielniku okazy *D. assimilis* i wyjątkowo *D. dilatata* z wyraźnie poziomym kłęczem (np. *D. assimilis*: Jasiołek k. Smeręka, lg. Wołoszczak 1892 rev. Walker, KRAM (Tabl. III, 2); *D. dilatata*: Łysica, lg. Kaznowski 1926, KRAM). Niestety w zbiorach zielnikowych większość okazów wskutek niewłaściwego ich zebrania nie posiada kłaczy, zatem pełniejsze zobrazowanie zmienności tej cechy nie było w tych warunkach możliwe. Kłącze wszystkich trzech gatunków jest skrętolegle ulistnione. U *D. dilatata* i *D. assimilis* liście są gęściej skupione na kłęczu niż u *D. carthusiana*. Kłącze jest okryte nasadami starych ogonków liściowych oraz rzadkimi łuskami u *D. carthusiana* i gęstymi u obu pozostałych gatunków.

B. Łuski

U gatunków grupy *D. dilatata* łuski występują na kłęczu, okrywają pączki i młode pastorałowato zwinięte liście, a na dorosłych liściach występują na ogonku i głównej osi blaszki. Obserwacje prowadzone na okazach hodowanych na działce wykazały, że na podstawie łusek można zidentyfikować nawet całkiem młode, jeszcze pastorałowato zwinięte liście *D. carthusiana*. U tego gatunku są one okryte jasnymi, często białawymi, nielicznymi, małymi, szeroko jajowatymi łuskami. Natomiast pastorały *D. dilatata*, *D. assimilis* oraz mieszańców są bardzo gęsto okryte długimi, wąskimi, dwubarwnymi łuskami. Ponieważ w obrębie tego samego liścia łuski różnią się wielkością, kształtem, barwą i gęstością w zależności od położenia na liściu, zatem w badanym materiale porównywano u 3 omawianych gatunków zawsze łuski nasadowej i środkowej części ogonka (Tablica IV).

Wielkość łusek jest bardzo zmienna w obrębie tego samego ogonka liściowego. Ogólnie biorąc, najmniejsze łuski ma *D. carthusiana*. U tego gatunku stwierdzono łuski do 9 mm długości i do 5 mm szerokości. U obu pozostałych gatunków łuski są większe, do 15-20 mm długie i do 5 mm szerokie.

Kształt łusek zmienia się zarówno u poszczególnych gatunków, jak i w obrębie jednego liścia. Ogólnie jednak można stwierdzić, że u wszystkich zbadanych okazów *D. carthusiana* w nasadowej i środko-

wej części ogonka zdecydowanie dominowały łuski szerokojałowate, rzadziej szerokolancetowate, na szczycie tępe, krótko zaokrąglone lub wybiegające w krótki i cienki kończerek. Na ok. 120 zbadanych okazów *D. dilatata* u 80% dominowały łuski lancetowate do wąskolancetowatych, wyciągnięte na szczycie w długi, sierpowo odgięty kończerek. Zaledwie u 14% okazów przeważały łuski szerokolancetowate. *D. assimilis* wykazuje większą zmienność w kształcie łusek niż gatunek poprzedni. Na 115 przebadanych okazów ok. 60% miało łuski lancetowate, a u 40% okazów kształt łusek był od szerokolancetowatych do szerokojałowatych, zwykle z długim lub bardzo rzadko z krótkim kończykiem na szczycie.

Barwa łusek zmienia się z wiekiem rośliny. Młode liście mają łuski jaśniejszej barwy niż stare. W grupie *D. dilatata* występują dwa typy łusek: jednobarwne i dwubarwne. Z ok. 100 zbadanych okazów *D. carthusiana*, 92% miało jednobarwne, jasnobrunatne łuski, a 8% okazów miało łuski z niewielką ciemniejszą plamką w nasadzie. Jednobarwność łusek *D. carthusiana* jest jedną z najlepszych cech pozwalających odróżnić ten gatunek od obu pozostałych, u których łuski są wyraźnie dwubarwne. Cecha ta wymieniana jest zresztą przez wielu autorów zarówno starszych, jak i współczesnych flor (np.: Fiek 1881, Pawłowski 1956, Heywood 1964, Schidlay 1967) i pozwala identyfikować nawet bardzo młode liście *D. carthusiana*. Większość łusek *D. dilatata* i *D. assimilis* ma wyraźną ciemnobrunatną część centralną i jasnobrunatne części boczne. U *D. dilatata* ciemna centralna część łuski tworzy węższy lub szerszy prążek biegnący od nasady aż po szczyt łuski albo też zajmuje prawie całą powierzchnię łuski, a jaśniejsza część tworzy jedynie wąskie obrzeżenie. Łuski wspomnianych typów dominowały u ok. 60% zbadanych okazów *D. dilatata*. U pozostałych okazów łuski nie posiadały wyraźnego prążka, a tylko słabo zaznaczoną smugę lub wyraź-

Ryc. 1. Procentowy udział okazów *Dryopteris carthusiana* (1), *D. dilatata* (2) i *D. assimilis* (3) o łuskach na ogonku liściowym: rzadkich (a), średnio gęstych (b) i bardzo gęstych (c)

Fig. 1. Per cent of specimens of *Dryopteris carthusiana* (1), *D. dilatata* (2) and *D. assimilis* (3) with petioles: sparsely scaly (a), ± densely scaly (b) and very densely scaly (c)

ną ciemną plamę w dolnej części łuski. *D. assimilis* wykazuje większą zmienność w barwie łusek niż gatunek poprzedni. W analizowanym materiale na 115 okazów ok. 29% miało łuski z wyraźnym ciemnobrunatnym prążkiem, dochodzącym do szczytu łuski lub kończącym się po-

niżej, ok. 28% okazów miało łuski bez wyraźnego prążka, a tylko z delikatnie zaznaczoną ciemniejszą smugą, a u ok. 38% okazów stwierdzono łuski z wyraźną ciemną plamą w dolnej części łuski. Ponadto obserwowano wśród okazów z wyższych położeń z Tatr (ok. 5% okazów), że niektóre z nich miały łuski jednobarwne czerwono-brunatne. W literaturze spotyka się wzmianki o występowaniu w północnej Skandynawii okazów *D. assimilis* z jednobarwnymi, czerwono-brunatnymi łuskami (Nannfeldt 1966; Widén, Sarvela, Ahti 1967).

Gęstość łusek w dolnej i środkowej części ogonka liściowego oceniano szacunkowo według następujących stopni: łuski rzadkie, średnio gęste i gęste (ryc. 1). Na 109 zbadanych okazów *D. carthusiana* ok. 75% miało łuski rzadkie, a 25% średnio gęste. Na 112 okazów *D. dilatata* ok. 65% miało łuski gęste, 33% średnio gęste, a zaledwie 2% rzadkie. Ze 147 okazów *D. assimilis* ok. 45% miało łuski gęste, 51% średnio gęste, a 4% rzadkie.

C. Liść

Długość liści jest cechą trudną do analizowania na materiale zielnikowym, gdyż przy zbieraniu roślin do zielnika preferowane są z reguły okazy małe, dostosowane do formatu arkuszy zielnikowych. W naturze dorosłe okazy *D. carthusiana* dochodzą do 90 (100) cm wysokości, podczas gdy u obu pozostałych gatunków przekraczają 1 m, dochodząc u *D. assimilis* do 120 cm, a u *D. dilatata* do 150 cm wysokości. W literaturze podawane są wiadomości o występowaniu małych, poniżej 40 cm wysokich okazów *D. assimilis* z zarodnikami, podczas gdy u *D. dilatata* zarodniki pojawiają się zwykle dopiero u okazów większych (Simon, Vida 1966).

Stosunek długości blaszki liściowej do długości ogonka liściowego (ryc. 2, tab. 1) jest według autorów „Flora der Schweiz” (1967) cechą różniącą *D. carthusiana* od dwu pozostałych gatunków tej grupy. *D. carthusiana* ma według wspomnianych autorów ogonek liściowy równie długi lub dłuższy od blaszki, gdy u pozostałych gatunków ogonek liściowy jest zawsze krótszy i stanowi 1/3-3/4 długości blaszki. W przebadanym materiale z Polski ok. 7% okazów *D. carthusiana* (na 74) miało ogonek liściowy dłuższy od blaszki, 29% okazów ogonek ± równy blaszce i 64% okazów blaszkę dłuższą od ogonka (do 1,5 rzadziej do 2,25 razy, średnia arytmetyczna 1,22). U *D. dilatata* ok. 7% okazów (na 68 zbadanych) miało blaszkę ± równą ogonkowi, a 93% okazów miało blaszkę dłuższą od ogonka do 2,5 razy (średnia arytmetyczna 1,64). Na 64 pomierzone okazy *D. assimilis*, 9% okazów miało ogonek ± równy blaszce, a 91% okazów miało blaszkę dłuższą od ogonka do

Ryc. 2. Wieloboki frekwencji stosunku długości blaszki liściowej do długości ogonka. 1 — *Dryopteris carthusiana*, 2 — *D. dilatata*, 3 — *D. assimilis*

Fig. 2. Frequency diagrams of the ratio of the length of the lamina to the length of the petiole. 1 — *Dryopteris carthusiana*, 2 — *D. dilatata*, 3 — *D. assimilis*

2,75 razy; średnia arytmetyczna 1,52). Przebadane pod względem tej cechy okazy z jednej populacji *D. assimilis* z otoczenia Toporowego Stawu Niżnego w Tatrach charakteryzowały się mniejszym zakresem zmienności wartości stosunku długości blaszki do ogonka (0,85-1,61; średnia arytmetyczna 1,21). Wartości tego stosunku różnią się również w pewnym zakresie u poszczególnych liści tego samego osobnika. Na przykład dla liści okazu *D. assimilis* nr 12/70, zbadanego cytologicznie, wartości te wynosiły: 1,47, 1,85 i 1,98, a dla 3 liści okazu *D. dilatata* nr 54/71: 1,62, 1,63 i 2,25. Ponadto u okazów hodowanych na działce stosunek długości blaszki do ogonka był dla danej rośliny w ciągu kolejnych lat $\pm$ stały lub zmieniał się; np. dla okazu *D. dilatata* nr 116/71, zbadanego cytologicznie, stwierdzono średnią wartość tego stosunku obliczoną z kilku liści: 1,75 w 1971 r. 2,36 w 1973 r. i 2,50 w 1974 r.

Kształt blaszki liściowej (ryc. 3, tab. 1). Hess, Landoldt, Hirzel (1967) podają w kluczu do oznaczania gatunków z omawianej grupy, że *D. carthusiana* ma blaszkę liściową 2,5-4 razy dłuższą niż szeroką, podczas gdy dwa pozostałe gatunki 1-2 razy dłuższą. W materiale z Polski stwierdzono u wszystkich trzech gatunków dużą zmienność zarówno jeśli idzie o stosunek długości blaszki do jej szerokości, jak i pod względem położenia najszerszej części blaszki liściowej (fot. 1-3). Stosunek długości blaszki liściowej do jej maksymalnej szerokości wynosi dla większości pomierzonych okazów *D. carthusiana* 1,5-2,75, dla *D. dilatata* 1,25-2, a dla *D. assimilis* 1,25-1,75. U *D. carthusiana* można wyróżnić liście o blaszce albo wyraźnie wąskiej (fot. 1. 1) albo też szerszej (fot. 1. 2 i 3). Te dwa typy liści dały między innymi podstawę do wyróżnienia w obrębie wspomnianego gatunku dwu odmian: var. *elevata* i var. *exaltata* (Milde in Luerksen). Oba typy liści są połączone ze sobą szeregiem form pośrednich. Ogólnie biorąc

Ryc. 3. Wieloboki frekwencji stosunku długości blaszki liściowej do jej szerokości. 1 — *Dryopteris carthusiana* var. *exaltata*, 2 — *D.c.* var. *elevata*, 3 — *D. assimilis*, 4 — *D. dilatata*

Fig. 3. Frequency diagrams of the ratio of the length of the lamina to its width. 1 — *Dryopteris carthusiana* var. *exaltata*, 2 — *D.c.* var. *elevata*, 3 — *D. assimilis*, 4 — *D. dilatata*

kształt blaszki liściowej *D. carthusiana* jest od wąsko- do jajowato-lancetowatego. U *D. assimilis* częściej niż u *D. dilatata* można spotkać okazy o szerszych blaszkach liściowych. U obu tych gatunków kształt blaszki liściowej jest od jajowato-lancetowatego do szerokotrójkątnego (fot.2 i 3).

W zbadanym materiale najniższa para odcinków liściowych 1. rzędu była krótsza od następnych u 70% okazów *D. dilatata*, u 65% okazów *D. assimilis* i u 71% okazów *D. carthusiana*. Najszersza część blaszki liściowej przypada najczęściej na trzecią lub czwartą parę odcinków 1. rzędu od dołu.

Stopień podzielenia blaszki liściowej. Najslabiej podzieloną (2—3-krotnie) blaszkę liściową ma *D. carthusiana*. U obu pozostałych gatunków blaszka liściowa jest 3-4-krotnie pierzasta. *D. assimilis* różni się często od *D. dilatata* delikatnie pociętymi liśćmi. Cechę tę najlepiej ocenić porównując okazy obu gatunków równocześnie.

Stosunek długości podstawowego dolnego odcinka 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu do długości odcinka 1. rzędu. Wiele autorów (np. Clapham, Tutin, Warburg 1962; Heywood 1964; Simon, Vida 1966) opiera klucz do oznaczania *D. dilatata* i *D. assimilis* na różnicy w wartości tego stosunku. Według tych autorów *D. assimilis* ma podstawowy dolny odcinek 2. rzędu długi, równy połowie długości odcinka 1. rzędu lub nawet dłuższy. Natomiast u *D. dilatata* analogiczny odcinek 2. rzędu jest zawsze dość krótki, krótszy od połowy odcinka 1. rzędu. Jednakże stałość tej różnicy podważyli już Döpp i Gätzi (1964) publikując fotografię okazu *D. dilatata* zbadanego cytologicznie, który miał długi podstawowy odcinek 2. rzędu. Mimo to w 1966 r. Simon i Vida, biorąc

za podstawę odróżniania *D. assimilis* od *D. dilatata* tę właśnie cechę, zrewidowali materiały zielnikowe i podali mapkę rozmieszczenia *D. assimilis* w kilku krajach Europy. W niniejszym opracowaniu wspomnianej różnicy poświęcono szczególną uwagę. Starano się stwierdzić, w jakim stopniu cecha ta jest stała u każdego z dwu gatunków, a zatem jakie jest prawdopodobieństwo prawidłowej identyfikacji okazów jedynie na podstawie tej cechy. Wyniki ilustrują ryciny 4 i 5 oraz tabela 1.

Ryc. 4. Wykresy częstości stosunku długości podstawowego dolnego odcinka 2. rzędu do długości najniższego odcinka 1. rzędu. 1 — *Dryopteris dilatata*, 2 — *D. assimilis* (okazy zielnikowe z różnych części Polski), 3 — *D. assimilis* (populacja z Tatr)

Fig. 4. Frequency diagrams of the ratio of the length of the proximal basicopic pinnule on basal pinna to the total length of the pinna. 1 — *Dryopteris dilatata*, 2 — *D. assimilis* (herbarium specimens from different parts of Poland), 3 — *D. assimilis* (population from the Tatra Mts.)

Jak widać, zakresy zmienności tej cechy u *D. assimilis* i *D. dilatata* zachodzą na siebie dość znacznie, choć ich średnie arytmetyczne różnią się. Cecha ta zmienia się również w pewnym zakresie w obrębie jednej populacji *D. assimilis*, choć w mniejszym zakresie niż u okazów zielnikowych reprezentujących stanowiska z całej Polski. Ponadto stwierdzono, że wartości tego stosunku mogą różnić się — i to niekiedy dość znacznie — u różnych liści w obrębie tego samego osobnika (np. u okazu *D. dilatata* nr 120/71 wartości stosunku wahają się w granicach: 0,30–0,51; u okazu *D. assimilis* nr 12/70 zbadanego cytologicznie: 0,44–0,61). Omawiana cecha może również zmieniać się u danej rośliny w ciągu kolejnych kilku lat. Na przykład średnie wartości z kilku liści dla okazu *D. assimilis* nr 11/70 wynosiły: w 1970 r. — 0,50, w 1971 r. — 0,56 i w 1973 r. — 0,43, a u okazu *D. dilatata* nr 120/71: 0,41 w 1971 r. i 0,28 w 1974 r. Na ogół jednak średnie wartości obliczone na podstawie kilku liści z danej rośliny nie różniły się tak wyraźnie w poszczególnych latach. Z analizy zmienności omawianej cechy wynika, że ona sama nie może być podstawą do identyfikacji *D. dilatata* i *D. assimilis*, lecz tylko w połączeniu z innymi cechami. Podobne stwierdzenie należy również odnieść do kilku innych cech omówionych poniżej.

Ryc. 5. Diagram rozrzutu okazów *Dryopteris assimilis* (1) i *D. dilatata* (2) w zależności od długości podstawowego dolnego odcinka 2. rzędu (oś rzędnych) i długości najniższego odcinka 1. rzędu (oś odciętych); długość w mm

Fig. 5. Scatter diagram of specimens of *Dryopteris assimilis* (1) and *D. dilatata* (2) plotted according to the length of the proximal basicopic pinnule on basal pinna (vertical axis) and the total length of the pinna (horizontal axis); the length in mm

Stosunek długości podstawowego dolnego odcinka do długości podstawowego górnego odcinka 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu. Jak wspomniano, podstawowy dolny odcinek 2. rzędu na najniższej parze odcinków 1. rzędu jest zwykle długi u *D. assimilis*, najczęściej 2-2,5 razy dłuższy od sąsiadującego z nim od góry odcinka 2. rzędu. Powoduje to asymetrię najniższego odcinka 1. rzędu, która zanika u wyżej położonych odcinków 1. rzędu. U *D. dilatata* asymetria najniższego odcinka 1. rzędu zwykle zaznacza się słabiej, ponieważ podstawowy dolny odcinek 2. rzędu nie jest tak długi jak u *D. assimilis*, najczęściej 1,25-2 razy dłuższy od odcinka górnego. Zmienność tej cechy u obu gatunków ilustrują rycina 6 i tabela 1.

Długość dwu kolejnych odcinków dolnych 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu. W zbadanym materiale stwierdzono, że u *D. carthusiana* podstawowy dolny odcinek 2. rzędu na najniższej parze odcinków 1. rzędu jest 1-14 mm dłuższy od następnego kolejnego odcinka dolnego 2. rzędu. Również u *D. assimilis* analogiczny odcinek jest najdłuższy, a sąsiadujący z nim odcinek dolny jest o 3-20 mm krótszy. Natomiast u 24% zbadanych okazów *D. dilatata* podstawowy dolny odcinek 2. rzędu był o 1-11 mm krótszy od sąsied-

niego dolnego odcinka, a u 74% okazów o 1-13 mm dłuższy. Również u mieszańca *D. dilatata* × *assimilis* podstawowy odcinek dolny 2. rzędu może być krótszy niż odcinek sąsiedni.

Ryc. 6. Wieloboki frekwencji stosunku długości podstawowego dolnego do długości podstawowego górnego odcinka 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu. 1 — *Dryopteris dilatata*, 2 — *D. assimililis* (okazy zielnikowe z różnych części Polski), 3 — *D. assimililis* (populacja z Tatr)

Fig. 6. Frequency diagrams of the ratio of the length of the proximal basicopic pinnule on basal pinna to the length of the proximal acroscopic pinnule. 1 — *Dryopteris dilatata*, 2 — *D. assimililis* (herbarium specimens from different parts of Poland), 3 — *D. assimililis* (population from the Tatra Mts.)

Kształt najniższego odcinka 1. rzędu (ryc. 7A, tab. 1) został już zasadniczo scharakteryzowany na podstawie cech podanych poprzednio. U *D. carthusiana* i *D. assimililis* najniższy odcinek 1. rzędu ma kształt nierówno szerokotrójkątny. U większości okazów obu wymienionych gatunków odcinek ten jest 1,25-1,75 razy dłuższy niż szeroki. U *D. dilatata* analogiczny odcinek ma kształt trójkątny lub jajowato-trójkątny i jest najczęściej 1,5-2,25 razy dłuższy niż szeroki.

Kształt środkowego odcinka 1. rzędu (ryc. 7B, tab. 1) może mieć pewne znaczenie przy odróżnianiu *D. dilatata* i *D. assimililis*, jak sugerują Crabbe, Jermy i Walker (1970). W badanym materiale z Polski porównywano zawsze trzeci od dołu odcinek 1. rzędu. Stwierdzono słabo zaznaczającą się asymetrię tego odcinka u *D. assimililis*. Jego kształt jest trójkątny, a stosunek długości odcinka do jego szerokości wynosi najczęściej 2,25-3,0. Analogiczny odcinek u *D. dilatata* jest prawie symetryczny, wąskotrójkątny, najczęściej 2,5-3,5 razy dłuższy niż szeroki.

Barwa liści jest jedną z cech diagnostycznych. *D. carthusiana* ma liście zielone do ciemnozielonych (var. *exaltata*) lub żółtozielone (var. *elevata*), *D. dilatata* wyraźnie ciemnozielone, a *D. assimililis* jasnozielone. Niektórzy autorzy (np. Simon, Vida 1966, Hess, Landoldt, Hirzel 1967) oparli klucz do oznaczania *D. dilatata* i *D. assimililis* m. in. na różnicach w barwie liści. Wspomniane różnice barwy nie zawsze

Ryc. 7. Wieloboki frekwencji: A — stosunku długości do szerokości najniższego odcinka 1. rzędu, B — stosunku długości do szerokości środkowego odcinka 1. rzędu. 1 — *Dryopteris dilatata*, 2 — *D. assimilis* (okazy zielnikowe z różnych części Polski), 3 — *D. assimilis* (populacja z Tatr)

Fig. 7. Frequency diagrams: A — of the ratio of the length of the basal pinna to its width, B — of the ratio of the length of the median pinna to its width. 1 — *Dryopteris dilatata*, 2 — *D. assimilis* (herbarium specimens from different parts of Poland), 3 — *D. assimilis* (population from the Tatra Mts.)

są widoczne na materiale zielnikowym. Natomiast w terenie zaznaczają się dosyć wyraźnie, zwłaszcza kiedy mamy możliwość porównania rosnących obok siebie okazów obu tych gatunków. Obserwacje okazów rosnących na działce doświadczalnej wykazały jednak, że barwa liści zmienia się w zależności od ich wieku oraz od dostępu światła. Tak więc młode liście są zawsze jasnozielone. Jaśniejszy odcień barwy miały też okazy rosnące w pełnym świetle niż okazy z głębokiego cienia.

Inne cechy budowy liścia. U *D. carthusiana* można wyróżnić dwa typy liści: jedne o blaszkach tęgich, sztywnych, skórzastych, z odcinkami ostatniego rzędu $\pm$ wypukłymi oraz drugi typ o blaszkach bardziej delikatnych, cieńszych, płaskich. Wspomniane dwa typy liści są połączone ze sobą szeregiem form pośrednich. Podobny typ zmienności co do konsystencji liści występuje u obu pozostałych gatunków.

D. dilatata ma liście o odcinkach ostatniego rzędu bardzo często wy-

pukłych, podczas gdy liście *D. assimilis* są płaskie. Różnica ta, nie zawsze widoczna u sprasowanych podczas suszenia okazów zielnikowych, zaznacza się wyraźnie u roślin żywych, zwłaszcza u młodych liści.

D. Komórki szparkowe

Wielkość komórek szparkowych jest często skorelowana ze stopniem ploidalności (por. Tryon, Britton 1966, Widén 1971). Również w omawianej grupie paproci diploidalna *D. assimilis* ma komórki szparkowe mniejsze w porównaniu z obu pozostałymi tetraploidalnymi gatunkami. Wyniki pomiarów długości komórek szparkowych ilustrują rycina 8 i tabela 2.

Mimo że zakresy wartości długości komórek szparkowych u 3 oma-

Ryc. 8. Diagram długości komórek szparkowych u zbadanych okazów: A — *Dryopteris assimilis*, B — *D. dilatata*, C — *D. carthusiana*; liczby komórek szparkowych w poszczególnych klasach: a — 1-5, b — 6-10, c — 11-15, d — 16-20, e — 21-25. Linie pionowe oznaczają średnie arytmetyczne zbadanych gatunków *Dryopteris*

Fig. 8. Diagram of the length of stomata in the examined specimens: A — *Dryopteris assimilis*, B — *D. dilatata*, C — *D. carthusiana*; numbers of stomata in the particular classes: a — 1-5, b — 6-10, c — 11-15, d — 16-20, e — 21-25. Vertical lines show the arithmetical means of *Dryopteris* species

Tabela 2 — Table 2

Zakres zmienności długości komórek szparkowych u gatunków z grupy *D. dilatata* (wartości w poszczególnych klasach podano w procentach)

Range of variability of stomata length of species in the *D. dilatata* complex (numbers in particular classes in per cent)

Gatunek Species	Klasy długości w μm — Classes of length in μm									Min.-Max.	M	Liczba komórek szparko- wych Number of stomata	Liczba okazów Number of specimens
	33,3-36,7	36,8-40,2	40,3-43,7	43,8-47,2	47,3-50,7	50,8-54,2	54,3-56,7	57,8-61,2	61,3-64,7	64,8-68,2	68,3-71,7		
<i>D. assimilis</i>	0,2	1,5	12,5	35,8	31,0	16,5	2,3	0,2				400	8
<i>D. dilatata</i>				1,1	14,1	39,8	28,2	12,2	4,4	0,2		500	10
<i>D. carthusiana</i>					3,0	21,5	34,3	25,0	12,8	3,2	0,2	400	8

wianych gatunków zachodzą na siebie, to jednak w średnich arytmetycznych zaznaczają się wyraźne różnice (dla *D. assimilis* $M=47,6\ \mu\text{m}$, dla *D. dilatata* $M=54,25\ \mu\text{m}$, dla *D. carthusiana* $M=57,05\ \mu\text{m}$). Na podstawie tych wstępnych badań wydaje się, że długość komórek szparkowych może okazać się ważną cechą anatomiczną użyteczną przy identyfikacji zieleniokowych okazów *D. assimilis* i *D. dilatata* nie posiadających zarodników. Jak już wspomniano, identyfikacja takich okazów na podstawie samych tylko cech makroskopowych często nie jest możliwa.

E. Ogruczenie

U gatunków grupy *D. dilatata* gruczołki mogą występować na zawijce, ogonku liściowym, na osi liścia i jego odcinków, na dolnej stronie blaszki liściowej, na brzegu liścia oraz na brzegu łusek. Zupełny brak gruczołków u *D. carthusiana* oraz obecność ich u *D. dilatata* s. l. (tzn. łącznie z *D. assimilis*) wymienia się w wielu florach i szczegółowych opracowaniach jako jedną z kluczowych cech, różniących te gatunki (np. Nannfeldt 1966, Pawłowski 1956, Schidlay 1967). Niektórzy autorzy różnice w ogruczeniu u omawianych gatunków odnoszą wyłącznie do zawijki (np. Heywood 1964, Karpowicz 1972). Tylko nieliczni autorzy podają, że zawijka u *D. carthusiana* może być także nieco ogruczona (np. Hegi 1965) lub podają, że zawijka jest u tego gatunku „najczęściej nieogruczona” (Ascherson, Graebner 1896-98), co pozwala przypuszczać, że autorzy ci mieli również okazy z ogruczonymi zawijkami. W obrębie *D. carthusiana* wyróżniono już dawno var. *glandulosa* Milde (Luerssen 1889, Domin 1942), u której ogonek liściowy, oś liścia oraz blaszka liściowa na dolnej stronie i na brzegu są ogruczone. Jest to jednak forma rzadka. Widén i in. (1966, 1970) również podają wzmiankę o sporadycznym występowaniu okazów *D. carthusiana* z ogruczonymi liśćmi w materiale z Finlandii. Równocześnie w obrębie *D. dilatata* s. l. już dawniejsi autorzy wspominali o dużej zmienności ogruczenia liści, wyróżniając nawet formy nieogruczone (Domin 1942). W tej sytuacji w niniejszym opracowaniu poświęcono nieco więcej uwagi ogruczeniu zawijek i liści.

Ogruczenie liści oceniano szacunkowo według 4 wyróżnionych klas: 1 — brak gruczołków, 2 — gruczołki nieliczne, 3 — gruczołki średnio liczne, 4 — gruczołki bardzo liczne. Osobno określano ogruczenie zawijek, dzieląc rośliny na dwie grupy: 1 — o zawijkach nagich, 2 — o zawijkach ogruczonych. Wyniki zestawiono w tabeli 3. W przebadanym materiale z Polski wszystkie okazy *D. dilatata*, które widziałam, oraz większość okazów *D. assimilis* miało zawijki ogruczone. Cecha ta nie zawsze była łatwa do określenia, ponieważ u starszych okazów gruczołki często odpadają. Zawijki *D. dilatata* są gęsto ogruczone, podczas gdy u *D. assimilis* często gruczołki na zawijce są nieliczne.

Fot. A. Pachowski

Fot. 5. Zarodniki gatunków z grupy *Dryopteris dilatata* w mikroskopie świetlnym (pow. 550×)

Phot. 5. Spores of the three fern species of the *Dryopteris dilatata* complex in the light microscope (all ×550)

1 — *Dryopteris carthusiana* var. *elevata*: Wronów, lg. H. Stasiak 1950, LBL; 2 — *D. dilatata*: Pieniny, lg. E. Koteja 1963, KRAM; 3 — *D. assimilis*: Bieszczady, lg. K. Piech 1925, KRAM

Fot. H. Piękoś i A. Reński

Fot. 6. Zarodniki *Dryopteris carthusiana* w elektronowym mikroskopie skaningowym

Phot. 6. Spores of *Dryopteris carthusiana* in the SEM

1, 3, 5 — *D. carthusiana* var. *elevata* (360X, 1200X, 3600X): Dygowo, lg. J. Mądalski 1947, JM;
2, 4 — *D. carthusiana* var. *exaltata* (1200X, ca. 6000X): Spytkowice, lg. M. Guzikowa 1966.

KRAM

Fot. H. Piękoś i A. Reński

Fot. 7. Zarodniki *Dryopteris dilatata* i *D. assimilis* w elektronowym mikroskopie skaningowym

Phot. 7. Spores of *Dryopteris dilatata* and *D. assimilis* in the SEM
 1, 3 — *D. dilatata* (360×, 1200×): Sobótka, lg. J. Mądalski 1953, JM; 5 — *D. dilatata* (ca. 6000×):
 Mochy, lg. J. Paczoski 1932, POZ; 2, 6 — *D. assimilis* (360×, ca. 6000×): Rajewo, lg. J. Serwatka
 1966, WRS; 4 — *D. assimilis* (1200×): Sieraków, lg. K. Nowak 1970, KN

Tabela 3 — Table 3

Ogruczenie zawijek i liści gatunków z grupy *Dryopteris dilatata*
(liczby okazów w %)Glandularity of indusium and leaf in the *Dryopteris dilatata* complex
(numbers of specimens in per cent)

Gatunek Species	Zawijka—Indusium		Liście — Leaves				Liczba zbadanych okazów Number of exa- mined specimens
	nieogru- czolona eglandu- lar	ogruczo- lona glandular	bez gru- czołków without glands	słabo ogruczo- lone sparsely glandular	średnio gęsto ogruczo- lone ± densely glandular	gęsto ogruczo- lone densely glandular	
<i>D. carthusiana</i>	70,4	29,6	78,2	21,8	—	—	206
<i>D. dilatata</i>	—	100,0	1,9	14,4	65,4	18,3	104
<i>D. assimilis</i>	16,8	83,2	12,2	36,4	22,4	29,0	107

Typowe okazy *D. carthusiana* w przeważającej większości mają zawijki nieogruczone. U około 30% okazów występowały nieliczne gruczołki na niektórych tylko zawijkach. Okazy o wyraźnie ogruczonych zawijkach przy bliższym zbadaniu okazały się mieszańcami z *D. dilatata* s.l., na co wskazywałyby zmarniałe zarodniki oraz inne cechy morfologiczne. Zwykle mieszańce te miały również wyraźnie ogruczoną blaszkę liściową i ogonki, podczas gdy typowe okazy *D. carthusiana* były zupełnie nagie lub z pojedynczymi gruczołkami. Szeroki zakres zmienności gęstości ogruczenia liści wykazują *D. dilatata*, a zwłaszcza *D. assimilis*. U tego ostatniego gatunku stwierdzono zmienność od okazów o bardzo licznych gruczołkach aż do zupełnie pozbawionych gruczołków. *D. dilatata* ma najczęściej liście średnio gęsto ogruczone, a okazy zupełnie nieogruczone stanowiły w analizowanym materiale zaledwie około 2%.

Stopień ogruczenia blaszki liściowej u *D. assimilis* i *D. dilatata* jest ± podobny u wszystkich liści w obrębie danego okazu. W przebadanych populacjach *D. assimilis* różne okazy były w różnym stopniu ogruczone.

U okazów hodowanych na działce gęstość ogruczenia była ± stała dla danego okazu w różnych latach lub zmieniała się w nieznacznym stopniu.

U wszystkich trzech gatunków ogruczenia zawijek i liści wydają się być cechami słabo (lub w ogóle nie) zkorelowanymi. Tak np. u *D. assimilis* są okazy o bardzo gęsto ogruczonych blaszkach liściowych, a całkiem nagich zawijkach. Często spotyka się okazy *D. carthusiana* z pojedynczymi gruczołkami na zawijce i o całkiem nagich liściach. Okazy *D. dilatata* mają — jak wyżej powiedziano — zawsze gęsto ogruczone zawijki, natomiast liście od całkiem nagich aż do bardzo gęsto ogruczonych.

Według autorów fińskich (Widén i in. 1967, 1970) jedną z cech anatomicznych różniących gatunki z grupy *Dryopteris dilatata* jest długość włosków wydzielniczych w przestworach międzykomórkowych w kłacu i ogonku liściowym. Tak więc *D. assimilis* ma włoski wydzielnicze 60-85 μm długie *D. dilatata* — 75-120 μm , a *D. carthusiana* — 80-115 (140) μm . Włoski wydzielnicze zilustrowano na przykładzie *Dryopteris dilatata* (ryc. 9).

Ryc. 9. Wewnętrzny włoszek wydzielniczy w przestworach międzykomórkowych nasady ogonka liściowego u *Dryopteris dilatata* (okaz nr 116/71)

Fig. 9. Internal secretory hair in the intercellular space of the petiolar base in *Dryopteris dilatata* (specimen no. 116/71)

G. Zarodniki

Cechy morfologii zarodników są jednym z ważnych kryteriów różnicowania gatunków u paproci (Karpowicz 1929, Crane 1955, 1960, Sorsa 1964). Dotychczasowe badania nad gatunkami z grupy *Dryopteris dilatata* wydają się wskazywać, że barwa zarodników i skulptura perisporu mogą mieć duże znaczenie przy identyfikacji gatunków omawianej grupy (Crabbe, Jermy, Walker 1970, Piękoś 1975).

Barwa. Barwę dojrzałych zarodników gatunków z grupy *D. dilatata* oceniano według kodu barw (Locquin 1957). Stwierdzono następujące różnice w barwie 3 omawianych gatunków:

<i>D. carthusiana</i> :	zarodniki czarnobrunatne	($G_{40}R_{50}B_{20}$ — wg kodu barw)
<i>D. dilatata</i> :	ciemnobrunatne	($G_{40}R_{50}B_{20}Y_{10}$ " " ")
<i>D. assimilis</i> :	jasnobrunatne	($G_{40}R_{50}B_{05}Y_{30}$ " " ")

Różnice w barwie zarodników pomiędzy *D. dilatata* i *D. assimilis* widać zupełnie dobrze gołym okiem, kiedy zarodniki w większej masie wy-

sypane są na arkuszu zielnikowym. Barwę zarodników można również ocenić w terenie, przez rozgniecenie dojrzałych zarodni na powierzchni blaszki liściowej.

Wielkość. Wymiary zarodników podawane w literaturze różnią się niekiedy dość znacznie. Widén, Sarvela, Ahti (1967) podają następujące wymiary zarodników (z perisporem): *D. carthusiana* 44-56 × 32-36 μm, *D. dilatata* 48-56 × 36-40 μm, *D. assimilis* 48-60 × 32-40 μm. Dane według W. Karpowicz (1929, 1960): *D. carthusiana* 40-55 × 32,5-35 μm, *D. dilatata* s.l. 42,5-65 × 37,5-50 μm. Dane według Nardiego (1976): *D. assimilis* 45-54 × 32-41 μm, *D. dilatata* 46 × 34 μm.

Pomiary zarodników (wraz z perisporem), jakie wykonałam na materiale acetolizowanym, wykazały, że wielkość zarodników w obrębie 1 liścia waha się w szerokich granicach. Jak widać z tabeli 4, największe zarodniki ma *D. assimilis*, a najmniejsze *D. carthusiana*, jednakże zakresy wartości wymiarów dla wszystkich 3 gatunków zachodzą na siebie bardzo wyraźnie. Wielkość zarodników nie jest zatem cechą pozwalającą rozróżnić gatunki grupy *D. dilatata*.

Pomiary długości zarodników bez perisporu, przeprowadzone na tym samym materiale, dały następujące wyniki:

<i>D. carthusiana</i> :	(44-)-47,5-54,6(-56,3) μm
<i>D. dilatata</i> :	(35,2-)-47,5-54,6(-59,8) μm
<i>D. assimilis</i> :	(35,2-)-42,2-52,8(-61,6) μm:

Porównanie długości zarodników bez perisporu tetraploidalnej *D. dilatata* i blisko z nią spokrewnionej diploidalnej *D. assimilis* wskazywałoby na to, że wielkość zarodników u tych gatunków nie jest skorelowana ze stopniem ich ploidalności.

Kształt. Zarodniki wszystkich 3 gatunków *Dryopteris* mają symetrię dwuboczną. Różnice gatunkowe w kształcie zarodników widoczne pod mikroskopem świetlnym ilustruje tablica V. Zarodniki oglądane pod lupą lub mikroskopem świetlnym są w zarysie kanciaste u *D. dilatata* i zaokrąglone u *D. assimilis*.

Dalsze różnice w kształcie zarodników ujawnił elektronowy mikroskop skaningowy (SEM), przy pomocy którego możliwe było również zbadanie w szczegółach skulptury perisporu (Crabbe, Jermey, Walker 1970, Briton 1972, Piękoś 1975).

Skulptura perisporu. Różnice w morfologii zarodników 3 omawianych gatunków, stwierdzone przy zastosowaniu SEM, przedstawiono na elektronogramach (tablice VI i VII).

Perispor *D. carthusiana* jest pofałdowany, z pojedynczymi brodawkowatymi wypukłościami. Na powierzchni występują liczne stożkowate

Tabela 4 — Table 4

Pomiary długości i szerokości zarodników (wraz z perisporem) gatunków z grupy *Dryopteris dilatata*
(wartości w poszczególnych klasach podano w procentach)

Results of measurement of the length and width of spores (perispore included) in the *Dryopteris dilatata* complex
(numbers in particular classes in per cent)

Gatunek Species	Klasy długości w μm — Classes of length in μm								Min.-Max.	M	Liczba zarod- ników Number of spores	Liczba okazów Number of speci- mens
	40,0-44,9	45,0-49,9	50,0-54,9	55,0-59,9	60,0-64,9	65,0- 69,9	70,0- 74,9	75,0- 79,9	80,0- 84,9			
<i>D. carthusiana</i>		1,7	20,5	53,0	16,9	6,6	1,3			58,97	302	6
<i>D. dilatata</i>	0,7	3,0	26,2	40,5	16,3	10,6	2,7			58,86	300	6
<i>D. assimilis</i>		4,9	13,7	20,1	25,9	20,1	11,3	3,9	0,4	60,38	204	5
Gatunek Species	Klasy szerokości w μm — Classes of width in μm								Min.-Max.	M	Liczba zarod- ników Number of spores	Liczba okazów Number of speci- mens
	25,0-29,9	30,0-34,9	35,0-39,9	40,0-44,9	45,0-49,9	50,0- 54,9	55,0- 59,9					
<i>D. carthusiana</i>	0,3	4,3	67,6	25,8	1,7	0,3			29,9-52,5	38,51	302	6
<i>D. dilatata</i>		2,0	52,5	32,9	12,3	0,3			31,7-52,5	39,20	300	6
<i>D. assimilis</i>		1,5	27,0	42,6	22,5	5,4	1,0		31,7-56,3	41,95	204	5

kolce, zredukowane często do brodawkowatych wyrostków. Kolce perisporu są ostre, tępe lub zaokrąglone na szczycie, w nasadzie szerokie i zlewające się lub stojące oddzielnie. W zbadanym materiale z Polski zarodniki z kolcami zlewającymi się w nasadach należały do okazu zaliczonego przeze mnie do var. *exaltata*. Natomiast zarodniki z kolcami nie zlewającymi się pochodziły z okazu oznaczonego jako var. *elevata*. Czy określony typ zarodników jest w tym przypadku skorelowany z daną odmianą, wyróżnioną na podstawie morfologii liści, trudno rozstrzygnąć bez badań na szerszym materiale.

Typ zarodników *D. carthusiana* o zlewających się kolcach przypomina zarodniki *D. dilatata*, mimo że cechami makroskopowymi gatunki te różnią się wyraźnie.

Zarodniki *D. dilatata* mają gruby skórzasty perispor z wyraźnymi żebrami na powierzchni, podczas gdy perispor *D. assimilis* jest cienki, błoniasty i kruchy, z szerokimi fałdami. Crabbe, Jermy i Walker (1970) oceniają pokrycie powierzchni zarodnika przez kolce na ok. 50% u *D. dilatata* oraz 10-25% u *D. assimilis*. Różnice w gęstości kolców u omawianych gatunków widoczne są również w mikroskopie świetlnym. U obu wymienionych gatunków daje się jednakże zauważyć pewną zmienność w gęstości kolców, nawet w obrębie tego samego liścia. Dlatego przy identyfikacji gatunków należy uwzględnić nie pojedyncze zarodniki, lecz ich większą liczbę.

Kolce *D. dilatata* są dość mocne, prawie stożkowate, często zlewające się wyraźnie rozszerzonymi nasadami. Kolce *D. assimilis* są smukłe, słabo rozszerzone w nasadach i zwykle nie zlewające się z sobą. Kolce *D. dilatata* (1-2 μm długie) są zwykle większe w porównaniu z kolcami *D. assimilis* (ok. 1 μm długie). Tę cechę niektórzy autorzy podają jako cechę kluczową przy odróżnianiu tych 2 gatunków (np. Crane 1955, Simon, Vida 1966). Długość kolców jest jednak cechą zmienną zarówno u *D. dilatata* jak i u *D. assimilis*, na co zwrócili już uwagę Hess, Landoldt i Hirzel (1967) oraz Melzer (1970), a co również można było stwierdzić w materiale z Polski.

Na fotografiach 5 i 6 (Tablica VII), które przedstawiają szczegóły skulptury perisporu, widać, że kolce *D. dilatata* są często ostro zakończone. W literaturze donoszono dotychczas, że kolce tego gatunku są tępe (np. Flora Europaea 1964, Flora der Schweiz 1967). Tę cechę, obserwowaną w mikroskopie świetlnym przy powiększeniu 1000 $\times$, uważano za istotną różnicę w stosunku do *D. assimilis*, której kolce miały być ostre. We „Flora der Schweiz” oparto na tej cesze klucz do oznaczania gatunków *D. dilatata* i *D. assimilis*. Istotnie, w mikroskopie świetlnym bardziej mocne i szersze kolce *D. dilatata* sprawiają wrażenie tępych w porównaniu z bardziej delikatnymi i smukłymi kolcami *D. assimilis*, które wskutek tego wydają się być ostre.

W mikroskopie skaningowym zbadano również zarodniki pochodzące

z okazów trudnych do identyfikacji na podstawie samej tylko morfologii liści. Zarodniki tych okazów nie wykazywały w skulpturze perisporu cech pośrednich między *D. dilatata* i *D. assimilis*, lecz można je było jednoznacznie zaklasyfikować do jednego z wymienionych gatunków na podstawie skulptury perisporu.

Omówione wyżej wyniki badań nad zarodnikami 3 gatunków z grupy *D. dilatata* wydają się wskazywać na to, że barwa i cechy morfologii zarodników mogą stanowić dobrą podstawę do identyfikacji omawianych gatunków. Dotyczy to zwłaszcza *D. dilatata* i *D. assimilis*, nie zawsze możliwych do rozróżnienia na podstawie samych tylko cech makroskopowych.

H. Gametofit

Mimo że identyfikacja paproci opiera się na sporoficie, porównawcze badania gametofitów mogą mieć także wartość taksonomiczną i rzucić światło na sprawę pokrewieństwa w grupie paproci (Atkinson 1973). Użytecznych w taksonomii informacji dostarczają zarówno typ kiełkowania i typ rozwoju, jak i cechy kształtu oraz budowy przedrośla i jego organów seksualnych. Cechy gametofitu mogą być stałe w danej rodzinie, rodzaju czy gatunku lub też mogą różnić się od gatunku do gatunku. Mimo licznych prac, jakie wykonano zwłaszcza w ciągu ostatnich 25 lat, ciągle jeszcze brak danych o gametofitach wielu przedstawicieli paproci (Atkinson 1973).

Rodzaj *Dryopteris* należy do bardzo dobrze zbadanych pod względem budowy gametofitu. W Polsce szczegółowe badania nad rozwojem przedrośli wykonała Karpowicz (1929, 1960), uwzględniając w swej pracy również *D. carthusiana* oraz *D. dilatata* s.l. Przedrośla w całym rodzaju *Dryopteris* charakteryzują się raczej jednakowym typem budowy. Ponieważ jednak do tej pory nie prowadzono badań porównawczych nad gametofitami *D. assimilis*, uzupełniono niniejszą pracę o kilka obserwacji z tego zakresu.

Zarodniki wszystkich trzech gatunków zebrane jesienią poprzedniego roku kiełkowały z łatwością w bardzo dużym procencie i to już po około dwu tygodniach od wysiania. W szybkości kiełkowania trzech omawianych gatunków nie stwierdzono różnic. Natomiast zarodniki pochodzące z okazów zielnikowych, zebranych w poprzednich latach (1-4 lat wcześniej), wykazały bardzo niską zdolność kiełkowania. Rozwój gametofitu przebiega od stadium nitki przez stadium łopatki do stadium przedrośla (Tablica VIII).

Rozwój stadium nitki, łopatki i sercowatego przedrośla przebiega u *D. dilatata* i *D. assimilis* ± w tym samym czasie. Jeżeli wysiew zarodników nie był gęsty, to stadium nitki trwa zaledwie kilka dni, a pierwsze sercowate przedrośla pojawiają się już po 6 tygodniach. Natomiast przy gęstym wysiewie poszczególne stadia rozwoju gametofitu silnie wydłu-

żają się w czasie. Tak np. jeszcze po 180 dniach od wysiewu obserwowano liczne nitki u *D. assimilis*. Najczęściej spotykane liczby komórek w stadium nitki wynosiły 7 lub 8 u *D. carthusiana* oraz 7-9 u obu pozostałych gatunków. Kształt komórek i ich liczba zmieniały się w zależności od dostępu światła. Nitki rosnące w dużym zagęszczeniu (mniejszy dostęp światła) miały większą liczbę komórek i komórki te były silnie wydłużone w porównaniu z nitkami rosnącymi pojedynczo. Pierwszy chwytник pojawia się już na komórce podstawowej, dalsze w stadium nitki, łopatki i na dorosłym przedroślu. Dojrzałe przedrośla wszystkich trzech gatunków mają kształt wydłużonosercowaty do szeroko-sercowatego. Charakterystyczną cechą przedrośli rodzaju *Dryopteris* jest występowanie na nich u wszystkich gatunków gruczołowatych włosków (Tablica VIII g.). Szerokość dojrzałych gametofitów wynosi 3-5 mm.

I. Dane cytologiczne

W wyniku badań cytogenetycznych prowadzonych nad grupą *Dryopteris dilatata* zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej stwierdzono, że *D. carthusiana* i *D. dilatata* są allotetraploidami o liczbie chromosomów $2n=164$, a *D. assimilis* jest diploidem o liczbie chromosomów $2n=82$ (Manton 1950, Walker 1955, 1961, Crabbe, Jermy, Walker 1970, Döpp, Gätzi 1964, Simon, Vida 1966, Wیدن, Sorsa 1966, i in.). Te same liczby chromosomów stwierdzono również na materiale z Polski (ryc. 10). Rośliny do badań cytologicznych zebrano w latach 1970-1974 z kilkunastu stanowisk w Polsce i hodowano na działce doświadczalnej w Krakowie. Wszystkie rośliny zbadane cytologicznie analizowano szczegółowo pod względem morfologii ich liści i zarodników. Prócz okazów o typowej morfologii liści zbadano liczbę chromosomów dla okazu nr 116/71 oznaczonego na podstawie zarodników jako *D. dilatata*, lecz o wybitnie długim dolnym podstawowym odcinku 2. rzędu, sugerującym, że mamy do czynienia z *D. assimilis*. Jednakże liczba chromosomów u tego okazu była charakterystyczna dla *D. dilatata* ($2n=164$). Liczbę chromosomów $2n=82$ podano m. in. dla okazu, który miał zarodniki *D. assimilis*, lecz morfologią liści odbiegał od typowych okazów tego gatunku (okaz nr 132/74).

Wynika stąd, że typ zarodników i liczba chromosomów są z sobą skorelowane. Potwierdza to wyniki otrzymane w Wielkiej Brytanii (Crabbe, Jermy, Walker 1970).

V. IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA

Dyskusja

Prawie wszyscy współcześni autorzy traktują *D. carthusiana*, *D. dilatata* i *D. assimilis* w randze gatunków. Wyjątek stanowi opracowanie

Ryc. 10. Płytki metafazowe ze stożków wzrostu korzeni: 1 — *Dryopteris assimilis* $2n=82$ (okaz nr 6/70), 2 — *D. dilatata* $2n=164$ (okaz nr 133/74), 3 — *D. carthusiana* $2n=164$ (okaz nr 26/70)

Fig. 10. Root-tip metaphase plates: 1 — *Dryopteris assimilis* $2n=82$ (specimen no. 6/70), 2 — *D. dilatata* $2n=164$ (specimen no. 133/74), 3 — *D. carthusiana* $2n=164$ (specimen no. 26/70).

Schidlay'a we „Flora Slovenska” (1966), gdzie autor potraktował wspomniane 3 taksony jako podgatunki w obrębie *D. spinulosa*. Schidlay podaje jako argument fakt, że taksony te są połączone szeregiem form przejściowych, między którymi nie da się postawić wyraźnej granicy. Formy przejściowe są według niego pospolite w Karpatach i rosną często na stanowiskach, gdzie brak jednego z taksonów.

Moim zdaniem status gatunkowy *D. carthusiana* nie powinien budzić wątpliwości. Takson ten różni się wystarczająco od *D. dilatata* i *D. assimilis* kształtem, barwą, liczbą i wielkością łusek na ogonku liściowym, pocięciem liści, brakiem ogruczenia, barwą i skulpturą zarodników, tak że jego identyfikacja nie sprawia na ogół większych trudności. Formy o cechach pośrednich, trudne do jednoznacznego oznaczenia, są pochodzenia mieszańcowego, na co dowodem są zmiarniałe zarodniki oraz dane cytologiczne.

Fot. 8. Stadia rozwoju gametofitu *Dryopteris assimilis* S. Walker.

a-c — kielkująca nitka (pow. 164×), *d* — stadium wczesnej łopatki (pow. 164×), *e* — stadium łopatki (pow. 65×), *f* — przedrośle (pow. 38×), *g* — włoski gruczołowe na brzegu przedrośla (pow. 92×)

Phot. 8. Stages in the development of gametophyte in *Dryopteris assimilis* S. Walker

a-c — germ filament (164×), *d* — early spatula stage (164×), *e* — spatula stage (65×), *f* — mature cordate prothallium (38×), *g* — glandular hairs an margin of prothallium (92×)

Ranga gatunkowa *D. assimilis* może budzić pewne wątpliwości, zważywszy, że makroskopowe cechy uznawane za diagnostyczne okazały się na tyle zmienne, że nie zawsze pozwalają na pewne odróżnienie tego taksonu od *D. dilatata*. Jako jedyne pewne cechy, pozwalające na identyfikację tych 2 taksonów, pozostają zatem liczba chromosomów oraz barwa i morfologia zarodników z ich skulpturą włącznie. Cechy morfologii zarodników są dość trudne do studiowania; wymagają nieco doświadczenia i ograniczają możliwości pewnej identyfikacji jedynie do okazów o dojrzałych zarodnikach.

D. dilatata i *D. assimilis* łatwo krzyżują się, a mieszańce są zawsze sterylne (Wagner, Chen 1965). W populacji niekiedy mieszańce dominują liczebnie nad formami rodzicielskimi (np. na Babiej Górze). Zdarza się również, że na danym stanowisku występuje mieszańiec w towarzystwie tylko jednego z gatunków rodzicielskich. Jednakże, wobec możliwości transportu zarodników paproci na dużą odległość, krzyżowanie w przyrodzie może prawdopodobnie zachodzić na dużą skalę, a brak jednego z rodziców na danym stanowisku nie stanowi przeszkody dla krzyżowania.

Na podstawie badań nad indukowaną apogamią oraz analizą chromosomów w mejozie u mieszańców sztucznie zsyntetyzowanych oraz naturalnych, Walker (1955) doszedł do wniosku, że *D. carthusiana* jest allotetraploidem, posiadającym genomy B+C, *D. dilatata* — również allotetraploidem o genomach C+D, a *D. assimilis* — diploidem, którego jedyny genom C jest reprezentowany u obu poprzednio wymienionych gatunków. Jak zatem widać, są to 3 gatunki bardzo blisko spokrewnione, wykazujące duże podobieństwo zarówno w cechach morfologicznych, jak i chemicznych. W wyniku badań cytogenetycznych ustalono, że mechanizmami prowadzącymi do powstania gatunków w grupie *D. dilatata* było krzyżowanie i poliploidalność (Vida 1972). Proponowana klasyfikacja taksonów w grupie *D. dilatata* jest zatem klasyfikacją cytogenetyczną, mającą sens ewolucyjny. Jest ona powszechnie przyjmowana w ostatnich pracach taksonomicznych nad tą grupą paproci. Również i w niniejszym opracowaniu potraktowano omawiane taksony w randze gatunków. Za takim ujęciem przemawiają wspomniane powyżej wyniki badań cytogenetycznych, sterylność mieszańców oraz różnice morfologiczne, głównie w zarodnikach, a także zaznaczające się różnice w niektórych cechach makroskopowych (por. rozdz. IV). Taksony w grupie *D. dilatata* pomimo dużej zmienności różnią się wystarczająco, by móc je zidentyfikować jednoznacznie. Należy tu jednak zaznaczyć, że są to tzw. drobne gatunki, blisko spokrewnione, a różnice pomiędzy nimi są dość subtelne.

D. dilatata i *D. carthusiana* powstały na drodze krzyżowania i podwojenia liczby chromosomów, z diploidalnych przodków, których jeden genom jest dziś reprezentowany u *D. assimilis*. Jak pokazano w poprzed-

nim rozdziale, *D. assimilis* posiada szeroką zmienność pod względem morfologicznym, cytologicznym i chemicznym. Nie jest więc bezpodstawną hipoteza wysuwana w literaturze, że różne cytotypy lub chemotypy pierwotnej *D. assimilis* mogły być formami wyjściowymi dla dwu allo-tetraploidów: *D. carthusiana* i *D. dilatata*. Dotąd nie rozwiązany natomiast pozostaje problem ewentualnej introgresji w grupie *D. dilatata*. W literaturze podkreśla się, że mieszańce w grupie *D. dilatata* są sterylne (Walker 1955, Wagner, Chen 1965), a introgresja nie zachodzi. Tymczasem wygląd mieszanых populacji, trudny do wytłumaczenia jedynie na podstawie polimorfizmu tych taksonów, sugerowałby, jak się wydaje, taką możliwość. Wymaga to jednak specjalnych badań.

VI. KLUCZ DO OZNACZANIA GATUNKÓW

1. Wszystkie łuski na ogonku liściowym jednobarwne jasnobrązowe, najczęściej jajowate do szeroko jajowatych, na szczycie co najwyżej z bardzo krótkim kończykiem; największe nie przekraczają 9 mm długości *D. carthusiana* (Vill). H. P. Fuchs
- 1*. Przynajmniej część łusek na ogonku liściowym dwubarwna, z ciemnobrunatną częścią środkową i jaśniejszym obrzeżeniem; łuski najczęściej lancetowate do jajowatych, na szczycie zawsze z dość długim (do 1/3 długości łuski) kończykiem; najdłuższe powyżej 9 mm długości 2
2. Zarodniki ciemnobrązowe. Podstawowy dolny odcinek 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu zwykle krótszy od 1/2 długości odcinka 1. rzędu *D. dilatata* (Hoffm.) A. Gray
- 2*. Zarodniki jasnobrązowe. Podstawowy dolny odcinek 2. rzędu na najniższym odcinku 1. rzędu równy ok. 1/2 długości odcinka 1. rzędu *D. assimilis* S. Walker

VII. TAKSONY

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs

D. carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs Bull. Soc. Bot. France 105:339 (1958)
Heywood Fl. Europ. 1:21 (1964)

Bazonim: *Polypodium carthusianum* Vill. Hist. Plantes Dauph. 1:292 (1786).

Syn.: *Polypodium spinulosum* O. F. Müll. Fl. Dan. 4, 12:7, tab. 707 (1777); *Polystichum spinulosum* DC. sensu Berdau Fl. Tatr... 817 (1890), sensu Sagorski, Schneider Fl. Centr.-Carp. 2:581 (1891); *Aspidium spinulosum* Sw. sensu Szafer, Kulczyński, Pawłowski Rośl. pol. 8 (1924);

A. spinulosum Sw. a) *genuinum* Röper sensu Fiek. Fl. Schl. 553 (1881); *A. spinulosum* Sw. subsp. *genuinum* Milde sensu Luerksen Farnpfl. 433 (1889); *A. spinulosum* (Müll.) Sw. subsp. *euspinulosum* Aschers. sensu Ascherson, Graebner Syn. Mitteleurop. Fl. 1:32 (1896); *Lastrea spinulosa* Presl. Tent. Pterid. 76 (1936); *Nephrodium spinulosum* (Müll.) Strempel subsp. *euspinulosum* Aschers. sensu Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. 1:27 (1927); *Dryopteris spinulosa* (Müll.) Ktze. sensu Raciborski Fl. pol. 1:20 (1919), sensu Fl. ZSRR 1:40 (1934), sensu Szafer, Kulczyński, Pawłowski, Rośl. pol. ed. 2, 11 (1953), sensu Pawłowski Fl. Tatr 1:153 (1956); *D. spinulosa* (Müll.) Ktze. subsp. *euspinulosa* Aschers. sensu Hegi Ill. Fl. 1:28 (1965); *D. spinulosa* (Müll.) Watt sensu Rothmaler Exkurs. Fl. 4:7. (1965); *D. spinulosa* (Müll.) Watt subsp. *spinulosa* sensu Schidlay Fl. Slov. 2:214 (1966); *Dryopteris euspinulosa* (Diels) Fom. Fl. USSR 1:64 (1938); *Dryopteris lanceolatocristata* (Hoffm.) Alston Watsonia 4(1):41 (1957).

Typ: Francja (allant du chateau d'Entremont á la grande Chartreuse par le mont Bovinant).

Nomenklatura

D. carthusiana opisał Villars w 1786 r. Jednakże już wcześniej, bo w 1767 r., Müller we „Flora Fridrichsdalina” podał bez epitetu gatunkowego w obrębie rodzaju *Polypodium* opis oraz fragmentaryczny rysunek, które mogłyby dotyczyć omawianej rośliny. Następnie w 1777 r. ten sam autor we „Flora Danica” opisał *Polypodium spinulosum* i zilustrował go rysunkiem całej rośliny. Jednakże rysunek Müllera zidentyfikował Woynar (1818) jako *Dryopteris uliginosa* (Newm.) Kuntze ex Druce (= *D. cristata* × *carthusiana*), a opis nie zawiera żadnych cech, na podstawie których można by omawianą roślinę odróżnić od *D. dilatata*. Ponadto już w roku 1768 Burmann pod nazwą *Polypodium spinulosum* opisał całkiem inną roślinę z rodziny *Proteaceae* (Merill sec. Alston 1957). Mimo to w literaturze, także i najnowszej, omawiany gatunek paproci występuje często jeszcze pod nazwą. *D. spinulosa* (O. F. Müll.) Watt (np. Hess, Landoldt, Hirzel 1967, Schidlay 1966, Hegi 1965). Z proponowanych w miejsce nieważnej nazwy *D. spinulosa*, można spotkać w literaturze dwie inne: *D. lanceolato-cristata* (Hoffm.) Alston (= *Polypodium lanceolato-cristatum* Hoffm. 1790) oraz *D. carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs (= *Polypodium carthusianum* Vill. 1786). Pierwsza z tych dwu nazw figuruje np. w „Atlas of the British Flora” (Perring, Walters 1962). Nazwę tę, budzącą zamieszanie, bo proponowaną przez Fuchsa (1963) także i dla *D. dilatata*, należy odrzucić. Używana przez część botaników jako obowiązująca nazwa *D. carthusiana* jest zdaniem niektórych autorów również nie całkiem pewna (Hess et al. 1967). Ponieważ jednak nie ustalono dotąd obowiązującej nazwy, a przy niniejszym opracowaniu nie dysponowano koniecznymi typami, zatem przyjęto

wzorując się na „Flora Europaea” nazwę *D. carthusiana*, używaną dziś już przez wielu autorów (np. Soó 1964, Janchen 1966, Rothmaler 1976).

Opis

Kłacze do 10 cm długie, 2-3 cm grube, poziome lub nieco ukośnie wznoszące się, pokryte z rzadka łuskami. W przestworach międzykomórkowych w kłacu i ogonku nieliczne włoski wydzielnicze 80-115 (140) μm długie, na długich trzonkach (Widén i in. 1967, 1970).

Liście 30-90 (100) cm długie, wyprostowane, z ogonkiem do 2 razy krótszym od blaszki lub dorównującym jej długością, wyjątkowo nieco dłuższym. Blaszka liściowa ciemnozielona do jasno- lub żółtawozielonej, najczęściej 1,5-3 razy dłuższa niż szeroka, w zarysie jajowata, jajowato-lancetowata, trójkątnie jajowata lub szerokopodługowata, w dolnej części potrójnie, wyżej podwójnie pierzasta, z każdej strony z 15-25 odcinkami 1. rzędu, naga lub rzadko z nielicznymi gruczołkami po dolnej stronie. Odcinki liściowe 1. rzędu z 10-15 odcinkami 2. rzędu z każdej strony, krótkoogonkowe, przeważnie naprzemianległe, dolne w zarysie jajowate, lub jajowatotrójkątne, górne lancetowate; najniższe oddalone od następnych. Najniższa para odcinków 1. rzędu przeważnie krótsza od sąsiednich, niesymetryczna; jej podstawowy dolny odcinek 2. rzędu równy jest połowie długości odcinka 1. rzędu lub krótszy oraz zwykle ok. 1,5 razy dłuższy od leżącego nad nim po stronie górnej odcinka, jak również dłuższy od sąsiednich dolnych odcinków 2. rzędu. Odcinki liściowe 2. rzędu podługowate, jajowate lub jajowatotrójkątne, na szczycie zastrzone, dolne pierzastodzielne, krótkoogonkowe, wyższe pierzastoklapowane lub wrębne, siedzące lub zlewające się z sobą, wszystkie ząbkowane, o ząbkach krótkościstych. Ogonek liściowy ok. 3 mm gruby, dołem ciemnobrunatny, wyżej słomiastożółty lub żółtozielony, pokryty zwłaszcza w dolnej części nielicznymi, jednobarwnymi, jasnobrunatnymi łuskami. Łuski do 9 mm długie i do 5 mm szerokie, jajowate lub szeroko-jajowate, na szczycie tępe lub zastrzone, brzegiem często frędzlowate, niekiedy z pojedynczymi gruczołkami. Najniższa para odcinków 1. rzędu często bez zarodni. Zawijka cienka, naga, bez gruczołków lub rzadziej z pojedynczymi gruczołkami, całobrzega lub brzegiem ząbkowana.

Zarodniki (46-)-51-62 (-70) $\times$ (30-)-35-40(-52) μm (z perisporem), elipsoidalne lub rzadziej słabo fasolowate, czarnobrunatne. Perispor po-fałdowany, z pojedynczymi brodawkami. Na powierzchni perisporu liczne stożkowate kolce, zredukowane często do brodawkowatych wyrostków. Kolce perisporu ostre lub zaokrąglone na szczycie, szerokie w nasadzie, zlewające się nasadami lub stojące oddzielnie (Tablica VI). Zarodniki dojrzewają w lipcu, sierpniu lub wrześniu. Liście płonne zachowują się niekiedy przez zimę. Liście z zarodnikami tylko wyjątkowo.

W materiale z Polski na wyróżnienie zasługują 2 odmiany (Tablica I):

1) var. *elevata* A. Br. — liście o blaszce jasnozielonej lub żółtozielonej, wąskopodługowatej, do 4 razy dłuższej niż szerokiej, dość tęgiej; odcinki 2. rzędu ścięśnione. Rośnie głównie na torfowiskach i w borach sosnowych,

2) var. *exaltata* Lasch — liście szersze, o blaszce ciemnozielonej, cieńszej; odcinki 2. rzędu nieco oddalone od siebie. Ogólnym wyglądem przypomina *D. dilatata*. Roślina cienistych lasów.

Prawdopodobnie jedna z tych 2 odmian powinna być nazwana zgodnie z zasadami „Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury” (1972) var. *carthusiana*. Trudno jednak powiedzieć, która z nich, bez obejrzenia typu.

W obrębie *D. carthusiana* stwierdzono w Europie istnienie 2 chemotypów (Widén, Sorsa 1966, 1969, Widén 1969, Widén, Sorsa, Sarvela 1970), pomiędzy którymi nie znaleziono żadnych różnic cytologicznych. Niestety w literaturze brak wiadomości, czy zróżnicowanie chemiczne jest skorelowane ze zróżnicowaniem morfologicznym. Wyżej wymienione 2 odmiany różnią się także ekologicznie. Gdyby potwierdziło się na szerszym materiale, że również zarodniki obu odmian wykazują różnice w skulpturze perisporu (por. str. 29), to być może należałoby podnieść rangę tych taksonów do podgatunków.

W zbiorach zielnikowych można spotkać nieliczne okazy nieco gęściej ogruczone, oznaczone jako var. *glandulosa* Milde lub z dopiskiem na etykiecie, stwierdzającym obecność gruczołków. Zwykle jednak gruczołki występują u tego gatunku pojedynczo. Jak okazało się przy bliższym zbadaniu, okazy gęściej ogruczone często były to nie rozpoznane mieszańce z *D. dilatata*.

Cytologia

Jak wykazały badania cytogenetyczne, *D. carthusiana* jest gatunkiem tetraploidalnym, posiadającym na całym swym szerokim zasięgu geograficznym, obejmującym Europę i Amerykę Północną, tę samą liczbę chromosomów $2n=164$ (Walker 1955, 1961 i in.). U tego gatunku stwierdzono regularną mejozę z tworzeniem 82 biwalentów. Również w materiale z Polski stwierdzono liczbę chromosomów $2n=164$ (ryc. 10).

Stanowiska okazów zbadanych cytologicznie:

1) Ojców: Żłota Góra. Las sosnowy na południowych zboczach. (Okaz nr 26/70).

2) Lubin. Las dębowo-świerkowy. (Okaz nr 111/71).

Mieszzańce *D. carthusiana*:

D. carthusiana × *felix-mas* s.l., *D. carthusiana* × *cristata*, *D. carthusiana* × *dilatata*, *D. carthusiana* × *assimilis*.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray s. str.

D. dilatata (Hoffm.) A. Gray s.l. Man. Bot. North. U. S. 631 (1848); Raciborski Fl. pol. 1:20 (1919); *D. dilatata* (Hoffm.) A. Gray s. str. Heywood Fl. Europ. 1:21 (1964), Hess et al. Fl. Schw. 1:120 (1967).

Bazonim: *Polypodium dilatatum* G. F. Hoffm. Deutschl. Fl. 2:7 (1795) emend. S. Walker Am. J. Bot. 48:607 (1961).

Syn.: *Polypodium austriacum* Jacq. Obs. Bot. 1:45 (1764) nom. illeg.; *Polystichum spinulosum* DC. var. *dilatatum* Hoffm. p.p. Berdau Fl. Tatr... 817 (1890), sensu Sagorski, Schneider Fl. Centr. Carp. 2:581 (1891); *Aspidium spinulosum* Sw. b) *dilatatum* (Hoffm.) Sm. sensu Fiek Fl. Schl. 553 (1881); *A. spinulosum* Sw. subsp. *dilatatum* Sw. p.p. Lueress. Farnpfl. 439 (1889), Ascherson, Graebner Syn. Mitteleurop. Fl. 1:33 (1896); *Aspidium dilatatum* Sm. p.p. sensu Szafer, Kulczyński, Pawłowski, Rośl. pol. 8 (1924); *Nephrodium spinulosum* (Müll.) Strempel subsp. *dilatatum* Hoffm. p.p. sensu Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. 1:27 (1927); *Dryopteris spinulosa* (Müll) Ktze. subsp. *austriaca* (Hoffm.) Woynar p.p. sensu Hegi Ill. Fl. 1:29 (1965); *D. spinulosa* (O. F. Müll.) Watt subsp. *dilatata* (Hoffm.) C. Christensen s. str. sensu Schidlay Fl. Slov. 2:217 (1966); *Dryopteris austriaca* (Jacq.) Woynar p.p. sensu Fomin Fl. ZSRR 1:41 (1934), sensu Szafer, Kulczyński, Pawłowski Rośl. pol. ed. 2, 11 (1953), sensu Pawłowski Fl. Tatr 1:153 (1956); *D. austriaca* Woynar ex Schinz et Thell. p.p. sensu Domin Vestn. Král. Ces. Spol. Nauk. 12 (1942); *D. lanceolato-cristata* (Hoffm.) Alston emend. H. P. Fuchs Acta Bot. Hung. 9(1-2): 16 (1963), Bobrov Fl. eur. cz. ZSRR 1:81 (1974).

Nomenklatura

Dryopteris dilatata opisana po raz pierwszy w roku 1795 z Centralnych Niemiec przez Hoffmanna jako *Polypodium dilatatum*, wcześniej nie była odróżniana od *Polypodium spinulosum*. W obrębie wyróżnionego przez Hoffmanna gatunku stwierdzono istnienie dwu cytotypów: tetraploidalnego $2n=164$ i diploidalnego $2n=82$. Tetraploid został uznany przez Walkera (1961) za *D. dilatata* s. str., natomiast diploidowi nadano rangę odrębnego gatunku i nazwano *D. assimilis*. Tak długo, dopóki typ nie zostanie zbadany, nie można określić czy Hoffmann pod nazwą *Polypodium dilatatum* miał na myśli roślinę diploidalną, którą Walker uważa za *D. assimilis*, czy też tetraploida uznanego przez tegoż autora za *D. dilatata* s. str. W opisie Hoffmanna nie ma niczego,

co by tę kwestię rozstrzygało. Ponieważ jednak tetraploid jest pospolitszy w Europie Środkowej, można więc przypuszczać, że okaz, na podstawie którego opisał Hoffmann *Polypodium dilatatum*, był właśnie tetraploidem. W literaturze omawiany takson występuje dość często pod nazwą *D. austriaca* (Jacq.) Woynar (np. Clapham, Tutin, Warburg 1952, Flora ZSRR 1934, Szafer, Kulczyński, Pawłowski 1953, Karpowicz 1972). Jak wykazał Fuchs (1958), okaz *Polypodium austriacum* Jacquin'a był w rzeczywistości młodym okazem *Pteridium aquilinum*.

Arkusze z zielnika Jacquin'a, znajdujące się w British Museum i zaetykietowane nie przez Jacquin'a jako „*Polypodium austriacum*”, są mieszaniną okazów *D. dilatata* i *D. carthusiana* (Walker 1955). W tej sytuacji obowiązującą jest nazwa *D. dilatata*, nie zaś *D. austriaca*. Próbę zastąpienia nazwy *D. dilatata* (Hoffm.) A. Gray nazwą *D. lanceolato-cristata* (Hoffm.) Alston (Fuchs 1963, Soó 1964, Bobrov 1974) skrytykował Janchen (1964), jako zupełnie bezpodstawną, bowiem opis *Polypodium lanceolato-cristatum* (Hoffmann 1790, in Mag. Bot. ed. Roemer et Usteri 9:9) całkiem nie odpowiada *D. dilatata*, podczas gdy opis *Polypodium dilatatum* (Hoffman 1795, in Bot. Taschenb. 2:7) ma tę właśnie roślinę znamionować.

Opis

Kłaczę do 15 cm długie, 3-6 cm grube, pionowe lub prawie pionowe, pokryte gęsto łuskami. Międzykomórkowe przestrzenie i wewnętrzne włoski wydzielnicze w kłaczach i ogonku występują raczej rzadko; włoski 75-120 μm długości, krótkotrzonkowe (Widén i in. 1967, 1970).

Liście do 150 cm długie, łukowato przegięte, z ogonkiem zwykle ok. 1,5 razy krótszym od blaszki. Blaszka liściowa ciemnozielona lub oliwkowozielona, najczęściej ok. 1,5-2 razy dłuższa niż szeroka, w zarysie szeroko trójkątna, jajowato-trójkątna lub lancetowato-trójkątna, 3-4-krotnie pierzasta, z każdej strony z 15-25 odcinkami 1. rzędu ustawionymi przeważnie naprzemianlegle. Blaszka spodem ogruczołona oraz z długimi wstęgowatymi włoskami; gruczołki 90-110 μm długie, obecne niekiedy także i na górnej stronie liścia. Odcinki liściowe 1. rzędu z 10-15 odcinkami 2. rzędu z każdej strony, krótkoogonkowe, naprzemianległe; najniższe w zarysie trójkątne, wyższe wąskotrójkątne lub trójkątno-lancetowate. Najniższa para odcinków liściowych przeważnie krótsza od następnych wyżej położonych; jej podstawowy dolny odcinek 2. rzędu zwykle krótszy od połowy długości odcinka 1. rzędu (rzadko równy połowie) oraz niewiele dłuższy od leżącego nad nim odcinka po stronie górnej, jak również od sąsiedniego dolnego odcinka 2. rzędu. Odcinki 2. rzędu podługowatojajowate do lancetowatych, pierzastodzielne, na szczycie zaokrąglone z nasadonym ościstym wierzchołkiem. Odcinki 3. rzędu

u okazów żywych zwykle wypukłe, a u okazów zielnikowych — o brzegach podwiniętych, jajowate do podługowatych, pierzasto kłapowane z ościsto zakończonymi ząbkami. Ogonek liściowy mocny, do 5 mm grubości, szeroki w nasadzie, w dole ciemnobrunatny, wyżej do słomastożółtego, pokryty gęsto łuskami. Ogonek i oś liścia zwykle gęsto ogruczołone, z gruczołkami 90-110 μm długimi oraz z licznymi wstęgowatymi włoskami 1-2 mm długimi. Łuski na ogonku jajowato-lancetowate lub szeroko do wąskolancetowatych, większe 16-20 mm długie i 4-5 mm szerokie, zawsze z długim kończykiem na szczycie, dwubarwne, jasnobrunatne z wyraźnym czarno brunatnym paskiem w środku, dochodzącym do szczytu łuski, rzadziej tylko z ciemną smugą, a wyjątkowo jednobarwne (wtedy ciemnobrunatne). Brzeg łusek często z trzoneczkowatymi gruczołkami. Zawijka zawsze brzegiem z trzoneczkowatymi gruczołkami. Gruczołki u okazów starszych często odpadające. Zarodniki (44—)53-62(—70) $\times$ $\times$ (32)35-42 (—52) μm (z perisporem), elipsoidalne, ciemnobrunatne. Perispor gruby, z wąskimi wyraźnymi fałdami i z gęstymi kolcami, pokrywającymi około 50% powierzchni perisporu. Kolce (1)-2 μm długie, przeważnie ostre na szczycie, w nasadzie szerokie i często zlewające się nasadami. Zarodniki dojrzewają w lipcu, sierpniu lub wrześniu. Liście często zimozielone.

Zmienność i taksonomia

W obrębie *D. dilatata* s.l. wyróżniano dawniej kilka odmian, z których zwłaszcza var. *oblonga* Milde i var. *deltoidea* Milde, wymieniane także i w literaturze polskiej (Pawłowski 1956), zasługują na omówienie.

Do var. *oblonga* zaliczano okazy o blaszce liściowej jajowatopodługowatej, ogruczołonej, równej ogonkowi lub krótszej, z dwoma najniższymi odcinkami pierwszego rzędu krótszymi od następnych.

Do var. *deltoidea* zaliczano okazy o szerokotrójkątnej blaszce, dłuższej od ogonka, z dwoma odcinkami 1. rzędu dłuższymi od następnych. Oba typy zmienności, które były podstawą wyróżniania wymienionych odmian, występują zarówno u *D. assimilis* jak i u *D. dilatata* s. str. Okazy częściej w naszych zielnikach var. *oblonga* należą po części do *D. assimilis*, a po części do *D. dilatata*. Natomiast większość okazów oznaczonych jako var. *deltoidea* zidentyfikowałam jako *D. assimilis*. Mimo dużej zmienności *D. assimilis* i *D. dilatata*, trudno wyróżnić w ich obrębie jednostki taksonomiczne o wyższej randze niż forma. Takie twierdzenie popierają zwłaszcza obserwacje prowadzone przez kilka lat na okazach hodowanych na działce doświadczalnej.

Pod względem chemicznym gatunek nie wykazuje zróżnicowania (Widén, Sorsa 1966, 1969, Widén, Sorsa, Sarvela 1970).

D. dilatata s. str. jest tetraploidem o liczbie chromosomów $2n=164$ i regularnej mejozie z tworzeniem 82 biwalentów (Walker 1955).

Również w materiale z Polski stwierdzono somatyczną liczbę chromosomów $2n=164$ (ryc. 10).

Okazy zbadane cytologicznie pochodzą z następujących stanowisk:

1) Niepołomice. Las sosnowy wprowadzony na siedlisku *Tilio-Carpinetum*. (Okaz nr 116/71).

2) Tatry: Toporowy Staw Niżni, wys. 1089 m n.p.m. Las z *Abies alba*, na morenie. (Okaz nr 133/74).

3) Babia Góra, przy szlaku z Krowiarek na Sokolicę, wys. 1050 m n.p.m. Dolnoregłowy bór mieszany *Abieti-Piceetum montanum*. (Okaz nr 120/71).

4) Lubin. Las z *Picea abies*, *Quercus sessilis* i *Padus serotina*. W runie obficie paprocie, zwłaszcza *D. dilatata* i *D. carthusiana*. (Okaz nr 114/71).

Mieszańce *D. dilatata*:

D. dilatata × *felix-mas* s.l., *D. dilatata* × *carthusiana*, *D. dilatata* × *assimilis*.

Dryopteris assimilis S. Walker

D. assimilis S. Walker Am. J. Bot. 48:607 (1961), Walker, Jermy Brit. Fern. Gaz. 9 (5):138 (1964), Heywood Fl. Europ. 1:22 (1964), Hess et al. Fl. Schw. 1:120 (1967).

Syn.: *Lastrea dilatata* (Hoffm.) Presl. var. *alpina* Moore Handb. Brit. Ferns 126 (1857); *Dryopteris spinulosa* (O. F. Müll.) Watt subsp. *assimilis* (S. Walker) Schidlay Fl. Slov. 2:217 (1966).

Typ: Anglia (Ben Lawers, Perthshire).

Nomenklatura

W 1961 r. Walker rozdzielił *D. dilatata* na dwa gatunki: tetraploidalną *D. dilatata* s. str. oraz diploidalną *D. assimilis*. Diploidalny cytotyp znany cytologom już od 1948 r. (Manton 1950, Walker 1955) okazał się identyczny z *Lastrea dilatata* var. *alpina*, którą opisał w 1857 r. Moore z Wielkiej Brytanii. Według tego autora wymieniona odmiana charakteryzuje się delikatnie pociętą blaszką liściową oraz wybitnie niesymetrycznym najniższym odcinkiem 1. rzędu. Odmiany tej nie podali z Europy Środkowej ani Luerssen (1889), ani Ascherson i Graebner (1896). Jeden z trzech okazów zielnikowych zebranych i zaetykietowanych przez Moore'a („Ben Lawers Perth-

shire 1855 T. M.") został wyznaczony przez Jermy'ego jako lektotyp *D. assimilis*. Opis *D. assimilis* poszerzony w stosunku do opisu podanego dla var. *alpina* przez Moore'a, wraz z diagnostycznymi cechami zaznaczonymi kursywą, podają Walker i Jermy (1964).

Opis

Kłaczce do 25 cm długie, 4-8 cm grube, pionowe lub prawie pionowe, wyjątkowe poziome, pokryte gęsto łuskami. W kłaczku i ogonku liściowym często przestrzenie międzykomórkowe z wewnętrznymi włoskami wydzielniczymi 60-85 μm długimi, na krótkich trzonkach (Widén i in. 1967, 1970). Liście do 120 cm długie (wysoko w górach znacznie mniejsze), wyprostowane, z ogonkiem równym co do długości blaszki lub krótszym od niej. Blaszka liściowa zwykle jasno- do żółtozielonej, rzadziej zielona do ciemnozielonej, do 2 razy dłuższa niż szeroka, w zarysie jajowata, jajowato-lancetowata lub trójkątna, na szczycie zwężona i krótko zaostrowana, 3-4-krotnie pierzasta, z każdej strony z 15-25 odcinkami 1. rzędu przeważnie naprzemianległymi, po stronie dolnej z wstęgowatymi włoskami oraz mniej lub bardziej gęsto ogruczolona, z gruczołkami 80-100 μm długimi, do całkiem nagiej. Oś liścia ogruczolona lub naga, często z wąskimi łuskami i wstęgowatymi włoskami. Odcinki liściowe 1. rzędu z 10-15 odcinkami 2. rzędu z każdej strony, krótkoogonkowe, naprzemianległe, najniższe w zarysie szerokotrójkątne, średnie trójkątne. Najniższa para odcinków liściowych dłuższa lub krótsza od następnych wyżej położonych; jej podstawowy dolny odcinek 2. rzędu zwykle równy lub dłuższy od połowy długości odcinka 1. rzędu, rzadziej krótszy oraz 2-2,5 razy dłuższy od sąsiadującego z nim od strony górnej podstawowego odcinka 2. rzędu. Odcinki liściowe 2. rzędu podługowatojajowate do lancetowatych, pierzastodzielne. Zatoki otwarte, wcięcia dochodzą do osadki. Odcinki liściowe 3. rzędu płaskie, rzadziej słabo wypukłe, jajowate do podługowatych, pierzasto klapowane z ościisto zakończonymi ząbkami. Ogonek liściowy mocny, szeroki w nasadzie, ciemnobrunatny do słomiastożółtego, mniej lub bardziej gęsto (zwłaszcza dołem) pokryty łuskami i często ogruczolony. Łuski zmienne pod względem kształtu i wielkości, największe do 18 mm długie i 7 mm szerokie, od wąskolancetowatych do jajowatych, z długim lub bardzo rzadko krótkim kończykiem na szczycie, niekiedy jednobarwne czerwobrunatne, lecz najczęściej dwubarwne z ciemną częścią centralną w postaci wyraźnego paska, smugi lub plamy często obecnej tylko w nasadzie oraz z jaśniejszym obrzeżeniem. Brzegi łusek często frędzlowate, z trzoneczkowatymi gruczołkami. Zawijka brzegiem frędzlowata z trzoneczkowatymi gruczołkami ok. 60 μm długimi do całkiem nagiej. Gruczołki z tendencją do krótkotrwałości, stąd u okazów starszych często ich brak. Zarodniki (47—)56-65(—76) $\times$ (32—)37-46(—56) μm (z perisporem włącz-

nie), elipsoidalne, jasnobrunatne. Perispor cienki, słabo pofałdowany, z szerokimi fałdami, z rzadko ustawionymi kolcami, pokrywającymi ok. 10-25% powierzchni perisporu. Kolce 1-2 μm długie, na szczycie tępe lub zaostrome, stojące zwykle oddzielnie i nie zlewające się nasadami. Liście zwykle obumierają w jesieni, wyjątkowo zachowujące się przez zimę. Zarodniki dojrzewają w lipcu, sierpniu i wrześniu.

Zmienność i taksonomia

D. assimilis jest wybitnie polimorficznym gatunkiem. Wykazuje zmienność w barwie łusek, kształcie i pocięciu liści, ich barwie oraz stopniu ogruczolenia, od form bardzo gęsto ogruczolonych do całkiem nagich. Okazy o jednobarwnych, rdzawobrunatnych łuskach i o niskim wzroście, występujące w górach i na północy, wyróżniono jako osobną odmianę. Jednak zdaniem niektórych autorów (np. Widén, Sarvela, Ahti 1967) jest to jednostka bez znaczenia taksonomicznego. Okazy o szerokotrójkątnych blaszkach zaliczano poprzednio do *D. dilatata* var. *deltoidea*, natomiast okazy o blaszkach jajowatopodługowatych do var. *oblonga*.

Uwaga: Okazy *D. assimilis* w naszych zielnikach bywały nierzadko mylone z *Athyrium filix-femina* ze względu na delikatnie pociętą blaszkę i jasnozieloną barwę *D. assimilis*. Dotyczy to zwłaszcza okazów bez zarodni.

Cytologia

D. assimilis jest diploidem o liczbie chromosomów $2n=82$ i regularnej mejozie z tworzeniem 41 par (Walker 1955).

D. assimilis wykazuje zróżnicowanie na kilka różnych diploidalnych cytotypów (Widén, Sorsa 1969). Przypuszczenie to popierają badania chemotaksonomiczne, które wykazały dużą zmienność wewnątrzgatunkową *D. assimilis* na poziomie chemicznym (Widén 1969; Widén, Britton 1969, 1971; Britton, Widén 1974. Ważnym argumentem na istnienie cytotypów u tego gatunku są obserwowane dość często okazy niewątpliwiej *D. assimilis* ze zmarniałymi zarodnikami. Okazy te są prawdopodobnie mieszańcami między dwoma różnymi diploidalnymi cytotypami *D. assimilis* (Widén, Sorsa 1969). Również w materiale z Polski można stwierdzić pewien procent okazów o cechach morfologicznych *D. assimilis*, których zarodniki są zmarniałe. Powyżej podkreślano duży polimorfizm *D. assimilis*. Dotąd jednak nie stwierdzono żadnej korelacji pomiędzy określonymi formami morfologicznymi i typami chemicznymi lub cytotypami.

Okazy z Polski zbadane cytologicznie wykazują również liczbę chromosomów $2n=82$ (ryc. 10).

Zbadane okazy pochodzą z następujących stanowisk:

1) Bieszczady Zachodnie: Dol. Terebowca, wys. 700 m n.p.m. W *Fagetum carpaticum* (Piękoś, Passakas 1973).

2) Tatry: Toporowy Staw Niżni, wys. 1089 m. n.p.m. Las z *Albies alba* na morenie. (Okaz nr 132/74).

3) Tatry Wysokie: Morskie Oko, 1400 m n.p.m. Kamienisty, przedrzeczny bór świerkowy. (Okaz nr 12/70).

4) Góry Świętokrzyskie: przy szlaku ze św. Katarzyny na Łysicę, wys. 320 m n.p.m., w głębi lasu bukowego. (Okaz nr 6/70).

Mieszańce *D. assimilis*:

D. assimilis × *dilatata*, *D. assimilis* × *carthusiana*.

VIII. ROZMIESZCZENIE I WARUNKI WYSTĘPOWANIA GATUNKÓW GRUPY *DRYOPTERIS DILATATA*

D. carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs

Gatunek eurosyberyjsko-północnoamerykański. W Europie dochodzi na północy po 70° szerokości geograficznej. Północna granica zasięgu biegnie przez Szkocję, Skandynawię (z wyjątkiem najbardziej północnej części) i Syberię. Południowa granica zasięgu w Europie przebiega przez północną Hiszpanię, południową Francję, Korsykę, północne Włochy, Bułgarię, Grecję i Kaukaz. W Ameryce Północnej występuje w części wschodniej. Brak na Alasce oraz na Dalekim Wschodzie.

W Polsce (ryc. 12) jest to gatunek pospolity na całym obszarze, zarówno na niżu oraz na pogórzu, jak i w górach w reglu dolnym; w reglu

Ryc. 11. Rozmieszczenie pionowe *Dryopteris carthusiana* (I), *D. dilatata* (II) i *D. assimilis* (III) w Polsce; oś rzędnych — wysokość w metrach n.p.m., oś odciętych — liczby stanowisk w procentach

Fig. 11. Vertical distribution of *Dryopteris carthusiana* (I), *D. dilatata* (II) and *D. assimilis* (III) in Poland; vertical axis — altitude in m a.s.l., horizontal axis — number of localities in per cent

górnym rzadko spotykany. Słuszne wydają się obserwacje Zapalowicza (1880) dotyczące rozmieszczenia *D. carthusiana* na Babiej Górze, gdzie gatunek ten występuje „w niższej części lasów dość często i nieraz z następną odmianą (tzn. *D. dilatata* s.l.), z którą pośrednimi formami się spływa. W typowej postaci najwyżej: 935 i 930 m”. Również autorzy monograficznych opracowań flor innych pasm karpackich (Pawłowski 1925, 1956; Kornaś 1957; Jasiewicz 1966) stwierdzają, że *D. carthusiana* występuje głównie w reglu dolnym i rzadko przekracza jego górną granicę. Trudno ustalić dokładnie górne granice zasięgu tego gatunku w górach, ponieważ materiały zielnikowe są zbyt skąpe, by na ich podstawie uzyskać obraz rozmieszczenia pionowego w poszczególnych pasmach górskich. Natomiast dane z literatury odnoszące się do wyższych położeń, oparte na notowaniach w terenie, często budzą wątpliwości (Kornaś 1957). Tak np. maksymalne stanowiska tego gatunku w Tatrach podane przez Kotulę (1889-1890) z wysokości 1644-2098 m n.p.m., są na pewno błędne i należy je odnieść do *D. assimilis*. Najwyższe stanowiska *D. carthusiana* zarejestrowane na podstawie zweryfikowanych okazów zielnikowych: Dol. Pańszczyca (Tatry) 1330 m, Smerek (Bieszczady Zach.) 1220 m, Palenica (Wzniesienie Gubałowskie) 1180 m, Rycerzowa Wielka (Beskid Żywiecki) 1180 m.

D. carthusiana rośnie na niżu w większości zbiorowisk leśnych i zaroślowych jak: lasy i zarośla bagienne oraz łęgowe, lasy bukowe, dębowo-grabowe, bory mieszane, jodłowe, świerkowe i sosnowe, a także na torfowiskach wysokich i przejściowych. W Karpatach rośnie w *Dentario glandulosae-Fagetum*, *Luzulo-Fagetum*, *Piceetum abietetosum*, w *Alnetum incanae*, *Caltho-Alnetum* i rzadko w górnoreglowej świerczynie.

Według „Atlas Florae Europaeae” (Jalas, Suominen 1972) *D. carthusiana* jest gatunkiem występującym prawie w całej Polsce. Obraz rozmieszczenia przedstawiony w niniejszej pracy na ryc. 12 jest na pewno niepełny, mimo że przy opracowaniu mapki starano się uwzględnić możliwie duży materiał zielnikowy. Ogólnie biorąc rozmieszczenie tego gatunku pozostaje w ścisłym związku ze stopniem lesistości w poszczególnych regionach Polski. Tym należy najprawdopodobniej tłumaczyć luki w rozmieszczeniu gatunku w Polsce środkowej. Natomiast brak na mapce stanowisk z terenu okręgów: Olsztyńskiego, Kurpiowsko-Piskiego, Pojezierza Mazurskiego i Wałecko-Drawskiego jest spowodowany przede wszystkim brakiem materiałów zielnikowych z wymienionych obszarów.

D. dilatata (Hoffm.) A. Gray

Według najnowszych danych (Jalas, Suominen 1972; Piękoś-Mirkowa 1977) — jest to gatunek europejski, a poza Europą występuje prawdopodobnie tylko na Kaukazie i w Azji Mniejszej. Najdalej

Ryc. 12. Rozmieszczenie *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs w Polsce
 Fig. 12. Distribution of *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs in Poland

na północy dochodzi do północno-zachodniej Skandynawii. Południowa granica przebiega przez Portugalię i Hiszpanię, południową Francję, Włochy, Jugosławię i Bułgarię. Być może część stanowisk podanych na mapce w „Atlas Florae Europaeae” należy odnieść do *D. assimilis*. Dlatego dokładne rozmieszczenie w Europie obu tych gatunków wymaga opracowania na podstawie zrewidowanych materiałów zielnikowych.

W Polsce gatunek ten występuje zarówno na niżu oraz na pogórzu, jak i w górach w reglu dolnym, a rzadko wyżej. Podanie dokładnych zasięgów pionowych w poszczególnych pasmach górskich na razie nie jest możliwe z uwagi na to, że gatunek ten nie był dotąd odróżniany od *D. assimilis*, a do tego jeszcze mylony z *D. carthusiana*. Dane z wysokich położeń w Tatrach, np. 2098 m (Kotula 1889-90), dotyczą najprawdopodobniej *D. assimilis*. Najwyższe stanowiska w Polsce wynotowane z zielników: Przysłop Waksmundzki (Tatry) 1420 m, Jaworzyna k. Turbacza (Gorce) 1225 m, Mogielica (Beskid Wyspowy) 1170 m.

Ryc. 13. Rozmieszczenie *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray w Polsce

Fig. 13. Distribution of *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray in Poland

Jak widać z mapki rozmieszczenia (ryc. 13), *D. dilatata* jest dość częstym gatunkiem na niżu, choć znacznie rzadszym niż *D. carthusiana*. Uwagi dotyczące luk w rozmieszczeniu w niektórych regionach Polski, przytoczone przy omawianiu *D. carthusiana*, dotyczą również *D. dilatata*. Jednakże mała liczba stanowisk *D. dilatata* w porównaniu z *D. carthusiana* w niektórych okręgach w Pasie Wielkich Dolin lub np. w okręgu Łódzko-Piotrkowskim jest chyba wyrazem rzeczywistych różnic w częstości rozmieszczenia tych 2 gatunków. Trudno bowiem przypuścić, aby paprocie zbierano wybiórczo. Pewne skupiska stanowisk *D. dilatata* zaznaczają się na Pobrzeżu Bałtyckim, w okręgu Kartuskim, w Sudetach i w Górach Świętokrzyskich. *D. dilatata* występuje w Polsce niewątpliwie znacznie częściej niż wynikałoby to z mapki, na której uwzględniono wyłącznie stanowiska okazów z dojrzałymi zarodnikami. Według mapki publikowanej w „Atlas Florae Europaeae” (Jalas, Suominen 1972), gatunek ten występuje prawie w całej Polsce.

D. dilatata rośnie przeważnie na glebach wilgotnych, kwaśnych, często kamienistych. Na niżu występuje, podobnie jak poprzedni gatunek, w różnych zbiorowiskach leśnych, zwykle jednak na siedliskach bardziej wilgotnych niż *D. carthusiana*. W Karpatach rośnie zarówno na podłożu ubogim, jak i bogatym w węglan wapnia, w następujących zbiorowiskach: *Dentario glandulosae-Fagetum*, *Piceetum abietetosum*, *Alnetum incanae* oraz w górnoregłowych świerczynach: w *Piceetum tatricum subnormale*, *P. t. normale* i *P. t. myrtilletosum*.

D. assimilis S. Walker

Rozmieszczenie ogólne — Europa, Azja, Kaukaz, Ameryka Północna. W Europie dochodzi na północy po 71° szerokości geograficznej. Według najnowszych danych (Jalas, Suominen 1972; Nardi 1976, Piękoś-Mirkowa 1977), gatunek ten znany jest w Europie z Islandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, ZSRR, Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Jugosławii, Włoch oraz jako wątpliwy z Bułgarii. Dokładne rozmieszczenie w Europie wymaga zbadania, gdyż do dziś jeszcze nie wszędzie jest oddzielany od *D. dilatata*, a nawet od *D. carthusiana*. W Europie Środkowej *D. assimilis* jest podana głównie z gór.

W Polsce *D. assimilis* występuje pospolicie w górach od regla dolnego po piętro kosówki, rzadko na niżu (ryc. 11 i 14). Powyżej 1000 m n.p.m. jest najczęstszym gatunkiem z omawianej grupy zarówno na podłożu bogatym, jak i ubogim w węglan wapnia. Najwyższe stanowiska w Polsce na podstawie etykietek zielnikowych: Opalone (Tatry) 1720 m, Tarnica (Bieszczady Zachodnie) 1300 m, Polica (Beskid Żywiecki) 1250 m.

Podawane w literaturze maksima wysokościowe *D. dilatata* w Tatrach: 2098 m na wapieniu i 1906 m na granicie (Kotula 1889-90), odnoszą się niewątpliwie do *D. assimilis*.

Na niżu spotyka się ten gatunek w rozproszonych stanowiskach, ze słabo zaznaczającymi się skupiskami w Polsce północnej w okęgach: Kartuskim, Borów Tucholskich, Augustowskim, Kurpiowsko-Piskim, w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, a poza tym w Górach Świętokrzyskich, w Sudetach i na Roztoczu. Rozmieszczenie *D. assimilis* w Polsce południowej, środkowej i północno-wschodniej jest mniej więcej zgodne z rozmieszczeniem świerka. Podobnie jak w przypadku tego ostatniego gatunku, tak i w rozmieszczeniu *D. assimilis* zaznacza się luka przebiegająca równoleżnikowym pasem przez Polskę środkową.

D. assimilis rośnie na niżu w wilgotnych lasach i zaroślach, głównie w olesach, w lasach łęgowych, borach świerkowych, wilgotnych borach sosnowych i mieszanych, buczynach, a rzadko w grądach. W Karpatach częsta jest w następujących zbiorowiskach leśnych i zaroślowych: *Dentario glandulosae-Fagetum*, *Luzulo-Fagetum*, *Piceetum abietetosum*, a

Ryc. 14. Rozmieszczenie *Dryopteris assimilis* S. Walker w Polsce

Fig. 14. Distribution of *Dryopteris assimilis* S. Walker in Poland

przede wszystkim w górnoreglowych świerczynach: *Piceetum tatricum normale*, *P. t. myrtilletosum* i *P. t. subnormale*, poza tym powyżej górnej granicy lasu w zaroślach kosówki *Pinetum mughi calcicolum* i *P. mughi silicicolum* oraz w zaroślach olchy kosej *Pulmonario-Alnetum viridis* w Bieszczadach.

Dyskusja

Z omówionych wyżej 3 gatunków *Dryopteris*, najszerszą amplitudę ekologiczną ma *D. carthusiana*. Jak wykazały badania Zarzyckiego (1964, 1965) nad amplitudami i optimami ekologicznymi leśnych gatunków w Bieszczadach Zachodnich, *D. carthusiana* rośnie tutaj na glebach bagien-nych, madach górskich, glebach brunatnych i bielcowych, na glebach mokrych, wilgotnych, świeżych i umiarkowanie suchych, o odczynie w szerokich granicach $\text{pH}=3,2-7,2$. Występuje we wszystkich zbiorowiskach

leśnych i zaroślowych regla dolnego z podobną stałością i ilościowością. Węższą amplitudę ekologiczną mają oba pozostałe gatunki. *D. dilatata* s.l. uchodziła dotąd za gatunek charakterystyczny dla *Vaccinio-Piceetalia*, a lokalnie, np. w Puszczy Bukowej pod Szczecinem, za gatunek z klasy *Quercio-Fagetea* (Celiński 1964). Zaliczana była do gatunków ogólnogórskich, a jej stanowiska na niżu miały reprezentować element górski na niżu. Na podstawie aktualnych, choć jeszcze niekompletnych danych, wydaje się, że nie *D. dilatata*, lecz *D. assimilis* jest gatunkiem ogólnogórskim. Jak widać z diagramów (ryc. 11), *D. assimilis* jest znacznie częstsza w górach niż *D. dilatata*, a w wyższych położeniach występuje jako jedyny gatunek z omawianej grupy. Skupienia stanowisk *D. assimilis* na niżu występują przeważnie w obszarach znanych z dużego zagęszczenia gatunków górskich np. na Roztoczu, czy też w okręgu Kartuskim (Czubiński 1950; Izdebski 1969; Szafer 1930).

Diagramy częstości występowania 3 gatunków *Dryopteris* w poszczególnych pasach wysokościowych uzupełniają mapki rozmieszczenia. Diagramy te wskazują wyraźnie na górski charakter *D. assimilis* w porównaniu z pozostałymi gatunkami. Diagramy należy jednak interpretować z pewną ostrożnością. Tak np. *D. carthusiana* jest w niższych położeniach górskich znacznie częstsza niż wynikałoby to z diagramu. Stosunkowo niski — niższy niż w rzeczywistości — procent stanowisk tego gatunku w górach jest spowodowany tym, że gatunek ten był zwykle notowany, a rzadziej zbierano okazy do zielnika, natomiast diagram oparty jest wyłącznie na danych zielnikowych.

Crabbe, Jermy i Walker (1970) wysuwają przypuszczenie, że *D. assimilis* i *D. dilatata* są to 2 rasy ekologiczne. Na podstawie danych z etykietek zielnikowych trudno co do tego wyciągnąć jakieś wnioski z terenu Polski. Na wielu stanowiskach zresztą oba gatunki rosną obok siebie.

Skróty:

Nazwiska zbieraczy:

Fij.=D. Fijałkowski,
Kling.=C. Klinggraeff,

Mąd.=J. Mądalski,
Sokoł.=A. Sokołowski.

Inne:

dol.=dolina,
jez.=jezioro,
k.=koło,
leśn.=leśnictwo,
Mł.=Mała, Małe,
m.=między

ndl.=nadleśnictwo.
oddz.=oddział,
ok.=około,
pot.=potok,
pd.=południe, południowy,
pn.=północ, północny,

rez.=rezerwat,
Wlk.=Wielki,
woj.=województwo,
wsch.=wschodni,
zach.=zachodni,

Skróty zielników podano na str. 8-9

1889, 1964 itp. — oznaczają daty zbioru
320 m — wysokość w metrach nad poziom morza

Mapki rozmieszczenia *D. dilatata* i *D. assimilis* w Polsce (ryc. 13, 14) wykonano uwzględniając wyłącznie okazy zielnikowe z dobrze wykształconymi, dojrzałymi zarodnikami, gdyż jedynie cechy barwy i morfologii zarodników — w przeciwieństwie do cech makroskopowych — są pewną podstawą rozróżnienia tych dwu gatunków.

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs

Woj. szczecińskie

Pobierowo, lg. Kaczorowska 1968, WRS; Lewino, nad jez. Lewino, lg. ?, SN; Jez. Rosiczka k. Stepnicy, lg. ? 1964, SN; Święta, lg. A. Lüderwaldt 1906, KRAM; Szczecin, na Gumieńcach, lg. H. Misiąg 1960, WRS; Szczecin Międzyodrze, lg. J. Radomski 1958, SN; Puszcza Bukowa pod Szczecinem, lg. F. Celiński 1954, POZ.

Woj. koszalińskie

Dygowo, lg. Mąd. 1947, JM; Szczecinek, 3 km na pd., lg. W. Żukowski 1958, POZ; Drawień, na wsch. od wsi, lg. W. Żukowski 1957, POZ; Kołobrzeg, lg. A. Sendek 1976, KTU.

Woj. słupskie

Słupsk, Lasek Południowy, lg. J. Misiewicz 1970, M; Karwno, lg. ? 1901, KRAM; dolina Łeby k. Lęborka przy szosie do Słupska, lg. W. Anisimowicz 1962, POZ.

Woj. gdańskie.

Nowy Dwór k. Karwi, lg. K. Piech 1922, KRAM; m. Wielką Wsią a Chałupami, lg. W. Ročławska 1962, TRN; Werblina, Darżlubski Las, lg. ? 1895, TRN; Niepoczłowice, lg. C. Lützow 1884, TRN; Gniewino, lg. Kling. 1889, TRN; Wejherowo, lg. Kling. 1889, TRN; Kielno, lg. Kling. 1882, TRN; Jastarnia — Kuźnica, lg. H. Rychterówna 1935, POZ; Kępa Redłowska, lg. ? 1932, KRA; Oliwa, lg. Kling. 1851, C. Lützow 1883, 1891, TRN; Jaśkowa Dol. w Gdańsku Wrzeszczu, lg. K. Tobolska 1962, LOD; Gdańsk, lg. Koch, TRN; Stogi w Gdańsku, lg. Klinsmann 1834, Kling. 1889, C. Lützow 1891, TRN; Otomin, lg. Kling. 1889, TRN; Lublewo, lg. Karsten 1897, TRN; Przywidz, lg. S. Schultze 1879, TRN; Kartuzy, lg. Kling. 1884, TRN; Egiertowo, lg. Kling. 1889, TRN; Kolano, lg. Kling. 1884, TRN; Skarszewy, lg. Kling. 1852, TRN; Rokocin, lg. Hohnfeldt 1884, TRN; Jez. Bagienko k. Ocypla, lg. A. J. Kornasiowie 1968, KRA; Osieczno, lg. Hohnfeldt 1885, TRN; Borki, lg. Hohnfeldt 1884, TRN; Głuche, lg. Hohnfeldt 1884, TRN.

Woj. elbląskie

Rakowiec, lg. J. Sitok 1900, TRN; Opalenie, lg. Kling. 1873, TRN; Brachlewo, lg. Bünaui, TRN; Brokowo, lg. Kling. 1873, TRN; Kwidzyn, lg. M. Ceynowa 1961, TRN; Bogusze, lg. Kling. 1873, TRN; Sadlinki, lg. Kling. 1873, TRN; Ruda, lg. Kling. 1874, TRN; Janowo, lg. J. Peil 1898, TRN; Gardej, lg. M. Rejewski 1963, TRN; Stążki, lg. Kling. 1863, 1865, TRN; Sztum, lg. Kling. 1862, TRN; Ryjewo, lg. Wacker 1862, TRN; Krynica Morska, lg. Kalmuss 1871, TRN; Święty Kamień, lg. Kalmuss 1883, TRN; Kadyny, lg. Kalmuss 1883, Kling. 1889, TRN; Elbląg, lg. Straube 1897, TRN; Wiśniewo, lg. Kling. 1885, 1861, TRN.

Woj. olsztyńskie

Łodygowo, lg. J. Sitok 1900, TRN; Iława, lg. M. Choińska 1970, TRN; Wojciechy, lg. Kalmuss 1822, TRN; Sportyny, lg. Kalmuss 1833, TRN; Prakwice, lg. Ludwig

1877, TRN; Dobrze Miasto, lg. F. Sedler 1871, TRN; Stary Dwór, lg. B. Polakowski 1954, OLS; Wadąg, lg.? 1954, OLS; Olsztyn, rez. „Mszar”, lg.? 1954, OLS; Purda, lg.? 1958, KRAM; ndl. Tabórz, lg. H. Wojciechowska 1959, OLS; Ostróda, lg. Kling. 1856, TRN; Zajęczki, lg. Kling. 1861, TRN; Nidzica, lg.? 1953, WRS; okolice Krutynia nad jez. Krutyńskim, lg. Z. Mirek 1977, ZM; uroczysko „Szyldak” nad rzeką Dylewką, lg. Z. Mirek 1977, ZM.

Woj. suwalskie

Wronki Małe, lg. N. Romańczuk 1970, BIA; Botkuny Stare, lg. N. Romańczuk 1970, BIA; Stańczyki, lg. Sokoł. 1969, BIA; Tatars, lg. J. Kozak 1970, BIA; Czuprynowo, lg. S. Borowiak 1970, BIA; Sidorówka, lg. N. Romańczuk 1969, BIA; Płociczno, lg. W. Karpowiczówna 1921, WA; Smolany, lg. S. Fieńko 1969, BIA; Strzelcowizna, lg. J. Żurawski 1971, BIA; Gorczyca, lg. J. Żurawski 1971, BIA; Studzienina, lg. Sokoł. 1971, BIA; Gruszki, lg. J. Żurawski 1971, BIA; Okolnie, lg. J. Żurawski 1971, BIA; ndl. Balinka oddz. 129, lg. Sokoł. 1963, BIA; Białobrzegi, lg. J. Żurawski 1971, BIA; Kolnica, lg. J. Kozak 1971, Wypust, lg. J. Żurawski 1971, BIA.

Woj. białostockie

Downary, lg. J. Żurawski 1971, BIA; Ciasno, lg. J. Żurawski 1971, BIA; Krynickie, lg. N. Romańczuk 1971, BIA; Skroblaki, lg. Sokoł. 1961, BIA; Dziemłakowo, lg. S. Fieńko 1969, BIA; Żyrokowo, lg. Sokoł. 1968, BIA; Jaiówka, lg. Sokoł. 1968, BIA; Rybniki, lg. J. Pietrzykowski 1969, BIA; Rajsk, lg. J. Kozak 1979, BIA; Stryki, lg. N. Romańczuk 1970, BIA; Szastały, lg. N. Romańczuk 1970, BIA; Szumki, lg. N. Romańczuk 1970, BIA; Koce Borowe, lg. Sokoł. 1968, BIA; Rudka, lg. Sokoł. 1968, BIA; Olędy, lg. Sokoł. 1968, BIA; Bielsk Podlaski, uroczysko „Piliki”, lg. H. Strzelecka 1932, POZ; Nurzec, lg. J. Nasiadło 1970, BIA; Łuszcz, lg. A. Dackiewicz, 1968, BIA; Podrzeczany, lg. Sokoł. 1968, BIA; Narewka, lg. J. Kozak 1970, BIA; Michówka, lg. A. Dackiewicz 1969, BIA; Planta, lg. Sokoł. 1971, BIA; Skupowo, lg. S. Fieńko 1970, BIA; Nowosady, lg. S. Fieńko 1970, BIA; Kornin, lg. J. Żurawski 1971, BIA; Łozowa, lg. J. Wołkorycki 1971, BIA; Pasieczniki, lg. N. Romańczuk 1971, BIA; Białowiecki Park Narodowy, lg. J. Żurawski 1969, Sokoł. 1969, 1970, BIA; ndl. Białowieża, lg. J. Sieleżyński 1930, S. Jacyna 1960, Sokoł. 1968, BIA, WA; ndl. Browek, lg. Sokoł. 1967, 1968, S. Fieńko 1970, BIA; Czaje Bagno, lg. Sokoł. 1968, BIA; Granne, lg. Sokoł. 1968, BIA; Mikulicze, lg. J. Kozak 1970, BIA.

Woj. łomżyńskie

Kuzie, lg. Sokoł. 1968, BIA; Krajewo Borowe, lg. Sokoł. 1970, BIA; Zbrzeźnica, lg. S. Borowiak 1970, BIA; Grabówka, lg. Z. Czechowska 1969, BIA; Srebrna, lg. S. Borowiak 1970, BIA; Mystki-Rzym, lg. S. Borowiak 1970, BIA.

Woj. ciechanowskie

Lidzbark, lg. Kling. 1880, TRN.

Woj. włocławskie

Nowy Ciechocinek, lg. K. Łapczyński 1879, WA.

Woj. toruńskie

Lipowice, lg. Finger 1883, TRN; Linie k. Chełmna, lg. M. Rejewski, 1967, TRN; okolice Jez. Ciche k. Nowego Miasta Lubawskiego, lg.? 1931, WA; Górzno, lg. Kling. 1880, TRN; Czarne Błoto, lg. B. Cieślak 1961, TRN; Toruń, lg. A. Matze 1900, POZ; parów Wilczy Młyn k. Lubicza, lg. K. Knobloch 1952, TRN; Cierpice, lg. Zakierska 1952, TRN.

Woj. bydgoskie

Nad jez. Stawek k. osady Asmus, lg. S. Lisowski i in. 1964, POZ; okolice Czerska, na zach. brzegu jez. Trzebomierz, lg. F. Szafrński, K. Tobolski 1966, POZ; Ryteł w rez. „Mętne”, lg. M. Ceynowa, S. Lisowski, F. Szafrński 1965, POZ, TRN; Biała nad jez. Ryjki, lg. M. Ceynowa 1968, TRN; Komierowo, lg. S. Bojakowska 1962, POZ; Nowy Świat, nad jez. Strzemno, lg. M. Ceynowa 1959, TRN; Oplawca, lg. S. Fabiszak 1959, TRN; m. Osiami a Starą Rzeką, lg. Grütter 1890, TRN; Przewodnik, lg. F. Hallwig 1883, TRN; Rejna, lg. M. Ceynowa 1966, TRN; Las Gocanowski nad Gopłem, lg. Z. Adolski 1952, TRN.

Woj. pilskie

Trzebieszki, lg. Kling. 1884, TRN; Rudna leśn. Łobzonka, lg. K. Latowski 1963, POZ; Rąbczyn, lg. F. Krawiec 1933, POZ.

Woj. gorzowskie

Nowogródek Pomorski, lg. Kling. 1881, TRN; Gorzów Wielkopolski, Park Słowiański, lg. J. Misiewicz 1968, SN; Zdroisko, lg. H. Borkowska 1963, WRS; Radowo, na pn.-zach. od wsi, lg. T. Poleszczuk 1952, WRS.

Woj. zielonogórskie

Polupin, lg. C. Kowalonek 1961, WRS; Biecz, 2 km na pd. od wsi, lg. T. Kowal 1963, WRS; Bogumiłów, na zach. od wsi, lg. T. Kowal 1962, WRS; Rajewo, na zach. od wsi, lg. J. Serwatka 1966, WRS; Ochla, lg. B. Schröder 1889, JM; rez. „Zatonie” k. Zatonia, lg. Z. Dzwonko 1967, WRSL; Bobrowniki, lg. Z. Dzwonko 1968, KRA; rez. „Bażantarnia” k. Otynia, lg. Z. Dzwonko 1968, KRA; Stare Żabno, lg. Z. Dzwonko 1968, KRA; Kopanica, lg. J. Paczosi 1933, POZ; Mochy, lg. J. Paczosi 1932, POZ.

Woj. poznańskie

Wąsowo, lg. F. Krawiec 1939, POZ; Parkowo, lg. W. Sławrowski 1926, POZ; Szymankowo, lg. W. Festsch 1964, POZ; Autoniewo, lg.? 1897, POZ; Dziewicza Góra pod Poznaniem, w pn. części Wąwozu Wielkiego, lg. W. Alkiewicz 1934, POZ; Gołęciński Klin Zieleni w Poznaniu, po pd. stronie Jez. Strzeszyńskiego, lg. T. Kornowski 1961, TRN; Poznań, lg. Schönke 1895, POZ; Poznań, Kobylepole — Park, lg. J. Łukowska 1936, POZ; Poznań, las pod Miasteczkim, lg. E. Klimczak 1927, POZ; Puszczykówko, lg. F. Krawiec 1933, POZ; Ludwikowo, m. jez. Skrzynką i Kociółkiem, lg. F. Krawiec 1939, POZ; Promno, nad jez. Wojtostwo, lg. F. Krawiec 1936, K. Jabłońska 1954, POZ; na pd. od Pobiedzisk, lg. L. Bujkówna 1934, POZ; Nekla, lg. F. Krawiec 1935, POZ; Witkowo, lg.? 1899, POZ; Iłowiec, lg. F. Krawiec 1932, POZ; ndl. Czerniejewo, uroczysko „Nowy Las”, lg. L. Czech, M. Pawłow 1954, POZ.

Woj. skierniewickie

Kiernoza, lg. K. Drymmer 1897, KRA; KRAM; Rogów, lg.? 1926, WA; Jeżów, lg. H. Urbanek 1964, LOD; leśn. Leszczyny, lg. H. Pasikowska, S. Sadowska 1964, LOD; Tedin, lg. Dzikowska 1955, LOD; rez. „Wiączyn”, lg. R. Olaczek 1960, LOD; Gałkówkę, lg. J. Jersek 1952, LOD; Trębaczew, lg. Hereźniak 1958, R. Olaczek 1961, LOD; Puszcza Bolimowska lg. K. Rostański 1972, KTU.

Woj. stołeczne warszawskie

Błonie, lg. K. Nowak 1968, KN; Bramki Ludne, lg. K. Nowak 1966, KN; Młociny, lg. R. Kobendza 1950, WA; Bielany pod Warszawą, lg. K. Łapczyński 1877, WA; Warszawa-Wolica, lg. J. Pinkiewicz 1964, WA; Kabaty, lg.? 1956, WA; Piaseczno,

lg. 1909, WA; Chojnów, lg. R. Kobendza 1949, WA; Całowanie, lg. K. Nowak 1962, WA; Celestynów, lg. H. Juraszkówna 1925, WA; Puszcza Kampinoska k. Palmir, lg. K. Rostański 1972, KTU.

Woj. siedleckie

Urle, lg. J. Graff 1922, WA; Mrozy, lg. K. Łapczyński 1878, WA; okolice Pustelnika, lg. H. Juraszkówna 1924, WA; Mienia, lg. A. Leśniak-Stecka 1952, WA; Wodynie, lg. J. Muszyński 1907, WA; Stoczek Łukowski lg. Fij. 1964, LBL; Grudź, lg. Fij. 1965, LBL; Radoryż, lg. Fij. 1965, LBL.

Woj. białkopodlaskie

Łosice, lg. F. Karo 1870, WA; Leśna Podlaska, lg. Fij. 1962, LBL; Rzeczyca, lg. Fij. 1965, LBL; Danówka, lg. Fij. 1965, LBL; Żerocin lg. Fij. 1965, LBL; Przechodzisko, lg. Fij. 1965, LBL; Wola Chomejowa, lg. Fij. 1965, LBL; Żeszczynka, lg. Fij. 1962, LBL; Białka, lg. Fij. 1962, LBL.

Woj. chełmskie

Sosnowica nad Jez. Czarnym, lg. Fij. 1962, LBL; Jamniki nad jez. Moszne, lg. H. Piękoś, KRAM; Wytyczno nad Jez. Wytyckim, lg. Fij. 1958, LBL; Włodawa, lg. J. Motyka 1949, LBL; Łowiszów, lg. Fij. 1960, 1964, LBL; Cyców, lg. Fij. 1962, LBL; Sawin, lg. Fij. 1957, LBL.

Woj. lubelskie

Wronów, lg. H. Stasiak 1950, LBL; Firlej, lg. L. Rewieński 1946, LBL; Kolechowice nad Tyśmienicą, lg. Fij. 1960, LBL; Nasutów, lg. H. Koporska 1925, LBL; Niemce, lg. H. Koporska 1926, LBL; Poniatowa, lg. Fij. 1949, LBL; Ratoszyn, lg. Fij. 1951, LBL; Dyss, lg. Fij. 1948, LBL; Snopków, lg. J. Motyka 1946, LBL; Rudnik, lg. Fij. 1948, LBL; Dębówka, lg. Fij. 1949, LBL; Turka, lg. H. Koporska 1925, LBL; Zemborzyce, lg. E. Zielińska 1964, LBL; Świdnik, lg. Fij. 1949, LBL; Krępiec-Kolonia, lg. Fij. 1949, LBL; Wierchowiska, lg. Fij. 1949, LBL; Majdan, lg. Fij. 1948, LBL; Puchaczów, lg. Fij. 1955, LBL; Dębszczyna k. Bychawy, lg. B. Małysek 1963, LBL.

Woj. piotrkowskie

Leśn. Rokiciny, lg. H. Pasikowska, S. Sadowska 1965, LOD; Lubiec, lg. M. Jędrzejczak 1964, 1965, LOD; Meszcze, lg. H. Urbanek 1960, LOD; Lubiaszów, lg. H. Urbanek 1956, 1959, B. Balich 1964, LOD; Niechcice, lg. R. Kobendza 1909, WA; Trzepnica, lg. W. Rychter 1949, LOD; Niebieskie Źródła, lg. R. Maczek 1960, LOD; uroczysko „Wola Wydrzyna”, lg. J. Gózdź 1965, LOD; Kobiela Wlk., lg. Z. Wojciechowska 1957, J. Sztampke 1958, LOD; Jasień, rez. cisowy, lg. E. Cajgler, 1958, LOD; rez. „Borek”, lg. Z. Rozbicka, K. Lubrosińska 1959, LOD.

Woj. miejskie łódzkie

Łągiewniki k. Łodzi, lg. Horodnicka 1949, Jankowska 1963, LOD; rez. „Polesie Konstantynowskie”, lg. R. Sowa 1960, LOD; Łódź—Marysin, lg. L. Grajewska 1948, LOD; Łódź—Helenówek, lg. J. Lembke 1946, LOD; Łódź—Zdrowie, lg. A. Zawadzka 1947, LOD; Modlica, lg. J. Mowszowicz 1945, LOD; rez. „Molenda” ndl. Rydzyny, lg. A. Gierałtowska, E. Skalmierska 1963, LOD; rez. „Wolbrowka”, lg. B. Daszyńska, T. Zgirska, 1961, LOD; Oleśnica, lg. R. Sowa, H. Urbanek 1964, LOD.

Woj. sieradzkie

Poddębice, lg. J. Binder 1956, LOD; ndl. Sieradz, lg. J. Jersak 1948, LOD; rez. „Jaźwiny” k. Brąszewic, lg. R. Olaczek 1964, LOD; Jamno, lg. J. Szymańska 1961,

LOD; Nowa Wieś, lg. H. Urbanek 1960, LOD; rez. „Homusówka”, lg. R. Sowa 1960, LOD; Złoczew, lg. J. Mowszowicz 1948, LOD.

Woj. kaliskie

Dobrzyca, lg. H. Miller 1898, POZ; Gałązki, lg. H. Miller 1898, POZ; Węglewice, lg. J. Mowszowicz 1962, LOD.

Woj. leszczyńskie

Okolice Kąkolewa, lg. T. Schube 1898, POZ; Ludwinowo, lg. F. Krawiec 1926, lg. J. Paczoski 1928, POZ.

Woj. legnickie

Mieszków, 1 km na pn.-wsch. od wsi, lg. M. Ciaciura 1966, WRS; ndl. Lubin oddz. 91, lg. H. Piękoś 1971, HP; Prusice, lg. Wiurel 1965, WRS; Chelmiec, lg. E. Gajec 1961, WRS.

Woj. jeleniogórskie

Łagów, lg. T. Kowal 1962, WRS; Lubań Śląski, 3 km na pn. od miasta, lg. A. Szpak 1965, WRS; Rybnica, lg.? 1906, WRSL; Sobieszów, lg. J. Szmyt 1967, WRS; Podgórzyn, lg. Mika 1959, WRS; Janowice Wlk., lg. P. Kruber 1913, WRSL.

Woj. wałbrzyskie

Muszkowice, rez. „Muszkowicki Las Bukowy”, lg.?, MGS; Ząbkowice Śląskie, lg.? 1938, WRSL; Brzeźnica, rez. „Cisy”, lg. H. Urbanik 1974, HU; Łądek Zdrój, lg. J. Kuperman 1952, WRS; Bystrzyca Kłodzka, lg. Kramarz 1937, WRSL; grupa Śnieżnika Kłodzkiego, lg. Zimerman 1871, WRSL.

Woj. wrocławskie

Krzelow, lg. E. Gelczuk 1968, WRS; Jary, lg. Mąd. 1957, JM; Sułów, lg. A. Milian 1966, WRS; Milicz, nad dopływem Baryczy, lg. M. Podlewska 1967, T. Kulesza 1968, WRS; Krośnice, lg. Schoepke 1927, 1928, WRSL; Strupina, lg. J. Wolak 1968, WRS; Złotów, 2 km na pn., lg.? 1961, WRS; Trzebnica, lg. T. Pnip 1968, WRS; Oborniki Śląskie, lg. B. Gajewska 1955, M. Ciaciura 1962, WRS; Piotrowiczki, lg. J. Mikulska 1968, WRS; Mrozów, na pd.-zach. od wsi, lg. J. Serwatka 1961, WRS; Siechnice, lg. J. Moczoń 1964, WRS; Sobótka, lg. B. Kula 1966, WRS; Śleza, na stokach Góry Kościuszki, lg. K. Górską 1952, MGS; Malerzów, lg. B. Goślińska, Z. Stadnik 1968, WRS; Długoleka, ok. 1,5 km na pd.-wsch. od wsi, lg. ? 1960, WRS; Damnik, na zach. od wsi, lg. M. Ciaciura 1966, WRS; Nowy Dwór, lg. Mąd. 1964, JM; Bierutów, lg. A. Kosiba 1967, WRS; Chwałowice, lg. L. Demiańczyk 1955, WRS.

Woj. opolskie

Łączany, lg. J. Serwatka 1964, WRS; Zorzów, na zach. od wsi, lg. T. Kowal, S. Michalak 1959, WRS; Brynica, lg. A. Sendek 1966, WRS; Komorzno, lg. A. Sendek 1967, WRS; Maciejów, lg. A. Sendek 1967, WRS; Brzezinka, lg. Mąd. 1959, JM; Lasowice Mł., lg. T. Kowal 1959, WRS; Przylesie, lg. Z. Paradowski, WRS; Magnuszowiczki, lg. J. Serwatka 1963, WRS; Przysiecz, lg. J. Serwatka 1967, WRS; Gogolin, na wsch. od wsi, lg. M. Pyka 1959, WRS; Wawrzyńcowice, lg. P. Szotkowski 1968, WRS; Pokrzywnica, lg. P. Szotkowski 1965, WRS; Koźle, lg. P. Szotkowski 1965, WRS; Kędzierzyn, lg. P. Szotkowski 1964, WRS; Ortowice, lg. P. Szotkowski 1964, WRS; Dąbrowa, lg. P. Szotkowski 1964, WRS; Rozumice, lg. S. Wika 1973, KTU.

Woj. częstochowskie

Ożarówski Las k. Praszki, lg. H. Juraszkówna 1917, WA; uroczysko „Rędziny” k. wsi Rędziny, lg. S. Sadowska, H. Pasikowska 1965, LOD; uroczysko „Sowin” k. Żytnej, lg. B. Chyrczakowska, K. Bańskowska 1964, LOD; Leśn. Dębowiec, wieś Silniczka, lg. M. Kwaśniewska, B. Kaczmarek 1962, LOD; leśn. Knieja, okolice Św. Anny, lg. S. Zielińska i in. 1965, LOD; Kościeliska, lg. ?, 1960, WRS; uroczysko „Jatno” k. Stanisławic, lg. K. Czyżewska, S. Lewińska 1965, LOD; Gnaszyn, lg. F. Karo 18?, KRAM; Złoty Potok, lg. Z. Radwańska-Paryska 1922, WA; Kochcice, lg. Wolny 1937, MGS; Koszęcin, lg. Wolny 1937, MGS; Kalety, lg. Wolny 1937, MGS; Jeziorki, lg. M. Mazaraki 1948, KRA; rez. „Zielona Góra”, lg. S. Wika 1973, KTU.

Woj. kieleckie

Rejów, lg. K. Kaznowski 1922, KRAM; Niewachłów, lg. K. Kaznowski 1922, KRAM; Krajno, lg. K. Wołowicz 1968, WRS; Janaszów, lg. K. Kaznowski 1922, KRAM; rez. „Swinia Góra” k. Bliżyna, lg. H. Piękoś 1964, 1965, KRAM; Jastrzębia Góra, ndl. Bliżyn, lg. H. Piękoś 1964, 1969, KRAM; Góry Świętokrzyskie: Łysica, lg. R. Kobendza 1909, K. Kaznowski 1926, K. Pstrokońska 1954, KRA, KRAM, WA; przy szlaku ze Św. Katarzyny na Łysicę 320 m, lg. H. Piękoś 1970, HP; Pasma Klonowskie, lg. R. Kobendza 1929, WA; Św. Krzyż, lg. B. Pawłowski 1925, BP; Łasy Łagowskie, lg. R. Kobendza 1930, WA; Nagłowice, lg. K. Piech, KRAM; Cisza Wola k. Książa Wlk., lg. Z. Mirek 1975, ZM; Wola Górna-Zagorzyce, lg. Z. Mirek 1974, ZM; Śląboszów, lg. Z. Mirek 1975, ZM.

Woj. tarnobrzskie

Batorz, lg. Fij. 1965, LBL; Zaklików, lg. Balinowska 196?, LBL; Gielnia, lg. Fij. 1965, LBL; Łązek, lg. Fij. 1965, LBL; Janów Lubelski, lg. Fij. 1950, T. Krzaczek 1959, 1960, LBL; Golejów i Wola Wiśniowska lg. R. Ochrya 1973, RO; Nagnajów, lg. Sadecka 1951, WRS; Piaseczno, lg. K. Zarzycki 1965, KZ; Nisko-Warcholy, lg. Z. Sobolewska 1966, WRS.

Woj. zamojskie

Orlów, lg. M. Kasiura 1959, WRS; Krasne, lg. Fij. 1958, LBL; Huszczka, lg. Fij. 1964; Gorzków, lg. Fij. 1961, LBL; Stary Zamość, lg. H. Zderkiewicz 1963, LBL; Kąty, lg. Fij. 1959, LBL; Bukowa Góra k. Zwierzynca, lg. K. Izdebski 1957, Fij. 1959, LBL; Zwierzyniec, lg. Fij. 1958, 1965, LBL; rez. „Obrocz”, lg. W. Skuratovich 1937, POZ; Potoczek, lg. A. Wasiura 1955, LBL; Hutków, lg. Fij. 1964, LBL; Pańska Dol., lg. R. Zderkiewicz 1963, LBL; Strzelce, lg. Fij. 1948, LBL; Kułakowice, lg. Fij. 1964, LBL; Grabowiec, lg. Fij. 1949, LBL; Mircze, lg. Fij. 1949, LBL; Liski, lg. Fij. 1949, LBL; Szeliga, lg. Fij. 1964, LBL; Huta Krzeszowska, lg. Fij. 1950, LBL, Hedwiżyn, torfowisko „Tałandy” lg. H. Piękoś 1975, HP; Luchów, lg. Fij. 1964, LBL; Zamach, lg. Fij. 1965, LBL; Dzierażnia, lg. Fij. 1957, LBL; Szarowola, lg. Fij. 1964, LBL; Hrebenne, lg. Fij. 1965, LBL.

Woj. przemyskie

Trynczę, lg. H. Piękoś 1975, HP; Dynów, lg. D. Zasada 1962, WRS; Przemyśl, lg. B. Kotula 1876, KRAM.

Woj. rzeszowskie

Rez. „Morgi” k. Kamienia, lg. H. Piękoś 1975, HP; Smoczka k. Mielca, lg. H. Piękoś 1975, HP; rez. „Buczyna” w Cyrance, lg. H. Piękoś 1975, HP; Kołacznia w Woli Zarczyckiej, lg. ? 1909, KRA; Brzózka Królewska, lg. H. Piękoś 1975,

HP; Budy Głogowskie, lg. Z. Bednarz 1963, KRA; Błędowa Tyczyńska, lg.? 1964, WRS.

Woj. tarnowskie

Między Jodłową a Wisłoką, wzgórze nad Dęborzynem, lg. Z. Mirek 1977, ZM; m. Doluszcami a Kopaliniemi, lg. H. Piękoś 1971, KRAM; Kopaliny-Pogwizdów, lg. J. Baryła 1968, KRA; Muchówka, lg. H. Piękoś 1971, HP; Jasień-Bugaj, lg. J. Baryła 1968, KRA; przy szlaku turystycznym z Tymowej Górnej na Machulec 397-483 m, lg. H. Piękoś 1972, HP; rez. „Skamieniałe Miasto k. Ciężkowic”, lg. Z. Mirek 1977, ZM.

Woj. miejskie krakowskie

Ojców, lg. F. Karo 1876, F. Berdau 1898, H. Piękoś 1970, HP, KRA, WA; Zielona, lg. Z. Mirek 1974, ZM; k. Skały Kmity, lg. A. Ślędziński 1875, KRA; Dol. Klucz-wody, lg. K. Luchter 1965, KRA; Balice, lg. A. Ślędziński 1876, KRA; Bielany k. Krakowa, lg. A. Żmuda 1908, KRAM; Tynec, lg. J. Bławiczak 1967, KRA; Kraków-Bronowice, lg. A. Rehman, KRAM; Kraków, lg. A. Rehman, KRAM; Sikornik k. Krakowa, lg. A. Rehman, KRAM; Kraków-Dębniki, lg. Sawicz 1955, WRS; Kraków, Borek Fałęcki, lg. A. Żmuda 1881, I. Król 1917, KRAM; m. Li-bertowem a Gajem, lg. H. T. Tacikowie 1970, HP; Mogilany, lg. D. Tumidajowicz 1959, KRA; Skawina, lg. Z. Mirek 1971, ZM; Krzywaczka, lg. A. Rehman, KRAM; Dobczyce, lg. A. Rogalski, KRAM; Skrzynka, lg. A. Rogalski 1879, KRAM; Nie-połomice, lg. A. Pałkowa, H. Piękoś 1971, KRAM; Błoto k. Niepołomic, lg. J. Trela 1925, KRAM; Puszcza Niepołomska, lg. J. Krupa 1876, K. Miczyński 1921, KRAM.

Woj. katowickie

Miasteczko Śląskie, lg. K. Rostański 1975, 1976, KTU; Nędza, lg. A. Sendek 1963, WRS; okolice Kroczyca, nad Białką, lg. K. Piech 1935, KRAM; Bytom, lg. A. Sen-dek 1975, KTU; Dąbrowa Górnicza, na wsch. od miasta, lg. B. Piotrowska 1957, WRS; ndl. Panewnik, lg. M. Guzikowa 1974, MG; Dąbrowa, lg. Werner 1910, MGS; Gliwice, lg. Broske 1901, KRA; Gliwice-Port, lg. P. Szotkowski 1969, KRA; Gliwice — Zabrze, lg. A. Sendek 1972, KTU; Zabrze-Maciejów, lg. K. Rostański 1972, KTU; Zabrze — Rokitnica, lg. A. Sendek 1973, KTU; Ruda Śląska-Stara Kuźnia Leśna, lg. A. Sendek 1976, KTU; Katowice-Ligota, lg. K. Jędrzejko 1969, A. Sendek 1976, KTU; Katowice-Giszowiec, lg. A. Sendek 1974, B. Hauer 1976, KTU; Kostuchna, lg. B. Hauer 1976, KTU; między Łaziskami a Orzeszem, las „Sa-lamander” k. Mikołowa, lg. K. Rostański 1974, KTU; Murcki, lg. K. Rostański 1972, KTU; Wesola, lg. A. Sendek 1973, KTU; Siemianowice Śląskie, lg. A. Sendek 1974, KTU; Adamowice, na pn.-wsch. od wsi, lg. M. Ciaciura 1964, WRS; Brzeźce, lg. S. Wróbel 1965, WRS; Pszczyna, lg. Mielke 1850, POZ; Klucze, lg. E. Miodek 1956, KRA; u źródeł Białej na Pustyni Będowskiej, lg. K. Piech 1924, KRAM; Jankowice, lg. B. Gustawicz, KRAM.

Woj. bielskie

Pastwiska, lg. A. Berek 1955, WRS; Bażanowice, lg.? 1935, MGS; Tuł, stoki pd. lg.? 1930, POZ; Marklowice, lg. K. Rostański 1972, KTU; Ustroń, lg. K. Kajfosz 1963, WRS; Beskid Śląski: Orłowa, lg. A. Kozłowska 1929, MGS; Brenna, lg. A. Kozłowska 1929, MGS; Wisła-Uzdrowisko, lg. K. Rostański 1972, KTU; Miku-szowice, lg. K. Kajfosz 1963, WRS; Szczyrk, lg. E. Balbierz 1953, D. Kowalek 1966, WRS; Czaniec, lg. M. Guzikowa 1976, MG; Wieprz k. Andrychowa, lg. M. Łań-cucka 1935, KRA; Jastrzębia Dolna m. Lanckorona a Sułkowicami, lg. Z. Mirek 1973, ZM; Kalwaria Zebrzydowska, lg. M. Guzikowa 1959, KRAM; wzgórze m.

Andrychowem a Gancarzem, lg. A. Środoń 1937, KRAM; Jarosławice, lg. Iżycka 1953, WRS; Beskid Żywiecki: Rachowiec od Zwarodnia 840 m, lg. H. Piękoś 1971, HP; Ożna 820 m, lg. H. Piękoś 1971, HP; Rycerka Kolonia 700 m, Jaworzyna 800 m, Będoszka 700 m, Przegibek 1000 m, lg. H. Piękoś 1971, HP; Pasma Wlk. Raczy: Bugaj 900 m, lg. H. Piękoś 1969, HP; Rycerzowa Wlk. 1180 m, Rycerzowa Mł. 920-1060 m, Bednarów Beskid 950 m, Przysłop 850 m, lg. H. Piękoś 1972, HP; Sobłówka, lg. H. Piękoś 1965, HP; Ujsoły 580-660 m, lg. H. Piękoś 1972, HP; Glinka 750 m, lg. H. Piękoś 1972; Smerekówka Mł. od Glinki 780-1030 m, lg. H. Piękoś 1972, HP; Smereków Wlk. 800-1040 m, Kaniówki 967 m, pn.-zach. zbocza Oszusta 800 m, lg. H. Piękoś 1972, HP; Sopotnia, lg. I. Król, KRAM; Babia Góra, lg. H. Zapalowicz 1887, KRAM.

Woj. nowosądeckie

Beskid Żywiecki: Pasma Policy, pn. stok Urwanicy, lg. B. L. Stuchlikowie 1956, KRAM; Polica stok pn., lg. B. L. Stuchlikowie 1954, KRAM; Oblak, lg. B. L. Stuchlikowie 1954, KRAM; Bystra, lg. M. Guzikowa 1965, KRAM; Spytkowice 685 m, lg. M. Guzikowa 1962, KRAM; Beskid Wyspowy: Słopnice, nad Pot. Czarnym 480 m, lg. K. Kowpasz 1967, KT; pn. stok Paproci 610 m, lg. K. Towpasz 1969, KT; m. Kamienicą a Szczawą, lg. H. Piękoś 1967, HP; Chełmiecka Góra, lg. B. Pawłowski 1918, BP; Falkowa, lg. B. Pawłowski 1919, KRAM; Beskid Sądecki: Pasma Radziejowej, dol. Mł. Roztoki, lg. B. Pawłowski 1918, 1919, BP, KRAM; Dol. Czerczy, lg. B. Pawłowski 1919, KRAM; Pańskie k. Muszyny, lg. B. Pawłowski 1929, KRAM; Luboń Wlk. od Zarytego 820-1025 m, lg. A. Doszła 1966, KRA; Lipnica Mł. 763 m, lg. M. J. Guzikowie 1966, KRAM; Zubrzyca Dolna, pn.-zach. stok Gronia 740 m, lg. M. Guzikowa 1960, KRA; Zubrzyca Górna, lg. M. Guzikowa 1960, KRA; Podśarnie 695 m, nad pot. Czarna Orawa, lg. M. J. Guzikowie 1962, KRAM; na pn. od Podszkla 830 m, w dol. potoku m. Wlk. Działem a Bukowińskim Wierchem, lg. M. J. Guzikowie 1965, KRAM; na pn.-zach. od Podwilka 705 m, lg. M. J. Guzikowie 1966, KRAM; Podszkle 725 m, nad potokiem Bukowińskim lg. M. J. Guzikowie, 1962, 1965, KRAM; Bory Nowotarskie, Czarny Dunajec, lg. K. Szczepanek 1953, KRA; Bór Ostrowski, lg. K. Szczepanek 1953, KRA; Bór Bielski, lg. K. Szczepanek 1953, KRA; Gorce: Czoło Turbacza, lg. A. Jasiewicz 1951, AJ; Dol. Łopusznej 965 m, lg. A. J. Kornasiowie 1953, AJK; Dol. Piekielko pod Runkiem (nad Maniowami) ok. 700-800 m, lg. J. Kornaś 1963, AJK; Nowy Targ, lg. M. Raciborski, KRA; Bryjarka k. Szczawnicy 540 m, lg. B. Pietras 1966, KRA; Jarmuta k. Szczawnicy, lg. B. Pietras 1966, KRA; Szczawnica, lg. K. Łapczyński 1880, WA; Pieniny: poniżej Trzech Koron, lg. S. Kulczyński 1918, KRA; Magura Witowska, dol. Pot. Magury, lg. E. Kotejowa 1962, KRAM; Pogórze Gubałowskie, zach. stoki Palenicy 1180 m, pn. stoki Mietłówki 930 m, pn. stoki Gubałówki, lg. E. Pancer 1955, KRA; Tatry Zach.; Dol. Chochołowska 890 m, lg. Z. Mirek 1977, ZM; Dol. Kościeliska, lg. A. Pacyna 1960, KRA; Dol. Małej Łąki lg. W. Kulczyński 1875, KRAM; Dol. Strążyska 930-950 m, lg. B. Pawłowski 1946, BP, KRAM; Dol. Bystrej 1100 m, lg. H. Piękoś 1960, KRA; Toporowy Staw Niżni 1089 m, lg. H. Piękoś 1973, HP; Tatry Wysokie: Dol. Pańszczyca 1330 m, lg. H. Piękoś 1961, KRA; k. Łysej Polany powyżej mostu na Białce 980 m, lg. B. Pawłowski 1926, BP; Stara Roztoka 990 m, lg. Z. Mirek 1977, ZM; Wierch Poroniec 1130 m, lg. Z. Mirek 1977, ZM.

Woj. krośnieńskie

Strzeszyn, lg. U. Moskal 1962, WRS; Dębowiec lg. K. Wiśniewicz, KRA; Czarnorzeki k. Odrzykonია, lg. W. Jabłoński 1862, KRAM; Targowiska, lg. K. Piech 1923, KRAM; Iwonicz Zdrój, lg. K. Piech 1923, KRAM; Cergowa Góra k. Dukli, lg. K. Piech 1923, KRAM; Jureczkowa, lg. H. Piękoś 1971, HP; Rymanów Zdrój,

lg. K. Piech 1925, KRAM; Olchowce, lg. K. Piech 1928, KRAM; Sanok, lg. J. Żak 1959, U. Skoczyńska 1967, WRS; Bieszczady Zach.: Smerek 1220 m, lg. A. Jasiewicz 1954, KRAM; Wetlina k. leśniczówki „Rawka” 660 m, lg. A. Jasiewicz, K. Zarzycki 1957, KRAM; Otryt, lg. B. Kotula 1880, KRAM.

Stanowiska nie zidentyfikowane lub bez bliższego określenia
nie zamieszczone na mapie:

„Belauf Eichwald” k. Świecia, lg. Kling. 1881, TRN; dawny powiat Łapy, lg. F. Fienko 1970, BIA; Puszcza Białowiecka, lg. S. Malinowski 1922, Sokoł. 1969, BIA; Izabelin, lg. F. Kamiński 1872, WA; Góry Świętokrzyskie, lg. R. Kobendza 1909, Z. Okrutna, J. Szydkówna 1949, LOD, WA; wąwóz przy Lubrzance, lg. J. Grządek 1931, POZ; dawny powiat Przemyśl, lg. M. Wiśniowska 1965, WRS; Białołęka, lg. F. Kamiński 1870, WA; Korytnica, lg. J. Muszyński 1903, WA; Jakóbów, lg. K. Pachol 1963, WA; Sławno, lg. A. Marhl 1955, WRS; Łącznia, lg. Miller 1887, POZ; Bystrzyca na Śląsku, lg. B. Kotula 1895, KRAM; „Lausiter Torfmoor”, lg. M. Fiek 1900, WRS; „Bielgrund bei Königstein”, lg. Rabenhorst, KRAM; Bischdorf, lg.?, MGS; Korzybie, lg. I. Winiarska 1971, TRN.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

Woj. szczecińskie

Wolin: Łunowo, lg. H. Piotrowska 1958, GDU.

Woj. słupskie

Kępice nad Wieprzą, lg. W. Żukowski 1959, POZ; Polonica nad jez. Bardze, lg. W. Żukowski 1960, POZ; Łeba na pn. brzegu jez. Sarbskiego, lg. Mąd. 1953, JM; Steknica, na zach. od osiedla, lg. Mąd. 1953, JM; Sarbsk, przy drodze do Nowego Dworu, lg. Mąd. 1953, JM; Kluki, lg. M. Machnikowski 1977, GDU.

Woj. gdańskie

Odargowo, lg. F. Krawiec 1930, POZ; Jastarnia, lg. R. Kobendza 1938, WA; Kępa Redłowska, lg. F. Krawiec 1930, POZ; Oliwa, lg. C. Lützow 1891, TRN; Otomin, lg. Kling. 1889, TRN; Mirachowo, lg. C. Lützow 1884, F. Krawiec 1936, POZ, TRN; Wyżyna Staniszeńska, lg. H. Piotrowska 1957, POZ; Kartuzy, lg. Kling. 1884, F. Krawiec 1934, POZ, TRN.

Woj. elbląskie

Trzciano, lg. Kling. 1863, TRN; Krynica Morska, lg. Kalmuss, 1891, TRN; Przybyłowo, lg. Kling. 1885, TRN; Elbląg, lg. Straube 1897, TRN.

Woj. olsztyńskie

Wygoda, leśn. Klonowo oddz. 170, lg. A. Jutrzenka-Trzebiatowski 1968, OLS; Wysoka Wieś, leśn. Dylewo oddz. 122, lg. A. Jutrzenka-Trzebiatowski 1968, OLS; Ludwikowo, leśn. Kisielice oddz. 215, lg. A. Jutrzenka-Trzebiatowski, 1967, OLS.

Woj. suwalskie

Jurkiszki, ok. 6 km w kierunku Czarnowa, lg. Mąd. 1964, JM.

Woj. białostockie

Podrzeczany, lg. Sokoł. 1968, BIA; Nowosiółki, lg. Sokoł. 1968, BIA.

Woj. łomżyńskie

Borawskie, lg. Sokoł. 1968, BIA.

Woj. bydgoskie

Maćkaly, 4 km. na zach. nad jez. Zielone, lg. M. Rejewski 1966, TRN; nad jez. Czarnogłowie, lg. M. Ceynowa 1966, TRN; Lutówka, leśn. Gaj, lg. M. Rejewski 1964, TRN; Trzciany k. Sępólna Krajeńskiego, lg. K. Burzyńska 1962, POZ; Biała nad. jez. Karaski, lg. M. Ceynowa 1968, TRN; Plewno, lg.?, 1885, TRN.

Woj. gorzowskie

Drezenko, lg. Lasch, POZ; Grońsko, lg. F. Krawiec 1931, POZ.

Woj. zielonogórskie

Ochla, lg. B. Schröder 1889, WRSL; Lipiny, lg. Scholtz 1881, WRSL; Mochy, lg. J. Paczowski 1932, POZ.

Woj. poznańskie

Stęszew, lg. J. Paczowski 1932, POZ.

Woj. stołeczne warszawskie

Puszcza Kampinoska, Pociecha, lg. R. Kobendza 1922, WA; Sieraków, lg. R. Kobendza 1922, WA; Brwinów, lg. K. Nowak 1967, KN; Zielonka, lg. F. Krawiec 1930, POZ.

Woj. białkopodlaskie

Uroczysko „Chmielinne” k. Leśnej Podlaskiej, lg. Z. Denisiuk 1958, POZ.

Woj. chełmskie

Wólka Wytycka, lg. Fij. 1964, LBL.

Woj. lubelskie

Podlodówka, lg. Fij. 1965, LBL.

Woj. piotrkowskie

Lubieniec, lg. M. Jędrzejak 1964, LOD.

Woj. sieradzkie

Rez. „Jaźwiny”, lg. R. Olaczek 1964, LOD.

Woj. kaliskie

Patarzyce, lg. Krawiec 1934, POZ; m. Obrą a Goliną, lg. F. Krawiec 1934, POZ; Rychtal, lg. F. Krawiec 1934, POZ.

Woj. leszczyńskie

Okolice Gostynia, lg. L. Witmajerówna 1926, WA; Załęcze, lg. Nitgenke? 1899, WRSL.

Woj. legnickie

Lubin, lg. H. Piękoś 1971, HP.

Woj. jeleniogórskie

Krzewie Mł., na pn.-zach. od wsi, lg. M. Ciaciura 1965, WRS; Gradówek, lg. Fuchs 1933, WRSL; Łupki, lg. J. Serwatka 1965, WRS; Szklarska Poręba, lg. H. Piękoś 1971, HP; Bierutowice, lg. J. Serwatka 1960, JM; Karpacz, lg. E. Kuźniewski 1960, WRS; na zboczach Mł. Kopy nad Łomniczką, lg. J. Serwatka 1960, JM; Trzcinaśko, szczyt Sokolik, lg. J. Serwatka 1960, WRS; Jagniątków, lg. E. Kuźniewski 1959, WRS.

Woj. wałbrzyskie

Ludwikowice Kłodzkie, lg. Kramarz 1939, WRSŁ; Brzeźnica, rez. „Cisy” oddz. 85, lg. H. Urbanik 1974, HU; Gorzanów, lg. C. Cramer 1859, POZ; Spalona, k. schroniska turystycznego, lg. M. Ciaciura 1965, WRS; Bystrzyca Kłodzka, lg. Kramarz 1937, WRSŁ.

Woj. wrocławskie

Wężewice, na pd. od wsi, lg. J. Serwatka 1964, WRS; Krośnice, lg. Schoepke 1927, WRSŁ; Oborniki Śląskie, lg. K. Górka 1952, A. Chabin 1963, MGS, WRS; Szczepanów przy gościńcu do Brodna, lg. Mąd. 1964, JM; Sobótka, lg. Mąd. 1953, JM; Nowy Dwór, na pn.-zach. od wsi, lg. Mąd. 1964, JM; Góra Ślęza, lg. Schmattorsch 1920, WRSŁ.

Woj. opolskie

Borucice, lg. Rothe 1908, WRSŁ; Biskupia Kopa, lg. Broske 1916, KRA; Dąbrowa, lg. P. Szotkowski 1964, WRS; Stara Kuźnia, lg. P. Szotkowski 1964, WRS; Głucholazy, lg. Richter 1882, MGS; Rozumice, lg. F. Celiński, S. Wika 1973, KTU.

Woj. częstochowskie

Stanisławice, uroczysko „Jatno”, lg. K. Czyżewska 1966, LOD.

Woj. kieleckie

Blizyn, lg. H. Piękoś 1971, HP; Góry Świętokrzyskie, Łysa Góra, lg. A. Żmuda 1909, WA; Góry Świętokrzyskie, przy szlaku turystycznym ze Św. Katarzyny na Łysicę 320 m, lg. H. Piękoś 1970, HP; Łysica, lg. K. Kaznowski 1926, KRAM; Bodzentyn, lg. N. Puring 1897, WA; Góra Jeleniowska, lg. R. Kobendza 1930, WA; lasy Łagowskie, lg. R. Kobendza 1930, WA.

Woj. tarnobrzskie

Janów Lubelski, lg. Fij. 1950, LBL.

Woj. zamojskie

Obroc, lg. Fij. 1965, LBL; Górecko Kościelne rez. „Szum”, lg. Fij. 1965, LBL; Luchów, lg. Fij. 1964, LBL.

Woj. przemyskie

Bircza, lg. H. Piękoś, 1972, HP.

Woj. rzeszowskie

Kamionka, lg. A. Zając 1976, UAZ; Blizna, lg. A. Zając 1976, UAZ.

Woj. tarnowskie

Okolice Jodłowej, wzgórze nad Dęborzynem, lg. Z. Mirek 1977, ZM; rez. „Skamieniałe Miasto” k. Ciężkowic, lg. Z. Mirek 1977, ZM.

Woj. miejskie krakowskie

Ojców, Złota Góra, lg. H. Piękoś 1970, HP; Skała Kmity, lg. T. Tacik 1973, KRAM; Krzywaczka, lg. A. Rehman, KRAM; Harbutowice 480 m, 540 m, lg. H. T. Taciakowie 1964, 1965, HTT; Kłaj w Puszczy Niepołomickiej, lg. K. Piech 1926, KRAM.

Woj. katowickie

Rez. „Segiet” k. Blachówki, lg. Z. Mirek 1974, ZM; Bogunice, na zach. od wsi, lg. M. Ciaciura 1964, WRS; Bączkowice lg. M. Ciaciura 1964, WRS; Kamień pod

Rzędówka, na pd. od wsi, lg. Mąd. 1964, JM; Rowień, lg. Schmattorsch 1919, WRSŁ; Miasteczko Śląskie, lg. K. Rostański 1976, KTU; Kozłowa Góra, lg. A. Sendek 1972, KTU; Zabrze-Maciejów, lg. K. Rostański 1972, KTU.

Woj. bielskie

Nidek, lg. M. J. Guzikowie 1976, MG; Czaniec, lg. M. J. Guzikowie 1976, MG; Bulowice, lg. M. J. Guzikowie, 1976, MG; Przeciszów, lg. M. J. Guzikowie 1976, MG; Osiek, lg. M. J. Guzikowie 1976, MG; Markłowice, rez. „Kopce”, lg. K. Rostański 1972, KTU; Wisła, lg. K. Rostański 1972, KTU; Brenna Leśnica, lg. M. Broda 1968, KRA; Beskid Żywiecki: Rachowiec 870 m, lg. H. Piękoś 1975, HP; Rycerka Kolonia, lg. H. Piękoś 1971, HP; Kłokocz 660 m, od Rycerki Dolnej, lg. H. Piękoś 1973, HP; Glinka 730 m, lg. H. Piękoś 1974, HP; Koszarawa, lg. L. Bujkówna 1936, POZ; Pilsko, lg. Seńkowski 1938, H. Piękoś 1962, HP, KRA; Babia Góra, Krowiarki, lg. H. Piękoś 1971, HP; Jastrzębia Dolna m. Lanckoroną a Sułkowicami, lg. H. Piękoś 1973, HP; Madohora 910 m, lg. S. Pelc 1954, KRAM.

Woj. nowosądeckie

Pcim, pn. stok Ziembówki, lg. K. Starmach 1925, KRAM; Sidzina Mł. 715 m, lg. M. Guzikowa 1964, KRAM; Beskid Wyspowy: Ostra, lg. H. Piękoś 1971, HP; Strzebel, lg. K. Starmach 1926, KRAM; Łopień, lg. H. Piękoś 1971, HP; Mogielica 1170 m, lg. K. Towpasz 1967, KT; m. Kamienicą a Szczawą, lg. H. Piękoś 1975, HP; Margoń Niżni, lg. B. Pawłowski 1927, KRAM; Krynica, lg. J. Krupa, KRAM; Zubrzyca Górna, lg. M. Guzikowa 1960, KRA; Podszkle, lg. W. Nieszawska 1926, WA; Gorce, rez. Orkana, lg. M. Wawrzekiewicz 1963, LOD; Jaworzyna k. Turbacza 1225 m, lg. A. J. Kornasiowie 1950, AJK; Dol. Piekielko, pod. Runkiem nad Marniowami ok. 600-700 m, lg. J. Kornaś 1963, AJK; Krempachy, Fordiak 600 m, lg. K. Grodzińska 1972, KG; Pieniny, Toporzyska k. Krościenka, lg. K. Zarzycki 1967, KZ; powyżej Gródka 590 m, lg. H. Piękoś 1971, HP; Pogórze Gubałowskie: Potok Głęboki 1020 m, na zach. od Słodyczek stoki pn. 1060 m, nad dopływem Pot. Rafaczańskiego 759 m, Gubałówka stoki pn.-zach., lg. E. Pancer 1955, KRA; Tatry: Staw Toporowy Niżni, lg. H. Piękoś 1973, HP; Przysłop Waksmundzki 1420 m, lg. Z. Mirek 1977, ZM.

Woj. krośnieńskie

Folusz (pasmo Magury Wątkowskiej), lg. T. Tacik 1956, HTT; Jureczkowa, lg. H. Piękoś 1971, HP; Rymanów Zdrój, lg. K. Piech 1928; KRAM; k. Deszna, lg. K. Piech, KRAM; Olchowce, lg. K. Piech 1923, KRAM; Pasma Bukowicy (Beskid Niski), zbocza Skibców, lg. E. Pancer, K. Grodzińska 1956, KRAM.

Stanowiska nie zidentyfikowane lub bez bliższego określenia
nie zamieszczone na mapie:

Białe Jez. w dawnym powiecie Kartuzy, lg. Kling. 1884, TRN; Góry Świętokrzyskie, lg. K. Kaznowski, lg. wycieczka Zakł. Syst. Roślin UW 1925, KRAM, WA.

Dryopteris assimilis S. Walker

Woj. szczecińskie

Żółtwin, m. jez. Żółtwinowskim a Kołczewskim, lg. Mąd. 1951, JM; Wolin, Lubiewo, lg. H. Piotrowska 1958, GDU.

Woj. koszalińskie

Jelenino, lg. W. Żukowski 1956, POZ.

Woj. śląskie

Ślupsk, Lasek Południowy, lg. J. Misiewicz 1970, M.

Woj. gdańskie

Jastrzębia Góra, lg. Mąd. 1950, JM; Darżlubski Las, lg.? 1895, TRN; jez. Żarnowickie, lg. Kling. 1883, TRN; Oliwa, lg. C. Lützow 1883, TRN; Babi Dół, lg. Kling. 1884, TRN; zbocza parowu Raduni, lg. F. Krawiec 1933, POZ; Brzeźno, ndl. Peplin, ok. 2 km na wsch. od wsi, lg. K. Tobolski 1967, POZ.

Woj. elbląskie

Bogusze, lg. Kling. 1873, TRN; „Rehhöfer Forst”, lg. Kling. 1873, TRN.

Woj. olsztyńskie

Dylewska Góra, ok. 300 m, lg. Z. Mirek 1977, ZM; uroczysko „Szyldak” k. Durąga, lg. Z. Mirek 1977, ZM.

Woj. suwalskie

Smolniki, lg. Sokoł. 1969, BIA; Królówek, lg. A. Kawecka 1970, BIA; Remienkinie, lg. A. Kawecka 1969, BIA; Piertanie, lg. A. Kawecka 1969, BIA; Jez. Białe, lg. B. Hryniewiecki 1921, WA; Puszcza Augustowska, ndl. Balinka, lg. Sokoł. 1963, BIA.

Woj. białostockie

Katarynka, lg. J. Pietrzykowski 1969, BIA; Puszcza Knyszyńska, ndl. Złota Wieś, lg. Sokoł. 1963, BIA; Jeziorek, lg. S. Fieńko 1969, BIA; Pasieki, lg. J. Kozak 1970, BIA; Białowieża, lg. A. Rusińska 1968, BIA; Białowiecki Park Narodowy, lg. Sokoł. 1965, BIA; Puszcza Białowieska, lg. J. Paczoski 1927, POZ.

Woj. łomżyńskie

Pupkowizna, lg. Sokoł. 1968, BIA; Kuzie, lg. Sokoł. 1968, BIA; Wyk, lg. Sokoł. 1968, BIA; Stawiski, lg. Sokoł. 1968, BIA.

Woj. bydgoskie

Dębki, ndl. Twarożnica rez. „Ustronie”, lg. M. Ceynowa 1962, TRN; Łązek, lg. S. Grütter 1890, TRN.

Woj. zielonogórskie

Rajewo, na zach. od wsi, lg. J. Serwatka 1966, WRS; Ochla, lg. Schröder 1889, JM.

Woj. poznańskie

Ilowiec, lg. J. Paczoski 1928, POZ.

Woj. stołeczne warszawskie

Sieraków, lg. K. Nowak 1970, KN; Całowanie, lg. K. Nowak 1963, WA.

Woj. białkopodlaskie

Rzeczyca, lg. Fij. 1965, LBL.

Woj. lubelskie

Niemce, lg. L. Rewieński 1948, LBL; Krężnica, lg. L. Rewieński 1947, LBL.

Woj. piotrkowskie

Wola Wydrzyna, leśn. Niwa Leśna, lg. J. Góźdz 1965, LOD.

Woj. kaliskie

Rychtal, lg. F. Krawiec 1939, KRAM; Brzeziny, ndl. Węglewice, lg. J. Mowszowicz 1964, LOD.

Woj. jeleniogórskie

Przesieka, Karkonoski Park Narodowy obok schroniska „Odrodzenie”, lg. J. Serwatka 1960, JM; Karpacz, na zboczu Czarnej Kopy nad Łomniczką przy wodospadach, lg. J. Serwatka 1960, JM; Trzcińsko, szczyt Sokolik, lg. J. Serwatka 1960, WRS.

Woj. wałbrzyskie

Wałbrzych, lg. Oborny 1876 (sec. Simon, Vida 1966).

Woj. wrocławskie

Wrocław, lg. Sydow (sec. Simon, Vida 1966).

Woj. opolskie

Brynica, lg. F. Kern 1974, WRSŁ.

Woj. kieleckie

Góry Świętokrzyskie: Pasma Klonowskie, lg. Kobendza 1929, WA; przy szlaku ze Świętej Katarzyny na Łysicę, lg. H. Piękoś 1970, HP; Łysica, lg. Moesz 1917 (sec. Simon, Vida 1966).

Woj. zamojskie

Otocz, k. Turobina, lg. Fij. 1955, LBL; okolice Zwierzyńca, „Do Grela”, lg. H. Piotrowska 1957, POZ; Bukowa Góra k. Zwierzyńca, lg. K. Izdebski 1957, LBL; Tarnowola, nad Szumem, lg. Fij. 1965, LBL; Podlodów, lg. Fij. 1965, LBL.

Woj. miejskie krakowskie

Krzywaczka, lg. A. Rehman, KRAM.

Woj. katowickie

Wygony, lg. Mąd. 1964, JM.

Woj. bielskie

Brenna Leśnica, lg. M. Broda 1967, KRA; Barania Góra, źródła Białej Wisielki, lg. A. Kozłowska 1932, MGS; Beskid Żywiecki: Węglarze, lg. H. Surówka 1931, POZ; Węgierska Górka, lg. M. Wolna 1974, KTU; Rycerka Górna, Kłokocz, lg. H. Piękoś 1973, HP; Pasma Wlk. Raczy, Orzeł poniżej szczytu 1100 m, lg. H. Piękoś 1965, HP; Będoszka 1080 m, lg. A. Pacyna 1971, HP; Rycerzowa Wlk., lg. H. Piękoś 1968, HP; Smereków Wlk. od strony wsi Glinka 950 m, Jaworzyna 1050 m od strony wsi Glinka, lg. H. Piękoś, HP; Zawoja, lg. ?, KRA; Babia Góra, lg. F. Krawiec 1930, POZ.

Woj. nowosądeckie

Beskid Wyspowy: Strzebel, lg. K. Starmach 1926, KRAM; Pasma Policy, Polica 1250 m, lg. B. L. Stuchlikowie 1957, KRAM; szczyt nad Halą Krupową, lg. B. L. Stuchlikowie 1954, KRAM; Sucha Góra, lg. B. L. Stuchlikowie 1954, KRAM; pn. stok Łysicy, lg. B. L. Stuchlikowie 1954, KRAM; Beskid Sądecki: pn. stoki Wlk. Prehyby, lg. B. Pawłowski 1919, BP; Pasma Radziejowej, pod szczytem Skałek, lg. E. Wołoszczak 1899, KRAM; Nawojowa, lg. R. Kobendza 1926, WA; Jaworzyna k. Krynicy, lg. K. Piech 1930, KRAM; Podszkle, lg. W. Niedziałkowski 1925, WA;

Gorce, Dol. Pot. Turbacz nad Huciskiem poniżej rez. Orkana 755 m, lg. A. J. Kornasiowie 1950, KRAM; Dol. Łopusznej 940 m, lg. A. J. Kornasiowie 1953, KRA; Pieniny: Nowa Góra 890 m, lg. K. Zarzycki 1966, KZ; Czerwone Skały, lg. K. Zarzycki 1967, KZ; Wzniesienie Gubałowskie: Jantolówka 930 m, Słodyczki stok pn.-wsch., lg. E. Pancer-Kotejowa 1955, KRA; Zakopane, lg. A. Rehman, KRAM; Murzasichle, lg. H. Piękoś 1974, HP; Brzeziny k. Cyrhli, lg. H. Piękoś 1974, HP; Tatary Zachodnie: Furkaska od Dol. Chochołowskiej 1230 m, lg. B. Pawłowski 1922, BP; Dol. Chochołowska 890 m, 1180 m, lg. A. Pacyna 1961, KRA; stoki Ornaku od Dol. Kościeliskiej, lg. A. Żmuda 1910, KRAM; Hala Tomanowa 1390 m, lg. T. Tacik 1954, HTT; Dol. Małej Łąki 1300 m, lg. G. Vida (sec. Simon, Vida 1966), lg. W. Kulczyński 1875, KRAM; pod Giewontem, lg. F. Berdau 1856, KRAM; Dol. Strążyska 930 m, lg. K. Łapczyński 1881, B. Pawłowski 1946, KRAM; Dol. Białego, lg. A. J. Kornasiowie 1945, AJK; Kondratowa, lg. T. Wilczyński, S. Zuber 1911, KRAM; m. Kalatówkami a Kondratową, lg. T. Wilczyński 1911, S. Zuber, KRA; Dol. Bystrej 1100 m, lg. H. Piękoś 1962, HP; Nosal, lg. ?, 1946, KRA; Dol. Olczyska, lg. ?, 1926, KRAM; Skupniów Uplaz, lg. H. Piękoś 1973, HP; Dol. Suchej Wody 1350 m, lg. H. Piękoś 1962, HP; Tatry Wysokie: Dol. Pańszczyca 1330 m, lg. H. Piękoś 1962, HP; zbocza Małej Koszystej 1290 m, lg. Z. Mirek 1977, ZM; Dol. Roztoki 1080 — 1620 m, lg. Z. Mirek 1974, ZM; Morskie Oko 1400 m, lg. W. Kulczyński, lg. H. Piękoś 1974, KRAM; Świstówka — Opalone 1460 m, 1590 m, 1720 m, lg. Z. Mirek 1977, ZM; Palenica Białczańska — Rusinowa Polana 1090 m, lg. Z. Mirek 1977, ZM.

Woj. krośnieńskie

Beskid Niski: pn. zbocza Magury Wątkowskiej nad Foluszem 600-750 m, lg. Z. Mirek 1977, ZM; Jureczkowa, lg. H. Piękoś 1971, HP; Rymanów Zdrój, lg. K. Piech 1925, KRAM; Słonne, lg. K. Piech 1927, KRAM; Bieszczady Zach.: Smerek, pod szczytem Jasiołka, lg. E. Wołoszczak 1892, KRAM; Połonina Wetlińska, lg. K. Piech 1925, KRAM; m. Czarną a Lutowiskami, lg. H. Piękoś 1971, HP; Mała Rawka 1000-1100 m, lg. A. Jasiewicz 1970, AJ; przełęcz m. Małą a Wielką Rawką 1260 m, lg. A. Jasiewicz, K. Zarzycki 1956, KRAM; Dol. Terebowca 700 m, lg. H. Piękoś 1971, HP; Tarnica, zbocza zach. 1300 m, lg. A. Jasiewicz, K. Zarzycki 1954, H. Piękoś 1971, KRAM; Rozsypaniec, lg. A. Jasiewicz 1970, AJ.

Stanowiska nie zidentyfikowane lub bez bliższego określenia,
nie zamieszczone na mapie:

Zakrzewo w poznańskim, lg. ?, 1898, POZ; Regle Zakopiańskie w Tatrach, lg. F. Berdau 1885, KRA; Bielawa, lg. F. Krawiec 1935, POZ.

IX. ZESTAWIENIE WYNIKÓW

1. Stwierdzono występowanie na terenie Polski 3 gatunków z grupy *Dryopteris dilatata*: *D. carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs [= *D. spinulosa* (Müll.) Watt], *D. dilatata* (Hoffm.) A. Gray em. S. Walker oraz blisko z tym ostatnim spokrewnionego i nie wyróżnianego dotąd u nas gatunku *D. assimilis* S. Walker.

2. W oparciu o materiał zielnikowy i żywy zanalizowano zmienność cech podawanych w literaturze dla rozróżnienia gatunków z grupy *D. dilatata* oraz próbowano ocenić taksonomiczną wartość tych cech.

Stwierdzono, że *D. carthusiana* różni się od obu pozostałych gatunków takimi cechami jak: barwa, kształt i gęstość łusek na ogonku liściowym, brak ogruczolenia, pocięcie blaszki liściowej oraz barwa i skulptura zarodników. Natomiast najlepszymi cechami odróżniającymi *D. assimilis* od *D. dilatata* są barwa i morfologia zarodników, w przeciwieństwie do cech makroskopowych, których zakresy zmienności zachodzą wyraźnie na siebie u obu tych gatunków.

3. Podano klucz do oznaczania gatunków z grupy *D. dilatata*, ich opisy, uwagi o nomenklaturze i najważniejsze synonimy oraz omówiono zmienność wewnątrzgatunkową w materiale z Polski.

4. Podano po raz pierwszy z Polski liczby chromosomów gatunków z grupy *D. dilatata*. Stwierdzono następujące liczby chromosomów: *D. carthusiana* $2n=164$, *D. dilatata* $2n=164$ i *D. assimilis* $2n=82$.

5. Na podstawie zrewidowanych materiałów zielnikowych wykonano mapki rozmieszczenia gatunków z grupy *D. dilatata* w Polsce oraz omówiono ich wymagania ekologiczne. Okazało się, że *D. assimilis* jest gatunkiem nierzadkim na naszym terenie, a liczne stanowiska podawane dotąd dla *D. dilatata* odnoszą się w rzeczywistości do *D. assimilis*. Wydaje się, że *D. assimilis* jest gatunkiem górskim z licznymi stanowiskami na niżu, natomiast *D. dilatata* jest gatunkiem niegórskim, tzn. występującym zarówno na niżu, jak i w górach, zwłaszcza w niższych położeniach, bez wyraźnego centrum występowania.

Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków, ul. Lubicz 46.

SUMMARY

The *Dryopteris dilatata* complex in Central Europe consists of three species, i.e. *D. carthusiana* (= *D. spinulosa*), *D. dilatata* and *D. assimilis*. The latter species has not been hitherto distinguished in Poland from the closely related *D. dilatata* s. str. and was reported from Poland by foreign authors only (Simon, Vida 1966). On the other hand, *D. dilatata* s.l. has been sometimes confused with *D. carthusiana* and with their hybrids. Thus, there are some incorrect determinations in our herbarium collections.

This paper is a result of taxonomical studies performed in 1971-1974 on the basis of Polish material on the taxa of the *D. dilatata* complex.

Material and methods. The studies were carried out on the basis of herbarium- and living material. About 1500 specimens from the herbaria of Polish botanical institutes, private collections and also the author's material have been examined. A list of herbaria and their abbreviations are given on p. 8-9.

Living plants collected from 25 localities, mostly from southern Poland, were transplanted and cultivated in an experimental field in Cracow during the four seasons mentioned above. Each year three to four leaves from cultivated specimens were collected and measurements of choosen characters were carried out; other ones were calculated on the basis of measurements of these characters. These same measurements were made also on the herbarium material.

The examined material belonging to three taxa was worked out graphically by means of frequency diagrams and characterized on the basis of extreme values of characters (min.-max.), of arithmetical means (M) with their error (m), of the standard deviation (σ), and of the coefficient of variability (V).

The measurements of spores were made on the acetolyzed material. The perispore morphology of *D. carthusiana*, *D. dilatata* and *D. assimilis* was examined with a scanning electron microscope (cf. Piękoś 1975). Karyological studies were carried out by using the method previously given by the author (Piękoś, Passakas 1973; Piękoś 1974).

The length of stomata was examined on live plants as well as on boiled herbarium material.

Analysis of taxonomical characters. In this chapter the variability of some morphological characters was discussed on the basis of herbarium- and living material and their taxonomical value as a possible criterion for the identification of species in the *D. dilatata* complex was assessed. Results of the author's studies were compared with the results of analogical studies made by other authors. The characters are discussed as follows:

A. Rhizome

The rhizome of *D. carthusiana* is nearly horizontal, sparsely scaly, with widely spaced leaves while that of *D. dilatata* and *D. assimilis* is usually erect or semi-erect, densely scaly, with closely arising leaves. *D. assimilis* occasionally has also a horizontal rhizome (Phot. 3.2).

B. Scales on petiole

D. carthusiana differs markedly from *D. dilatata* and *D. assimilis* in having small, reaching 9 mm in length, broadly ovate, obtuse or short acuminate, usually concolorous and pale scales (Phot. 4). In the other two species the scales are bigger reaching 15-20 mm in length. In *D. dilatata* dominate lanceolate, long acuminate scales. In *D. assimilis* the scales vary from lanceolate (ca. 60% of the examined specimens) to ovate ones. They are usually long acuminate or rarely short acuminate. The bicolorous scales, being dark brown or blackish in the central part and pale brown along the edges, were found in all investigated specimens of *D. dilatata*. In respect to scale colour the variation is greater in *D. assimilis* than in *D. dilatata*. *D. assimilis* has bicolorous scales, with a more or less dark median stripe extending often to the tip, or with a dark patch in the lower part of the scale. Five per cent of the 115 plants of *D. assimilis* have pale or redbrown concolorous scales.

The differences in density of scales on the petiole in three species are illustrated in Figure 1.

C. Leaf

The differences were observed in the length of leaves in three species mentioned. The leaves of *D. carthusiana* can reach up to 90 (100) cm while those of *D. dilatata* can attain 150 cm. In *D. assimilis* the length of mature leaves varies from 35-120 cm.

The ratio of the length of lamina to the length of petiole has been used sometimes as a diagnostic character for *D. carthusiana* (Hess, Landoldt, Hirzel 1967). The range of variation in this character is presented in Figure 2 and Table 1. The variation of this ratio in the leaves of one crown in one year was also observed; e.g. in cytologically examined specimen No. 12/70 of *D. assimilis* the ratio ranges from 1.47 to 1.98. Most commonly, however, the intraplant variability was rather small. Some specimens may show the variation in the means of their crowns in the consecutive years. This is illustrated by cytologically examined specimen No. 116/71 of *D. dilatata* in which the ratio of the length of lamina to the length of petiole ranged from 1.75 (in 1971) to 2.50 (in 1974).

The ratio of the length of lamina to its width is presented in Figure 3 and Table 1. All three species show a great variability in this character as well as in the position of the longest pinna (Photos. 1-3). The extent of variation in the length/width ratio is the greatest in *D. carthusiana*. In general, *D. carthusiana* has narrower fronds than either of the other two. The broad fronds in which the basal pinna is the longest can be found in *D. assimilis* more common than in *D. dilatata*.

The ratio of the length of proximal basicopic pinnule on basal pinna to the total length of pinna has been regarded by many authors as a key character for *D. assimilis* and *D. dilatata* (Clapham, Tutin, Warburg 1962, Heywood 1964, Simon, Vida 1966). The data obtained on the basis of Polish material is presented in Table 1 and the illustration of the variation is given in Figs. 4-5. It can be seen that the ranges of variation of both species overlap, but the arithmetical means of the character studied are markedly different. In the population of *D. assimilis*, the variation of this character was also observed.

Moreover, it was found that this character may vary to a greater or less degree in the leaves of one plant both in one year and in the consecutive years. Great intraplant variation may be illustrated by some selected plants of *D. assimilis* and *D. dilatata*. In one year, the specimen no. 120/71 of *D. dilatata* showed the range of variation in ratio of the length of basicopic pinnule to the length of pinna from 0.30 to 0.51; in the plant no. 12/70 of *D. assimilis* the ratio ranged from 0.44 to 0.61 in one year. In the plant no. 120/71 of *D. dilatata* the ratio varied from 0.41 (in 1971) to 0.28 (in 1974), and in the plant no. 11/70 of *D. assimilis* from 0.56 (in 1971) to 0.43 (in 1973).

The analysis of variation in the mentioned ratio shows that it is not always possible to distinguish *D. assimilis* from *D. dilatata* basing on this character only.

Considering the variation found in other studied characters, such as the ratio of the length of proximal basicopic pinnule to the proximal acroscopic one on basal pinna (Fig. 6, Table 1), as well as the shape of the median pinnae (Fig. 7B, Table 1), it is obvious that they cannot be accepted as a criterion for the identification of all specimens of *D. dilatata* and *D. assimilis*.

In *D. carthusiana* and *D. assimilis* the basal pinna has always the inferior basal pinnule longer than the adjacent one (1 to 14 mm in *D. carthusiana* and 3 to 20 mm in *D. assimilis*), while *D. dilatata* has the inferior basal pinnule shorter than the adjacent one (1 to 11 mm) in 24% of the investigated specimens, equal in the length in 2% of the investigated specimens or longer (1 to 13 mm) in 74% of the investigated specimens.

The colour of lamina has been used as one of the diagnostic character for *D. assimilis* and *D. dilatata* (Hess, Landoldt, Hirzel 1967). In the literature it was reported that the frond colour is yellow-green in *D. assimilis* and darker, olive-green in *D. dilatata*. The observations in the nature have indicated that it is generally true when both the species grow in similar habitat conditions. However, observations of the cultivated material have showed that the frond colour depends on age of leaf and to some extent it is influenced by light conditions.

D. Length of stomata

The results of measurements are presented in Table 2 and Figure 8. Although the ranges of variation in stomata length overlap in all three species, their arithmetical means differ distinctly. A comparison of the stomata length of *D. assimilis* and *D. dilatata* seems to show a correlation between the length of stomata and the ploidy level, as has been found in a number of other plant groups.

E. Glandularity of indusium and leaf

On the basis of Polish material the mentioned character was analysed and the results are presented in Table 3. Eglandularity of *D. carthusiana* has been emphasized in the literature as one of the diagnostic characters. In the material from Poland seventy per cent of the examined 206 plants of *D. carthusiana* have the glabrous indusia; thirty per cent have some indusia slightly glandular. Sporadically in the herbaria some specimens identified as *D. carthusiana* with numerous glands on the indusia were detected. These plants showing abortive spores have appeared to be the hybrids with *D. dilatata*. They have usually the lamina and the petiole distinctly glandular while those of typical *D. carthusiana* are glabrous or only slightly and infrequently glandular. All specimens examined of *D. dilatata* have the indusia densely glandular. In most cases their leaves are densely glandular; sparsely glandular are rare. *D. assimilis* is highly variable in respect to glandularity, both glabrous forms and those very densely glandular being found. The glandularity of the indusium and leaf seem to show

only a slight correlation, e.g. in *D. assimilis* the specimens with very densely glandular leaves and glabrous indusia may be found.

Most commonly a rather small intraplant variability was observed in respect to glandularity in a single plant both in one year and in the consecutive years. In one population the variation in glandularity may be great.

F. Internal secretory hairs in the intercellular spaces of the rhizome and petiole

They were studied by Widén et al. (1967, 1970). This character is illustrated in Figure 9, which shows an internal secretory hair in *D. dilatata*.

G. Spores

The results of measurements of spore size (including perispore) carried out on acetolized material are shown in Table 4. As it can be seen the size of spores is not useful as a criterion for the identification of species in the *D. dilatata* complex. On the other hand the colour of spores which was assessed basing on the colour code (Locquin 1957) allow to identify each of three mentioned species.

Perispore sculpture of species of *D. dilatata* complex was studied by the author in detail by means of the SEM and was already discussed (Piękoś 1975). In the present paper these studies were only supplemented. The scanning electronmicrographs are shown in Photos. 6 and 7. It should be pointed out that the perispore sculpture may be a reliable character for the identification of *D. dilatata* and *D. assimilis*.

G. Gametophyte

No marked differences in respect to the germination of spores and the gametophyte development in three studied species were observed. The stages of the development of gametophyte in *D. assimilis* are illustrated in Phot. 8.

The spores obtained from plants collected in the summer germinate in the high percentage in the next spring. For the spores obtained from plants preserved in the herbarium for two to four years the loss of the germination capacity was observed very clearly.

I. Chromosome number

There are reported for the first time from Poland the chromosome numbers of *D. carthusiana* and *D. dilatata*. As shown in Figure 10 the mentioned species have been found to be tetraploids ($2n=164$). In *D. assimilis* the chromosome number ($2n=82$) was reported previously (Piękoś, Passakas 1973). In present paper the next cytologically examined plants from the other localities were added. One of the cytologically examined plants has spores of the *D. dilatata* type, but its proximal basicopic pinnule on basal pinna is extremely long. The plant has been found to be tetraploid. The other plant showing not typical vegetative characters and spores of the *D. assimilis* type has been found to be diploid. It indicates that there is a correlation between the characters of spores and chromosome number.

The taxonomical status of the taxa in the *D. dilatata* complex is discussed in chapter V „Identification and classification”. On the basis of data from literature and the author's investigations the critical comments on the classification and identification of species of the *D. dilatata* complex are given.

D. carthusiana is clearly distinguished from *D. dilatata* and *D. assimilis* by its scales, frond dissection, eglandularity as well as by the colour of spores and their perispore sculpture. According to several authors (e.g. Nannfeldt 1966, Crabbe, Jermy, Walker 1970) the chromosome number as well as the

colour of spores and perispore sculpture are the most reliable characters for the identification of *D. dilatata* and *D. assimilis*. The investigations carried out on the basis of Polish material support this opinion. The colour of lamina, the shape of basal pinna and the scales may give further help in the determination. However, they cannot be the only base for the identification considering their rather a high variation. The length of stomata seems to provide a taxonomic character which may be useful for the identification of many herbarium specimens collected at a time when mature spore are not present.

As a result of the taxonomical study performed in the first part of the present paper the morphological descriptions and a key for the identification of the Polish species of the *D. dilatata* complex are presented. The variability within *D. carthusiana*, *D. dilatata* and *D. assimilis* is also discussed. There are photographs of specimens to supplement the descriptions. The nomenclature of *D. carthusiana*, *D. dilatata* and *D. assimilis* is also treated and the chromosome numbers are given.

The distribution of *D. carthusiana*, *D. dilatata* and *D. assimilis* in Poland was presented on the point maps (Figs. 12-14). Comments on the altitudinal distribution of each species (Fig. 11), and its habitat requirements are given. A full list of their localities is added on pp. 51-65.

The distribution of three mentioned species has been worked out on the basis of verified herbarium material only and the data from the literature were not taken into account. It has been stated that *D. carthusiana* is a very common species in the whole country. It is widely distributed both in the lowlands and in the mountains up to the lower montane zone, rarely at a higher altitude. According to the author, the records from the higher altitudes, e.g. in the Tatra Mts. at an altitude of 1644-2098 m above sea level (Kotula 1899-90), refer to *D. assimilis*.

D. carthusiana has a wide ecological scale. It grows on various soils and in numerous forest communities.

D. dilatata is a much rarer species than *D. carthusiana*. It occurs in the entire country of Poland but in rather dispersed localities. It is more common than was shown on the map (Fig. 13), which shows the results of the unequal collection of herbarium material from Poland. *D. dilatata* grows in the lowlands in various forest communities. In the Carpathians it occurs in the lower montane zone in *Dentario glandulosae-Fagetum*, *Piceetum tatricum abietetosum*, *Alnetum incanae* and in the upper montane zone in *Piceetum tatricum subnormale*, *P. tatricum normale* and *P. tatricum myrtilletosum*.

D. assimilis is very often encountered in the Carpathians and Sudets and seldom in the lowlands (Fig. 14). It occurs abundantly in both montane zones and it passes above the upper forest limit as the only species of the *D. dilatata* complex. It grows both on calcareous and non-calcareous substrata. It may be found in *Dentario glandulosae-Fagetum*, *Luzulo-Fagetum*, *Piceetum abietetosum* and especially in *Piceetum normale*, *P. myrtilletosum*, *P. subnormale* and exists also in *Pinetum mughi calcicolum*, *P. mughi silicicolum* as well as in *Pulmonario-Alnetum* in the East Carpathians. In the lowlands *D. assimilis* grows in dispersed localities, which are concentrated in the areas with a rich aggregation of mountain species.

D. dilatata was hitherto regarded as a mountain species in the lowlands of Poland. In the light of present investigations it seems that this statement refers to *D. assimilis*.

LITERATURA

- Alston A. H. G., 1957. Some new names in the British Flora. *Watsonia* 4(1):41.
- Ascherson P., Graebner P., 1896-1898. Synopsis der mitteleuropäischen Flora. 1. Leipzig, Verl. W. Engelmann, ss. XI, 416, 45.
- Atkinson L. R., 1973. The gametophyte and family relationships. [W:] Jermy A. C., Crabbe J. A., Thomas B. A. The phylogeny and classification of the ferns. *Bot. J. Linn. Soc.* 67, Suppl. 1:1-284.
- Benl G., Eschelmüller A., 1970. *Dryopteris dilatata* × *assimilis* in Bayern. *Ber. bayer. bot. Ges.* 42:185-188.
- Berdau F., 1890. Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. Warszawa, Kasa Mianowskiego, ss. IV, 827, 55.
- Bobrov A. G., 1974. *Dryopteris*. [W:] Flora jevropiejskoj czasti SSSR. 1. Leningrad, Izd. „Nauka”, ss. 404.
- Britton D. M., 1962. *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray in North America. *Rhodora* 64:207-211.
- Britton D. M., 1967. Diploid *Dryopteris dilatata* from Quebec. *Rhodora* 69:1-4.
- Britton D. M., 1968. The spores of four species of spinulose wood ferns (*Dryopteris*) in eastern North America. *Rhodora* 70:340-347.
- Britton D. M., 1972. Spore ornamentation in the *Dryopteris spinulosa* complex. *Can. J. Bot.* 50:1617-1621.
- Britton D. M., Widén C.-J., 1974. Chemotaxonomic studies on *Dryopteris* from Quebec and eastern North America. *Can. J. Bot.* 52:627-638.
- Celiński F., 1964. Rośliny naczyniowe Puszczy Bukowej pod Szczecinem. *Pr. Kom. Biol. PTPN* 29(2):1-189.
- Clapham A. R., Tutin T. G., Warburg E. F., 1962. Flora of the British Isles. 2. Ed. Cambridge, Univ. Press, ss. XLVIII, 1269.
- Crabbe J. A., Jermy A. C., Walker S., 1970. The distribution of *Dryopteris assimilis* S. Walker in Britain. *Watsonia* 8:3-15.
- Crane F. W., 1955. Comparative study of diploid and tetraploid spores of *Dryopteris dilatata* from Britain and Europe. *Watsonia* 3(3):168-169.
- Crane F. W., 1960. A key to American *Dryopteris* species based on characters of the perispore. *Am. Fern. J.* 50:270-275.
- Czubiński Z., 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. *Bad. fizjogr. nad Pol. zach.* 2(4):439-658.
- Domin K., 1942. Příspěvek k poznání českých forem a mišencu rodu *Dryopteris* ze sekce *Spinulosae*. *Věstník král. čes. spol. nauk. Tř. mat.-přir.* 1-24.

- Döpp W., Gätzi W., 1964. Der Bastard zwischen tetraploider und diploider *Dryopteris dilatata*. Ber. schweiz. bot. Ges. 74:45-53.
- Fiek E., 1881. Flora von Schlesien. Breslau, J. U. Kern's Verl., ss. 571.
- Flora na Narodna Republica Balgarija, 1963. 1. Sofija, Izd. Akad. Nauk, ss. 507.
- Flora polska, 1919. 1. Kraków, PAU, ss. 427.
- Flora SSSR, 1934. 1. Leningrad, Izd. Akad. Nauk SSSR, ss. 778.
- Fuchs H. P., 1958. Identification et validite du *Polypodium pterioides* Lamarck. Bull. Soc. Bot. France 105:338-33.
- Fuchs H. P., 1963. Nomenklatorische Liste der in Ungarn vorkommenden Gefäßkryptogamen. Acta Bot. Acad. Sc. Hung. 9 (1-2):11-20.
- Gätzi W., 1966. Zur Kenntnis von *Dryopteris assimilis* S. Walker. Ber. schweiz. bot. Ges. 76:146-156.
- Hegi G., 1965. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 1. München, C. Hanser Verl., ss. XXIV, 528.
- Hegnauer R., 1961. Über infraspezifische chemische Variabilität bei einigen Dryopteris-Arten. Pharmaceutica Acta Helvetiae 36:21-29.
- Hess H. E., Landoldt E., Hirzel R., 1967. Flora der Schweiz. 1. Basel und Stuttgart, Birkhäuser Verl., ss. 858.
- Heywood V. H., 1964. *Dryopteris*. [W:] Flora Europaea. 1. Cambridge, Univ. Press, ss. 20-22.
- Hoffmann G. F., 1795. Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch. 2. Erlangen, ss. 200.
- International Code of Botanical Nomenclature, 1972. Utrecht.
- Izdebski K., 1968. Rośliny górskie Roztocza na tle warunków siedliskowych. Ann. UMCS Sect. C, 22 (1967):267-287.
- Jalas J., Suominen J., 1972. Atlas Florae Europaeae. 1. *Pteridophyta*. Helsinki, ss. 121.
- Janchen E., 1964. Catalogus Florae Austriae. 1. Ergh. 2. Wien, Springer Verl., ss. 83.
- Janchen E., 1966. Catalogus Florae Austriae. 1. Ergh. 3. Wien, Springer Verl., ss. 84.
- Jasiewicz A., 1966. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich. Monogr. bot. 20 (1965):1-340.
- Jerry A. C., Crabbe J. A., Thomas B. A., 1973. The phylogeny and classification of the ferns. Bot. J. Linn. Soc. 67, Suppl. 1: 1-284.
- Karpowicz W., 1929. Badania nad rozwojem przedrośli oraz pierwszych liści sporofitu paproci krajowych (*Polypodiaceae*). Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, dz. B. ser. III, 28:1-41.
- Karpowicz W., 1960. Studium porównawcze nad krajowymi przedstawicielami gatunków rodzaju *Dryopteris* i *Thelypteris*. Acta Soc. Bot. Pol. 29 (2):175-198.
- Karpowicz W., 1972. Paprocie. Warszawa, PWN, ss. 168.
- Kornaś J., 1957. Rośliny naczyniowe Górców. Monogr. bot. 5:1-260.
- Kotula B., 1889-1890. Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach. Kraków, Nakł. Wydz. Mat.-Przyr. AU, ss. 512.
- Locquin M., 1957. Chromotaxia. Code mycologique et pédologique des couleurs. Paris, ss. 63+36 filtres.
- Luerssen Ch., 1889. Die Farnpflanzen oder Gefäßbündelkryptogamen (*Pteridophyta*). [W:] Rabenhorst L.: Kryptogamen-Flora von Deutschland. Aufl. 2. 3. Leipzig, E. Kummer, ss. XII, 909.
- Manton I., 1950. Problems of cytology and evolution in the *Pteridophyta*. Cambridge, Univ. Press, ss. 316.
- Mądrałski J., 1954. Atlas flory polskiej i ziem ościennych. 1(1). Warszawa—Wrocław, PWN.

- Melzer H., 1969. Neues zur Flora von Kärnten. Carinthia II (Mitt. Naturwiss. Ver. Kärnten) 159:181-190.
- Müller O. F., 1767. Flora Fridrichsdalina. 2. Argentorati, ss. 841.
- Müller O. F., 1777. Florae Danicae Iconum. 4 (12). Havniae.
- Nannfeldt J. A., 1966. *Dryopteris dilatata* och *Dr. assimilis* i Sverige. Botaniska Notiser 119 (2):136-152.
- Nardi E., 1976. *Dryopteris assimilis* S. Walker in Italia. Webbia 30 (2):457-478.
- Pawłowski B., 1925. Geobotaniczne stosunki Sądeczyzny. Prace Monogr. Kom. Fizjogr. PAU 1:1-342.
- Pawłowski B., 1956. Flora Tatr. 1. Warszawa, PWN, ss. 672.
- Perring F. H., Walters S. M., 1962. Atlas of the British flora. Edinburgh, London, New York, Toronto, Thomas Nelson and Sons LTD, ss. XXIV, 432.
- Piękoś H., 1974. Mieszaniec *Dryopteris assimilis* × *dilatata* w Polsce. Fragm. flor. geobot. 20 (3):333-338.
- Piękoś H., 1975. Perispore sculpture of *Dryopteris cristata* and those in the *D. dilatata* complex in Poland. Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. V. 23 (11):755-759.
- Piękoś-Mirkowa H., 1977. Notes on taxonomy and distribution of the *Dryopteris dilatata* complex in the Caucasus, Siberia and Far East. Acta Soc. Bot. Pol. 46(4):577-585.
- Piękoś H., Passakas T., 1973. The chromosome number in *Dryopteris assimilis* S. Walker from the West Bieszczady Range (East Carpathian Mts.). Fragm. flor. geobot. 19 (3):305-308.
- Rothmaler W., 1973. Exkursionsflora von Deutschland. 2. Berlin, Volk u. Wissen Volkseigener Verl., ss. 612.
- Sagorski E., Schneider G., 1891. Flora der Centralkarpathen. Leipzig, E. Kummer Verl., ss. 591.
- Schidlay E., 1966. *Dryopteris*. [W:] Flóra Slovenska. 2. Vyd. SAV, ss. 349.
- Simon T., Vida G., 1966. Neue Angaben zur Verbreitung der *Dryopteris assimilis*. S. Walker in Europa. Ann. Univ. Sc. Budap. Sect. Biol. 8:275-284.
- Soó R., 1964. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve. 1. Budapest, ss. 547.
- Sorsa P., 1964. Studies on the spore morphology of fennoscandian fern species. Ann. Bot. Fenn. 1 (3):179-201.
- Sorsa A., Widén C.-J., 1968. The *Dryopteris spinulosa* complex in Finland. A cytological and chromatographical study of some hybrids. Hereditas 60:273-293.
- Stafleu F. A., 1974. Index Herbariorum. 1. Ed. 6. Regnum vegetabile 92:1-397.
- Szafer W., 1930. Element górski we florze niżu polskiego. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU Dział B 69 (3):1-112.
- Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1924. Rośliny polskie. Lwów, Książnica-Atlas, ss. XXXII, 736.
- Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1976. Rośliny polskie. Warszawa, PWN, ss. XXVIII, 1020.
- Tryon R., Britton D. M., 1966. A study of variation in the cytotypes of *Dryopteris spinulosa*. Rhodora 68:59-92.
- Vida G., 1972. Cytotaxonomy and genome analysis of the european ferns. Symp. Biol. Hung. 12:51-60.
- Villars D., 1786. Histoire des plantes de Dauphiné. 1. Grenoble, ss. 292.
- Wagner W. H. Jr., 1974. Pteridology 1947 — 1972. 25 years of botany. Ann. Missouri Bot. Gard. 61 (1):86-111.
- Wagner W. H. Jr., Chen K. L., 1965. Abortion of spores and sporangia as a tool in the detection of *Dryopteris* hybrids. Am. Fern J. 55:9-29.

- Walker S., 1955. Cytogenetic studies in the *Dryopteris spinulosa* complex. I. *Watsonia* 3:193-209.
- Walker S., 1959. Cytotaxonomic studies of some American species of *Dryopteris*. *Am. Fern J.* 49:104-112.
- Walker S., 1961. Cytogenetic studies in the *Dryopteris spinulosa* complex. II. *Am. J. Bot.* 48 (7):607-614.
- Walker S., Jermy A. C., 1964. *Dryopteris assimilis* S. Walker in Britain. *Brit. Fern Gaz.* 9:137-140.
- Widén C.-J., 1969. Chemotaxonomic investigations on Finnish *Dryopteris* species and related North American taxa. *Ann. Acad. Sci. Fenn. A IV*, 143:1-19.
- Widén C.-J., Britton D. M., 1969. A chromatographic and cytological study of *Dryopteris dilatata* in eastern North America. *Can. J. Bot.* 47: 1337-1344.
- Widén C.-J., Britton D. M., 1971. A chromatographic and cytological study of *Dryopteris dilatata* in North America and eastern Asia. *Can. J. Bot.* 49(2): 247-258.
- Widén C.-J., Sorsa V., 1966. A chromatographic and cytological study of the *Dryopteris spinulosa* complex in Finland. *Hereditas* 56: 377-381.
- Widén C.-J., Sorsa V., 1969. On the intraspecific variability of *Dryopteris assimilis* S. Walker and *Dryopteris spinulosa* Watt. A chromatographic and cytological study. *Hereditas* 63: 1-13.
- Widén C.-J., Sarvela J., Ahti T., 1967. The *Dryopteris spinulosa* complex in Finland. *Acta Bot. Fenn.* 77: 3-24.
- Widén C.-J., Sorsa V., Sarvela J., 1970. *Dryopteris dilatata* s. lat. in Europe and the Island of Madeira. A chromatographic and cytological study. *Acta Bot. Fenn.* 91: 1-30.
- Wieffering J. H., Fikenscher L. H., Hegnauer R., 1965. Chemotaxonomische Untersuchungen mit *Dryopteris*-Arten 6. *Dryopteris spinulosa* Komplex. *Pharm. Weekblad* 100: 737-754.
- Woynar H., 1918. Betrachtungen über *Polypodium austriacum* Jacq. *Oesterr. bot. Ztschr.* 67: 267-275.
- Zapałowicz H., 1880. Roślinność Babiej Góry pod względem geograficzno-botanicznym. *Spraw. Kom. Fizjogr. Au* 14:79-250.
- Zarzycki K., 1964. Biological and ecological studies in Carpathian Beechwood. *Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II*, 12(1): 15-21.
- Zarzycki K., 1965. Lasy Bieszczadów Zachodnich. *Acta Agrar. et Silv. Ser. Leśna* 3: 3-132.