· MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. LVIII, 1980

ANTONI JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI

ZESPOŁY LEŚNE WZGÓRZ DYLEWSKICH

Forest associations of Wzgórza Dylewskie
(north-eastern Poland)

WARSZAWA

Wydano z pomocą finansową
Polskiej Akademii Nauk

KOMITET REDAKCYJNY

Z. Podbielkowski (Warszawa), K. Rostański (Katowice)
A. Gajewska (Warszawa)

RADA REDAKCYJNA

W. Matuszkiewicz (Warszawa), R. Olaczek (Łódź)
Z. Podbielkowski (Warszawa), A. Gajewska (Warszawa)

ADRES REDAKCJI: Al. Ujazdowskie 4; 00-478 Warszawa

© Copyright by Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980

ISBN 83-01-01152-1

ISSN 0077-0655

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE — WARSZAWA

Nakład 350+90 egz. Wydanie I. Ark. wyd. 20,50. Ark. druk. 12,00+9 wklejek. Papier druk. sat. kl. III, 80 g, 70×100 cm. Oddano do składania w styczniu 1979 r. Podpisano do druku w lipcu 1980 r. Druk ukończono w sierpniu 1980 r. Zam. nr 652-79.
Cena zł 65.— B-7

Zakład Graficzny Poczty i Telekomunikacji Wrocław, ul. Krasieńskiego 5

SPIS TREŚCI

Wstęp	5
I. Metody badań	7
II. Ogólna charakterystyka fizjograficzna terenu	8
a. Położenie i granice	8
b. Podłoże geologiczne i ukształtowanie powierzchni	9
c. Gleby	10
d. Hydrografia	13
e. Klimat	14
f. Holoceńska historia szaty leśnej Wzgórz Dylewskich i wpływ czło- wieka na jej aktualny stan	18
g. Ogólna charakterystyka szaty roślinnej	22
III. Przegląd i charakterystyka zbiorowisk	26
a. Uwagi dotyczące przyjętej systematyki	26
b. Klasyfikacja zidentyfikowanych zespołów	28
c. Szczegółowy przegląd wyróżnionych zespołów	29
<i>Salici-Franguletum</i> (Malc. 1929) R. Tx. 1937	29
<i>Carici elongatae-Alnetum</i> (Koch 1926) Tx. et Bodeaux 1955	32
<i>Circae-Alnetum</i> Oberd. 1953	37
<i>Alnetum boreale</i> Oberd. 1953	46
<i>Geranio-Petasitetum hybridi</i> Oberd. 1957	53
<i>Tilio-Carpinetum</i> Traczyk 1962	57
A. <i>Tilio-Carpinetum corydaletosum</i>	58
B. <i>Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae</i>	73
C. <i>Tilio-Carpinetum lathyretosum verni</i>	78
D. <i>Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae</i>	93
E. <i>Tilio-Carpinetum calamagrostietosum arundinaceae</i>	99
<i>Melico-Fagetum</i> Knapp 1942	106
A. <i>Melico-Fagetum mercurialetosum perennis</i>	107
B. <i>Melico-Fagetum typicum</i>	114
C. <i>Melico-Fagetum festucetosum silvaticae</i>	123
<i>Trientali-Fagetum</i> R. Tx. 1960	127
<i>Fago-Quercetum petraeae</i> R. Tx. 1955	135
<i>Sphagno girgensohni-Piceetum</i> Pol. 1962	143
<i>Quercu-Piceetum</i> Mat. (1952) 1955	144
<i>Sambuco racemosi-Piceetum</i> ass. nova	151
IV. Amplituda ekologiczna i wartość wyróżniająca gatunków z ważniejszych grup syngenetycznych	163
V. Rola gatunków drzewiastych w wyróżnionych zespołach	169

VI. Tendencje rozwojowe wyróżnionych zespołów	172
VII. Problemy ochrony przyrody	176
VIII. Zestawienie wyników badań	178
Summary	182
Literatura	185

WSTĘP

Wzgórza Dylewskie, stanowiące północną część Garbu Lubawskiego, są terenem badawczym z różnych względów niezmiernie interesującym. Od krain sąsiednich wyróżniają się one nie tylko wysokością względną (Góra Dylewska — 312 m n.p.m.) i bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu, lecz także stosunkami klimatycznymi i edaficznymi oraz hydrografią, a szczególnie szatą roślinną i jej historią.

W szacie roślinnej Polski północno-wschodniej badany teren tworzy wyraźnie zaznaczającą się wyspę zwartego występowania lasów liściastych i mieszanych oraz świerkowych borów mieszanych, położoną na wschodnim skraju zasięgu buka i jaworu, a sąsiadującą z północnym zasięgiem świerka. Liczne stanowiska posiada tam również *Alnus incana*, a często występuje *Sambucus racemosa* i *Ulmus scabra*. Taki skład drzewostanów i podszycia na niżu jest spotykany nieczęsto nie tylko w Polsce, lecz nawet w Europie. Spodziewano się, że znajdzie to swoje odbicie także w składzie gatunkowym roślinności zielonej rozwijających się tam zbiorowisk leśnych.

Powyższe spostrzeżenia skłoniły mnie do podjęcia na terenie Wzgórz Dylewskich kompleksowych badań fitosocjologiczno-ekologicznych i florystycznych. Obserwacje florystyczne, rozpoczęte w 1966 roku, są kontynuowane i będą opublikowane w oddzielnej pracy.

W wyniku badań fitosocjologicznych starano się:

1) ustalić pozycję systematyczną tamtejszych lasów grabowo-lipowo-bukowych zgodnie z koncepcją T r a c z y k a (1962), dotyczącą geograficznego zróżnicowania grądów Polski;

2) określić stanowisko systematyczne dylewskich świerkowych borów mieszanych i lasów lęgowych z olszą szarą (*Alnus incana*);

3) zbadać rolę oraz amplitudę ekologiczną buka i innych lasotwórczych gatunków drzewiastych na terenie Wzgórz Dylewskich;

4) wykorzystując kontaktowe wykształcanie się na badanym terenie lasów grądowych i buczyny pomorskiej, ustalić lokalną wartość wyróżniającą gatunków charakterystycznych dla tych zbiorowisk;

5) prześledzić sukcesję zespołów leśnych.

Głównym celem badań glebowych było ustalenie wzajemnej korelacji między podłożem a szatą roślinną.

Zbiorowiska leśne Wzgórz Dylewskich nie były dotychczas opracowywane kompleksowo pod względem fitosocjologicznym. Fragmentaryczne

Mapa sytuacyjna Wzgórz Dylewskich
 Situation plan of Wzgórza Dylewskie

badania tego typu prowadzili tam jedynie Steffen (1931) i Tokarz (1971, 1976). Praca niniejsza jest więc pierwszym monograficznym opracowaniem zespołów leśnych Wzgórz Dylewskich.

Panu Prof. dr hab. B. Polakowskiemu, promotorowi tej pracy, pragnę najserdeczniej podziękować za życzliwą i wszechstronną pomoc w czasie prowadzenia badań oraz opracowywania uzyskanych wyników. Za wiele cennych wskazówek, których mi nie szczędzono, dziękuję recenzentom P. Prof. dr hab. T. Sulmie i Prof. dr hab. K. Kępczyńskiemu oraz Kolegom: Dr T. Korniakowi, Dr J. Dziedzicowi i Dr L. Olesińskiemu. Panu Prof. dr Hjalmarowi Uggli dziękuję za szereg wyjaśnień dotyczących badań glebowych i klasyfikacji gleb leśnych. Pani Inż. E. Polakowskiej dziękuję za fachową pomoc w czasie wykonywania analiz glebowych. Panu Mgr inż. J. Łuniewskiemu dziękuję za wszelką pomoc w czasie badań terenowych. Mojej żonie Małgorzacie Jutrzenka-Trzebiatowskiej i Pani J. Kuklińskiej dziękuję za staranne wykonanie rysunków.

Panu Prof. dr hab. Z. Podbielkowskiemu dziękuję bardzo za wiele cennych rad i wskazówek redakcyjnych, które w sposób istotny poprawiły jasność treści i pozwoliły wyeliminować drobne usterki metodyczne.

I. METODY BADAŃ

Terenowe prace badawcze w lasach Wzgórz Dylewskich prowadzono głównie w latach 1966-1969. W późniejszym okresie — do roku 1975 — dokonano jedynie niezbędnych uzupełnień w materiale zdjęciowym. W sumie wykonano w tym czasie 363 zdjęcia fitosocjologiczne, z których 292 zestawiono w tabele charakteryzujące zidentyfikowane zespoły. Zdjęcia nie umieszczone w tabelach przedstawiały najczęściej zbiorowiska o charakterze przejściowym, a w kilku przypadkach prezentowały płaty lasów zniekształconych w wyniku nieprawidłowej gospodarki leśnej. Wykorzystano je jako materiał pomocniczy do poszerzenia analizy wyróżnionych jednostek fitosocjologicznych, a także przy ustalaniu kierunków rozwojowych lasów dylewskich.

W czasie badań terenowych i kameralnego opracowywania materiału zdjęciowego, posługiwano się powszechnie przyjętymi metodami Braun-Blanqueta (Pawłowski 1972).

W celu przedstawienia pełnego obrazu zbiorowisk łęgowych oraz żywnych podzespołów lasów grądowych i buczyny pomorskiej, charakteryzujących się wybitną zmiennością struktury runa w ciągu sezonu wegetacyjnego, sporządzono w nich dwukrotne spisy gatunków. Zdjęcia w ten sposób wykonane oznaczono dwiema datami.

Szczegółowej lokalizacji zdjęć dokonano na podstawie mapy przeglądowej siedlisk byłego nadleśnictwa Grunwald z 1965 roku (str. 6).

Nachylenie zboczy mierzono za pomocą kątomierza z ruchomą wskazówką i ciężarkiem.

W celu określenia roli poszczególnych grup syngenetycznych gatunków w zbiorowiskach leśnych badanego terenu, obliczono ich wartość systema-

tyczną (D) metodą Tüxena i Ellenberga (Pawłowski 1972). Dla wielu z badanych zbiorowisk wartości te podano w treści niniejszej pracy.

W celu zbadania dynamiki rozwojowej wiodących gatunków drzewiastych i określenia ich roli w poszczególnych zbiorowiskach opracowano na 20 powierzchniach strukturę biologiczną drzewostanu metodą Paczowskiego (1928). Średnicę drzew, na wysokości 130 cm od ziemi, mierzono za pomocą metalowej klupy używanej w leśnictwie. Pomiarów w każdym przypadku dokonywano na powierzchniach zdjęć przedstawiających przeciętne stosunki danego zespołu. Otrzymane wyniki przedstawiono w wykresach, w których przyjęto podział na pięciocentymetrowe klasy grubości.

Dla lepszego zobrazowania rzeczywistego udziału gatunków drzewiastych w badanych zbiorowiskach obliczono ich współczynniki pokrycia (Pawłowski 1972).

Nazwy gatunków roślin naczyniowych podano według Szafera, Kulczyńskiego, Pawłowskiego (1967), mchów — według Szafra (1957, 1961) wątrobowców — według Szwejkowskiego (1958).

Charakterystyka ekologiczna wyróżnionych zespołów roślinnych została w głównej mierze oparta na badaniach glebowych. Uzupełniono ją opracowaniem niektórych czynników topograficznych, hydrograficznych i klimatycznych. W celu scharakteryzowania stosunków glebowych wykonano 28 głębokich odkrywek w płatach typowych dla poszczególnych jednostek fitosocjologicznych. Próbkę do analiz glebowych pobrano z wszystkich profili. Celem przeprowadzonych badań laboratoryjnych było określenie najważniejszych fizycznych i chemicznych właściwości gleb. Obejmowały one: analizę składu mechanicznego metodą Cassagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego; oznaczanie kwasowości czynnej ($\text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$) i wymiennej (pH_{KCl}) metodą elektrometryczną pehametrem produkcji krajowej; zbadanie procentowej zawartości materii organicznej i węgla metodą Tiurina; oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahla; określenie zawartości przyswajalnego fosforu (P_2O_5) i potasu (K_2O) metodą Egnera w modyfikacji Riehma. Analizy wykonano w pracowni ekologicznej Zakładu Botaniki Instytutu Biologii Roślin.

Charakterystykę i typologię badanych gleb uzgodniono z II opracowaniem klasyfikacji gleb leśnych PTG (Królikowski 1969) i klasyfikacją Uggli (1965). Zastosowano także zaproponowany przez Ugglę (1965) sposób znakowania schematycznych rysunków profili glebowych.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA TERENU

a. POŁOŻENIE I GRANICE

Obszar Wzgórz Dylewskich zajmuje południowo-zachodnią część województwa olsztyńskiego. Jego granice orientacyjnie wyznacza linia łącząca miasta Ostróda i Lubawa oraz miejscowości: Dąbrówno, Grunwald, Rych-

nowo i Szyldak. W do niedawna aktualnym podziale administracyjno-leśnym badane lasy stanowiły obszar nadleśnictwa Grunwald. Jego powierzchnia, według stanu z dnia 1 X 1965 roku, wynosiła 5368 ha. Obecnie wchodzi one w skład nadleśnictwa Olsztynek.

b. PODŁOŻE GEOLOGICZNE I UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Dzisiejsza budowa morfologiczna Wzgórz Dylewskich i krain z nimi sąsiadujących jest w głównej mierze wynikiem akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. Zasadnicze rysy tego terenu kształtowały się w stadiale poznańskim zlodowacenia bałtyckiego (G a l o n 1961, 1972) (ryc. 1).

Na kształtowanie się aktualnej rzeźby w określony sposób wpłynęło tak-

Ryc. 1. Budowa morfologiczna Wzgórz Dylewskich i krain sąsiednich (według G a l o n a 1953, 1972)

Fig. 1. Morphological structure of Wzgórz Dylewskie and neighbor regions (after G a l o n 1953, 1972)

że podłoże geologiczne. Zdaniem Kondrackiego (1965) badany teren stanowił wypiętrzenie podłoża trzeciorzędowego, przykryte szczątkami starszych zlodowaceń i dlatego oparł się naporowi mas lodowca, który w tym miejscu rozdzielił się na dwa loby: wiślański i mazurski. Koncentracja olbrzymich zwałów materiału morenowego, w wyniku akumulacji czołowej i zwarcia się spiętrzonych moren wytworzonych na bokach obu jeziorów lodowcowych, doprowadziła do powstania wyraźnie zaznaczającego się zespołu wzgórz.

Punktem kulminacyjnym tego terenu jest Góra Dylewska (312 m n.p.m.), która jest jednocześnie najwyższym wyniesieniem w Polsce północno-wschodniej. Niewiele jej ustępują wyniesienia położone nieco na wschód, a nazywane przez miejscową ludność Górą Bukową (287 m n.p.m.) i Górą Francuską (283 m n.p.m.).

W całości centralna część Wzgórz Dylewskich tworzy rozległą kopułę dość łagodnie opadającą w kierunku zachodnim, a silnie zerodowaną od strony wschodniej. Przedłuża się ona w postaci przerywanego rynnami grzbietu w kierunku północnym, w okolice Ostródy, oraz w kierunku południowo-wschodnim, aż do Nidzicy, tworząc morenę wypiętrzoną (Kondracki 1952), zawierającą w głębi ily trzeciorzędowe i utwory plejstoceny (Galon 1972). Powierzchniowo zalega gruba warstwa gliny zwałowej, warstwowanej często piaskami lub innymi utworami. Ten stosunkowo słabo zwarty materiał ulegał w okresie postglacjalnym przemieszczaniu i sortowaniu przez wody spływające z Wzgórz Dylewskich. Duże głazy narzutowe pozostawały na miejscu i tworzyły na łagodnych zboczach i dnie wąwozów rumowiska skalne, jeszcze do niedawna eksploatowane. Materiały drobniejsze, osadzając się w niższych partiach Wzgórz Dylewskich, tworzyły równiny denudacyjne, pokryte najczęściej utworami pyłowymi, rzadziej — piaskami i żwirami.

Obwodowe partie badanego terenu pokrywają osady moreny dennej, przedstawiające młodoglacjalny krajobraz — pagórkowaty, pełen różnorodnych form martwego lodu, takich jak rynnny subglacjalne z jeziorami czy porozrzucane między pagórkami małe jeziorka wytopiskowe.

Pod względem geomorfologicznym Wzgórz Dylewskie stanowią północną część Garbu Lubawskiego, traktowanego w aktualnym podziale fizyczno-geograficznym Polski (Kondracki 1965) jako oddzielny mezo-region.

c. GLEBY

Celem przeprowadzonych badań glebowych, w powiązaniu z identyfikowanymi zespołami roślinnymi i ich niższymi jednostkami taksonomicznymi, było ustalenie rzeczywistej zmienności i różnicowania pokrywy glebowej pod badanymi lasami, a także określenie wzajemnych korelacji między szatą roślinną i podłożem.

Z przeprowadzonej analizy składu mechanicznego wynika, że skałę

macierzystą, względnie podścielającą tych gleb stanowią najczęściej plejstocenske gliny zwałowe, utwory pyłowe oraz piaski zwałowe i wodnolodowcowe, a tylko niekiedy holocenske torfy i osady dyluwialno-aluwialne.

Na badanym terenie tworzą one przeważnie utwory pokrywowe dwuczłonowe. W wyższych położeniach są to z zasady piaski gliniaste na glinie, a u podnóży zboczy i na dnie wąwozów — utwory pyłowe na glinie zwałowej lub piaskach gliniastych. Utwory całkowite spotyka się tam dość rzadko. P i a ś c i k i W o c ł a w e k (1968) tłumaczą powyższe fakty działaniem różnorodnych procesów geologicznych w warunkach środowiska peryglacialnego. Takie tłumaczenie uzasadnia większa zawartość frakcji pyłu i wyraźne spiaszczenie w powierzchniowych poziomach wielu profili, a także brak węgla wapnia oraz na ogół kwaśny lub słabo kwaśny odczyn badanych gleb. Omawiana pokrywa glebowa, wylugowana powierzchniowo w okresie peryglacialnym, ulegała w późniejszym czasie stopniowej metamorfozie pod wpływem sprzężonego działania wody, procesów glebotwórczych i innych czynników.

Tamtejsze warunki klimatyczne i szata roślinna szczególnie sprzyjać musiały procesom brunatnienia, gdyż gleby brunatne najczęściej zalegają pod badanymi lasami, a także przeważają wśród gleb użytkowanych rolniczo na terenie Wzgórz Dylewskich (P i a ś c i k, W o c ł a w e k 1964, 1968; U g g l a i in. 1964). Na przemian z nimi dość często występują gleby płowe.

W specyficznych warunkach topograficznych, gdzie stosunki wodne kształtują się dość zmiennie albo wręcz niekorzystnie, w zależności od podłoża powstały gleby szarobrunatne, opadowoglejowe lub gruntówoglejowe. Rozrzucone po całym terenie większe zagłębienia wytopiskowe wypełnione są różnymi glebami pobagiennymi.

Na peryferiach Wzgórz Dylewskich, najczęściej w sąsiedztwie rzeczek lub jezior, wykształciły się nieduże kompleksy gleb torfowych torfowisk niskich i przejściowych, a gdzieniegdzie — nawet bardzo żyzne mady brunatne i czarnoziemne.

Rozmieszczenie gleb na terenie Wzgórz Dylewskich w układzie pionowym przedstawia się następująco.

Wierzchołkowe partie silnie zerodowanych zboczy Góry Dylewskiej zajmują na ogół gleby płowe, wytworzone zazwyczaj z piasków gliniastych na glinie, a niekiedy wyłącznie z gliny zwałowej. Stanowią one odpowiednie siedlisko dla zbiorowisk leśnych niezbyt wymagających, takich jak kwaśna dąbrowa (*Fago-Quercetum*), czy kwaśna buczyna (*Trientali-Fagetum*). Niejednokrotnie są one także porośnięte przez najuboższe postacie typowej buczyny pomorskiej (np. *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*) i tego typu lasy grądowe (*Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*).

Na ocienionych, północnych zboczach i dnie głębokich wąwozów wytworzyły się dość próchniczne gleby brunatne kwaśne. Powstały one z utworu pyłowego na glinie, a porośnięte są prawie zawsze żyzną buczyną pomorską (*Melico-Fagetum mercurialetosum*).

Pozostałe zbocza Góry Dylewskiej i płaskie powierzchnie terasów pokrywają wylugowane gleby brunatne. Na badanym terenie występują one przeważnie jako gleby całkowite, wytworzone z gliny zwałowej i stanowią dogodnie siedlisko dla różnych postaci mezotroficznych buczyny pomorskiej. Na stromych pochyłościach o ekspozycji południowej żywią także ubogi podzespół buczyny — *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*.

Pagórkowate tereny niżej położone odznaczają się większym zróżnicowaniem pokrywy glebowej. Ich łagodne zbocza i wierzchowiny pokryte są najczęściej glebą brunatną kwaśną. W jej kompleksie występuje niekiedy g'leba brunatna wylugowana, względnie gleba płowa. Jeżeli wspomniane utwory glebowe powstały z materiału zwięzlejszego (np. z gliny zwałowej lub utworów pyłowych), to porastają je zazwyczaj lasy grądowe. Jeżeli natomiast wytworzyły się z piasków gliniastych lub piasków luźnych, to zajmują je przeważnie różne postacie świerkowego boru mieszanego (*Sam-buco racemosi-Piceetum*), a jedynie w uroczysku Klonowo — turzycowy grąd wysoki (*Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*).

W uroczysku Klonowo i niektórych kompleksach leśnictwa Durąg, na terasach północnych zboczy i u ich podnóży, zalegają nieraz gleby brunatne właściwe, na przemian z glebami opadowoglejowymi. We wszystkich badanych przypadkach powstały one z głębokich utworów pyłowych, podścielonych gliną zwałową. Są to gleby bardzo produktywne, porośnięte zawsze żyznymi postaciami lasów grądowych, a najczęściej przez *Tilio-Carpinetum corydaletosum*.

Na terenie uroczyska Dylewo, gdzie poszczególne grzbiety pagórków przedzielone są wąwozami lub szerokimi parowami, na dnie tych ostatnich gleby tworzyły się w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, co ujawnia się stałym ich oglejeniem redukcyjnym.

W tych szczególnych warunkach topograficzno-siedliskowych, tam gdzie poziom wody gruntowej kształtuje się stale dość wysoko, a okresami zaznacza się nawet powierzchniowa stagnacja wody, występują gleby torfowe z niezbyt głębokim pokładem torfu mszystego, porośnięte przez fragmentarycznie wykształcającą się na badanym terenie świerczynę na torfie (*Sphagno girgensohni-Piceetum*). W miejscach, gdzie stosunki wodne kształtowały się nieco korzystniej, wytworzyła się gleba gruntowoglejowa, będąca naturalnym siedliskiem dla wilgotnego boru świerkowego (*Quercu-Piceetum*) albo gleba torfowo-glejowa, porośnięta niekiedy łęgim olszowo-jesionowym (*Circae-Alnetum*).

W parowach, w których podłoże zbudowane jest ze stale namulanej gliny zwałowej lub z utworów pyłowych, powstała głęboko próchniczna gleba szarobrunatna, względnie nieco zakwaszona gleba brunatna. Glebę szarobrunatną najczęściej zajmuje łęg olszowo-jesionowy, a wspomnianą glebę brunatną — niski grąd czyścowy (*Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*).

Z powstałych na terenie Wzgórz Dylewskich gleb bagiennych i poba-

giennych zbiorowiska leśne i zaroślowe zajmują jedynie gleby torfowe wytworzone z torfu torfowisk niskich i przejściowych. Na torfowiskach niskich — olsowych występuje przeważnie olszyna typowa (*Carici elongatae-Alnetum*), a gleby torfowisk przejściowych porastają nieraz zarośla łozowe (*Salici-Franguletum*).

W pradolinie rzeczki Grabiczki, na odcinku od Gierzwałdu do Durąga, w wielu miejscach zalega bardzo żyzna mada rzeczna czarnoziemna, która stanowi optymalne siedlisko dla łęgu borealnego (*Alnetum boreale*) z panującą w drzewostanie olszą szarą.

Na dnie przełomu rzeczki Dylewki, koło Durąga, wykształciła się mada rzeczna brunatna. Jest to utwór powstały z piasku luźnego w wyniku jednoczesnego działania w przeszłości zarówno procesów dyluwialnych, jak i aluwialnych. Żywi ona dość swoiste zbiorowisko żyznego lasu gładowego z koryczkami (*Tilio-Carpinetum corydaletosum* w wariacie z *Geranium phaeum*).

d. HYDROGRAFIA

Stosunki wodne Wzgórz Dylewskich są konsekwencją ich historii i aktualnej rzeźby. Dość duże różnice wzniesień oraz stosunkowo luźny materiał morenowy sprzyjały tworzeniu się w okresie polodowcowym dużej ilości głębokich rynien i wąwozów. Bogata rzeźba nie sprzyjała natomiast powstawaniu na tym obszarze zbiorników wodnych. Do dzisiaj zachowało się zaledwie kilka większych jezior umiejscowionych w partiach peryferycznych badanego terenu.

Największe z nich to położone w południowej części Wzgórz Dylewskich jeziora Dąbrowa Wielka (631,63 ha) i Dąbrowa Mała (195,54 ha), między którymi na przesmyku ułokowało się Dąbrówno — jedno z najstarszych miast na Pojezierzu Mazurskim.

W tej części badanego obszaru znajdują się jeszcze trzy inne zbiorniki wodne odznaczające się niedużymi powierzchniami. Są to: jezioro Dąbrówno (42,92 ha), przylegające od strony północno-wschodniej do miejscowości Samin, oraz jeziora Żynowiec i Straszewo, położone nieco na wschód od miejscowości Leszcz.

Największe zbiorniki wodne w części północnej Wzgórz Dylewskich, a więc jeziora: Durąskie (20,02 ha) i Lichtajny (51,0 ha) ułożone są szeregowo, gdyż wypełniają głęboczki wyraźnie zaznaczonej rynny polodowcowej. Oprócz wymienionych, na badanym terenie zachowało się do dzisiaj jeszcze kilka małych jeziorek wytopiskowych.

Prawdziwą ozdobą badanego terenu jest pięknie wkomponowane we wschodnie zbocza Góry Dylewskiej, małe jeziorko Salk, nazywane przez miejscową ludność jeziorem Francuskim. Jeszcze w drugiej połowie ubiegłego stulecia miało ono znacznie większe wymiary, gdyż sięgało aż w okolice Pietrzwałdu. Systematyczne odwadnianie spowodowało zmniejszenie

się jego powierzchni do około 5,0 ha. Na osuszonym terenie powstały łąki i fragmenty niezbyt typowego boru bagiennego. W obrzeżeniu jeziora, od strony północno-wschodniej, znajduje się wąski pas torfowiska przejściowego, porośniętego przez zbiorowiska klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, gdzie do dzisiaj zachowało się stanowisko reliktovej wierzby borówkolistnej (*Salix myrtilloides* L.). W celu zabezpieczenia tego gatunku, a także dla ochrony fragmentu typowo rozwijającej się na wschodnich zboczach Wzgórz Dylewskich buczyny pomorskiej (*Melico-Fagetum*), jezioro i zbiorowiska rozwijające się w jego obrzeżeniu objęto ochroną prawną jako Rezerwat „Jezioro Francuskie” (P o l a k o w s k i 1968).

Drugim ważnym czynnikiem regulującym stosunki wodne tego terenu jest bogata sieć strumyków i rzeczek wypływających promieniście z różnych miejsc partii kulminacyjnej, a wykorzystujących głębokie rynny polodowcowe.

W przeszłości, kiedy Młyńska Wkra, biorąca swój początek z południowych zboczy Góry Dylewskiej, stanowiła górny bieg Wkry, część południowa badanego terenu należała do dorzecza Bugu (B u c z e k 1936). Od czasu kiedy Młyńską Wkrę skierowano do rzeki Wel, cały badany obszar leży w granicach dorzecza Drwęcy i jest dla niej węzłem wodnym (K o s t r o w i c k i 1961).

Z terenu Wzgórz Dylewskich wypływają, rozpoczynając od górnego biegu Drwęcy, następujące jej lewobrzeżne dopływy: Grabiczka ze strumykiem Dylewką, Pobórska Struga, Gizela, Elszka z Sandelą oraz, od południa, rzeka Wel z dopływami: Młyńską Wkrą, Strugą i Prątnicą.

Reasumując, hydrografię tego terenu należy określić jako niezbyt korzystną dla gospodarki leśnej. Mniejsza niż przeciętnie na sąsiednim Pojezierzu Mazurskim liczba zbiorników wodnych, dość znaczne zróżnicowanie orograficzne terenu, gęsta sieć strumyków i rzeczek powodują zbyt szybkie, i często nadmierne, osuszanie gleby w okresie lata. W czasie okresów wegetacyjnych skrajnie suchych jak np. 1969, który wyróżnia się sumą rocznych opadów wynoszącą 227 mm, jest to przyczyną wędnięcia i wysychania runa leśnego nawet w zbiorowiskach rozwijających się na glebach żyznych i bagiennych, a w drzewostanach świerkowych ułatwia atak kornika. W tej sytuacji kontynuowane do dzisiaj systematyczne odwadnianie, zaledwie tu i ówdzie zachowanych jeszcze zbiorników retencyjnych, jest obecnie zabiegiem niczym nie uzasadnionym. Już w najbliższej przyszłości może to spowodować ogromne straty i to nie tylko w drzewostanach świerkowych.

e. KLIMAT

Według podziału Polski na regiony klimatyczne R o m e r a (1949), badany obszar leży na granicy krainy ostródzkiej i olsztyńskiej, zaliczanych do dzielnicy klimatycznej pojeziernej.

W oparciu o szczegółową analizę poszczególnych elementów klimatu, nie mniej uzasadniony wydaje się także podział Gumińskiego (1948), według którego Wzgórz Dylewskie zalicza się do dzielnicy mazurskiej (patrz także Kondracki 1965). W ten sposób podkreślono rzeczywiste podobieństwo warunków klimatycznych tego terenu z sąsiednim Pojezierzem Olsztyńskim, a szczególnie z Pojezierzem Giżyckim (Hohendorf 1956, 1961, Galon 1937, Kaczorowska 1950, Tomanek 1955, Kostrowicki 1961). Zaznaczona wyżej niezgodność zdań w tym względzie podkreśla przejściowy charakter warunków klimatycznych Wzgórz Dylewskich.

Najwierniej klimat badanego terenu odzwierciedlają wyniki podane z miejscowości Bałcyny, Stare Miasto, Pietrzwald, Dylewo i Naprom (ryc. 2). Dane z Ostródy przedstawiają wartości pośrednie w stosunku do tych, jakie charakteryzują Pojezierze Iławskie.

Jednym z podstawowych czynników regulujących klimat są ruchy po-

Ryc. 2. Diagramy klimatyczne (metodą Waltera 1962) dla wybranych stacji meteorologicznych z Wzgórz Dylewskich (a-c) oraz wykresy wilgotności względnej powietrza (d) i częstotliwości kierunków wiatru (e, f) w Ostródzie. Dane ze Starego Miasta, Ostródy i Pietrzwaldu cytowane wg Hohendorfera (1956). Średnie dla Bałcyny obliczono z piętnastolecia 1960-1974

Fig. 2. Climatic diagrams (after Walter's method 1962) for some meteorologic stations of Wzgórz Dylewskie (a-c) and diagrams of relative air moisture (d) and frequency of wind directions (e, f) in Ostróda. Data from Stare Miasto, Ostróda and Pietrzwald cited after Hohendorf (1956). Averages for Bałcyny were counted of the years 1960-1974

Tabela 1 — Table 1

Inne dane meteorologiczne według Hohendorfa

Other meteorological data after Hohendorf

Wartości średnie (Averages)	Miejscowość (Locality)					Okres (Period)
	Gru- dziądz	Mal- bork	Ostró- da	Stare Miasto	Olecko	
Liczba dni letnich Quantity of summer days	31	28	24	23	25	różny (different)
Okres trwania temperatury powie- trza ponad 15°C* Period with air temperature above 15°C	—	78	78	61	66	1811-1930
Okres trwania temperatury powie- trza ponad 10°C Period with air temperature above 10°C	153	149	147	140	138	1881-1930
Początek temperatury powietrza ponad 5°C Begining of air temperature above 5°C	4 IV	6 IV	9 IV	12 IV	14 IV	1881-1930
Koniec temperatury powietrza po- nad 5°C End of air temperature above 5°C	3 XI	2 XI	29 X	25 X	22 X	1881-1930
Trwanie okresu wegetacyjnego Length of vegetation period	210	207	201	184	189	1881-1930
Temperatura okresu wegetacyjnego Temperature of vegetation period	15,5	14,9	15,1	14,3	14,7	1881-1930
Data ostatniego przymrozku wio- sennego Date of last spring slight frost	29 IV	30 IV	27 IV	6 V	5 V	różny (different)
Data pierwszego przymrozku je- siennego Date of first spring slight forst	11 X	19 X	21 X	11 X	12 X	różny (different)
Liczba dni z przymrozkiem Quantity of days with slight frost	109	110	177	134	140	różny (different)
Liczba dni bez przymrozku Quantity of days without slight frost	164	171	176	157	159	różny (different)
Liczba dni mroźnych Quantity of frosty days	32	38	44	53	58	różny (different)
Liczba dni z opadem śnieżnym Quantity of days with suowfall	—	40	53	58	65	1881-1930

* Według Kaczorowskiej (1950) — after Kaczorowska (1950).

wietrza. Na badanym terenie wiatry północne, północno-zachodnie i zachodnie (ryc. 2 c), nanoszące powietrze przesycone parą wodną, są szczególnie częste w okresie letnim. Przez to wydatnie wpływają one na wzrost zachmurzenia (150-160 dni), zmniejszenie czasu insolacji, obniżenie temperatury w okresie wegetacyjnym oraz zawężenie amplitudy jej rocznych i dobowych wahań, a także przyczyniają się do podwyższenia opadów w miesiącach od maja do września. Powyższe cechy są wyrazem silniej zaznaczającej się oceanizacji klimatu na terenie Wzgórz Dylewskich, niż w krainach sąsiadujących od południa i wschodu.

Przewaga wiatrów południowych (SW, S, SE) w okresie jesiennym i zimowym sprzyja procesowi kontynentalizacji klimatu. Dowodem tego są niskie przeciętne temperatury miesięcy zimowych, przedłużenie czasu trwania zimy w stosunku do Pojezierza Iławskiego o około 11-21 dni, częste jeszcze w maju i pojawiające się już około 11 października przymrozki oraz skrócenie okresu bezprzymrozkowego i wegetacyjnego (tab. 1).

Swoistość klimatu na tym obszarze podkreślana jest szczególnie małą liczbą dni letnich (23), dużą liczbą dni mroźnych (53) i przymrozkowych (134), jak również dłuższym czasem zalegania pokrywy śnieżnej (58 dni), co z kolei rekompensuje do pewnego stopnia zmniejszenie ilości opadów w miesiącach lutym i marcu.

Z powyższego widać, że Wzgórz Dylewskie, podobnie jak wschodnie tereny Pojezierza Mazurskiego, odznaczają się w stosunku do pozostałych ziem niżej polskiego nieco gorszymi stosunkami termicznymi.

Korzystnie wyróżnia je podwyższona przeciętna suma opadów rocznych i okresu wegetacyjnego (V-VII) oraz półroczna letniego (IV-IX), a także dość wysoka średnia miesięczna i roczna wilgotność względna powietrza (ryc. 2 d). Większa w tym rejonie częstotliwość opadów burzowych i gradowych, przy zróżnicowanej konfiguracji terenu i gęstej sieci strumyków, powoduje jednak, że pokaźna część wody jest stosunkowo szybko odprowadzana i tym samym nie wykorzystywana przez roślinność.

Przedstawiony ogólny obraz klimatu oparto na danych przeciętnych. Tymczasem z zestawienia maksymalnych i minimalnych temperatur powietrza oraz największych i najmniejszych opadów wynika, że poszczególne miesiące i lata mogą się pod tym względem znacznie różnić (ryc. 2 a-c).

Kształtowanie się stosunków termicznych, a szczególnie rozkład opadów, zależy na badanym terenie także od wysokości bezwzględnej. W rejonie Góry Dylewskiej okres bezprzymrozkowy trwa tylko około 150 dni, a średnie roczne opady wynoszą 620-665 mm (patrz ryc. 2 a-c — krzywa P). W niżej położonych partiach Wzgórz Dylewskich okres bezprzymrozkowy się wydłuża (157-176 dni), a ilość opadów maleje (581 mm w Napromie, 585 mm w Starym Mieście).

W całości stosunki klimatyczne Wzgórz Dylewskich należy ocenić jako korzystne dla gospodarki leśnej, gdyż sprzyjają uprawie wielu bardzo cennych gatunków drzew liściastych.

Postglacjalne przemiany klimatu i szaty roślinnej na Pojezierzu Mazurskim i w regionach sąsiednich są dobrze poznane dzięki licznym oryginalnym i syntetycznym pracom palynologicznym z lat trzydziestych i powojennych (Petrenz 1932; Thomaschewski 1933; Gross 1935 i inne; Ołtuszewski 1937; Witkowska 1938; Firbas 1949, 1952; Magier 1960; Polakowski 1961, 1963; Kępczyński 1965; Kępczyński, Noryśkiewicz 1968; Tokarz 1967).

W tej sytuacji szerokie i szczegółowe rozpracowanie tego problemu w niniejszej pracy jest zbędne. Nawiązanie do tych zagadnień w opracowaniu fitosocjologiczno-ekologicznym jest jednak konieczne, gdyż pozwala dokładniej ustalić zarówno stopień naturalności aktualnie rozwijających się zbiorowisk leśnych, jak i wpływ działalności człowieka na ich zasięg, skład i strukturę.

Hołoczeńską historię szaty leśnej Wzgórz Dylewskich znamy dzięki źródłowej pracy Grossa z 1935 roku. Podane w niej wyniki pozwalają sądzić, że historia niektórych gatunków drzewiastych i struktura wiodących zbiorowisk leśnych kształtowały się na badanym terenie nieco inaczej, niż w krainach sąsiednich (tab. 2). Każdy z wyróżnionych dla tego obszaru okresów klimatyczno-roślinnych cechuje się swoistym udziałem ilościowym ziarn pyłków.

Okres borealny (V wg Grossa), znacznie cieplejszy i suchszy od mioniego okresu preborealnego, zaznaczył się na terenie Wzgórz Dylewskich wielokrotnie większym, niż na terenach sąsiednich, przeciętnym udziałem leszczyny (127,1%). Taka jej ilość pozwala przypuszczać, że stanowiła ona nie tylko główny składnik podszycia widnych zbiorowisk leśnych, lecz miejscami tworzyła czyste zarośla. W końcowym odcinku tego okresu zwraca uwagę szybki wzrost udziału wiązu i lipy.

Temu kierunkowi zmian sprzyjał bardzo ciepły i wilgotny klimat okresu atlantyckiego (VI i VII wg Grossa). Żyzne gleby morenowe Pojezierza Mazurskiego zostały w tym czasie opanowane przez ciepłolubne lasy liściaste. Na badanym terenie najpierw odznaczały się one dużym udziałem lipy i wiązu, później wzrosło w nich znaczenie dębu. W sposób widoczny zmalała natomiast frekwencja sosny. W mniejszym stopniu, niż w krainach sąsiednich, wzrósł udział olszy i jesionu. Podkreślenia wymaga także pojawienie się graba i buka.

Okres subborealny (VIII wg Grossa) zaznaczył się powtórным pogorszeniem klimatu. Nowe warunki na terenie Wzgórz Dylewskich szczególnie sprzyjały rozwojowi dębu i graba; zmniejszył się natomiast udział lipy i wiązu. Badany teren stanowił w tym czasie wschodnią część wyraźnie zaznaczonej wyspy zwiększonego udziału graba, zajmującej (cyt. za Polakowskim 1963) „obszary zawarte między Łyną i wschodnimi krańcami Pojezierza Kartuskiego i Borów Tucholskich”.

Tabela 2 — Table 2

Przeciętny skład ziarn pyłków drzew w poszczególnych okresach dla terenu Wzgórz Dylewskich i krain sąsiednich
Average pollen grains composition of trees in several periods for Wzgórze Dylewskie terrain and neighbor lands

Obszar Region	Okres Period	Betula	Pinus	Corylus	Quercus	Ulmus	Tilia	Alnus	Picea	Fagus	Carpinus	Liczba prób Number of sample	Liczba profilu Number of profile
		%											
Wysoczyzna Elbląska Rakowo 25d (Tokarz 1967)	IX VIII VI i VII V	49,0	7,5	11,1	5,2	0,5	1,7	13,7	0,4	4,2	3,3	9	1
		42,2	5,1	14,7	10,6	3,7	7,9	11,5	0,1	1,5	0,3	8	1
		25,3	12,1	31,0	7,5	6,3	10,7	14,0	0,06	0,6	0,7	32	1
		53,2	23,2	10,0	2,5	3,9	1,6	3,5	—	—	—	17	1
Pojezierze Iławskie (Firbas 1952)	IX VIII VI i VII V	13,0	57,4	3,7	3,4	0,3	1,0	10,4	7,3	0,3	6,5	56	5
		14,9	48,6	17,8	7,6	2,1	2,8	18,5	1,4	0,17	3,6	29	6
		14,9	53,5	18,8	3,7	6,3	4,5	16,0	0,6	0,05	0,4	31	6
		19,4	62,8	31,1	0,7	4,5	2,7	8,8	0,4	—	0,13	14	6
Wzgórze Dylewskie (Firbas 1952)	IX VIII VI i VII V	15,3	29,2	7,1	4,5	1,6	2,6	14,0	0,7	1,9	29,8	25	3
		14,1	38,6	24,4	11,9	5,4	6,3	16,3	0,8	0,5	4,8	10	3
		11,5	33,1	31,4	9,0	11,1	19,0	13,1	0,4	0,3	1,4	24	3
		28,2	52,8	127,1	1,6	10,0	2,8	3,4	0,2	—	—	7	3
Pojezierze Olsztyńskie (Firbas 1952)	IX VIII VI i VII V	16,0	50,4	5,0	3,7	0,7	1,2	14,0	10,3	0,18	3,2	49	8
		14,9	37,7	16,8	7,3	2,2	2,9	25,2	7,6	0,07	1,7	42	7
		15,0	35,8	22,8	5,7	8,2	6,9	26,8	1,3	0,007	0,2	43	7
		26,2	53,1	43,4	1,2	7,6	3,5	7,2	0,6	—	—	16	5

Okres subatlantycki — współczesny (IX wg G r o s s a) znamionuje dalszy ogromny wzrost udziału ilościowego pyłków graba (29,8%) i nieznaczny buka (1,9%) oraz jednoczesne zmniejszenie się ilości wiązu, dębu, lipy, leszczyny i sosny. Powyższy kierunek zmian pogłębia się w ciągu wieków tak, że w czasach wczesnohistorycznych pyłki graba osiągnęły na tym terenie 30-46%.

W takiej postaci badane lasy przetrwały do około XIII wieku, do czasu kiedy słabo zaznaczył się jeszcze wpływ działalności człowieka na tym terenie. Zamieszkujące dotąd Garb Lubawski plemię Sasinów, nękane ciągłymi najazdami sąsiadujących z nimi od północy plemion pruskich oraz od południa zbrojnymi wyprawami książąt polskich, a wyniszczone ostatecznie w walkach z Bolesławem Krzywoustym na początku XII wieku Ł o w m i a ń s k i 1935, 1953; G ó r s k i 1946; B u c z e k 1936), było z pewnością zbyt słabe, by móc w sposób widoczny i trwałe zmniejszyć powierzchnię leśną, czy też przyczynić się do zmiany struktury drzewostanu na tym terenie. Badany obszar stanowił dlatego jeszcze w XIII wieku zachodnią część dziewiczej i zwartej Puszczy Galindzkiej, rozciągającej się wzdłuż południowych granic Pojezierza Mazurskiego (Ł o w m i a ń s k i 1935, 1953; B u c z e k 1936; Ż a b k o - P o t o p o w i c z 1959).

Początek przemian powodujących stopniowe zmniejszanie się powierzchni leśnej oraz trwałe zmiany w strukturze drzewostanu przypada na pierwszą połowę XIV wieku, kiedy miało miejsce nasilenie akcji kolonizatorskiej na Pojezierzu Mazurskim. W tym czasie na obszarze Garbu Lubawskiego zaczęto zakładać pierwsze miasta (Dąbrówno 1326, Ostróda 1328, Lubawa 1345-60). Ekspansja żywiołu polskiego zaznaczyła się powstaniem 29 wsi, w tym także osady Grunwald (Ż a b k o - P o t o p o w i c z 1954, Ł o w m i a ń s k i 1947). Systematyczne trzebieże i zniszczenia wojenne (np. bitwa pod Grunwaldem 1410) spowodowały już w XV i XVI wieku dość znaczne uszczuplenie powierzchni leśnej.

Za główne przyczyny gwałtownego ubytku na tym terenie obszarów leśnych w okresie porzoborowym uważa się wyprzedaż dóbr koronnych osobom prywatnym (M r ó z 1946) oraz uwłaszczenie włościan w latach 1807-1811 (A n t o n i e w i c z i i n. 1953). Przemiany te przyczyniły się wprawdzie do pomyślniejszego rozwoju gospodarki rolnej, lecz spowodowały tym samym dalszą redukcję powierzchni leśnej (Ż a b k o - P o t o p o w i c z 1954). Sporo cennego drzewostanu zniszczono także w okresie wojny napoleońskiej. W latach sześćdziesiątych XIX wieku i w okresie przed I Wojną Światową znaczne obszary borów i lasów mieszanych na terenie Wzgórz Dylewskich padły pastwą pasożytniczych owadów (M a g e r 1960).

W wyniku tej klęski straty w drzewostanach musiały być ogromne, gdyż od tego czasu zaczęły się rodzić tendencje do ograniczania grabieżczej gospodarki leśnej. Zaczęto eksploatować zasoby leśne w sposób nieco zor-

Ryc. 3. Rozmieszczenie lasów na obszarze Wzgórz Dylewskich
a — do r. 1800, b — współczesne rozmieszczenie powierzchni leśnych (według Magera 1960)

Fig. 3. Distribution of forests on the Wzgórza Dylewskie
a — before 1800, b — contemporary distribution of forests (acc. to Mager 1960)

ganizowany, a nawet dokonywać wtórnych nasadzeń. Spowodowało to jednakże jedynie nieznaczne zahamowanie w dalszym ciągu szybko postępującej redukcji powierzchni leśnej (ryc. 3).

W ostatnim tysiącleciu zaznaczyły się głębokie zmiany także w strukturze lasów dylewskich (B u j a k 1839; G r o s s 1935; M a g e r 1960; P o l a k o w s k i 1963). Do przełomu XIV i XV wieku panowały tam jeszcze naturalne lasy z przewagą graba; uzupełniane obficie dębem i lipą, a gdzieś: klonami, wiązami, jesionem i brzozą.

W literaturze naukowej już niejednokrotnie zwracano uwagę na pewną zbieżność między stopniem pospolitości gatunków drzewiastych w minionych wiekach a pochodzeniem wielu nazw geograficznych i częstością ich występowania (S t y p i ń s k i 1973a). Na obszarze Wzgórz Dylewskich utworzono po 7 nazw od graba i dębu, 6 — od lipy, 5 — od brzozy, 3 nazwy od klonów, a od buka zaledwie jedną (Góra Bukowa). Podane liczby w sposób właściwy uzasadniają wspomnianą zależność, gdyż zarówno dominacja graba i dębu, jak i nieczęste występowanie w średniowieczu na tym terenie buka, są faktami dowiedzionymi.

Buk zaczął się pojawiać najpierw w południowej części Uroczyska Dylewo, gdzie, najprawdopodobniej dlatego, jedno z trzech największych wzniesień nazwano Górą Bukową (287 m n.p.m.).

Według G r o s s a (1935) ekspansja buka, kosztem graba, rozpoczęła się tam przy końcu XVII wieku. W następnym stuleciu buk był już gatunkiem częstym, gdyż zaczęto go stosować do produkcji węgla potasu (potażu) oraz jako materiał budulcowy. Nie tworzył on wtenczas jeszcze czystych

lasów bukowych (B u j a k 1839). Przemianę dotąd istniejących drzewostanów na bukowe przyspieszyło nadmierne trzebieenie graba, lipy i dębu na opał, dla zdobycia węgla potasu i na cele hut szklanych w Glaznotach i Szczepankowie. Jednogatunkowe lasy bukowe zaczęły się pojawiać na zboczach Góry Dylewskiej najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Taki punkt widzenia uzasadniają także wyniki badań zawarte w niniejszej pracy.

Znaczny wzrost procentowego udziału pyłków świerka w powierzchniowych warstwach torfowisk spowodowany jest w znacznym stopniu wprowadzaniem tego gatunku od sześćdziesiątych lat ubiegłego stulecia przez człowieka (M a g e r 1960).

Dzisiejsza struktura badanych lasów jest więc wypadkową zmian naturalnych i dość wyraźnie zaznaczającego się w przeszłości i obecnie wpływu działalności człowieka. W przeważającej mierze jest ona zgodna z wymogami tamtejszych siedlisk. Błędem dawnej gospodarki leśnej było jedynie nadmierne zaświerczenie tych lasów. Stopniowe zmniejszanie areалу świerkowych borów mieszanych oraz odtwarzanie zbiorowisk leśnych w zależności od ich naturalnych tendencji rozwojowych powinno być głównym zadaniem administracji leśnej na przyszłość.

g. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ

Pod względem geobotanicznym szereg ważnych cech zbliża Wzgórza Dylewskie do krain zachodnich. W pierwszym rzędzie trzeba tu zaliczyć gromadne występowanie buka oraz wykształcanie się w pełnej skali zmienności buczyny pomorskiej (*Melico-Fagetum*), buczyny kwaśnej (*Trientali-Fagetum*) i dąbrowy kwaśnej (*Fago-Quercetum*). Świadczy o tym ponadto: częsta obecność w drzewostanach, podszyciu i runie jaworu i wiązu górskiego, dominowanie wśród roślin zielnych elementu środkowoeuropejskiego oraz niemała rola gatunków subatlantyckich i górskich.

R u b n e r (1960), mając powyższe na względzie, zaliczył Wzgórza Dylewskie do środkowoeuropejskiej strefy lasów bukowo-dębowych.

Z polskich badaczy podobne stanowisko zajęli w tej sprawie S z a f e r (1972) i P o l a k o w s k i (1963), gdyż włączyli badany obszar do krainy Pojezierze Pomorskie.

M r o c z k i e w i c z (1952) i W a l a s (1953) sugerują natomiast, że liczne i gromadne występowanie świerka oraz pojawianie się sosny w drzewostanach mieszanych z grabem, dębem i brzozą brodawkowatą wskazuje na przynależność całego Garbu Lubawskiego do dzielnicy Północnomazurskiej. Taki pogląd wydaje się mniej uzasadniony, gdyż sosna i brzoza brodawkowata odgrywają bardzo małą rolę, a rozwijające się tam drzewostany świerkowe w przeważającej części są wynikiem sztucznych nasadzeń i tworzą w dodatku zbiorowiska dość znacznie różniące się składem gatunkowym

runa od analogicznych ze wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Odmiennność świerkowych borów mieszanych spowodowana jest w głównej mierze częstym współwystępowaniem na tym terenie świerka, buka i jaworu, które możliwe jest w związku z położeniem Wzgórz Dylewskich w strefie kontaktowania się naturalnych zasięgów tych gatunków.

Buk i świerk odgrywają najważniejszą rolę na tym terenie, gdyż zbiorowiska, w których one przeważają, zajmują największą powierzchnię. Jednogatunkowe drzewostany budowane przez te gatunki nie są jednak częste.

Czyste drzewostany bukowe, z runem typowym dla buczyny pomorskiej lub buczyny kwaśnej, porastają jedynie najwyżej położone partie wschodnich zboczy Góry Dylewskiej.

Zbiorowiska z bukiem, występujące na pozostałym obszarze, uzupełniane zwykle grabem, dębem szypułkowym, lipą, klonem i niekiedy sosną, a na siedliskach żyznych: wiązem, jesionem i jaworem, tworzą albo swoiste postacie lasów grądowych, albo zespół kwaśnej dąbrowy (*Fago-Quercetum*).

Naturalne lasy liściaste grabowo-lipowo-dębowe, z domieszką wiązu górskiego i klonu zwyczajnego, zajmują aktualnie nieduży procent powierzchni leśnej. Zachowały się one jedynie w oddziałach 8-11 oraz 26-28 leśnictwa Durąg i stanowią dzisiaj prawdziwy relikw po tego typu lasach panujących tu jeszcze do połowy XVIII wieku.

Drzewostany świerkowe, zajmujące znaczną część powierzchni leśnej badanego terenu, uzupełniane są najczęściej bukiem, dębem szypułkowym, klonem zwyczajnym, brzozą brodawkowatą, grabem lub sosną. W oddziałach 54 i 59 leśnictwa Dylewo do świerkowego boru mieszanego wprowadzono jodłę pospolitą (Tumiłowicz 1966). Stare okazy tego gatunku czują się dobrze, gdyż obficie „owocują”, a młode siewki zaczynają się pojawiać nawet w oddziałach sąsiednich.

Podszycie w wymienionych lasach słabiej wykształca się jedynie w typowych płatach buczyny pomorskiej, w kwaśnej buczynie i w grądzie turzycowym. W pozostałych typach lasu liściastego i mieszanego oraz w borach mieszanych rozwija się obficie i stanowi tym samym ważny składnik zbiorowiska. Budują go zawsze odpowiednie gatunki drzewiaste, a uzupełniają najczęściej: w lasach liściastych i mieszanych — trzmielina brodawkowata, leszczyna, jarzębina, suchodrzew i kalina koralowa, w mieszanym borze świerkowym — bez koralowy, jarzębina, jeżyna pofałdowana i bez czarny.

Tu i ówdzie na terenie uroczyska Dylewo, na żyznym i wilgotnym podłożu dna wąwozów, zachowały się nieduże płaty łągu olszowo-jesionowego (*Circaeo-Alnetum*).

W obwodowych partiach Wzgórz Dylewskich, w kontakcie z olszyną typową, lecz na żyznej glebie mineralno-próchnicznej, rozwija się w wielu

miejscach las łęgowy z olszą szarą w drzewostanie. Zbiorowisko to utożsamiono z opisanym przez Oberdorfera (1953) łągiem borealnym (*Alnetum boreale*).

Typowe olszyny, z panującą olszą czarną, znajdują odpowiednie dla siebie warunki na podłożu torfowym w sąsiedztwie rzeczek i jezior oraz w zastoiskach śródleśnych.

W kilku miejscach Wzgórz Dylewskich znaleziono nieduże skupienia zarośli łozowych. Zajmują one zamulone wytopiska polodowcowe, względnie tworzą porożrywane kępy wśród zbiorowisk bagnisto-łąkowych.

Na terenie leśnictwa Dylewo i uroczyska Durąg II natrafiono na fragmentarycznie rozwijające się wilgotne zbiorowisko świerczyny na torfie, reprezentujące inicjalną postać wyróżnionego przez Polakowskiego (1962) zespołu *Sphagno girgensohni-Piceetum*.

Listę badanych asocjacji leśnych zamyka mało znaczące, lecz godne odnotowania, zbiorowisko oszyjkowe, charakteryzujące się przerzedzonym drzewostanem grabowo-bukowym i bardzo silnie rozwiniętym podszyciem, w którym dominuje *Prunus spinosa*. Nieduże jego płaty zajmują północny skraj oddziałów 54 i 55 w uroczysku Dylewo. Posiada ono szereg cech wspólnych w zakresie struktury, składu florystycznego i zajmowanego siedliska z wyróżnionym przez Tüxena w 1952 roku zespołem *Carpino-Prunetum spinosae*.

Nieczęste i fragmentaryczne wykształcenie się dwóch ostatnich zbiorowisk uniemożliwiło skompletowanie dostatecznego materiału zdjęciowego dla dokonania szerszej ich analizy.

W przeprowadzonych badaniach uwzględniono także nieczęsto spotykany na niżu, a występujący w kilku miejscach na badanym terenie, interesujący zespół ziółorośliny z panującym lepiężnikiem różowym (*Geranio-Petasitetum hybridi*).

Interesująca szata roślinna Wzgórz Dylewskich nie była, jak dotąd, szczegółowo badana również pod względem florystycznym. Dotychczasowe notatki z tego zakresu są dość fragmentaryczne i w pewnej mierze już nieaktualne (Abromeit i in. 1898-1940). W niedalekiej przyszłości lukę tę wypełnią rozpoczęte w 1964 roku, lecz jeszcze nie zakończone, własne badania florystyczne. Na ich podstawie już obecnie można stwierdzić, że badany teren odznacza się dużym bogactwem flory, nie tylko drzewiastej i zielnej, ale także zarodnikowej.

Zasygnalizowania wymagają także, coraz powszechniej obserwowane na obszarze Wzgórz Dylewskich, procesy synantropizacji i degeneracji zbiorowisk roślinnych. Dobrym wskaźnikiem tych procesów jest obecność gatunków obcych zbiorowiskom leśnym. Z tej grupy gatunków dość często w lasach dylewskich występuje: *Campanula glomerata*, *C. rotundifolia*, *Ranunculus repens*, *Luzula campestris*, *L. multiflora*, *Stellaria media*, *Juncus effusus*, *Prunella vulgaris*, *Carex hirta*, *C. fusca*, *C. leporina*, *C. vulpina*, *C. contigua*, *Vicia cracca*, *Lathyrus pratensis*, *Plantago maior*, *P. lance-*

olata, *P. media*, *Veronica serpyllifolia*, *Astragalus glycyphyllos*, *Torilis japonica*, a z traw: *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Calamagrostis epigeios*, *Festuca pratensis*, *Anthoxanthum odoratum*, *Phleum pratense*, *Poa annua*, *Avenastrum pubescens* i *Arrhenatherum elatius*. Są one częstymi składnikami zbiorowisk porębowych i tzw. dywanowych, rozwijających się na drogach i ścieżkach leśnych, a niejednokrotnie wnikają także w płaty zbiorowisk leśnych. Stosunkowo szybko pojawiają się w miejscach okresowej działalności człowieka, np. w miejscach składowania drewna.

Zbiorowiska dywanowe często rozwijają się jako zespół *Prunello-Plantaginetum*, rzadziej jako *Lolio-Plantaginetum*. W postaci inicjalnej tworzą one mozaikowe skupienia trudne do zidentyfikowania.

Obrzeżenia dróg na podłożu żyzniejszym zajmują z zasady ziołoroślowe zbiorowiska z panującym *Chaerophyllum aromaticum* i licznie występującą *Urtica dioica*.

Na porębach młodszych, w zależności od typu siedliska, rozwijają się różne postacie zbiorowisk z rzędu *Epilobietalia angustifolii*. Z nich, szczególnie na porębach drzewostanów świerkowych, tworzą się pionierskie zarośla ze związku *Sambuco-Salicion* (Matuszkiewicz 1967), będące następnym stadium regeneracji zbiorowisk leśnych. Wyróżnia je dobrze rozwinięta warstwa krzewów, w której dominują najczęściej: *Sambucus racemosa*, *S. nigra*, *Salix caprea*, *Corylus avellana*, *Rubus idaeus* i *Rubus bellardii*. Z roślin zielnych stale występuje *Epilobium angustifolium* i szereg traw, z których w większej ilości często pojawia się *Calamagrostis epigeios*. Gromadnie rozwija się tam także wiele mszaków.

Osobnym problemem jest gwałtowne rozprzestrzenianie się na badanym terenie wschodnioazjatyckiego przybysza — niecierpka drobnokwiatowego (*Impatiens parviflora* D. C.). Dzięki swojej zdolności do samoczynnego rozsiewania nasion, a także przy pomocy człowieka, bardzo szybko pojawia się on wszędzie, gdzie została zachwiana równowaga dynamiczna zbiorowiska.

Dobłą ilustracją tego procesu jest masowe pojawienie się jego w latach 1967-1969 w oddziałach 114 i 115 leśnictwa Dylewo. Do roku 1966 runo tego lasu odznaczało się typową strukturą i składem gatunkowym dla buczyny pomorskiej (zdjęcie fitosocjologiczne nr 35). Szybkie rozprzestrzenienie się niecierpka drobnokwiatowego nastąpiło w wyniku zmiany stosunków wodnych i świetlnych po częściowym przerębie drzewostanu. W podanym przykładzie, gdzie przebudowa lasu nie została zbyt daleko posunięta, wybiórcze działanie siedliska szybko ogranicza nadmierny rozwój intruza i prowadzi do ponownego zrównoważenia zbiorowiska. W miejscach pełniejszych wyrębów (np. w oddziałach 117, 118 i 86) proces ten jest trwalszy i wtedy masowe pojawienie się niecierpka drobnokwiatowego może być traktowane jako czynnik degeneracji zbiorowiska, gdyż powoduje dłuższe zahamowanie vegetacji szeregu gatunków rodzimych, a nawet wyginiecie niektórych (Faliński 1966).

a. UWAGI DOTYCZĄCE PRZYJĘTEJ SYSTEMATYKI

Klasyfikację wyróżnionych zespołów oparto w głównej mierze na systemie podanym przez M e d w e c k ą - K o r n a ś w „Szacie roślinnej Polski” (1972).

W ujęciu jednostek niższych uwzględniono jednakże bogaty dorobek lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w dziedzinie fitosocjologii. Ze słusznych koncepcji tego okresu zastosowano między innymi nową klasyfikację zespołów grądowych, zaproponowaną przez T r a c z y k a (1962a i b), a uzupełnioną niektórymi jednostkami wprowadzonymi do polskiej literatury fitosocjologicznej przez M a t u s z k i e w i c z a (1952), P o l a k o w s k i e g o (1961, 1963), i W o j t e r s k i e g o (1960).

Zaliczenie badanych zbiorowisk grądowych, w myśl tej propozycji, do zespołu *Tilio-Carpinetum* nie wzbudza istotnych zastrzeżeń. Brak gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla grądu zachodniego (*Galio-Carpinetum*) i obecność trzech, spośród pięciu, gatunków uznanych za charakterystyczne i wyróżniające dla *Tilio-Carpinetum*, wystarczająco uzasadniają pozycję systematyczną dylewskich lasów grądowych.

Trudno jest natomiast ustalić ich przynależność do jednej z trzech wyróżnionych przez T r a c z y k a odmian geograficznych. Badane grądy z całą pewnością nie należą do odmiany mazurskiej, gdyż *Dentaria bulbifera* nie jest notowana na badanym terenie, a *Festuca silvatica* i *Equisetum pratense* unikają omawianych zbiorowisk. *Festuca silvatica* jest stałym składnikiem buczyny pomorskiej i niektórych postaci świerkowego boru mieszanego, natomiast *Equisetum pratense* zdradza wyraźne przywiązanie do lasów łęgowych (tab. 70).

Z powodu stałego udziału w drzewostanie, podszyciu i runie buka oraz częstej obecności jaworu, a wśród roślinności zielnej — *Campanula latifolia* i *Myosotis silvatica*, nie można się także zgodzić z ich przynależnością do odmiany mazowieckiej. Wymienione gatunki wskazują na większe powiązanie badanych grądów z odmianą małopolską, a także zbliżają je do *Galio-Carpinetum*, a szczególnie do jego wariantu z *Fagus silvatica* (W o j t e r s k i 1960; B o i ń s k i 1973).

W strefie kontaktowania się naszych zespołów grądowych ze zbiorowiskami związku *Fagion*, wzdłuż całej wschodniej granicy buka na terenie Polski spotkać można buczynowe postacie grądów.

W Polsce północno-wschodniej, gdzie buk jest częstym składnikiem lasów liściastych aż po Olsztyn (T o k a r z 1971, 1976), buczyna pomorska z jej charakterystycznymi gatunkami zielnymi rozwija się jedynie na wierzchołkach najwyższych wyniesionych garbów terenowych, którymi są: Wzgórza Górowskie (F a l i ń s c y 1965), Wyżyna Elbląska (T o k a r z 1961), niektóre marginalne formy polodowcowe w środkowej części Pojezierza

ławskiego (Tokarz 1971, Jutrzenka-Trzebiatowski 1969 — maszynopis), a przede wszystkim badany teren.

Do lasów grądowych i borów mieszanych buk wchodzi na terenach niżej położonych tego obszaru i jest w nich na ogół składnikiem częstym, a nieraz nawet dominuje.

Niemożliwe było utrzymanie jednoznacznego stanowiska w sprawie systematyki zbiorowisk łęgowych. Wszystkie wyróżnione postacie lasów łęgowych — podobnie jak na pogórzu — zajmują tu nieduże powierzchnie i rozwijają się przeważnie w bezpośrednim kontakcie z innymi zbiorowiskami leśnymi. Dlatego, a także ze względu na położenie Wzgórz Dylewskich w niedalekim sąsiedztwie Działu Północnego (Szafer i in. 1972), wykształcają się one w sposób dość swoisty, najczęściej ze znaczną domieszką gatunków rzędu *Fagetalia*. Z tych względów, nie negując słusznych racji zawartych w systemie Oberdorfera (1953) oraz przekonywujących uwag Wojterskiego (1960) i Kępczyńskiego (1965), uznano za właściwe i wystarczająco uzasadnione podtrzymanie koncepcji Medveckiej-Kornaś w odniesieniu do jednostek wyższych, natomiast charakterystykę i nomenklaturę zespołów uzgodniono z propozycjami Oberdorfera (1953).

Niełatwo jest także ustalić pozycję systematyczną świerkowych borów mieszanych wykształcających się na terenie Wzgórz Dylewskich na siedliskach grądowych. Nie można ich utożsamiać z świerczynami wyróżnionymi przez Sokołowskiego (1968) i Czerwńskiego (1973, 1977), gdyż posiadają runo wzbogacone o szereg przedstawicieli lasów liściastych i gatunki, które nie są spotykane w borach świerkowych na obszarze Działu Północnego. Są to przede wszystkim: *Sambucus racemosa*, *Dryopteris austriaca*, *Rubus bellardii* i *Circaea alpina*. Wymienione gatunki wskazują raczej na pewne powiązania dylewskich świerkowych borów mieszanych z południowopolskim *Pino-Quercetum abietetosum* (Olaczek 1965; Urbanek (1966c; Sowa, Szymański 1966; Izdebski 1963), a nawet — z *Abietetum polonicum* (Dziubałtowski 1928, Dziubałtowski, Kobendza 1933, 1934).

Na podstawie obserwacji własnych i posiadanego materiału zdjęciowego wiadomo także, że podobna postać boru świerkowego występuje również w rejonie wielkich jezior mazurskich oraz gdzieś na terenie pojezierzy: mazurskiego, ławskiego i kaszubskiego (Jutrzenka-Trzebiatowski 1968). Pozwala to przypuszczać, że mamy tu do czynienia ze zbiorowiskiem zastępującym świerczyny Działu Północnego na obszarze kontaktowania się świerka z bukiem.

W sytuacji, kiedy indywidualny charakter składu florystycznego badanych borów świerkowych uniemożliwia utożsamianie ich z którymkolwiek z opisanych dotychczas na terenie Polski zespołów borów mieszanych, zdecydowano się na wyodrębnienie ich jako jednostki samodzielnej — w randze zespołu.

Grupa zbiorowisk reprezentujących nasze północno-wschodnie bory świerkowe i bory mieszane powiększyła się w ten sposób o jeszcze jeden zespół — *Sambuco racemosi-Piceetum*. W obecnej chwili trudno z całą pewnością odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście bory świerkowe w Polsce północno-wschodniej wykazują aż tak daleko idące różnicowanie. Wyjaśnienie tego problemu wymaga analizy na szerszym tle, a taka nie została przewidziana w założeniach niniejszej pracy.

Ujęcie reszty zbiorowisk oparto na pracach: Matuszkiewicza (1967), Matuszkiewicza, Polakowskiej (1955); Matuszkiewiczowej (1958); Piotrowskiej (1955, 1966, 1967); Kępczyńskiego (1965), Tokarz (1961, 1964, 1971, 1976); Krotoskiej (1966); J. B. i K. Falińskich (1965) i innych autorów.

D. KLASYFIKACJA ZIDENTYFIKOWANYCH ZESPOŁÓW

Na podstawie zebranego materiału zdjęciowego i badań glebowych zidentyfikowano i scharakteryzowano na badanym materiale 11 zespołów leśnych i zaroślowych oraz 1 zespół ziołoroślowy. Ich klasyfikacja przedstawia się następująco:

Klasa: *Molinio-Arrhenatheretea* R. Tx. 1937

Rząd: *Molinietalia* Koch 1926

Związek: *filipendulo-Petasition* Br.-Bl. 1947

1. Zespół *Geranio-Petasitetum hybridi* Oberd. 1957

Klasa: *Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et R. Tx. 1943

Rząd: *Alnetalia glutinosae* R. Tx. 1937

Związek: *Alnion glutinosae* (Malc. 1929) Meijer Drees 1936

2. Zespół *Salici-Franguletum* (Malc. 1929) R. Tx. 1937

3. Zespół *Carici elongatae-Alnetum* (Koch 1926) Tx. et Bodeaux 1955

Klasa: *Quercu-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger 1937

Rząd: *Fagetalia silvaticae* Pawł. 1928

Związek: *Alno-Padion* Knapp 1942 em. Medwecka-Kornaś 1959

4. Zespół *Circae-Alnetum* Oberd. 1953

5. Zespół *Alnetum boreale* Oberd. 1953

a. Wariant z *Solanum dulcamara*

b. Wariant typowy

Związek: *Carpinion betuli* Oberd. 1953

4. Zespół *Tilio-Carpinetum* Traczyk 1962

A. Podzespół *Tilio-Carpinetum corydaletosum*

a. Wariant z *Geranium phaeum*

b. Wariant z *Acer pseudoplatanus*

c. Wariant typowy

B. Podzespół *Tilio-Carpinetum stachyetosum*

C. Podzespół *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*

- a. Wariant typowy
- b. Wariant z *Campanula persicifolia*
- c. Wariant z *Sambucus racemosa*
- D. Podzespół *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*
 - a. Wariant typowy
 - b. Wariant z *Vaccinium myrtillus*
- E. Podzespół *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*
 - a. Wariant typowy
 - b. Wariant z *Carex montana*

Związek: *Fagion silvaticae* R. Tx. et Diem. 1936

Podzwiązek: *Eu-Fagion* Oberd. 1957 em. R. Tx. 1960

7. Zespół *Melico-Fagetum* Knapp 1922

- A. Podzespół *Melico-Fagetum mercurialetosum perennis*
- B. Podzespół *Melico-Fagetum typicum*
- C. Podzespół *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*

Podzwiązek: *Luzulo-Fagion* Lohm. et R. Tx. 1954

8. Zespół *Trientali-Fagetum* Tx. 1960

- a. Wariant typowy
- b. Wariant mszysty

Klasa: *Quercetea robori-petraeae* Br.-Bl. et R. Tx. 1943

Rząd: *Quercetalia robori-petraeae* R. Tx. 1931

Związek: *Quercion robori-petraeae* Br.-Bl. 1932

9. Zespół *Fago-Quercetum petraeae* R. Tx. 1955

- a. Wariant typowy
- b. Wariant z *Leucobryum glaucum*

Klasa: *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. 1939

Rząd: *Vaccinio-Piceetalia* Br.-Bl. 1939

Związek: *Pino-Quercion* Medw.-Korn. 1959

10. Zespół *Sambuco racemosi-Piceetum* ass. nova

- a. Wariant z *Phegopteris polypodioides*
- b. Wariant typowy
- c. Wariant z *Deschampsia flexuosa*

11. Zespół *Querco-Piceetum* Mat. (1952) 1955

Związek: *Vaccinio-Piceion* Br.-Bl. 1938

12. Zbiorowisko *Sphagno girgensohni-Piceetum* Pol. 1962

c. SZCZEGÓŁOWY PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH ZESPOŁÓW

Salici-Franguletum (Malc. 1929) R. Tx. 1937

Zarośla łozowe

Zbiorowiska zaroślowe, z panującą w warstwie krzewów *Salix cinerea*, rozwijają się na terenie Wzgórz Dylewskich sporadycznie i na stosunkowo małych powierzchniach. Ich rozprzestrzenianie ogranicza zróżnicowana

Tabela 3

Salici - Franguletum /Malc. 1929/ Tx. 1937

Nr kolejny /Successive number/		1	2	3	4	5	6	
Nr zdjęcia /Number of record/		324	274	360	361	268	271	
Data /Date/		16.7 68	29.8 68	23.8 76	23.8 76	28.8 68	29.8 68	
Leśnictwo /Forestry/		Dur	Bed	Dur	Dur	Szcz	Bed	
Uroczysko /Range/		Szyl	Dyl	D.II	D.II	Szcz	Dyl	
Nr oddziału /No of section/		11	75	34	34	20m	90d	
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a %	30	20	15	20	50	50	Stożenie stałości
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	b %	50	60	70	70	50	60	/Constancy/
Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	c %	90	90	85	80	40	30	
Pokrycie warstwy mchów /Cover of moss layer/	d %	10	10	15	15	50	60	
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	200	250	250	250	300	250	
Liczba gatunków /Number of species/		42	43	49	48	53	43	

I Ch. Salici-Franguletum								
Salix cinerea	b	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	V
Salix aurita	b	2.2	1.2	+2	1.2	+2	1.2	V
Salix pentandra	b	.	.	+2	+2	+	.	III
II Ch. Alnetea glutinosae								
Frangula alnus	b,c	+	1.2	+	1.1	1.2	3.4	V
Calla palustris	c	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.3	V
Dryopteris thelypteris		3.3	2.3	.	1.2	1.2	1.2	V
Calamagrostis canescens		2.2	1.2	2.3	2.2	1.2	.	V
Solanum dulcamara		.	.	+2	1.1	1.2	+2	IV
Lycopus europaeus		.	.	+2	+2	1.2	+2	IV
Dryopteris cristata		1.2	+2	.	.	.	.	II
Sphagnum squarrosum	d	2.2	2.3	2.3	2.2	1.3	1.2	V
III Ch. Phragmitetalia								
Galium palustre	c	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	V
Carex acutiformis		2.3	1.2	1.2	+2	1.2	1.2	V
Carex vesicaria		1.2	1.2	1.2	1.2	+2	+2	V
Carex pseudocyperus		+2	1.2	1.2	+2	1.2	.	V
Peucedanum palustre		+	+	1.1	1.1	.	+	V
Carex paniculata		+2	1.2	.	+2	1.2	.	IV
Lysimachia thyrsiflora		1.1	.	+2	+2	+2	.	IV
Scutellaria galericulata		.	+2	+	.	.	+	III
Oenanthe aquatica		1.2	+2	.	.	1.1	1.1	III
Iris pseudocorus		1.2	+2	.	+2	.	.	III
Typha latifolia		1.2	+2	+2	.	.	.	III
Carex rostrata		+	.	1.2	+2	.	.	III
Equisetum limosum		1.2	+2	.	.	.	.	II
Carex hudsoni		.	.	+2	.	1.2	.	II
Phragmites communis		.	+2	.	1.1	.	.	II
IV Ch. Molinietalia								
Lysimachia vulgaris	c	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	V
Lythrum salicaria		1.1	1.1	1.1	+	+	+	V
Scirpus silvaticus		+	1.2	+2	1.2	2.3	+	V
Deschampsia caespitosa		.	+2	+2	+2	+2	.	IV
Juncus effusus		.	.	+2	+2	+2	+2	IV
Caltha palustris		.	+2	+2	1.2	.	+2	IV
Molinia coerulea		.	.	.	+2	+2	+2	III
Myosotis palustris		.	.	+2	+2	+2	.	III
Cirsium palustre		.	.	.	+	+	.	II
Filipendula ulmaria		.	.	.	+	+	.	II
Epilobium hirsutum		.	.	.	.	+	.	I
V Ch. Scheuchzerio-Caricetea fuscae								
Comarum palustre	c	1.2	1.2	3.3	2.2	1.1	+2	V
Agrostis canina		+2	1.2	2.2	1.2	1.2	.	V
Menyanthes trifoliata		2.3	1.2	+2	+2	+2	.	V
Epilobium palustre		+2	1.1	1.1	+	.	+2	V
Carex lasiocarpa		2.2	1.2	1.2	1.2	.	1.2	V
Carex canescens		+2	.	+2	.	2.2	+2	IV
Carex fusca		.	+2	+2	+2	+2	.	IV
Eriophorum angustifolium		+2	1.2	1.1	.	.	.	III
Viola palustris		+	.	+2	1.2	.	+2	III
Ranunculus flammula		+	.	.	.	.	.	I

VI Gatunki towarzyszące /Accompanying species/								
<i>Betula pubescens</i>	a	2.1	2.1	1.1	+	+2	2.2	V
<i>Alnus glutinosa</i>	a	.	.	+	1.1	2.3	3.3	IV
" "	b	.	.	+	.	1.1	1.2	
<i>Dryopteris spinulosa</i>	c	.	+2	+2	+	1.2	1.2	V
<i>Vaccinium myrtillus</i>	.	.	+2	.	+	1.2	1.2	III
<i>Bidens cernuus</i>	.	.	.	+2	.	+	.	II
<i>Carex leporina</i>	.	.	.	+2	.	1.2	.	II
<i>Athyrium filix-femina</i>	.	.	.	.	+2	+2	.	II
<i>Eupatorium cannabinum</i>	.	.	.	.	.	.	+2	II
<i>Calliergon cuspidatum</i>	d	1.2	2.3	3.3	2.3	2.2	2.2	V
<i>Sphagnum palustre</i>	.	2.3	2.2	2.3	1.3	+2	+2	V
<i>Polytrichum commune</i>	.	+2	+2	.	+	+2	+2	V
<i>Climacium dendroides</i>	.	1.2	+2	+2	.	+2	1.2	V
<i>Calliergon cordifolium</i>	.	1.2	1.2	+2	.	.	1.2	IV
<i>Knium affine var. elatum</i>	.	.	+2	+2	+2	+2	.	IV
<i>Marchantia polymorpha</i>	.	1.2	+2	+2	.	.	.	III
<i>Sphagnum teres</i>	.	.	+2	.	.	+2	1.2	III
<i>Lemna minor</i>	.	.	.	.	1.3	2.4	2.3	III
<i>Georgia pellucida</i>	.	.	.	+2	.	+2	+2	III
<i>Oxyccocus quadripetalus</i>	.	1.2	+2	.	.	.	.	II
<i>Sphagnum fimbriatum</i>	.	.	.	.	.	+2	1.2	II
<i>Dicranum maius</i>	.	.	.	.	.	+2	+2	II

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

ad VI *Bryum ventricosum* /5/, *Chiloscyphus polyanthus* /1/, *Dryopteris austriaca* /6/, *Eriophorum vaginatum* /1/, *Festuca gigantea* /5/, *Glyceria fluitans* /6/, *Picea excelsa* /6/, *Pinus silvestris* /6/, *Polygonum tomentosum* /1/, *Sphagnum apiculatum* /3/, *Stellaria palustris* /3/, *Trientalis europaea* /1/, *Urtica dioica* /5/.

Objaśnienia /Explanations/

Bed - Bednarki, D.II - Domkowo II, Dur - Durąg, Dyl - Dylewo, Szcz - Szczepankowo, Szyl - Szyldek.

orografia tego terenu i w związku z tym niewykształcanie się na większych powierzchniach siedlisk przez dłuższy czas zalewanych i zabagnionych. Nie-duże skupienia zarośli łozowych znaleziono jedynie w oddziałach 75 i 90 uroczyiska Dylewo, w oddziale 34 uroczyiska Domkowo II, koło oddziału 11 uroczyiska Szyldek oraz w oddziale 20 uroczyiska Szczepankowo.

W oddziałach 90 i 20 omawiane zbiorowisko porasta zagłębienia tzw. „oczek śródleśnych”. Podłoże ich jest stosunkowo bogate, gdyż w okresie wiosennym i jesiennym jest wzbogacane w składniki pokarmowe nanoszone przez spływającą wodę. W oddziałach 75, 11 i 34, zarośla łozowe kontaktują ze zbiorowiskami łąkowymi. Ich rozwój i istnienie w głównej mierze zależą od czasu utrzymywania się wysokiego stanu wody. W latach wilgotnych trwa on niemal przez cały rok. Bezpośredni kontakt tego zespołu z ubogimi i zakwaszonymi zbiorowiskami łąkowymi w mniejszym stopniu sprzyja procesowi wzbogacania podłoża w substancje pokarmowe i dlatego tego rodzaju siedliska są uboższe niż w zagłębieniach śródleśnych.

Przedstawiony w tabeli 3 skład florystyczny tego zespołu, jego fizjonomia i struktura, a także znaczenie dominujących grup syngenetycznych (tab. 4) oraz stosunki ekologiczne są podobne jak w zaroślach łozowych opisanych w wielu miejscach Polski północno-wschodniej (Matuszkiewicz 1952; Sokołowski 1962, 1969; Denisiuk 1963; Polkowski 1963; Faliński 1965; Faliński 1965; Faliński, Matuszkiewicz 1965; Kępczyński 1965; Rejewski 1971) oraz Pomorza Zachodniego (Celiński 1962; Jasnowski 1962; Celiński, Piarczyńska 1966; Jutrzenka-Trzebiatowski 1968).

Tabela 4 — Table 4

Struktura systematyczna zespołu *Salici-Franguletum*
 Systematic structure of *Salici-Franguletum*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
<i>Alnetea glutinosae</i>	11	53	19,00	80,30	12,56
<i>Phragmitetalia</i>	15	57	20,43	63,33	12,94
<i>Molinietalia</i>	11	41	14,69	62,12	9,11
<i>Scheuchzeria-Caricetea fuscae</i>	11	42	15,06	63,63	9,58
Towarzyszące (Accompanying sp.)	33	86	30,82	43,43	13,38
Razem (Total)	81	279	100,00	—	—

Carici-elongatae-Alnetum (Koch 1926) Tx. et Bodeaux 1955

Oles (olszyna)

Olesy nie zajmują dużej powierzchni na terenie Wzgórz Dylewskich. W postaci najbardziej typowej rozwijają się one w południowej części badanego terenu, w bezpośrednim sąsiedztwie jezior Żynowiec i Straszewo oraz w uroczyskach: Szyldak, Durąg i Domkowo II. Małe płaty lasów olszowych rozwijają się ponadto w południowo-wschodnim skraju jeziora Dąbrowskiego Wielkiego, w uroczysku Fiugajki — niedaleko Starego Miasta i w oddziale 110 uroczyska Dylewo.

Warunki siedliskowe typowej postaci lasów olszowych są zawsze dość ściśle określone i dlatego na badanym terenie nie różnią się w sposób istotny od tych, w jakich olesy najczęściej rozwijają się na obszarze Polski i krajów ościennych. Porastają one przeważnie glebę torfową (ryc. 4), powstałą z torfu torfowisk olszynowych, a tworzącą się w warunkach niedostatecznej aeracji powodowanej zbyt długo trwającą powierzchniową stagnacją wody. Na terenie Wzgórz Dylewskich istotne znaczenie dla przebiegu procesów glebotwórczych w olszynach mają periodyczne wahania poziomu wody gruntowej, stwarzające okresowo korzystniejsze warunki dla tlenowego rozkładu materii organicznej, a tym samym powstawania próchnicy. Do ciągłego użyźniania podłoża przyczyniają się także poziome i pionowe ruchy wody powierzchniowej. Powodują one stałe namulanie gleby torfowej, a przez to wzbogacają ją w cząstki mineralne i składniki przyswajalne pochodzenia organicznego. Ruchami wody można, między innymi, tłumaczyć dość równomierny rozkład w profilu 24 składników przyswajalnych (P_2O_5) i (K_2O), utrzymywanie się prawie obojętnego odczynu i stosunkowo korzystnego stosunku C/N w warstwie wierzchniej (tab. 5).

Ryc. 4. Profil glebowy w zespole *Carici elongatae*-*Alnetum*
Fig. 4 — Soil profile of the association *Carici elongatae*-*Alnetum*

Objaśnienia:

a) Morfologia profili glebowych: 1 — ściółka liściasta, 2 — ściółka iglasta, 3 — ściółka mieszana, 4 — podpoziom humifikacyjny, 5 — poziom próchniczny, 6 — poziom brunatnienia, 7 — poziom przemywania, 8 — poziom iluwalny gleb pływów, 9 — oglejenie opadowe, 10 — oglejenie oksyredukcyjne, 11 — oglejenie gruntowe słabe, 12 — oglejenie gruntowe średnie, 13 — oglejenie gruntowe silne, 14 — oglejenie opadowe marmurowate, 15 — torf, 16 — skała macierzysta, 17 — skała podścielająca, 18 — korzenie traw i ziół, 19 — korzenie drzew, 20 — kamienie, 21 — chodniki dżdżownic, 22 — kretowiny, 23 — lustro wody gruntowej

b) Skład mechaniczny: 1 — piasek luźny, 2 — piasek słabo gliniasty, 3 — piasek gliniasty lekki, 4 — piasek gliniasty mocny, 5 — glina lekka silnie spiaszczona, 6 — glina lekka słabo spiaszczona, 7 — glina średnia, 8 — utwór pyłowy zwykły, 9 — utwór pyłowy ilasty.

Explantations:

a) Soils profile morphology: 1 — leafy litter, 2 — coniferous litter, 3 — mixed litter, 4 — humification sub-horizon, 5 — humus horizon, 6 — brown horizon, 7 — leaching horizon, 8 — illuvial horizon, 9 — pseudogleying, 10 — oxyreducing gleying, 11 — weakly reducing gleying, 12 — middle reducing gleying, 13 — strong reducing gleying, 14 — marble pseudogleying, 15 — peat, 16 — mother rock, 17 — underlying rock, 18 — roots of herbal plants, 19 — roots of trees and shrubs, 20 — stones, 21 — rain-worm tunnels, 22 — moleworms, 23 — ground water-level

b) Mechanical composition: 1 — loose sand, 2 — slightly loamy sand, 3 — light loamy sand, 4 — strong loamy sand, 5 — strongly sandy loam, 6 — lightly sandy loam, 7 — medium-heavy loam, 8 — light silt loam, 9 — clayey silt loam.

Olesy dylewskie, to typowe zbiorowisko leśne, charakteryzujące się czterowarstwową strukturą roślinności.

Ich drzewostan buduje głównie olsza czarna, uzupełniana niekiedy przez brzozę brodawkowatą, olszę szarą i jesion wyniosły (ryc. 5). Warstwę krzewów tworzą zazwyczaj odrośla i podrost olszy czarnej wraz z kruszyną, wierzbą szarą i innymi gatunkami.

Powierzchnia leśna w obrębie olesów odznacza się zawsze budową kąpiastą. Powoduje to zróżnicowanie warunków ekologicznych wewnątrz zbiorowiska i mozaikowy układ roślinności runa. Stale występujące ponad wodą kopulaste powierzchnie kęp porośnięte są głównie przez gatunki charakterystyczne dla zespołu *Carici elongatae*-*Alnetum* i klasy *Alnetea glut-*

Tabela 5 — Table 5

Niektóre właściwości chemiczne gleby w zespole *Carici elongatae-Alnetum*Some chemical properties of soil in *Carici elongatae-Alnetum* association

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		C %	N ogólny Total N %	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			w in H ₂ O	w in KCl					

Gleba torfowa wytworzona z torfu torfowiska niskiego olszynowego
Peaty soil formed from peats of alder lowmoor

24	Durąg	A ₀ /T 2-30	6,5	6,2	38,150	2,2512	16,1	15,45	4,40
	11	T ₂ 30-50	6,6	5,8	36,600	2,0056	18,2	13,40	5,40
	314	T ₃ 50-150	6,8	6,0	38,700	1,7584	22,0	12,00	3,70

Ryc. 5. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w zespole *Carici elongatae-Alnetum*Fig. 5. Diagram of biological structure of the woody layer in association *Carici elongatae-Alnetum*

1 — *Alnus glutinosa*, 2 — *Betula pubescens*
3 — *Alnus incana*

nosae. Na badanym terenie są one liczniej uzupełniane przez eutroficzną roślinność związku *Alno-Padion*, klasy *Querco-Fagetea* i rzędu *Molinieta-lia*. W zalewanych przez dłuższy czas i zamulanych obniżeniach między kępami dominują zazwyczaj przedstawiciele rzędu *Phragmitetalia*. W pełni lata mogą im towarzyszyć niektóre gatunki rzędu *Molinietalia* i klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*. Po wiosennych roztopach i w okresie wczesnoletnim liczniej pojawia się także *Lemna minor* i *L. trisulca*, a niekiedy nawet *Hottonia palustris*.

Tabela 6

Carici elongatae - Alnetum /Koch 1926/ Tx.et Bodeux 1955

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Nr zdjęcia /Number of record/	294	301	302	303	304	299	300	293	297	315	314	305	306	307	
Data /Date/	18.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	18.6	17.6	16.6	16.6	15.7	15.7	15.7	
	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
Leśnictwo /Forestry/	Dyl	Sam	Sam	Sam	Sam	Sam	Sam	Dyl	Sam	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	
Uroczysko /Range/	Dyl	Sam	Sam	Sam	Sam	Sam	Sam	Dyl	Sam	Szyl	Szyl	D.II	D.II	D.II	
Nr oddziału /No of section/	110	242g	242g	242g	251	242	242	110	239b	11c	11c	34	34	34	
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a %	70	50	50	75	75	70	70	75	70	70	80	60	70	Stopień stałości
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	b %	10	10	10	20	25	30	50	10	40	20	25	30	40	/Constancy/
Fokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	c %	70	75	75	85	80	85	85	85	80	80	80	90	90	1-3 4-14
Fokrycie warstwy mchów /Cover of moss layer/	d %	40	50	60	40	50	60	60	40	50	60	60	40	40	
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	150	150	200	300	300	400	400	250	200	300	300	250	250	
Liczba gatunków /Number of species/		38	45	47	61	65	70	70	65	65	70	72	75	65	

a				b												
I	Ch. Carici elongatae-Alnetum															
	Ribes nigrum	b,c	1.1	+	+	2.3	1.2	2.2	2.2	1.1	+	2.2	1.2	2.2	1.2	+
	Solanum dulcamara	c	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	+
	Carex elongata		.	.	+	1.2	.	1.2	+	1.2	1.2	+	+	+	+	3
II	Ch. Alnetea glutinosae															
	Frangula alnus	b,c	.	+	+	+	1.1	2.3	1.1	1.1	2.2	1.2	1.1	+	2.2	+
	Salix cinerea	b	+	+	.	.	+	.	1.2	1.2	1.2	2.2	2.3	2.3	2.3	1
	Salix pentandra	b	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.2	1.2	1
	Salix aurita	b	.	.	.	.	.	2.2	1.2	.	.	.	.	.	.	1
	Lyopopus europaeus	c	1.1	+	+	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	3
	Dryopteris thelypteris		+	+	1.2	3.3	2.3	2.3	2.3	.	2.3	2.3	3.3	2.3	1.2	1.2
	Calamagrostis canescens		+	.	.	.	1.2	1.2	2.2	1.2	1.2	+	+	+	1.2	1
	Calla palustris		.	1.2	+	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	2
	Dryopteris cristata		.	.	.	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	1
	Sphagnum squarrosum	d	.	+	+	2.2	1.3	3.3	2.3	1.2	2.3	2.2	1.2	1.3	1.3	+
III	Ch. Alno-Padion															
	Alnus incana	a	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1.2	2.3	2.3	-
	"	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.2	1.2	III
	Fagus avium	b,c	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.2	1.2	1
	Equisetum pratense	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.2	1.2	1.2	II
	Stellaria nemorum		.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	1.2	1.2	1.2	1
	Matium undulatum	d	.	.	.	1.2	1.2	1.2	2.2	2.3	1.2	1.2	2.3	2.3	2.3	V
IV	Ch. Querco-Fagetea															
	Fraxinus excelsior	b	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	-
	"	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	Humulus lupulus	b,c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	-
	Impatiens noli-tangere	c	1.2	+	1.2	1.2	1.3	2.3	2.2	2.2	1.2	2.2	.	2.2	+	II
	Fanis quadrifolia		.	.	.	.	.	1.2	+	1.2	.	.	+	1.2	+	IV
	Adoxa deschatellina		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.2	1.2	1.2	I
	Euragmonium zwertzii	d	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	+	1.2	II
	Euragmonium zwertstedtii		.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	+	+	I
V	Ch. Molinietalia															
	Lythrum salicaria	c	.	+	.	1.2	1.1	1.1	1.2	+	1.1	1.1	1.1	+	1.1	1
	Lysimachia vulgaris		+	2.2	+	1.2	1.2	1.1	+	2.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	V
	Crepis paludosa		.	.	.	1.2	1.1	1.1	+	1.2	+	2.2	2.2	1.2	1.2	V
	Cirsium palustre		1.1	+	1.2	+	+	1.1	+	+	+	.	.	+	+	V
	Filipendula ulmaria		+	+	1.2	+	+	1.1	+	+	+	1.1	2.2	1.1	2.2	V
	Callitriche palustris		1.2	+	1.2	+	+	1.2	1.2	1.2	+	+	+	+	+	V
	Myosotis palustris		+	1.2	+	+	1.1	1.2	+	+	+	+	+	+	+	V
	Geum rivale		.	+	+	+	+	.	1.2	+	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	V
	Cirsium oleraceum		.	.	.	+	+	.	.	+	.	1.1	2.2	2.3	2.3	IV
	Deschampsia caespitosa		.	+	+	.	.	.	+	+	.	+	+	+	+	III
	Valeriana officinalis		.	.	.	.	+	.	.	.	.	1.1	+	+	+	III
	Heracleum sibiricum		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1.1	II
	Scirpus silvaticus		1.1	3.3	2.3	.	+	.	+	.	.	.	+	+	1.1	II
	Epilobium parviflorum		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	I
	Stachys palustris		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I
	Geranium palustre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	I
VI	Ch. Paragitetalia															
	Carex acutiformis	c	2.3	1.2	2.3	1.2	2.3	3.3	2.2	3.3	3.4	3.4	3.4	2.3	2.3	2.2
	Carex vesicaria		.	+	.	+	1.2	+	1.2	2.3	1.2	2.2	2.3	+	1.2	1.2
	Galium palustre		1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	3
	Carex rostrata		+	.	.	1.2	1.2	+	+	1.2	+	+	1.2	1.2	1.2	3
	Eragrostis communis		+	+	+	2.3	1.2	2.3	2.3	+	1.2	+	1.2	+	2.2	3
	Carex pseudocyperus		+	.	.	3.3	1.2	+	1.2	.	1.2	.	1.2	+	+	V
	Carex paniculata		.	.	+	1.2	2.2	2.2	2.3	1.2	1.2	+	1.2	+	+	IV
	Scrophularia alata		1.2	+	+	+	+	1.2	+	+	.	.	1.1	.	.	IV
	Rumex hydrolapatnum		.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	2
	Scutellaria galericulata		+	+	+	+	1.2	.	+	+	+	+	.	.	.	III
	Cicuta virosa		.	.	.	1.1	+	.	1.1	.	.	.	.	.	.	2
	Equisetum limosum		3.4	4.5	4.5	+	+	1.2	1.2	.	+	.	.	.	.	3
	Sium latifolium		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
	Cerastium aquatica		+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
	Lysimachia thyrsoflora		+	1.1	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	3
	Typsa latifolia		.	.	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	3
	Alisma plantago-aquatica		+	+	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	1
VII	Ch. Scheuchzerio-Caricetea fuscae															
	Viola palustris	c	.	.	+	1.2	1.2	1.3	1.2	.	1.2	1.2	2.2	1.2	1.2	1
	Comarum palustre		+	+	+	+	1.2	+	+	+	.	.	+	.	.	3
	Carex canescens		.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	+	.	.	III
	Epilobium palustre		+	1.1	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1
	Stellaria palustris		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
	Menyanthes trifoliata		.	1.2	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	2
	Carex stellulata		.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	2
	Carex lasiocarpa		.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1
VIII	Gatunki towarzyszące /Accompanying species/															
	Alnus glutinosa	a	4.3	3.2	3.2	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.4	3.3	3.2	3.3
	"	b	.	1.2	1.2	2.2	1.2	1.2	2.2	+	.	+	1.1	.	.	.
	"	c	.	+	.	1.2	+	.	+	+	+	+	.	.	.	.
	Betula pubescens		.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Sorbus aucuparia	b,c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV
	Cardamine emera	c	3.4	3.3	3.4	2.2	2.3	2.2	1.2	2.4	.	+	.	+	2.2	2.2
	Athyrium filix-femina		.	.	.	+	1.2	+	+	1.2	.	+	1.2	+	+	3
	Urtica dioica		+	+	+	1.2	+	1.2	1.2	1.2	.	+	1.2	1.1	2.3	3
	Rubus idaeus		.	.	.	.	1.2	+	.	.	+	+	1.2	+	1.1	+
	Dryopteris spinulosa		.	.	.	1.2	1.2	1.2	1.2	.	+	1.2	+	1.2	1.2	V
	Eupatorium cannabinum		.	.	.	2.2	1.2	2.3	2.2	+	1.2	1.2	2.2	.	.	+
	Leana minor		2.3	1.2	+	+	1.3	+	1.2	.	2.3	1.2	1.2	.	1.3	3
	Galium asperine		.	+	+	.	1.2	.	+	.	.	.	.	.	.	IV
	Ranunculus repens		.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	2.2	+	2.2	2
	Leana trisulca		.	1.2	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	1
	Hottonia palustris		.	.	.	+	+	.	+	1.2	1.2	1.2	.	.	.	1
	Wagantemum bifolium		.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1
	Valeriana dioica		.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	1
IX	Mchy i wątrobowce towarzyszące /Accompanying mosses and liverworts/															
	Calliergon cuspidatum	d	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	1.2	2.2	3
	Climacium dendroides		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3
	Matium affine var. elatum		.	+	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2	1.2	2.3	2.2	1.2	+	+	V
	Matium cuspidatum		.	.	.	.	1.2	1.2	2.2	+	1.2	1.2	1.2	+	+	2
	Matium hornum		.	.	.	1.2	+	2.3	1.2	+	1.2	1.2	1.2	+	+	V
	Matium punctatum		.	.	.	.	+	+	+	+	1.2	1.2	1.2	+	+	V
	Fruidium tamariscifolium		.	.	.	+	+	+	+	+	1.2	1.2	1.2	+	+	V
	Matium affine		1.2	.	.	.	+	.	.	+	1.2	1.2	1.2	+	+	IV
	Georgia pellucida		+	.	+	.	.	.	+	+	1.2	1.2	1.2	1.2	+	IV
	Lophocolea heterophylla		.	.	.	.	.	.	+	+	1.2	1.2	1.2	+	+	IV
	Polytrichum attenuatum		.	.	.	.	+	+	+	+	1.2	1.2	1.2	+	+	1
	Sphagnum palustre		2.3	2.3	3.3	+	1.3	1.3	2.3	1.2	.	+	+	+	+	3
	Plagiotechium neglectum		.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	+	.	1.2	III

U schyłku lata, kiedy kończą wegetację gatunki zielne, intensywnie zaczynają się rozwijać mszaki. Swoim gromadnym występowaniem tworzą one ostatni aspekt tego zespołu.

Skład florystyczny olesów przedstawiono w tabeli 6, a ich strukturę systematyczną obrazuje tabela 7.

Tabela 7 — Table 7

Struktura systematyczna zespołu *Carici elongatae-Alnetum*

Systematic structure of *Carici elongatae-Alnetum*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) kl. <i>Alnetea glutinosae</i>	13	122	13,80	67,03	9,25
Ch. <i>Quercu-Fagetea</i>	21	66	7,48	22,44	1,68
Ch. <i>Phragmitetalia</i>	19	146	16,53	54,89	9,08
Ch. <i>Molinietalia</i>	18	142	16,00	56,35	9,02
Ch. <i>Scheuchzerio-Caricetea fuscae</i>	8	44	4,98	39,28	1,96
Gat. towarzyszące (Accompanying species)	71	363	41,21	36,52	15,05
Razem (Total)	150	883	100,00		

Podobny udział grupowy i zbliżone wartości systematyczne dla gatunków z klasy *Alnetea glutinosae* oraz przedstawicieli rzędów *Molinietalia* i *Phragmitetalia* stanowią cechę charakterystyczną tego zbiorowiska, gdyż są konsekwencją dużego zróżnicowania siedliska wewnątrz jego płatów, a w pewnym zakresie wynikają również ze stałego sąsiedztwa badanych olszyn ze zbiorowiskami szuwarowymi lub podmokłych łąk. Wysoka grupowa wartość systematyczna gatunków charakterystycznych dla zespołu i klasy *Alnetea glutinosae* jest przede wszystkim rezultatem wysokiej ich stałości, natomiast niemałe znaczenie elementów szuwarowych i podmokłych łąk wynika ponadto z ich większej ilości. Udział przedstawicieli związku *Alno-Padion* i klasy *Quercu-Fagetea* jest przeważnie niewielki, lecz w poszczególnych zdjęciach dość różny.

Duże znaczenie gatunków towarzyszących w głównej mierze jest wynikiem licznego występowania mchów (45 gatunków). Zielnych gatunków towarzyszących odnotowano 26. Ich niższa stałość powoduje, że nie odgrywają one większej roli niż pozostałe ważne grupy syngenetyczne.

Fitocenozy zespołu *Carici elongatae-Alnetum* z terenu Wzgórz Dylewskich różnicują się na dwie grupy (a i b). Pierwszą z nich tworzą zdjęcia 1-3, a do drugiej (b) zaliczono resztę badanych płatów.

Dla pierwszej grupy zdjęć bardzo znamienny jest duży udział zbiorowy ($G=24,81$) i wysoka przeciętna stałość ($S=68,75$) gatunków szuwarowych. Niektóre z nich występują nawet licznie, a *Equisetum limosum* stale dominuje w runie. Tak duży udział roślinności szuwarowej powoduje, że

pozycja tej jednostki systematycznej jest niewyraźna. Stanowi ona bezspornie jedno z ogniw łączących w naturalnym ciągu sukcesyjnym olszynę typową ze zbiorowiskami rzędu *Phragmitetalia*. W niniejszej pracy określono ją jako fację z *Equisetum limosum* zespołu *Carici elongatae-Alnetum*.

Podobne zbiorowisko rozwija się w sąsiedztwie większych zbiorników wodnych w wielu miejscach na Pojezierzu Olsztyńskim i Pojezierzu Iławskim.

Pozostałe zdjęcia (4-14) przedstawiają typową formę zespołu *Carici elongatae-Alnetum*. Odnaczają się one dość stałym składem florystycznym. Jedyne trzy ostatnie wyróżnia większy udział gatunków związku *Alno-Padion*, klasy *Quercus-Fagetea* i rzędu *Molinietalia* oraz zmniejszony udział przedstawicieli rzędu *Phragmitetalia*.

Stanowisko systematyczne dylewskich lasów olszowych określono opierając się na opracowaniach syntetycznych dotyczących zbiorowisk klasy *Alnetea glutinosae* z Europy środkowej (Bodeux 1955) i Polski (Matuszkiewicz; Traczykowie 1958) oraz bogaty materiał porównawczy zawarty w pracach wykonanych na terenie Wielkopolski (Piotrowska 1950; Krotoska 1953; Wojterski 1960; Mielcarski 1969), Pomorza Zachodniego (Piotrowska 1955; Celiński 1962); Jasnowski 1962; Sokołowski 1965; Celiński, Piarczyńska 1966; Boiński 1973), krain sąsiednich (Polakowski 1961; Tokarz 1964; Falińscy 1965; Faliński 1965; Rejewski 1971; Kępczyński 1965; Kępczyński, A. Noryśkiewicz 1968; Kępczyński, B. Noryśkiewicz 1968; Polakowski, Jutrzenka-Trzebiatowski 1976 — maszynopis), Podlasia i Puszczy Białowieskiej (Matuszkiewicz 1952; Denisiuk 1963; Sokołowski 1963, 1968, 1969), Rostocza (Izdębski 1963, 1966, 1967; Kozak 1967) oraz województwa łódzkiego (Urbanek 1966a; Mowszowicz i in. 1967, 1969). Typowa forma zespołu *Carici elongatae-Alnetum* z terenu Wzgórz Dylewskich wykazuje dużą zgodność w zakresie składu florystycznego, struktury systematycznej i warunków ekologicznych z analogicznymi zbiorowiskami z innych terenów Polski. Zaliczenie więc badanych olsów do zespołu *Carici elongatae-Alnetum* nie wzbudza zastrzeżeń.

Niemożliwe jest natomiast ustalenie ich przynależności do jednego z podzespółów zaproponowanych przez Matuszkiewicza i Traczyków (1958). Zgromadzony materiał zdjęciowy przedstawia zbiorowisko o charakterze zdecydowanie pośrednim między określonym jako zachodni podzespółem *Carici elongatae-Alnetum medioeuropaeum* a wschodnim *Carici elongatae-Alnetum dryopteridetosum cristatae*. W oparciu o własne obserwacje z badanego terenu i całego Pojezierza Mazurskiego oraz wyniki badań z ostatnich lat trudno jest uważać *Dryopteris cristata* za podstawowy gatunek wyróżniający podzespół wschodni, gdyż paproć ta nie ogranicza się w swoim występowaniu jedynie do obszarów wschodnich.

Tam gdzie występuje częściej, wykazuje ponadto większe przywiązanie do zarośli łożowych (Celiński, Piarczyńska 1966; Rejewski 1971). Taki punkt widzenia potwierdzają także wyniki pracy Matuszkiewicza i Traczyków (1958), według których *Dryopteris cristata* w *Salici-Franguletum* występuje w 90% analizowanych zdjęć, a w *Carici elongatae-Alnetum*, wprawdzie tylko w postaci wschodniej, lecz zaledwie w 60%. Częste występowanie nieczernicy grzebieniastej odnotowano dotychczas jedynie w Stępnicy koło Zalewu Szczecińskiego (Celiński, Piarczyńska 1966), w Puszczy Kurpiowskiej (Faliński 1965) i Puszczy Białowieskiej (Matuszkiewicz 1952). Na pozostałym obszarze Polski paproć ta występuje w lasach olszowych sporadycznie lub w ogóle zaznacza się jej brak.

Płaty z dużą ilością *Dryopteris cristata* — na co słusznie zwrócił uwagę Rejewski (1971) — wyróżniają się większym udziałem *Salix cinerea*, *Salix aurita* i *Calla palustris* oraz znaczniejszą rolą niektórych gatunków z klasy *Schuechzerio-Caricetea fuscae*, a zwłaszcza *Menyanthes trifoliata* i *Comarum palustre*. Ich częstsze pojawianie się w omawianej postaci lasów olszowych należy chyba dlatego uważać za objaw ściślejszego powiązania tego typu olszyn z zaroślami łożowymi i traktować je jako określoną postać ekologiczną, a nie — odmianę geograficzną.

Circae-Alnetum Oberd. 1953

Łęg olszowo-jesionowy

Najbardziej typowe płaty łęgu olszowo-jesionowego znaleziono w uroczysku Dylewo — głównym kompleksie leśnym Wzgórz Dylewskich. Tam też wykonano wszystkie zdjęcia ilustrujące omawiane zbiorowisko. Jego znaczenie na badanym terenie jest obecnie niewielkie, gdyż zajmuje nie-dużą powierzchnię. Porasta przeważnie płaskie, często wydłużone, lecz niezbyt szerokie dna wąwozów. Tylko w oddziałach 55 i 110 zajmuje łagodne pochyłości z wyciekającą wodą podskórną.

Gleby zespołu *Circae-Alnetum* na terenie Wzgórz Dylewskich stanowią podłoże żyzne, bogate w materię organiczną i produktywnie, zawsze dość wilgotne i dlatego gruntowo oglejone.

W celu dokonania bliższej charakterystyki podłoża wykonano trzy profile glebowe. W dwóch z nich pobrano próbki do analizy laboratoryjnej (tab. 8 i 9) oraz opisano ich morfologię (ryc. 6). Otrzymane wyniki wskazują, że łęg olszowo-jesionowy na badanym terenie nie rozwija się na podłożu jednorodnym. Postać z panującą w drzewostanie *Alnus glutinosa* porasta glebę torfowo-glejową (profil 17), względnie mułowo-glejową (profil nie analizowany), z próchnicą hydromulłową i poziomem próchnicznym o grubości około 35 cm. Postać z panującym *Fraxinus excelsior* zajmuje glebę szarobrunatną, będącą odpowiednim siedliskiem także dla żyznych postaci grądu i buczyny.

Tabela 9 — Table 9

Niektóre właściwości chemiczne gleb w zespole *Circaeol-Alnetum*
Some chemical properties of soils in *Circaeol-Alnetum* association

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
			w in H ₂ O	w in KCl							
			%								
Gleba torfowo-glejowa zalegająca na piaskach gliniastych Peaty-gley soil underlying by loamy sands											
17	Dylewo 114 273	T	2-14	—	3,6	—	39,150	2,3240	16,8	11,30	23,50
		A ₁	14-28	4,3	3,6	6,137	3,560	0,2016	17,6	4,30	3,10
		CGor	28-55	5,3	4,6	0,385	0,222	0,0168	13,2	13,05	2,20
		CGr	55-125	5,4	4,5	0,704	0,414	0,0224	18,5	20,30	1,80
Gleba szarobrunatna wytworzona z gliny zwałowej lekkiej Gray-brown soil formed from boulder sandy clay											
4	Dylewo 123 63	A ₁	3-18	5,0	4,2	5,672	3,290	0,2688	12,2	10,90	12,30
		A ₁ (B)g	18-28	4,7	4,0	4,465	2,590	0,1820	14,2	9,10	5,70
		A ₁ (B)	28-60	4,8	4,0	2,500	1,450	0,1232	11,7	10,90	6,00
		(B)Gor	60-100	5,2	4,2	0,963	0,558	0,0504	11,1	17,90	5,70
		CGor	100-140	5,1	4,1	0,848	0,492	0,0476	10,3	17,20	4,30

Ryc. 6. Profile glebowe w zespole *Circaeo-Alnetum*
 Fig. 6. Soil profiles of the association *Circaeo-Alnetum*
 (Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in fig. 4)

Stosunkowo wysokie — jak na ten typ zbiorowiska — zakwaszenie badanych gleb może być wynikiem bliskiego kontaktu fitocenozy tego zespołu ze świerkowym borem mieszanym (profil 17) i kwaśną buczyną (profil 4).

Płaty zespołu *Circaeo-Alnetum* z panującą w drzewostanie olszą czarną upodobią się pod względem fizjonomii i struktury drzewostanu do olesów. Brak tu jednak budowy kępiastej na dnie lasu. Wszystkie gatunki runa są zawsze rozproszone po całym płacie i równomiernie wymieszane. Świadczy to, że podłoże w poszczególnych płatach jest jednorodne. W naturalnym układzie stosunków edaficznych olsza wtedy buduje drzewostan zespołu *Circaeo-Alnetum*, jeżeli w podłożu utrzymuje się dość długo wysoki poziom wody gruntowej. W warunkach dla siebie optymalnych zbiorowisko to odznacza się drzewostanem olszowo-jesionowym, natomiast widoczna przewaga jesionu jest odznaką wkraczania w ostatni etap sukcesji. Inne gatunki (np. *Quercus robur* lub *Fagus silvatica*) spotyka się tu jednostkowo i sporadycznie.

Ryc. 7. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w zespole *Circaeo-Alnetum*

Fig. 7. Diagram of biological structure wood-layer in association *Circaeo-Alnetum*

1 — *Alnus glutinosa*, 2 — *Fraxinus excelsior*

Ryc. 8. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w zespole *Circae-Alnetum*

Fig. 8. Diagram of biological structure wood-layer in association *Circae-Alnetum*

1 — *Alnus glutinosa*, 2 — *Fraxinus excelsior*

Strukturę drzewostanu i jego skład gatunkowy obrazują wykresy ryc. 7 i 8. Bardziej interesujący jest wykres 7, gdyż zwraca uwagę na duże podobieństwo drzewostanów w łęgu olszowo-jesionowym i olszynie typowej (ryc. 5), a jednocześnie uwypukla zaznaczające się między nimi różnice. W łęgu olszowo-jesionowym olsza czarna wykazuje większą dyspersję klas grubości. Jeżeli przyjmie się, że średnica drzew jest wprost proporcjonalna do ich wieku, to olszowy drzewostan w łęgu uznać trzeba za różnowiekowy i nieco starszy niż w olszynie. Udział olszy czarnej w szerokim zakresie klas grubości oraz częste pojawianie się w jej podroście, świadczy o naturalnym odnawianiu się tego drzewostanu.

Wykres ryciny 8 pozwala przypuszczać, że jesionowy drzewostan w zdjęciu 63 ma strukturę co najwyżej półnaturalną, gdyż przeważająca liczba egzemplarzy jest zbliżona wiekiem. Został on sztucznie nasadzony przez człowieka albo odnowił się z samosiewu po dokonanych uprzednio wyrębie.

Warstwa krzewów wyróżnia się przeważnie niezbyt silnym zwarcie, a tworzą ją głównie gatunki drzewiaste. Warunki świetlne na dnie lasu kształtują się przez to dość korzystnie, co przy wysokiej żyzności i dużej wilgotności podłoża umożliwia niezwykle bujny rozwój roślinności zielnej.

Runo fitocenoz tego zespołu, choć odznacza się wyraźną zmiennością facjonalną, w ciągu całego okresu wegetacyjnego w całości pokrywa podłoże. W okresie wiosennym dominują geofity. Najliczniej występuje wtedy: *Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*, *Ficaria verna* i *Chrysosplenium alternifolium*, a uzupełniają je: *Corydalis fabacea*, *C. cava* oraz *Adoxa moschatellina*.

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr zdjęcia /Number of record/	272	156	157	273	167	168	124	63	
	30.8	2.5	2.5	30.8	2.5	2.5	19.7		
Data /Date/	68	68	68	68	68	68	67	14.6	
	18.6	22.5	22.5	18.6	23.5	23.5	3.5	67	
	69	68	68	69	68	68	68		
Leśnictwo /Forestry/	Dyl	Bed	Bed	Dyl	Bed	Bed	Bed	Dyl	
Uroczysko /Range/	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	
Nr oddziału /No. of section/	105f	55	54	114	53	54	59	123	Stopień
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a %	80	70	70	75	70	80	85	stałości
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	b %	5	15	30	5	25	40	10	/Constancy/
Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	c %	95	95	90	90	95	90	95	95
Pokrycie warstwy mchów /Cover of moss layer/	d %	60	30	30	40	25	40	20	30
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	300	250	200	250	250	200	250	250
Liczba gatunków /Number of species/		63	54	51	60	55	58	64	62

I Ch. Circaseo-Alnetum
i /and/ Alno-Padion

Radus avium	b	1.2	2.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.2	I
Stachys silvatica	c	1.2	2.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.2	V
Stellaria nemorum		2.2	3.5	1.2	2.3	3.4	2.3	1.2	2.2	V
Chrysosplenium alternifolium		1.2	2.3	1.2	1.3	2.3	1.2	1.2	1.2	V
Carex remota		1.2	1.2	+2	2.2	+2	+2	+2	1.2	V
Festuca gigantea		1.2	+2	+2	1.2	+2	+2	1.2	1.2	V
Picaria verna		2.2	3.4	3.4	1.2	3.4	3.3	2.3	3.4	V
Equisetum silvaticum		2.2	+2	+2	2.2	2.4	1.2	1.2		V
Circaea alpina		1.2	+2	+2	1.2			+2	+2	IV
Agropyron caninum		+2	1.2	+2	1.2		+2			IV
Equisetum pratense		+2			1.2	+2	2.3		1.1	IV
Chaerophyllum aromaticum				+		+2	+		1.1	IV
Circaea lutetiana				+2	+2	1.1			+2	III
Poa remota			1.2	+2						II
Circaea intermedia				+2						I
Veronica montana									+2	I
Mnium undulatum	d	3.3	1.2	1.2	2.3	1.2	2.2	1.2	2.2	V

II Ch. Fagetalia silvaticae

Fraxinus excelsior	a	.	.	+	2.1	2.3	3.4	3.4	4.4	IV
" "	b	.	.	.	.	2.3	3.4	+	+	
" "	c	.	.	.	.	.	.	1.1	1.1	
Fagus silvatica	a	.	.	+	/+ /	.	.	.	.	II
" "	b	.	.	+	.	.	.	.	.	
Ulmus scabra	c	.	.	.	.	.	.	+	+	II
Impatiens noli-tangere	c	1.2	2.4	1.2	3.4	1.2	+2	1.2	2.2	V
Anemone ranunculoides		2.2	2.3	2.3	2.2	+2	1.2	+2	2.3	V
Dryopteris filix-mas		1.2	.	+2	1.2	+2	1.2	1.2	+2	V
Galeobdolon luteum		.	.	1.2	2.3	1.2	2.2	2.2	+	IV
Milium effusum		1.2	.	.	+2	+2	+2	+	+2	IV
Paris quadrifolia		+	1.2	.	.	.	1.1	+	+	IV
Adoxa moschatellina		1.2	1.2	.	+2	.	1.2	1.2	+	IV
Stellaria holostea		.	.	2.4	.	.	1.2	2.2	+2	III
Asperula odorata		.	.	.	.	+2	1.2	1.2	+	III
Carex silvatica		+2	.	.	1.2	.	.	+2	1.2	III
Corydalis fabacea		.	2.2	1.2	.	.	.	.	+	II
Corydalis cava		.	1.2	.	.	.	.	.	1.2	II

III Ch. Querco-Fagetea

Corylus avellana	b	.	+	2.3	.	.	+	.	.	II
" "	c	.	.	.	.	.	+	.	.	
Anemone nemorosa	c	2.3	3.4	3.5	2.2	3.4	4.5	4.5	2.3	V
Aegopodium podagraria		1.2	1.2	2.3	1.1	2.3	2.2	+	1.2	V
Geum urbanum		.	.	.	1.1	+	+	1.1	1.1	IV
Viola silvestris		.	.	.	.	.	.	.	+	II
Eurhynchium swartzii	d	2.3	1.2	2.2	2.2	1.2	2.2	1.2	1.2	V
Eurhynchium zetterstedtii		.	.	.	.	1.2	+2	+2	1.2	III

IV Ch. Molinietalia

Deschampsia caespitosa	c	1.2	+2	+2	1.2	.	+2	1.2	+2	V
Filipendula ulmaria		1.1	+2	1.1	.	+	+	+	+	V
Lysimachis vulgaris		1.1	1.2	+	+	.	.	+	+	V
Cirsium oleraceum		1.1	+	.	.	.	.	+	+	IV
Crepis paludosa		+2	1.2	+2	.	+	+	.	.	IV
Geum rivale		.	1.1	1.1	.	1.1	1.1	.	.	III
Heracleum sibiricum		+	.	1.1	.	.	.	+	+	II
Cirsium palustre		+	.	+	.	.	.	.	.	II
Caltha palustris		.	1.2	.	/+2/	.	.	.	.	II
Juncus effusus		+2	.	.	+2	.	.	.	.	II
Scirpus silvaticus		1.2	+2	.	.	.	.	.	.	II

V Gatunki towarzyszące
/Accompanying species/

<i>Alnus glutinosa</i>	a	4.5	4.3	4.4	4.4	3.4	2.2	+2	+2	V
"	b,c	+	+3	+	+2	+	.	.	.	V
<i>Quercus robur</i>	a	.	.	.	+	.	.	2.2	.	II
"	b	.	.	.	+	.	.	.	.	II
<i>Frangula alnus</i>	b	+	.	.	.	.	.	.	.	II
<i>Urtica dioica</i>	c	1.2	3.4	3.4	2.3	3.5	1.2	4.4	4.5	V
<i>Rubus idaeus</i>		3.4	1.2	2.3	1.2	2.3	1.1	2.3	+	V
<i>Cardamine amara</i>		1.2	2.3	1.3	1.2	+2	+2	+2	+	V
<i>Oxalis acetosella</i>		1.2	1.2	.	+2	+2	.	+2	+2	IV
<i>Athyrium filix-femina</i>		2.3	1.2	.	1.2	1.2	.	1.2	1.2	IV
<i>Dryopteris spinulosa</i>		1.2	1.2	+2	+2	.	.	1.2	+2	IV
<i>Dryopteris austriaca</i>		1.2	1.2	+2	.	1.2	+2	.	.	IV
<i>Viola palustris</i>		1.1	1.2	+2	1.2	.	.	.	.	III
<i>Rumex obtusifolius</i>		+	.	.	1.1	+	.	.	+	III
<i>Ajuga reptans</i>		.	.	+	+	+	.	.	.	III
<i>Galeopsis pubescens</i>		1.1	.	.	+	+	1.2	.	.	III
<i>Geranium robertianum</i>		.	+	+	.	+	+	.	.	III
<i>Galium palustre</i>		+	+	.	+	.	.	.	.	II
<i>Phegopteris dryopteris</i>		+2	.	.	.	1.3	1.3	.	.	II
<i>Ranunculus repens</i>		+	.	.	+	.	.	+	+	II
<i>Anthriscus silvestris</i>		.	.	+	.	+	.	+	.	II
<i>Mejanthemum bifolium</i>		1.1	.	.	.	.	.	.	.	II
<i>Rubus caesius</i>		.	.	.	.	.	+2	.	.	II
<i>Solanum dulcamara</i>		.	+2	.	1.2	.	.	.	.	II
<i>Impatiens parviflora</i>		1.2	.	.	1.2	.	.	.	.	II

VI Mchy i wątrobowce towarzyszące
/Accompanying mosses and liverworts/

<i>Mnium cuspidatum</i>	d	1.2	1.2	+2	1.2	+2	+2	1.2	1.2	V
<i>Mnium affine</i>		+2	1.2	1.2	+2	+2	+2	.	1.2	V
<i>Mnium affine var. elatum</i>		+2	1.2	+2	.	+2	.	+2	+2	IV
<i>Hypnum cupressiforme</i>		1.2	.	.	1.2	+2	+2	+2	+2	IV
<i>Plagiothecium neglectum</i>		+2	.	.	+2	.	1.2	1.2	1.2	IV
<i>Lophocolea heterophylla</i>		.	1.2	1.2	.	+2	.	+2	+2	IV
<i>Mnium hornum</i>		1.2	1.2	+2	.	+2	.	.	.	III
<i>Brachythecium rutabulum</i>		.	.	.	+2	+2	.	.	+2	III
<i>Climacium dendroides</i>		+2	1.2	+2	1.2	.	.	.	.	III
<i>Mnium punctatum</i>		+2	1.2	+2	.	.	.	+2	.	III
<i>Thuidium tamariscifolium</i>		+2	.	.	.	.	+2	+2	+2	III
<i>Georgina pellucida</i>		.	1.2	1.2	.	+2	.	+2	.	III
<i>Brachythecium velutinum</i>		.	.	.	+2	+2	.	.	+2	III
<i>Amblystegium serpens</i>		.	.	.	+2	.	+2	.	.	II
<i>Plagiothecium denticulatum</i>		.	.	.	+2	.	.	.	+2	II
<i>Lophocolea bidentata</i>		+2	.	+2	.	.	.	.	.	II
<i>Lepidosia reptans</i>		.	.	.	.	.	+2	+2	.	II
<i>Mnium rostratum</i>		+2	.	.	.	.	.	.	+2	II
<i>Dolichotheca seligeri</i>		.	.	.	.	.	.	+2	+2	II

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

- ad II *Melandrium rubrum* /2/, *Carpinus betulus* /6/, *Acer pseudoplatanus* /8/, *Dactylis aschersoniana* /7/, *Festuca silvatica* /1/, *Hepatica nobilis* /6/, *Phyteuma spicatum* /7/, *Actaea spicata* /8/, *Asarum europaeum* /8/, *Mercurialis perennis* /8/, *Ranunculus lanuginosus* /8/, *Viburnum opulus* /7/, *Ribes grossularia* /6/, *Catharinaea undulata* /8/.
- ad III *Scrophularia nodosa* /7/, *Moehringia trinervia* /7/, *Eurhynchium striatum* /6/.
- ad V *Betula pubescens* /1/, *Picea excelsa* /1/, *Sorbus aucuparia* /7/, *Pteridium aquilinum* /5/, *Rubus serpens* /6/, *Phegopteris polypodioides* /2/, *Ribes nigrum* /2/, *Carex rostrata* /1/, *Glyceria fluitans* /1/, *Carex vesicaria* /4/, *Veronica chamaedrys* /6/, *Vicia sepium* /6/, *Rubus belardii* /7/, *Galeopsis tetrahit* /1/, *Platanthera bifolia* /6/, *Hypericum maculatum* /5/, *Lapsana communis* /7/, *Carex stellulata* /4/, *Phalaris arundinacea* /4/, *Galium aparine* /5/.
- ad VI *Conocephalum concum* /2/, *Catharinaea tenella* /8/, *Rhytidiadelphus triquetrus* /6/.

Objasnienia /Explanations/

Bed - Bednarki, Dyl - Dylewo.

W pierwszej połowie czerwca w runie przeważa *Equisetum silvaticum* i *E. pratense*, tworząc bardzo znamieny dla tego zespołu aspekt. W drugiej połowie czerwca zanikają gatunki wczesnowiosenne, a rozpoczyna się intensywny rozwój wysokich bylin. Gatunki te tworzą najwyższą warstwę runa, przeważnie od 1 do 1,5 m wysoką. Przeważa wśród nich *Urtica dioica* i *Rubus idaeus*. W późniejszym okresie, wraz z *Chaerophyllum aromaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Lysimachia vulgaris*, *Cirsium oleraceum*, *C. palustre* i *Heracleum sibiricum*, tworzą one prawdziwą gęstwinię.

W pełni lata roślinność zielna runa różnicuje się więc na co najmniej

trzy warstwy. Najwyższą z nich tworzą wyżej wymienione byliny. Najliczniejszą w gatunki jest warstwa średnia. W niej, oprócz wspomnianych skrzypów, występuje często i licznie: *Stellaria nemorum*, *Impatiens noli-tangere*, *Stachys silvatica*, *Aegopodium podagraria* oraz paprocie. Najniższą warstwę zielną buduje: *Carex remota*, *Crepis paludosa*, *Oxalis acetosella*, *Viola palustris* i inne gatunki. Skład runa uzupełniają cieniolubne mszaki. Dzięki gromadnemu występowaniu *Mnium undulatum* i *Eurhynchium swartzii* na powierzchni gleby tworzy się często zwarty zielony kobierzec.

Skład florystyczny zespołu *Circae-Alnetum* przedstawia tabela 10, a jego strukturę systematyczną tabela 11.

Tabela 11 — Table 11

Struktura systematyczna zespołu *Circae-Alnetum*
Systematic structure of *Circae-Alnetum*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (assoc.), <i>Alno-Padion</i>	17	93	19,91	68,38	13,61
Ch. <i>Fagetalia</i>	29	86	18,42	37,07	6,83
Ch. <i>Quercu-Fagetea</i>	11	42	8,99	47,73	4,29
Ch. <i>Molinietalia</i>	11	47	10,06	53,41	5,37
Towarzyszące (Accompanying sp.)	64	199	42,61	38,87	16,56
Razem (Total)	132	467	99,99	—	—

Lęg olszowo-jesionowy jest bogaty w gatunki. Pełna jego lista florystyczna zawiera aż 132 taksony. Ilości gatunków w poszczególnych zdjęciach są zbliżone, a ich średnia wynosi 58.

Udział przedstawicieli określonych grup systematycznych w podanych zdjęciach jest dość podobny. Uwagę zwraca jedynie nierównomierny rozkład gatunków rzędu *Molinietalia*.

Ważną rolę w opisywanym zbiorowisku spełniają elementy związku *Alno-Padion*. Jest on reprezentowany przez 17 gatunków, z których 12 osiąga najwyższe (IV i V) stopnie stałości. Z wysokiej stałości wynika ich duży udział grupowy oraz wysoka wartość systematyczna. W omawianym zespole wyraźnie przewyższa ona te same wartości innych grup systematycznych. Dość duże znaczenie mają także gatunki rzędu *Fagetalia* i klasy *Quercu-Fagetea*. Jeżeli uwzględni się dodatkowo niedużą grupową wartość systematyczną gatunków towarzyszących zielnych ($D = 8,61$) i znikomy udział przedstawicieli klasy *Alnetea glutinosae* ($G = 0,01$), to trzeba stwierdzić, że zespół *Circae-Alnetum* na badanym terenie jest dobrze scharakteryzowany florystycznie, a jego stanowisko systematyczne nie budzi zastrzeżeń.

Do podobnego wniosku dochodzi się także porównując opisywane zbiorowisko z łęgami olszowo-jesionowymi z innych regionów Polski (Matuszkiewicz, Borowik 1957; Piotrowska 1960; Celiński 1962; Tokarz 1961; Polakowski 1961; Polakowski, Jutrzenka-Trzebiatowski 1976 — maszynopis; Matuszkiewicz 1952; Kępczyński 1965; Boińska 1970; Dziubałtowski, Kobendza 1933, 1934; Sokołowski 1963; Denisiuk 1963). Okazuje się, że zespół *Circaeo-Alnetum* w wielu miejscach naszego kraju nie posiada gatunków, które by go charakteryzowały w skali terytorialnej (Wojterski 1960; Urbanek 1966; Boiński 1973; Rejewski 1971; Kępczyński 1965). Zbiorowiska tego typu przeważnie utożsamia się z powyższym zespołem na podstawie charakterystycznego składu i struktury drzewostanu, swoistej kombinacji gatunków, roli poszczególnych grup syngenetycznych, a także gatunków charakteryzujących je lokalnie.

Przy pomocy gatunków proponowanych jako charakterystyczne przez Oberdorfera (1953) (*Padus avium*, *Microstylis monophyllos*, *Circaea alpina*) oraz Matuszkiewicza i Borowik (1957) (*Mnium undulatum*, *Equisetum silvaticum* i *Circaea alpina*) można ten zespół należycie scharakteryzować jedynie w Polsce północno-wschodniej (Tokarz 1961; Faliński 1965; Polakowski (1961; Polakowski, Jutrzenka-Trzebiatowski 1976; Matuszkiewicz 1952).

Na pozostałym terenie Polski niżowej mamy, być może, do czynienia z inną postacią geograficzną łęgu olszowo-jesionowego, albo prezentuje on określony wariant zachodniego *Pruno-Fraxinetum* (Matuszkiewicz 1967).

Na terenie Wzgórz Dylewskich szczególnie *Equisetum silvaticum* i *Circaea alpina* dobrze charakteryzują omawiane zbiorowisko. Oba są w nim częste, a jeżeli wystąpią licznie, to *Equisetum silvaticum* tworzy większe skupienia, natomiast *Circaea alpina* dość równomiernie rozprasza się po całym podłożu. *Mnium undulatum*, choć w łęgu olszowo-jesionowym ma optymalne warunki dla swojego rozwoju, nie charakteryzuje go dostatecznie dobrze, gdyż na badanym terenie posiada dość szeroką amplitudę ekologiczną (patrz. tab. 70). To samo można powiedzieć o *Padus avium*, która częściej występuje w *Alnetum boreale*, a pojawia się także w żyznych grądach. *Microstylis monophyllos* jest gatunkiem ginącym w naszym kraju i dlatego nie może spełniać tej roli.

Duże przywiązanie do zespołu *Circaeo-Alnetum* wykazuje natomiast *Carex remota*, *Crepis paludosa*, *Poa remota* oraz *Cardamine amara*. Takie zachowanie się tych gatunków nie jest zjawiskiem lokalnym, gdyż daje się zauważyć na całym terenie Polski niżowej. *Carex remota* i *Poa remota*, w sytuacji, kiedy podgórski zespół *Carici remotae-Fraxinetum* na niżu rozwija się nieczęsto, wykorzystują łęg olszowo-jesionowy jako swoje środowisko zastępcze.

Łęg borealny

Fitocenozy zespołu *Alnetum boreale* występują na glebach dyluwialno-
-aluwialnych zalegających nieraz w obrzeżeniu rzeczek i na dnie starorzeczy.
Częściej występują one dlatego w obwodowych partiach Wzgórz Dylewskich.
Większe powierzchnie zajmują w uroczyskach: Domkowo II, Szyl-
dak i Samin, a fragmentarycznie rozwijają się także w zachodniej części
uroczyska Zajązki.

Z powodu wyraźnie zaznaczającej się w tym zespole jednorodności sie-
dliska, dla zbadania jego stosunków glebowych wykonano tylko jedną od-
krywkę. Pobrano z niej próbki do analiz laboratoryjnych, których wyniki
podano w tabelach 12 i 13. Jego morfologię ilustruje rycina 9.

Ryc. 9. Profil glebowy w zespole *Alnetum boreale*
Fig. 9. Soil profile of the association *Alnetum boreale*
(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

Badany profil przedstawia glebę typu mady rzecznej czarnoziemnej,
wytworzonej z warstwowanych piasków gliniastych, przedzielonych utwo-
rem pyłowym. Jest to gleba strukturalna i pulchna, z głębokim poziomem
próchnicznym (40 do 50 cm).

Warunki wodne zespołu *Alnetum boreale* można określić jako korzyst-
ne. Podłoże jego może być sporadycznie zalewane, ale tylko częściowo
i względnie krótko. Woda gruntowa w czasie kopania dołu (17 X 1969 r.)
utrzymywała się na głębokości 70 cm. Z górnej granicy oglejenia grunto-
wego można sądzić, że na tym poziomie utrzymuje się przez większą część
roku. Jest to z pewnością korzystne, gdyż z jednej strony umożliwia swo-
bodną aerację warstwy próchnicznej, a z drugiej utrzymuje korzystny sto-
pień jej wilgotności. W takich warunkach niski stosunek C/N (w $A_1 = 11,1$,
a w $A_1C = 7,3$), duża zawartość składników przyswajalnych oraz obojętny
odczyn jest prawidłowością. Opisywany typ gleby stanowi bezsprzecznie
najżyźniejsze podłoże na terenie Wzgórz Dylewskich.

Swoim wyglądem zespół *Alnetum boreale* bardzo jest zbliżony do gór-
skiego łęgu *Alnetum incanae*. Niektórymi cechami przypomina także zbior-

Tabela 12 — Table 12

Skład mechaniczny gleby w zespole *Alnetum boreale*
 Mechanical composition of the soil in *Alnetum boreale* association

Nr pro- filu No. of pro- file	Lésnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, of section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	Części szkie- letowe Skele- ton parts %	Części ziemiste % — Earth parts %						Gatunek gleby według klasyfikacji PTG Name of the soil variety according to the classification of PTG			
				Części piaskowe Sand parts		Cz. pyłowe Dust parts		Cz. spławialne Float parts					
				1-0,5	0,5-0,25	0 1-0,05	0,05- 0,02	0,02- 0,006	0,006- 0,002				
											Ø mm		
Mada rzeczna czarnoziemna — River alluvial black turf soil													
25	Durag 11 316	A ₁	2-40	3,0	0,20	3,80	53,0	20	14	2	0	7	piasek słabo glinasty
		A ₁ C	40-55	0,8	0,02	3,57	50,4	20	9	5	7	5	piasek glinasty mocny
		CGor	55-70	0,7	0,20	3,00	52,8	21	9	5	4	5	piasek glinasty lekki
		WGr	70-100	0,7	0,22	0,44	19,3	24	21	7	6	22	utwór pyłowy zwykły
		W ₁ Gr	100-140	1,0	0,35	5,25	47,4	16	13	12	3	3	piasek glinasty mocny

Tabela 13 — Table 13
 Niektóre właściwości chemiczne gleby w zespole *Alnetum boreale*
 Some chemical properties of soil in *Alnetum boreale* association

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Mada rzeczna czarnoziemna — River alluvial black turf soil											
25	Durag 11 316	A ₁	2-40	6,7	5,9	8,327	4,830	0,4334	11,1	12,00	3,10
		A ₁ C	40-55	7,4	6,7	0,352	0,204	0,0280	7,3	12,35	4,10
		CGor	55-70	7,3	6,7	0,196	0,114	0,0224	5,1	10,90	3,90
		WGr	70-100	7,7	6,9	0,440	0,255	0,0392	6,5	15,45	19,60
		W ₁ Gr	100-140	7,9	7,7	0,227	0,132	0,0168	7,8	18,55	9,40

rowiska z rzędu *Populetales* występujące w sąsiedztwie wielkich rzek na niżu. Odznacza się wielowarstwową budową, a granice między poszczególnymi warstwami roślinności zaznaczają się w nim niezbyt wyraźnie. Co najmniej czterowarstwowe runo (włącznie z mszakami), przez bujny rozwój *Humulus lupulus*, zlewa się z podszyciem, które z kolei, jako wielogatunkowe i różnowiekowe, sięga często niższej warstwy drzewostanu. Niepowtarzalny obraz tego zbiorowiska jest także wynikiem grupowej budowy jego drzewostanu, powodowanej naturalnym odnawianiem się *Alnus incana* nieraz przez odrośla (fot. 1). Lity drzewostan olszy szarej porasta jedynie niektóre powierzchnie w oddziałach 33 uroczyska Domkowo II i 239 uroczyska Samin. Najprawdopodobniej odnowił się on naturalnie przez samosiew. Operat urzędzeniowy byłego nadleśnictwa Grunwald nie zawiera

Fot. R. Jaromiński

Fot. 1. Naturalne odnawianie się olszy szarej (*Alnus incana*) w łęgu borealnym (*Alnetum boreale*) w oddziale 11 uroczyska Szydlak

Phot. 1. Natural renovation of *Alnus incana* in *Alnetum boreale* association in 11th forest section of Szydlak range

żadnej notatki o dokonywaniu kiedykolwiek sztucznych nasadzeń tego gatunku.

Drzewostan zespołu *Alnetum boreale* buduje głównie *Alnus incana*. W płatach wilgotniejszych dodatkowo występuje *Alnus glutinosa*. W niektórych zdjęciach odnotowano także *Ulmus scabra*. Inne gatunki występują w tym zespole pojedynczo i spotykane są sporadycznie.

Olsza szara we wszystkich badanych płatach prezentuje się bardzo korzystnie. Jej okazy są zdrowe i wykazują dość duży przyrost roczny średnicy ($= 6,4$ mm).

Ryc. 10. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w zespole *Alnetum boreale*

Fig. 10. Diagram of biological structure wood-layer in association *Alnetum boreale*
1 — *Alnus incana*, 2 — *Alnus glutinosa*, 3 — *Ulmus scabra*, 4 — *Padus avium*

Strukturę drzewostanu w leśu borealnym przedstawia rycina 10. Stopniowe wzrastanie krzywej obrazującej liczbę okazów olszy szarej w poszczególnych klasach grubości dowodzi o naturalnym odnawianiu się tego gatunku do momentu pełnego pokrycia powierzchni przez jego korony. Obecność egzemplarzy w klasach grubości od 35 do 45 cm świadczy zarazem, że interesujący nas gatunek wzrasta na podłożu dla niego odpowiednim.

Warstwa krzewów rozwija się bujnie. Tworzy ją przede wszystkim podrost *Alnus incana*, a także *Padus avium*, oraz, wspinające się często do 5 metrów po pniach olszy szarej, pędy *Humulus lupulus*. Niejednokrotnie uzupełnia je: *Sambucus racemosa*, *S. nigra*, *Frangula alnus*, *Salix aurita*, *S. cinerea*, *Ribes nigrum* i *Rubus caesius*. Pozostałe krzewy i gatunki drzewiaste pojawiają się w podroście sporadycznie i jednostkowo.

O wysokiej urodzajności podłoża w omawianym zespole świadczy bogaty skład florystyczny runa (średnio w zdjęciu 57,7 gatunków). Roślin-

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nr zdjęcia /Number of record/	319	318	330	349	293	295	313	3-5	310	317	316	312	311	309	298
Data /Date/	17.5 69	17.5 69	17.5 69	22.5 75	17.6 69	17.6 69	17.5 69	22.5 75	17.5 69	17.5 69	17.5 69	17.5 69	17.5 69	17.5 69	17.5 69
Leśnictwo /Forestry/	Dur	Dur	Dur	Dur	Sas	Sas	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	Sas
Uroczysko /Range/	Styl	Styl	Styl	Dom	Sas	Sas	D.II	D.II	D.II	Styl	Styl	D.II	D.II	D.II	Sas
Nr działki /No. of section/	91	91	91	-	2391	239m	33	33	33	113	11c	33	33	33	239d
Nakłnienie terenu w stopniach /Inclination of area in grades/	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	8
Ekspozycja /Exposition/	-	E	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	W	SW
Gęstość warstwy drzew /Density of tree layer/	a %	70	70	70	60	70	90	80	85	70	70	90	80	90	85
Gęstość warstwy krzewów /Density of shrub layer/	b %	15	30	40	10	30	15	20	10	20	20	20	20	25	30
Gęstość warstwy runa /Cover of herb layer/	c %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	95	95
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	400	225	300	150	200	250	250	300	400	300	300	300	400	300
Liczba gatunków /Number of species/	53	46	50	52	62	70	53	61	56	57	61	54	64	56	60
Variant /Variant/	n /with Solanum dulcamara						typowy /typical/								
I Ch. i /and/ wyróżn. /differential/ <i>Alnus boreale</i>															
<i>Alnus incana</i>	a	2.3	3.4	2.2	2.2	1.2	4.5	4.4	5.5	4.4	4.5	5.5	5.5	5.5	3.3
" "	b	+2	2.2	.	1.1	.	1.1	1.2	.	1.1	1.1	1.1	1.1	+2	1.1
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	c	+2	.	+2	+2	.	1.2	1.1	1.1	1.2	+2	1.2	1.2	1.1	1.2
<i>Polygonum duratorum</i>		+2	1.1	.	1.1	1.2	1.1	1.2	+2	+2	+2	+2	1.1	+2	1.2
II Ch. Alno-Pedion															
<i>Festuca ovina</i>	b,c	.	+2	2.3	.	1.2	+2	1.2	.	1.3	2.3	.	.	.	1.1
<i>Stellaria nemorum</i>	c	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
<i>Ricaria verna</i>		2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
<i>Carex spiliophora alternifolia</i>		2.3	1.2	1.2	2.3	1.2	2.3	1.2	1.3	2.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2
<i>Chaerophyllum aromaticum</i>		.	.	.	.	1.1	.	.	1.1	1.2	1.2	.	.	.	.
<i>Festuca gigantea</i>		.	.	1.1	1.2	1.2	+2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<i>Equisetum pratense</i>		.	+2	.	1.2	1.2	.	.	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
<i>Agropyron caninum</i>		+2	.	+2	1.2	1.2	.	.	+2	+2	+2	2.3	1.2	.	.
<i>Stechys silvatica</i>		.	.	.	.	1.1	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.
<i>Circaea lutetiana</i>		.	.	.	.	+2	.	1.2	+2	.	.	.	.	.	.
<i>Squisetum silvaticum</i>		.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	1.2	+2	+2	+2
<i>Gagea lutea</i>		.	.	.	.	.	+2	.	1.2	.	.	.	.	1.2	+2
<i>Ranunculus auricomus</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Carex remota</i>		.	.	.	.+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ribes schlechtendalii</i>		.	.	.	.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Veronica montana</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Malva undulatum</i>	d	2.3	2.3	2.2	2.3	3.3	2.3	2.2	2.3	3.3	3.4	1.2	2.2	+2	1.2
III Ch. Fagetalia silvaticae															
<i>Ulmus scabra</i>	a	.	.	2.1	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	3.4
" "	b	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.
" "	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Fraxinus excelsior</i>	b,c	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1
<i>Aders pseudoplatanus</i>	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Impatiens noli-tangere</i>	c	2.3	3.4	2.2	1.2	1.2	1.2	2.3	2.2	2.2	1.2	+2	2.3	2.2	+2
<i>Aconitum ranunculoides</i>		1.2	2.2	1.2	+2	2.3	1.2	2.2	2.3	2.2	1.2	2.3	2.2	+2	+2
<i>Adoxa moschatellina</i>		.	+2	+2	2.3	2.2	+2	1.2	1.2	+2	1.2	+2	1.2	1.2	2.2
<i>Lactuca maculatum</i>		.	.	1.1	2.2	1.2	2.2	1.2	1.2	1.2	+2	1.2	1.2	+2	1.2
<i>Melandrium rubrum</i>		1.2	+2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	+	1.2	1.2	+	+
<i>Paris quadrifolia</i>		.	.	.	.	1.1	+	+2	+	1.1	+2	+	1.1	+	1.1
<i>Ranunculus lanuginosus</i>		.	.	.	.	+	+	+2	+	+	+	1.1	+	+	1.1
<i>Dryopteris filix-mas</i>		.	.	.	.	+	+	1.2	+	+	+	+2	+2	+2	+2
<i>Carex silvatica</i>		.	.	.	.	+2	.	+2	+	+	+	+2	+2	+2	1.2
<i>Stellaria holostea</i>		.	.	.	.	+	.	+	+	+	+	2.2	2.3	+2	.
<i>Galeobdolon luteum</i>		.	1.2	1.2	.	.	.	.	.	.	+	1.2	+2	.	.
<i>Asarum europaeum</i>		.	+2	+2	.	+2	.	.	+	+	+	1.2	+2	.	.
<i>Viburnum opulus</i>		.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	+2
<i>Brachypodium silvaticum</i>		.	.	.	.	.	.	+2	.	.	+	.	+2	.	+2
<i>Alliaria officinalis</i>		+2	.	1.2	+2	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.
<i>Epilobium montanum</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Corydalis solida</i>		.	+2	.	1.1	.	.	.	.	1.1	.	1.2	+2	+	+
<i>Catherinea undulata</i>	d	.	.	.	.	2.3	+2	1.2	+2	.	1.2	1.2	+2	2.2	1.2
IV Ch. Querco-Fagetea															
<i>Rubus lupulus</i>	b,c	1.2	1.2	1.2	+2	3.3	1.1	1.2	+2	2.3	2.3	1.2	+2	.	2.2
<i>Corylus avellana</i>	b	.	.	1.2	.	1.2	.	.	.	.	.	1.2	1.2	.	+
<i>Rubus caesius</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Eryngium europaea</i>	b,c	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2
<i>Rumex cathartica</i>	b,c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Aconitum neorosa</i>	c	1.2	2.3	2.2	2.3	.	+2	3.3	1.2	1.2	1.2	2.3	2.2	+2	.
<i>Asopodium podagraria</i>		.	2.2	2.2	2.3	+2	2.2	1.1	1.2	1.2	2.2	+2	1.1	2.3	.
<i>Adiantum trinevria</i>		.	.	.	.	2.2	1.2	1.2	+2	+2	+	1.2	1.2	2.3	2.2
<i>Gaultheria urbanum</i>		.	.	1.1	+	+	1.2	1.2	+2	+	+	1.2	2.2	2.3	2.3
<i>Myrica gale</i>		.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.2
<i>Poa nemoralis</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+
<i>Eurhynchium swartzii</i>	d	1.2	1.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.3	1.2	2.2	+2	1.2
<i>Eurhynchium zetterstedtii</i>		.	.	.	.	1.2	+2	.	.	+2	+2	+2	.	+2	1.2
V Ch. Alnetea glutinosae															
<i>Ribes nigrum</i>	b,c	1.2	+2	1.2	+2	.	+2	+2	.	.	.	.	.	.	.
<i>Fraxinus alnus</i>	b,c	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	1.2	1.2	1.1	.	.
<i>Salix aurita</i>	b	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Salix cinerea</i>	c	2.2	1.2	+2	.	+	.	.	.	+2	+	.	.	.	.
<i>Solanum dulcamara</i>	c	2.2	1.2	+2	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lycopus europaeus</i>		1.1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Galanthus plicatus</i>		1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI Ch. Molinietales															
<i>Deschampsia caespitosa</i>	c	+2	.	.	+2	+2	+2	1.2	+2	1.2	1.2	+2	1.2	+2	+2
<i>Gnaphalium rivale</i>		1.2	+2	.	2.2	1.2	1.1	1.2	2.2	1.2	1.2	+	+2	.	.
<i>Lysimachia vulgaris</i>		.	.	+2	.	.	1.1	1.2	.	+	+	1.1	.	.	.
<i>Crepis paludosa</i>		+2	+2	.	1.1	+	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	.	.	.	.
<i>Cirsium oleraceum</i>		.	.	.	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	2.2	.	.	.	.
<i>Plantaginella ulmaria</i>		.	.	.	1.1	.	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	.	.	.	.
<i>Geranium sibiricum</i>		.	.	.	.	+	+	1.1	1.1	1.1	1.1	.	1.1	1.1	+
<i>Geranium palustre</i>		.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.
<i>Cirsium palustre</i>		.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Caltha palustris</i>		1.2	+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Valeriana officinalis</i>		.	.	.	.	+2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Lythrum salicaria</i>		.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.
VII Ch. Phragmitetalia															
<i>Phragmites communis</i>	c	1.1	.	+2	.	1.3	.	+	+	.	.	.	.	.	.
<i>Carex acutiformis</i>		1.2	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phalaris arundinacea</i>		1.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Carex vesicaria</i>		.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII Gatunki towarzyszące /Accompanying species/															
<i>Alnus glutinosa</i>	a	3.3	2.2	3.4	2.2	3.3	+	+	+2	+2	+	.	.	.	.
" "	b	.	.	+2	.	2.2	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Quercus robur</i>	b,c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Betula verrucosa</i>	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.
<i>Sambucus racemosa</i>	b,c	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1.1	+2	.	1.2	1.1
<i>Sambucus nigra</i>	b,c	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.1
<i>Sorbus aucuparia</i>	b,c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Urtica dioica</i>	c	4.5	3.5	4.5	3.5	+2	3.4	4.5	4.5	2.3	2.3	1.2	1.2	3.4	3.4
<i>Rubus idaeus</i>		+	+2	1.2	1.1	2.2	1.2	1.1	2.2	3.4	3.4	4.5	2.3	1.2	1.2
<i>Galium aparine</i>		2.3	2.3	1.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	1.2	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2
<i>Anthriscus silvestris</i>		.	.	.	1.2	2.3	+	1.1	1.2	+2	1.1	+	1.2	2.2	2.2
<i>Geranium robertianum</i>		.	+2	.	1.1	2.2	1.1	1.1	.	1.1	+	+	1.2	2.3	2.3
<i>Poa trivialis</i>		.	+2	.	+2	2.2	1.2	1.2	.	1.2	+	+2	1.2	1.2	+2
<i>Glechoma hederacea</i>		+2	+2	.	.	1.2	+2	+2	.	+	+	+	1.2	1.2	1.2
<i>Veronica chamaedrys</i>		.	.	.	1.2	+2	+	1.1	+2	+	.	.	+2	1.2	.
<i>Ranunculus repens</i>		.	.	.	.	+	+2	1.1	+2	+	.	.	+2	1.2	.
<i>Galeopsis speciosa</i>		.	.	.	+	.	1.1	1.1	+2	+	.	1.1	1.2	1.1	1.1
<i>Galeopsis pubescens</i>		.	.	.	.	1.1	.	1.1	.	.	.	1.1	1.2	1.1	1.1
<i>Dryopteris spinulosa</i>		+2	.	.	.	.	.	+2	.	+2	+2	+2	+	+	+
<i>Fragaria vesca</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	+	+	+
<i>Lappula communis</i>		.	.	.	.										

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

ad III *Daphne mezereum* /5,6/, *Mercurialis perennis* /2,3/, *Geranium phaeum* /4/, *Dactylis aschersoniana* /7/,
Polygonatum multiflorum /8/, *Campanula latifolia* /7/, *Millium effusum* /8/.

ad IV *Acer platanoides* /8/, *Crataegus monogyna* /10/, *Sorophtularia nodosa* /10,4/, *Viola silvestris* /14/.

ad VII *Carex paniculata* /8/, *Galium palustre* /1/, *Lysimachia thyrsiflora* /1/, *Peucedanum palustre* /8/.

ad VIII *Betula pubescens* /6/, *Pinus silvestris* /6/, *Impatiens parviflora* /5,15/, *Oxalis acetosella* /11,15/,
Vicia sepium /10,11/, *Eupatorium cannabinum* /5,6/, *Cardamine amara* /1,3/, *Hypericum maculatum* /14/,
Galium mollugo /6/, *Lysimachia numularia* /8,9/, *Potentilla erecta* /13/, *Alchemilla* sp. /9/, *Lacium*
album /4/.

Objaśnienia /Explanations/:

Dom - koło Dąbkowa, D.II - Dąbkowo II, Sam - Samin, Dur - Durąg, Szyl - Szyldek.

ność zielna, podobnie jak w łągu olszowo-jesionowym, rozmieszczona jest w trzech warstwach. W warstwie najwyższej, w płatach wilgotniejszych, zdecydowanie dominuje *Urtica dioica*, a w suchszych — *Rubus idaeus*. W pełni lata są one bardzo silnie splecione przez *Cuscuta europaea*, *Galium aparine*, *Polygonum dumetorum* oraz *Humulus lupulus*. Stały udział roślin czepnych jest cechą bardzo znamieną dla tego zespołu. Równie typowe jest ciągle występowanie pewnej liczby przedstawicieli rzędu *Molinietalia*, którego wysokie byliny są stałym składnikiem górnej warstwy runa.

Najbogatsza w gatunki jest warstwa średnia, gdyż w ciągu okresu wegetacyjnego charakteryzuje ją zmienność facjalna. Wiosną dominują w niej *Anemone nemorosa* i *A. ranunculoides*. W pełni lata ilościowo przeważa *Stellaria nemorum*, *Impatiens noli-tangere* i *Aegopodium podagraria*.

W najniższej warstwie na początku okresu wegetacyjnego bardzo licznie pojawia się *Ficaria verna*, *Chrysosplenium alternifolium* i *Adoxa moschatellina*, a później dominuje *Oxalis acetosella*, *Viola palustris*, *Asarum europaeum* bądź inne gatunki. Pokrycie warstwy najniższej w ciągu lata jest niewielkie.

Z powodu zbyt dużego ocienienia dna lasu w tym czasie, także mchy mają ograniczone możliwości rozwoju. W pełni lata warstwę mszystą tworzy jedynie *Mnium undulatum* i *Eurhynchium swartzii*. Optymalne warunki dla rozwoju mszaków nastają w czasie późnego lata i jesieni. W tym okresie rośliny te tworzą na dnie lasu, bogate w gatunki, zwarte kobierce.

Pełny obraz stosunków florystycznych w zespole *Alnetum boreale* przedstawia tabela 14. Skład gatunkowy odnośnych grup syngenetycznych nie tylko wskazuje na łągowy charakter tego zbiorowiska, lecz także podkreśla jego indywidualne cechy.

Najważniejszą rolę w opisywanym łągu odgrywają gatunki charakterystyczne dla zespołu i związku *Alno-Padion* (tab. 15). Z 20 przedstawicieli

Tabela 15 — Table 15

Struktura systematyczna zespołu *Alnetum boreale*
Systematic structure of *Alnetum boreale*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and)					
<i>Alno-Padion</i>	20	189	21,92	63,00	13,80
Ch. <i>Fagetalia</i>	28	168	19,49	40,00	7,80
Ch. <i>Quercu-Fagetea</i>	17	99	11,48	38,82	4,45
Ch. <i>Alnetea glutinosae</i>	7	25	2,90	23,81	0,69
Ch. <i>Molinietalia</i>	12	81	9,39	45,00	4,32
Ch. <i>Phragmitetalia</i>	8	19	2,20	15,83	0,35
Towarzyszące (Accompanying sp.)	53	281	32,60	35,33	11,51
Razem (Total)	145	862	100,00		

tej grupy, jedenaście osiągnęło IV i V stopień stałości. Z powyższego wynika ich wysoka systematyczna wartość grupowa ($D = 13,8$). Interesujące jest to, że do najrzadszych w zespole należą gatunki związku *Alno-Padion*, które najlepiej charakteryzują zespół *Circaeo-Alnetum*. Z nich rzadko występuje tylko *Equisetum silvaticum* i *Carex remota*. *Circaea alpina* i *Poa remota* w ogóle nie zostały odnotowane.

Z gatunków uznanych przez Oberdorfera (1953) za charakterystyczne dla *Alnetum boreale*, na badanym terenie jedynie olsza szara spełnia tę funkcję należycie. Lokalnie duże przywiązanie wykazuje *Chaerophyllum bulbosum* i *Polygonum dumetorum*.

Opierając się na materiale zdjęciowym wykonanym w całości na jednym terenie trudno jest orzec, które z pozostałych gatunków mogą również charakteryzować omawiane zbiorowisko. Na Pomorzu Zachodnim dobrze wyróżnia ten typ łągu *Melandrium rubrum* (Jasnowski — wiadomość ustna). Na terenie Wzgórz Dylewskich gatunek ten także jest stałym składnikiem zespołu *Alnetum boreale* (V stopień stałości), lecz jego występowanie nie ogranicza się jedynie do tego zbiorowiska (tab. 70).

W interesującym nas łągu stale reprezentowane są także wymagające żyzniejszego podłoża elementy rzędu *Fagetalia* i klasy *Querco-Fagetea*. Przedstawiciele tych grup syngenetycznych, choć występują z niewielką stałością przeciętną (około 40%), osiągają dzięki dużej ich liczebności dość wysokie systematyczne wartości grupowe. Powyższe wyjaśnia problem przynależności zespołu *Alnetum boreale* do jednostek wyższych.

Z gatunków charakterystycznych dla zbiorowisk, które w naturalnym ciągu sukcesyjnym poprzedzają omawiany zespół, najliczniej występują przedstawiciele rzędu *Molinietalia*.

Ta grupa, a także roślinność olszynowa i szuwarowa, częściej pojawiają się w wariancie z *Solanum dulcamara*. Zasygnalizowane zróżnicowanie *Alnetum boreale* w sumie jest jednak nieduże. Podkreślona na początku tego rozdziału jednorodność siedliska ogranicza zmienność składu florystycznego, a tym samym przyczynia się do utrwalania stanu tzw. równowagi dynamicznej, który wyraźnie charakteryzuje opisywane zbiorowisko.

Zespołu *Alnetum boreale* nie można na razie scharakteryzować na płaszczyźnie szerszej, gdyż brakuje odpowiednich materiałów porównawczych. W krajowej literaturze fitosocjologicznej zaledwie sygnalizuje się obecność takiego zbiorowiska na terenie Borów Tucholskich (Kępczyński, Boiński, Ceynowa 1967), koło Grudziądza, Wąbrzeźna i Chełmna na ziemi chełmińskiej (Kępczyński, Noryśkiewicz 1968; Kępczyński, A. Noryśkiewicz 1968; Kępczyński, Wilkoń-Michalska 1967) oraz w obrębie Basenu Szczecińskiego (Celiński, Piaczyńska 1966). O obecności łągu borealnego w Puszczy Piskiej poinformował także Faliński (1965), a z autopsji wiadomo o jego występowaniu w okolicy Elku oraz koło Wydmin w krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Nieduże płaty ziołorośli lepiężnika różowego znaleziono na badanym terenie u ujścia rzeczki Dylewki do Grabiczki w oddziale 9 uroczyska Szyldak oraz koło Grabiczki — w południowej części oddziału 34 uroczyska Domkowo II. Rozwijają się one przeważnie w najbliższym sąsiedztwie rzeczek, zajmując skarpy lub powierzchnie nisko położonych teras.

Ich naturalnym podłożem jest piaszczysta mada rzeczna czarnoziemna, kształtująca się u podnóży stoków. Jeżeli łopuszyny zajmują łagodne zbocza z wysiłekającą wodą lub terasę wyżej położoną, może pod nimi zalegać mada rzeczna brunatna, a nawet dość głęboko próchniczna gleba brunatna.

Zespół *Geranio-Petasitetum hybridi* jest zbiorowiskiem ziołoroślowym. Pojedyncze okazy gatunków drzewiastych i odosobnione grupki ich podrostu pojawiają się jedynie wtedy, gdy wykształca się on na porębie lasu łąkowego lub niskiego grądu.

Typowa postać ziołorośli lepiężnika różowego odznacza się strukturą dwuwarstwową i wyraźnie zaznaczającą się w ciągu okresu wegetacyjnego zmiennością facjalną.

Wczesną wiosną, kiedy *Petasites officinalis* rozwija różowe kwiatostany, panują w tym zbiorowisku dogodne warunki dla rozwoju wielu roślin zielnych. W tym czasie na plan pierwszy wybijają się najpierw: *Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*, *Corydalis fabacea*, *C. solida*, *Ficaria verna*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Gagea lutea*, *Adoxa moschatellina* oraz *Asarum europaeum*, a nieco później: *Mercurialis perennis*, *Aegopodium podagraria*, *Geranium phaeum*, *Melandrium rubrum*, *Stellaria nemorum*, *Equisetum pratense*, *Alliaria officinalis*, *Galium aparine*, *Impatiens noli-tangere*, *Lamium maculatum* i inne gatunki.

Na przełomie czerwca i lipca w omawianym zespole zaczynają dominować wysokie byliny, jak: *Chaerophyllum aromaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Angelica silvestris*, *Epilobium hirsutum*, *Cirsium oleraceum*, *C. palustre* i inne. Ich swobodny rozwój nie trwa zbyt długo, gdyż wkrótce zostaje ograniczony szybkim wzrostem ogromnych liści lepiężnika. Blaszki tych liści, wyniesione wysoko na długich ogonkach (150-170 cm), tworzą zwarte sklepienie, pod którym kształtuje się swoisty mikroklimat. W tych warunkach wiele roślin ma ograniczone możliwości rozwoju. W pełni lata, w silnie ocienionym i wilgotnym wnętrzu każdego płata, rozwija się dlatego niedużo gatunków. Dominuje wśród nich na przemian *Aegopodium podagraria*, *Stellaria nemorum* lub *Galium aparine*, a uwagę najbardziej zwraca na siebie *Geranium phaeum*, *Melandrium rubrum* i *Omphalodes scorpioides*.

Warstwę mszaków tworzy zazwyczaj *Mnium undulatum* i *Eurhynchium swartzii*. Pozostałe mchy liściaste odgrywają małą rolę. Podkreślenia wy-

Tabela 16

Geranio - Petesitetum hybridi Oberdorfer 1957

3

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	
Nr zdjęcia /Number of record/	308	275	276	
Data /Date/	17.5 69 15.7 69	17.5 69 17.7 69	17.5 69 17.7 69	
Leśnictwo /Forestry/	Dur	Dur	Dur	
Uroczysko /Range/	D.II	Szyl	Szyl	
Nr oddziału /No. of section/	34	9	9	
Nachylenie terenu w stopniach /Inclination of area in grades/	5	2-5	2-5	
Ekspozycja /Exposition/	SE	SE	S	Stopień stałości /Constancy/
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a %	30	30	40
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	b %	10	30	10
Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	c %	85 100	90 100	90 100
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	100	150	100
Liczba gatunków /Number of species/		49	61	61

I Ch. Geranio-Petasitetum +/, Filipendulo-Petasition i /and/ Molinietalia				
+ Petasites officinalis	c	4.5	4.5	4.5
Deschampsia caespitosa		+2	+2	+2
Geum rivale		1.1	1.1	+
Valeriana officinalis		1.1	+	+2
Geranium pratense		+2	+2	+
Filipendula ulmaria		1.1	+	+
Cirsium oleraceum		+	1.2	+
Heracleum sibiricum		+	.	+
Cirsium palustre		+	.	+
Epilobium hirsutum		+	1.1	.
Angelica silvestris		.	+	.
Crepis paludosa		+2	.	.
II Ch. Alno-Padion				
Padus avium	b,c	.	+	+
Ficaria verna	c	1.3	2.3	2.3
Chrysosplenium alternifolium		2.3	2.2	1.2
Stellaria nemorum		2.2	1.2	2.2
Equisetum pratense		+2	1.1	1.1
Festuca gigantea		+2	1.2	1.2
Chaerophyllum aromaticum		+	2.2	2.2
Geranium phaeum		.	1.2	1.2
Stachys silvatica		.	.	+
Mnium undulatum	d	2.3	1.2	2.3
III Ch. Fagetalia silvaticae				
Ulmus scabra	a	+	1.1	1.2
" "	b	+	1.1	2.2
Fraxinus excelsior	b	.	2.3	+
" "	c	.	1.1	+
Anemone ranunculoides	c	2.3	1.2	2.3
Melandrium rubrum		1.1	1.2	1.1
Alliaria officinalis		+2	1.2	1.1
Corydalis fabacea		+2	+2	1.2
Corydalis solida		1.2	2.2	2.3
Impatiens noli-tangere		2.2	1.2	1.2
Adoxa moschatellina		2.2	2.3	1.2
Ranunculus lanuginosus		+	2.2	1.2
Acerum europaeum		+3	1.2	1.2
Pulmonaria obscura		+	1.2	1.2
Brachypodium silvaticum		+2	+2	+2
Lamium maculatum		+2	1.2	+2
Galeobdolon luteum		.	1.2	1.2
Mercurialis perennis		.	2.3	1.2
Stellaria holostea		.	1.2	1.2
Daphne mezereum		.	.	+
IV Ch. Quercus-Fagetea				
Acer platanoides	a	.	+	.
" "	a	.	1.1	.
Humulus lupulus	b,c	+2	1.2	+2
Evonymus europaea	b,c	+2	+	+
Aegopodium podagraria	c	1.2	2.3	3.3
Anemone nemorosa		2.2	2.3	1.2
Geum urbanum		.	1.1	+
Scrophularia nodosa		.	+	+
Eurhynchium swartzii	d	3.3	2.2	2.3

V Gatunki towarzyszące /Accompanying species/					
<i>Alnus glutinosa</i>	a	2.2	1.2	1.2	3
"	b	+2	1.2	1.1	
<i>Urtica dioica</i>	c	1.2	1.2	1.2	3
<i>Galium aparine</i>		2.3	2.2	+2	3
<i>Oxalis acetosella</i>		.	1.2	+2	2
<i>Rubus idaeus</i>		+2	.	+	2
<i>Vicia sepium</i>		.	+	1.2	2
<i>Anthriscus silvestris</i>		.	+	+	2
VI Mchy i wątrobowce towarzyszące /Accompanying mosses and liverworts/					
<i>Mnium affine</i>	d	1.2	+2	1.2	3
<i>Lophocolea heterophylla</i>		+2	+2	+2	3
<i>Mnium cuspidatum</i>		1.2	+2	+2	3
<i>Brachythecium rivulare</i>		+2	.	+2	2
<i>Mnium marginatum</i>		.	+2	+2	2
<i>Calliergon cuspidatum</i>		+2	+2	.	2
<i>Mnium stellare</i>		.	+2	.	1
<i>Mnium punctatum</i>		+2	.	.	1
<i>Georgia pellucida</i>		.	1.2	.	1
<i>Brachythecium rutabulum</i>		.	+2	.	1
Gatunki sporadyczne /Sporadic species/					
ad III <i>Viola mirabilis</i> /3/, <i>Dactylis aschersoniana</i> /3/, <i>Campanula latifolia</i> /3/,					
ad V <i>Populus tremula</i> /2/, <i>Omphalodes scorpioides</i> /2,3/, <i>Ajuga reptans</i> /3/, <i>Scrophularia elata</i> /1/.					
Objaśnienia /Explanations/					
D.II - Domkowo II, Lur - Durąg, Szył - Szyłdek.					

maga *Mnium stellare*, gdyż należy do bardzo rzadkich gatunków naszej brioflory.

Zebrany materiał zdjęciowy jest wprawdzie ubogi, lecz prezentuje płyty jednorodne i dlatego może stanowić podstawę dla charakterystyki fitosocjologicznej badanych łopuszyn i ich oceny pod względem systematycznym (tab. 16).

W składzie gatunkowym omawianego zbiorowiska przeważają elementy rzędu *Fagetalia*, uzupełniane w jednakowym stopniu przez przedstawicieli rzędu *Molinietalia* i lęgową roślinność związku *Alno-Padion* (tab. 17). Udział gatunków z klasy *Quercu-Fagetea* i towarzyszącej roślinności zielnej jest nieco skromniejszy.

W powyższej ocenie znaczenia odnośnych grup syngenetycznych, rze-

Tabela 17 — Table 17

Struktura systematyczna zespołu *Geranio-Petasitetum* hybridi
Systematic structure of *Geranio-Petasitetum* hybridi

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and)					
<i>Molinietalia</i>	12	29	18,02	80,55	14,51
Ch. <i>Alno-Padion</i>	10	26	16,15	86,66	13,99
Ch. <i>Fagetalia</i>	21	48	29,81	76,19	22,71
Ch. <i>Quercu-Fagetea</i>	8	20	12,42	83,33	10,35
Towarzyszące (Accompanying sp.)	21	38	23,60	60,32	14,23
Razem (Total)	71	161	100,00		

czywista rola gatunków rzędu *Molinietalia* jest wyraźnie pomniejszona, gdyż tworzą one trzon łopuszyn w czasie przeważającej części sezonu wegetacyjnego. Gatunki leśne dominują w nich jedynie wiosną.

Łopuszyny najlepiej charakteryzuje *Petasites officinalis*. Jego okazała forma i gromadne występowanie decydują o fizjonomii i strukturze tego zbiorowiska, a pośrednio wpływają także na wzrost i rozwój reszty jego komponentów. Za gatunki wyróżniające dla łopuszyn Oberdorfer (1957) uważa *Geranium pratense* i *G. silvaticum*. Indywidualne cechy omawianych ziółorośli w niemalym stopniu zależą również od udziału pozostałych przedstawicieli związku *Filipendulo-Petasition* i rzędu *Molinietalia*.

Aegopodium podagraria, traktowany przez Tuxena (1949) jako gatunek wyróżniający dla łopuszyn, spełnia tę funkcję w ramach związku *Filipendulo-Petasition* na równi z innymi częstymi gatunkami związku *Alno-Padion* i rzędu *Fagetalia*.

O występowaniu fitocenoz zespołu *Geranio-Petasitetum* na terenie Polski wiemy na razie niedużo. Wiadomo na pewno, że występują one w pasie wyżyn podkarpackich (Kornaś, Medwecka-Kornaś 1967; Medwecka-Kornaś, Kornaś 1963), w Polsce północno-wschodniej w dolinie rzeki Wąszy (Falińscy 1965) i koło Kętrzyna oraz w województwie śluskim na Pomorzu Zachodnim (Śpiewakowski, Kępczyńska 1974).

Zespół *Geranio-Petasitetum hybridi* z terenu Wzgórz Dylewskich, w porównaniu z łopuszynami cytowanymi z literatury, posiada więcej gatunków leśnych. Możliwe, że przedstawia on końcową fazę rozwojową tego krótkotrwałego w zmieniających się warunkach edaficznych zbiorowiska. W naturalnych warunkach łopuszyny powstają z nie koszonych zbiorowisk rzędu *Molinietalia*. Jako zbiorowisko dynamiczne, szybko osiągają kolejne etapy swojego rozwoju, tak że w stosunkowo krótkim czasie przygotowują odpowiednie siedlisko dla zbiorowisk leśnych. Na badanym terenie są nimi przeważnie lasy łęgowe typu *Alnetum boreale*, względnie *Tilio-Carpinetum corydaletosum* w wariancie z *Geranium phaeum*. W poszczególnych przypadkach ziółorośla z lepieźnikiem różowym mogą mieć charakter antropogeniczny. Tak jest, gdy wykształcają się one na porębie lasów łęgowych.

Ilość zdjęć wykonana na terenie Wzgórz Dylewskich nie upoważnia do zajęcia stanowiska w sprawie, dyskutowanej w literaturze, przynależności tej asocjacji do jednostek wyższych. Podobnie, więc jak Falińscy (1965), Kornaś, Medwecka-Kornaś (1967) oraz Matuszkiewicz (1967), zaliczono ją do związku *Filipendulo-Petasition* i rzędu *Molinietalia*. Duży udział przedstawicieli związku *Alno-Padion* i rzędu *Fagetalia* w interesującym nas zespole zwraca uwagę na dyskusyjny charakter przyjętego stanowiska.

Lasy liściaste mieszane typu grądu (*Tilio-Carpinetum*) jeszcze do XVIII wieku dominowały na obszarze Wzgórz Dylewskich. Od tego czasu ich znaczenie maleje. Wymownie zmniejszyła się powierzchnia lasów grądowych, a duże zmiany notuje się także w ich składzie gatunkowym i strukturze drzewostanów. Pod względem zajmowanej powierzchni ustępują one świerkowym borom mieszanym.

Dzięki temu, że charakteryzuje je dość szeroka skala ekologiczna, znajdują dla siebie odpowiednie warunki prawie na całym badanym terenie. Nie porastają jedynie wierzchołkowych partii Wzgórz Dylewskich oraz siedlisk bardzo wilgotnych lub okresowo zalewanych.

Znamienne dla grądów dylewskich jest to, że rozwijając się w strefie przejściowej dla *Galio-* i *Tilio-Carpinetum* oraz w bezpośrednim sąsiedztwie buczyny pomorskiej, nie zatraciły naturalnego charakteru i w dalszym ciągu prezentują zbiorowisko dynamicznie zrównoważone oraz dobrze scharakteryzowane obecnością szeregu gatunków grądowych (tab. 70); z nich *Carpinus betulus*, *Stellaria holostea*, *Dactylis aschersoniana* i *Evolvulus verrucosa* osiągają zazwyczaj najwyższe stopnie stałości. *Tilia cordata* występuje rzadziej i w większej ilości tylko w grądach niskich. *Melampyrum nemorosum* wykazuje przywiązanie do odmian postaci mezotroficznych, a *Lathraea squamaria* — do wilgotniejszych i eutroficznych. *Carex pilosa* i *Ranunculus cassubicus* głównie są spotykane w fitocenozach podzespołu *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*. Znaczenie *Vinca minor* trudno ocenić, gdyż dwa dotychczas odnotowane stanowiska tego gatunku w grądzie czyszcowym mają charakter antropogeniczny. Na badanym terenie przywiązanie do lasów grądowych wykazuje także *Bromus benekeni*.

Wszystkie grądy na obszarze Wzgórz Dylewskich odznaczają się stałym występowaniem buka w drzewostanie, podszyciu i w runie oraz dość częstym pojawianiem się siewek jaworu. Zjawisko to jest zrozumiałe, gdyż badany teren leży w obrębie naturalnych zasięgów tych gatunków. Zasygnalizowany problem wymaga jednak podkreślenia, bo stwarza określone trudności przy uzgadnianiu pozycji systematycznej omawianych lasów grądowych.

Duże zróżnicowanie topograficzne terenu i wynikająca stąd różnorodność warunków edaficznych przyczyniły się do wykształcenia w obrębie zespołu *Tilio-Carpinetum* szeregu form ekologicznych nieraz dość istotnie różniących się fizjonomią, strukturą i składem gatunkowym. Okoliczności te stały się podstawą do wyróżnienia w ramach zespołu pięciu jednostek w randze podzespołu. Są to:

A. *Tilio-Carpinetum corydaletosum*

B. *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*

C. *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*

D. *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*

E. *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum arundinaceae*.

Dalsze ich zróżnicowanie podkreślono wyróżnieniem wariantów i podwariantów, które bliżej zostaną omówione w rozdziałach traktujących o odpowiednich podzespołach.

A. *Tilio-Carpinetum corydaletosum*

Eutroficzne lasy grądowe z masowo występującymi w okresie wiosennym kokoryczami i innymi geofitami spotkać można w wielu miejscach Wzgórz Dylewskich. Większe powierzchnie zajmują w urozczyskach Szyl-dak, Domkowo I i Klonowo oraz w oddziale 110 kompleksu głównego koło Dylewa. Jako zbiorowisko wymagające żyznego podłoża i mikroklimatu cechującego się zwiększoną wilgotnością powietrza, znajduje dogodnie warunki dla swojego rozwoju na kamienistych zboczach o ekspozycji północnej i u ich podnóży.

W celu należytego zbadania podłoża trzeba było wykonać 5 odkrywek glebowych (ryc. 11 i 12), gdyż fitocenozy omawianego podzespołu porastają gleby o różnym składzie mechanicznym i pochodzeniu. Wyniki analizy składu mechanicznego wskazują, że grądy kokoryczowe rzadko zajmują gleby całkowite, a szczególnie o luźnym składzie mechanicznym (profil 26). Przeważnie żywią je gleby niecałkowite, zbudowane z utworu pyłowego zwykłego na glinie zwałowej lekkiej lub średniej. Jeżeli porastają zbocza, to w ich podłożu zalegają piaski gliniaste na utworze pyłowym (tab. 18, profil 27).

Ryc. 11. Profile glebowe w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum*
Nr 26 — wariant z *Geranium phaeum*, Nr 7 i 9 — wariant z *Acer pseudoplatanus*

Fig. 11. Soil profiles of the subassociation *Tilio-Carpinetum corydaletosum*
No. 26 — variant with *Geranium phaeum*, No. 7 and 9 — variant with *Acer pseudoplatanus*
(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

Ryc. 12. Profile glebowe w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum*
Nr 27 i 28 — wariant typowy

Fig. 12. Soil profiles of the subassociation *Tilio-Carpinetum corydaletosum*
No. 27 and 28 — Typical variant

(legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

Duża zwężłość i dwuczłonowość tych gleb sprzyja okresowej stagnacji wody opadowej w głębszych warstwach profili, a przez to powoduje periodyczne pogarszanie się warunków tlenowych. Potwierdzeniem tego jest częste zaznaczanie się procesu oglejenia opadowego. W profilu 7 wykonanym na terasie zbocza proces ten dominuje nawet nad innymi, co upoważnia do określenia tej gleby jako opadowoglejowej (=pseudoglejowej)

Blżej podnóży zboczy i na dnie wąwozów, w wierzchniach warstwach profili, przeważają procesy akumulacji i brunatnienia, a niedostatek tlenu zaznacza się w postaci oglejenia opadowego albo jako oglejenie gruntowe nieco głębiej. W takich warunkach edaficznych powstaje przeważnie gleba brunatna właściwa, wyróżniająca się bardzo korzystnymi właściwościami fizyczno-chemicznymi i dużą żyznością. Profil 27, wykonany na zboczu przełomu rzeczki Dylewki koło Durąga, przedstawia glebę brunatną kwaśną, przemienioną procesami peryglacialnymi oraz — w okresie późniejszym — ługowaniem. Ten podtyp gleby nie jest dobrym siedliskiem dla żyznych grądów. To, że w opisywanym przypadku żywi tak żyzne zbiorowisko, w większym stopniu jest wynikiem korzystnie kształtującego się w tym przełomie mikroklimatu, a szczególnie dużego nasycenia powietrza parą wodną oraz stałego wysiśkania ze zbocza wody podskórnej.

Dno wspomnianego przełomu pokrywa piaszczysta mada rzeczna brunatna, porośnięta grądem kokoryczowym w wariantcie z *Geranium phaeum*.

Znamienne jest to, że gleby o tak różnym składzie mechanicznym, kształtując się pod tym samym zbiorowiskiem, mają podobne właściwości chemiczne (tab. 19).

Z przeprowadzonej analizy odczynu wynika, że podłoże dylewskich grądów kokoryczowych powierzchniowo jest przeważnie nieco zakwaszo-

Tabela 18 — Table 18

Skład mechaniczny gleb w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum*

Mechanical composition of the soils in *Tilio-Carpinetum corydaletosum* subassociation

[illegible]

Małdź rzeczna brunatna wytworzona z piasku luźnego aluwialnego

River alluvial brown soil formed from alluvial loose sand

Durąg	A ₁	4-30	7,1	0,38	8,93	72,69	9	4	3	1	1	piasek luźny
	(B)	30-65	7,5	0,39	8,70	75,91	8	4	1	1	1	piasek luźny
	Dh	65-95	1,4	0,10	6,40	64,50	14	10	4	1	0	piasek luźny
	D	95-130	2,1	0,12	8,25	79,63	8	0	0	2	2	piasek luźny

Gleba opadowoglejowa właściwa utworu pyłowego na glinie zwałowej

Typical pseudogley soil formed from slit loam on boulder clay

	A ₁	3-25	2,0	2,0	2,5	18,5	18	35	15	5	4	utwór pyłowy zwykły
	A _{1g}	25-42	2,2	2,5	3,7	20,8	14	30	17	5	7	utwór pyłowy zwykły
Klonowo 198	g	42-100	2,1	1,7	3,5	17,8	17	29	14	4	13	utwór pyłowy zwykły
202	Dg	100-115	6,8	3,0	6,0	23,0	19	20	11	5	13	glina lekka pylasta
	D	115-160	4,0	3,2	7,0	25,8	19	7	9	17	12	glina średnia pylasta

Gleba brunatna właściwa wytworzona z utworu pyłowego na glinie zwalowej
Typical brown soil formed from silt loam on boulder clay

9	Klonowo 172 205	A ₁ A ₁ (B) (B) Dg	3-25 25-65 65-110 110-160	8,0 7,6 9,6 20,4	5,0 5,0 6,0 8,7	8,7 7,0 9,0 16,2	24,3 24,0 16,0 33,1	21 12 14 8	25 28 26 13	11 10 14 7	1 6 6 5	4 8 9 9	utwór pyłowy zwykły utwór pyłowy zwykły utwór pyłowy zwykły gлина lekka spiaszczana
---	-----------------------	---	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------	------------------	--

Gleba brunatna właściwa wytworzona z utworu pyłowego na glinie zwalowej
Typical brown soil formed from silt loam on boulder clay

28	Durąg 11 320	A ₁ A ₁ (B) (B) Dg	2-31 31-60 60-100 100-140	6,2 7,3 10,1 17,6	1,3 1,0 2,1 1,2	6,3 7,9 6,1 8,2	22,4 20,1 18,8 25,6	23 18 17 15	26 27 25 21	12 14 15 10	4 5 6 6	5 7 10 13	utwór pyłowy zwykły utwór pyłowy zwykły utwór pyłowy zwykły gлина lekka pylasta
----	--------------------	---	------------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------------	--

Gleba brunatna kwaśna wytworzona z piasku gliniastego na utworze pyłowym
Acid brown soil formed from loamy sand on silt loam

27	Durąg 10 287	A ₁ (B) (B)C D	2-30 30-65 65-95 95-140	23,0 15,0 15,4 0,9	0,23 0,29 0,15 0,00	7,20 7,48 6,20 0,72	54,57 56,23 47,65 33,28	23 21 29 44	9 9 8 11	3 2 4 5	1 2 1 4	2 2 4 2	piasek słabo gliniasty piasek słabo gliniasty piasek słabo gliniasty utwór pyłowy zwykły
----	--------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---

Tabela 19 — Table 19

Niektóre właściwości chemiczne gleb w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum*
Some chemical properties of soils in *Tilio-Carpinetum corydaletosum* subassociation

Nr profilu No. of profile	Léśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O metoda Egnera acc. to Egner mg/100 g gleby mg/100 g of soil
			w in	w in						
			H ₂ O	KCl						

Mada rzeczna brunatna wytworzona z piasku luźnego aluwialnego
River alluvial brown soil formed from alluvial loose sand

26	Durag 10 283	A ₁	4-30	7,1	6,9	4,637	2,690	0,3472	7,7	16,85	4,10
		(B)	30-65	7,8	7,7	0,098	0,057	0,0168	3,4	14,80	1,60
		Dh	65-95	7,4	7,3	1,034	0,600	0,0336	17,8	12,35	1,40
		D	95-130	7,7	7,4	0,217	0,126	0,0336	3,7	16,50	1,40

Gleba opadowoglejowa właściwa wytworzona z utworu pylowego na glinie zwałowej
Typical pseudogley soil formed from silt loam on boulder clay

7	Klonowo 198 202	A ₁	3-25	5,4	4,5	3,431	1,990	0,1512	13,1	7,80	9,30
		A _{1g}	25-42	5,7	4,8	1,717	0,996	0,0784	12,7	10,20	4,30
		g	42-100	5,6	4,8	0,631	0,366	0,0140	26,1	8,00	4,85
		Dg	100-115	5,6	4,7	0,517	0,300	0,0084	35,7	7,50	5,70
		D	115-160	6,0	4,9	0,385	0,222	0,0112	19,8	11,65	9,10

Gleba brunatna właściwa wytworzona z utworu pyłowego na glinie żwłowej
Typical brown soil formed from silt loam on boulder clay

9	Klonowo 172 205	A ₁	3-25	6,1	5,3	5,490	3,180	0,2296	13,8	3,55	5,70
		A ₁ (B)	25-65	6,0	5,2	1,704	0,984	0,0924	10,6	2,40	2,80
		(B)	65-110	6,3	5,4	0,591	0,348	0,0196	17,7	1,75	1,80
		Dg	110-160	7,5	6,8	0,569	0,330	0,0252	13,1	5,00	5,10

Gleba brunatna właściwa wytworzona z utworu pyłowego na glinie żwłowej
Typical brown soil formed from silt loam on boulder clay

28	Durąg 11 320	A ₁	2-31	6,3	5,5	5,563	3,226	0,2581	12,5	6,35	8,10
		A ₁ (B)	31-60	6,5	5,5	1,712	0,993	0,1013	9,8	5,05	6,40
		(B)	60-100	6,7	5,7	0,713	0,414	0,0302	13,7	3,25	4,30
		Dg	100-140	7,6	6,1	0,622	0,361	0,0269	13,4	12,60	10,20

Gleba brunatna kwaśna wytworzona z piasku gliniastego na utworze pyłowym
Acid brown soil formed from loamy sand on silt loam

27	Durąg 10 287	A ₁	2-30	5,6	4,6	2,775	1,610	0,1176	13,7	12,35	4,70
		(B)	30-65	5,6	4,6	0,931	0,540	0,0448	12,0	9,45	2,80
		(B)C	65-95	5,7	4,6	0,321	0,186	0,0392	4,7	10,55	2,20
		D	95-140	5,9	4,7	0,098	0,57	0,0168	3,4	9,10	2,00

ne. W głąb profili odczyn staje się mniej kwaśny, a na głębokości 140-150 cm jest zazwyczaj obojętny. Obojętnym odczynem w całej głębokości profilu wyróżnia się jedynie wspomniana mada rzeczna brunatna.

Głębokość poziomu próchnicznego waha się od 20 do 30 cm. Proces akumulacji biologicznej obejmuje często także górne partie poziomu brunatnienia (B) i wtedy w sumie może się on zaznaczać do głębokości około 60 cm. Duża zazwyczaj zawartość w tych warstwach węgla i azotu, ich korzystny stosunek ($C/N = 3,4-13,8$) oraz niemałe na ogół ilości składników przyswajalnych (P_2O_5 i K_2O) świadczą o wysokiej produktywności tych gleb.

Podzespół *Tilio-Carpinetum corydaletosum* jest przeważnie zbiorowiskiem czterowarstwowym. Dwie najwyższe warstwy tworzy wielogatunkowy drzewostan, niższe — podszycie i runo.

W warstwie drzew prawie zawsze uczestniczy *Carpinus betulus*, *Fagus silvatica*, *Ulmus scabra* i *Acer platanoides*. W płatach łęgodobnych wzrasta znaczenie *Fraxinus excelsior* (ryc. 13, 15). Jeżeli omawiany podzespół rozwija się w kontakcie z buczyną pomorską, to także *Acer pseudoplatanus* staje się istotnym jego składnikiem (ryc. 14, 15). W drzewostanach typowych (rys. 16) wzrasta znaczenie *Tilia cordata*. Dość rzadko wchodzi do drzewostanu *Quercus robur* i *Betula verrucosa*. Inne gatunki pojawiają się raczej przypadkowo.

Znaczna rozpiętość klas grubości i dość równomierny rozkład ilościowy gatunków są cechami charakterystycznymi tego podzespołu i wskazują, że mamy tu do czynienia z drzewostanami naturalnymi, względnie naturalnie odnowionymi po dokonanej wyрубie. Szczególnie interesująca jest obecność w najstarszych klasach grubości *Ulmus scabra* i *Acer pseudoplatanus*, a w wariantach typowych *Tilia cordata* i *Carpinus betulus*. Na zgodność siedliska z ich wymogami wskazuje obfite i naturalne odnawianie się przez samosiew.

Podszycie rozwija się różnie. Oprócz podrostu gatunków drzewiastych, częściej spotykano w nim: *Evonymus verrucosa*, *Lonicera xylosteum* i *Padus avium*. Rzadziej natomiast występują: *Corylus avellana*, *Evonymus europaea*, *Sambucus nigra*, *Ribes schlechtendalii* i *R. alpinum* oraz inne krzewy.

Runo tego podzespołu cechuje się dużym udziałem geofitów w okresie wczesnowiosennym, zaś w pełni lata zdecydowaną przewagą gatunków, które wyróżniają go w stosunku do grądu czyścowego. Do tej grupy zaliczyć należy: *Mercurialis perennis*, *Viola mirabilis*, *Brachypodium silvaticum*, *Asarum europaeum*, *Lamium maculatum*, *Myosotis silvatica* oraz *Campanula latifolia*, *C. rapunculoides* i *C. trachelium*.

Częste pojawianie się w płatach ocienionych *Campanula latifolia* i *C. trachelium*, a w świetlistych — *Campanula rapunculoides* i *C. persicifolia*, jest bardzo charakterystyczne dla opisywanego zbiorowiska na terenie Wzgórz Dylewskich. Z tego powodu można mówić o wykształcaniu się

Ryc. 13. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, wariant z *Acer pseudoplatanus*

Fig. 13. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, variant with *Acer pseudoplatanus*

1 — *Carpinus betulus*; 2 — *Fraxinus excelsior*; 3 — *Ulmus scabra*; 4 — *Acer pseudoplatanus*; 5 — *Acer platanoides*; 6 — *Fagus silvatica*

Ryc. 14. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, wariant z *Acer pseudoplatanus*

Fig. 14. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, variant with *Acer pseudoplatanus*

1 — *Carpinus betulus*; 2 — *Ulmus scabra*; 3 — *Acer pseudoplatanus*; 4 — *Fagus silvatica*; 5 — *Acer platanoides*; 6 — *Betula verrucosa*

dodatkowego aspektu, którego optimum rozwoju przypada na miesiąc sierpień.

Pełna lista florystyczna podzespołu *Tilio-Carpinetum corydaletosum* obejmuje 151 gatunków, a jego wariantów — 109-113. W poszczególnych zdjęciach ich liczba waha się od 47 do 77. Średnio w zdjęciu występuje 59 gatunków. Pod tym względem jest to jedno z najbogatszych zbiorowisk leśnych badanego terenu.

Pełny pogląd na jego strukturę systematyczną daje tabela 20. Zestawione wyniki potwierdzają przynależność omawianych zbiorowisk do podze-

Ryc. 15. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, wariant z *Acer pseudoplatanus*

Fig. 15. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, variant with *Acer pseudoplatanus*

1 — *Carpinus betulus*; 2 — *Fraxinus excelsior*; 3 — *Ulmus scabra*; 4 — *Fagus silvatica*; 5 — *Acer pseudoplatanus*; 6 — *Acer platanoides*; 7 — *Betula verrucosa*

Ryc. 16. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, wariant typowy

Fig. 16. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, typical variant

1 — *Carpinus betulus*; 2 — *Tilia cordata*; 3 — *Ulmus scabra*; 4 — *Fagus silvatica*

społu *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, natomiast wysoka wartość systematyczna gatunków wyróżniających wskazuje, że mamy do czynienia z jednostką dobrze scharakteryzowaną także w obrębie zespołu *Tilio-Carpinetum*. Stosunkowo niewielka domieszka gatunków towarzyszących świadczy ponadto, że jest to zbiorowisko zrównoważone i posiadające charakter naturalny.

Fot. Cz. Hołdyński

Fot. 2. Fragment grądu kokoryczowego (*Tilio-Carpinetum corydaletosum*, wariant z *Geranium phaeum*) w oddziale 9 uroczyska Szyldak

Phot. 2. Fragment of *Tilio-Carpinetum corydaletosum* association, variant with *Geranium phaeum* in 9th forest section of Szyldak range

Cechą charakterystyczną grądów kokoryczowych jest stała obecność pewnej liczby elementów związku *Alno-Padion*. Stanowią one przez to ogniwo łączące pozostałe grądy z lasami lęgowymi.

Zaznaczające się różnice w składzie florystycznym, wynikające przede wszystkim z niejednakowo kształtujących się stosunków świetlnych i edaficznych, dały podstawę do wyodrębnienia trzech jednostek niższych. Są to:

- a. Wariant z *Geranium phaeum*
- b. Wariant z *Acer pseudoplatanus*
- c. Wariant typowy.

Pierwszy z nich (tab. 21) reprezentowany jest tylko w uroczyskach Durąg i Szyldak (fot. 2). Jego drzewostan tworzą głównie *Tilia cordata*, *Carpinus betulus*, *Ulmus scabra* i *Acer palattonides*. Towarzyszy im *Fraxinus excelsior* i *Fagus silvatica*. W runie zwraca uwagę stosunkowo duży udział gatunków lęgowych, a ponadto obecność *Geranium phaeum* (fot. 3), *Melandrium rubrum*, *Omphalodes scorpioides* (fot. 4), *Circaea intermedia* i *Alliaria officinalis*.

Dla wariantu z *Acer pseudoplatanus* (tab. 22), częstego w uroczysku Klonowo, znamienny jest stały udział w drzewostanie *Acer pseudoplatanus* i *Fraxinus excelsior*, przy jednoczesnym braku *Tilia cordata*, jak również

Tabela 20 — Table 20

Struktura systematyczna podzespołu *Tilio-Carpinetum corydaletosum*Systematic structure of *Tilio-Carpinetum corydaletosum*

Grupa gatunków Group of species	Wariant Variant	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) <i>Carpinion betuli</i>	a	6	39	6,83	72,22	4,93
	b	5	56	5,73	65,88	3,77
	c	7	59	9,29	76,62	7,12
		8	154	7,05	52,03	3,67
Wyróżniające podzespół i warianty Diff. subassoc. and variants	a	14	96	16,78	76,19	12,78
	b	11	143	14,64	76,47	11,20
	c	13	96	15,14	67,13	10,16
		16	335	15,35	56,59	8,69
Ch. <i>Alno-Padion</i>	a	13	91	15,94	77,77	12,39
	b	12	100	10,23	49,02	5,01
	c	12	56	8,83	42,42	3,75
		15	247	11,31	44,54	5,04
Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i>	a	24	133	23,25	61,57	14,32
	b	28	318	32,55	66,81	21,75
	c	27	200	31,55	67,34	21,25
		31	651	29,82	56,76	16,93
Ch. <i>Querco-Fagetea</i>	a	18	87	15,21	53,70	7,17
	b	14	135	13,82	56,72	7,84
	c	14	96	15,14	62,34	9,44
		18	318	14,57	47,74	6,96
Towarzyszące Accompanying	a	38	126	22,06	36,84	8,13
	b	40	225	23,03	33,09	7,62
	c	36	127	20,05	32,07	6,42
		63	478	21,89	20,56	4,50
Razem Total	a	113	572	100,00		
	b	110	977	100,00		
	c	109	634	100,00		
		151	2183	100,00		

a — Wariant (variant) z *Geranium phaeum*; b — wariant z *Acer pseudoplatanus*; c — wariant typowy (typical variant).częste pojawienie się w runie *Campanula latifolia* i *Myosotis silvatica*.

Wariant typowy wyróżnia drzewostan z przewagą graba i lipy oraz w pełni lata gromadne występowanie dzwonków w runie. Porastający zboża podwariant z *Campanula persicifolia* żywi dodatkowo ciekawą florę mszaków. Z bardziej interesujących można wymienić *Mnium stellare*, *Mnium marginatum* i *Mnium rostratum* var. *rugicum*.

Indywidualne cechy dylewskich żyznych łąk z kokoryczami są przyczyną, że zaliczenie tych zbiorowisk do podzespołu *Tilio-Carpinetum*

Fot. Cz. Holdyński

Fot. 3. Bodziszek żałobny (*Geranium phaeum*) — gatunek wyróżniający reliktowy wariant podzespołu *Tilio-Carpinetum corydaletosum* w oddziale 9 uroczyska Sztydak

Phot. 3. *Geranium phaeum* — the differential species of the relict variant of *Tilio-Carpinetum corydaletosum* subassociation in 9th forest section of Sztydak range

corydaletosum wzbudza pewne zastrzeżenia. Niekontrowersyjna jest jedynie forma określona jako wariant typowy. Zbiorowe występowanie w okresie letnim dzwonków i innych gatunków wyróżniających, nadaje jednakże temu zbiorowisku charakter odrębny. Tymi cechami zbliża się omawiany wariant do grądu z Puszczy Augustowskiej, określonego przez Sokółowskiego (1968) jako *Tilio-Carpinetum campanuletosum*. Interesujący nas grąd więcej cech wspólnych posiada jednak z odpowiadającymi mu podzespołami z „Doliny rzeki Wąszy” (Faliński 1965), Wysoczyzny Elbląskiej (Tokarz 1961), z okolic Sulęcyna na Pojezierzu Kaszubskim (znane z autopsji), z Jaru Branicy (Młyniek, Polakowski 1960) oraz z nadleśnictwa Płock (Bońska 1970).

Wariant z *Geranium phaeum* należy do tej samej grupy zbiorowisk, lecz jest postacią bogatszą w gatunki i nie notowaną dotychczas na obszarze Polski niżowej. Zwiększony udział w drzewostanie *Acer platanoides*,

Tabela 21

Tilio - Carpinetum corydaletosum Traczyk 1962

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nr zdjęcia /Number of record/	282	287	277	284	283	279	333	335	358	
	17,5 69	17,5 69	17,5 69	17,5 69	17,5 69	17,5 69	12,5 73	12,5 73	23,5 75	
Data /Date/	17.7 69	17.7 69	17.7 69	17.7 69	17.7 69	17.7 69	28.8 73	28.8 73	16.7 75	
Leśnictwo /Forestry/	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	Dur	
Uroczysko /Range/	Szyl	Szyl	Szyl	Szyl	Szyl	Szyl	Dur	Szyl	Szyl	
Nr oddziału /No. of section/	9/10	10	9	10	10	9	8	k.9	9	
Nachylenie terenu w stopniach /Inclination of area in grades/	2	-	-	5	-	-	20	15	10	
Ekspozycja /Exposition/	WNW	-	-	S	-	-	NE	NW	SE	Stopień
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a ₁ % a ₂ %	75	10	70 30	70 30	70 30	70 30	60 30	60 60	60 40
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	b %	20	30	20	20	30	20	60	20	40
Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	c %	90 100	90 95	80 90	85 95	80 85	80 80	80 80	85 85	90 85
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	250	150	150	250	300	150	250	200	250
Liczba gatunków /Number of species/		54	63	60	59	59	59	76	67	77

Wariant /Variant/	z /with/ Geranium phaeum										
I Ch. Tilio-Carpinetum i /and/ Carpinion betuli											
Tilia cordata	a	+	2.1	2.1	+	3.2	+	1.1	3.2	2.1	V
" "	b	+2	1.1	1.1	+	2.2	2.3	1.1	1.1	1.1	
" "	c	.	+	.	.	.	.	+	+2	1.1	
Carpinus betulus	a	.	+	+	3.2	2.1	2.2	2.2	3.2	3.2	V
" "	b	.	.	.	1.1	.	1.2	1.2	1.1	1.1	
" "	c	.	.	+2	1.2	.	+2	1.2	1.2	1.2	
Evonymus verrucosa	b, c	.	.	.	1.1	+2	1.2	.	+2	1.2	III
Stellaria holostea	c	+2	+2	.	1.2	2.2	+2	1.2	+2	2.2	V
Lathraea squamaria		+2	.	+2	+2	.	.	.	+2	+2	III
Dactylis aschersoniana		.	.	+2	.	.	.	+2	1.2	1.2	III
II Wyróżn./Differ./ Tilio-Carpinetum corydaletosum											
Corydalis solida	e	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	1.2	+2	1.2	1.2	V
Ranunculus lanuginosus		1.2	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	V
Mercurialis perennis		2.3	4.5	2.3	3.4	3.4	3.3	+	.	2.2	V
Corydalis fabacea		1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	2.2	+2	.	+2	V
Brachypodium silvaticum		+2	.	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	V
Lamium maculatum		1.2	1.2	+2	1.2	1.1	.	1.2	1.2	1.2	V
Asarum europaeum		1.2	1.2	1.3	.	1.2	2.3	1.2	.	1.2	IV
Campanula trachelium		.	.	.	+	+	+	.	.	+	III
Viola mirabilis		.	.	.	.	.	+2	1.2	+2	1.2	III
III Wyróżn. wariant /Differ. variant/ z Geranium phaeum											
Geranium phaeum	c	1.1	1.1	2.2	1.2	1.1	+2	1.2	+2	2.2	V
Melandrium rubrum		1.1	1.1	+2	1.1	1.2	+	+2	+2	1.1	V
Omphalodes scorpioides		+2	.	1.2	1.2	+2	+2	.	+2	1.2	IV
Alliaria officinalis		1.2	1.2	1.2	+	+	1.1	.	+2	.	IV
Circsea intermedia		.	+2	.	+2	+2	+2	+2	1.2	.	IV
IV Ch. Alno-Padion											
Padus avium	b, c	2.2	2.3	2.3	+2	2.2	1.2	.	+	1.1	V
Ficaria verna	c	2.2	2.3	1.2	2.2	2.3	2.2	2.4	1.2	2.2	V
Chrysosplenium alternifolium		1.2	2.2	1.2	1.2	1.2	+2	1.2	2.2	2.2	V
Equisetum pratense		1.1	1.2	+	1.2	2.2	3.3	+2	1.1	1.1	V
Gagea lutea		+2	1.2	1.2	1.2	+2	.	1.2	1.2	.	IV
Stellaria nemorum		3.3	1.2	.	1.2	1.2	+2	2.2	1.2	2.2	V
Chaerophyllum aromaticum		1.1	+	2.3	.	1.2	+	1.2	1.1	+2	V
Stachys silvatica		1.2	.	+2	1.1	.	+	1.1	1.1	1.1	IV
Pestuca gigantea		+	.	.	1.1	.	+2	1.1	+	1.2	IV
Ribes schlechtendalii et alpinum		.	+2	.	+	1.1	.	1.1	.	1.1	III
Equisetum silvaticum		.	.	.	+2	.	.	1.1	1.1	+2	III
Veronica montana		.	+2	.	.	.	+2	.	.	.	II
Anium undulatum	d	3.4	2.3	1.2	2.3	3.3	1.2	.	1.2	1.2	V

V Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i>											V
<i>Ulmus scabra</i>	a ₁	2.1	3.3	3.3	3.2	3.2	2.1	3.2	1.1	3.2	
" "	a ₂	.	1.1	1.1	1.1	1.1	2.2	1.1	1.1	1.1	
" "	b	.	1.1	1.1	2.2	1.1	2.2	2.2	.	1.1	
" "	c	.	1.1	2.2	.	+	.	1.1	+	1.1	
<i>Fagus silvatica</i>	a ₁	.	.	.	+	.	.	2.2	1.1	+	III
" "	"	.	.	.	.	1.1	.	1.1	+	+	
" "	b ₂	.	.	.	+	1.1	.	.	+	+	
" "	"	.	.	.	1.1	1.1	.	1.2	+	1.1	
<i>Fraxinus excelsior</i>	a	.	.	2.1	.	.	.	.	.	1.1	III
" "	b	.	.	.	1.1	.	1.1	.	+	1.1	
" "	c	.	.	.	1.1	.	.	.	+	1.1	
<i>Anemone ranunculoides</i>	c	2.3	3.3	2.2	2.3	2.2	1.2	2.2	2.3	1.2	V
<i>Galeobdolon luteum</i>		1.2	2.3	2.2	2.3	1.2	2.3	2.2	1.2	2.2	V
<i>Pulsanaria obscura</i>		1.1	1.2	1.2	1.2	+	1.2	1.2	1.1	1.2	V
<i>Impatiens noli-tangere</i>		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	.	2.2	+	+	V
<i>Asperula odorata</i>		.	+	2.2	1.2	+	1.2	2.2	1.2	2.2	V
<i>Dryopteris filix-mas</i>		+	2.2	+	1.2	+	2.2	2.2	1.2	1.2	V
<i>Adoxa moschatellina</i>		+	2.2	+	2.2	.	+	2.2	1.2	1.2	IV
<i>Actaea spicata</i>		.	1.1	.	.	+	1.1	2.1	1.1	1.2	IV
<i>Hepatica nobilis</i>		.	.	+	2.2	.	1.2	1.2	1.1	1.1	IV
<i>Paris quadrifolia</i>		+	2.2	.	.	+	2.2	1.2	+	2.2	III
<i>Milium effusum</i>		.	.	.	.	.	+	2.2	+	1.2	III
<i>Mycelis muralis</i>		.	.	.	.	.	1.1	1.1	1.1	1.1	III
<i>Carex silvatica</i>		.	.	.	+	2.2	.	+	2.2	+	II
<i>Lathyrus vernus</i>		.	.	.	.	+	+	1.1	.	.	II
<i>Viburnum opulus</i>		.	+	.	.	.	.	.	+	+	II
<i>Phyteuma spicatum</i>		.	+	.	.	.	.	.	1.1	1.1	II
<i>Polygatum multiflorum</i>		.	.	+	2.2	.	.	+	2.2	.	II
<i>Daphne mezereum</i>		.	.	+	.	.	1.1	.	.	.	II
<i>Campanula latifolia</i>		.	.	+	.	.	.	.	.	.	I
<i>Eurhynchium zetterstedtii</i>	d	+	2.2	1.2	1.2	2.2	+	2.2	1.2	1.2	V
<i>Catharina undulata</i>		.	.	.	+	2.2	+	2.2	1.2	+	IV
<i>Eurhynchium striatum</i>		.	.	.	.	.	.	1.2	+	2.2	II
VI Ch. <i>Quercus-Fagetea</i>											IV
<i>Acer platanoides</i>	a	.	2.1	.	2.2	1.1	+	+	1.1	1.1	
" "	b	.	.	.	.	+	.	1.1	1.1	1.1	
" "	c	.	.	.	.	+	.	1.1	.	1.1	
<i>Evonymus europaea</i>	b,c	+	+	2.2	1.2	+	+	+	2.2	+	V
<i>Corylus avellana</i>	b	.	+	2.2	.	1.2	.	+	2.2	+	IV
<i>Lonicera xylosteum</i>	b,c	.	+	2.2	.	+	+	1.1	+	1.1	III
<i>Humulus lupulus</i>	b,c	+	2.2	.	+	2.2	.	1.1	+	1.1	II
<i>Aegopodium podagraria</i>	c	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.2	1.2	V
<i>Anemone nemorosa</i>		1.2	1.2	2.3	1.2	1.2	2.3	3.3	3.3	2.2	V
<i>Geum urbanum</i>		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	+	1.1	1.1	1.1	V
<i>Scrophularia nodosa</i>		.	.	.	+	.	+	1.1	+	+	III
<i>Viola silvestris</i>		.	.	+	.	+	1.1	1.1	.	.	III
<i>Vicia silvatica</i>		.	.	.	.	.	.	1.2	+	2.2	II
<i>Poa nemoralis</i>		.	.	.	.	.	.	+	2.2	+	II
VII Gatunki towarzyszące /Accompanying species/											II
<i>Betula verrucosa</i>	a	4.4	.	.	.	.	.	1.1	+	+	II
<i>Alnus glutinosa</i>	a	4.4	.	.	.	.	.	2.3	.	.	II
<i>Sambucus nigra</i>	b,c	+	2.2	.	.	.	.	+	.	.	II
<i>Ribes nigrum</i>	b,c	.	.	2.2	.	.	+	+	.	.	II
<i>Urtica dioica</i>	c	4.5	1.2	3.4	2.3	+	2.2	1.1	1.2	1.2	V
<i>Oxalis acetosella</i>		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	+	1.2	V
<i>Ajuga reptans</i>		.	+	2.2	.	+	1.1	+	.	1.1	IV
<i>Geranium robertianum</i>		.	+	2.2	.	+	.	+	2.2	1.1	III
<i>Rubus idaeus</i>		+	.	+	2.2	.	.	+	2.2	1.1	III
<i>Chelidonium majus</i>		+	.	.	+	.	.	.	.	+	III
<i>Athyrium filix-femina</i>		+	2.2	.	.	.	.	+	2.2	+	III
<i>Dryopteris spinulosa</i>		.	+	2.2	.	+	2.2	.	.	.	II
VIII Mochy i wątrobowce towarzyszące /Accompanying mosses and liverworts/											V
<i>Mnium affine</i>	d	1.2	1.2	+	2.2	1.2	+	2.2	1.2	1.2	V
<i>Hypnum cupressiforme</i>		+	2.2	.	.	1.2	+	2.2	+	2.2	V
<i>Mnium cuspidatum</i>		1.2	+	2.2	1.2	.	.	2.2	1.2	+	IV
<i>Mnium punctatum</i>		+	2.2	+	2.2	.	.	.	1.2	+	III
<i>Brachythecium velutinum</i>		.	+	2.2	.	.	+	1.2	+	1.2	III
<i>Lophocolea heterophylla</i>		.	+	2.2	.	.	+	2.2	.	.	III
<i>Brachythecium rutabulum</i>		.	.	+	2.2	1.2	+	2.2	.	.	III
<i>Mnium stellare</i>		+	2.2	.	.	1.2	.	+	.	.	II
<i>Plagiothecium neglectum</i>		.	.	+	2.2	.	.	.	.	1.2	II
<i>Mnium marginatum</i>		.	+	2.2	.	.	.	+	2.2	.	II

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

- ad VI *Cornus sanguinea* /2/, *Melica nutans* /9/, *Campanula persicifolia* /7/, *Campanula rapunculoides* /8/.
- ad VII *Populus tremula* /3/, *Pinus silvestris* /5/, *Cirsium oleraceum* /1,2,3/, *Filipendula ulmaria* /2,3/, *Petasites officinalis* /2/, *Geum rivale* /2/, *Vicia sepium* /1/, *Galium aparine* /1/, *Anthriscus silvestris* /2/, *Ranunculus repens* /2/, *Chaerophyllum temulum* /9/.
- ad VIII *Brachythecium rivulare* /2,3/, *Georgia pellucida* /1,5/, *Thuidium tamariscifolium* /4,6/, *Calliergon cuspidatum* /2/, *Radula complanata* /4/.

Objaśnienia /Explanations/: Dur - Durag, Szyl - Szyldek, k.9 - koło oddziału 9.

w podroście — *Ribes alpinum*, a w runie: obecność *Geranium phaeum*, *Melandrium rubrum*, *Omphalodes scorpioides*, *Circaea intermedia*, *Alliaria officinalis* i *Viola mirabilis*, dominowanie *Mercurialis perennis* oraz częste pojawianie się w nim *Campanula rapunculoides*, *C. presicifolia*, *Vicia silvatica* i innych gatunków światłolubnych, nie jest chyba przypadkiem. Jest bardzo prawdopodobne, że mamy tu do czynienia z nowym typem zbiorowiska grądowego.

Fot. Cz. Holdyński

Fot. 4. Uludka leśna (*Omphalodes scorpioides*) — gatunek wyróżniający reliktowy wariant podzespołu *Tilio-Carpinetum corydaletosum* w oddziale 9 uroczyska Szyldak

Phot. 4. *Omphalodes scorpioides* — the differential species of the relict variant of *Tilio-Carpinetum corydaletosum* subassociation in 9th forest section of Szyldak range

W Europie zachodniej już od dawna wielu autorów zalicza tego typu zbiorowiska do zespołu *Aceri-Tilietum* (Faber 1936), włączonego przez Oberdorfera (1957) do rzędu *Quercetalia pubescentis*, natomiast przez Matuszkiewicza (1967) — do związku *Carpinion betuli*.

Wariant z *Acer pseudoplatanus* rozwijający się w bliskim kontakcie z buczyną pomorską — przez stałą obecność w drzewostanie *Acer pseudoplatanus* i *Ulmus scabra*, a w runie *Campanula latifolia* i *Myosotis silvatica* — nawiązuje do zbiorowisk podzwiązku *Acerion pseudoplatani* (Oberdorfer 1957), zaś szczególnie do wyróżnionego przez Bertscha w 1940 roku zespołu *Acero-Fagetum*.

W Czechosłowacji wszystkie eutroficzne lasy mieszane z udziałem klonów — niezależnie czy rozwijają się w kontakcie z grądami, czy też z bu-

ad IV *Helica uniflora* /7,12,15,16/ *Festuca silvatica* /42/, *Meottia nidus-avis* /7/.
ad V *Carex digitata* /11,12/, *Helica nutans* /14/ *Vicia silvatica* /8,9,18/, *Hedera helix* /8,16/, *Burnhamium striatum* /18,26,28/,
ad VI *Pinus sylvestris* /25/, *Picea excelsa* /22/, *Sabucus racemosa* /25/, *Ribes nigrum* /2/, *Pinus glutinosa* /1,2/, *Populus tremula* /5,12/, *Chelidonium majus* /11,19,25,27/, *Deschampsia caespitosa*
/7,8,9,18/, *Cherophyllum tomentosum* /18,25/, *Crepis paludosa* /1,2,3/, *Cirsium palustre* /1,2/, *Galium aparine* /1,2/, *Viola palustris* /2/, *Viola riviniana* /42/, *Geum rivale* /22/, *Cirsium*
cleraceum /2/, *Pimpinella ulmaria* /2/, *Eryopteris austriaca* /22/, *Lactyllis glomerata* /26/, *Anthriscus sylvestris* /18,25/, *Hieracium murorum* /21/.
ad VII *Plantaginaceae* /2/, *Pinguicula vulgaris* /2/, *Thuidium delicatulum* /2,7/, *Anisum officinale* var. *elatum* /2/.

Objaśnienia /Explanations/
Dzielniki: D.I - Dzielnica I, Dur - Durów, Dyl - Dylewo, Klon - Klonowo, Szyl - Szylask, Wg - Wygoda.

czyniami — zalicza się do jednego związku *Tilio-Acerion* (Klik 1955). Jego zbiorowiska dość często zawierają gatunki uznane za wyróżniające dla wariantu z *Geranium phaeum*.

Poczynione uwagi upewniają w przekonaniu, że przyjęte w niniejszej pracy stanowisko systematyczne dla dylewskich grądów z kokoryczami może być w przyszłości zrewidowane. Dla wyjaśnienia tego problemu niezbędne są odpowiednie materiały porównawcze z większej liczby stanowisk z obszaru Polski niżowej.

Z porównania badanego podzespołu z materiałami opublikowanymi z innych regionów Polski wynika, że najbardziej zbliża się on do żyznych grądów w pasie pomorskich moren czołowych. Nieco więcej różnic zaznacza się w stosunku do tej postaci grądu, gdy rozwija się ona na terenach mniej zróżnicowanych orograficznie (Matuszkiewicz 1952; Denisiuk 1963; Kępczyński 1965; Kępczyński, Michalska 1967; Boińscy 1969). Najmniej podobne do dylewskich są tego typu zbiorowiska z Wielkopolski (Krotoska, Piotrowska 1952; Krotoska 1952, 1966; Wojterscy 1953; Wojterski 1960; Celiński, Filipek 1955; Krotoska, Pawłow, Piotrowska 1965).

B. *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*

Niski grąd czyścowy jest zbiorowiskiem dość często spotykanym na całym obszarze Wzgórz Dylewskich. Jego płaty zajmują nieco osuszone dna wąwozów, względnie łagodne, a nieraz nawet dość strome-północne lub północno-wschodnie — zbocza.

Podłożem tego grądu jest zazwyczaj gleba brunatna kwaśna, a niekiedy szarobrunatna (ryc. 17). Gleba szarobrunatna zalegająca na dnie wąwozu powstała z utworu pyłowego. Gleby brunatne kwaśne u podnóży zboczy tworzą się z utworu pyłowego na glinie, a w wyższych partiach stoków — z gliny zwałowej na utworze pyłowym (tab. 23).

Ryc. 17. Profile glebowe w podzespołe *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*
Fig. 17. Soil profiles of the subassociation *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*
(Legenda jak na rys. 4 — Legend as in Fig. 4)

Tabela 23 — Table 23

Skład mechaniczny gleb w podzespole *Tilio-Carpinetum stachytosum*
 Mechanical composition of the soils in *Tilio-Carpinetum stachytosum* subassociation

Nr pro- filu No. of pro- file	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	Części szkie- letowe Skele- ton parts %	Części ziemiste % — Earth parts %					Gatunek gleby według klasyfikacji PTG Name of the soil variety according to the classification of PTG				
				Części piaszkowe Sand parts		Cz. pyłowe Dust parts		Cz. spławialne Float parts					
				1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0,05- 0,02						
							0,006- 0,002			0,002			
Ø mm													
Gleba szarobrunatna wytworzona z utworu pyłowego Gray-brown soil formed from silt loam													
5	Dylewo 121 218	A ₁	4-25	1,53	3,57	25,90	24	27	11	2	5	utwór pyłowy zwykły	
		A ₁ (B)	25-40	1,78	3,82	26,40	19	25	11	6	7	utwór pyłowy zwykły	
		(B)	40-62	1,60	3,90	24,50	19	24	12	5	5	utwór pyłowy zwykły	
		(B)CGor	62-90	2,04	7,90	17,06	18	22	13	6	14	utwór pyłowy zwykły	
		CGr	90-130	2,50	6,70	18,80	19	25	13	4	11	utwór pyłowy zwykły	
Gleba brunatna kwaśna wytworzona z utworu pyłowego na glinie lekkiej Acid brown soil formed from silt loam on sandy loam													
10	Klonowo 170 190	A ₁	3-22	2,6	9,6	23,8	22	26	10	2	4	utwór pyłowy zwykły	
		A ₁ (B)	22-51	2,7	8,1	23,2	16	27	11	5	7	utwór pyłowy zwykły	
		(B)g	51-73	6,0	8,9	16,1	16	25	12	7	9	utwór pyłowy zwykły	
		Dg	73-140	2,3	7,3	25,4	20	8	8	16	13	głina średnia pylasta	
Gleba brunatna kwaśna wytworzona z gliny lekkiej na utworze pyłowym Acid brown soil formed from sandy loam on silt loam													
21	Bednarki 71 210	A ₁	3-15	8,2	9,7	31,3	17	24	7	2	3	piasek gliniasty lekki	
		(B)	15-63	7,8	5,5	10,0	26,5	15	21	10	5	7	głina lekka
		(B)Dg	63-75	4,2	2,5	3,5	17,0	30	21	16	4	6	utwór pyłowy zwykły
		D ₁ g	75-130	6,0	1,7	3,0	18,3	14	59	1	3	0	utwór pyłowy zwykły

Tabela 24 — Table 24

Niektóre właściwości chemiczne gleb w podzespole *Tilio-Carpinetum stachytetosum*
Some chemical properties of soils in *Tilio-Carpinetum stachytetosum* subassociation

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O		
			w in H ₂ O	w in KCl								
											%	
Gleba szarobrunatna wytworzona z utworu pyłowego Gray-brown soil formed from silt loam												
5	Dylewo 121 218	A ₁	4-25	4,8	4,0	4,724	2,740	0,1848	14,8	16,80	8,50	
		A ₁ (B)	25-40	5,1	4,5	1,614	0,936	0,0588	15,9	9,45	2,75	
		(B)	40-62	5,7	4,6	0,839	0,487	0,0301	16,2	8,25	4,40	
		(B)CGor	62-90	5,8	4,7	0,517	0,300	0,0140	21,4	8,70	6,25	
		CGr	90-130	5,9	4,7	0,434	0,252	0,0168	15,0	10,20	6,40	
Gleba brunatna kwaśna wytworzona z utworu pyłowego na glinie lekkiej Acid brown soil formed from silt loam on sandy loam												
10	Klonowo 170 190	A ₁	3-22	5,6	4,8	5,503	3,192	0,2296	13,9	6,45	5,90	
		A ₁ (B)	22-51	5,9	5,1	1,714	0,994	0,0974	10,2	10,10	4,50	
		(B)g	51-73	6,4	5,3	0,579	0,336	0,0183	18,3	5,40	5,60	
		Dg	73-140	6,8	5,7	0,514	0,298	0,0197	15,1	7,30	7,70	
Gleba brunatna kwaśna wytworzona z gliny lekkiej na utworze pyłowym Acid brown soil formed from sandy loam on silt loam												
21	Bednarki 71 210	A ₁	3-15	5,7	4,7	3,287	1,860	0,1428	13,0	3,55	3,70	
		(B)	15-63	5,7	4,8	1,189	0,690	0,0448	15,4	4,55	2,20	
		(B)Dg	63-75	6,0	5,0	0,476	0,276	0,0140	19,7	3,15	3,10	
		D _{1g}	75-130	6,4	5,3	0,239	0,138	0,0084	16,4	2,55	4,10	

Gleby te, choć mają odmienny skład mechaniczny, pod względem niektórych właściwości chemicznych prezentują sobą podobne siedliska (tab. 24). Charakteryzuje je nieznaczne lub średnie zakwaszenie i mniej więcej ten sam stosunek C/N, chociaż ilości węgla i azotu nie są jednakowe. Im bliżej wierzchołków, tym ilości pierwiastków i głębokość poziomu próchnicznego są mniejsze.

Stosunki wodne we wszystkich badanych przypadkach kształtują się dodatnio. Wskazuje na to niemała produktywność tych gleb ($A_1 = 12-25$ cm) oraz zaznaczanie się na głębokości poniżej 65 cm procesów glejowych.

Ryc. 18. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*, forma z *Quercus robur*

Fig. 18. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*, variant with *Quercus robur*
1 — *Fagus sylvatica*; 2 — *Picea excelsa*; 3 — *Quercus robur*; 4 — *Acer pseudoplatanus*

Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae zajmując na terenie Wzgórz Dylewskich dość różne siedliska, jakimi są dna wąwozów i północne zbocza, rozwija się jako zbiorowisko niejednorodne. Szczególnie zróżnicowana jest struktura jego drzewostanów (tab. 25). Stałym składnikiem drzewostanów jest tylko *Carpinus betulus* i *Fagus sylvatica*. Częściej uzupełnia je *Acer platanoides* i *Betula verrucosa*, rzadko natomiast — *Tilia cordata*. *Acer pseudoplatanus* w większej liczbie pojawia się na stromych zboczach (zdjęcia 20-24). *Quercus robur* dominuje z kolei w fitocenozach porastających dna wąwozów (zdjęcia 1-8). Tam częściej spotyka się także *Picea excelsa* (ryc. 18).

W warstwie krzewów, oprócz podrostu gatunków drzewiastych, częściej występują: *Evonymus verrucosa*, *Corylus avellana*, *Lonicera xylosteum*, *Sorbus aucuparia*, *Sambucus nigra* oraz *Evonymus europaea*.

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

ad III *Ulmus scabra* /3,17/, *Fraxinus excelsior* /2,21/, *Mercurialis perennis* /8,21/, *Neottia nictus-avis* /10,11/, *Viola mirabilis* /1,21,19/, *Corydalis cava* /9/,
Lamium maculatum /3,14/, *Myosotis silvatica* /3,19/, *Corydalis solida* /16/.

ad IV *Crataegus monogyna* /10/, *Rhennus cathartica* /2/, *Vicia silvatica* /5,15/.

ad V *Populus tremula* /21/, *Frangula alnus* /1,13/, *Sambucus racemosa* /2,19/, *Eryopteris austriaca* /2,11/, *Prageria vesca* /5,7,10,17/, *Platanthera bifolia*
/5,9,15/, *Hieracium murorum* /5,10,12/, *Renunculus repens* /16,17,18,20/, *Antiriscus silvestris* /10,13,16,19/, *Solidago virga-aurea* /3,12/, *Convallaria*
maialis /4,12,16/, *Vicia sepium* /11,12,14/, *Chamaenerion angustifolium* /15,17/, *Hypericum maculatum* /2,17/, *Hieracium sataudum* /12/, *Hieracium lasce-*
nalis /12/, *Viola riviniana* /2/, *Pteridium aquilinum* /5/, *Rubus saxatilis* /12/, *Juncus effusus* /2/, *Erosus tenekeni* /12/, *Gelectis speciosa* /14/,
Galium aparine /14,19/, *Chelidonium majus* /19/, *Glechoma hederacea* /19/, *Polygonatum verticillatum* /16/.

ad VI *Anium affine* var. *elatum* /1, 20,21/, *Dicranella heteromalla* /6,24/, *Rhytidadelphus triquetrus* /3,8/, *Pohlia nutans* /5,8/.

Cojnaszenia /Explanations/

Red - Redanka, D.1 - Domkowo I, Dur - Durąg, Dyl - Dylewo, Kit - park w Kitnowie, Klon - Kłontwo, Rud - Rudno, Szcz - Szczepankowo, Wng - Wygoda.

Różnice w strukturze drzewostanów powodują, że wilgotność i stosunki świetlne w poszczególnych płatach kształtują się niejednakowo, a tym samym stwarzają różne warunki wegetacji dla roślinności runa. Wynikające stąd różnice w składzie gatunkowym nie wystarczają jednak do wyróżnienia w obrębie omawianego podzespołu wariantów.

Najpełniejszy skład gatunkowy posiadają fitocenozy z grupy b. Występuje w nich przeciętnie 56 gatunków. W grupie z *Quercus robur* (a) odnotowano ich 48, zaś w grupie z *Acer pseudoplatanus* (c) — tylko 43. Zubożenie składu roślinności zielnej w grupach a i c spowodowane jest dużą cieniistością wnętrza lasu w okresie letnim, a w pewnym stopniu wynika także z selektywnego wpływu samego siedliska. Wiele gatunków nie znajduje tam dogodnych warunków dla swojego rozwoju, a niektóre z kolei występują masowo. Do tych ostatnich należą w okresie wiosennym *Anemone nemorosa* i *A. ranunculoides*, natomiast w okresie lata — *Impatiens noli-tangere*, *Stellaria nemorum* i *Aegopodium podagraria*.

Na przynależność opisanych zbiorowisk do podzespołu *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae* wskazują systematyczne wartości ich najważniejszych grup syngenetycznych (tab. 26).

Tabela 26 — Table 26

Struktura systematyczna podzespołu *Tilio-Carpinetum stachyetosum*
Systematic structure of *Tilio-Carpinetum stachyetosum*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and)					
<i>Carpinion betuli</i>	7	84	6,91	50,00	3,45
Ch. <i>Alno-Padion</i>	11	115	9,46	43,56	4,12
Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i>	34	381	31,33	46,69	14,63
Ch. <i>Quercu-Fagetea</i>	21	225	18,50	44,64	8,26
Towarzyszące (Accompanying sp.)	58	411	33,80	29,53	9,98
Razem (Total)	131	1216	100,00		

Gatunki charakterystyczne zespołu i związku *Carpinion betuli* odgrywają poślednią rolę, gdyż stanowią nieliczną grupę. Najlepiej scharakteryzowany jest przez nie wariant typowy. Wiodącą grupę tworzą gatunki rzędu *Fagetalia* i związku *Alno-Padion* wymagające siedlisk eutroficznych. Uzupełniają je elementy klasy *Quercu-Fagetea* i roślinność towarzysząca. Przewaga gatunków przywiązanych do eutroficznych lasów liściastych nad gatunkami o szerszej skali ekologicznej jest cechą wyróżniającą dla tego podzespołu w stosunku do grądów wysokich (tab. 70).

Od tych ostatnich grąd czyścicowy różni się szczególnie: stałym udziałem *Anemone ranunculoides* i *Impatiens noli-tangere*, częstym występowaniem

niem *Adoxa moschatellina* i *Carex silvatica* oraz brakiem lub zaledwie sporadycznym pojawieniem się *Hedera helax*, *Vicia silvatica*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Carex digitata*, *Poa nemoralis*, *Lathyrus vernus*, a także przedstawicieli związku *Pino-Quercion* i klasy *Vaccinio-Piceetea*.

Brak w omawianym podzespole niektórych geofitów i innych gatunków wyróżniających podzespół *Tilio-Carpinetum corydaletosum* stwarza możliwość łatwego rozróżniania na badanym terenie grądów niskich między sobą.

W skali krajowej podzespół *Tilio-Carpinetum stachyetosum* jest zbiorowiskiem powszechnie notowanym w pracach opisujących lasy grądowe. W pasie Niżu Środkowego najczęściej rozwija się w postaci typowej. Zajmuje tam zazwyczaj duże powierzchnie, a kontaktując się często z zespołem *Fraxino-Ulmetum* tworzy szereg wariantów zbliżających się składem florystycznym do łęgów. Do nich należy: wielokrotnie wyróżniany wariant z *Ulmus campestris* (Wojterski 1960; Denisiuk 1963; Krotoska, Pawłow, Piotrowska 1965; Krotoska, Pawłow, Piotrowska 1965; Mielcarski 1969), wariant z *Fraxinus excelsior* (Mielcarski 1969), a także warianty z *Alnus glutinosa* i *Tilia platyphyllos* z województwa łódzkiego (Urbanek 1966; Mowszowicz i in. 1967, 1969).

Na obszarach sąsiedownia, względnie współistnienia lasów grądowych z buczynami (Wzniesienia Górowskie, Wysoczyzna Elbląska, Pojezierze Iławskie, ziemia chełmińska, Pojezierze Zachodnie, zachodnia Wielkopolska, północe Niemcy), wykształca się forma grądu czyścowego z dużą ilością buka w drzewostanie i obecnymi w runie niektórymi gatunkami zielnymi ze związku Fagion. Określa się ją za Tuxenem (1937) jako wariant z *Fagus silvatica*. Ten typ grądu niskiego wyróżnili w Polsce północnej Tokarz (1961), Wojterski (1960), Jutrzenka-Trzebiatowski (1968), Rejewski (1971) i Stypiński (1974). Do niego należałoby też zaliczyć podzespół *Tilio-Carpinetum stachyetosum* z terenu Wzgórz Dylewskich. Nie uwzględniono tej jednostki w układzie systematycznym badanych grądów, gdyż buk występuje we wszystkich podzespółach i wariantach zespołu *Tilio-Carpinetum*.

C. *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*

Tilio-Carpinetum lathyretosum verni jest zbiorowiskiem grądowym najczęściej spotykanym na badanym terenie. Zajmuje dlatego poważny procent powierzchni lasów grądowych. Porasta zazwyczaj płaskie powierzchnie, łagodne zbocza i kopulaste grzbiety falistych wzgórz morenowych. W swoim występowaniu nie zdradza przywiązania do określonej ekspozycji.

Podłoże typowych grądów mezotroficznych tworzą przeważnie gleby brunatne wylugowane lub gleby płowe, wytworzone z piasków gliniastych, zalegających na głębokości około 70 cm na glinie średniej lub lekkiej

(ryc. 19, tab. 27). Omawiany podzespół zajmuje więc gleby dość luźne, przepuszczalne, przewiewne i dlatego szybko wysychające.

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują, że gleby te są średnio produktywne i zakwaszone, co wyjaśnia stałe zaznaczanie się w nich procesów przemiywania. Odczyn kształtuje się w obu odkrywkach na tym samym poziomie, lecz różny jest rozkład jego wartości w płaszczyźnie pionowej (tab. 28). Stosunek C/N waha się w poziomie próchnicznym od 17,0 do 19,3. Niższe wartości osiąga w glebie płatów typowych (prof. 23). Ilość przyswajalnego P_2O_5 jest na ogół nieduża (1,40-7,80) i różna w tych samych poziomach badanych gleb. Podobne wartości osiąga także K_2O (3,10-7,40), lecz w jego rozkładzie zaznacza się wyraźna prawidłowość. Najwięcej znajduje się go w poziomie próchnicznym i w dolnych poziomach profilu.

Ryc. 19. Profile glebowe w podzespole *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*

Fig. 19. Soil profiles of the subassociation *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*

(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

Podzespół *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni* z terenu Wzgórz Dylewskich swoją fizjonomią bardziej kojarzy się z buczyną pomorską lub niektórymi postaciami boru mieszanego niż z analogicznymi zbiorowiskami rozwijającymi się w pasie Niżu Środkowopolskiego. Jest tak dlatego, że gatunkiem zazwyczaj przeważającym, a często nawet dominującym w drzewostanie jest buk, któremu w płatach bardziej odbiegających od typu towarzyszy dodatkowo sosna i świerk. Z gatunków grądowych jedynie grab jest prawie stałym składnikiem drzewostanu, choć często występuje w niedużej ilości. Lipa drobnolistna i dąb szypułkowy w dylewskich grądach wysokich należą do rzadkości. Z pozostałych gatunków drzewiastych częściej spotykane są *Acer platanoides* i *Betula verrucosa*, a inne występują sporadycznie. W określonych fitocenozach udział wymienionych gatunków może być zasadniczo różny.

Tabela 28 — Table 28

Niektóre właściwości chemiczne gleb w podzespole *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*
Some chemical properties of soils in *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni* subassociation

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O metoda Egnera acc. to Egner mg/100 g gleby mg/100 g of soil
			w in H ₂ O	w in KCl						
			% 							

Gleba brunatna wylugowana wytworzona z piasków gliniastych na glinie średniej
Brown leached soil formed from loamy sands on medium loam

23	Bendarki 52 164	A ₁	3-15	5,1	4,0	3,465	2,010	0,1176	17,0	6,80	5,70
		(B)	15-52	5,9	4,4	0,911	0,528	0,0280	18,8	7,80	3,10
		A ₃ (Bg)	52-68	5,9	4,4	0,187	0,108	0,0056	19,3	3,70	3,90
		BtD	68-92	5,7	4,2	0,362	0,210	0,0196	10,7	4,00	7,40
		D	92-140	5,8	4,2	0,176	0,102	0,0045	22,4	3,50	3,40

Gleba płowa właściwa wytworzona z piasków gliniastych na glinie lekkiej
Typical pseudopodzolic soil formed from loamy sands on sandy loam

20	Napromek 137 172	A ₁	3-14	5,5	4,1	3,913	2,270	0,1176	19,3	1,40	6,40
		A ₁ A ₃	14-33	5,3	4,3	1,997	1,158	0,0476	24,2	3,30	3,70
		A ₃	33-55	5,1	4,2	0,952	0,552	0,0336	16,4	5,25	3,30
		A ₃ g	55-68	5,3	4,3	0,455	0,264	0,0056	47,1	6,00	3,30
		BtDg	68-90	5,5	4,1	0,455	0,264	0,0112	23,6	6,55	5,45
		D	90-140	5,4	4,0	0,162	0,096	0,0056	17,5	7,40	5,70

Tabela 29

Tilio - Carpinetum lathyretosum verni Traczyk 1962

Nr kolejny /Successive number/ Nr zdjęcia /Number of record/ Data /Date/ Lecznictwo /Gorestry/ Uroczysko /Range/ Nr oddziału /No. of section/ Nachylenie terenu w stopniach /Inclination of area in grades/ Ekspozycja /Exposition/ Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/ Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/ Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/ Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/ Liczba gatunków /Number of species/	1 60 13.6 Dyl Dyl 114 5 F a ₁ a ₂ b c m ² 36	2 199 26.5 Klon Wg 185 10 NE 80 90 - 85 400 43	3 2 22.5 Bud Bud 46 5 NE 80 10 - 80 200 44	4 151 22.5 Bud Bud 126 3 NE 80 10 - 80 400 42	5 54 28.5 Bud Bud 421 5 NE 80 10 - 85 400 44	6 211 19.6 Dyl Dyl 121 - SW 80 10 - 95 500 38	7 68 68 Dyl Dyl 71 5 SE 80 10 - 80 500 42	8 149 19.7 Bud Bud 45 5 SE 80 15 - 85 400 42	9 134 22.5 Bud Bud 55 5 SE 80 15 - 85 400 47	10 112 18.7 Dyl Dyl 63 10 NE 75 20 - 400 46	11 131 19.7 Bud Bud 54 5 S 80 10 - 450 50	12 121 18.7 Dyl Dyl 64 15 SE 80 15 - 350 40	13 164 23.5 Bud Bud 59 10 SE 75 10 - 400 55	14 15 19.7 Dyl Dyl 52 3 NE 60 15 - 400 45	15 16 23.5 Bud Bud 58 15 NE 75 10 - 400 44	16 132 19.7 Dyl Dyl 54 5 NE 85 - 400 50	17 162 23.5 Bud Bud 52 - SE 70 - 300 41	18 115 18.7 Bud Bud 63 5 E 20 - 500 50	19 114 18.8 Bud Bud 67 3 E 20 - 400 49
---	--	---	---	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---

typowy /typical/

Wariant /Variant/

I Ch. Tilio-Carpinetum
i /and/ Carpinion betuli

Carpinus betulus

Evonymus verrucosa

Stellaria holostea

Dactylis eschersoniana

Melampyrum nemorosum

Ch. Alno-Padion

Stachys silvatica

Festuca gigantea

Equisetum silvaticum

Cirsium lutetiana

V
IV
IV
IV
III
III
III
I

[illegible]

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

- ad III Acer pseudoplatanus /1,2/, Anemone ranunculoides /3,16/, Viola mirabilis /5,10/, Festuca silvatica /7/, Melica uniflora /2/,
ad IV Vaccaria premaria /2/, Scotia nidus-avis /12/, Ribes grossularia /11/,
ad V Viola silvatica /6,3/, Moenchia trinervia /10,19/, Campanula ranunculoides /12/,
ad VI Populus tremula /2,3/, Ranus silvestris /1,13/, Fica excelsa /1,9/, Viola riviniana /3,14/, Iycopodium selago /15/, Pte-
ridium aquilinum /17/, Callimargotis arundinacea /13/, Dierum scoparium /5,16/,
ad VII Sambucus racemosa /9/, Sambucus nigra /4/, Chamaenerion angustifolium /14,15,18/, Rubus bellardii /9,11,16/, Bromus benekeni
/12,13,15/, Impatiens parviflora /1,13/, Rubus saxatilis /8,17/, Anthriscus silvestris /5,19/, Ribes sp. /10/, Glechoma hede-
racea /9/, Fragaria vesca /17/, Ranunculus repens /18/,
ad VIII Catharina tenella /2,11,16/, Ranunculus acris velutinum /1,3,14/, Dicanella heteronalla /5,12,13/, Brachythecium reflexum /1,
18,19/, Rhizidiadelphus triquetrus /11,12/, Thuidium recognitum /11,13/, Thuidium tamariaculum /3,16/.
- Objasnenia /Explanations/

Bed - Bednarki, Dyl - Dylewo, Klon - Klonowo, Rud - Rudno, Wzg - Wzgoda.

Niejednakowy jest też rozwój podszycia. Przeważnie rozwija się ono słabiej niż w podzespółach grądów niskich.

Najlepiej charakteryzuje ten typ grądu oraz najbardziej przemawia za jego przynależnością do podzespołu *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni* roślinność zielna runa (tab. 29 i 30). Jej skład gatunkowy odznacza się na ogół typowym dla tej jednostki doбором komponentów i dlatego dobrze wyróżnia ją także od pozostałych podzespółów lasu grądowego. Opisywany podzespół cechuje się brakiem gatunków o dość wysokich wymaganiach w stosunku do siedliska, zaliczanych do związku *Alno-Padion* lub uznawanych za wyróżniające dla podzespołu *Tilio-Carpinetum corydaletosum*. Większą rolę odgrywa natomiast roślinność siedlisk uboższych. W niektórych płatach naprzemian pojawiają się różne gatunki borowe ze związku *Pino-Quercion* i klasy *Vaccinio-Piceetea*. Pojedynczo mogą występować nawet rośliny kserotermiczne.

Z gatunków charakterystycznych dla zespołu i związku *Carpinion betuli* najwyższe stopnie stałości osiąga *Carpinus betulus*, *Stellaria holostea*, *Evonymus verrucosa* i *Dactylis aschersoniana*. Przywiązanie do tej postaci grądu zdradza *Melampyrum nemorosum*. Nie występuje natomiast *Lathraea squamaria* i *Ranunculus cassubicus*, a rzadko spotykana jest *Carex pilosa*.

Z przedstawicieli rzędu *Fagetalia* brak *Impatiens noli-tangere*, nieczęsto spotykana jest *Carex silvatica* i *Pulmonaria obscura*, z dużą stałością występuje natomiast *Lathyrus vernus*, *Phyteuma spicatum* i *Hepatica nobilis*. Z klasy *Querco-Fagetea* optymalne warunki dla rozwoju posiadają tu: *Lonicera xylosetum*, *Melica nutans*, *Carex digitata*, *Poa nemoralis* i *Moehringia trinervia*, a najwyższe stopnie stałości osiąga *Mycelis muralis* i *Scrophularia nodosa*.

Różnice florystyczne uwidaczniają się także w grupie gatunków towarzyszących. W opisywanym podzespole wzrosło znaczenie *Convallaria maialis*, *Luzula pilosa*, *Hieracium murorum*, *Phegopteris dryopteris*, *Ajuga reptans*, *Majanthemum bifolium* i *Veronica chamaedrys*. Obniżoną żywotnością wyróżnia się natomiast *Urtica dioica*, a sporadycznie występuje *Geranium robertianum*.

W ciągu sezonu wegetacyjnego runo tego podzespołu odznacza się niewielką zmiennością. Facja wiosenna zaznacza się tu jedynie jako masowy zakwit *Anemone nemorosa*, urozmaicony rozproszonymi grupami kwitnących okazów *Hepatica nobilis* i *Pulmonaria obscura*. Zdecydowaną przewagę posiadają gatunki rozwijające się w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

Średnia liczba gatunków w zdjęciu dla całego podzespołu wynosi około 47. W wariantcie typowym występuje ich 45, w wariantcie z *Campanula persicifolia* — 47, a w wariantcie z *Sambucus racemosa* — 54.

Zasadniczy zręb omawianego zbiorowiska tworzą przedstawiciele rzędu *Fagetalia*, klasy *Querco-Fagetea* i gatunki towarzyszące. Stale uzupełniają

Tabela 30

Tilio - Carpinetum lathyretosum verni Traczyk 1962

[illegible]

2

[illegible]

VI Gatunki towarzyszące
/Accompanying species/

a	a	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VII Mchy towarzyszące
/Accompanying masses/

[illegible]

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

- III Fed III Festuca silvatica /11/, Impatiens noli-tangere /16/, Pulmonaria obscura /2,4,9/, Ranunculus lanuginosus /6,16/, Asarum europaeum /4/,
IV Fed IV Adoxa moschatellina /4/,
V Fed V Crataegus monogyna /7/, Vicia silvatica /4,5/, Hedera helix /17/,
VI Fed VI Opulus tremula /13/, Pteridium aquilinum /12,13,14/, Pirola secunda /2,9,19/, Dicranum scoparium /9,11/, Calamagrostis arundinacea /11/, Trientalis europaea /8/, Polypodium vulgare /16/, Anthoxanthum odoratum /9/, Hydrocotyle vulgaris /9,15,19/,
VII Fed VII Hypericum perforatum /3,10,16/, Arctostaphylos uva-ursi /5,14,15/, Anthoxanthum odoratum /9/, Geranium robertianum /14/, Hieracium pilosella /11/, Ribes sp. /15/, Astragalus glycyphyllos /4/, Plantanthera biflora /4/,
VIII Fed VIII Thuidium recognitum /12/, Isachne viviparum /18/, Rhydiadelphus triquetrus /15,19/, Anabasis arvensis /17/,

Objaśnienia /Explanations/

Bed - Bednarki, D.I - Domkowo I, -Dur - Durąg, Dyl - Dylewo, Klon - Klonowo, Nap - Napromek, Rud - Rudno, Szyl - Szyldek, Wzg - Wzgoda, Zaj - Zajęzki.

je elementy związku *Carpinion betuli*, a w uboższych postaciach zawsze pojawiają się gatunki borowe ze związku *Pino-Quercion* i klasy *Vaccinio-Piceetea* (tab. 31). Obecność 7 gatunków grądowych, podczas gdy ze związku *Fagion silvaticae* występuje tylko *Fagus silvatica*, zdecydowanie przemawia za zaliczeniem charakteryzowanego lasu do grądów.

Chociaż w swojej podstawie skład florystyczny podzespołu *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni* jest jednolity, to jednak szereg dalszych różnic w zakresie jego struktury i ilościowego udziału poszczególnych gatunków, upoważnia do wydzielenia w jego obrębie trzech wariantów florystyczno-ekologicznych. Są to: wariant typowy, wariant z *Campanula persicifolia* i wariant z *Sambucus racemosa*.

Tabela 31 — Table 31

Struktura systematyczna podzespołu *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*
Systematic structure of *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*

Grupa gatunków Group of species	Wariant Variant	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) <i>Carpinion betuli</i>	a	5	67	7,82	70,52	5,51
	b	6	44	8,00	66,66	5,33
	c	5	28	6,48	70,00	4,54
		7	139	7,55	52,25	3,94
Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i>	a	33	274	31,93	43,70	13,95
	b	22	112	20,36	46,28	9,42
	c	21	101	23,38	60,12	14,06
		34	487	26,47	37,69	9,98
Ch. <i>Quercio-Fagetea</i>	a	17	174	20,28	54,18	10,99
	b	21	126	22,91	54,54	12,49
	c	14	73	16,89	65,18	10,21
		23	373	20,27	42,79	8,67
Ch. <i>Pino-Quercion</i> i (and) <i>Vaccinio-Piceetea</i>	a	13	47	5,48	19,02	1,04
	b	18	93	16,91	72,66	12,29
	c	15	71	16,43	59,16	9,72
		25	211	11,47	22,21	2,55
Towarzyszące (Accompanying species)	a	49	296	34,49	31,79	10,96
	b	37	175	31,82	43,00	13,68
	c	39	159	36,80	50,96	18,75
		56	630	34,24	29,65	10,15
Razem (Total)	a	117	858	100,00		
	b	104	550	100,00		
	c	94	432	99,99		
		145	1840	100,00		

a — wariant typowy (typical variant), b — wariant z (variant with) *Campanula persicifolia*, c — wariant z (variant with) *Sambucus racemosa*.

Mezotroficzne grądy dylewskie najlepiej charakteryzuje wariant typowy (tab. 29) wykształcający się we wszystkich większych kompleksach leśnych tego terenu.

Jest to zbiorowisko przeważnie trójwarstwowe. Składa się z dwuwarstwowego drzewostanu i runa. Podszycie rozwija się na ogół bardzo słabo, co upraszcza strukturę i powoduje, że wewnątrz tego lasu jest zazwyczaj widne i przejrzyste. W warstwie górnej drzewostanu dominuje *Fagus silvatica*. W niektórych płatach w większej ilości towarzyszy bukowi *Betula verrucosa*, a przez pojedyncze okazy mogą być reprezentowane: *Quercus robur*, *Acer platanoides* względnie inne gatunki. *Carpinus betulus* tworzy zazwyczaj okap drzewostanu. Struktura drzewostanu w wariantie typowym bardzo często zbliża się do typu, jaki ilustruje wykres ryciny 24.

W warstwie krzewów pojawiają się niekiedy jedynie małe skupienia *Evonymus verrucosa*, *Sorbus aucuparia* i *Lonicera xylosteum*.

Runo wariantu typowego posiada charakterystyczny dla omawianego podzespołu skład gatunkowy i nie wyróżnia się żadną cechą szczególną.

Wariant z *Campanula persicifolia* wykształca się w oddziałach 51 i 52, w północnej części kompleksu głównego oraz w uroczyskach: Rudno, Durąg I (oddz. 8), Durąg II, Szyldak i Domkowo I. W swoim występowaniu ogranicza się on do kopulastych lub prawie płaskich wierzchołków moreny pagórkowatej. Charakteryzują go wysokie wymagania w stosunku do światła, a niewielkie w stosunku do podłoża i dlatego zawsze rozwija się w brzeżnych partiach kompleksów leśnych.

Fizjonomia i struktura tego grądu jest podobna, jak w płatach buczyny pomorskiej w facji z *Melica uniflora*. W jego jednowarstwowym drzewostanie dominuje zawsze *Fagus silvatica*, podszycia najczęściej brak, a w runie przeważają trawy i turzyce.

W składzie gatunkowym runa na plan pierwszy wysuwa się masowo występująca *Poa nemoralis*. Do cech wyróżniających należy zaliczyć pojawianie się na przemian niektórych przedstawicieli rzędu *Quercetalia pubescentis*, a także światłolubnych gatunków towarzyszących, jak *Carex pallescens* czy *Luzula pallescens* (tab. 30). Ich obecność i stały brak w runie *Urtica dioica*, *Galeopsis pubescens* i *Geranium robertianum* oraz sporadyczny udział *Rubus idaeus* i *Athyrium filix-femina*, zbliża opisywany wariant grądowy do świetlistych dąbrów mieszanych. Wyższa jest także stałość i systematyczna wartość grupowa elementów związku *Pino-Quercion* i klasy *Vaccinio-Piceetea* (tab. 31). Cechy te dobrze wyróżniają omawianą jednostkę, szczególnie w stosunku do wariantu typowego.

Wariant z *Sambucus racemosa* częściej wykształca się w północnej części uroczyska Dylewo (kompleks główny) oraz w północno-zachodnich oddziałach uroczyska Zajączki. Na małych powierzchniach rozwija się także w uroczyskach Klonowo i Szczepankowo. We wszystkich badanych przypadkach zajmuje tereny płaskie z glebą płową, niezbyt zasobną w składniki przyswajalne (profil 20).

Ryc. 20. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*, wariant z *Rubus saxatilis*

Fig. 20. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*, variant with *Rubus saxatilis*

1 — *Carpinus betulus*; 2 — *Fagus sylvatica*; 3 — *Pinus silvestris*; 4 — *Betula verrucosa*

Omawiany wariant wieloma cechami różni się od pozostałych postaci podzespołu *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*.

Indywidualnie kształtuje się w nim struktura drzewostanu (ryc 20). Korony drzew układają się przeważnie w trzech warstwach. Słabo zwartą warstwę najwyższą tworzy *Pinus silvestris*. W jej okapie licznie występuje *Fagus sylvatica* i *Betula verrucosa* uzupełniane stale przez *Picea excelsa*, a niekiedy także przez *Quercus robur* i *Acer platanoides*. W najniższej warstwie przeważa *Carpinus betulus*. Taka budowa drzewostanu powoduje duże ocienienie wnętrza lasu i słabe odnawianie niektórych gatunków drzewiastych. Z rozkładu gatunków w poszczególnych klasach grubości można wnioskować, że mamy tu do czynienia z drzewostanem mieszanym regenerującym się w sposób naturalny z drzewostanu charakteryzującego pierwotnie bór mieszany.

W wariantcie z *Sambucus racemosa* dobrze rozwija się podszycie. Stałym lub częstym składnikiem tej warstwy jest: *Lonicera xylosteum*, *Sambucus racemosa*, *Evonymus verrucosa*, *Sorbus aucuparia* oraz podrost *Fagus sylvatica* i *Carpinus betulus*. Towarzyszy im nieraz *Corylus avellana*, *Frangula alnus*, podrost *Picea excelsa* i *Acer platanoides*.

W składzie gatunkowym runa zwraca uwagę częste i liczne występowanie *Rubus saxatilis* i *Viburnum opulus*. Częstsze pojawianie się *Festuca gigantea*, *Paris quadrifolia*, *Urtica dioica*, *Galeopsis pubescens* i *Deschampsia caespitosa* jest rezultatem większej cienistości dna lasu, a przez to lepszym kształtujących się stosunków wodnych w glebie.

Identyfikacja zestawionego w tabelach 29 i 30 materiału zdjęciowego, z często opisywanym na obszarze Polski wschodniej i południowej mezo-

troficznym podzespołem *Tilio-Carpinetum typicum* (= *lathyretosum verni*) nie następuje większych trudności (Traczyk 1962a i b; Młynek, Polakowski 1960; Polakowski 1961, 1966; Matuszkiewicz 1952; Izdebski 1962; Denisiuk 1963; Sokołowski 1963, 1968, 1969; Faliński, Matuszkiewicz 1965; Faliński 1965; Kępczyński 1965; Kępczyński, Wilkoń-Michalska 1967; Kępczyński, Boiński, Ceynowa 1967; Kępczyński, A. Noryśkiewicz, 1968, Rejewski, Mejnartowicz 1968, Tokarz 1961, 1971; Stypiński, 1974; Rejewski 1971; Boiński 1973; Urbanek 1966; Mowszowicz i inni 1967, 1969).

Daleko idące podobieństwo materiału zdjęciowego z Wzgórz Dylewskich w stosunku do cytowanego z literatury ujawnia się szczególnie w składzie gatunkowym runa. Istotną różnicę stanowi jedynie stałe dominowanie w mezotroficznym grądzie dylewskim buka. Powoduje to, że fizjonomią upodabniają się one do lasów bukowych, a całością stosunków florystycznych najbardziej zbliżają się do wyróżnianego niekiedy w obrębie podzespołu *Tilio-Carpinetum typicum* wariantu z *Fagus sylvatica* (Kępczyński, 1965; Kępczyński, Wilkoń-Michalska 1967; Tokarz 1971b; Rejewski 1971).

Z wyróżnionych jednostek niższych zbiorowiskiem o szerszym zasięgu jest wariant z *Campanula persicifolia*. Dotychczas stwierdzono jego występowanie na terenie środkowej Wielkopolski (Krotoska, Pawłow, Piotrowska 1965; Krotoska 1966) oraz w kilku miejscach na Pojezierzu Iławskim (Tokarz 1971; Jutrzenka-Trzebiatowski 1969 — maszynopis). Taka postać grądu znana jest z autopsji także na Pojezierzu Kaszubskim. Dla wariantu *Sambucus racemosa* nie znaleziono odpowiednika w literaturze fitosocjologicznej. Jest to, być może, lokalna postać grądu wysokiego, będąca wynikiem własnej drogi rozwojowej.

Dla określenia wysokich grądów typowych, z dwóch obecnie najczęściej używanych nazw „*typicum*” i „*lathyretosum verni*”, zastosowano w niniejszej pracy tę drugą, gdyż ona lepiej określa istotne cechy tego zbiorowiska. Nazwą *Tilio-Carpinetum* względnie *Galio-Carpinetum typicum* można określać grądy wysokie z drzewostanem grabowo-dębowym występujące poza zasięgiem buka. Duży udział buka w grądach dylewskich czyni je odmiennymi od postaci typowej i dlatego nazwa „*typicum*” jest dla nich niezbyt odpowiednia. W tej sytuacji poprawniejszym określeniem dla typowych grądów wysokich z terenu Wzgórz Dylewskich jest nazwa *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*. Dla tej jednostki podstawową cechą wyróżniającą jest stała obecność i zwiększona liczebność takich gatunków, jak *Lathyrus vernus*, *Poa nemoralis*, *Melica nutans*, *Carex digitata*, *Hepatica nobilis*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis* i *Phyteuma spicatum* (Wojterski 1960). Gatunki te, jako wyróżniające i należące do tej samej grupy ekologicznej, mogą być pomocne do określania stosunków siedliskowych tego grądu.

D. *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*

Typowo wykształcone płaty grądu turzycowego porastają południowe zbocza w uroczysku Wygoda i w zachodniej części uroczyska Zajączki. Na niedużej powierzchni rozwija się on także w oddziale 124 kompleksu głównego.

Podłożem omawianego grądu jest gleba brunatna kwaśna, wytworzona z piasków gliniastych zwałowych (ryc. 21). Dane charakteryzujące jej

Ryc. 21. Profil glebowy w podzespole *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*

Fig. 21. Soil profile of the subassociation *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*

(Legenda jak nr ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

skład mechaniczny i właściwości chemiczne podano w tabelach 32 i 33. W budowie morfologicznej tej gleby zwraca uwagę dość gruba warstwa słabo rozłożonej ściółki z przewagą szczątków *Carex pilosa*. Pod nią wykształcił się niezbyt gruby, ciemnoszary poziom akumulacyjny; przechodzący stopniowo w głęboki, jasnobrunatny poziom brunatnienia. Od głębokości około 100 cm zalega dużo kamieni, zaś barwa brunatno-żółta zwraca uwagę na zaznaczające się oglejenie opadowe.

Zarówno morfologia, jak i wyniki analizy mechanicznej, nie zdradzają oznak procesów wymywania i przemywania. Mając na uwadze różnicowaną orografię terenu, można to tylko tłumaczyć korzystnym wpływem roślinności zielnej. Stosunki powietrzne z powodu dość luźnego składu mechanicznego i znacznej szkieletowości substratu glebowego kształtują się pomyślnie. Nieduża zawartość składników przyswajalnych i azotu oraz nagromadzenie się węgla w warstwie akumulacyjnej wskazuje, że jest to podłoże co najwyżej średnio produktywne, gdyż stosunek C/N w profilu waha się od 21,7 w poziomie brunatnienia, do 26,9 w warstwie powierzchniowej. Głównym czynnikiem ograniczającym rozkład materii organicznej w warstwach wierzchnich jest częsty niedostatek wody. Zakwaszenie omawianej gleby jest dość duże. Skale macierzystą cechuje wprawdzie odczyn

Tabela 32 — Table 32

Skład mechaniczny gleby w podzespole *Tilio-Carpinetum carictetosum pilosae*
 Mechanical composition of the soil in *Tilio-Carpinetum carictetosum pilosae* subassociation

Nr pro- filu No. of pro- file	Leśnictwo oddział nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	Czści skie- letowe Skele- ton parts %	Części ziemiste % — Earth parts %						Gatunek gleby według klasyfikacji PTG Name of the soil variety according of PTG to the classification	
				Części piaskowe Sand parts			Cz. pyłowe Dust parts		Cz. splewialne Float parts		
				1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05- 0,02	0,02- 0,006		0,006- 0,002
				Ø mm							

Gleba brunatna kwaśna wytworzona z piasków gliniastych
 Acid brown soil formed from loamy sands

8	Klonowo 171 186	A ₁	9-20	15,6	14,0	19,7	23,3	16	13	7	3	4	piasek gliniasty lekki
		A ₁ (B)	20-41	16,0	13,2	19,5	23,3	11	14	10	5	4	piasek gliniasty mocny
		(B)	41-95	20,0	13,5	21,7	24,8	13	7	11	5	4	piasek gliniasty mocny
		(B)Cg	95-130	26,0	15,5	23,7	32,8	6	9	6	5	2	piasek gliniasty lekki
		C	130-170	25,2	19,5	32,5	27,0	5	3	3	7	3	piasek gliniasty lekki

Tabela 33 — Table 33

Niektóre właściwości chemiczne gleby w podzespole *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*
 Some chemical properties of soil in *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae* subassociation

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			w in H ₂ O	w in KCl						
			%							
Gleba brunatna kwaśna wytworzona z piasków gliniastych Acid brown soil formed from loamy sands										
8	Klonowo 171 186	A ₁	4,7	3,8	5,327	3,090	0,1148	26,9	1,20	3,90
		A ₁ (B)	4,9	4,1	2,222	1,284	0,0504	25,5	1,90	2,20
		(B)	5,1	4,2	1,549	0,852	0,0392	21,7	1,80	1,60
		(B)Cg	5,3	4,4	0,385	0,222	0,0084	26,4	0,75	0,80
		C	6,7	6,0	0,248	0,144	0,0056	25,7	3,55	2,20

zbliżony do obojętnego, lecz bliżej powierzchni osiąga on wartości coraz niższe. W poziomie akumulacyjnym kwasowość jest większa od przeciętnie spotykanej w grądach dylewskich.

Fizjonomią grąd turzycowy różni się dość znacznie od innych zbiorowisk zespołu *Tilio-Carpinetum*. Wyróżnia go przede wszystkim odrębny charakter runa, spowodowany dominowaniem *Carex pilosa*. Jej zwarte łany warunkują rozwój i rozprzestrzenianie się reszty gatunków. Warstwa zielna charakteryzuje się dlatego dużą jednorodnością i stałością składu gatunkowego. Tylko w okresie wiosennym, kiedy tu i ówdzie w większej ilości pojawia się *Anemone nemorosa* oraz towarzyszące jej *Hepatica nobilis* i *Pulmonaria obscura*, runo cechuje się mniej monotonnym wyglądem.

Warstwa krzewów rozwija się na ogół słabo, a często na dość dużych powierzchniach brak jej zupełnie. Przy zazwyczaj południowej ekspozycji zboczy brak podszycia ma istotne znaczenie dla kształtowania się warunków termicznych i świetlnych we wnętrzu lasu. Można przypuszczać, że powyższe czynniki w głównej mierze regulują skład runa i przyczyniają się do masowego rozwoju *Carex pilosa*.

Drzewostan w płatach uboższych, porastających wierzchołkowe partie moren pagórkowatych, jest zawsze jednowarstwowy i buduje go prawie wyłącznie *Fagus silvatica*. W fitocenozach zajmujących łagodniejsze zbocza i płaskie powierzchnie podnóży zróżnicowany jest na dwie warstwy. W warstwie wyższej gatunkiem dominującym jest *Fagus silvatica*, a w niższej — *Carpinus betulus*, z domieszką *Betula verrucosa* i *Fagus silvatica*, a nie-raz także *Acer platanoides* i *A. pseudoplatanus*.

Pomiary pierśnicy drzew do badań nad strukturą drzewostanu wykonano w zdjęciu 186, w oddziale 171 uroczyska Wygoda. Uzyskane wyniki obrazuje rycina 22. Skład gatunkowy drzewostanu i rozkład egzemplarzy w poszczególnych klasach grubości są podobne jak w wielu innych postaciach grądu na terenie Wzgórz Dylewskich. Najliczniej we wszystkich klasach grubości reprezentowany jest buk. Duża rozpiętość klas, a także łamany przebieg linii ilościowego udziału buka wskazują na naturalny charakter opisywanego drzewostanu. Drugie miejsce pod względem ilościowego udziału zajmuje *Carpinus betulus*. Obecność reszty gatunków drzewiastych jest mało znacząca.

Pod względem florystycznym podzespół *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae* jest zbiorowiskiem dobrze scharakteryzowanym (tab. 34). Dominowanie w runie *Carex pilosa*, stałe występowanie *Stellaria holostea* oraz częsta obecność w drzewostanie *Carpinus betulus*, w podszyciu — *Evonymus verrucosa*, a w runie — *Ranunculus cassubicus* i *Melampyrum nemorosum*, umożliwia łatwą identyfikację poszczególnych płatów.

Obliczona metodą Ellenberga i Tüxena systematyczna wartość grupowa dla gatunków charakterystycznych zespołu i związku *Carpinion betuli* oraz ich udział grupowy (tab. 35), choć są dość wysokie, to jednak w niedostatecznym stopniu odzwierciedlają wysoce indywidualny charak-

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Nr zdjęcia /Number of record/	195	200	196	186	206	184	183	10	185	175	173	177	178	
Data /Date/	25.5	26.5	25.5	25.5	26.5	24.5	24.5	28.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	
	68	68	68	68	68	68	68	67	68	68	68	68	68	
Leśnictwo /Forestry/	Klon	Klon	Klon	Klon	Klon	Nap	Nap	Dyl	Nap	Nap	Nap	Nap	Nap	
Uroczysko /Range/	Wyg	Wyg	Wyg	Wyg	Wyg	Zaj	Zaj	Dyl	Zaj	Zaj	Zaj	Zaj	Zaj	
Odział /No. of section/	170	186	184	171	172	143	143	124	140	140	137	139	139	
Nachylenie terenu w stopniach /Inclination of the area in grades/	10	20	15	20	15	5	5	8	25	8	5	5	5	
Ekspozycja /Exposition/	SW	SE	SW	SW	SE	SW	SW	NW	SE	SW	NW	SE	NW	Stopień
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a ₁ %	85	70	80	85	85	90	85	85	70	85	80	70	stałości
	a ₂ %	20	15	10	5	50	90	85	85	70	85	80	70	/Constancy/
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	b %	-	10	-	5	-	-	-	-	20	5	-	20	
Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	c %	95	80	95	95	90	95	80	80	95	90	80	80	
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	400	300	400	400	400	500	200	300	250	300	300	250	
Liczba gatunków /Number of species/		51	41	48	48	39	41	38	33	40	34	36	33	
<hr/>														
Wariant /Variant/	typowy /typical/							z /with/ Vaccinium myrtillus						
<hr/>														
I Ch. Tilio-Carpinetum i /and/ Carpinion betuli														
Carpinus betulus	a ₂	2.2	2.2	2.3	1.1	+	+	+	+	+	.	+	.	IV
" "	b	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	
Tilia cordata	c	+	+	+	.	.	.	+	+	+	+	.	.	II
Evonymus verrucosa	b, c	.	.	.	1.1	.	+	.	+	+	+	+	+.2	III
Carex pilosa	c	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	3.4	4.5	5.5	4.5	V
Stellaria holostea		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.2	V
Dactylis aschersoniana		+	+	+	+.2	+	+	+.2	.	+.2	+.2	+.2	+.2	IV
Ranunculus cassubicus		+	.	+	1.1	+	+.2	+	.	.	+.2	.	.	III
Melampyrum nemorosum		.	.	.	.	+	.	.	+.2	+.2	.	+.2	.	II
<hr/>														
II Ch. Fagetalia silvaticae														
Fagus silvatica	a ₁	5.5	3.3	5.5	+.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	5.5	4.5	V
" "	a ₂	1.1	.	1.1	+	1.1	.	.	.	.	2.3	+.2	.	
" "	b	1.1	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	+	1.1	+	1.1	1.1	1.1	
Acer pseudoplatanus	c	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	III
" "	c	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	+	.	.	.	.	.	.	
Asperula odorata	c	2.3	1.2	1.2	1.2	2.3	2.2	1.2	2.2	2.3	1.2	1.1	1.1	V
Galeobdolon luteum		2.2	1.2	2.2	1.1	1.2	2.3	1.1	1.2	+.2	1.2	+	1.2	V
Dryopteris filix-mas		+.2	+.2	+.2	+.2	1.2	+.2	+.2	1.2	+.2	.	1.2	+.2	V
Lathyrus vernus		+	1.1	+	1.1	1.1	+	1.1	+	+	.	1.1	+	V
Milium effusum		1.2	1.2	1.2	1.2	+.2	+.2	.	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	V
Hepatica nobilis		1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	2.2	1.2	1.2	+.2	2.2	.	2.2	V
Pulmonaria obscura		+	+	+	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	.	+	+.2	.	IV
Epilobium montanum		+	+	+	.	+	.	.	+	+	+	.	.	IV
Daphne mezereum		.	+	+	.	+	.	1.1	+	+	.	.	.	III
Phyteuma spicatum		.	+	1.1	1.1	+	+	.	.	+	.	.	.	III
Polygonatum multiflorum		+.2	+	+.2	+	.	.	.	.	.	+	.	.	III
Paris quadrifolia		1.1	.	+.2	+	+	+/+.2/	.	.	.	.	.	.	II
Sanicula europaea		+	+	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	II
Viburnum opulus		.	.	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	II
Ranunculus lanuginosus		+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II
Festuca silvatica		1.2	+.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Asarum europaeum		.	.	.	1.2	.	+.2	+.2	.	.	.	.	.	II
Catharinaea undulata	d	+.2	+.2	+.2	+.2	.	+.2	.	+.2	+.2	.	+.2	+.2	IV
<hr/>														
III Ch. Querco-Fagetea														
Acer platanoides	c	1.1	1.1	1.1	2.3	1.1	+	+	+	.	.	.	.	IV
Anemone nemorosa	c	3.3	3.4	3.3	2.3	3.4	2.2	2.2	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2	V
Scrophularia nodosa		1.1	+	1.1	+	+	+	+	+	.	+/+	+	+	V
Poa nemoralis		+.2	+.2	+.2	1.2	.	.	+.2	.	+.2	+.3	+.2	+.2	IV
Viola silvestris		1.1	+	1.1	1.2	+	+	+	1.2	.	.	.	.	IV
Aegopodium podagraria		1.2	1.2	+.2	1.2	1.2	2.3	+	1.2	.	.	.	.	IV
Mycelis muralis		1.1	+	+	.	.	.	.	.	+	+	+	+	III
Carex digitata		+.2	+.2	.	1.2	.	.	+.2	.	.	+.2	.	+.2	III
Melica nutans		1.2	1.2	+.2	1.2	.	.	.	.	.	+.2	1.2	+.2	III
Campanula persicifolia		.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	+	II
Vicia silvatica		+.2	+.2	+.2	+.2	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Hedera helix		1.2	+/+.2/	.	1.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	II
Eurhynchium zetterstedtii	d	+.2	1.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	+.2	.	+.2	.	+.2	V
<hr/>														
IV Ch. Vaccinio-Piceetea														
Sorbus aucuparia	b, c	+	.	+	1.1	+	+	+	.	.	.	+	+	IV
Viola riviniana	c	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	+	1.1	1.1	+	1.1	1.1	1.1	V
Solidago virgaurea		.	1.1	+	.	.	.	+	+	.	+/+	+	+	III
Vaccinium myrtillus		.	.	.	.	.	.	.	+.2	.	+.2	+.2	+.2	II
Hieracium lachenalii		.	.	.	.	.	.	.	+.2	+	+	+	+	II
Polytrichum attenuatum	d	.	+.2	.	1.2	+.2	+.2	+.2	+.2	1.2	+.2	+.2	1.2	V
<hr/>														
V Gatunki towarzyszące /Accompanying species/														
Betula verrucosa	a	.	1.1	1.1	.	1.1	.	1.1	.	.	.	.	.	II
Majanthemum bifolium	c	1.2	2.3	2.2	2.3	1.1	+	1.2	1.1	2.3	1.1	2.2	2.3	V
Convallaria maiialis		1.2	.	1.1	1.2	+.2	+.2	1.1	1.2	2.3	+/+.2/	+.2	2.2	V
Oxalis acetosella		1.2	1.2	+.2	.	+.2	+.2	1.2	1.1	.	1.2	+.2	1.2	V
Ajuga reptans		1.1	+	1.1	+	+.2	+/+	+	+	.	.	.	.	IV
Veronica chamaedrys		1.2	+.2	1.1	1.2	.	+	+.2	+.2	+	1.2	+.2	1.2	IV
Athyrium filix-femina		+.2	+.2	.	+.2	1.2	+.2	.	+.2	.	.	+.2	+.2	IV
Luzula pilosa		+.2	1.2	+.2	+.2	.	.	.	.	1.2	+.2	.	+.2	IV
Galeopsis pubescens		+	+	+	.	.	.	.	+	.	+	.	.	III
Hieracium murorum		+	1.1	.	+	.	.	.	.	1.1	+	.	.	III
Phegopteris dryopteris		.	1.2	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	1.2	II
Bromus benekenii		.	.	.	.	.	.	.	.	+.2	+.2	.	+.2	II
<hr/>														
VI Mchy i wątrobowce towarzyszące /Accompanying mosses and liverworts/														
Hypnum cupressiforme	d	.	+.2	.	.	.	+.2	+.2	.	1.2	+.2	+.2	+.2	IV
Pohlia nutans		+.2	.	.	.	.	.	+.2	+.2	.	+.2	.	.	II
Mnium cuspidatum		.	.	+.2	.	+.2	.	.	+.2	.	.	.	.	II
Dicranum montanum		.	.	.	.	.	.	.	.	.	+.2	.	+.2	II
Radula complanata		.	+.2	.	+.2	.	.	.	+.2	.	.	.	.	II

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

- ad II. Actaea spicata 1,7; Melica uniflora 1,2; Mercurialis perennis 4,5; Stachys silvatica 1; Equisetum silvaticum 10.
ad III. Lonicera xylosteum 7; Evonymus europaea 4; Crataegus monogyna 6.
ad IV. Pinus silvestris 6; Hieracium sabaudum 9,11; Entodon schreberi 10,13; Bazzania trilobata 9.
ad V. Quercus robur 3; Rubus idaeus 3,13; Hypericum maculatum 1,3; Urtica dioica 10; Dryopteris spinulosa 13; Vicia sepium 10; Chamaenerion angustifolium 13; Rubus saxatilis 7; Platanthera bifolia 3.
ad VI. Mnium rostratum 4,9; Catharinaea tenella 1,2; Isoetecium viviparum 5,12; Brachythecium velutinum 3,8; Mnium affine 1; Dicranodontium denudatum 7; Brachythecium reflexum 12.

Objaśnienia /Explanations/

Dyl - Dylewo, Klon - Klonowo, Wyg - Wygoda, Nap - Naproczek, Zaj - Zajaczkki.

Ryc. 22. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*

Fig. 22. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*

1 — *Fagus silvatica*; 2 — *Carpinus betulus*; 3 — *Acer pseudoplatanus*; 4 — *Acer platanoides*; 5 — *Betula verrucosa*

ter tego zbiorowiska. Wynika to z tego, że we wspomnianej metodzie nie uwzględnia się stosunków ilościowych. Tym niemniej otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują na przynależność tego zbiorowiska do zespołu *Tilio-Carpinetum*.

Wymieniona grupa gatunków, wraz z przedstawicielami rzędu *Fagetalia* i klasy *Quercio-Fagetea*, tworzy podstawę tego podzespołu. Udział gatunków związku *Pino-Quercion* i klasy *Vaccinio-Piceetea* jest przeciętnie niewielki. Stale występuje z nich tylko *Viola riviniana* i *Polytrichum attenuatum*.

W wariacie typowym (zdjęcia 1-7), średnia liczba gatunków w zdjęciu wynosi 44,7. Do elementów wyróżniających można tu zaliczyć: *Ranunculus cassubicus*, *Paris quadrifolia*, *Ranunculus languinosus*, *Asarum europaeum* i inne gatunki optymalne rozwijające się na podłożu eutroficznym.

Tabela 35 — Table 35

Struktura systematyczna podzespołu *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*

Systematic structure of *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and)					
<i>Carpinus betuli</i>	8	69	12,97	66,34	8,60
Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i>	25	171	32,14	52,61	16,91
Ch. <i>Quercio-Fagetea</i>	16	105	19,74	50,48	9,96
Ch. <i>Vaccinio-Piceetea</i>	10	53	9,96	40,77	4,06
Towarzyszące (Accompanying sp.)	32	134	25,19	32,21	8,11
Razem (Total)	91	532	100,00		

W postaci uboższej (zdjęcia 8-13), nazwanej wariantem z *Vaccinium myrtillus*, często występuje *Vaccinium myrtillus*, *Solidago virga-aurea* i *Hieracium lachenalii*, a sporadycznie także inne gatunki borowe. Wy różnia się ona ponadto brakiem szeregu elementów rzędu *Fagetalia* oraz mniejszą przeciętną liczbą gatunków w zdjęciu (= 34).

Pełną listę florystyczną podzespołu *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae* tworzy 91 gatunków, a średnio na jedno zdjęcie przypada ich 39,2. Wysokie stopnie pokrycia osiąga jedynie: wczesną wiosną *Anemone nemorosa*, a w pełni lata — *Carex pilosa*. Często, choć w różnej ilości, występuje: *Stellaria holostea*, *Asperula odorata*, *Galeobdolon luteum*, *Dryopteris filix-mas*, *Lathyrus vernus*, *Milium effusum*, *Hepatica nobilis*, *Poa nemoralis*, *Scrophularia nodosa*, zaś nieco rzadziej kilka innych gatunków o wymaganiach mezotroficznych. Na mezotroficzny charakter siedliska tego podzespołu wskazuje także skład gatunków towarzyszących.

Przynależność zbiorowisk leśnych z dominującą w runie *Carex pilosa* do grądów wysokich nie wzbudza istotnych zastrzeżeń. Takiego punktu widzenia nie może zmienić nawet dominujący udział buka w drzewostanie oraz pojawianie się w niektórych jego płatach innych gatunków ze związku *Fagion*. Z powodu małego znaczenia *Acer pseudoplatanus* wśród gatunków drzewiastych, a w runie — *Festuca silvatica* i *Melica uniflora*, systematyczna wartość tej grupy wynosi tylko 2,13 i jest czterokrotnie mniejsza od tej samej wartości dla przedstawicieli związku *Carpinion betuli* ($D = 8,60$). Nie nastrocza też większych trudności stwierdzenie analogii między podzespołem *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae* z terenu Wzgórz Dylewskich, a tego typu łąkami zbadanymi w innych częściach Polski (Polakowski 1961; Matuszkiewicz 1952; Izdebski 1962, 1963, 1965, 1966, 1967; Medwecka-Kornaś 1952; Kornaś 1968). Podobieństwo ich składu gatunkowego, fizjonomii, struktury i stosunków ekologicznych jest zazwyczaj daleko idące.

Do podzespołu *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae* należy także zaliczyć niektóre płaty lasu liściastego z drzewostanem bukowym z rezerwatu „Dębowo” na Pojezierzu Olsztyńskim. W dotychczasowej literaturze fitosocjologicznej zostały one przez Hutorowicza (1963) określone jako *Quercu-Carpinetum*, zaś przez Sokołowskiego (1966) i Tokarza (1971b) zaliczone do zespołu *Melico-Fagetum*.

Jak dotychczas brak także jednomyślności w pojmowaniu pozycji systematycznej grądu turzycowego wewnątrz zespołu *Tilio-Carpinetum*. W randze odrębnego podzespołu „*caricetosum pilosae*” określili ten grąd Matuszkiewicz (1952), Polakowski (1961) i Izdebski (1962). Traczyk (1962), analizując ekologiczne zróżnicowanie lasów grądowych w Polsce, włączył go do podzespołu *Tilio-Carpinetum typicum* w postaci wariantu. Podobne stanowisko zajął Izdebski (1966, 1967) w pracach traktujących o zbiorowiskach z Roztocza Południowego i Zachodniego.

Obniżenie rangi systematycznej grądów turzycowych jest chyba dysku-

syjne. Porównywanie tych zbiorowisk głównie przy pomocy stopni stałości zanadto podkreśla ich związek z podzespołem *Tilio-Carpinetum typicum*, gdyż w takim sposobie postępowania nie uwzględnia się istotnych różnic wynikających z ich struktury i ekologii. Przyjęte w niniejszej pracy stanowisko systematyczne dla lasów grabowo-dębowo-bukowych z dużym udziałem *Carex pilosa* wydaje się dlatego bardziej słuszne.

Dla ostatecznego rozstrzygnięcia tego problemu potrzebne są dalsze materiały zdjęciowe z Polski wschodniej i południowej, a ich opracowanie powinno być dokonane przy pomocy metod statystycznych uwzględniających również stosunki ilościowe w zbiorowisku.

E. *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum arundinaceae*

Podzespół *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum* wykształca fitocenozy głównie w południowej części kompleksu głównego, a na małych powierzchniach — także w jego części północnej oraz w uroczysku Wygoda.

Podłożem są zazwyczaj gleby płowe. Na terenach płaskich lub lekko falistych tworzą się one z utworu pyłowego na glinie zwałowej lekkiej (ryc. 23, tab. 36), a na stromych zboczach o ekspozycji południowej — z piasków gliniastych na glinie zwałowej.

Z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wynika, że są to gleby dość kwaśne i średnio produktywne (tab. 37). Stosunek C/N w warstwie wierzchniej wynosi 17,2, mniej korzystnie kształtuje się w poziomach prze-mywanych i zawęża się z kolei na głębokości poniżej 60 cm. Ilość składników przyswajalnych zmienia się podobnie. Najwięcej odnotowano ich w poziomie próchnicznym i w dolnych partiach profili. Zakwaszenie jest dość duże w całym profilu.

Ogólnym wyglądem grąd trzcinnikowy nie odbiega zasadniczo od typowego wariantu *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*. Jest to wysokopienny las mieszany z dwu- lub trójwarstwowym drzewostanem, ze słabo rozwijającym się podszyciem i różnie zwartym runem (60-90% pokrycia powierzchni).

Ryc. 23. Profil glebowy w podzespole *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*

Fig. 23. Soil profile of the subassociation *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*

(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

Tabela 36 — Table 36

Skład mechaniczny gleby w podzespole *Tilio-Carpinetum calaniagrostietosum*
 Mechanical composition of the soil in *Tilio-Carpinetum calaniagrostietosum* subassociation

Nr pro- filu No. of pro- file	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	Części szkie- letowe Skele- ton parts %	Części ziemiste % — Earth parts %						Gatunek gleby według klasyfikacji PTG Name of the soil variety according to the classification of PTG
				Części piaszkowe Sand parts		Cz. pyłowe Dust parts		Cz. splawialne Float parts		
				1-0,5		0,1-0,05		0,02- 0,006		
				0,5-0,25		0,25-0,1		0,006- 0,002		
				Ø mm						

Gleba płowa właściwa wytworzona z utworu pyłowego na glinie lekkiej
 Typical pseudo-podsolic soil formed from silt loam on sandy loam

I	Dylewo 125 49	A ₁	4-14	5,0	2,55	4,59	20,86	29	27	11	2	3	utwór pyłowy zwykły utwór pyłowy zwykły piasek gliniasty mocny głina lekka głina lekka
		A ₁ A ₃	14-45	4,6	3,06	4,59	21,35	11	34	16	7	3	
		A _{3g}	45-60	5,8	5,61	11,98	29,41	17	17	14	4	1	
		Bt	60-100	5,4	5,42	12,78	30,80	14	13	5	10	9	
		Cg	100-140	6,0	3,57	8,92	37,51	15	14	4	12	5	

Tabela 37 — Table 37

Niektóre właściwości chemiczne gleby w podzespole *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*
Some chemical properties of soil in *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum* subassociation

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			w	w						
			in	in	%					
			H ₂ O	KCl						
									metoda Egner acc. to Egner mg/100 g gleby mg/100 g of soil	

Gleba płowa właściwa wytworzona z utworu pyłowego na glinie lekkiej
Typical pseudo-podsolic soil formed from silt loam on sandy loam

I	Dylewo 125 49	A ₁	4-14	4,4	3,6	6,224	3,610	0,2100	17,2	8,00	9,90
		A ₁ A ₃	14-45	4,6	4,2	1,624	0,942	0,0504	18,7	1,80	2,75
		A ₃ g	45-60	5,0	4,4	0,279	0,162	0,0084	19,3	3,30	2,20
		Bt	60-100	5,1	4,4	0,291	0,169	0,0097	17,4	4,50	3,40
		Cg	100-140	5,3	4,9	0,279	0,162	0,0112	14,5	6,00	8,00

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Nr zdjęcia /Number of record/	9	49	20	19	25	8	66	7	126	341	363	
Data /Date/	21.7 66	28.5 67	21.7 66	21.7 66	22.7 66	20.7 66	20.7 66	20.7 66	19.7 67	4.6 74	11.6 76	
Leśnictwo /Forestry/	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Bed	Nap	Dyl	
Uroczysko /Range/	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Wyc	Dyl	
Nr oddziału /No. of section/	127	125	126	125	126	127	127	126	58	164	162	
Nachylenie terenu w stopniach /Inclination of area in grades/	3	5	5	8	8	-	-	5	3	20	20	
Ekspozycja /Exposition/	W	W	W	NW	W	-	-	EW	E	S	S	Stopień stałości /Constancy/
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a ₁ %	75 20	70	80	75	75 10	70	70	75 20	60 20	70	60 10
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	b %	5	-	10	20	10	5	10	5	5	-	-
Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	c %	70	90	90	70	60	80	70	80	70	80	80
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	250	400	300	250	300	250	225	225	400	250	250
Liczba gatunków /Number of species/		50	55	53	51	59	57	53	56	50	54	52

Wariant /Variant/	typowy /typical/	z /with/ Carex montana	
I Ch. Carpinion betuli i /and/ Tilio-Carpinetum			
Carpinus betulus	a ₁ 1.1 +		III
Evonymus verrucosa	b ₁	1.1	II
Stellaria holostea	b ₂ 2.3 1.2 2.2 1.2 2.2 2.3 2.3 1.2 +.2	1.2 +	V
Dactylis aschersoniana	c . +.2 +.2	2.3 2.2	II
Melampyrum nemorosum		+	I
II Ch. Quercetalia pubescentis			
Campanula persicifolia	c	1.1 1.1	I
Calamintha vulgaris		1.1 1.1	I
Carex montana		+ .2 +.2	I
Frimula officinalis		1.1 +	I
Hypericum montanum			I
Lathyrus niger		1.2	I
Vicia cassubica		1.1	I
III Ch. Pagetalia silvaticae			
Fagus silvatica	a ₁ 5.5 4.5 5.5 3.3 3.3 5.5 4.4 4.5 3.3	3.3 3.2	V
" "	a ₂ . 2.2	. 1.1	
" "	c 1.2 + 2.3 1.1 + 2.2 3.4 1.2 1.2	1.1 1.2	
Acer pseudoplatanus	c		II
Asperula odorata	c 2.2 2.3 1.2 2.3 2.3 2.3 1.2 2.3 1.2	+ .2 1.2	V
Galeobdolon luteum	c 2.3 1.2 2.3 2.3 2.3 2.3 +.2 1.2 +.2	1.2 2.2	V
Milium effusum	c 2.3 +.3 2.3 2.3 1.2 1.2 1.2 2.3 +.2	+ .2 +.2	V
Phyteuma spicatum	. . . 1.1 1.2 + +.2 1.1 + .	1.2 1.1	V
Lathyrus vernus	+ + + + + 1.1 + + .	1.2	V
Hepatica nobilis	2.2 1.2 +.2 . 1.2 1.2 . . .	1.2 +	IV
Dryopteris filix-mas	1.2 +.2 . . 1.2 +.2 +.2 +.2 +.2		IV
Epilobium montanum	1.1	+ . 1.1	II
Daphne mezereum	+ + +		II
Festuca gigantea	+ .2 +.2		II
Polygonatum multiflorum	+ . . . 1.2		II
Festuca silvatica	1.2		II
Carex silvatica	+ .2 +.2 +.2		II
Catharina undulata	d 1.2 +.2 1.2 +.2 1.2 1.2 +.2 +.2 +.2	1.2 1.2	V
IV Ch. Quercetalia silvaticae			
Acer platanoides	c		IV
Anemone nemorosa	c 1.2 2.3 +.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 +	2.3 . 1.2	V
Melica nutans	+ .2 +.2 2.2 2.3 +.2 2.3 1.2 1.3 +.2	1.2 1.2	V
Carex digitata	1.2 1.2 . . 1.2 +.2 1.2 1.2 1.2	1.2 1.2	V
Poa nemoralis	1.2 1.2 . . +.2 +.2 2.3 +.2 +.2	1.2 1.2	V
Myosotis muralis	1.1	1.1 1.1	V
Scrophularia podosa	1.1 + + + + 1.1 1.1 . . .		V
Viola silvestris	1.2 1.2 1.1 + + 1.2 1.1 +.2	1.1	V
Aegopodium podagraria	+ /+ . +.2/	2.2	III
Moehringia trinervia		. +.2	II

V Ch. Pino-Quercion i /and/ Vaccinio-Piceetea													
Pinus silvestris	a	+	+	1.1	+	3.3	+	1.1	1.1	2.1	+	.	V
Picea excelsa	a ₂ b, c	.	.	+	+	+	.	.	.	+	+	.	II
Sorbus aucuparia	b, c	1.1	+	1.1	1.1	+	1.1	1.1	1.1	+	+	1.1	V
Calamagrostis arundinacea	c	+2	1.2	1.2	+2	1.2	+2	1.2	2.3	+2	2.4	2.3	V
Vaccinium myrtillus		+2	+2	1.2	1.2	1.2	+2	2.3	2.3	2.4	+	1.2	V
Veronica officinalis		+2	+2	+2	+2	+2	+	+2	+2	+2	1.2	+2	V
Hieracium lichenalii		+	+	.	+	1.1	+	1.1	+	+	1.1	+	V
Solidago virga-aurea		+	+	.	1.1	1.1	.	1.2	1.1	.	+	1.1	IV
Viola riviniana		.	+	1.1	+	+	.	.	.	.	1.1	1.1	IV
Carex pilulifera		.	+2	+2	+2	+2	.	.	+2	.	1.2	1.2	IV
Pirola secunda		.	+2	.	.	.	+2	.	+2	+	+	+2	III
Lycopodium annotinum		.	.	.	+2	.	+2	+2	+2	.	.	.	II
Hieracium sabaudum		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Dicranum scoparium	d	+2	+2	+2	.	+2	+2	+2	+2	+2	1.2	+2	V
Polytrichum attenuatum		+2	+2	+2	+2	+2	.	1.3	+2	+2	1.2	1.2	V
Entodon schreberi		.	.	+2	.	+2	.	+2	+2	.	.	+2	III
VI Gatunki towarzyszące /Accompanying species/													
Betula verrucosa	a	.	+	+	+	+	.	.	.	+	+	.	III
Quercus robur	a ₂ b, c	.	.	.	1.1	+	.	.	.	.	.	.	II
Convallaria maialis	c	1.3	2.3	2.3	1.2	2.3	2.3	1.3	2.3	2.4	2.3	1.2	V
Majanthemum bifolium		2.2	1.2	+2	1.2	1.2	2.2	2.4	3.3	3.4	2.2	1.1	V
Luzula pilosa		1.2	+2	+2	1.2	+2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	V
Phegopteris dryopteris		2.4	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	+2	3.3	1.2	.	+2	V
Oxalis acetosella		+	+2	.	1.2	1.2	+2	+2	+2	1.2	1.2	1.2	V
Veronica chamaedrys		1.2	1.2	1.2	+2	1.2	+2	+2	+2	+2	+	+	V
Athyrium filix-femina		1.2	1.2	+2	+2	1.2	1.2	+2	+2	+2	.	.	V
Ajuga reptans		1.2	+2	+2	.	.	1.2	+	+	+2	1.1	+	V
Rubus idaeus		+2	+	1.1	+	+	+2	2.2	+	+	.	.	IV
Chamaenerion angustifolium		.	.	.	.	1.1	+	+	+	+	+	1.1	IV
Galeobasis pubescens		1.2	.	1.2	+2	1.1	1.2	.	.	.	.	.	III
Hieracium murorum		.	.	.	.	.	1.1	1.1	+	+	1.1	1.1	III
Urtica dioica		+	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	II
Dryopteris spinulosa		.	.	.	.	+2	.	.	.	.	+2	+2	II
Galeobasis tetrahit		.	.	.	.	.	1.1	+	+	.	.	1.1	II
Carex pallescens		.	.	.	.	.	.	.	+2	.	+2	+2	II
VII Mchy towarzyszące /Accompanying mosses/													
Hypnum cupressiforme	d	+2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	1.2	+2	1.2	+2	V
Mnium rostratum		+2	+2	.	1.2	+2	.	+2	.	.	.	.	III
Plagiothecium laetum v. curvifol.		.	.	+2	.	+2	.	.	.	+2	+2	+2	III
Isotrichum viviparum		.	+2	+2	.	+2	+2	.	+2	.	.	.	III
Plagiothecium denticulatum		.	.	+2	+2	+2	.	.	1.2	.	.	.	II
Dicranum montanum		+2	.	.	+2	.	+2	.	.	.	+2	.	II
Brachythecium reflexum		.	+2	+2	.	.	+2	.	.	+2	.	.	II
Thuidium recognitum		.	.	+2	+2	+2	.	.	+2	.	.	.	II
Polytrichum juniperinum		.	.	.	.	+2	.	.	+2	.	.	+2	II
Folia nutans		.	.	+2	.	.	.	.	+2	.	1.2	.	II
Mnium cuspidatum		.	.	.	.	.	+2	.	.	+2	.	+2	II
Redula complanata		.	.	.	.	.	+2	.	.	+2	.	+2	II

Gatunki sporsdyczne /Sporadic species/

- ad III Actaea spicata /9/, raris quadrifolia /4,5/, Helica uniflora /2/, Pulmonaria obscura /6/.
- ad IV Lonicera xylosteum /10/, Evonymus europaea /2/, Crataegus monogyna /5/, Vicia silvestica /6,7/, Hedera helix /1/, Eurythecium zetterstedtii /2,6/.
- ad V Populus tremula /5/, Pteridium squilinum /8/, Pirola minor /6,8/, Monotropa hypopitys /9/, Hylacomium splendens /4/.
- ad VI Sambucus racemosa /4,5/, Frangula alnus /4,9/, Sambucus nigra /1/, Luzula pallescens /7,8/, Vicia sepium /9/, Deschampsia caespitosa /9/, Rubus saxatilis /11/, Anthoxanthum odoratum /7/, Lactylis pometata /7/, Hieracium austrois /8/.
- ad VII Dicranella heteromalla /5,8/, Dicranodontium denudatum /1,4/, Rhytidadelphus triquetrus /3,5/, Dicranum longifolium /2,8/, Amblystegium serpens /26/, Brachythecium rutabulum /2/.

Objaśnienia /Explanations/

Bed - Bednarki, Dyl - Dylewo, Nap - Napromek, Wzg - Wzgoda.

W drzewostanie najwyższą warstwę tworzy przeważnie *Pinus silvestris*. W płatach, w których korony drzew są rozmieszczone w trzech poziomach, w warstwie środkowej bukowi towarzyszy niekiedy *Quercus robur*, *Betula verrucosa* lub *Picea excelsa*, a w dolnej — *Carpinus betulus*. W drzewostanach dwuwarstwowych, oprócz sosny, wszystkie gatunki tworzą warstwę dolną.

Strukturę drzewostanu w grądzie trzcinnikowym przedstawia rycina 24. Znaczna rozpiętość klas grubości u buka wskazuje, że na terenie Wzgórz

Ryc. 24. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*

Fig. 24. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*

1 — *Fagus silvatica*; 2 — *Carpinus betulus*; 3 — *Betula verrucosa*

Dylewskich od pewnego czasu dobrze odnawia się on naturalnie, nawet na podłożu dla niego mniej odpowiednim. Obserwowana aktualnie duża siła żywotna buka sugeruje nastanie korzystnych warunków klimatycznych dla jego naturalnego rozwoju.

Zupełnie inaczej zachowuje się w tym zbiorowisku sosna. Zdecydowana przewaga w drzewostanie gatunków liściastych powoduje silne ocienienie dna lasu, co uniemożliwia naturalny rozwój sosny, a także stwarza niedogodne warunki dla wegetacji gatunków borowych w runie. Nieodnawianie się sosny na całym badanym terenie pozwala przypuszczać, że obecność tego gatunku w omawianym grądzie jest wynikiem sztucznego wprowadzenia przez człowieka. Jest więc bardzo prawdopodobne, że grądy trzcinnikowe są zbiorowiskiem antropogenicznym. Podobne znamiona wyróżniają acidofilne grądy na Pojezierzu Krajeńskim (Boiński 1973) i w nadleśnictwie Laski pod Kępem (Ferchmin 1966).

Podszycie rozwija się w postaci tu i ówdzie spotykanych niedużych kęp lub pojedynczych okazów podrostu *Fagus silvatica*. Uzupełniane jest ono stale przez *Sorbus aucuparia*, a rzadziej — przez *Quercus robur*, *Picea excelsa*, *Carpinus betulus*, *Evonymus verrucosa* i *Frangula alnus*.

Runo wykazuje dużą stabilność, gdyż przeważają w nim gatunki, które żyją przez cały okres wegetacyjny.

W acidofilnym grądzie z *Calamagrostis arundinacea* odnotowano ogółem 115 taksonów, zaś średnio w zdjęciu występuje ich około 54. W ogólnej liczbie gatunków najliczniej reprezentowane są mezotroficzne elementy lasów liściastych z rzędu *Fagetalia* i klasy *Querco-Fagetea* (48 gatunków). Ustępuje im nieco roślinność towarzysząca (46), a niemały jest także udział gatunków borowych ze związku *Pino-Quercion* i klasy *Vaccinio-Piceetea*

(tab. 39). Obecność ostatnich zasługuje na szczególną uwagę, gdyż w takiej ilości nie występowały one w rzadziej z badanych postaci grądów wysokich. Jedenaście z nich osiąga najwyższe stopnie stałości (tab. 38), co powoduje, że płaty tego zbiorowiska upodabniają się do kwaśnej dąbrowy z bukiem.

Występująca w grądzie trzcinnikowym roślinność lasów liściastych odznacza się na ogół dość szeroką skalą ekologiczną. Gatunki o wymaganiach eutroficznych pojawiają się przypadkowo. Zmniejszyło się również znaczenie przedstawicieli związku *Carpinion betuli*. Z nich tylko *Stellaria holostea* występuje we wszystkich badanych powierzchniach. W większej ilości pojawiają się natomiast gatunki towarzyszące. Niektóre z nich są stałymi składnikami tego grądu, a *Convallaria maialis* i *Phegopteris dryopteris* zdradzają nawet przywiązanie do niego.

Mając na uwadze warunki siedliskowe oraz dobór i znaczenie najważniejszych grup syngenetycznych, zakwalifikowano dylewskie grądy z *Calamagrostis arundinacea* do wyróżnionego przez Traczyka (1962) podzespołu *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*. Zebrany materiał zdjęciowy przedstawia typową postać omawianego podzespołu, gdyż wykazuje daleko idące podobieństwo do tego typu zbiorowisk opisanych z innych regionów naszego kraju (Sokołowski 1963, 1968; Ferchmin 1966, Boiński 1973).

Występowanie grądu trzcinnikowego na terenie Wzgórz Dylewskich

Tabela 39 — Table 39

Struktura systematyczna podzespołu *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*
Systematic structure of *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*

Grupa gatunków Group of species	Wariant Variant	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) <i>Carpinion betuli</i>	a	4	20	4,11	55,55	2,28
	b	4	6	5,60	75,00	4,20
Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i>	a	20	98	20,12	54,44	10,95
	b	10	18	16,82	90,00	15,14
Ch. <i>Quercetalia pubescentis</i>	b	7	11	10,28	78,57	8,08
Ch. <i>Quercio-Fagetea</i>	a	16	80	16,43	55,55	9,13
	b	10	16	14,95	80,00	11,96
Ch. <i>Vaccinio-Piceetea</i>	a	21	110	22,59	58,20	13,15
	b	14	24	22,43	85,71	19,22
Towarzyszące (Accompanying species)	a	45	179	36,75	44,19	16,24
	b	21	32	29,92	76,20	22,79
Razem (Total)	a	106	487	100,00		
	b	66	107	100,00		

a — wariant typowy, (typical variant), b — wariant z (variant with) *Carex montana*.

w różnych warunkach topograficznych i siedliskowych powoduje wykształcanie się jego w dwóch wariantach.

Fitocenozy wariantu typowego porastają tereny lekko faliste, na których stosunki wodne w glebie kształtują się przeważnie korzystnie. Sprzyja to rozwojowi gatunków liściastych w drzewostanie, a roślinności mezotroficznej w runie. Pełne zwarcie drzewostanu, powodując silne ocienienie dna lasu, pogarsza warunki rozwoju elementom borowym i światłolubnym.

W wariacie świetlistym z *Carex montana*, którego fitocenozy zajmują strome zbocza o ekspozycji południowej, stale można spotkać niektóre gatunki rzędu *Quercetalia pubescentis*. Wyróżnia go ponadto masowy udział *Calamagrostis arundinacea* oraz częsta obecność niektórych światłolubnych gatunków towarzyszących. Brak w nim natomiast *Athyrium filix-femina*, *Rubus idaeus* i *Urtica dioica*. Z gatunków borowych nie występuje *Lycopodium annotinum*.

Melico-Fagetum Knapp 1942

Buczyna pomorska

Buczyna pomorska rozwija się na badanym terenie na silnie zerodowanych, wschodnich zboczach Góry Dylewskiej, stanowiących południowo-zachodnią część kompleksu głównego (uroczyska Dylewo). Wszystkie jej postacie ekologiczne zajmują w sumie dość dużą powierzchnię. Jest to fakt zasługujący na podkreślenie, gdyż wiadomo, że badany obszar leży na wschodnim skraju zwartego zasięgu buka.

Możliwość pełnego rozwoju fitocenoz zespołu *Melico-Fagetum* uwarunkowana jest przede wszystkim wysokim położeniem niektórych partii tego terenu (Góra Dylewska 312 m n.p.m.), urozmaiconą jego rzeźbą oraz sprzyjającymi mu stosunkami edaficznymi i klimatycznymi (ryc. 26, tab. 1). Zarówno buk, jak i gatunki zielne charakteryzujące buczynę pomorską, dobrze znoszą przedłużenie okresu zimy, dłuższe zaleganie w okresie przedwiośnia pokrywy śnieżnej oraz związane z tym nieznaczne skrócenie i ochłodzenie okresu wegetacyjnego. Do obniżenia przeciętnej temperatury okresu wegetacyjnego na terenie Wzgórz Dylewskich przyczynia się także wyższe niż w krainach sąsiednich średnie zachmurzenie i większa częstotliwość opadów. Czynniki te powodują, że przeciętna wilgotność względna powietrza jest tam wysoka i utrzymuje się stale na poziomie wymaganym przez to zbiorowisko. Rozwój zespołu *Melico-Fagetum* jest także możliwy dzięki dużej odporności buka na ostre i chłodne wiatry. Takie warunki są zgoła niekorzystne dla zbiorowisk grądowych, które z tego powodu unikają miejsc wyżej położonych na pojezierzach pomorskich. Tereny wyżej położone odznaczają się także odpowiednim dla buczyny pomorskiej niezbyt przepuszczalnym podłożem. Gleby są tam przeważnie zbudowane z gliny zwałowej, a niekiedy z utworów pyłowych i piasków gliniastych.

Duże zróżnicowanie konfiguracji terenu i spowodowana tym różnorod-

ność warunków edaficznych stwarza możliwości rozwoju buczyny pomorskiej w jej pełnej skali zmienności. W oparciu o zebrany materiał zdjęciowy można było wyróżnić na badanym terenie następujące jednostki niższe:

A. Podzespół *Melico-Fagetum mercurialetosum perennis*

B. Podzespół *Melico-Fagetum typicum*

C. Podzespół *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*

Dalsze zróżnicowanie składu florystycznego i stosunków edaficznych podkreślono wyróżnieniem facji florystycznych.

A. *Melico-Fagetum mercurialetosum perennis*

Podzespół *Melico-Fagetum mercurialetosum perennis* nie jest zbiorowiskiem pospolitym na terenie Wzgórz Dylewskich, gdyż na większych powierzchniach fitocenozy jego rozwijają się jedynie w południowej części kompleksu głównego (oddziały 89, 99, 108, 109, 119) oraz w uroczysku Klonowo (oddz. 184). W innych miejscach tworzy nieduże płyty, co wynika przede wszystkim z jego wysokich wymagań w stosunku do siedliska.

Żyzna buczyna porasta przeważnie północno-wschodnie, kamieniste zbocza i dna wąwozów, gdzie ruchy powietrza są łagodzone, a oświetlenie dna lasu i wilgotność powietrza największe. W takich warunkach poziome przemieszczanie się masy organicznej zalegającej na powierzchni gleby jest ograniczone, zaś jej rozkład sprawny, co w efekcie sprzyja tworzeniu się gleb żyznych, produktywnych oraz dostatecznie przewietrzanych i z powodu stałych wycieków wody podskórnej, zawsze świeżych.

Nr 13

Ryc 25. Profil glebowy w podzespole *Melico-Fagetum mercurialetosum*

Fig. 25. Soil profile of the subassociation *Melico-Fagetum mercurialetosum*

(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

W celu bliższego określenia podłoża żyznej buczyny wykonano jedną odkrywkę, z której pobrano próbki do analizy laboratoryjnej. Z budowy morfologicznej (ryc. 25) i analizy składu mechanicznego wynika, że omawiane zbiorowisko porasta niecałkowitą glebę brunatną kwaśną, zbudowaną z utworu pyłowego zwykłego na glinie zwałowej lekkiej (tab. 40). Dość duża zwięzłość i dwuczłonowość tej gleby sprzyja okresowej stagnacji wody opadowej w głębszych warstwach profilu, a przez to przyczynia się

Tabela 40 — Table 40

Skład mechaniczny gleby w podzespole *Melico-Fagetum mercurialetozum perennis*
 Mechanical composition of the soil in *Melico-Fagetum mercurialetozum perennis* subassociation

Nr pro- filu No. of pro- file	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	Części szkie- letowe Skele- ton parts %	Części ziemiste % — Earth parts %						Gatunek gleby według klasyfikacji PTG Name of the soil variety according to the classification of PTG			
				Części piaskowe Sand parts		Cz. pyłowe Dust parts		Cz. spławialne Float parts					
				1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05- 0,02	0,02- 0,006				
											0,006- 0,002		
Ø mm													
13	Dylewo 109 87	A ₁	5-22	4,8	2,5	4,2	14,3	21	34	12	3	9	utwór pyłowy zwykły
		A ₁ (B)	22-35	6,3	3,5	5,3	18,2	17	29	11	6	10	utwór pyłowy zwykły
		(B)	35-60	8,0	3,9	6,5	19,6	15	27	11	7	10	utwór pyłowy zwykły
		Dg	60-85	30,0	12,1	20,1	28,8	12	10	7	3	7	piasek gliniasty mocny
		D ₁ g	85-140	9,6	4,5	10,2	27,3	16	8	8	14	12	głina lekka

Gleba brunatna kwaśna wytworzona z utworu pyłowego na glinie żwiałowej												
Acid brown soil formed from silt loam on boulder clay												

Gleba brunatna kwaśna wytworzona z utworu pyłowego na glinie żwawej
 Acid brown soil formed from silt loam on boulder clay

utwór pyłowy zwykły
 utwór pyłowy zwykły
 utwór pyłowy zwykły
 piasek gliniasty mocny
 glina lekka

Tabela 41 — Table 41

Niektóre właściwości chemiczne gleby w podzespole *Melico-Fagetum mercurialetosum perennis*
Some chemical properties of soil in *Melico-Fagetum mercurialetosum perennis* subassociation

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
			w in H ₂ O	w in KCl							
											%
13	Dylewo 109 87	A ₁	5-22	4,6	3,9	5,318	3,080	0,2464	12,5	7,30	3,90
		A ₁ (B)	22-35	4,8	4,2	1,487	0,816	0,0616	13,2	14,10	0,60
		(B)	35-60	5,0	4,4	0,715	0,415	0,0305	13,6	10,30	1,50
		Dg	60-85	5,6	4,7	0,471	0,273	0,0112	24,4	8,50	1,00
		D ₁ g	85-140	5,9	4,8	0,434	0,252	0,0168	15,0	3,40	5,85

Gleba brunatna kwaśna wytworzona z utworu pyłowego na glinie zwalowej

Acid brown soil formed from silt loam on boulder clay

Gleba brunatna kwaśna wytworzona z utworu pylowego na glinie żwałowej
Acid brown soil formed from silt loam on boulder clay

do periodycznego pogarszania warunków tlenowych. Świadczy o tym bardzo wyraźnie zaznaczone oglejenie opadowe.

Analiza odczynu wykazała, że badana gleba jest zakwaszona (tab. 41). Najbardziej kwaśny jest poziom próchniczny (A_1). W głąb profilu odczyn wzrasta, zobojętnieniu ulega na głębokości 150-180 cm.

Głębokość poziomu próchnicznego wynosi 22. Dlatego, że proces akumulacji biologicznej obejmuje także górne partie poziomu brunatnienia, zaznacza się on aż do głębokości 35-37 cm. Niemala zawartość w tych warstwach węgla i azotu oraz ich korzystny stosunek świadczą o wysokiej produktywności tej gleby. Nieduże ilości składników przyswajalnych wskazują, że jest to jednocześnie podłoże biologicznie czynne.

Żyzna buczyna pomorska rozwija się na badanym terenie najczęściej jako zbiorowisko trójwarstwowe. W dwóch płaszczyznach układają się przeważnie korony gatunków drzewiastych, a w trzeciej — gatunki zielne. Warstwa krzewów wykształca się na ogół słabo.

Struktura drzewostanu w fitocenozach omawianego podzespołu kształtuje się dość jednorodnie. Gatunkiem lasotwórczym jest zawsze *Fagus sylvatica*. Uzupełnia go przeważnie *Ulmus scabra*, *Fraxinus excelsior*, *Quercus robur*, *Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus* lub *Betula verrucosa*. Zasadnicze rysy struktury drzewostanu przedstawione są na wykresie rys. 26. Duża rozpiętość klas grubości i dość równomierny rozkład ilości

Ryc. 26. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Melico-Fagetum mercurialetosum perennis*

Fig. 26. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Melico-Fagetum mercurialetosum perennis*

1 — *Fagus sylvatica*; 2 — *Acer pseudoplatanus*; 3 — *Ulmus scabra*; 4 — *Fraxinus excelsior*

ciowy buka i jesionu wskazuje, że mamy tu do czynienia z drzewostanem naturalnym, względnie — naturalnie odnowionym po dokonanych wyrębie. Nieciągły udział wiązu górskiego na badanej powierzchni jest wynikiem wypadania tego gatunku najprawdopodobniej z powodu jakiejś choroby.

Słabo rozwijające się podszycie tworzy przeważnie podrost wymienionych gatunków drzewiastych. W niektórych zdjęciach uzupełnia go *Evonymus europaea*.

Runo żyznej buczyny pomorskiej, podobnie jak w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum*, odznacza się wyraźną zmiennością facjalną. W okresie wiosennym, przed rozwinięciem się listowia gatunków drzewiastych, panują wśród roślinności zielnej geofity i inne gatunki wczesnowiosenne. Pojawiając się w dużych ilościach pokrywają dno lasu niezwykle kolorowym kobiercem, w którym na przełomie kwietnia i maja dominują masowo kwitnące: *Corydalis cava*, *C. fabacea*, *C. solida*, *Pulmonaria obscura* i *Hepatica nobilis*. W pierwszej połowie maja są one stopniowo uzupełniane przez coraz liczniej pojawiające się: *Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*, *Ficaria verna*, *Chrysosplenium alternifolium* i *Ranunculus lanuginosus*. Na drugą połowę maja przypada optimum kwitnienia *Galeobdolon luteum*. Z nastaniem lata zanikają geofity i pozostałe rośliny wcześniej kwitnące, a runo opanowują: *Mercurialis perennis*, *Viola mirabilis*, *Asperula odorata*, *Stellaria holostea*, *S. nemorum*, paprocie i inne gatunki rozwijające się do końca okresu wegetacyjnego.

Kolejne następstwo gatunków w runie jest cechą dodatnią tego zbiorowiska, gdyż umożliwia bytowanie większej liczby gatunków, a dlatego, że odbywa się harmonijnie, gwarantuje pełne pokrycie dna lasu oraz równomierną eksploatację podłoża w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

W żyznej buczynie odnotowano 96 gatunków. Średnio w zdjęciu występowało ich około 54. Podane liczby wskazują, że jest to jedno z bogatszych zbiorowisk leśnych na terenie Wzgórz Dylewskich. O stosunkach florystycznych tego podzespołu w pełni informuje tabela 42, a jego strukturę systematyczną obrazują wyniki zestawione w tabeli 43.

Najbardziej zwraca uwagę dość liczna grupa gatunków, które na terenie Wzgórz Dylewskich można uważać za wyróżniające dla podzespołu *Melico-Fagetum mercurialetosum*. Wszystkie gatunki tej grupy to rośliny siedlisk eutroficznych. O żyzności podłoża świadczy również występowanie w każdym zdjęciu kilku gatunków lęgowych ze związku *Alno-Padion*.

Dobrze reprezentują żyzną buczynę pomorską gatunki charakterystyczne zespołu *Melico-Fagetum* i związku *Fagion silvaticae*. Oprócz dominującego w drzewostanie *Fagus silvatica*, nieraz pojawia się także *Acer pseudoplatanus*, a w jej runie często występuje *Melica uniflora* i *Festuca silvatica*. Choć jest to grupa nieliczna, to jednak dzięki swojej wysokiej przeciętnej stałości wyróżnia się znaczną wartością systematyczną.

Podstawą składu gatunkowego są jednak rośliny o nieco szerszej skali ekologicznej, zaliczane do rzędu *Fagetalia* i klasy *Querco-Fagetea* (37 gatunków). Występują one często w dużej liczbie, a 21 z nich osiąga najwyższe stopnie stałości.

Wysoka ogólna wartość systematyczna gatunków towarzyszących wynika z obecności 17 gatunków mszaków. Roślin naczyniowych odnotowano z tej grupy tylko 19. Z nich jedynie 4 gatunki występują często i dlatego rola tej grupy roślin jest niewielka.

Zaliczenie żyznej buczyny dylewskiej do *Melico-Fagetum mercuriale-*

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Nr zdjęcia /Number of record/	43	80	87	220	86	88	45	105	89	1	347	
Data /Date/	5.5 67 27.5	5.5 67 15.6	5.5 67 16.6	4.5 68 22.6	5.5 67 16.6	5.5 67 16.6	5.5 67 27.5	5.5 67 18.6	5.5 67 16.6	5.5 67 22.5	4.5 74 22.5	
Leśnictwo /Forestry/	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	
Uroczysko /Range/	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	
Nr oddziału /No. of section/	119	99	109	109	109	109	119	89	108	89	89	
Nachylenie terenu w stopniach /Inclination of area in grades/	25	5	5	15	5	10	20	20	10	25	15	Stopień stałości /Constancy/
Ekspozycja /Exposition/	NE	SE	N	NE	SE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a ₁ % a ₂ %	70 10	70 10	80 10	80 10	75 10	80 10	70 20	80 20	75 10	70 20	
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	b %	5	-	20	-	-	-	-	-	-	5	
Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	c %	90 95	90 95	90 95	90 100	70 95	80 90	90 100	85 80	80 100	90 95	
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	300	400	400	300	400	300	400	300	300	250	
Liczba gatunków /Number of species/		59	52	54	56	58	56	55	55	47	52	

I Gat. wyróżniające podzespół
/Differential species of subassociation/

Mercurialis perennis	c	+2	2.4	2.3	1.3	+2	+2	2.3	1.3	2.3	+2	2.3	V
Corydalis cava		4.4	2.3	3.4	2.3	1.1	3.4	3.4	2.3	1.2	2.2	2.2	V
Corydalis fabacea		1.2	1.2	1.1	1.1	+	1.1	1.1	1.2	+	1.2	1.1	V
Ranunculus lanuginosus		+	1.1	1.1	1.1	+	+	+	1.2	+	2.2	1.1	V
Anemone ranunculoides		1.2	+	1.2	2.3	1.2	1.2	1.2	1.2	+2	1.2	1.2	V
Lesium maculatum		1.1	+	+	1.1	+	+	+	1.2	+2	+2	+	V
Brachypodium silvaticum		1.2	+2	1.2	+	2.2	1.2	+2	1.2	+	+2	+2	V
Asarum europaeum		2.3	+2	2.3	1.3	2.3	2.3	+	2.3	+	+3	+	V
Viola mirabilis		1.2	+2	+2	1.2	+	+2	1.2	+	+2	+2	1.1	V
Adoxa moschatellina		1.2	+	+2	+2	+	+	+	+	+2	+2	+	III
Corydalis solida		+	+2	1.1	1.1	+	1.2	+	+	+	+	+	II

II Ch. Fagion silvaticae

Fagus silvatica	a ₁	1.1	2.2	3.3	4.5	4.5	4.5	4.5	3.4	4.5	3.3	3.3	V
" "	a ₂	+	+	+	+	+	+	+	2.2	+	+	1.1	
" "	b ₁	+2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
" "	b ₂	+	2.2	1.1	+	+	+	1.3	+	1.1	+	1.1	
Acer pseudoplatanus	c	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Melica uniflora	c	+	+	+2	1.2	+2	1.2	+2	+2	+2	1.2	+2	V
Festuca silvatica	c	+2	+2	+2	+	1.2	+2	1.2	+2	+	+2	1.2	V

III Ch. Alno-Padion

Stellaria nemorum	c	1.2	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.2	1.2	V
Ficaria verna		2.3	1.3	2.3	2.3	+	1.2	1.3	1.2	+	1.2	1.2	V
Chrysosplenium alternifolium		+2	+2	+2	1.2	+	1.2	+	1.2	+2	+2	1.2	V
Stachys silvatica		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	+	+	+	+	+	+	V
Festuca gigantea		+	+2	+2	+2	+2	+	+	+	+	+	+	III
Gagea lutea		+	+2	+	+	+2	+	+	+	+2	1.2	+	III
Equisetum silvaticum		+	+	+	+	+	+	+2	+	1.2	+2	+2	II
Chaerophyllum aromaticum		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I

IV Ch. Fagetalia silvaticae

Ulmus scabra	a ₁	1.1	1.1	+2	1.1	+	+	+	2.2	+	1.1	1.1	V
" "	a ₂	+	1.1	+	1.1	+	+	+	1.1	+	1.1	1.1	
Fraxinus excelsior	a ₁	3.4	3.3	3.3	+	+	1.1	+	+	+	+	+	IV
" "	b ₁	+	+	2.3	+	+	+	+	+	+	+	+	
" "	b ₂	1.1	1.1	+	1.2	1.1	1.1	1.1	+	+	+	+2	
" "	c	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	V
Galeobdolon luteum		1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	+	+2	1.1	V
Paris quadrifolia		1.2	1.1	1.2	1.2	+	1.1	1.2	1.2	+	+2	1.1	V
Asperula odorata		+2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.2	V
Dryopteris filix-mas		1.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.2	3.3	1.2	2.2	V
Milium effusum		+2	+2	+2	+2	1.2	2.3	+2	+2	1.2	+2	+2	V
Actaea spicata		1.1	+	+	1.1	+	+	1.1	1.1	+	+	1.1	V
Polygonatum multiflorum		+	+	+2	+2	+	+	+2	+2	+	+2	1.2	V
Pulmonaria obscura		+2	+2	+2	1.1	+2	+2	+2	1.2	+	1.1	+	V
Stellaria holostea		+2	1.2	1.2	1.2	2.3	1.2	1.2	1.2	2.2	1.2	+	V
Carex silvatica		+2	+2	+2	+2	+	+	1.2	+	+2	+2	1.2	V
Impatiens noli-tangere		2.3	1.2	2.3	2.3	2.3	+2	2.2	+	1.2	+	1.2	V
Daphne mezereum		1.1	+	+	+	+	+	+	+2	+	+	+	IV
Sanicula europaea		+2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	III
Hepatica nobilis		+	+	+	1.2	+	1.2	+	+	+	+	+	III
Lathyrus vernus		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Catherinea undulata	d	+	+	1.3	+	1.2	+	+2	+2	+	+2	+2	III

V Ch. Querco-Fagetea											
Acer platanoides	a	.	.	.	.	.	.	1.1	.	+	III
" "	c	.	.	.	.	.	.	1.1	.	+	IV
Evonymus europaea	b,c	.	.	+	+2	.	.	+2	.	.	V
Anemone nemorosa	c	2.3	1.1	3.4	4.5	2.3	3.4	2.3	4.5	4.4	3.4
Viola silvestris		1.1	.	.	.	+	1.1	1.1	1.1	+	+
Aegopodium podagraria		.	1.1	.	1.1	1.2	.	.	2.2	+	1.2
Geum urbanum		+	.	+	.	.	.	.	.	.	.
Scrophularia nodosa		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eurhynchium zetterstedtii	d	1.2	+2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	+2	+2	1.2
Eurhynchium striatum		+2	+2	+2	+2	.	+2	.	+2	+2	.
Eurhynchium swartzii		1.2	1.2	+2	1.2	.	.	+2	.	.	+2
VI Gatunki towarzyszące /Accompanying species/											
Quercus robur		.	.	.	.	.	.	1.1	.	1.1	II
Betula verrucosa		.	.	.	.	.	.	1.1	.	2.1	IV
Urtica dioica		2.3	1.2	1.2	+2	2.3	1.2	1.1	+	1.2	+
Athyrium filix-femina		+2	2.3	1.3	1.2	2.3	+	1.2	1.2	1.2	1.2
Oxalis acetosella		.	+/+2/	+2	.	.	1.2	+	1.2	+	1.2
Lajanthemum bifolium		.	.	.	.	.	1.1	1.1	1.1	+	1.2
Rubus idaeus		.	.	.	.	2.3	1.1	.	.	1.1	+
Geranium robertianum		1.1	+	.	.	.	.	.	.	.	+
Phegopteris dryopteris		.	.	.	+2	.	.	2.2	1.2	+2	2.3
Ajuga reptans		.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
Galeobisis pubescens		+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Platanthera bifolia		.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
VII Wchy i wtrobowce towarzyszące /Accompanying mosses and liverworts/											
Mnium affine	d	1.2	1.2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	1.2	+2
Mnium cuspidatum		+2	+2	+2	+2	1.2	+2	.	+2	+	+2
Hypnum cupressiforme		+2	.	+2	.	1.2	+2	1.2	+2	.	+2
Plagiothecium neglectum		+2	+2	+2	+2	.	.	+2	.	.	+2
Brachythecium velutinum		1.2	.	+2	.	+2	+2	.	+2	.	.
Brachythecium rutabulum		.	+2	1.2	+2	.	+2	.	.	.	.
Thuidium delicatulum		.	.	.	.	+2	+2	+2	.	.	+2
Calypogeia trichomanis		+2	+2	.	.	1.2	.	.	.	+2	.
Amblystegium serpens		+2	.	.	+2	.	.	.	+2	.	.
Lophocolea heterophylla		+2	.	.	+2	.	.	.	.	+2	.
Lepidosia reptans		.	.	+2	.	+2	+2	.	.	.	.
Blepharostoma trichophyllum		.	+2	.	+2	+2	.	.	.	.	.

Tabela 43 — Table 43

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) <i>Fagion silvaticae</i>	4	32	5,42	72,72	3,94
Wyróżniające podzespół	11	100	16,90	82,64	13,97
Differential sp. of subassoc.					
Ch. <i>Alno-Padion</i>	8	55	9,31	62,50	5,82
Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i>	23	166	28,09	65,61	18,43
Ch. <i>Querco-Fagetea</i>	14	85	14,39	55,20	7,94
Towarzyszące (Accompanying sp.)	36	153	25,89	38,64	10,00
Razem (Total)	96	591	100,00		

tosum perennis nie rodzi istotnych wątpliwości. Za utożsamieniem tej jednostki z żyzną postacią buczyny przemawia dość wysoka wartość systematyczna gatunków charakterystycznych zespołu *Melico-Fagetum* i związku *Fagion silvaticae* ($D = 3,94$) oraz znaczny udział gatunków siedlisk eutroficznych, bardzo dobrze wyróżniających to zbiorowisko od podzespołów mezotroficznych buczyny pomorskiej.

Od niskich grądów, których fizjonomia i wymagania siedliskowe na badanym terenie są podobne, żyzna buczyna różni się minimalnym znaczeniem elementów związku *Carpinion betuli* ($D = 0,89$).

Melico-Fagetum mercurialetosum z terenu Wzgórz Dylewskich posiada najwięcej cech wspólnych z podzespołem o tej samej nazwie z Wysoczyzny Elbląskiej (T o k a r z 1961). Bardzo zbliżone do badanych są także tego typu zbiorowiska rozwijające się na ocienionych zboczach Góry Zamkowej w obrębie Wzniesień Górowskich, w rezerwacie „Dolina rzeki Wąlszy” (F a l i ŋ s c y 1965) oraz w nadleśnictwie Markowy koło Morąga (T o k a r z 1971a).

B. *Melico-Fagetum typicum*

Podzespół *Melico-Fagetum typicum* zasadniczo ogranicza swoje występowanie do wschodnich zboczy Góry Dylewskiej stanowiących południową część kompleksu głównego. Na małej powierzchni rozwija się on ponadto w oddziale 184 uroczyska Wygoda.

Gleby zajęte przez typową buczynę pomorską należą do najbardziej zwięzłych na badanym terenie (ryc. 27, tab. 44). W partiach najwyższej położonych są one wytworzone z gliny zwałowej lekkiej, często spiaszczonej (profil 12 i 16), a w położeniach niższych skałą macierzystą są dla nich utwory pyłowe (profil 18), zalegające nieraz na piaskach gliniastych (profil 2).

Dość często zaznacza się proces przemywania. Dalej zaawansowany jest on w glebie pokrywającej wierzchołki wzniesień morenowych, żywiące najuboższe postacie tego podzespołu (prof. 16), mniej natomiast w glebach wykształcających się na terasach zboczy (prof. 12) i u ich podnóży (prof. 18).

Omawiane gleby w całym profilu są wyraźnie zakwaszone. W poziomie akumulacyjnym (A_1) pH_{H_2O} kształtuje się między wartościami 4,3–4,8, a na głębokości około 1 m waha się od 5,1 do 5,9. Najmniej zakwaszona jest gleba w postaci typowej tego podzespołu (tab. 45).

Istotne różnice zaznaczają się w ilości składników przyswajalnych. Więcej znajduje się ich w glebach wytworzonych z utworu pyłowego, a wyraźny niedobór zaznacza się w glebach powstałych z gliny zwałowej. Zbliżone wartości węgla i azotu w wierzchnich warstwach badanych gleb świadczą, że mamy tu do czynienia z podłożem o podobnej aktywności biologicznej. Ilości tych pierwiastków i ich wzajemne stosunki pozwalają określić te gleby jako średnio produktywne. W oparciu o budowę morfolo-

Ryc. 27. Profile glebowe w podzespole *Melico-Fagetum typicum*
Nr 12 i 2 — facja z *Melica uniflora*, Nr 18 — wariant typowy, Nr 16 — facja z *Festuca silvatica*

(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

Fig. 27. Soil profiles of the subassociation *Melico-Fagetum typicum*
No. 12 and 2 — facies with *Melica uniflora*, No. 18 — typical variant, No 16 — facies with *Festuca silvatica*

(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

giczną i badane właściwości chemiczne określono je jako gleby brunatne wylugowane oraz kwaśne.

Podzespół *Melico-Fagetum typicum* jest zbiorowiskiem widnym, gdyż często brakuje w nim podszycia, a drzewostan jest wysokopienny. Korony gatunków drzewiastych ułożone są przeważnie w dwóch poziomach. W górnym zdecydowanie dominuje *Fagus silavtica*, w niższym buk uzupełniają niekiedy pojedyncze okazy: *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Quercus robur*, *Ulmus scabra* lub *Betula verrucosa*.

Tabela 44 — Table 44

Skład mechaniczny gleb w podzespole *Melico-Fagetum typicum*
 Mechanical composition of the soils in *Melico-Fagetum typicum* subassociation

Nr pro- filu No. of pro- file	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	Części szkie- letowe Skele- ton parts %	Części ziemiste % — Earth parts %						Gatunek gleby według klasyfikacji PTG Name of the soil variety according to the classification of PTG			
				Części piaskowe Sand parts		Cz. pyłowe Dust parts		Cz. spławialne Float parts					
				1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05- 0,02	0,02- 0,006				
											Ø mm		
Gleba brunatna wylugowana wytworzona z glin zwalowych Brown leached soil formed from boulder clays													
12	Dylewo 109 46	A ₁	4-18	7,0	5,8	11,5	33,7	17	15	8	4	5	piasek gliniasty mocny
		A ₁ (B)	18-40	7,2	6,0	12,0	26,0	15	17	9	6	9	głina lekka silnie spiaszcz.
		A ₃ (B)g	40-65	8,8	8,4	15,2	31,4	14	8	9	8	6	głina lekka silnie spiaszcz.
		Bt(B)g	65-90	9,8	6,0	12,2	24,8	16	6	7	11	17	głina lekka słabo spiaszcz.
		C	110-140	8,6	6,7	13,0	25,3	14	7	6	14	14	głina lekka słabo spiaszcz.
Gleba brunatna kwaśna wytworzona z utworu pyłowego na piasku gliniastym Acid brown soil formed from silt loam on loamy sand													
2	Dylewo 124 15	A ₁	5-16	2,0	0,76	1,78	16,46	45	19	10	2	5	utwór pyłowy zwykły
		A ₁ (B)	16-35	1,0	1,02	1,78	17,20	15	35	17	5	7	utwór pyłowy zwykły
		(B)	35-48	0,2	0,51	1,02	14,47	17	39	18	7	3	utwór pyłowy zwykły
		(B)	48-90	4,8	4,33	13,51	23,16	18	24	9	4	4	utwór pyłowy zw. spiaszcz.
		D	90-140	29,2	13,26	22,18	29,56	12	9	9	3	2	piasek gliniasty lekki

Gleba brunatna wylugowana wytworzona z utworów pylowych
Brown leached soil formed from silt loams

18	Dylewo 114 35	A ₁	5-13	2,2	2,0	3,5	18,5	19	33	12	6	6	utwór pylowy zwykly
		A ₁ (B)	13-32	2,4	1,2	2,2	28,6	17	30	10	9	2	utwór pylowy zwykly
		A ₃ (B)	32-55	0,2	0,0	0,0	13,0	12	66	4	2	3	utwór pyl. zwykly (glinka)
		Bt(B)	55-80	0,0	0,5	0,7	8,8	16	36	20	12	6	utwór pyl. ilasty (glinka)
		C	80-140	0,0	0,5	2,0	10,5	17	61	7	0	2	utwór pyl. zwykly (glinka)

Gleba brunatna wylugowana wytworzona z gliny lekkiej przewarstwionej utworem pylowym
Brown leached soil formed from sandy loam with a stratum of silt loam

16	Dylewo 106 109	A ₁	4-15	8,0	4,5	9,7	26,8	20	15	9	4	11	glinka lekka silnie spiaszcz.
		(B)	15-55	6,4	5,0	10,5	29,5	12	15	13	6	9	glinka lekka slabo spiaszcz.
		A ₃ (B)g	55-105	7,2	6,0	12,2	29,8	11	31	5	1	4	utwór pylowy zwykly
		Bt	105-137	3,0	3,7	8,0	37,3	16	9	6	7	13	glinka lekka slabo spiaszcz.
		C	137-150	3,8	4,8	9,0	35,2	15	14	6	7	9	glinka lekka silnie spiaszcz.

Tabela 45 — Table 45

Niektóre właściwości chemiczne gleb w podzespole *Melico-Fagetum typicum*
Some chemical properties of soils in *Melico-Fagetum typicum* subassociation

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			w in H ₂ O	w in KCl						
			%							

metoda Egner
acc. to Egner
mg/100 g gleby
mg/100 g of soil

Gleba brunatna wylugowana wytworzona z glin zwalowych
Brown leached soil formed from boulder clays

12	Dylewo 109 46	A ₁	4-18	4,6	3,8	3,379	1,960	0,1176	16,6	0,40	1,80
		A ₁ (B)	18-40	4,8	4,3	1,800	1,044	0,0504	21,9	2,55	1,00
		A ₃ (B)g	40-65	5,1	4,5	0,279	0,162	0,0112	14,5	0,85	0,80
		Bt(B)g	65-90	5,2	4,4	0,279	0,162	0,0168	9,6	2,55	3,90
		C	110-140	5,2	4,4	0,290	0,168	0,0112	15,0	4,80	5,10

Gleba brunatna kwaśna wytworzona z utworu pylowego na piasku gliniastym
Acid brown soil formed from silt loam on loamy sand

2	Dylewo 124 15	A ₁	5-16	4,3	3,7	5,318	3,080	0,2072	14,9	8,35	9,90
		A ₁ (B)	16-35	4,6	4,2	1,624	0,942	0,0560	16,8	2,30	8,50
		(B)	35-48	4,7	4,0	0,724	0,420	0,0224	18,7	5,25	8,70
		(B)	48-90	4,8	4,0	0,455	0,264	0,0112	23,6	6,00	7,55
		D	90-140	5,1	4,1	0,331	0,192	0,0084	22,8	9,80	3,70

Gleba brunatna wylugowana wytworzona z utworów pyłowych
Brown leached soil formed from silt loams

	A ₁	5-13	4,8	4,0	2,913	1,690	0,1400	12,0	15,45	6,60
Dylewo	A ₁ (B)	13-32	4,9	4,1	1,894	1,098	0,0980	11,2	14,40	4,10
114	A ₃ (B)	32-55	5,3	4,4	0,424	0,246	0,0280	8,8	4,00	3,50
35	Bt(B)	55-80	5,5	4,5	0,372	0,216	0,0196	11,0	3,30	3,50
	C	80-140	5,9	4,6	0,269	0,156	0,0084	18,6	0,90	3,10

Gleba brunatna wylugowana wytworzona z gliny lekkiej przewarstwionej utworem pyłowym
Brown leached soil formed from sandy loam with a stratum of silt loam

16	Dylewo	A ₁	4-15	4,5	3,8	5,051	2,930	0,2268	12,9	3,55	2,55
		(B)	15-55	4,7	4,3	1,800	1,044	0,0672	15,5	1,80	0,40
		A ₂ (B) _g	55-105	4,9	4,4	0,239	0,138	0,0140	9,8	1,40	0,40
		B _t	105-137	5,5	4,3	0,372	0,210	0,0140	15,0	4,15	4,30
		C	137-150	5,6	4,3	0,176	0,102	0,0058	17,6	4,00	3,90

Ryc. 28. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Melico-Fagetum typicum*

Fig. 28. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Melico-Fagetum typicum*

1 — *Fagus silvatica*

Struktura drzewostanu jest dlatego prosta (ryc. 28, 29), a przebieg krzywej buka zawsze podobny. Przedstawione wykresy obrazują różnowiekowy drzewostan bukowy, odnowiony sposobem naturalnym po dokonanych wyrębie. Taką interpretację narzuca obecność pojedynczych okazów tego gatunku w najstarszych klasach grubości i znaczna rozpiętość klas.

Fot. Cz. Holdyński

Fot. 5. Skupienie perlówki jednokwiatowej (*Melica uniflora*) gatunku charakterystycznego dla buczyny pomorskiej (*Melico-Fagetum*)

Phot. 5. Aggregation of *Melica uniflora* — the characteristic species of *Melico-Fagetum* association

[illegible][illegible]

Getrunki sporadyczne /Sporadic species/

111 *Tilia cordata* /13/, *Evolvulus verrucosa* /26,35/, *Carpinus betulus* /9/, *Viola mirabilis* /5,7,19,37/, *Asarum europaeum* /5,10,19/, *Mercurialis perennis* /13,19,35/, *Dactylis ischaemone* /12,24/, *Viburnum opulus* /7,25/, *Cerex villosa* /40/.

V. *Picea excelsa* /16, 17, 33, 35/, *Pinus silvestris* /25, 27/, *Hieracium lachenalii* /37, 40, 41/, *Veronica officinalis* /31, 38, 41/, *Viola riviniana* /39/, *Dicranum scoparium* /16, 17, 32/.

VI *Sambucus racemosa* /17,27/, *Sambucus nigra* /22/, *Frangula alnus* /40/, *Carex pallescens* /12,13,23,31,38,40/, *Deschampsia caespitosa* /6,30,31,32,37/, *Chamaenerion angustifolium* /12,27,28,30/, *Serenoa robertianus* /1,20,33/, *Plantanthera bifolia* /19,26/, *Lansana communis* /26,34/, *Carex leporina* /32,33/, *Hypericum perforatum* /3,30/, *Polypodium verticillatum* /12/, *Vicia spuria* /12/.

VII *Brachythecium rutabulum* /1,2,22,28,35,38,41/ *Sicranum longifolium* /4,20,30,32,39,40/, *Lepidosia reptans* /5,8,9,18,24,25/, *Radula complanata* /2,3,12,15,23/, *Elasia pusilla* /4,40/, *Rapidosia pusilla* /1,4,11/.

Objaśnienia /Explanations/: Bed - Bednarki, Dyl - Dylewo.

Gatunki charakterystyczne zespołu i związku *Fagion* są ważnym składnikiem omawianego zbiorowiska (tab. 46). Stale, a często nawet w dużej ilości, spotkać można *Festuca silvatica* i *Melica uniflora* (fot. 5). Z mniejszą stałością występuje *Elymus europaeus* i *Acer pseudoplatanus*. Systematyczna wartość grupowa przedstawicieli związku *Fagion* jest dlatego dość wysoka i wynosi 6,39 (tab. 47). Stała obecność wymienionych gatunków jest z pewnością wynikiem istnienia korzystnych warunków siedliskowych

Tabela 47 — Table 47

Struktura systematyczna podzespołu *Melico-Fagetum typicum*

Systematic structure of *Melico-Fagetum typicum*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) <i>Fagion silvaticae</i>	5	130	8,60	74,28	6,39
Ch. <i>Alno-Padion</i>	6	49	3,25	23,33	0,76
Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i>	31	465	30,77	42,12	12,96
Ch. <i>Quercu-Fagetea</i>	15	291	19,26	55,43	10,67
Ch. <i>Vaccinio-Piceetea</i>	8	40	2,65	14,28	0,38
Towarzyszące (Accompanying sp.)	52	536	35,47	30,55	10,84
Razem (Total)	117	1511	100,00		

dla buczyny pomorskiej na badanym terenie, a w pewnym stopniu może świadczyć o jej długowieczności.

Podstawę charakteryzowanego podzespołu stanowią przedstawiciele rzędu *Fagetalia*, klasy *Quercu-Fagetea* oraz gatunki towarzyszące. Z elementów związku *Carpinion* często pojawia się tylko *Stellaria holostea*. *Tilia cordata*, *Carpinus betulus*, *Evonymus verrucosa* i *Dactylis aschersoniana* wystąpiły zaledwie w jednym lub dwóch zdjęciach.

Mając na uwadze podobne wymagania siedliskowe buczyny pomorskiej i lasów grądowych, ich bliskie sąsiedztwo w terenie, a także położenie badanego obszaru u kresu wschodniego zasięgu buka i zespołu *Melico-Fagetum*, można było w buczynie z terenu Wzgórz Dylewskich przewidywać większy udział gatunków grądowych. Minimalna ich obecność jest zjawiskiem nieoczekiwanym.

Podzespół *Melico-Fagetum typicum* odznacza się małym zakresem zmienności. O jego stabilności świadczy wysoka stałość składu florystycznego oraz małe różnice w liczbie gatunków w zdjęciach. Na ogólną liczbę 117 gatunków, 28 osiągnęło IV i V stopień stałości, zaś w zdecydowanej większości badanych płatów liczba gatunków waha się od 37 do 49. Łatwo zauważalne zróżnicowanie fizjonomii runa wynika jedynie z dość różnego udziału ilościowego gatunków charakterystycznych. Stwarza to podstawę

Ryc. 29. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w podzespole *Melico-Fagetum typicum*

Fig. 29. Diagram of biological structure wood-layer in subassociation *Melico-Fagetum typicum*

1 — *Fagus silvatica*; 2 — *Acer pseudoplatanus*

do wyróżnienia w obrębie typowej buczyny facji z *Melica uniflora* (niektóre zdjęcia z grupy a) i facji z *Festuca silvatica* (grupa c).

Płaty, w których dominuje lub przeważa *Melica uniflora*, zajmują przeważnie niższe terasy wzniesień morenowych, względnie ich łagodne zbocza. Wyróżnia je nieco wilgotniejsze podłoże, większa zwartość drzewostanu, a przez to silniejsze ocienienie dna lasu.

Facja z *Festuca silvatica*, która w zakresie stosunków florystycznych nawiązuje do podzespołu *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*, porasta zwykle płaskie grzbiety wzgórz morenowych, z glebą okresowo przesuszaną, a w górnej części profilu — wyraźnie przemylaną. Ponieważ w sposób dla siebie najbardziej charakterystyczny wykształca się na powierzchniach z przerzadzonym drzewostanem w wyniku wyrębu, należy ją traktować jako kolejny etap naturalnej regeneracji typowej buczyny pomorskiej.

Typowa forma buczyny, odznaczając się bardzo podobnym składem gatunkowym, wyróżnia się jedynie zrównoważeniem stosunków ilościowych w runie.

Składem florystycznym i zakresem zmienności buczyny dylewskiej najbardziej nawiązują do tego samego zbiorowiska z Wysoczyzny Elbląskiej (Tokarz 1961), z wyspy Wolin (Piotrowska 1955, 1966) i z Puszczy Bukowej koło Szczecina (Celiński 1962, 1964).

Melico-Fagetum typicum w wariantach z *Melica uniflora*, opisane z dorzecza Mogilnicy (Wojterski 1960) i z leśnictwa Wronie koło Wąbrzeźna (Kępczyński, A. Noryśkiewicz 1968), najbardziej jest zbliżone do fitocenoz w facji z *Melica uniflora*. Nie różnią się od niej istotnie także buczyny opisane na Pojezierzu Iławskim (Jutrzenka-Trzebiatowski 1969, Tokarz 1971), w rezerwacie „Góra Zamkowa” koło Kartuz (Matuszkiewicz 1966), w rezerwacie „Wąwelno” na terenie Bo-

rów Tucholskich (Kępczyński, Boiński, Ceynowa 1967), na Pojezierzu Krajeńskim (Boiński 1973) oraz z ziemi chełmińskiej (Rejewski 1971).

Analogiczne zbiorowiska, jak dylewskie *Melico-Fagetum typicum* w facji z *Festuca silvatica*, zostało opisane na Wysoczyźnie Elbląskiej (Tokarz 1961), a podobny typ buczyny porasta także wierzchołkowe partie Góry Zamkowej na obszarze Wzniesień Górowskich (Faliński, Matuszkiewicz 1965).

C. *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*

Typowe fitocenozy podzespołu *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae* (tab. 46, zdjęcia 36-41) rozwijają się na stromych zboczach Góry Dylewskiej o ekspozycji południowej. W terenie kontaktują się one najczęściej albo z płatami *Melico-Fagetum typicum* w facji z *Festuca silvatica*, albo z uboższym od niego zespołem *Fago-Quercetum petraeae*.

Gleba zajęta przez buczynę kostrzewową jest najuboższym podłożem w obrębie zespołu *Melico-Fagetum*. W jej budowie morfologicznej (ryc. 30)

Ryc. 30. Profil glebowy w podzespole *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*
Fig. 30. Soil profile of the subassociation *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*

(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

zwraca uwagę zalegająca pod około 3-centymetrową warstwą ściółki 5-6-centymetrowa warstwa fermentacyjno-humifikacyjna, w której dobrze są widoczne niecałkowicie rozłożone szczątki części nadziemnych roślin i ich korzeni. Miąższość poziomu próchnicznego wynosi zaledwie 10 cm. W głąb profilu dobrze zaznacza się około 30 cm poziom wymywania (A_3), w dolnej części oglejony opadowo. Zaciekami przechodzi on w poziom wmywania (Bt) ze śladami oglejenia oksyredukcyjnego. Warunki topograficzne, w których występuje omawiane zbiorowisko, sprzyjają procesom przemýviania. Znaczne obniżanie się poziomu wód gruntowych w okresie lata przyspiesza wysychanie warstw powierzchniowych i ich pękanie. W tej sytuacji wody opadowe sprawniej wnikają w głąb profilu i szybciej przemieszczają składniki chemiczne i cząstki koloidalne.

Zawartość części szkieletowych w całym profilu jest większa niż zwykle w badanych glebach i waha się w poszczególnych warstwach od 8,0 do

Tabela 49 — Table 49

Niektóre właściwości chemiczne gleby w podzespole *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*
Some chemical properties of soil in *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae* subassociation

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			w in H ₂ O	w in KCl						
			%							
									metoda Egner acc. to Egner mg/100 g gleby mg/100 g of soil	

Gleba płowa właściwa wytworzona z glin zwałowych
Typical pseudopodzolic soil formed from boulder clays

14	Dylewo 109 82	A ₁	8-18	4,0	3,2	6,741	3,910	0,1848	21,1	0,50	2,00
		A ₃	18-47	4,6	4,2	2,172	1,260	0,0532	23,7	0,00	0,60
		A _{3g}	47-63	4,9	4,5	0,318	0,180	0,0084	21,4	0,30	0,10
		Btg	63-110	4,9	4,0	0,318	0,180	0,0140	12,8	1,40	1,80
		C	110-140	5,3	4,0	0,186	0,108	0,0079	13,6	1,70	2,10

16,40%. Niska jest natomiast zawartość przyswajalnego fosforu i potasu (tab. 49). Z powodu małej ilości azotu i stosunkowo dużej zasobności górnych warstw profilu w węgiel, stosunek C/N kształtuje się niezbyt korzystnie, gdyż wynosi 21,1-23,7. Nieco większe jest także zakwaszenie gleby. Opisaną glebę określono jako glebę płową właściwą wytworzoną z glin zwałowych (tab. 48).

Podzespół *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae* swoim wyglądem i strukturą drzewostanu zbliża się znacznie do opisanego poprzednio podzespołu *Melico-Fagetum typicum* w facji z *Festuca silvatica*. Jego jednowarstwowy drzewostan buduje wyłącznie *Fagus silvatica*. W słabo zaznaczającej się warstwie krzewów stale występuje tylko *Sorbus aucuparia*, a w niektórych płatach spotkać można małe skupienia podrostu *Fagus silvatica*.

W runie dominuje zawsze *Festuca silvatica*, która masowym występowaniem tworzy bardzo charakterystyczny dla tej jednostki aspekt trawiasty. Inne gatunki występują w niedużych ilościach.

Do omawianego podzespołu zaliczono zdjęcia 36-41 umieszczone w tabeli 46. Jego skład florystyczny znamionuje zupełny brak elementów siedlisk eutroficznych oraz wyższą stałość i zwiększony udział zbiorowy gatunków z klasy *Vaccinio-Piceetea* (tab. 50). Systematyczna wartość tej grupy jest tu wielokrotnie większa niż w buczynie typowej.

Tabela 50 — Table 50

Struktura systematyczna podzespołu *Melico-Fagetum festucetosum*
Systematic structure of *Melico-Fagetum festucetosum*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) <i>Fagion silvaticae</i>	3	16	6,20	88,88	5,40
Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i>	19	60	23,26	52,63	12,24
Ch. <i>Quercu-Fagetea</i>	14	52	20,15	61,90	12,47
Ch. <i>Vaccinio-Piceetea</i>	7	24	9,30	57,14	5,31
Towarzyszące (Accompanying sp.)	34	106	41,09	51,96	21,35
Razem (Total)	77	258	100,00		

Niemąla systematyczna wartość grupowa elementów związku *Fagion silvaticae* jest wynikiem stałej obecności *Fagus silvatica* i *Festuca silvatica* oraz częstego pojawiania się *Melica uniflora*.

Podstawą tego podzespołu są gatunki klasy *Quercu-Fagetea*, rzędu *Fagetalia* i towarzyszące. W stosunku do podzespołu typowego większą rolę odgrywają gatunki klasy *Quercu-Fagetea* i towarzyszące, mniej natomiast jest przedstawicieli rzędu *Fagetalia*. Zmniejszyła się w związku z tym ogólna liczba gatunków (77) oraz ich przeciętna liczba w poszczególnych

zdjęciach (43). Powyższe różnice wskazują, że mamy tu do czynienia z jednym z końcowych ogniw w szeregu sukcesyjnym buczyny pomorskiej.

W literaturze analogiczne zbiorowisko zostało opisane przez Celińskiego (1962, 1964) z Puszczy Bukowej koło Szczecina oraz przez Boińskiego (1973) z Pojezierza Krajeńskiego. Ten typ buczyny obserwowano również na stromych zboczach w południowo-wschodniej części Wyżyny Staniszewskiej na Pojezierzu Kaszubskim.

Tokarz (1971), analizując udział buka w zbiorowiskach leśnych Polski północno-wschodniej, włączyła ubogą buczynę kostrzewową do podzespołu *Melico-Fagetum typicum* jako wariant z *Festuca silvatica*.

Trientali-Fagetum R. Tüxen 1960

Kwaśna buczyna pomorska

Zespół *Trientali-Fagetum* jest spotykany w całym pasie pojezierzy, jednak wszędzie ogranicza się do najbardziej zróżnicowanych orograficznie wzgórz morenowych. Podobnie zachowuje się na badanym terenie, gdzie nieduże jego płaty rozproszone są po całym uroczysku Dylewo, lecz zajmują jedynie wierzchołki wzniesień morenowych i ich strome zbocza o różnej ekspozycji.

Miejsca te charakteryzuje specyficzny układ stosunków siedliskowych. Są one stale narażane na niekorzystne działanie wiatru i temperatury, w wyniku czego w czasie lata bywają pozbawiane ściółki leśnej oraz nadmiernie nagrzewane, natomiast w okresie zimy przykrywa je płytka pokrywa śnieżna i dlatego zbyt głęboko przemarzają.

Gleby tworzące się w takich warunkach są zawsze ubogie, silnie zakwaszone i przemylwane. W warstwach powierzchniowych charakteryzuje je częsty niedostatek wody. Rozkład ściółki odbywa się dlatego powoli, a poziom akumulacji biologicznej wykształca się na ogół słabo. Na powierzchniach płaskich różnicuje się wyraźnie na warstwę nie rozłożonej ściółki ($L=3$ cm), warstwę fermentacyjno-humifikacyjną ($F, H=6,7$ cm) i niezbyt grubą warstwę mineralno-próchniczną (ryc. 31). Gleby pokrywa-

Nr 3

Ryc. 31. Profil glebowy w zespole *Trientali-Fagetum*
Fig. 31 Soil profile of the association *Trientali-Fagetum*
(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

Tabela 51 — Table 51
 Skład mechaniczny gleby w zespole *Trientali-Fagetum*
 Mechanical composition of the soil in *Trientali-Fagetum* association

Nr pro- filu No. of pro- file	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	Części szkie- letowe Skele- ton parts %	Części ziemiste % — Earth parts %							Gatunek gleby według klasyfikacji PTG Name of the soil variety according to the classification of PTG		
				Części piaszkowe Sand parts			Cz. pyłowe Dust parts		Cz. splewialne Float parts				
				1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05- 0,02	0,02- 0,006	0,006- 0,002			
				Ø mm									
3	Dylewo 123 65	A ₁	9-19	11,8	5,61	13,26	29,13	23	14	5	6	4	piasek gliniasty lekki
		A ₃	19-45	10,6	6,37	14,02	33,16	14	16	5	6	2	piasek gliniasty lekki
		A _{3g}	45-60	8,6	5,61	13,26	32,13	16	11	10	9	1	głina lekka silnie spiaszcz.
		Bt	60-100	6,0	3,57	9,94	31,49	14	7	9	10	15	głina lekka słabo spiaszcz.
		C	100-130	12,1	5,37	8,23	33,40	14	10	10	9	11	głina lekka słabo spiaszcz.

Gleba płowa właściwa wytworzona z piasku gliniastego na glinie żwawej
 Typical pseudopodzolic soil formed from loamy sand on boulder clay

Tabela 52 — Table 52
 Niektóre właściwości chemiczne gleby w zespole *Trientali-Fagetum*
 Some chemical properties of soil in *Trientali-Fagetum* association

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			w in H ₂ O	% in KCl						
						%				metoda Egnera acc. to Egner mg/100 g gleby mg/100 g of soil

Gleba płowa właściwa wytworzona z piasku gliniastego na glinie zwałowej
 Typical pseudopodzolic soil formed from loamy sand on boulder clay

3	Dylewo 123 65	A ₁	9-19	4,3	3,7	4,628	2,680	0,1764	15,2	4,55	15,00
		A ₃	19-45	4,5	4,0	1,608	0,882	0,0532	16,8	4,30	2,75
		A _{3g}	45-60	5,0	4,1	0,279	0,162	0,0056	28,9	3,05	3,10
		Bt	60-100	5,1	3,8	0,331	0,192	0,0112	17,1	11,65	9,90
		C	100-130	5,2	3,8	0,214	0,124	0,0064	19,4	9,20	9,30

jące strome zbocza są zazwyczaj pozbawiane ściółki, a cienką warstwę fermentacyjno-humifikacyjną w dużej ilości porastają mchy. Pod poziomem próchnicznym zalega poziom płowienia, w którym przeważają procesy przemývania i oglejenia odgórnego. Ostatniemu procesowi sprzyja niecałkowita budowa opisywanych gleb. Tworzą je piaski gliniaste zalegające na glinie lekkiej (tab. 51).

Zakwaszenie omawianych gleb jest znaczne (tab. 52). Według klasyfikacji Strzemińskiego (z Medweckiej-Kornaś 1955) są one silnie kwaśne. Przyswajalnego fosforu i potasu zawierają natomiast niedużo. Najmniej znajduje się tych składników, podobnie jak węgla i azotu, w warstwie oglejonej poziomu płowienia. Stosunek C/N waha się w górnych poziomach profilu od 15,2 do 16,8. Charakteryzowany utwór glebowy sklasyfikowano jako glebę płową właściwą.

Do cech najlepiej wyróżniających kwaśną buczynę od innych zbiorowisk lasów liściastych należy przede wszystkim: wysokopienność drzewostanu bukowego, brak warstwy krzewów, małe pokrycie dna lasu przez roślinność zielną oraz zwiększony udział mszaków i częste występowanie porostów naziemnych. Wymienione cechy powodują, że omawiane zbiorowisko jest zawsze widne i prezentuje się bardzo ubogo.

Struktura drzewostanu w zespole *Trientali-Fagetum* jest analogiczna, jak w typowej buczynie pomorskiej (ryc. 32). Bukowy drzewostan tylko w niektórych płatach uzupełniany jest przez pojedyncze okazy *Betula verrucosa*, *Quercus robur*, *Picea excelsa*, *Populus tremula* lub *Pinus silvestris*.

W warstwie krzewów rzadko rośnie *Sorbus aucuparia* i *Picea excelsa*. Wśród roślinności zielnej brak gatunków osiągających wyższe stopnie po-

Ryc. 32. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w zespole *Trientali-Fagetum*

Fig. 32. Diagram of biological structure wood-layer in association *Trientali-Fagetum*

1 — *Fagus silvatica*; 2 — *Quercus robur*

Tabela 53

Trientalis - Fagetum R. Tüxen 1960

Nr kolejny / Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nr zdjęcia / Number of record/	53	65	116	12	85	138	48	122	73	83	104	142	95	97	74
Data / Date/	28.5	14.6	18.7	21.6	16.6	20.7	28.5	18.6	15.6	16.6	18.6	20.7	17.6	17.6	15.6
Lesnictwo / Forestry/	Dyl	Dyl	Bed	Dyl	Dyl	Bed	Dyl	Bed	Dyl	Dyl	Bed	Bed	Bed	Bed	Dyl
Uroczysko / Range/	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl
Nr oddziału / No. of section/	124	123	63	127	119	81	124	59	100	109	90	86	90	100	100
Nachylenie terenu w stopniach / Inclination of area in grades/	-	3	5	5	10	5	5	20	5	10	15	20	20	20	25
Ekspozycja / Exposition/	-	NE	NW	SW	S	SW	SW	SW	SE	SW	N	S	SE	SE	SE
Zwarcie warstwy drzew / Density of tree layer/	a1 %	80	80	80	70	70	60	80	75	70	70	70	85	95	60
Zwarcie warstwy krzewów / Density of shrub layer/	a2 %	10	10	15	5	10	10	10	10	10	20	20	-	10	10
Pokrycie warstwy runa / Cover of herb layer/	b %	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Pokrycie warstwy mchów / Cover of moss layer/	c %	60	50	60	70	60	50	50	50	50	60	40	40	50	30
Powierzchnia zdjęcia / Surface of record/	m ²	300	400	300	250	300	300	250	300	400	250	300	300	300	300
Liczba gatunków / Number of species/	41	55	37	46	48	44	34	43	41	38	35	45	40	44	47
Variant / Variant/	typowy / typical/														
Wzrosty / moss-grown/	wzrosty / moss-grown/														
I Wzrosty / differential/	I Wzrosty / differential/														
Trientalis-Fagetum i / and/ Luzulo-Fagetum	Trientalis-Fagetum i / and/ Luzulo-Fagetum														
Vaccinium myrtillus	c	1.2	2.3	+2/	+2	+2	+2	+2	+3	2.2	2.3	1.2	1.2	1.2	+2
Lycopodium obscurum		+	1.1	+2	1.1	+	+1	+	+	+2	1.2	+	+2	1.2	+2
Trientalis europaea		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lycopodium selago		+2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Luzula nemoralis		1.2	1.2	1.2	1.2	2.2	1.2	1.2	1.2	2.2	1.2	2.2	1.2	1.2	2.2
Dicranella heteromalla	d	+2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	+2	1.2
Dicranum scoparium		+2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	+2	1.2
Hypnum cupressiforme		+2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	+2	1.2
Anthurus hornum		+2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	+2	1.2

132

[illegible]

krycia. Wiele z nich występuje natomiast w najwyższych stopniach stałości. Szereg roślin zielnych ma tu ograniczone możliwości swojego rozwoju. Wyraża się to zmniejszeniem ich żywotności oraz nieczęstym kwitnieniem i owocowaniem.

Materiał zdjęciowy zestawiony w tabeli 53 wskazuje, że kwaśna buczyna z terenu Wzgórz Dylewskich wykazuje duże podobieństwo składu florystycznego do tego samego typu zbiorowisk opisanych z innych terenów naszego kraju (Piotrowska 1955, 1966; Wojterski 1960; Tokarz 1961, 1976; Celiński 1962, 1965; Sokołowski 1965; Jutrzenka-Trzebiatowski 1968). Charakteryzuje się jedynie nieco bogatszym składem gatunkowym (101 taksonów) oraz częstszym występowaniem szeregu przedstawicieli klasy *Quercus-Fagetum*.

Za przynależnością niniejszych płatów do zespołu *Trientalis-Fagetum* przemawia obecność dość licznej grupy gatunków wyróżniających omawiany zespół i podzwiazek *Luzulo-Fagion*. Kilka z nich występuje stale lub często, stąd przeciętna stałość tej grupy równa się 57,03%, a jej systematyczna wartość wynosi 7,0 (tab. 54). Mankamentem tego zespołu jest to,

Tabela 54 — Table 54

Struktura systematyczna zespołu *Trientalis-Fagetum*
Systematic structure of *Trientalis-Fagetum*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) <i>Luzulo-Fagion</i>	9	77	12,24	57,03	7,00
Ch. <i>Quercus-Fagetum</i>	28	193	30,68	45,95	14,10
Ch. <i>Vaccinio-Piceetum</i>	24	142	22,58	39,44	8,90
Towarzyszące (Accompanying sp.)	40	217	34,50	36,17	12,48
Razem (Total)	101	629	100,00		

że nie posiada on dobrych gatunków charakterystycznych. Od pozostałych zespołów związku *Fagion* najlepiej wyróżnia go: *Lycopodium selago*, *Dicranella heteromalla*, *Trientalis europaea*, *Luzula nemorosa*, *Mnium hornum*, a nieraz także inne gatunki.

Na uwagę zasługuje ciągła obecność pewnej liczby przedstawicieli związku *Pino-Quercion* i klasy *Vaccinio-Piceetum*. Stosunkowo wysoka systematyczna wartość tej grupy w głównej mierze jest jednak wynikiem jej liczebności (24 gatunki). Przeciętna stałość, z jaką one występują, jest niewysoka. Nieco większe przywiązanie do kwaśnej buczyny wykazują gatunki klasy *Quercus-Fagetum*.

Dynamiczna równowaga między elementami Klasy *Quercus-Fagetum* i *Vaccinio-Piceetum* jest cechą charakterystyczną zespołu *Trientalis-Fagetum* i wskazuje na jego pośredni charakter. Oprócz braku dobrych gatunków

charakterystycznych, stanowi to główną trudność przy ustalaniu pozycji systematycznej tego zbiorowiska.

Niejednorodność warunków ekologicznych, w jakich rozwija się kwaśna buczyna, powoduje różnicowanie się składu florystycznego i stwarza podstawę do wyróżnienia w jej obrębie wariantu typowego oraz wariantu mszystego (zboczowego).

Fitocenozy wariantu typowego porastają płaskie wierzchołki wzniesień morenowych i zbocza o niedużym nachyleniu. W ich runie przeważają gatunki zielne (tab. 53), przy czym wiele z nich występuje stale lub często, lecz żaden nie tworzy większych skupień.

Fitocenozy wariantu mszystego zajmują kopulaste wierzchołki i strome zbocza. Jest to skrajnie ubogie zbiorowisko leśne wyróżniające się bardzo małym udziałem roślinności zielnej, dużą rolą mszaków oraz obecnością porostów naziemnych.

Fago-Quercetum petraeae R. Tüxen 1955

Kwaśna dąbrowa pomorska

Zespół *Fago-Quercetum* na większej powierzchni reprezentowany jest we wschodniej, wyżej położonej, części uroczyska Zajączki. Nieduże jego płaty spotkać można w kompleksie z lasami grądowymi także w uroczysku Dylewo. Tereny zajęte przez kwaśną dąbrowę są zazwyczaj lekko faliste. Wyjątkowo są to strome zbocza o ekspozycjach południowych.

W podłożu kwaśnej dąbrowy zalega gleba płowa właściwa wytworzona z piasków gliniastych na glinie zwałowej lekkiej (ryc. 33, tab. 55). Jej niski stopień uwilgotnienia, dobrze zaznaczający się podpoziom fermentacyjno-humifikacyjny, słabo wykształcony poziom próchniczny (8-9 cm), natomiast daleko zaawansowany proces płowienia, a także wyraźne zakwaszenie (tab. 56), nieduże ilości węgla, azotu oraz przyswajalnego fosforu i po-

Ryc. 33. Profil glebowy w zespole *Fago-Quercetum petraeae*
Fig. 33. Soil profile of the association *Fago-Quercetum petraeae*

(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

Tabela 55 — Table 55

Skład mechaniczny gleby w zespole *Fago-Quercetum petraeae*
 Mechanical composition of the soil in *Fago-Quercetum petraeae* association

Nr pro- filu No. of pro- file	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	Części szkie- letowe Skele- ton parts %	Części ziemiste % — Earth parts %						Gatunek gleby według klasyfikacji PTG Name of the soil variety according to the classification of PTG			
				Części piaszkowe Sand parts		Cz. pyłowe Dust parts		Cz. sypkawe Float parts					
				1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05- 0,02	0,02- 0,006		0,006- 0,002		
												Ø mm	
19	Napromek 136 181	A ₁	6-15	6,8	4,7	12,7	49,6	12	7	3	6	5	piasek gliniasty lekki
		A ₁ A ₃	15-30	7,0	5,0	14,2	39,8	13	12	8	5	3	piasek gliniasty mocny
		A ₃	30-51	6,0	5,0	19,7	38,3	7	19	6	3	2	piasek gliniasty lekki
		Btg	51-90	4,4	3,5	12,5	45,0	11	6	3	6	13	głina lekka silnie spiecz.
		C	90-150	3,6	4,0	13,5	35,5	13	7	10	2	17	głina lekka słabo spiecz.

Gleba płowa właściwa wytworzona z piasku gliniastego na glinie żwawej
 Typical pseudopodzolic soil formed from loamy sand on boulder clay

Tabela 56 — Table 56

Niektóre właściwości chemiczne gleby w zespole *Fago-Quercetum petraea*
Some chemical properties of soil in *Fago-Quercetum petraea* association

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			w in H ₂ O	w in KCl						
			%							
									metoda Egner acc. to Egner mg/100 g gleby mg/100 g o soil	

Gleba płowa właściwa wytworzona z piasku gliniastego na glinie zwalowej
Typical pseudopodzolic soil formed from loamy sand on boulder clay

19	Napromek 136 181	A ₁	6-15	5,0	4,0	2,362	1,370	0,0868	15,8	2,30	4,30
		A ₁ A ₃	15-30	5,0	4,2	1,376	0,798	0,0280	28,5	3,05	2,95
		A ₃	30-51	5,1	4,3	0,527	0,306	0,0224	13,2	1,20	2,35
		Btg	51-90	5,7	4,0	0,269	0,156	0,0140	11,1	4,30	7,20
		C	90-150	5,8	4,0	0,176	0,102	0,0168	6,0	5,25	6,25

tasu świadczą, że jest to gleba niezbyt żyzna i co najwyżej średnio urodzajna. Stosunek C/N waha się w jej górnych warstwach od 15,8 do 28,5.

Fago-Quercetum petraeae w swojej typowej postaci wykształca się jako wysokopienny czterowarstwowy las mieszany sosnowo-bukowy, podszyty zazwyczaj silnie rozwijającym się podrostem bukowym. W dwupoziomowym drzewostanie wyższą warstwę tworzy *Pinus silvestris* oraz starsze okazy *Fagus sylvatica*. Zasadniczą częścią drzewostanu jest warstwa niższa, w której przeważającym gatunkiem jest zawsze *Fagus sylvatica*. W niektórych płatach pojawia się w niej także *Quercus robur*, *Betula verrucosa*, *Picea excelsa* lub *Acer platanoides*.

Dominującą rolę i znaczny dynamizm *Fagus sylvatica* w zespole *Fago-Quercetum* dobrze ilustruje przedstawiony wykres struktury biologicznej drzewostanu (ryc. 34). Buk występuje we wszystkich klasach grubości, a najwięcej jego okazów ma średnicę 35-50 cm. Z krzywej wynika, że buk odnowił się naturalnie z pozostawionych w tym celu przestoj. Sosnę wprowadzono z pewnością sztucznie, gdyż zarówno warunki klimatyczne, jak i duża żywotność buka oraz innych gatunków liściastych, uniemożliwiają jej naturalne odnawianie.

Warstwa krzewów w postaci podrostu bukowego rozwija się bardzo intensywnie jedynie w miejscach prześwitów. Nadmierną gęstością przez pewien czas ogranicza nawet rozwój runa.

Dla w pełni rozwiniętego runa kwaśnej dąbrowy bardzo znamieny jest masowy udział *Vaccinium myrtillus* lub *Calamagrostis arundinacea*. Reszta gatunków osiąga dlatego zaledwie pierwszy lub drugi stopień stałości.

Umiarkowanie rozwija się także warstwa mszysta. Występują w niej wprawdzie 22 gatunki mchów, wątrobowców i porostów, lecz tylko 8 z nich pojawia się często i w dodatku nie tworzy większych skupień.

Skład florystyczny zespołu *Fago-Quercetum* jest stosunkowo bogaty, gdyż pełna lista florystyczna obejmuje 92 gatunki. Z tej liczby 70 taksonów to rośliny naczyniowe; resztę (22 gatunki) stanowią mszaki i porosty (tab. 57 i 58).

Znamienne dla omawianego zespołu jest to, że w zbliżonych ilościach są w nim reprezentowane neutrofilne gatunki klasy *Querco-Fagetea* oraz acidofilne gatunki rzędu *Quercetalia robori-petraeae* i klasy *Vaccinio-Piceetea*. Stosunek ich liczebności (29 : 25) nie odzwierciedla w sposób właściwy rzeczywistej roli wymienionych grup syngenetycznych. Faktyczne znaczenie gatunków borowych w tym zespole jest co najmniej dwukrotnie większe niż przedstawicieli klasy *Querco-Fagetea*. Potwierdzają to wysokie systematyczne wartości grupowe rzędu *Quercetalia robori-petraeae* i klasy *Vaccinio-Piceetea* (tab. 59). Wskazuje na to również stały i gromadny udział w runie *Vaccinium myrtillus* i *Calamagrostis arundinacea*, a także występowanie w IV i V stopniu stałości 12 dalszych gatunków borowych.

Elementy klasy *Querco-Fagetea* rzadko występują w większej liczbie, zaś 12 z nich pojawia się sporadycznie (I stopień stałości). W wyniku tego

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Nr zdjęcia /Number of record/	182	181	118	99	180	179	51	103	101	106	102	
Data /Date/	24.5 58	24.5 68	18.7 67	17.6 67	24.5 68	24.5 68	28.5 67	17.6 67	17.6 67	18.6 67	17.6 67	
Leśnictwo /Forestry/	Nap	Nap	Bed	Bed	Nap	Nap	Dyl	Dyl		Dyl	Dyl	
Uroczysko /Range/	Nap	Zaj	Dyl	Dyl	Zaj	Zaj	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	
Nr oddziału /No. of section/	138	136	58	88	138	139	125	97	97	98	97	
Nachylenie terenu w stopniach /Inclination of area in grades/	0-3	5	5	25	10	10	0-5	10	-	20	20	Stopień stałości
Ekspozycja /Exposition/	S	S	SW	W	SE	SE	S	SE	-	SW	SW	/Constancy/
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a ₁ %	80	75	60	60	80	80	70	60	60	60	70
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	a ₂ %	-	-	10	20	-	-	10	20	5	10	10
Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	b %	20	25	-	10	-	15	-	10	-	25	-
Pokrycie warstwy mchów /Cover of moss layer/	d %	5	15	15	10	25	15	25	25	20	20	25
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	m ²	200	300	300	300	300	300	250	250	250	300	
Liczba gatunków /Number of species/		37	45	49	40	47	41	45	39	38	41	35

Wariant /Variant/	typowy /typical/								z Leucobryum plavum				
I Ch. Quercetalia robori-petraeae													
Hieracium laichenalii	c	+	1.1	1.1	+2	+	+2	1.1	1.1	+2	1.1	1.1	V
Viola riviniana		1.1	1.1	+	+	1.1	1.1	+	1.1	1.1	+	+	V
Carex pilulifera		+2	1.2	+	+2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	+2	+2	V
Veronica officinalis		+2	+2	+2	+	+2	+2	+2	+2	+2	+	+2	V
Hieracium sabaudum		+	1.1	+	+	+	+	+	1.1	+	+	+	IV
Lathyrus montanus		+	+	+	+2	+	+	+2	+	+	+	+	III
Melampyrum pratense		+	+2	1.2	+	1.2	1.2	+	+	+	+	+	III
Holcus mollis		+	+	+	+2	+	+2	+	+	+2	+	+	II
Polypodium vulgare		+	+	+	+	+	+	+2	+	+	+	+	V
Polytrichum attenuatum	d	+2	1.2	1.2	1.2	2.3	1.3	2.3	2.2	2.2	1.3	1.2	V
Leucobryum glaucum		+	+	+	+	+	+	+	+	+2	1.2	1.2	II
II Vaccinio-Piceetea													
Pinus silvestris	a	+	+	2.1	+	+	+	1.1	+	+	+	+	IV
Picea excelsa	a	+	+	2.1	+	+	+	2.2	+	+	+	+	III
" "	b,c	1.1	+	1.1	1.2	+	+	1.1	+	+	1.1	+	
Sorbus aucuparia	b,c	+	1.1	1.1	1.1	+	+	1.1	1.1	1.1	+	1.1	V
Vaccinium myrtillus	c	4.5	4.5	3.4	3.4	4.5	4.5	3.3	3.4	2.4	1.2	1.2	V
Solidago virga-aurea		+	1.1	1.1	+	+	1.1	1.1	+	+	1.1	+	V
Lycopodium annotinum		+2	+2	+2	1.3	2.3	+2	+	+2	2.3	+2	+	V
Calamagrostis arundinacea		+	+	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	3.3	3.4	4.5	V
Trientalis europaea		+	1.1	+	+	1.1	+	+	1.1	+2	+	+	IV
Pirola secunda		+	+2	+	+	+2	+2	+2	+2	+	+	+	III
Lycopodium clavatum		+	+	+	+	+	+	+	+2	1.2	+2	+2	II
Vaccinium vitis-idaea		+	+	+2	+	+	+2	+	+	+2	+	+	II
Dicranum scoparium	d	+2	+2	+2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	1.2	+2	V
Entodon schreberi		+	+	1.2	+	+2	+	+2	1.2	+	+	+	II
Hylacomium splendens		+	+	+2	+2	+	+	+2	+2	+	+	+	II
Dicranum undulatum		+2	+	+2	+	+	+	1.2	+	+	+	+	II
III Ch. Quercus-Pagetea													
Fagus sylvatica	a ₁	4.5	4.5	2.2	3.2	4.5	4.5	3.2	3.3	3.3	3.2	4.5	V
" "	a ₂	+	+	1.1	2.2	+	+	1.1	2.2	+	1.2	1.1	
" "	b ₂	2.4	2.3	+	1.1	+	2.3	+	1.1	+	2.2	+	
" "	c	1.1	2.3	2.2	2.3	1.1	2.2	1.2	1.1	1.1	2.3	1.1	
Poa nemoralis	c	+2	+	+2	+2	1.2	+2	1.2	+2	1.2	+2	+2	V
Carex digitata		+2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	+2	+2	+	+2	V
Stellaria holostea		1.1	1.1	+2	+3	1.2	1.2	+2	1.2	+	+	+	V
Anemone nemorosa		+	1.2	1.1	+	1.2	1.2	1.2	+	+	+	+	IV
Moeshringia trinervia		+2	+2	+2	+	+2	+	+2	+2	+2	+	+	IV
Milium effusum		+	+2	+	+	2.2	+2	+2	+	+2	+	+	III
Epilobium montanum		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	III
Myosotis muralis		+/	1.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	III
Festuca silvatica		+	+	+	+2	+	+	+	+2	+2	1.2	+	II
Sorophularia nodosa		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
Melica nutans		+	+	+	+2	+2	+	+	+	+	+	+	II
Catharina undulata	d	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+	+2	+2	V

IV Gatunki towarzyszące /Accompanying species/													
<i>Quercus robur</i>	a	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	III
"	c	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	+	
<i>Frangula alnus</i>	c	+2	+2	+	.	.	.	.	.	.	.	.	III
<i>Majanthemum bifolium</i>	c	2.3	2.2	2.3	1.1	2.3	2.3	2.3	1.2	1.2	1.2	+2	V
<i>Luzula pilosa</i>		1.2	1.2	1.2	+2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	V
<i>Hieracium murorum</i>		+	1.1	+	.	.	1.1	1.1	+	.	.	+	V
<i>Oxalis acetosella</i>		+	1.2	2.2	1.2	1.2	1.2	1.2	+	+2	1.2	.	V
<i>Convallaria maialis</i>		.	1.3	.	+2	+2	+2	2.2	.	1.2	.	+2	IV
<i>Rubus idaeus</i>		.	.	1.1	+	.	.	.	.	.	1.1	.	II
<i>Phegopteris dryopteris</i>		.	.	.	.	1.2	2.3	.	+2	+2	.	.	II
<i>Dryopteris spinulosa</i>		+2	.	.	.	.	.	+2	.	+2	+2	.	II
<i>Chamaenerion angustifolium</i>		.	+	+	.	.	.	+	.	+	.	.	II
<i>Veronica chamaedrys</i>		+2	1.2	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	II
<i>Ajuga reptans</i>		+	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	II
<i>Carex pallescens</i>		.	.	.	+2	.	.	.	.	.	+2	+2	II
V Mohy towarzyszące /Accompanying mosses/													
<i>Hypnum cupressiforme</i>		+2	+2	1.2	1.2	+2	+2	+2	+2	+2	1.2	1.2	V
<i>Dicranella heteromalla</i>		.	+2	+2	+2	+2	.	1.2	1.2	+2	1.2	2.2	V
<i>Polytrichum juniperinum</i>		.	+2	+2	+2	.	+2	+2	1.2	1.2	1.2	+2	V
<i>Pohlia nutans</i>		+2	+2	.	.	+2	1.2	+2	+2	+2	1.2	1.2	V
<i>Plagiothecium denticulatum</i>		+2	+2	+2	+2	.	1.2	.	.	.	+2	1.2	IV
<i>Dicranum montanum</i>		+2	.	.	.	+2	.	+2	.	+2	+2	+2	III
<i>Cladonia digitata</i>		.	+2	.	.	+2	+2	.	.	+2	+2	1.2	III
<i>Plagiothecium laetum v. recurvum</i>		.	.	+2	+2	.	.	+2	+2	.	.	.	II
<i>Mnium rostratum</i>		.	.	+2	+2	.	.	+2	.	.	.	.	II
<i>Radula complanata</i>		.	.	.	.	+2	.	.	+2	.	+2	.	II
<i>Mnium punctatum</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	+2	+2	II
<i>Mnium hornum</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.2	I

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

- ad II *Pirola minor* /3,9/, *Pteridium aquilinum* /1/, *Bazzania trilobata* /11/.
- ad III *Carpinus betulus* /3/, *Tilia cordata* /2/, *Dactylis aischersoniana* /2,3/, *Carex pilosa* /1,5/, *Asperula odorata* /4,5/, *Galeobdolon luteum* /5,7/, *Phyteuma spicatum* /5,7/, *Dryopteris filix-mas* /4/, *Actaea spicata* /3/, *Carex silvatica* /9/, *Viola silvestris* /2/, *Campanula persicifolia* /7/.
- ad IV *Betula verrucosa* /5/, *Fragaria vesca* /3,4/, *Athyrium filix-femina* /2,5/, *Galeopsis pubescens* /3/, *Rubus bellardii* /3/, *Antho*

przeciętna stałość, jak i systematyczna wartość tej grupy, są stosunkowo niewysokie.

Wysoka wartość systematyczna gatunków towarzyszących w głównej mierze jest rezultatem stałej obecności niektórych mszaków. Z gatunków zielnych w najwyższym stopniu stałości występują tylko: *Majanthemum bifolium*, *Luzula pilosa*, *Hieracium murorum* i *Oxalis acetosella*. Często spotykano także *Convallaria maialis*.

Ryc. 34. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w zespole *Fago-Quercetum*
Fig. 34. Diagram of biological structure wood-layer in association *Fago-Quercetum*
1 — *Fagus silvatica*; 2 — *Quercus robur*; 3 — *Pinus silvestris*; 4 — *Betula verrucosa*

Tabela 58 — Table 58

Porównanie składu gatunkowego zespołu *Fago-Quercetum* z analogicznymi zbiorowiskami północnej Polski
 Comparison of specifical composition of *Fago-Quercetum* association with analogical communities of northern Poland

Jednostka systematyczna Systematic unit	Miejscowość Locality	Gatunki acidofilne ¹ Acidophile species		Gatunki neutrofilne ² Neutrophile species		Gatunki towarzyszące Accompanying species		Ogółem gatunków w zespole Total number of sp. in association		Rośliny naczyniowe Vascular plants	Mszaki i porosty Mosses and lungworts
		razem total	z IV, V stop. stał. With IV, V const. degree	razem total	z IV, V stop. stał. With IV, V const. degree	razem total	z IV, V stop. stał. With IV, V const. degree	z towarzyszającymi sporadycznie together with sporadically acc. sp.	bez towarzyszających sporadycznie without sporadically acc. sp.		
<i>Fago-Quercetum holcetosum mollis</i>	P. K. ³	27	8	34	1	47	7	108	84	101	7
<i>Fago-Quercetum</i>	P. B.	32	11	28	2	53	6	113	78	100	13
<i>Fago-Quercetum</i>	W. P. N.	28	4	24	1	49	3	101	71	71	30
<i>Fago-Quercetum</i>	S.	33	17	33	5	24	6	90	84	77	13
<i>Pino-Quercetum</i>	P. B.	27	10	27	4	52	12	106	78	93	13
<i>Fago-Quercetum</i>	W. D.	29	14	25	7	38	10	92	79	70	22
<i>Fago-Quercetum</i>	P. p-w.	29	14	25	2	19	1	73	61	67	6
<i>Pino-Quercetum fagetosum</i>	S.	29	10	13	2	14	5	56	52	49	7
<i>Pino-Quercetum fagetosum</i>	W. E.	16	10	16	1	14	5	42	38	39	3
<i>Pino-Quercetum</i> war. z <i>V. myrtillus</i>	W. P. N.	22	7	2	1	23	2	47	32	33	14

Objaśnienia — Explanations:

¹ Gatunki charakterystyczne klasy *Vaccinio-Piceetea* i rzędu *Quercetalia robori-petraeae* — Characteristic species of *Vaccinio-Piceetea* class and *Quercetalia robori-petraeae* order.

² Gatunki charakterystyczne klasy *Quercio-Fagetea* — Characteristic species of *Quercio-Fagetea* class.

³ P. K. — Pojezierze Krajeńskie, P. B. — Puszcza Bukowa, W. P. N. — Woliński Parka Narodowy, S. — nadleśnictwo, Sulęcyno, W. D. — Wzgórze Dylewskie, P. p-w. — Polska północno-wschodnia, W. E. — Wysoczyzna Elbląska.

Tabela 59 — Table 59

Struktura systematyczna zespołu *Fago-Quercetum petraeae*Systematic structure of *Fago-Quercetum petraeae*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) <i>Quercetalia robori-petraeae</i>	10	72	15,75	65,45	10,31
Ch. <i>Vaccinio-Piceetea</i>	19	109	23,85	52,15	12,44
Ch. <i>Quercio-Fagetea</i>	25	105	22,98	38,18	8,77
Towarzyszące (Accompanying sp.)	38	171	37,42	40,90	15,30
Razem (Total)	92	457	100,00		

Uwarunkowane różną topografią zróżnicowanie składu florystycznego upoważnia do wyróżnienia w obrębie zespołu *Fago-Quercetum*:

a. wariantu typowego — typowej postaci tego zespołu na badanym terenie, porastającej tereny faliste.

b. wariantu z *Leucobryum glaucum* — porastającego zbocza, w którym większą rolę odgrywają mszaki i *Calamagrostis arundinacea*, a straciły na znaczeniu neutrofilne elementy klasy *Quercio-Fagetea*.

Pokreślone różnice, na tle całości stosunków florystycznych tego zespołu, nie są zbyt istotne. W sumie jest to asocjacja dość jednorodna, dobrze uwarunkowana edaficznie i dlatego trwała.

Fago-Quercetum z Wzgórz Dylewskich jest najbardziej zbliżone do kwaśnych dąbrów z Pojezierza Iławskiego (Tokarz 1976) i z Puszczy Bukowej koło Szczecina (Celiński 1965). Kwaśne dąbrowy określone jako *Pino-Quercetum fagetosum* z okolic Sulęcyna na Pojezierzu Kaszubskim (Jutrzenka-Trzebiatowski 1968) i z Wysoczyzny Elbląskiej (Tokarz 1961) są w stosunku do opisywanego zespołu nieco uboższe i bardziej borowe. Przedstawiają one kolejne ogniwa w ciągu sukcesyjnym do środkowopolskich borów mieszanych. Jednym z dalszych etapów w tym kierunku zmian jest *Pino-Quercetum* w wariantcie z *Vaccinium myrtillus* z Wolińskiego Parku Narodowego (tab. 58).

Najbardziej typowe postacie *Fago-Quercetum* opisano dotychczas w Puszczy Bukowej koło Szczecina, w Wolińskim Parku Narodowym oraz koło Sulęcyna na Pojezierzu Kaszubskim.

Boiński (1973) w swoim opracowaniu lasów liściastych z Pojezierza Krajeńskiego doniósł o występowaniu kwaśnej dąbrowy bardzo zbliżonej do opisanej przez Celińskiego z Puszczy Bukowej, lecz reprezentującej inny kierunek rozwojowy. *Fago-Quercetum holcetosum mollis* z Krai-ny jest formą pośrednią między *Fago-Quercetum typicum* (Piotrowska, Żukowski 1967) oraz lasami grądowymi i świetlistą dąbrówą. Do *Pino-Quercetum* nawiązuje w mniejszym stopniu.

Z powyższej analizy wynika, że kwaśna dąbrowa pomorska jest zbiorowiskiem niejednorodnym, zróżnicowanym wyraźnie na trzy typy uwarunkowane florystycznie i ekologicznie.

Jednym z nich jest *Fago-Quercetum holcetosum mollis*. Następny — to kwaśne dąbrowy, które, za Piotrowską i Żukowskim, należy uważać za formę typową — *Fago-Quercetum typicum* (tab. 58, pozycje 2-4). Trzecią grupę (pozycje 5-10) tworzą wszystkie postacie pośrednie do śród-kowopolskich borów mieszanych, wyróżniające się większą przewagą gatunków borowych, a szczególnie dominacją w runie *Vaccinium myrtillus* lub *Calamagrostis arundinacea*. Od formy typowej różnią się one dostatecznie, by je wyróżnić jako oddzielny podzespół pod nazwą *Fago-Quercetum vaccinietosum myrtillis*.

Sphagno girgensohni-Piceetum Polakowski 1962

Swierczyna na torfie

Swierczyna na torfie rozwija się na badanym terenie rzadko i bardzo fragmentarycznie. Zajmuje nieduże powierzchnie w bezodpływowych zagłębieniach w uroczyskach Durąg I i Dylewo. Jej podłożem jest gleba torfowa o miąższości 60-100 cm, zalegająca na piaskach gliniastych.

Stosunki florystyczne tego zbiorowiska ilustruje zdjęcie 336, wykonane 23. 8. 1973 r. w oddziale 13 uroczyska Durąg I.

Drzewa: *Picea excelsa* — a_1 -3,3, a_2 -2,2, b, c-2,2; *Betula pubescens* — a_2 -2,1;

Krzewy: *Sorbus aucuparia* — b,c-1,2; *Frangula alnus* — b,c-2,2; *Sambucus racemosa* — b—+; *Sambucus nigra* — b—+2;

Gatunki charakterystyczne zespołu i związku *Vaccinio-Piceion*: *Sphagnum girgensohni* +,2, *Stellaria longifolia* +,2, *Bazzania trilobata* 1,2;

Gatunki charakterystyczne rzędu i klasy *Vaccinio-Piceetea*: *Vaccinium myrtillus* 1,2, *Lycopodium annotinum* 1,3, *Dryopteris austriaca* +,2, *Trientalis europaea* 1,1, *Entodon schreberi* 1,2, *Hylocomium splendens* 1,2, *Dicranum scoparium* +,2, *Plagiochila asplenioides* +,2;

Gatunki charakterystyczne klasy *Querco-Fagetea*: *Stellaria holostea* 1,2, *Festuca gigantea* +,2, *Mycelis muralis* +, *Catharinea undulata* 1,2,

Gatunki towarzyszące: *Dryopteris spinulosa* 2,2, *Molinia coerulea* 1,2, *Oxalis acetosella* 2,2, *Majanthemum bifolium* 2,2, *Carex canescens* 1,2, *C. fusca* +,2, *Lysimachia vulgaris* 1,1, *Rubus saxatilis* 1,2, *Viola palustris* 1,2, *Galium palustre* 1,2, *Rubus* sp. +, *Angelica silvestris* +, *Heracleum sibiricum* +, *Urtica dioica* 1,2, *Athyrium filix-femina* 1,2, *Cirsium oleraceum* +,2, *Cirsium palustre* +, *Peucedanum palustre* 1,1, *Chamaenerion angustifolium* 1,1,

Mchy: *Polytrichum commune* 2,2, *Sphagnum apiculatum* 2,3, *Sphagnum palustre* 1,3, *Mnium hornum* 1,2, *Mnium punctatum* +,2, *Mnium affine* 2,2, *Pohlia nutans* 1,2.

Zespół *Quercus-Piceetum* zajmuje dna głębokich parowów w uroczyskach Dylewo i Wygoda.

Jego podłożem są zazwyczaj gleby gruntowoglejowe właściwe (ryc. 35), a nieraz szarobrunatne, lecz zawsze wytworzone z gliny lekkiej warstwowanej piaskami gliniastymi (tab. 60). Poziom wody gruntowej zmienia się w ciągu okresu wegetacyjnego. Przez dłuższy czas utrzymuje się jednak na głębokości 40-70 cm, stąd gleby te są w powierzchniowych warstwach zawsze wilgotne, a głębiej podtapiane i dlatego wyraźnie gruntowo oglejone.

Nr 11

Ryc. 35. Profil glebowy w zespole *Quercus-Piceetum*
Fig. 35. Soil profile of the association *Quercus-Piceetum*
(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

W ich składzie chemicznym zwraca uwagę mała zawartość potasu, dość duża ilość fosforu w głębszych poziomach profilu oraz silne powierzchniowe zakwaszenie (tab. 61). Procesy humifikacji zachodzą pomimo tego sprawnie. Świadczy o tym znaczna ilość azotu w poziomie A_1 oraz korzystnie kształtujący się w warstwach górnych stosunek C/N.

Wilgotny świerkowy bór mieszany z terenu Wzgórz Dylewskich jest zbiorowiskiem zazwyczaj sześciowarstwowym. Dwie najwyższe warstwy tworzy drzewostan, trzecią — stanowi dobrze na ogół rozwinięte podszycie, a w następnych układają się kolejno: wysokie byliny, paprocie i trawy, niższe gatunki zielne oraz mszaki.

Głównym składnikiem drzewostanu jest świerk. Jako z natury wysokopienny, przewyższa pozostałe gatunki drzewiaste i dominuje w warstwie najwyższej. W niektórych płatach w wyższej warstwie drzewostanu występuje ponadto *Quercus robur* lub *Fagus silvatica*. Wymienione gatunki drzewiaste, uzupełniane niekiedy przez *Betula verrucosa*, *Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus* lub *Carpinus betulus*, budują także niższą warstwę drzewostanu oraz podszycie. W podszyciu najliczniej występuje *Fagus silvatica* i *Sorbus aucuparia*.

Skład mechaniczny gleby w zespole *Querco-Piceetum*

Mechanical composition of the soil in *Quercus-Piceetum* association

Deluwialna gleba gruntowoglejowa
Deluvial gley soil

10 — Monographiae Botanicae, vol. LVIII

Tabela 61 — Table 61

Niektóre właściwości chemiczne gleby w zespole *Quercus-Piceetum*
Some chemical properties of soil in *Quercus-Piceetum* association

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O
			w in	w in KCl					
								metoda Egner acc. to Egner mg/100 g gleby mg/100 g of soil	

Deluwialna gleba gruntowoglejowa
Deluvial gley soil

11	Dylewo	A ₁	5-25	4,3	3,7	7,820	4,536	0,3444	13,1	1,80	3,90
	118	CGor	25-70	5,8	4,6	0,704	0,414	0,0336	12,3	14,10	2,35
	254	D ₁ Gr	70-105	5,8	4,6	0,434	0,252	0,0140	18,0	17,70	3,30
		D ₂ Gr	105-160	5,7	4,5	0,672	0,390	0,0112	34,8	20,30	1,40

Ryc. 36. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w zespole *Quercum-Piceetum*
 Fig. 36. Diagram of biological structure wood-layer in *Quercus-Piceetum* association
 1 — *Picea excelsa*; 2 — *Quercus robur*; 3 — *Fagus silvatica*

Fot. Cz. Hołdyński

Fot. 6. Naturalne odnawianie się świerka (*Picea excelsa*) w północnopolskim borze mieszanym wilgotnym (*Quercus-Piceetum*)
 Phot. 6. Natural renovation of spruce (*Picea excelsa*) in *Quercus-Piceetum* association

Strukturę biologiczną drzewostanu dobrze ilustruje rycina 36. Interesująco przedstawia się w niej zwłaszcza przebieg krzywej świerka. Jego okazy występują w dość szerokim zakresie klas grubości, z czego można wnioskować, że omawiany drzewostan odnowił się naturalnie z samosiewu.

Nr kolejny /Successive number/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Nr zdjęcia /Number of record/	252	256	253	254	5	238	255	265	259	266		
Data /Date/	22.6 68	22.6 68	22.6 68	22.6 68	22.5 64	21.6 68	22.6 68	30.8 68	29.8 68	30.8 68		
Leśnictwo /Forestry/	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Bed	Dyl	Dyl	Dyl	Klon	Dyl		
Uroczysko /Range/	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Wyg	Dyl		
Nr oddziału /No. of section/	122	108	118	118	88	122	118	100	170	100		
Nachylenie terenu w stopniach /Inclination of area in grades/	2	-	2	-	2	2	-	5	5	5		
Ekspozycja /Exposition/	NE	-	NE	-	SE	NE	-	SE	SE	NE	Stopień stałości IConstancyI	
Zwarcie warstwy drzew /Density of tree layer/	a ₁ % 70	60	70	70	75	70	70	70	80	70		
Zwarcie warstwy krzewów /Density of shrub layer/	a ₂ % 5	20	10	10	5	-	-	5	5	10		
Pokrycie warstwy runa /Cover of herb layer/	b % 10	10	20	20	5	30	30	30	20	30		
Pokrycie warstwy mchów /Cover of moss layer/	c % 90	85	75	90	80	85	80	80	75	75		
Powierzchnia zdjęcia /Surface of record/	d % 40	30	45	20	40	40	35	45	50	40		
Liczba gatunków /Number of species/	m ² 300	300	350	350	200	300	300	250	400	250		
	62	62	57	65	69	59	61	61	58	55		
<hr/>												
Wariant /Variant/	z /with/ Festuca silvatica											
<hr/>												
I Ch. i wyróż./Ch. and diff./ Querco-Piceetum												
Lycopodium annotinum	c	1.2	+2	2.3	1.3	1.3	2.3	2.4	1.3	+2	1.3	V
Plagioclila asplenoides	d	1.2	+2	1.2	+2	1.2	1.2	1.2	.	.	+2	IV
Bazzania trilobata		+2	1.2	1.2	.	1.2	+2	.	.	+2	+2	IV
Sphagnum girgensohnii		.	.	.	+2	+2	.	.	.	.	.	I
II Ch. Pino-Quercon												
Veronica officinalis	c	+2	+2	+2	+2	1.2	+2	+2	+2	1.2	.	V
Viola riviniana		+2	+	+	1.1	+	.	+	1.1	1.1	+	V
Hieracium lachenalii		+	.	+	.	1.1	.	+2	+	.	1.1	IV
Hieracium sabaudum		.	.	+	.	.	.	.	+2	+2	.	II
Hieracium laevigatum		.	.	.	.	.	+	.	.	.	+2	I
Polytrichum attenuatum	d	2.3	1.2	2.3	1.2	1.3	1.3	2.2	1.2	1.2	1.2	V
III Ch. Vaccinio-Piceetalia i /and/ Vaccinio-Piceetia												
Picea excelsa	a ₁	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	V
" "	a ₂	.	1.1	.	.	+	.	.	.	.	.	
" "	b	1.1	1.1	2.3	+	2.3	1.2	2.3	2.3	1.1	1.2	
Sorbus aucuparia	b, c	+	1.1	+	+	.	1.1	1.1	1.1	2.2	+	V
Vaccinium myrtillus	c	1.2	2.3	1.2	+2	2.3	1.2	2.3	1.3	2.3	2.3	V
Dryopteris austriaca		+2	1.2	+2	2.2	1.2	1.2	1.2	1.2	+2	1.2	V
Carex pilulifera		+2	+2	1.2	+2	+2	+2	+2	1.2	1.2	+2	V
Solidago virga-aurea		+	1.1	+	+	1.1	1.1	1.1	+	.	+2	V
Vaccinium vitis-idaea		+3	.	.	.	+2	+2	+	.	.	+2	II
Trientalis europaea		.	+2	.	.	+2	+2	+	.	.	.	II
Calamagrostis arundinacea		.	.	+2	.	.	+2	.	+2	.	.	II
Pteridium aquilinum		.	.	.	+2	+3	.	.	.	.	.	I
Lycopodium clavatum		.	.	.	.	.	.	.	+3	.	+2	I
Pirola secunda		.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I
Melampyrum pratense		.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Entodon schreberi	d	1.2	+2	1.2	+2	2.3	2.3	1.2	1.3	2.3	2.3	V
Dicranum scoparium		+2	+2	.	+2	+2	1.2	1.2	+2	1.2	1.2	V
Hylacomium splendens		+2	1.2	.	+2	+2	+2	.	.	+2	.	III
Dicranum undulatum		+2	.	+2	.	.	+2	1.2	.	+2	.	III
Ptilium crista-castrensis		.	.	+2	+2	+2	.	1.2	.	.	+2	III
IV Ch. Fagetalia silvaticae i /and/ Querco-Fagetea												
Fagus silvatica	a ₁	.	+	.	.	.	.	.	1.1	.	.	V
" "	a ₂	1.1	1.1	2.3	2.2	+	2.3	3.3	3.3	+	2.1	
" "	c	.	1.1	.	.	+	.	.	.	.	2.3	
Acer pseudoplatanus	a	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	IV
" "	b	.	.	1.1	.	.	.	.	.	1.1	.	
" "	c	1.1	.	1.1	+	+	1.1	+	.	1.1	.	
Acer platanoides	a, b	.	+	1.1	.	.	+	+	.	+	+	III
" "	c	.	+	.	.	.	+	.	.	+	+	

Pomimo że świerk występuje tam już poza naturalnym swoim zasięgiem, powyższe przypuszczenie jest bardzo prawdopodobne, gdyż tamtejsze warunki siedliskowe, wilgotnego boru świerkowego sprzyjają rozwojowi świerka, zarówno w jego początkowym okresie życia, jak i w fazie dojrzałości. Wskazuje na to: obfite odnawianie się świerka w miejscach prześwitów, (fot. 6) regularne „owocowanie”, duża odporność na inwazję kornika, a także obliczony według Czura (1963) przeciętny przyrost roczny średnicy świerka. W *Quercus-Piceetum* jest on wyraźnie większy niż w świeżych borach świerkowych (*Sambucus racemosa-Piceetum*) na badanym terenie (tab. 66).

Runo i warstwa mszysta rozwijają się bujnie i dlatego w całości pokrywają powierzchnię gleby. O wyglądzie runa przeważnie decydują łany *Festuca silvatica*, uzupełniane licznie przez paprocie i *Rubus idaeus*.

Pełna lista florystyczna zespołu *Quercus-Piceetum* obejmuje 118 gatunków, a w poszczególnych zdjęciach notowano ich średnio około 61. Skład gatunkowy tego zbiorowiska przedstawia tabela 62, zaś jego strukturę systematyczną obrazują liczby zestawione w tabeli 63.

Za przynależnością tej jednostki do związku *Pino-Quercion* przemawia wysoka wartość systematyczna jego przedstawicieli i gatunków charakterystycznych dla zespołu.

Z gatunków uznanych przez Matuszkiewicza i Polakowską (1955) za charakterystyczne dla *Quercus-Piceetum*, największą wartość posiada *Plagiochila asplenoides*, gdyż jest częstym składnikiem tego zespołu i zdradza wysokie przywiązanie do niego. Stale i licznie występuje *Lycopodium annotinum*, a często — *Bazzania trilobata*; ich wartość wyróżniająca jest jednak nieco mniejsza, ponieważ notowano je także w innych zbiorowiskach. Sporadyczne pojawianie się *Sphagnum girgensohni* wskazuje na powiązania genetyczne omawianej jednostki z rozwijającym się na podłożu torfowym *Sphagnum girgensohni-Piceetum*.

Z przedstawicieli związku *Pino-Quercion* z największą stałością występują: *Veronica officinalis*, *Viola riviniana*, *Polytrichum attenuatum* i *Hieracium lachenalii*. *Hieracium sabaudum* i *H. laevigatum* spotykano rzadziej.

Klasę *Vaccinio-Piceetea* reprezentuje 18 gatunków. Z nich: *Picea excelsa* buduje drzewostan, *Sorbus aucuparia* stale występuje w podszyciu, a w runie i w warstwie mszystej 6 gatunków osiąga najwyższe stopnie stałości. Przeciętna stałość elementów borowych i ich systematyczna wartość grupowa jest z tego powodu stosunkowo wysoka.

Z klasy *Quercus-Fagetea* odnotowano 35 gatunków. Jedenaście z nich występuje w IV i V stopniu stałości (tab. 69), a *Festuca silvatica* pojawia się w dodatku masowo i decyduje o wyglądzie runa. Większość mezofilnych gatunków lasów liściastych należy jednak do rzadkości i dlatego przeciętna ich stałość jest niewysoka, a systematyczna wartość grupowa prawie taka, jak elementów borowych. Pojawianie się niektórych gatun-

Tabela 63 — Table 63

Struktura systematyczna zespołu *Querco-Piceetum*Systematic structure of *Querco-Piceetum*

Grupa gatunków — Group of species	z	g	G %	S	D
Ch. zespołu (association) i (and) <i>Pino-Quercion</i>	10	67	11,02	67,00	7,38
Ch. <i>Vaccinio-Piceetea</i>	18	110	18,09	61,11	11,05
Ch. <i>Querco-Fagetea</i>	35	154	25,33	44,00	11,14
Towarzyszące (Accompanying sp.)	55	277	45,56	50,37	22,95
Razem (Total)	118	608	100,00		

ków ze związku *Alno-Padion* związanych z siedliskiem eutroficznym bliżej określa stosunki edaficzne tego zespołu.

Znaczną rolę w wilgotnym borze świerkowym odgrywają gatunki towarzyszące. Dzięki temu, że wiele z nich (15 gatunków) występuje stale lub bardzo często i że razem z mszakami stanowią one około 50% składu gatunkowego, ich udział zbiorowy (G) wynosi aż 45,56%.

Pod względem florystycznym i siedliskowym zespół *Querco-Piceetum* jest na badanym terenie dobrze scharakteryzowany i dlatego jego pozycja systematyczna jest jasna. Nie można go jednak całkowicie utożsamiać z wilgotnymi borami świerkowymi, znanymi z literatury (Matuszkiewicz 1952; Matuszkiewicz; Polakowska 1955; Polakowski 1961, 1962; Tokarz 1961; Sokołowski 1963, 1965 i inne), gdyż wyróżnia się występowaniem w runie *Dryopteris austriaca*, *Rubus bellardii* i *Circaea alpina* oraz pojawianiem się w podszyciu *Sambucus racemosa*. Większy niż na ogół jest także udział przedstawicieli klasy *Querco-Fagetea*. Charakterystyczne jest zwłaszcza występowanie w drzewostanie i podszyciu *Fagus silvatica* oraz masowe pojawianie się w runie *Festuca silvatica*. Współczynnik pokrycia tej trawy wynosi 2825. Z gatunków towarzyszących na uwagę zasługuje *Viola palustris*.

Indywidualne cechy dylewskich wilgotnych borów świerkowych wynikają głównie z bliskiego kontaktu z buczyną pomorską i ze świeżymi borami świerkowymi. W celu ich podkreślenia opisanej jednostce nadano rangę wariantu z *Festuca silvatica*.

Sambuco racemosi-Piceetum ass. nova

Północnopolski bór mieszany świeży

Świerkowy bór mieszany świeży na terenie Wzgórz Dylewskich jest zbiorowiskiem pospolitym i niejednorodnym, gdyż rozwija się we wszystkich większych kompleksach leśnych i zajmuje siedliska kształtujące się w różnych warunkach topograficznych. Jego podłoże zawsze tworzą jed-

nak gleby o luźnym składzie mechanicznym wytworzone przeważnie z piasków gliniastych, a niekiedy nawet z piasków luźnych.

Szerokie rozprzestrzenienie zespołu *Sambuco racemosi-Piceetum* jest powodem jego kontaktu z różnymi zbiorowiskami. Ten czynnik jest drugim istotnym momentem warunkującym zmienność omawianego zespołu. Na terenie Wzgórz Dylewskich jego fitocenozy najczęściej sąsiadują z różnymi postaciami lasów grądowych i buczyny pomorskiej, rzadziej natomiast — z kwaśną buczyną lub kwaśną dąbrową.

Powyższe czynniki znajdują swoje odbicie w składzie florystycznym badanych płatów, gdyż różnicują je na trzy dość odmienne grupy (tab. 67). Upoważnia to do wyróżnienia w obrębie zespołu *Sambuco racemosi-Piceetum* następujących jednostek niższych:

- a. wariantu z *Phegopteris polypodioides*,
- b. wariantu typowego,
- c. wariantu z *Deschampsia flexuosa*.

W celu przedstawienia pełnego i wyrazistego obrazu tego zbiorowiska najpierw opisano jego fizjonomię, strukturę drzewostanu i skład florystyczny w odniesieniu do całości; natomiast szczegółową analizę warunków siedliskowych i charakterystykę składu gatunkowego poszczególnych wariantów podano łącznie w dalszej części tego podrozdziału.

Świerkowy bór mieszany świeży ma strukturę podobną, jak zespół *Quercus-Piceetum*. W nim także dwie najwyższe warstwy tworzy drzewostan, trzecią stanowi dobrze rozwijające się podszycie, zaś w trójwarstwowym runie najwyżej układają się trawy i inne wysokie byliny, środkową warstwę tworzą mniejsze gatunki zielne, a najniższą — mszaki (fot. 7).

Wyższą warstwę drzewostanu tworzy głównie świerk. W niektórych płatach występuje w niej także *Pinus silvestris*, *Fagus sylvatica* lub *Quercus robur*, a w wariantie typowym — wprowadzona sztucznie — *Abies alba*. Wymienione gatunki liściaste, uzupełniane nieraz przez *Betula verrucosa*, *Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus* lub *Carpinus betulus*, budują z zasady niższą warstwę drzewostanu (fot. 7).

Strukturę biologiczną drzewostanu w zespole *Sambuco racemosi-Piceetum* ilustrują ryciny 37 i 38. Krzywa liczebności świerka przebiega w nich podobnie. Choć w runie świerk jest przeważnie licznie reprezentowany, często brakuje go w klasach od 5 do 15 cm, a drzewostan jest zbliżony wiekiem.

Zwężenie amplitudy klas grubości oraz zaznaczający się niekiedy brak warunków do naturalnego odnawiania pozwala przypuszczać, że drzewostany omawianego zespołu są przeważnie sadzone. Słabe na ogół odnawianie się świerka wynika częściowo z położenia Wzgórz Dylewskich już poza zwartym zasięgiem jego naturalnego występowania, a w pewnym zakresie jest także rezultatem niezgodności podłoża z wymaganiami siedliskowymi tego gatunku. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych badań glebowych (tab. 64 i 65), a także obliczony według Cz u r a j a (1963) roczny

Fot. R. Jaromiński

Fot. 7. Fragment północnopolskiego boru mieszanego świeżego (*Sambuco racemosi-Piceetum*) w oddziale 54 uroczyska Dylewo

Phot. 7. Fragment of *Sambuco racemosi-Piceetum* association in 54th forest section of Dylewo range

przeciętny przyrost średnicy świerka (tab. 66). W zespole *Sambuco racemosi-Piceetum* jest on zawsze mniejszy niż w zespole *Quercus-Piceetum*, a w najsuchszym wariancie z *Deschampsia flexuosa* różnica jest znaczna.

Podszycie jest na ogół dobrze rozwinięte. W całym zespole występuje w nim *Sambucus racemosa*, *Sorbus aucuparia*, *Quercus robur* i *Acer platanoides*. W wariancie z *Phegopteris polypodioides* częściej spotykano *Frangula alnus* i *Carpinus betulus*, a w typowym — dodatkowo *Picea excelsa* i *Fagus silvatica*.

Świeże bory mieszane z drzewostanem świerkowym wyróżniają się wieloma cechami indywidualnymi. Odrębność ich wyraża się nie tylko obecnością własnych gatunków charakterystycznych, znacznym bogactwem składu florystycznego i jego zmiennością, lecz i zajmowanym podłożem.

Ryc. 37. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w zespole *Sambuco racemosi-Piceetum*

Fig. 37. Diagram of biological structure wood-layer in association *Sambuco racemosi-Piceetum*

1 — *Picea excelsa*; 2 — *Fagus sylvatica*

Ryc. 38. Wykres struktury biologicznej drzewostanu w zespole *Sambuco racemosi-Piceetum*

Fig. 38. Diagram of biological structure wood-layer in association *Sambuco racemosi-Piceetum*

1 — *Picea excelsa*; 2 — *Pinus silvestris*; 3 — *Quercus robur*

Skład mechaniczny gleb w zespole *Sambuco racemosi-Piceetum*
Mechanical composition of the soils in *Sambuco racemosi-Piceetum* association

Nr pro- filu No. of pro- file	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	Części szkie- letowe Skele- ton parts %	Części ziemiste % — Earth parts %					Gatunek gleby według klasyfikacji PTG Name of the soil variety according to the classification of PTG				
				Części piaszkowe Sand parts		Cz. pyłowe Dust parts		Cz. spławialne Float parts					
				1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0 1-0,05 0,02 0,06 0,002						
				Ø mm									
Gleba brunatna kwaśna wytworzona z piasku luźnego Acid brown soil formed from loose sand													
15	Bednarki 88 247	A ₁	6-25	44,0	23,5	7,5	3	5	3	9	piasek gliniasty mocny		
		(B)	25-77	53,9	36,9	2,2	1	1	2	3	0	piasek luźny	
		CGor	77-130	10,1	26,5	39,4	9	11	2	2	0	piasek luźny	
		CGor	130-160	9,7	26,9	41,4	4	13	4	1	0	piasek luźny	
Gleba brunatna wylugowana wytworzona z piasków gliniastych przewarstwionych utworem pylowym Brown leached soil formed from loamy sands with a stratum of silt loam													
22	Bednarki 60 227	A ₁	3-15	3,8	11,5	46,8	19	7	5	2	4	piasek gliniasty lekki	
		(B)	15-70	4,0	5,2	34,6	8	22	12	2	1	piasek gliniasty lekki	
		A ₃ (B)	70-95	5,6	5,0	14,7	37,3	10	32	0	1	0	utwór pylowy zwykły
		Bt(B)g	95-121	5,8	5,5	13,0	35,5	18	11	8	6	3	piasek gliniasty mocny
		C	121-160	6,4	6,0	12,5	35,5	10	28	6	2	0	piasek słabo gliniasty
Gleba brunatna wylugowana wytworzona z piasków gliniastych przewarstwionych gliną lekką Brown leached soil formed from loamy sands with a stratum of sandy loam													
6	Klonowo 195 234	A ₁	5-15	7,8	9,2	10,0	40,8	19	10	9	3	4	piasek gliniasty mocny
		(B)	15-50	8,2	5,7	13,9	26,4	13	22	10	5	4	piasek gliniasty mocny
		A ₃ (B)	50-75	5,8	4,2	10,0	25,8	16	21	12	8	3	głina lekka spiaszczona
		Bt(B)g	75-116	6,4	5,0	13,7	40,3	14	7	7	3	10	piasek gliniasty mocny
		C	116-150	2,4	3,5	17,5	53,0	15	2	3	6	0	piasek słabo gliniasty

Tabela 65 — Table 65

Niektóre właściwości chemiczne gleb w zespole *Sambuco racemosi-Piceetum*
Some chemical properties of soils in *Sambuco racemosi-Piceetum* association

Nr profilu No. of profile	Leśnictwo, oddział, nr zdjęcia Forestry, section, No. of record	Poziom i głębokość Horizon and depth cm	pH gleby pH of soil		Próchnica Humus	C	N ogólny Total N	C/N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
			w in H ₂ O	w in KCl							
			%								
Gleba brunatna kwaśna wytworzona z piasku luźnego Acid brown soil formed from loose sand											
15	Bednarki 88 247	A ₁	6-25	4,0	3,5	9,723	5,640	0,1344	41,9	5,00	1,00
		(B)	25-77	5,2	4,4	1,955	1,134	0,0196	57,8	7,50	0,10
		CGor	77-130	6,2	5,0	0,248	0,144	0,0084	17,1	3,05	0,40
		CGor	130-160	7,5	7,0	0,329	0,186	0,0028	66,4	9,10	1,60
Gleba brunatna wylugowana wytworzona z piasków gliniastych przewarstwionych utworem pyłowym Brown leached soil formed from loamy sands with a stratum of silt loam											
22	Bednarki 60 227	A ₁	3-15	4,6	3,7	3,448	2,000	0,1232	16,2	1,40	3,90
		(B)	15-70	5,1	4,2	0,776	0,450	0,0280	16,1	1,30	4,65
		A ₃ (B)	70-95	5,3	4,3	0,817	0,474	0,0224	21,1	3,30	3,30
		Bt(B)g	95-121	5,8	4,5	0,835	0,480	0,0168	28,5	13,05	3,50
		C	121-160	6,2	4,6	0,621	0,360	0,0140	25,7	8,70	2,75
Gleba brunatna wylugowana wytworzona z piasków gliniastych przewarstwionych gliną lekką Brown leached soil formed from loamy sands with a stratum of sandy loam											
6	Klonowo 195 234	A ₁	5-15	3,8	3,0	14,661	8,040	0,3024	26,6	9,10	7,20
		(B)	15-50	4,7	4,2	1,608	0,882	0,0364	24,2	7,80	2,95
		A ₃ (B)	50-75	5,1	4,1	0,455	0,264	0,0140	18,8	6,00	3,50
		Bt(B)g	75-116	5,1	4,0	0,549	0,318	0,0140	22,7	4,30	7,55
		C	116-150	5,3	4,1	0,385	0,222	0,0028	79,3	5,00	4,85

Tabela 66 — Table 66

Przeciętny przyrost roczny średnicy świerka w zespołach borów świerkowych na terenie Wzgórz Dylewskich

Average annual increment of spruce diameter in Wzgórze Dylewskie region

Jednostka systematyczna Systematic unit	Wiek w latach Age in years	Liczba mierzonych okazów Number of measured specimens	Przeciętna średnica Average diameter cm	Przeciętny przyrost roczny średnicy Average annual increment of diameter cm
<i>Quercus-Piceetum</i>	75	64	50,8	0,68
<i>Sambuco racemosi-Piceetum</i>				
wariant typowy (typical variant)	65	96	32,1	0,49
wariant z (variant with)				
<i>Festuca silvatica</i>	71	107	31,2	0,44
wariant z (variant with)				
<i>Deschampsia flexuosa</i>	65	107	25,6	0,39

Lista florystyczna omawianego zespołu obejmuje 147 gatunków. W poszczególnych wariantach ich liczba jest niższa, gdyż wynosi 103-128 gatunków. Średnio w zdjęciu notowano ich natomiast: w wariacie z *Phegopteris polypodioides* — 48,1, w wariacie typowym — 62,0, w wariacie z *Deschampsia flexuosa* — 50,1, a w całym zespole — około 53.

Skład florystyczny zespołu *Sambuco racemosi-Piceetum* przedstawiono w tabeli 67. Dane ilustrujące jego strukturę systematyczną podano w tabeli 68. W celu dokonania wnikliwszej analizy obliczono je osobno dla zespołu i osobno dla jego wariantów.

Odrębność zespołu *Sambuco racemosi-Piceetum* najlepiej jest podkreślona obecnością gatunków uznanych za charakterystyczne. Do tej grupy zaliczono: *Sambucus racemosa*, *Dryopteris austriaca* i *Rubus bellardii*. Powyższe gatunki dobrze wyróżniają omawiany zespół, zarówno od pozostałych zbiorowisk na badanym terenie, jak i od świerkowych borów mieszanym rozwijających się na obszarze Działu Północnego (Matyszkiewicz 1952; Polakowski 1961, 1962; Sokołowski 1963, 1965, 1968a i b, 1969; Czerwinski 1973, 1977). Od tych ostatnich dylewskie świerkowe bory świeże różnią się dodatkowo częstym występowaniem *Circaea alpina* i *Bazzania trilobata*.

Za przynależnością tej jednostki do związku *Pino-Quercion* przemawia niemała wartość systematyczna jego sześciu przedstawicieli. Z tej grupy w całym zespole w najwyższych stopniach stałości występują: *Viola riviniana*, *Hieracium lachenalii*, *Veronica officinalis* i *Polytrichum attenuatum*. W wariacie z *Deschampsia flexuosa* spotykano ponadto *Hieracium laevigatum* i *H. sabaudum*.

Klasę *Vaccinio-Piceetea* reprezentuje 21 gatunków. Z nich *Picea excelsa* buduje drzewostan; w podszyciu stale występuje *Sorbus aucuparia*, a w warstwie runa najczęściej można spotkać *Vaccinium myrtillus*, *Solidago virga-aurea* oraz *Carex pilulifera*. Z mchów stałym udziałem wyróżnia się *Entodon schreberi* i *Dicranum scoparium*. Reszta gatunków tej klasy pojawia się z różną częstością w poszczególnych wariantach, stąd ich systematyczna wartość grupowa jest stosunkowo niska.

Z klasy *Quercu-Fagetea* odnotowano 52 gatunki. Dziewięć z nich występuje w IV i V stopniu stałości, zaś *Festuca silvatica* pojawia się często masowo i decyduje wtedy o fizjonomii runa. Większość gatunków lasów liściastych pojawia się jednak sporadycznie, co powoduje, że przeciętna stałość tej grupy w zespole jest bardzo niska. Niemalży udział zbiorowy i większa niż dla gatunków borowych systematyczna wartość grupowa wynika głównie z dużej liczebności. W poszczególnych zdjęciach pojawiają się także niektóre elementy związku *Alno-Padion*. Ich obecność dokładniej precyzuje stosunki wilgotnościowe i warunki siedliskowe tego zespołu.

W zespole *Sambuco racemosi-Piceetum* bardzo dużą rolę odgrywają gatunki towarzyszące. Występowanie z tej grupy aż 65 gatunków, a 14 z nich w najwyższych stopniach stałości, powoduje, że ich wartość grupowa jest znaczna. Duży ich procent pojawia się jednak nieczęsto, a wybiórcze działanie siedliska sprawia, że wiele ogranicza swoje występowanie jedynie do niektórych wariantów. Ich przeciętna stałość jest dlatego niewielka, a systematyczna wartość tej grupy obniżona.

Wariant z *Phegopteris polypodioides* rozwija swe fitocenozy w silnie zróżnicowanej orograficznie południowej części kompleksu głównego. Podłożem ich jest zazwyczaj gleba brunatna kwaśna wytworzona z piasku luźnego (ryc. 39, tab. 64 — profil 15), a niekiedy gleba brunatna wylugowana. Luźny skład mechaniczny, duże zakwaszenie i urozmaicona rzeźba terenu ułatwiają przenikanie składników przyswajalnych oraz węgla i azotu w głąb profilu. Tłumaczy to nieduże ich ilości i bardzo niekorzystny stosunek C/N w opisywanej glebie (tab. 65).

Charakterystycznym rysem tego wariantu jest masowy udział w runie *Festuca silvatica*. Współczynnik pokrycia tej trawy wynosi 4187. Do opisywanej postaci świerkowego boru mieszanego wnikają także inne gatunki związku *Fagion*. *Fagus silvatica* jest częstym składnikiem drzewostanu, natomiast *Acer pseudoplatanus* w wielu płatach pojawia się w runie. Jednorazowo wystąpiła także *Melica unifora* i *Elymus europaeus*. Większe znaczenie gatunków buczynowych oraz częste występowanie *Phegopteris polypodioides* i niektórych przedstawicieli związku *Alno-Padion* są cechami wyróżniającymi tę jednostkę.

W wariantcie z *Phegopteris polypodioides* indywidualnie kształtuje się stosunek neutrofilnych przedstawicieli klasy *Quercu-Fagetea* do acidofilnych elementów klasy *Vaccinio-Piceetea*. W odniesieniu do wszystkich gatunków tych grup kształtuje się on jak 39:22 (tab. 69). Po odjęciu gatunków

Nr kolejno / Successive number/		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Nr zdjęcia / Number of record/		251	250	229	247	245	246	93	245	242	241	248	244	262	239	240	243	113	224	129	130	232	223	222	225	125	227	226	260	263	233	236	234	237	231	235
Data / Date/		21.6	19.6	21.6	21.6	21.6	17.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	18.7	18.6	19.7	19.7	20.6	18.6	18.6	18.6	19.7	18.6	18.6	29.8	29.8	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	
Data / Date/		68	68	68	68	68	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	68	67	67	68	68	68	68	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Leśnictwo / Forestry/		Dyl	Dyl	Bed	Bed	Bed	Bed	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Klon	Dyl	Dyl	Dyl	Bed	Bed	Bed	Bed	Klon	Bed	Bed	Bed	Bed	Bed	Bed	Klon	Klon	Klon	Klon	Klon	Klon	Klon	Klon
Kroczysko / Range/		Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Wyg	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Wyg	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Dyl	Wyg	Wyg	Wyg	Wyg	Wyg	Wyg	Wyg	Wyg
Nr oddziału / No. of section/		95	96	77	68	83	83	83	96	122	122	96	122	170	122	123	123	64	59	54	54	196	53	53	59	60	60	60	170	106	194	196	196	196	194	195
Nachylenie terenu w stopniach / Inclination of area in grades/		30	25	10	15	20	10	10	10	30	25	20	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-5	3-5	5	3-5	5	5	3-5	20
Ekspozycja / Exposure/		E	NE	NE	NE	NE	NE	E	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SW	NE	N	-	-	N	NW	SW	SE	NW	SW	NE	NE	SW	SW	NE	NW	NE	SE
Średnia wysokość drzew / Average height of trees /m/		a ₁ %	80	70	50	60	60	50	50	80	75	70	75	70	70	70	75	70	70	70	40	75	60	70	60	70	70	60	65	70	85	70	80	75	80	80
Gęstość warstwy kryjącej / Density of shrub layer/		b %	10	15	20	10	10	10	5	5	5	15	50	5	5	5	5	5	10	10	25	15	20	30	40	25	20	20	5	15	20	10	20	5	20	15
Porównanie warstwy kryjącej / Comparison of shrub layer/		c %	95	95	100	95	95	100	100	100	90	100	100	95	85	95	100	95	90	85	90	90	85	90	80	85	80	80	95	90	95	100	95	100	90	100
Powierzchnia odkryta / Surface of ground/		a ²	300	450	400	450	300	400	400	300	500	400	450	300	300	400	400	300	400	300	300	400	400	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	450	450
Materiał gatunkowy / Material of species/		61	54	62	49	46	48	35	46	40	49	54	45	43	53	46	60	51	66	52	69	66	76	67	60	57	57	40	54	50	50	45	46	63	53	
Wariant / Variant/		z /with/ <i>Rhegopteris polypodioides</i> </																																		

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/

ad III *Pirola secunda* /11,25,29/, *Viscum album* /23,30/, *Monotropa hypopitys* /25/, *Polypodium vulgare* /23/, *Ptilium crista-castrensis* /32/.

ad IV *Corylus avellana* /19,32/, *Crataegus monogyna* /5,27/, *Ulmus scabra* /1/, *Fraxinus excelsior* /27/, *Lonicera xylosteum* /24/, *Evonymus verrucosa* /20/, *Feris quadrifolia* /13,15/, *Phytosoma spicatum* /2/, *Hepatica nobilis* /19,23/.

ad V *Carex pilosa* /25/, *Salix uniflora* /15/, *Alnus europaea* /2/, *Pulsinaria obscura* /17/, *Sanicula europaea* /22/, *Asarum europaeum* /9/, *Daphne mezereum* /13/.

Sambucus nigra /22,24/, *Impatiens parviflora* /11/, *Rubus saxatilis* /21,23/, *Dactylis glomerata* /24,24/, *Lapsana communis* /1,24/, *Cheerophyllum tomentosum* /17/, *Renunculus repens* /24/, *Linaria vulgaris* /30/, *Malva lanata* /17/.

Bromus benekenii /19/.

Objaśnienia/Explanations/: Red - Bełżany, Biel - Bieleń, Klon - Klonowo, Wzg - Wygoda.

Tabela 68 — Table 68

Struktura systematyczna zespołu *Sambuco racemosi-Piceetum*Systematic structure of *Sambuco racemosi-Piceetum*

Grupa gatunków Group of species	Wariant Variant	z	g	G %	S	D
Ch. <i>Sambuco racemosi-Piceetum</i>	a	3	44	5,68	91,66	5,23
	b	3	30	4,40	90,90	4,00
	c	3	17	4,53	75,00	3,40
		3	91	4,96	86,66	4,80
Ch. <i>Pino-Quercion</i>	a	4	52	6,72	81,25	5,46
	b	4	37	5,43	84,09	4,57
	c	6	34	9,06	70,83	6,41
		6	123	6,77	58,57	3,98
Ch. <i>Vaccinio-Piceetea</i>	a	15	97	12,53	40,42	5,06
	b	18	101	14,81	50,81	7,52
	c	16	79	21,06	61,72	13,00
		21	277	15,18	37,69	5,72
Ch. <i>Fagetalia silvaticae</i> , <i>Quercio-Fagetea</i>	a	39	234	30,23	37,50	11,34
	b	43	218	31,96	46,09	14,73
	c	25	103	27,46	51,50	14,14
		52	555	30,31	30,50	9,24
Towarzyszące (Accompanying species)	a	53	347	44,83	40,92	18,34
	b	60	296	43,40	44,84	19,47
	c	53	142	37,90	33,50	12,70
		65	785	42,88	34,50	14,79
Razem (Total)	a	114	774	99,99		
	b	128	682	100,00		
	c	103	375	100,00		
		147	1831	100,00		

a — wariant z (variant with) *Phegopteris polypodioides*, b — wariant typowy (typical variant), c — wariant z (variant with) *Deschampsia flexuosa*.

sporadycznych zbliża się nieco do jedności (20:16), natomiast ich gatunki częste mają się do siebie jak 11:12. Przewaga ilościowa elementów neutrofilnych zwraca uwagę na zaznaczającą się w tym zbiorowisku naturalną tendencję rozwoju w kierunku lasów mieszanych. W dobrze pojmowanym interesie gospodarki leśnej należy dbać o podtrzymanie tego kierunku zmian, gdyż jedynie w ten sposób można ustrzec zakwaszone gleby piaszczyste przed dalszą degradacją.

Fitocenozy wariantu typowego porastają mniej zróżnicowaną topograficznie, północną część kompleksu głównego, a rozwijają się przeważnie w kontakcie ze zbiorowiskami grądowymi.

Tabela 69 — Table 69

Analiza składu gatunkowego borów świerkowych z Wzgórz Dylewskich
 Analysis of specific composition of spruce woods of Wzgórz Dylewskie region

Jednostka systematyczna Systematic unit	Gatunki acidofilne ¹ Acidophile species			Gatunki neutrofilne ² Neutrophile species			Gatunki towarzyszące Accompanying species			Ogółem gatunków w zespole Total number of sp. in association		Rośliny naczyniowe Vascular plants	Mszaki i porosty Mosses and lungworts
	razem total	z IV, V stop. stał. with IV, V const. degree	S. ³	razem total	z IV, V stop. stał. with IV, V const. degree	S.	razem total	z IV, V stop. stał. with IV, V const. degree	S.	z towarzyszącymi sporadycznie together with sporadically acc. sp.	bez towarzyszących sporadycznie without sporadically acc. sp.		
<i>Quercus-Piceetum Sambuco</i>	28	15	6	35	11	15	55	15	15	118	103	88	30
<i>racemosi-Piceetum</i> wariant z (Variant with)	30	12	12	52	9	27	65	14	27	147	120	122	25
<i>Phlegopteris poly-podioides</i>	22	12	6	39	11	19	53	13	19	114	95	91	23
wariant typowy (typical variant)	25	14	6	43	16	15	60	18	22	128	106	104	24
wariant z (Variant with)													
<i>Deschampsia flexuosa</i>	25	16	5	25	12	5	53	17	14	103	89	84	19

Objaśnienia — Explanations:

1 Gatunki charakterystyczne klasy *Vaccinio-Piceetea* i rzędu *Quercetalia robori-petraeae* — Characteristic species of *Vaccinio-Piceetea* class and *Quercetalia robori-petraeae* order.

2 Gatunki charakterystyczne klasy *Quercus-Fagetum* — Characteristic species of *Quercus-Fagetum* class.

3 Gatunki sporadyczne — Sporadic species (w I stopniu stałości — in I constancy degree).

Ryc. 39. Profile glebowe w zespole *Sambuco racemosi-Piceetum*

Nr 15 — wariant z *Phegopteris polypodioides*; Nr 22 — wariant typowy, Nr 6 — wariant z *Deschampsia flexuosa*

(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

Fig. 39. Soil profiles of the association *Sambuco racemosi-Piceetum*

No. 15 — variant with *Phegopteris polypodioides*, No. 22 — typical variant, No. 6 — variant with *Deschampsia flexuosa*

(Legenda jak na ryc. 4 — Legend as in Fig. 4)

W ich podłożu zalegają najczęściej gleby brunatne wylugowane (profil 22 w tab. 64, 65 i ryc. 39). Pod względem składu mechanicznego i badanych właściwości chemicznych nie wyróżniają się one w sposób szczególny od gleb pozostałych wariantów tego zespołu. Przedstawiają więc typowy obraz jego stosunków edaficznych. W porównaniu z nimi są one jednak bardziej produktywne, gdyż odznaczają się korzystnym stosunkiem C/N oraz żywią bogatszą florę.

Lista florystyczna wariantu typowego obejmuje 128 gatunków. Z nich: 60 zaliczono do towarzyszących, 43 to neutrofilne elementy lasów liściastych, natomiast acidofilnych roślin borowych odnotowano 25 (tab. 69). Taki skład florystyczny w zbiorowiskach z drzewostanami świerkowymi w Polsce północnej jest dotychczas nie notowany. Przewaga roślinności lasów liściastych nad gatunkami borowymi jest tu wielostronna i nie ogranicza się tylko do przewagi liczebnej. Wyraża się ponadto większym udziałem grupowym i wysoką wartością systematyczną gatunków z klasy *Querco-Fagetea*, a także występowaniem 16 z nich w IV i V stopniu stałości. Kilku przedstawicieli klasy *Querco-Fagetea* tylko w tym wariantcie występuje często. Do nich należą przede wszystkim: *Stellaria holostea*, *Melica nutans*, *Asperula odorata*, *Festuca gigantea*, *Actaea spicata* i *Dactylis aschersoniana*. Obecność większej liczby gatunków z mezotroficznych lasów liściastych po części spowodowana jest bliskim kontaktem fitocenoz wariantu typowego z lasami grądowymi, a w pewnym zakresie jest także wynikiem mezotroficznego charakteru jego podłoża.

Z gatunków charakterystycznych zespołu na uwagę zasługuje *Rubus bellardii*. Spotkać ją można w każdym płacie, a często pojawia się masowo i wtedy decyduje o fizjonomii dna lasu.

Wariant z *Deschampsia flexuosa* również jest przywiązany do gleb brunatnych wylugowanych wytworzonych z piasków gliniastych zwałowych (profil 6, ryc. 39, tab. 64). W odróżnieniu od gleb w poprzednich wariantach cechuje je niedostateczne uwilgotnienie, największe zakwaszenie (tab. 65) oraz obecność słabo rozłożonej ściółki.

Omawiana jednostka największe powierzchnie zajmuje w falistym terenie południowo-wschodniej części uroczyska Wygoda.

W zespole *Sambuco racemosi-Piceetum* wariant z *Deschampsia flexuosa* jest postacią najsuchszą, najbardziej świetlistą, najuboższą w gatunki i najbardziej nawiązującą do zbiorowisk borowych. O mniejszej wilgotności jego podłoża świadczą między innymi brak elementów związku *Alno-Padion* i *Frangula alnus*. Odnotowano tu 103 gatunki, w tym 14 towarzyszących zaledwie sporadycznie (tab. 69). Mniej licznie reprezentowane są gatunki neutrofilne (25) i mszaki (19). Zwiększona jest natomiast rola gatunków borowych z klasy *Vaccinio-Piceetea* i związku *Pino-Quercion* (tab. 68). Szereg z nich osiąga najwyższe stopnie stałości (16 gatunków), a niektóre, jak np. *Picea excelsa* czy *Vaccinium myrtillus* i *Entodon schreberi* są podstawowymi składnikami drzewostanu lub runa.

W przeciwieństwie do reszty wariantów, w tej postaci świerkowego boru mieszanego ustaliła się równowaga ilościowa między elementami acidofilnymi i neutrofilnymi (25:25). Pod względem przeciętnej stałości i liczby gatunków stałych, elementy acidofilne uzyskały tu już wyraźną przewagę (16:12).

Nieco mniejszą rolę spełniają gatunki charakterystyczne i wyróżniające zespołu. *Rubus bellardii*, *Circaea alpina* i *Bazzania trilobata* występują w opisywanym wariantcie sporadycznie. Przywiązanie do niego zdradzają natomiast: *Deschampsia flexuosa*, *Hieracium sabaudum* i *Luzula nemorosa*.

Bory świerkowe na terenie Wzgórz Dylewskich przedstawiają swoistą postać boru mieszanego. Stałym lub częstym występowaniem w warstwie krzewów *Sambucus racemosa*, a w runie — *Dryopteris austriaca*, *Rubus bellardii* i *Circaea alpina* oraz pojawianiem się także *Phegopteris polypodioides*, *Luzula nemorosa* i *Circaea intermedia*, jak również większym udziałem przedstawicieli rzędu *Fagetalia* i klasy *Quercio-Fagetea*, zbliżają się one w większym stopniu do borów mieszanych z Polski południowej (Krotoska, Piotrowska 1962; Urbanek 1966; Olaczek 1965; Sowa, Szymański 1966; Medwecka-Kornaś 1952; Dziubałtowski 1928; Dziubałtowski, Kobendza 1933, 1934; Fabianowski, Zarzycki 1965; Izdebski 1962a, 1963a, 1966, 1967), niż do świerkowych borów mieszanych sąsiadujących z nimi od wschodu (Matuszkiewicz 1952; Polakowski 1961, 1962; Sokółowski 1963, 1965, 1968a i b, 1969; Czerwiński 1973, 1977).

Przy utożsamianiu dylewskich świerkowych borów mieszanych z którymkolwiek z opisanych na terenie Polski zespołów borów mieszanych napotyka się na wyraźne trudności. Tymczasowo można by to zbiorowisko włączyć do zespołu *Pino-Quercetum* w randze nowego podzespołu. Taka propozycja byłaby jednak sprzeczna z wyraźnie zaznaczającą się ostatnio tendencją do ściślejszego sprecyzowania stanowiska systematycznego środkowopolskich borów mieszanych.

Obecnie wiadomo, że tego typu bory świerkowe nie wykształcają się wyłącznie na badanym terenie. Analogiczne zbiorowisko notowano w leśnictwie Gąsior na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na Pojezierzu Olsztyńskim, między Biskupcem i Mragowem (materiały nie opublikowane, patrz także Sokołowski 1966a). Występuje ono także na Pojezierzach Iławskim i Kaszubskim (Jutrzenka-Trzebiatowski 1968; Sulma 1959). W oparciu o powyższe można przypuszczać, że mamy tu do czynienia z postacią świerkowego boru mieszanego rozwijającego się na obszarze naturalnego występowania buka i dlatego wikaryzującego z zespołami: *Calamagrosti arundinaceae-Piceetum* (= *Serratulo-Piceetum*) i *Tilio Piceetum* oraz z zbiorowiskami do nich zbliżonymi z Polski północno-wschodniej (patrz Czerwinski 1977).

IV. AMPLITUDA EKOLOGICZNA I WARTOŚĆ WYRÓŻNIAJĄCA GATUNKÓW Z WAŻNIEJSZYCH GRUP SYNGENETYCZNYCH

Bogata rzeźba Wzgórz Dylewskich powoduje, że strefy przejściowe między sąsiadującymi zespołami rozwijają się zawsze w pasie o ograniczonej szerokości. Stwarza to dogodne sytuacje do śledzenia zarówno możliwości przystosowawczych, jak i zakresu wymagań siedliskowych u poszczególnych składników badanej szaty leśnej. Najważniejsze z nich, umieszczone we właściwych im grupach syngenetycznych, zestawiono w tabeli 70. Dla zilustrowania ich znaczenia w wyróżnionych zespołach notowano je w tabeli przy pomocy stopni stałości. Dla gatunków drzewiastych obliczono dodatkowo współczynniki pokrycia (tab. 71).

Uzyskane wyniki nie tylko wyznaczają lokalną skalę ekologiczną podanych gatunków i najważniejszych grup syngenetycznych, lecz zwracają także uwagę na ich wartość wyróżniającą i dynamikę rozwojową. Podkreślają również zaznaczające się powiązania i różnice między składami florystycznymi badanych zbiorowisk. Interesująco zachowują się na terenie Wzgórz Dylewskich zwłaszcza przedstawiciele związków: *Fagion silvaticae* i *Carpinion betuli*. Większość gatunków buczynowych cechuje znaczny dynamizm, natomiast przedstawiciele związku *Carpinion* zachowują się w sposób dla nich charakterystyczny, gdyż ograniczają swoje występowanie ściśle do lasów gądowych. Rzuca to pewne światło na możliwości succe-

Tabela 70

Skala ekologiczna i wartość wyróżniająca ważniejszych gatunków roślin zespołów leśnych Wzgórz Dylewskich
/Ecological scale and differential value of more important species in the associations forests in the Wzgórz Dylewskie/

Zespoły /Associations/	I	II	III	IV	V	VI			VII	VIII IX			X	XI						
Podzespoły /Subassociations/	A			B			C			D E A B C			A							
Warianty /Variants/	a	b		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c					
Liczba zdjęć /No. of records/	6	3	11	8	15	3	9	17	11	24	19	11	8	13	11	11	16	8	11	10
Ch. Scheuchzerio-Caricetea fuscae																				
Agrostis canina	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex fusca	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eriophorum angustifolium	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Menyanthes trifoliata	V	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex lasiocarpa	V	2	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stellaria palustris	II	2	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Epilobium palustre	IV	3	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex canescens	IV	3	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cenurus palustris	V	3	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Viola palustris	III	1	V	III	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Ch. Phragmitetea																				
Carex hudsonii	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Iris pseudocorus	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Potamogeton amplius	IV	1	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Typha latifolia	III	2	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oxymachia thyrsiflora	IV	3	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cephanthe aquatica	III	2	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Equisetum limosum	II	2	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Scutellaria galericulata	III	2	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex pseudocyperus	V	1	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex paniculata	IV	1	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex vesticaria	V	2	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex rostrata	III	2	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex scutiformis	III	2	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stum latifolium	V	2	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rumex hydrocorydaceum	III	2	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Scrophularia alata	.	2	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cicuta virosa	.	2	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Galium palustre	V	3	V	II	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phragmites communis	II	2	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

APPROXIMATELY 2000

[illegible]

Ch. Quercus-agile

[illegible]

Ch. *Sambuco racemosi-Piceetum* i wyróżniające warianty /and differential of variants/

[illegible]

Hieracium laevigatum	.	.	.	.	.	.	.II.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vernonia officinalis	.	.	.	.	.	.	.IV.	.	.	.	.	.	.	.	I.
Hieracium sabaudum	.	.	.	.	.	.	.IV.	.	.	.	.	.	.	.	IV.
Picris raviniana	.	.	.	.	.	.	.V.	.	.	.	.	.	.	.	IV.
Hieracium lucnallii	.	.	.	.	.	.	.V.	.	.II.	.	.	.	.	.	IV.
Polytrichum attenuatum	.	.	.	.	.	.	.II.	.	.	.	.	.	.	.	V.
Ch. Vaccinio-Ficeetea															
Lycopodium selago	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Luzula nemorosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vaccinium vitis-idaea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lycopodium clavatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Trentalis europaea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Polypodium vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Melampyrum pratense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Itillum cristata-castrensis*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Itillum squilinum	.	.	.	.	.	.	.II.	.	.	.	.	.	.	.	.III.
Pteridium aquilinum	.	.	.	.	.	.	.II.	.	.	.	.	.	.	.	.II.
Finus silvestris	.	.	.	.	.	.	.II.	.	.	.	.	.	.	.	.
Picro secunda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Calamagrostis arundinacea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dicranum undulatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nyctocnemis splendens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Antodon schreberi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Clericum scoparium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex filiculifera	.	.	.	.	.	.	.IV.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vaccinium myrtillus	.	.	.	.	.	.	.V.	.	.	.	.	.	.	.	.
Picea excelsa	.	.	.	.	.	.	.II.	.	.	.	.	.	.	.	.
Solidago virga-aurea	.	.	.	.	.	.	.V.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sorbus aucuparia	.	.II.	.	.	.	.	.III.	.	.	.	.	.	.	.	.

Objasnenia / Explanations/

I Zespół /Association/ Salicifraguletum
II Zespół /Association/ Carici elongatae-Alnetum
a. facja /facies/ z Equisetum limosum
b. forma /Form/ typowa /typical/
III Zespół /Association/ Circaeo-Alnetum
IV Zespół /Association/ Alnetum boreale
V Zespół /Association/ Geranio-Petasitetum hybridi
VI Zespół /Association/ Tilio-Carpinetum
A. Podzespół /Subass./ Tilio-Carpinetum corydaletosum
a. Warient /Variant/ z Geranium phaeum
b. Warient /Variant/ z Acer pseudoplatanus
c. Warient /Variant/ typowy /typical/
B. Podzespół /Subass./ Tilio-Carpinetum stachyetosum
C. Podzespół /Subass./ Tilio-Carpinetum lathyretosum verni
a. Warient /Variant/ typowy /typical/
b. Warient /Variant/ z Campanula persicifolia
c. Warient /Variant/ z Sambucus racemosa
D. Podzespół /Subass./ Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae
E. Podzespół /Subass./ Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
VII Zespół /Association/ Melico-Pagetum
A. Podzespół /Subass./ Melico-Pagetum mercurialetosum
B. Podzespół /Subass./ Melico-Pagetum typicum
C. Podzespół /Subass./ Melico-Pagetum festucetosum
silvaticae
VIII Zespół /Association/ Trientali-Pagetum
IX Zespół /Association/ Fago-Quercetum petraeae
X Zespół /Association/ Sambuco racemosi-Ploceetum
a. Warient /Variant/ z Phloxopteris polypodioides
b. Warient /Variant/ typowy /typical/
c. Warient /Variant/ z Deschampsia flexuosa
XI Zespół /Association/ Quercuo-Ploceetum

syjne buczyny pomorskiej i lasów grądowych oraz zwraca uwagę na ich wzajemną zdolność konkurencyjną.

Wiele spostrzeżeń wynikających z tabeli 70 wyjaśniono w treści opisującej poszczególne zespoły i ich jednostki niższe.

V. ROLA GATUNKÓW DRZEWIASTYCH W WYRÓŻNIONYCH ZESPOŁACH

Znaczenie gatunków drzewiastych na badanym terenie oraz ich amplitudę ekologiczną i żywotność dobrze obrazują zamieszczone w niniejszej pracy wykresy struktury biologicznej (ryc. 5, 7, 8, 10, 13-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 36-38) oraz obliczone dla nich współczynniki pokrycia i stopnie stałości (tab. 71).

Uzyskane wyniki są pod wieloma względami zbieżne, a przez to także bardziej przekonujące.

Wiodącym gatunkiem drzewiastym na terenie Wzgórz Dylewskich pod względem zajmowanej powierzchni, jak również okazywanej dynamiki rozwojowej, jest buk (*Fagus silvatica*). Jest on głównym składnikiem drzewostanu wszystkich postaci buczyny pomorskiej, lasów grądowych z siedlisk mezotroficznych, kwaśnej buczyny i kwaśnej dąbrowy. W formie domieszki występuje w grądach niskich i w świerkowych borach mieszanych. Stała obecność buka w runie i podroście wymienionych zbiorowisk świadczy o dużej sile żywotnej i znacznej ekspansywności tego gatunku na terenie Wzgórz Dylewskich. Pod tym względem zdecydowanie ustępują mu pozostałe gatunki drzewiaste. Buk unika tylko siedlisk zdecydowanie wilgotnych i wyraźnie eutroficznych, zajmowanych zazwyczaj przez olesy i zespoły łęgowe.

Duża rola świerka (*Picea excelsa*) w lasach Wzgórz Dylewskich jest po większej części zjawiskiem wtórnym, gdyż wynika z wprowadzenia tego gatunku na szeroką skalę w połowie ubiegłego stulecia. Obecnie, choć ogranicza on swoje występowanie głównie do zespołów *Quercu-Piceetum*, *Sambuco racemosi-Piceetum* oraz zbiorowisk świerczyny na torfie, zajmuje największy procent powierzchni leśnej.

Przeprowadzone badania nie wykluczają możliwości naturalnego występowania świerka na badanym terenie przed wspomnianym okresem. Pozwalają jednak przypuszczać, że jego występowanie mogło się ograniczać do siedlisk zajmowanych obecnie przez zespół *Quercu-Piceetum*. W wilgotnym borze świerkowym świerk zawsze obficie się obsiewa, częściej znajduje się w podroście i stopniowo przechodzi w warstwę drzew (ryc. 36). W tym zespole wyróżnia się on dodaktowo większym przeciętnym przyrostem rocznym średnicy oraz dużą odpornością na szkodniki. W zespole *Sambuco racemosi-Piceetum* najlepiej obsiewa się w fitocenozach wariantu z *Deschampsia flexuosa*. W pozostałych wariantach proces ten jest hamowany bujnym rozwojem runa. W podszyciu tego zespołu świerk występuje dość rzadko.

Z innych zbiorowisk leśnych tylko w niektórych płatach grądu typowego i kwaśnej dąbrowy omawiany gatunek stanowi bardziej istotną domieszkę. W pozostałych zespołach pojawia się przypadkowo.

Sosna (*Pinus silvestris*) jest gatunkiem nieczęsto spotykanym na badanym terenie. Stałym składnikiem drzewostanu jest tylko w zespole *Fago-Quercetum* oraz w acidofilnym grądzie *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*. Dość licznie występuje także w niektórych płatach podzespołu *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni* i zespołu *Sambuco racemosi-Piceetum*. W żadnym z badanych zbiorowisk nie znajdowano jej w podroście i runie.

Osika (*Populus tremula*) jest gatunkiem na ogół często spotykanym w borach mieszanych. Na terenie Wzgórz Dylewskich nie odgrywa żadnej roli, gdyż jej pojedyncze okazy odnotowano zaledwie w kilku zespołach.

Jodła (*Abies alba*) na badanym terenie jest wprowadzona sztucznie (Tumiłowicz 1966). Kilkanaście jej okazów drzewiastych rośnie w oddziałach 54 i 59, w północnej części uroczyska Dylewo. W runie i podszyciu notowano ją ponadto w oddziałach 53, 55, 58 i 60. Jej siedliskiem jest wariant typowy zespołu *Sambuco racemosi-Piceetum*. Tamtejsze warunki klimatyczne i edaficzne sprzyjają rozwojowi jodły, gdyż jej okazy drzewiaste prezentują się okazale, obficie „owocują” i naturalnie się odnawiają. W przyszłości jodła zasługuje na tym terenie na większą uwagę niż dotychczas.

Grab (*Carpinus betulus*) i lipa (*Tilia cordata*) wykazują znaczne przywiązanie do zespołu *Tilio-Carpinetum* (tab. 70). Ich znaczenie w drzewostanach grądowych na badanym terenie jest jednak niewielkie. Grab jest wprawdzie stałym składnikiem wszystkich zbiorowisk grądowych, lecz w większej ilości spotykano go jedynie na siedliskach żyzniejszych. W grądach niskich częściej występuje także w runie i podroście. Swoją siłą żywotną zdecydowanie ustępuje bukiowi i dlatego systematycznie w sposób naturalny jest przez niego wypierany. Lipa drobnolistna na terenie Wzgórz Dylewskich jest gatunkiem nieczęstym. Do rzadkości należy nawet w grądach wysokich (Stypinski 1973 a, b). Gatunkiem lasotwórczym jest tylko w podzespole *Tilio-Carpinetum corydaletosum* (ryc. 16). W tym typie grądu często spotyka się ją także w podszyciu.

Jawor (*Acer pseudoplatanus*) jest naturalnym składnikiem badanych zbiorowisk leśnych, gdyż Wzgórza Dylewskie stanowią wschodni skraj naturalnego zasięgu tego gatunku. Najlepsze warunki do swojego rozwoju posiada w uroczysku Wygoda. W rozwijającym się tam na północnych zboczach żyznym grądzie kokoryczowym wykazuje znaczny dynamizm. Bardzo silnie się odnawia, w dużej ilości znajduje się w podszyciu, a w drzewostanie z powodzeniem konkuruje z resztą gatunków drzewiastych (ryc. 13-15). O długowieczności jaworu na tym terenie świadczą spotykane w niektórych oddziałach jego przestoje o średnicy 69-90 cm. Stałym i znaczącym składnikiem drzewostanu jest on także w grądzie czyścicowym, porastającym północne zbocza w środkowej części uroczyska Dylewo. W buczynie

Rola gatunków drzewiastych w wyróżnionych zespołach
/The role of trees species in distinguished associations/

Zespół /Association/	Salici- Franguletum	Carici elongatae- Alnetum	Circae- Alnetum	Alnetum boreale	Tilio - Carpinetum					Melico - Pagetum			Trientali- Pagetum	Pogo-Quercetum	Sambuco racemosi- Ficeetum	Quercus-Ficeetum
					corydaletosum	stachyetosum	lathyretosum vern	caricetosum pilosae	calamagros- tietosum	mercuriale- tosum	typicum	festucetosum silvaticae				
Liczba zdjęć /Number of record/	6	14	8	15	37	24	38	13	11	11	35	6	15	11	35	10
Gatunek /Species/	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.	s. wsp. st. pok.
Betula pubescens a	V 962	III 41	I 1	I 1												
Alnus glutinosa a	IV 1001	V 5357	V 3875	IV 1237	I 183											
" " b	IV 170	V 432	IV 6	I 118												
" " c		III 41														
Alnus incana a		II 287		V 4983												
" " b		II 108		IV 320												
" " c				IV 301												
Fraxinus excelsior a		I 36	IV 2157	I 67	III 630					III 1024						
" " b			III 690	I 34	II 116					I 160						
" " c		I 36	II 125		II 183					IV 274	I 65	I 2				
Ulmus scabra a			II 2	II 401	V 1874					IV 388	I 1					
" " b				I 2	III 312											
" " c				I 37	V 347	I 1				V 322	I 29	II 3				
Tilia cordata a					III 1062	I 302	I 99							I 1		
" " b					II 203	I 1										
" " c					II 69	I 2	I 27	II 3								
Carpinus betulus a					V 2013	V 1544	IV 306	IV 447	III 94					I 1	I 15	I 50
" " b					II 136	I 42	I 14	I 1	I 45							
" " c					IV 180	IV 190	III 69	II 3	I 45						I 1	I 1
Fagus silvatica a ₁		II 2	II 2		IV 1258	IV 2538	V 5730	V 7020	V 5795	V 4410	V 7050	V 6666	V 6083	V 4704	I 153	I 51
" " a ₂					III 137	IV 781	V 732	II 116	II 364	IV 210	III 536	V 255	V 683	IV 501	III 495	II 178
" " b			I 1		I 42	I 73	II 198	II 309	III 228	I 2	II 123	II 85	I 1	III 727	II 151	IV 1750
" " c					IV 225	II 65	V 482	V 521	V 934	IV 343	IV 287	V 1125	IV 470	V 1023	II 45	II 226
Acer pseudoplatanus a				I 1	III 711	II 522		I 1			I 1		I 1		I 1	I 2
" " b					II 116	I 42									II 58	I 100
" " c					III 467	IV 231	II 15	III 193	II 48	II 3	II 18				II 187	IV 203
Acer platanoides a				I 1	IV 745	III 763	I 1			II 48	I 1		I 1		I 15	I 1
" " b					III 183	I 94	I 46								I 16	III 54
" " c					IV 373	IV 417	III 107	IV 313	IV 6	III 94	III 48	V 8			II 55	III 5
Quercus robur a			II 220	I 1	II 380	II 1710	I 26	I 1	I 46	II 92	I 29		I 117	I 159	II 80	III 223
" " b				I 2		I 22									I 1	II 151
" " c			I 1	I 2	I 15	II 22	I 1		II 48		I 15	I 2		III 4	III 118	V 205
Betula verrucosa a				I 36		III 377	III 264	II 154	III 5	II 250	I 15		II 185	I 1	III 43	II 52
Populus tremula a		I 1			I 1	I 1	I 1		I 1				I 1			
Pinus silvestris a	I 2			I 1	I 1		II 343	I 1	V 641		I 1		I 1	IV 210	II 130	
Picea excelsa a	I 2		I 1		I 1	II 64	II 73		II 4		I 1		I 67	II 320	V 5273	V 6301
" " b						I 1	I 26						I 1	II 46	I 114	I 175
" " c							I 27		I 45				II 3	III 228	IV 773	V 951
Abies alba a															I 4	
" " c															I 7	

Objaśnienia /Explanations/: s.st. - stopień stałości /Constancy/, wsp.pok. - współczynnik pokrycia /Cover coefficient/

pomorskiej drzewiaste okazy jaworu spotyka się znacznie rzadziej, a w pozostałych zbiorowiskach pojawiają się sporadycznie. W podszyciu i runie jawor występuje w różnych postaciach wielu zespołów. Zjawisko to zasługuje na podkreślenie, gdyż sygnalizuje naturalną tendencję do poszerzania się areалу tego cennego gatunku. Z uwagi na duży udział jaworu w regulacji stosunków klimatycznych wewnątrz lasu oraz w kształtowaniu korzystnej struktury podłoża, nie należy całkowicie eliminować jego podrostu, lecz właściwie selekcjonować.

Klon zwyczajny (*Acer platanoides*) zachowuje się podobnie jak jawor, gdyż odznacza się zbliżonymi wymaganiami w stosunku do siedliska. On również odgrywa większą rolę tylko w grądach niskich (rys. 13-15), zaś najlepsze warunki dla rozwoju znajduje w żyznym grądzie kokoryczowym z *Geranium phaeum*. W runie pojawia się w szeregu zbiorowisk, co dobrze świadczy o jego dynamizmie i wskazuje, że — podobnie jak jawor — w przyszłości powinien być bardziej protegowany na tym terenie niż dotychczas.

Wiąz górski (*Ulmus scabra*) występuje jedynie w zbiorowiskach zajmujących podłoża eutroficzne. Na badanym terenie są to różne postacie *Tilio-Carpinetum corydaletosum* (ryc. 13-16) oraz *Melico-Fagetum mercurialetosum* (ryc. 26). W nich występuje on także w runie, a nieraz przechodzi nawet do podrostu. Można z tego wnioskować, że na terenie Wzgórz Dylewskich tylko tego typu zbiorowiska zapewniają wiązowi górskiemu odpowiednie warunki rozwoju. Pojedyncze jego okazy lub małe grupy spotykano ponadto w niektórych płatach zespołu *Alnetum boreale* (ryc. 10).

Jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior*) także odznacza się wysokimi wymaganiami w stosunku do siedliska. Jego znaczenie nie może być duże, bowiem żyzne i wilgotne gleby obecnie nieczęsto są podłożem zbiorowisk leśnych Wzgórz Dylewskich. Gatunkiem przeważającym w drzewostanie jest on jedynie w niektórych płatach zespołu *Circae-Alnetum* (ryc. 8). Istotną domieszkę stanowi w wielu płatach niskich grądów kokoryczowych (ryc. 13, 15) oraz w żyznej buczynie (ryc. 26). W powyższych zespołach najczęściej spotykano go także w podszyciu i runie.

Olsza szara (*Alnus incana*) porasta najżyźniejsze siedliska. Zakres jej wymagań edaficznych jest bardzo wąski, ponieważ ogranicza występowanie prawie wyłącznie do fitocenoz zespołu *Alnetum boreale*. W tym zespole występuje natomiast stale i zawsze jest głównym gatunkiem lasotwórczym (ryc. 10). Potwierdza to bardzo wysoki jej współczynnik pokrycia, wynoszący 4983 (tab. 71). W łęgu borealnym olsza szara bardzo często odnawia się naturalnie przez odrosty (fot. 1) i prawie zawsze reprezentowana jest w warstwie krzewów i w runie. Obecność olszy szarej w odwodnionych fragmentach olszyny typowej jest wynikiem podobieństwa siedlisk, jak i częstego sąsiedztwa tych zespołów na terenie Wzgórz Dylewskich.

Olsza czarna (*Alnus glutinosa*) buduje drzewostan w olszynie typowej i w wilgotniejszych partiach łęgu olszowo-jesionowego (rys. 5 i 7). Jako

tował drzewostany naturalne i wprowadzał na ich miejsce głównie świerk. Przy tak znacznym zaświerczeniu dokonywane obecnie systematyczne odwadnianie naturalnych zbiorników retencyjnych, gromadzących niezbędny zapas wody na okres letni, jest absolutnym błędem. Wyraźnie zaznaczające się obniżenie poziomu wód gruntowych wpływa niekorzystnie nie tylko na drzewostany świerkowe, zmniejszając przyrost drewna i pogarszając ich stan zdrowotny, lecz modyfikuje także przebieg naturalnych sukcesji w lasach liściastych. Wzajemne przeplatanie się tendencji naturalnych z efektami działalności człowieka w wielu przypadkach stwarza niemałe trudności przy odtwarzaniu przypuszczalnych sukcesji badanych zespołów leśnych.

Dokładne przesłедzenie wielorakich i różnokierunkowych powiązań między badanymi zbiorowiskami umożliwiającą z jednej strony przeprowadzone badania glebowe, a z drugiej — pomiary struktury drzewostanu oraz obfity materiał zdjęciowy, ilustrujący zmienność stosunków florystycznych, nie tylko między zespołami, lecz także wewnątrz nich.

Schemat przypuszczalnych kierunków rozwojowych badanych zbiorowisk przedstawiono na rycinie 40. Wynika z niego, że ciąg zmian, jaki można przesłedzić w badanych zespołach, jest zasadniczo jednokierunkowy, lecz wielotorowy. Rozpoczyna się on od kształtowania w siedliskach zbiorowisk klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, względnie rzędu *Phragmitetalia*, fitocenozy zespołu *Salici-Franguletum* lub w siedliskach zbiorowisk rzędu *Molinietalia* — fitocenozy zespołu *Geranio-Petasitetum hybridi*.

Dłużej trwający proces akumulacji masy organicznej, stopniowe wypływanie i namywy z sąsiednich terenów, mogą spowodować „starzenie się” zbiorowisk łożowych. Objawia się to stopniowym opanowywaniem ich przez olszę i wzbogacaniem składu florystycznego runa w gatunki zielne. Tego typu zmiany zauważa się zawsze w płatach przejściowych do olszyny typowej, która jest pierwszym zespołem typowo leśnym w opisywanym szeregu rozwojowym.

Obecność olesu w postaci facji z *Equisetum limosum* wskazuje na możliwość jego rozwoju pośrednio ze stopniowo osuszanych szuwarów ze związku *Phragmition* poprzez zespoły związku *Magnocaricion elatae*, lecz bez wykształcania się zarośli łożowych. Drzewostan we wspomnianej facji jest przeważnie młody i mniej zwarty. W runie gatunkiem przeważającym jest *Equisetum limosum*. Zwraca uwagę także duża rola przedstawicieli rzędu *Phragmitetalia* ($D = 17,06$). Brak natomiast elementów związku *Alno-Padion*, a gatunki charakterystyczne dla zespołu odgrywają nieco mniejszą rolę. Podłożem tej facji z *Equisetum limosum* jest gleba mineralna, silnie zamulona.

Naturalne, względnie sztuczne, obniżenie poziomu wód gruntowych zwiększa aerację wierzchnich warstw torfu. Przyspiesza to jego rozkład i podwyższa żyzność gleby. W takim siedlisku osadzają się już zazwyczaj niektóre gatunki związku *Alno-Padion*, rzędu *Fagetalia* i klasy *Querco-Fa-*

getea. Fitocenozy z nieznacznym ich udziałem mają charakter pośredni i stanowią ogniwo łączące olesy z łągami.

Na terenie Wzgórz Dylewskich łatwy jest do prześledzenia ciąg sukcesyjny od olesu do łągu borealnego, gdyż zespoły te często kontaktują ze sobą. Kolejne etapy tego zjawiska ilustrują z jednej strony zdjęcia 12-14 zespołu *Carici-elongatae-Alnetum* (tab. 6), a z drugiej — wariant z *Solanum dulcamara* zespołu *Alnetum boreale* (tab. 14).

Przebieg naturalnej sukcesji od olesu do łągu olszowo-jesionowego jest mniej wyraźny na badanym terenie, gdyż łąg olszowo-jesionowy jest tam zbiorowiskiem nieczęstym i ogranicza się w występowaniu do silnie zróżnicowanego orograficznie uroczyska Dylewo. Świadectwem jego powiązań z olesem są niektóre wilgotniejsze płaty z *Ribes nigrum* i *Solanum dulcamara*.

W oddziałach 33 i 34 koło Kitnowa, wykształcające się obok siebie w typowych postaciach fitocenozy łągu borealnego i ziołoroślowego zespołu *Geranio-Petasitetum hybridi* rozdziela zawsze pas zbiorowiska o charakterze pośrednim; z czego można wnioskować o możliwości kształtowania się łągu borealnego także z ziołorośli lepieźnika różowego.

W uroczysku Szyldak (oddz. 9-11) można obserwować bardzo przekonujące przykłady sukcesji zespołu *Geranio-Petasitetum hybridi* w kierunku *Tilio-Carpinetum corydaletosum* w wariancie z *Geranium phaeum*.

Obecność *Alnus glutinosa* w niektórych płatach tego grądu oraz dość liczne nieraz występowanie *Ribes nigrum* nie pozwala wykluczyć możliwości tworzenia się żyznego grądu z *Geranium phaeum* — drogą stopniowych przemian — z zespołu *Circae-Alnetum*. Więcej cech wspólnych z wspomnianym grądem posiada w swoim składzie gatunkowym zespół *Alnetum boreale*.

Z powodu na ogół fragmentarycznego wykształcania się zbiorowisk łągowych na badanym terenie nie zawsze było możliwe prześledzenie dostatecznie dużej liczby stadiów pośrednich szeregu rozwojowego do zespołów siedlisk eutroficznych, nie zalewanych nawet okresowo. Pewne jest jednak, że przemiana zespołów łągowych w inne zbiorowiska siedlisk eutroficznych dokonuje się tam w różnych warunkach i dlatego nie jest jednorodna.

Jednym z lepiej znaczonych na badanym terenie szeregów ekologicznych jest ciąg sukcesyjny wiodący od łągu *Circae-Alnetum* do podzespołu *Tilio-Carpinetum corydaletosum* w jego wariancie z *Acer pseudoplatanus* i dalej przez kolejne odstopniowania ekologiczne tego wariantu do podzespołów *Melico-Fagetum typicum* oraz *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*, a kończący się na zespole *Trientali-Fagetum*. Szereg ten dokumentowany jest przez odpowiednie grupy zdjęć fitosocjologicznych zestawione w tabelach: 10, 21, 22, 46 i 53. W odnośnych tabelach nie podano jednakże zdjęć o charakterze typowo pośrednim, w tym przypadku najbardziej przydatnych.

Z powodu stałego pogarszania się stosunków wodnych w wyższych partiach Wzgórz Dylewskich aktualnie nieczęsto można obserwować przekonujące przykłady sukcesji zespołu *Circae-Alnetum* do podzespołu *Melico-Fagetum mercurialetosum*. Jednym z ogniw łączących zespół *Circae-Alnetum* z typową postacią żyznej buczyny jest z pewnością płat tego łęgu z oddziału 123 w uroczysku Dylewo (tab. 10, zdjęcie 63). Dalszy ciąg tego szeregu ekologicznego jest stosunkowo łatwy do prześledzenia. Postępujące ubożenie siedliska powoduje zrozumiałe zmiany w składzie gatunkowym zbiorowisk buczynowych, a przez to czyni potencjalnie możliwe przekształcanie się żyznej buczyny w podzespoły siedlisk mezotroficznych buczyny pomorskiej, zaś tych ostatnich — w wyróżnione postaci buczyny kwaśnej (*Trientali-Fagetum*). Szereg powiązań zbliża także podzespół *Melico-Fagetum mercurialetosum* z podzespołem *Tilio-Carpinetum corydaletosum* w wariancie z *Acer pseudoplatanus*.

Następny szereg rozwojowy tworzą kolejne postacie ekologiczne zespołu *Tilio-Carpinetum* oraz zespół *Fago-Quercetum* (tab. 21, 22, 25, 29, 30, 34, 38 i 57). Ten ciąg przemian rozpoczyna się od podzespołu *Tilio-Carpinetum* w wariancie z *Geranium phaeum* i prowadzi w prostej linii do określonych postaci jego wariantu typowego. Taką możliwość uzasadniają wyraźne powiązania składu gatunkowego tych zbiorowisk, a także ich sąsiedztwo w terenie. Fitocenozy podwariantu z *Campanula persicifolia* są bardziej prześwietlane, gdyż zawsze zajmują strome zbocza, natomiast płaty wariantu typowego wykształcają się przeważnie u podnóży zboczy lub na terenach lekko falistych.

Naturalne ubożenie podłoża, stopniowe pogarszanie się stosunków wodnych oraz zmiany w strukturze drzewostanu mogą przedłużyć omawiany ciąg sukcesyjny, przez odpowiednie postaci *Tilio-Carpinetum stachyetosum*, do typowego wariantu *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*.

Przemiana wysokiego grądu typowego w jego wariant z *Campanula persicifolia* odbywa się na tym samym poziomie ekologicznym, lecz w zmieniających się warunkach klimatycznych. Tego typu grąd wysoki rozwija się zawsze na okrajkach kompleksów leśnych, gdzie dobrze kształtują się stosunki świetlne, natomiast gleba jest zawsze głęboko przesuszona. Obecność w tym zbiorowisku gatunków światłolubnych sugeruje jego sukcesję w kierunku świetlistej dąbrowy.

Do tej samej grupy ekologicznej należy także wariant z *Sambucus racemosa* zespołu *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*. Pod względem składu florystycznego zajmuje on pozycję pośrednią między grądem wysokim typowym a mezotroficznym zespołem *Sambuco racemosi-Piceetum*.

Nie nasuwa wątpliwości przebieg sukcesji od typowego wariantu *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*, poprzez *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*, do kwaśnej dąbrowy. Ten ciąg zmian dokumentowany jest szeregiem płatów przejściowych, a główną jego przyczyną jest postępujące naturalne ubożenie siedliska.

Na zboczach o zazwyczaj południowej ekspozycji rozwija się podzespół *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae*. Siedliskiem i składem gatunkowym dość wyraźnie odbiega on od wariantu typowego *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni*; ponadto jest bardziej światłolubny i lepiej znosi okresowe zmniejszanie się wilgotności podłoża. Wysoki grąd turzycowy przeważnie rozwija się dość jednorodnie. Tylko w płatach porastających wierzchołkowe partie terenu uwiadczenia się zmiany prowadzące do zespołu *Fago-Quercetum*, wynikające z dalszego zubożenia siedliska wskutek częstego niedoboru wody.

Zespoły borów świerkowych tworzą na badanym terenie szereg rozwojowy niezależny od poprzednich. Rozpoczyna się on od wykształcającego się fragmentarycznie i bardzo wilgotnego zbiorowiska świerczyny na torfie (*Sphagno girgensohni-Piceetum*). Wspomniana świerczyna niektórymi cechami nawiązuje do *Quercio-Piceetum*, a ten zespół z kolei — dzięki podobnemu podłożu i niektórym wspólnym cechom w składzie florystycznym — poprzez grąd czyszcowy nawiązuje do pozostałych grądów niskich.

Opisywany ciąg zmian zasadniczo prowadzi do kształtującego się w siedliskach mezotroficznych zespołu *Sambuco racemosi-Piceetum*, który przez swój wariant z *Phegopteris polypodioides* zbliża się wyraźnie do mezotroficznych postaci buczyny pomorskiej, a poprzez wariant typowy nawiązuje zarówno do grądów wysokich, jak i do jego bardziej borowej postaci, określonej jako wariant z *Deschampsia flexuosa*. Ten ostatni, dzięki obecności *Hieracium sabaudum*, *Luzula nemorosa* i *Deschampsia flexuosa* oraz innych przedstawicieli rzędu *Quercetalia robori-petraeae*, zbliża się do opisanego w Polsce północnej zespołu *Fago-Quercetum*.

Kierunki i szybkość zmian w obrębie wyróżnionych borów świerkowych zależą przede wszystkim od stosunków wodnych i składu gatunkowego drzewostanów, a w pewnym zakresie także od sąsiedztwa z pozostałymi zbiorowiskami.

Przeprowadzone badania umożliwiają wytypowanie lokalnych zespołów klimaksowych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w szeregu sukcesyjnym buczyny pomorskiej jest nim kwaśna buczyna (*Trientali-Fagetum*), natomiast w ciągu przemian zbiorowisk grądowych, a po części także mieszanych borów świerkowych, zespołem klimaksowym jest kwaśna dąbrowa (*Fago-Quercetum*).

Naszkicowane tu w sposób zwięzły tendencje rozwojowe badanych zespołów są w całości logiczne i potwierdzają zgodność kierunków rozwojowych dylewskich lasów liściastych i mieszanych oraz borów mieszanych z typem sukcesji najczęściej notowanym w literaturze krajowej.

VII. PROBLEMY OCHRONY PRZYRODY

Intensywna gospodarka leśna, prowadzona na obszarze Wzgórz Dylewskich od XVIII wieku, spowodowała maksymalne uszczuplenie powierzchni

leśnej. Aktualnie lasy porastają jedynie te tereny, które z powodu silnego urzeźbienia, albo nadmiernego uwilgotnienia, bądź z innych względów, nie nadają się pod uprawę rolniczą. Porastające je kompleksy leśne w tej sytuacji są niezbędne, gdyż chronią pokrywę glebową przed szkodliwymi skutkami erozji wietrznej i wodnej.

Zachowane do dzisiaj nieliczne fragmenty zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym lub bardzo zbliżonym do naturalnego należy objąć ochroną prawną także po to, by mogły służyć przyszłym pokoleniom jako gotowe wzorce do naśladowania w racjonalnej hodowli lasu oraz by stały się w przyszłości placówkami dla badania naturalnych procesów lasotwórczych. Należy więc dążyć do utworzenia takiej sieci rezerwatów, która co najmniej w dostatecznym stopniu gwarantowałaby zachowanie najważniejszych, naturalnie rozwijających się zespołów leśnych (S u l m a 1959).

Jedynym obiektem chronionym na badanym terenie jest dotychczas rezerwat „Jezioro Francuskie”, zatwierdzony dla ochrony relikтового gatunku *Salix myrtilloides* oraz zbiorowisk leśnych rozwijających się w obręzeniu jeziora Sałk, czyli Francuskiego (P o l a k o w s k i 1968). Śledząc od lat różne zabiegi związane z gospodarką leśną w najbliższym otoczeniu tego obiektu (np. systematyczne odwadnianie i budowa drogi bitej), można być pewnym, że w najbliższym czasie do reszty wytraci on swoje walory zarówno naukowe, jak i krajobrazowe. Szczegółowa lustracja w 1976 roku wykazała, że *Salix myrtilloides* utrzymuje się w nim w postaci pojedynczego skupienia i to w dodatku o niepewnym losie, gdyż wegetującego wśród koszonego nieraz zbiorowiska łąkowego.

Jest oczywiste, że rezerwat „Jezioro Francuskie” — nawet jeżeli zostanie ustrzeżony od zagłady — nie zabezpieczy dostatecznej ochrony dla bogatej i interesującej flory oraz wielu naturalnie rozwijających się zbiorowisk leśnych na obszarze Wzgórz Dylewskich.

Ze wszech miar uzasadnione jest objęcie ochroną prawną najbardziej typowych partii buczyny pomorskiej, wykształcających się w pełnej skali ekologicznej na wschodnich stokach Góry Dylewskiej. Najpiękniejsze fragmenty tego zespołu zachowały się w oddziałach 100 i 109 oraz im towarzyszących.

Uwzględniając reliktowy charakter zbiorowiska grądowego z bodziszkiem żałobnym (*Tilio-Carpinetum corydaletosum* wariant z *Geranium phaeum*), znaczne nagromadzenie w nim rzadkich roślin naczyniowych (fot. 3 i 4), i mszaków, naturalny charakter drzewostanu oraz obecność pomnikowych okazów lipy, buka i wiązu górskiego, a z przyrody nieożywionej — ogromnych głazów narzutowych, w pełni na ochronę zasługują oddziały 9-11 uroczyska Szyldak. Charakteryzowany obiekt jest usytuowany w głębokim przełomie rzeczki Dylewki, koło miejscowości Durąg. Z tego powodu nie powinien być nigdy eksploatowany, gdyż chroni sąsiadujące z nim grunty orne przed skutkami erozji i posiada niezaprzeczalne walory krajobrazowe (fot. 2).

Należałoby także ustrzec przed likwidacją znaturalizowane partie zbiorowisk grądowych, buczyny pomorskiej oraz świerkowego boru mieszanego, porastające oddziały 170, 171 i 184 w uroczysku Klonowo.

Na ochronę zasługują również fragmenty łągu borealnego z olszą szarą (*Alnetum boreale*). Typowo rozwija się on w oddziale 33 uroczyska Domkowo II, między Kitnowem i Domkowem.

Powyższe propozycje nie obejmują wszystkich obiektów leśnych godnych ochrony na tym terenie. Zwrócono uwagę jedynie na te, które w pierwszej kolejności należałoby objąć ochroną prawną, gdyż tylko w ten sposób ochroni się przed szybko postępującą przemianą, a być może nawet zniszczeniem, ostatnie fragmenty przyrody naturalnej Wzgórz Dylewskich.

VIII. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

1. Na podstawie przeprowadzonych badań fitytosocjologicznych i glebowych zidentyfikowano na terenie Wzgórz Dylewskich 11 zespołów roślinnych oraz zbiorowisko świerczyny na torfie. Są to:

a. <i>Geranio-Petasitetum hybridi</i>	— ziołorośla lepieźnika różowego
b. <i>Salici-Franguletum</i>	— zarośla łożowe
c. <i>Carici elongatae-Alnetum</i>	— olszyna typowa (oles)
d. <i>Circae-Alnetum</i>	— łąg olszowo-jesionowy
e. <i>Alnetum boreale</i>	— łąg borealny
f. <i>Tilio-Carpinetum</i>	— grąd wschodniopolski
g. <i>Melico-Fagetum</i>	— buczyna pomorska
h. <i>Trientali-Fagetum</i>	— kwaśna buczyna pomorska
i. <i>Fago-Quercetum petraeae</i>	— kwaśna dąbrowa pomorska
j. <i>Sphagno girgensohni-Piceetum</i>	— świerczyna na torfie
k. <i>Quercu-Piceetum</i>	— świerkowy bór mieszany wilgotny
l. <i>Sambuco racemosi-Piceetum</i>	— świerkowy bór mieszany świeży

a. Ziołorośla lepieźnika różowego (*Geranio-Petasitetum hybridi*) zajmują zazwyczaj najniższe terasy w bezpośrednim sąsiedztwie rzeczek z glebą typu mady rzecznej czarnoziemnej lub rozwijają się na niezbyt stromych skarpach oraz na terasie wyższej i wtedy ich podłoże stanowi mada rzeczna brunatna. W ich składzie florystycznym udział gatunków rzędu *Molinietalia* i związku *Filipendulo-Petasition* jest zawsze znaczący, a gatunkiem dominującym jest *Petasites officinalis*. Niemala rola przedstawicieli związku *Alno-Padion* i rzędu *Fagetalia* zbliża je do zbiorowisk łągowych.

b. Zarośla łożowe (*Salici-Franguletum*) występują przeważnie w niekowatych i bezodpływowych zagłębieniach. W okresie wiosennym i jesienią są one z tego powodu przez dłuższy czas zalewane wodą. Do cech szczególnych tego zbiorowiska należy bujny rozwój warstwy krzewów i dominowanie w niej wierzby łoży (*Salix cinerea*) oraz duży udział w runie

gatunków nieleśnych. W naturalnym ciągu sukcesyjnym zarośla łożowe są ogniwem łączącym zbiorowiska rzędu *Molinietalia* lub *Phragmitetalia* z olesami.

c. Olszyna typowa (*Carici elongatae-Alnetum*) rozwija się w siedliskach w czasie wiosny i jesieni podtapianych wodą. Jej podłożem jest zawsze gleba torfowa wytworzona z torfu torfowiska niskiego. Z gatunków charakterystycznych najwierniejszym jest *Carex elongata*. Nieco mniejsze przywiązanie wykazuje *Ribes nigrum* i *Solanum dulcamara*. Stosunki wodne i glebowe różnicują olesy dylewskie na: fację z *Equisetum limosum*, będącą ogniwem łączącym olesy ze zbiorowiskami szuwarowymi i formę typową.

d. Łęg olszowo-jesionowy (*Circae-Alnetum*) porasta gleby bogate w składniki przyswajalne, z dobrze wykształconym poziomem próchnicznym i dlatego żyzne i produktywne. Z powodu ciągłego utrzymywania się wysokiego poziomu wody gruntowej są one zawsze gruntowo-oglejone. Na terenie Wzgórz Dylewskich omawiany łęg jest dobrze scharakteryzowany częstą obecnością i dużym przywiązaniem *Equisetum silvaticum*, *Circaea alpina* i *Carex remota*.

e. Łęg borealny (*Alnetum boreale*) zajmuje najżyźniejsze gleby badanego terenu. Są nimi mady rzeczne czarnoziemne, odznaczające się dużą miąższością warstwy próchnicznej, bardzo korzystnymi właściwościami fizyczno-chemicznymi oraz dobrymi stosunkami wodnymi.

Z gatunków uznanych za charakterystyczne dla tego zespołu przez Oberdorfera (1953) jedynie *Alnus incana* spełnia tę funkcję należycie. Lokalnie dobrze charakteryzuje łęg borealny *Chaerophyllum bulbosum* i *Polygonum dumetorum*. Od zespołu *Circae-Alnetum* niniejszy łęg wyróżnia się stałym brakiem jego gatunków charakterystycznych oraz zasadniczo odmienną fizjonomią.

f. Grąd wschodniopolski (*Tilio-Carpinetum*) na badanym terenie jest spotykany bardzo często. Jego podłożem najczęściej są gleby brunatne kwaśne, rzadziej brunatne wylugowane lub właściwe. Grąd kokoryczowy porasta nieraz mady brunatne bądź glebę opadowoglejową. W jego obrębie wyróżniono następujące podzespoły:

Tilio-Carpinetum corydaletosum

Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae

Tilio-Carpinetum lathyretosum verni

Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae

Tilio-Carpinetum calamagrostietosum arundinaceae

Powyższe jednostki łączy częsta obecność dziewięciu przedstawicieli związku *Carpinion betuli*. Są to: *Carpinus betulus*, *Tilia cordata*, *Evonymus verrucosa*, *Stellaria holostea*, *Dactylis aschersoniana*, *Carex pilosa*, *Melampyrum nemorosum*, *Ranunculus cassubicus* i *Lathraea squamaria*.

W obrębie *Tilio-Carpinetum corydaletosum* wyróżniono: wariant z *Geranium phaeum*, wariant z *Acer pseudoplatanus* i wariant typowy; w *Tilio-Carpinetum stachyetosum* — trzy grupy fitocenoz różniące się przede

wszystkim strukturą drzewostanu; w *Tilio-Carpinetum lathyretosum verni* — wariant typowy, wariant z *Campanula persicifolia* i wariant z *Sambucus racemosa*; w *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae* — wariant typowy i wariant z *Vaccinium myrtillus*; w *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum* — wariant typowy i wariant z *Carex montana*.

Według propozycji Traczyka (1962) łatwo dało się zakwalifikować badane grądy do zespołu *Tilio-Carpinetum*; nie udało natomiast zająć stanowiska w sprawie ich przynależności do jednej z trzech wyróżnionych przez niego odmian geograficznych.

g. Buczyna pomorska (*Melico-Fagetum*) zajmuje najwyższe partie Góry Dylewskiej i porasta przeważnie gliniaste, rzadziej piaszczysto gliniaste gleby brunatne kwaśne lub wylugowane. Różnicuje się na trzy podzespoły:

Melico-Fagetum mercurialetosum perennis

Melico-Fagetum typicum

Melico-Fagetum festucetosum silvaticae

Fitocenozy *Melico-Fagetum mercurialetosum* porastają kamieniste, północne zbocza i cieniste dna wąwozów. Podłożem jest tu gleba brunatna kwaśna. Podzespół ten wyróżnia się wielogatunkowym drzewostanem i obecnością w runie szeregu gatunków siedlisk eutroficznych. *Melico-Fagetum typicum* charakteryzuje drzewostan bukowy. W runie ważną rolę odgrywa *Melica uniflora* i *Festuca silvatica*, a często spotkać można także *Elymus europaeus*. *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae* jest najuboższą formą omawianego zespołu. W glebie zaznacza się proces przemywania. W runie stale dominuje *Festuca silvatica*, pojawiają się niektóre gatunki borowe, brakuje natomiast elementów związku *Alno-Padion*.

h. Kwaśna buczyna (*Trientali-Fagetum*) porasta wierzchołki kopulastych wzniesień morenowych z glebą płową. Swoistą cechą tego zbiorowiska jest słabe pokrycie dna lasu przez roślinność zielną i zwiększony udział mszaków. Wśród roślin zielnych przeważają gatunki o małych wymaganiach w stosunku do podłoża.

i. Kwaśna dąbrowa (*Fago-Quercetum petraeae*) zajmuje piaszczysto-gliniaste, słabo wilgotne gleby płowe w uroczyskach Zajączki i Dylewo. W jej drzewostanie przeważa buk, uzupełniany częściej sosną, a nieraz także dębem szypułkowym. W runie większą rolę odgrywają gatunki rzędu *Quercetalia robori-petraeae* oraz elementy borowe.

j. Świerkowy bór mieszany świeży (*Sambuco racemosi-Piceetum*) zajmuje największą powierzchnię spośród badanych zespołów. W jego podłożu zalegają zawsze piaszczysto-gliniaste gleby brunatne wylugowane lub kwaśne. W składzie florystycznym tego zbiorowiska na uwagę zasługuje stała obecność oraz duże przywiązanie *Sambucus racemosa*, *Dryopteris austriaca* i *Rubus bellardii*.

Urozmaicona topografia oraz wynikające stąd zróżnicowanie siedlisk i składu florystycznego, stwarza podstawę do wyróżnienia 3 jednostek niższych. Są to: a) wariant z *Phegopteris polypodioides* — rozwijający się

w kontakcie z buczyną pomorską; b) wariant typowy — sąsiadujący najczęściej z lasami grądowymi; c) wariant z *Deschampsia flexuosa* — postać najbardziej borowa tego zespołu.

k. Świerkowy bór mieszany wilgotny (*Quercus-Piceetum*) porasta dna głębokich parowów z glebą gruntowoglejową. W składzie runa najlepiej charakteryzują go: *Plagiochila asplenoides*, *Lycopodium annotinum* i *Bazania tribolata*. Świerk posiada w tym zespole optymalne warunki dla swojego rozwoju.

1. Zbiorowisko świerczyny na torfie (*Sphagno girgensohni-Piceetum*) rozwija się bardzo rzadko i fragmentarycznie. Podłożem są tu płytkie torfy mszyste, zalegające w bezodpływowych obniżeniach terenowych.

2. Przeprowadzone badania fitosocjologiczne umożliwiły prześledzenie lokalnej amplitudy ekologicznej wielu gatunków leśnych, a w odniesieniu do tych, które powszechnie uważa się za charakterystyczne dla różnych zespołów, pozwoliły dokładnie określić ich wartość diagnostyczną.

3. W charakterystyce badanych zespołów leśnych przedstawiono strukturę biologiczną drzewostanu metodą Paczowskiego (1928) oraz obliczono współczynniki pokrycia dla gatunków drzewiastych. Uzyskane wyniki szeroko informują o roli, jaką spełniają gatunki drzewiaste w lasach dylewskich.

4. Kierunki rozwojowe zespołów leśnych ustalono na podstawie zaznaczających się powiązań florystycznych i siedliskowych. Główny ciąg zmian, jaki daje się zauważyć w rozwoju badanych zbiorowisk, jest zasadniczo jednokierunkowy, lecz wielotorowy. Kierunki i szybkość zmian zależą w pierwszym rzędzie od stosunków siedliskowych. W terenie tak zróżnicowanym orograficznie, jak badany, szybciej ujawniają się także skutki nieprzemyślanej działalności człowieka.

5. Większej, niż dotychczas, uwagi wymagają na tym terenie problemy ochrony przyrody. Jedyne, jak dotychczas, rezerwat „Jezioro Francuskie” w minimalnym stopniu zabezpiecza najważniejsze wartości przyrodnicze tego terenu. Proponuje się w związku z tym wzięcie pod ochronę prawną czterech dalszych obiektów. W pełni na to zasługują: buczyna pomorska na stokach Góry Dylewskiej, uroczysko Sztydak z bardzo interesującą reliktową postacią żyźnego lasu grądowego, oddziały 170, 171 i 184 uroczyska Wygoda z naturalnymi fragmentami lasów grądowych, buczyny pomorskiej i świerkowego boru mieszanego oraz lęg borealny (*Alnetum boreale*) w oddziale 33 uroczyska Domkowo II.

SUMMARY

Results are reported of several years phytosociological-ecological investigations on the forest communities of the Wzgórza Dylewskie (hills).

Wzgórza Dylewskie occupy the south-western part of the Lubawa Hammock. They differ from the neighbouring lakeland not only by their relative height (Góra Dylewska Mt. 312 m a.s.l.), and by a wide differentiation of habitats, but also by climatic conditions, hydrography and their vegetal cover.

On the basis of 363 phytosociological records obtained by the Braun-Blanquet method, the following 11 associations and one community were identified: *Geranio-Petasitetum hybridi* Oberd. 1957; *Salici-Franguletum* (Malc. 1929) R.Tx. 1937; *Carici elongatae-Alnetum* (Koch 1926) Tx. et Bodeaux 1955; *Circae-Alnetum* Oberd. 1953; *Alnetum boreale* Oberd. 1953; *Tilio-Carpinetum* Traczyk 1962; *Melico-Fagetum* Knapp 1942; *Trientali-Fagetum* R. Tx. 1960; *Fago-Quercetum petraeae* R. Tx. 1955; *Sphagno girgensohni-Piceetum* Pol. 1962; *Quercu-Piceetum* Mat. (1952) 1955; *Sambuco racemosi-Piceetum* ass. nova.

Geranio-Petasitetum hybridi usually grows on soil of alluvial tchernozem type in the immediate vicinity of small streams or they develop on slopes and higher terraces, and then their substrate consists of alluvial brown soil. The contribution of species of the order *Molinietalia* and the alliance *Filipendulo-Petasion* is large here, and the dominating species is always *Petasites officinalis*. The prominent role of representatives of the alliance *Alno-Padion* and the order *Fagetalia* brings the discussed herb groups close to floodland communities.

Salici-Franguleta are scarce and occupy bowl-like depressions without run-off. In the spring and autumn periods, therefore, these associations are inundated for long periods. Their particular feature is an exuberant growth of the willow *Salix cinerea* in the shrub layer and a large contribution in the herb layer of nonforest species. In the natural course of succession willow brushwood is a link between communities of the order *Molinietalia* or *Phragmitetalia* with *Alneta*.

Typical *Carici elongatae-Alnetum* develops always on peat soil formed from low peat. It is innundated in spring and autumn. Among the characteristic species *Carex elongata* shows the highest faith degree. Somewhat less strongly attached are *Ribes nigrum* and *Solonum dulcamara*. The water and soil relations differentiate the Dylewskie *Alneta* into the typical form of the association and the facies with *Equisetum limosum*.

Circae-Alnetum grows on soil rich in assimilable components, therefore fertile and productive. On account of the constant high ground water level these soils are gleyed. The presence and strong attachment of *Equisetum silvaticum*, *Circaea alpina* and *Carex remota* are characteristic for the flood plain in the Wzgórza Dylewskie.

Alnetum boreale covers the most fertile soils of this area, that is tchernozem alluvial soils exhibiting a thick humus layer with very good physico-chemical properties and water relations. Among the species considered as characteristic for the association by Oberdorfer (1953) only *Alnus incana* truly plays this role. Locally

Alnetum boreale is well characterised by *Chaerophyllum bulbosum* and *Polygonum dumetorum*.

Tilio-Carpinetum is very frequent on this area. Their substrate mostly consists of acid brown soil, less frequently of leached or typical brown soil, sometimes even of brown alluvial and pseudogley soils.

This syntaxon is differentiated into the following subassociations: *Tilio-Carpinetum corydyletosum*, *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*, *Tilio-Carpinetum laethyretosum verni*, *Tilio-Carpinetum caricetosum pilosae* and *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum arundinaceae*.

These units have a common feature, the frequent presence of 9 species characteristic for the association and the alliance *Carpinion betuli*: *Carpinus betulus*, *Tilia cordata*, *Evonymus verrucosa*, *Stellaria holostea*, *Dactylis aschersoniana*, *Carex pilosa*, *Melampyrum nemorosum*, *Ranunculus cassubicus* and *Lathraea squamaria*.

The particular subassociations include a number of variants and subvariants (Tables 21, 22, 25, 29, 30, 34, 38).

It was easy to classify the examined hornbeam forests to the association *Tilio-Carpinetum* according to the suggestion of Traczyk (1962). It was not possible, however, to reach a decision as to their appurtenance to one of the three geographical varieties distinguished by this author.

Melico-Fagetum occupies the highest part of the Dylewska Mountain and grows mostly on clayey, less frequently sandy-clayey acid or leached brown soils. Within this group 3 subassociations were distinguished: *Melico-Fagetum mercurialetosum perennis*, *Melico-Fagetum typicum* and *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae*.

The phytocenosis *Melico-Fagetum mercurialetosum* overgrows the stony northern slopes and shady ravine bottoms. Its substrate is acidic brown soil. The syntaxon is characterised by mixed stands of many species and the presence in the herb layer of a number of eutrophic species. For *Melico-Fagetum typicum* beech stands are typical. In the herb layer an important role is played by *Melica uniflora* nad *Festuca silvatica*; *Elymus europaeus* is also frequent. *Melico-Fagetum festucetosum silvaticae* is the poorest form of this association. In the soil a leaching process appears. In the herb layer *Festuca silvatica* is dominant and some coniferous forest species grow, whereas elements of the alliance *Alno-Padion* are lacking.

Trientali-Fagetum grows on the crests of the domed moraine eminences with gray grown podzolic soil. The forest floor is poorly covered with herbs with a large contribution of bryophytes.

Fago-Quercetum petraeae covers sandy-loamy not very moist gray brown podzolic soils in the forest range Zajączki and Dylewo. The beech dominates in the stand with pine and common oak. Species of the order *Quercetalia robori-petraeae* and coniferous forest elements predominate in the herb layer.

Sphagno girgensohni-Piceetum develops on peat very seldom and fragmentarily. The substrate consists of a thin *Sphagnum* peat layer in depressions without run-off.

Querco-Piceetum overgrows the bottom of deep ravines with gley soil. Most characteristic for the herb layer are: *Plagiochila asplenioides*, *Lycopodium annotinum* and *Bazzania trilobata*. The spruce has here optimal conditions for development.

Sambuco racemosi-Piceetum occupies the largest area among all the associations studied. Its substrate always contains sandy-clayey brown leached or acidic soils. In the floristic composition noteworthy is the constant presence and high attachment of *Sambucus racemosa*, *Dryopteris austriaca* and *Rubus bellardii*. Within the association were distinguished the variant with *Phegopteris polypodioides* — usually developing in contact with *Melico-Fagetum*, the typical variant mostly in the neighbourhood of *Tilio-Carpinetum*, the variant with *Deschampsia flexuosa* — the form of the association most characteristic for coniferous forests.

On the basis of the distinguished association soil studies were performed, the morphology was described and basic laboratory analyses were carried out for 28 soil profiles. Their aim was to establish the true variability of the soil cover in the forests examined and the correlations between the vegetal cover and the substrate.

Phytosociological studies revealed the ecological amplitude of numerous forest plant species, and allowed to estimate more accurately the diagnostic value of those species which are characteristic for the distinguished associations.

In the characteristic of the forest associations the biological structure of the forest stands is presented according to the method of Paczowski (1928) and the coefficients of coverage were calculated for woody species (Table 71). The results give ample information on the role of woody species in the Dylewskie Forests.

The lines of development of the forest associations were traced on the basis of habitat and floristic relations. The main course of changes which is noticeable in the development of the associations under study is as a rule unidirectional, but it runs along various lines.

Problems of nature protection on this area should be given more attention. The only reservation existing to date, „Jezioro Francuskie”, hardly protects the most valuable natural objects of this area. It is suggested in this connection to bring under legal protection four other reservations. The following objects fully merit protection: *Melico-Fagetum* on the slopes of Dylewska Mountain, the forest range Szyldak with a very interesting relict form of fertile *Tilio-Carpinetum*; the sections 170, 171 and 184 of the range Wygoda with natural fragments of *Tilio-Carpineta*. *Metico-Fagetum* and mixed spruce forest and the *Alnetum boreale* in section 33 of the range Domkowo II.

LITERATURA

- Abromeit J., 1898-1940, Flora von Ost- und Westpreussen, Berlin.
- Antoniewicz J., i inni, 1953, Historia (region Mazury). W pracy „Warmia i Mazury” Cz II: 151-203 Instytut Zachodni, Poznań.
- Bodeux A., 1955, *Alnetum glutinosae*, *Mitteil.* d. Florist.-soziol. Arbeitsgemeinschaft, N. F., 5: 114-137 Stolzenau/Weser.
- Boińska U., 1970, Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne uroczysk Podgórze i Nakwasin w nadleśnictwie Płock. Stud. Soc. Sci. Tor., Sectio D, 9, 2: 1-57, Toruń.
- Boiński M., 1973, Lasy liściaste środkowej części Pojezierza Krajeńskiego, Stud. Soc. Sci. Tor., Sectio D, 9(5): 1-105, Toruń.
- Boiński M., Boińska U., 1968, Stosunki fitosocjologiczne projektowanego rezerwatu wiązowego w Grocholinie, Zesz. nauk. UMK, Mat.-Przyr. 21: 139-158, Toruń.
- Buczek K., 1936, Geograficzno-historyczne podstawy Prus Wschodnich. W pracy „Dzieje Prus Wschodnich”, Wyd. Inst. Balt., Toruń.
- Bujak J., 1839, Botanische Skizzen, Prov. Blätt., 21.
- Celiński F., 1962, Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem, Mon. Bot., 13, suppl.: 1-207. Warszawa.
- Celiński F., 1964, The mesophilous deciduous forests of the „Puszcza Bukowa” territory near Szczecin, Ekol. pol. 12(31): 555-596, Warszawa.
- Celiński F., 1965, Acidophilous forests of „Puszcza Bukowa” near Szczecin, Ekol. pol. 13(13): 196-224, Warszawa.
- Celiński F., Filipiek M., 1955, Rezerwat „Dębina” pod Wągrowcem. Ochr. Przyr., 23: 255-282, Kraków.
- Celiński F., Piaczyńska M., 1966, Lasy bagienne i wilgotne okolic Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, Bad. fizjogr. nad Pol. zach., 18: 111-154, Poznań.
- Czerwiński A., 1973, Lasy dębowo-świerkowe Działu Północnego, Pr. Białost. Tow. Nauk. 19: 135-203.
- Czerwiński A., 1977, Świerczyny niżowe północno-wschodniej Polski, [w:] Nasze drzewa leśne; Świerk pospolity (*Picea abies* (L.) Karst), pod red. S. Białoboka, 5: 372-404.
- Czubiński Z., 1948, Stosunki florystyczne południowo-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego, PTPN 9(3): 1-65, Poznań.
- Czubiński Z., 1950, Zagadnienia geobotaniczne Pomorza, Bad. fizjogr. nad Pol. zach. 2(4): 439-658, Poznań.
- Czuraj M., 1963, Pomiar drzew i drzewostanów, PWRiL, wyd. II, Warszawa.
- Denisiuk Z., 1963, Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej, PTPN 27(2): 1-132, Poznań.
- Dziubałtowski S., 1928, Étude phytosociologique du Massif de S-te Croix. I, Acta Soc. Bot. Pol. 5: 1-42, Warszawa.
- Dziubałtowski S., Kobendza R., 1933, Badania fitosocjologiczne w Górach Świętokrzyskich, II, Acta Soc. Bot. Pol. 10(2): 129-177, Warszawa.

- Dziubałtowski S., Kobendza R., 1934, Badania fitosocjologiczne w Górach Świętokrzyskich, III. Acta Soc. Bot. Pol., 11 Suppl.: 217-246.
- Faber A., 1936, Über Waldgesellschaften auf Kalksteinböden und ihre Entwicklung im Schwäbisch-Fränkischen Stufenland und auf der Alb. Jahresber. dtsch. Forstver., Württ.
- Fabijanowski J., Zarzycki K., 1965, Roślinność rezerwatu leśnego „Świnia Góra” w Górach Świętokrzyskich, Acta Agr. Silv., Ser. leśna 5: 61-103, Kraków.
- Faliński J. B., 1965, O roślinności Zielonej Puszczy Kurpiowskiej na tle stosunków geobotanicznych tzw. Działu Północnego, Acta Soc. Bot. Pol. 34(4): 719-752, Warszawa.
- Faliński J. B., 1966, Degeneracja zbiorowisk roślinnych lasu miejskiego w Ilawie, Mat. Zakł. Fitosoc. Stosowanej, UW, 13: 3-13, Warszawa-Białowieża.
- Faliński J. B., Falińska K., 1965, Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego „Dolina rzeki Walszy” (Wzniesienia Górowskie), Mat. Zakł. Fitosoc. Stosowanej, UW, 7: 5-83, Warszawa-Białowieża.
- Faliński J. B., Matuszkiewicz Wł., 1965, Charakterystyka geobotaniczna regionu Wzniesień Górowskich, Mat. Zakł. Fitosoc. Stosowanej, UW, 8: 3-29, Warszawa-Białowieża.
- Ferchmin M., 1966, Zespoły leśne nadleśnictwa Laski pod Kępem, PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Leśnych 21(1): 51-92, Poznań.
- Firbas F., 1949, 1952, Waldgeschichte Mitteleuropas, I, II, Jena.
- Galon R., 1937, Klimat Pomorza i Prus Wschodnich. Słownik Geograficzny. Warszawa.
- Galon R., 1961, Extents of the Scandinavian Glaciations and of the Recessions Stages on the territory of Poland, Prz. geogr., 33(3).
- Galon R., 1972, Geomorfologia Polski, II; 129-156, PWN, Warszawa.
- Górski K., 1946, Państwo krzyżackie w Prusach, Gdańsk-Bydgoszcz.
- Gross H., 1935, Der Döhlauer Wald in Ostpreussen, Beih. Bot. Cbl. 53/B: 405-431.
- Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Prz. meteor. 1.
- Hohendorf E., 1956, Klimat Pojezierza Mazurskiego a potrzeby rolnictwa, Zesz. nauk. WSR w Olsztynie, 1: 55-88, Warszawa.
- Hohendorf E., 1961, Klimat, W pracy „Poradnik dla rolników ziem północno-wschodnich”, 9-15, PWRIŁ, Warszawa.
- Hutorowicz J., 1963, Szata roślinna rezerwatów „Dębowego” i „Bukowego” w woj. olsztyńskim, Zesz. nauk. WSR 16(294): 295-315, Olsztyn.
- Izdabski K., 1962, Bory na Roztoczu Środkowym, Ann. UMCS, C 17(10): 313-361, Lublin.
- Izdabski K., 1962b, Grądy na Roztoczu Środkowym, Ekol. pol., A 10(18): 523-584, Warszawa.
- Izdabski K., 1963, Olsy i bory mieszane na Roztoczu Środkowym, Ann. UMCS, C 18(14). Lublin.
- Izdabski K., 1966, Zbiorowiska leśne na Roztoczu Południowym, Ann. UMCS, C 21(16): 203-246, Lublin.
- Izdabski K., 1967, Zbiorowiska leśne na Roztoczu Zachodnim, Ann. UMCS, C 22(18): 235-266, Lublin.
- Jasnowski M., 1962, Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego, Szczec. Tow. Nauk., Wyd. Nauk Przyr.-Roln. 10: 1-340, Szczecin.
- Jutrzenka-Trzebiatowski A., 1968, Zespoły roślinne lasów liściastych i borów mieszanych nadleśnictwa Sulęcyno w pow. Kartuskim, Zesz. nauk. WSR 24(629): 261-307, Olsztyn.

- Jutrzenka-Trzebiatowski A., 1969, Lasy liściaste i mieszane nadleśnictwa Susz na Pojezierzu Iławskim, Maszynopis.
- Kaczorowska Z., 1950, Klimat Prus Polskich, [w:] Gospodarstwo wiejskie na ziemiach zachodnich i północnych, I, Warszawa.
- Kępczyński K., 1965, Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej, Toruń.
- Kępczyński K., Boiński M., Ceynowa M., 1967, Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu leśnego z brekinią (*Sorbus torminalis*) w Wąwelnie na terenie Borów Tucholskich, Zesz. nauk. UMK, Mat.-Przyr. 17(10): 207-244, Toruń.
- Kępczyński K., Michalska J., 1967, Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu „Wielka Kępa Ostromecka i Las Mariański”, Stud. Soc. Sci. Tor. D, 7(6): 1-56, Toruń.
- Kępczyński K., Wilkoń-Michalska J., 1967b, Roślinność rezerwatu „Ostrów Panieński” koło Chelmina, Zesz. nauk. UMK 17(10): 187-205.
- Kępczyński K., Noryśkiewicz A., 1968, Zespoły lasów liściastych leśnictwa Wronie, pow. Wąbrzeźno, Zesz. nauk. UMK 21: 97-129, Toruń.
- Kępczyński K., Noryśkiewicz B., 1968, Roślinność i historia torfowiska Fletnowo w pow. grudziądzkim. Zesz. nauk. UMK 21: 49-95, Toruń.
- Klika J., 1955, Nauka o roslinnych společenstvech (Fytocenologie), Praha.
- Kondracki J., 1952, Uwagi o ewolucji morfologicznej Pojezierza Mazurskiego, Biul. PIG 65. Z badań czwartorzędu w Polsce, I, Warszawa.
- Kondracki J., 1967, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
- Kornaś J., 1968, Der Linden-Eichen-Heinbuchen-Wald (*Tilio-Carpinetum*) in der polnischen Karpaten. Feddes Repert. B 77(2), Berlin.
- Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., 1967, Zespoły roślinne Gorców, I, Naturalne i na wół naturalne zespoły nieleśne. Fragm. Flor. et Geobot. 13(2): 167-316, Kraków.
- Kostrowicki J., 1961, Środowisko geograficzne Polski, PWN, Warszawa.
- Kozak K., 1967, Olsy, grądy i bory mieszane nadl. Parczew. Ann. UMCS, C 22(21): 329-358, Lublin.
- Krotoska T., 1953, Zespoły leśne Parku Natury w Pronnie pod Poznaniem. PTPN, Pr. Kom. Biol. 14(3): 63-113, Poznań.
- Krotoska T., 1966, Lasy dębowo-grabowe Wielkopolski, PTPN, Pr. Kom. Biol. 31: 3-145, Poznań.
- Krotoska T., Pawłow M., Piotrowska H., 1965, Grądy środkowej Wielkopolski, Bad. fizjogr. nad Pol. zach. 16: 77-121, Poznań.
- Krotoska T., Piotrowska H., 1962, Dąbrowy na glebach „typu krotoszyńskiego”, Bad. fizjogr. nad Pol. zach. 10: Poznań.
- Królikowski L. (red.) 1969, Klasyfikacja gleb leśnych Pol. Tow. Gleb. II (Wyd. techn. powielaczową), Warszawa.
- Łowmiański H., 1935, Prusy pogańskie, [w:] Dzieje Prus Wschodnich. I(2): 1-56, Wyd. Inst. Balt., Toruń.
- Łowmiański H., 1947, Polityka ludnościowa zakonu niemieckiego w Prusach i na Pomorzu, Wyd. Inst. Balt. 1-72, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin.
- Łowmiański H., 1953, Prusowie i państwo krzyżackie, [w:] Warmia i Mazury, I: 93-120, Poznań.
- Mager F., 1960, Der Wald in Altpreußen als Wirtschaftsraum, I, Köln.
- Matuszkiewicz A., 1958, Materiały do fitosocjologicznej systematyki buczyn i pokrewnych zespołów (związku *Fagion*) w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 27(4): 675-725, Warszawa.
- Matuszkiewicz Wł., 1952, Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego, Ann. UMCS, C Suppl. 6: 1-218, Lublin.

- Matuszkiewicz W., 1966, Potencjalna roślinność naturalna wybranych obiektów leśnych w nadleśnictwie Kartuzy, *Mat. Zakł. Fitosoc. Stos. UW*, 10: 4-10, Warszawa-Białowieża.
- Matuszkiewicz W., 1967, Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski, [w:] Scamoní A. Wstęp do fitosocjologii praktycznej: 175-229, PWRiL, Warszawa.
- Matuszkiewicz Wł., Borowik M., 1957, Materiały do fitosocjologicznej systematyki lasów łęgowych w Polsce, *Acta Soc. Bot. Pol.* 26(4): 719-756, Warszawa.
- Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A., 1967, Zespoły roślinne Karkonoskiego Parku Narodowego. I, Zbiorowiska leśne, *Pr. Wrocł. Tow. Nauk.*, B, 135: 5-98, Wrocław,
- Matuszkiewicz Wł., Polakowska M., 1955, Materiały do fitosocjologicznej systematyki borów mieszanych w Polsce, *Acta Soc. Bot. Pol.* 24(2): 421-458, Warszawa.
- Matuszkiewicz W., Traczyk H., Traczyk T., 1958, Materiały do fitosocjologicznej systematyki zespołów olsowych w Polsce, *Acta Soc. Bot. Pol.* 27(1): 21-44, Warszawa.
- Medwecka-Kornaś A., 1952, Zespoły leśne Jury Krakowskiej, *Ochr. Przyr.* 20: 133-236, **Kraków**.
- Medwecka-Kornaś A., 1955, Zespoły leśne Górców, *Ochr. Przyr.*, 23: 1-111.
- Medwecka-Kornaś A., 1972, Zespoły leśne i zaroślowe, [w:] *Szata roślinna Polski*, pod red. W. Szafera, I: 383-441, PWN, Warszawa.
- Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., 1963, Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego, *Och. Przyr.* 29: 17-88, **Kraków**.
- Mielcarski Cz., 1969, Lasy liściaste okolic Cieczewa nad Wartą, *Bad. fizjogr. nad Pol. zach.* 22: 69-111, Poznań.
- Młynek T., Polakowski B., 1960, Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu „Jar Branicy”, *Zesz. nauk. WSR* 10(97): 275-310.
- Mowszowicz J., Olaczek R., Sowa R., Urbanek H., 1967, Rezerwat lipy szerokolistnej (*Tilia platyphyllos* Scop.) w uroczysku Dębowiec, *ŁTN*, Pr. Wyd. III 102: 8-67, **Łódź**.
- Mowszowicz J., Olaczek R., Sowa R., Urbanek H., 1969, Zespoły roślinne uroczyska Żądłowice, *ŁTN*, Pr. Wyd. III 105: 1-42, **Łódź**.
- Mroczkiewicz L., 1952, Podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne, *Pr. IBL* 80: 1-120, Warszawa.
- Mróz L., 1946, Sprawa lasów Pomorza Wschodniego, *Wyd. Inst. Bałt.*: 1-57, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin.
- Oberdorfer E., 1953, Der europäische Auenwald, *Beitr. z. naturkundl. Forschung in Südwestdeutschland* 12(1): 23-70, Karlsruhe.
- Oberdorfer E., 1957, Süddeutsche Pflanzengesellschaften, *Pflanzensoziologie*, 10: 1-564, Jena
- Olaczek R., 1965, Rezerwat jodłowy Murowaniec, *Zesz. nauk. UŁ, Ser. II*, 18: 113-130, **Łódź**.
- Paczoski J., 1928, Biologiczna struktura lasu, *Sylwan* 46: 193-221, 401-438, **Lwów**.
- Pawłowski B., 1972, Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania, [w:] *Szata roślinna Polski*, pod red. W. Szafera, I: 237-269, PWN, Warszawa.
- Petrenz H., 1932, Pollenanalytische untersuchungen im Westgebiet des ostpreussischen Landrückens, *Unser Ostland* 2(4).
- Piaścik H., Wocławek T., 1964, Gleby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego WSR w Olsztynie-Lipowo, *Zesz. nauk. WSR* 17(354): 633-644.
- Piaścik H., Wocławek T., 1968, Rolnicza charakterystyka gleb Zakładu Doś-

- wiadczalnego WSR w Olsztynie-Zajęczki. Zesz. nauk. WSR w Olsztynie 24(614): 25-63, Olsztyn.
- Piotrowska H., 1950, Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego, PTPN 2(5): 1-31, Poznań.
- Piotrowska H., 1955, Zespoły leśne wyspy Wolina, PTPN 16(5): 223-290.
- Piotrowska H., 1960, Lasy południowo-wschodniego Uznamu, Bad. fizjogr. nad Pol. zach. 6: 69-157, Poznań.
- Piotrowska H., 1966, Stosunki geobotaniczne wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu, Mon. Bot. 22: 3-155, Warszawa.
- Piotrowska H., Żukowski W., 1967, Bory mieszane i lasy mieszane Wolińskiego Parku Narodowego, Bad. fizjogr. nad Pol. zach. 20: 45-57.
- Polakowski B., 1961, Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne Puszczy Boreckiej ze szczególnym uwzględnieniem lasów leśnictwa Lipowo i Walisko, Stud. Soc. Sci. Tor. 5: 1-346.
- Polakowski B., 1962, Bory świerkowe na torfowiskach (zespół *Piceo-Sphagnetum Girsensohnii*) w północno-wschodniej Polsce, Fragm. Flor. et Geobot. 8(2): 139-156, Kraków.
- Polakowski B., 1963, Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego, Zesz. nauk. WSR w Olsztynie, 15(247): 3-153, Olsztyn.
- Polakowski B., 1966, Pomnikowy drzewostan modrzewiowy w rezerwacie „Lenki” na Pojezierzu Mazurskim, Rocz. dendr. 20: 76-92, Warszawa.
- Polakowski B., 1968, Interesująca postać lasów wierzbowych na Pojezierzu Mazurskim, Fragm. Flor. et Geobot. 14(2): 423-432, Kraków.
- Polakowski B., 1968b, Stan i potrzeby sieci rezerwatów roślinnych w województwie olsztyńskim, Zesz. nauk. WSR w Olsztynie 24(612): 3-18, Olsztyn.
- Polakowski B., Jutrzenka-Trzebiatowski A., 1976, Lasy olchowe na Pojezierzu Iławskim, maszynopis.
- Rejewski M., 1971, Lasy liściaste ziemi chełmińskiej, Stud. Soc. Sci. Tor., D 9(3): 3-118, Toruń.
- Rejewski M., Mejnartowicz L., 1968, Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu „Las Piwnicki” koło Torunia, Zesz. nauk. UMK, Mat.-Przyr. 21: 209-231, Toruń.
- Romer E., 1949, Regiony klimatyczne Polski, Pr. Wrocł. Tow. Nauk., B 16: 5-27, Wrocław
- Rubner K., 1960, Die pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaues, Neumann Verlag, Radebeul i Berlin.
- Sokołowski A. W., 1963, Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej, Mon. Bot. 16: 1-176, Warszawa.
- Sokołowski A. W., 1963b, Zespoły leśne nadleśnictw Resko-Wschód, Resko-Zachód i Łobez w województwie szczecińskim, Pr. IBL 263.
- Sokołowski A. W., 1965, Zespoły leśne nadleśnictwa Laska w Borach Tucholskich, Fragm. Flor. et Geobot. 9(1): 97-119.
- Sokołowski A. W., 1966, Roślinność rezerwatu leśnego „Dębowo” w nadleśnictwie Sadłowo w województwie olsztyńskim, Pr. IBL 303: 3-44, Warszawa.
- Sokołowski A. W., 1966b, Fitosocjologiczna charakterystyka borów świerkowych w Puszczy Białowieskiej, Pr. IBL 304: 46-69, Warszawa.
- Sokołowski A. W., 1966c, Fitosocjologiczna charakterystyka borów iglastych Puszczy Augustowskiej, Pr. IBL 306: 108-125, Warszawa.
- Sokołowski A. W., 1968, Sosnowo-świerkowy bór mieszany (zespół *Calamagrosti arundinaceae-Piceetum*) w północno-wschodniej Polsce. Pr. IBL 350: 215-232, Warszawa.

- Sokołowski A. W., 1968b, Zespoły leśne nadleśnictwa Suwałki w Puszczy Augustowskiej, Pr. IBL 349: 171-213, Warszawa.
- Sokołowski A. W., 1969, Zespoły leśne nadleśnictwa Balinka w Puszczy Augustowskiej, Mon. Bot. 28: 3-80, Warszawa.
- Sowa R., Szymański J., 1966, Rezerwat jodłowy Jamno, Zesz. nauk, UŁ, Ser. II 22: 105-119, Łódź.
- Steffen H., 1931, Vegetationskunde von Ostpreussen, Pflanzensoziologie 1: III-XIV+406, Jena.
- Stypiński P., Udział lipy drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.) oraz jej rola w drzewostanach Pojezierza Mazurskiego, Cz. I, Zarys historii lipy drobnolistnej na Pojezierzu Mazurskim w okresie polodowcowym, Roczn. dendr. 27: 97-111, Warszawa.
- Stypiński P., 1973b, Występowanie lipy drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.) w lasach państwowych Pojezierza Mazurskiego, Sylwan 8: 9-20, Warszawa.
- Stypiński P., 1974, Warunki występowania i udział lipy drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.) w zespołach leśnych Pojezierza Mazurskiego, Fragm. Flor. et Geobot. 20(3): 345-364, Kraków.
- Sulma T., 1959, Główne problemy botaniczne Pomorza, Soc. Scient. Gedan. Acta Biol. et Med. 3(2): 19-73, Gdańsk.
- Sulma T., Tokarz H., 1960, Zagadnienie ochrony buka i lasów bukowych na ziemiach pomorskich, Przycz. Pol. Zach. 4(3-4), Poznań.
- Szafer W., 1972, Szata roślinna Polski Niżowej, [W:] Szata roślinna Polski, 2: 17-188, PWN, Warszawa.
- Szafer W., Kulczyński St., Pawłowski B., 1967, Rośliny polskie, PWN.
- Szafran B., 1957, 1961, Mchy (*Musci*), I, II, PWN, Warszawa.
- Szweykowski J., 1958, Prodrum Florae Hepaticarum Poloniae, PTPN, Pr. Kom. Biol. 19: 5-596, Poznań.
- Śpiwakowski R., Kępczyńska M., 1974, *Aegopodio-Petasitetum hybridi* R. Tx. 1949 na terenie województwa koszalińskiego, Fragm. Flor. et Geobot. 20(3): 339-343, Kraków.
- Thomaschewski M., 1933, Historia lasów na Pomorzu w świetle analizy pyłkowej, Roczn. Nauk rol. i leśn. 29(1): 1-26, Poznań.
- Tokarz H., 1961, Zespoły roślinne Wysoczyzny Elbląskiej, Soc. Scient. Gedan., Acta Biol. et Med. 5(7): 121-244, Gdańsk.
- Tokarz H., 1964, Zespół *Carici elongatae-Alnetum* w nadleśnictwie Elbląg na Wysoczyźnie Elbląskiej, Soc. Scient. Gedan., Acta Biol. et Med. 8: 271-296, Gdańsk.
- Tokarz H., 1967, Materiały do postglacjalnej historii lasów na Wysoczyźnie Elbląskiej, Soc. Scient. Gedan., Acta Biol. et Med. 11: 341-361.
- Tokarz H., 1971a,b, Zbiorowiska leśne z udziałem buka (*Fagus silvatica*) w obszarze północno-wschodniej granicy jego zasięgu, I i II, Soc. Scient. Gedan., Acta Biol. et Med. 15(3): 227-274+275-294, Gdańsk.
- Tokarz H., 1976, Zbiorowiska leśne z udziałem buka (*Fagus silvatica*) w obszarze północno-wschodniej granicy jego zasięgu, III, IV, Soc. Scient. Gedan., Acta Biol. 1: 5-22+23-52, Gdańsk.
- Tomanek J., 1955, Meteorologia i klimatologia dla leśników, PWRiL.
- Traczyk T., 1962, Materiały do geograficznego różnicowania grądów w Polsce, Acta Soc. Bot. Pol. 31(2): 275-304, Warszawa.
- Traczyk T., 1962b, Próba podsumowania badań nad ekologicznym różnicowaniem grądów w Polsce, Acta Soc. Bot. Pol. 31(4): 621-635, Warszawa.
- Tumiłowicz J., 1966, Jodła pospolita (*Abies alba* Mill.) w lasach Krainy Mazursko-Podlaskiej, Sylwan 5: 1-17, Warszawa.

- Tüxen R., 1937, Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands, Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. 3: 3-170, Hannover.
- Tüxen R., 1955, Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften, Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 5: 155-176, Stolzenau/Weser.
- Uggla H., 1965, Gleboznawstwo leśne szczegółowe, PWRiL Warszawa.
- Uggla H. i inni, 1964, Gleby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego-Balcyny, Zesz. Nauk. WSR Olszt. 17(352): 599-619, Olsztyn.
- Urbanek H., 1966, Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków, Cz. I, Zespoły olchowe i łęgowe, Acta Soc. Bot. Pol. 35(1): 79-110, Warszawa.
- Urbanek H., 1966b, Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków, Cz. II, Zespoły grądowe, Acta Soc. Bot. Pol. 35(4): 511-528, Warszawa.
- Urbanek H., 1966c, Zespoły borowe województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków, Zesz. nauk. UŁ, Ser. II, 22: 91-103, Łódź.
- Walas J., 1953, Roślinność, [w:] Warmia i Mazury, I: 35-60, Poznań.
- Walter H., 1962, Die Vegetation der Erde in ökologischer Betrachtung, I. Jena.
- Wiszniewski W., 1953, Atlas opadów atmosferycznych w Polsce 1891-1930, PIHM, Wyd. Kom.: 55pp + 14 map, Warszawa.
- Witkowska J., 1938, Analiza pyłkowa torfowisk Pojezierza Brodnickiego, Spraw. PTPN 3: 227-231, Poznań.
- Wojterska H., Wojterski T., 1953, Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem, PTPN, Pr. Kom. Biol. 14(4): 114-240, Poznań.
- Wojterski T., 1960, Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce, PTPN, Pr. Kom. Biol. 23(3): 245-472, Poznań.
- Żabko-Potopowicz A., Zagadnienie lasów w Polsce przed rozbiorami od schyłku XV do połowy XVII w., Sylwan 5: 364-388, Warszawa.
- Żabko-Potopowicz A., 1959, Dotychczasowy stan badań nad rozmieszczeniem lasów i zasięgiem poszczególnych gatunków drzew w Polsce do połowy XII w., Sylwan 2: 1-34, Warszawa.