MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. LXII, 1981

JAN MAREK MATUSZKIEWICZ

POTENCJALNE ZBIOROWISKA ROŚLINNE
I POTENCJALNE FITOKOMPLEKSY
KRAJOBRAZOWE
PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

Potential plant communities
and landscape phytocomplexes
of Northern Mazovia

Redaktor: R. Olaczek

WARSZAWA

Wydano z pomocą finansową
Polskiej Akademii Nauk

Praca pod redakcją Z. Podbielkowskiego

REDAKTOR NACZELNY: R. Olaczek (Łódź)

RADA REDAKCYJNA

W. Matuszkiewicz (Warszawa), Z. Podbielkowski (Warszawa),
E. Sidorkiewicz (Warszawa), R. Olaczek (Łódź), K. Rostański (Katowice),
W. Żukowski (Poznań), H. Piotrowska (Gdańsk)

ADRES REDAKCJI: al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

© Copyright by Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Warszawa 1982

ISBN 83-01-02911-0
ISSN 0077-0655

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	5
II. Problematyka i cel pracy	6
III. Krótka charakterystyka terenu objętego opracowaniem	10
IV. Potencjalne zbiorowiska roślinne północnego Mazowsza	15
1. Uwagi wstępne	15
2. Metoda kartowania potencjalnych zbiorowisk roślinnych	16
3. Charakterystyka jednostek potencjalnej roślinności naturalnej przedstawionej na mapie	18
4. Rozmieszczenie potencjalnych zbiorowisk roślinnych na badanym terenie	36
V. Potencjalne fitokompleksy krajobrazowe północnego Mazowsza	40
1. Określenie jednostki i rozważania ogólne	40
2. Zasady wydzielania potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych	46
3. Praktyczne wydzielenie potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych na badanym terenie	53
4. Klasyfikacja potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych badanego obszaru	55
VI. Próba podziału geobotanicznego badanego terenu	69
Summary	75
Literatura	77

I. WSTĘP

Jednym z ważniejszych zadań fitosocjologii w Polsce w bieżącej chwili jest opracowanie przeglądowej mapy potencjalnej roślinności naturalnej całego kraju. Stopień zaawansowania prac na tym zagadnieniu pozwala sądzić, że już w stosunkowo niedługim czasie (to znaczy w ciągu kilku lat) mapa ta zostanie wykonana. Prace przy jej opracowaniu prowadzone są przez wielu fitosocjologów z różnych ośrodków w Polsce przy dużym nakładzie sił i środków. Duże nadzieje związane z tą mapą wynikają z oczekiwanej wartości naukowej, a także praktycznej i uzasadniają trud wkładany przez poszczególnych badaczy, jak również ponoszone przez Państwo koszty.

Biorąc udział w opracowaniu wyżej wspomnianej mapy, prowadziłem, między innymi, w latach 1972-1974 badania potencjalnej roślinności naturalnej na obszarze północnego Mazowsza. Podstawowym celem prac było wykonanie mapy potencjalnych zbiorowisk roślinnych określonego wycinka Polski, co też w pracy zostało zaprezentowane.

Niejako przy tej okazji zająłem się zagadnieniem struktury organizacyjnej roślinności, a szczególnie zróżnicowaniem roślinności na jednostki krajobrazowe, zwane tu fitokompleksami krajobrazowymi. Wykonana została mapa potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych badanego terenu oraz przedstawiono wnioski metodyczne i teoretyczne wynikające z przeprowadzonych badań tego poziomu organizacji roślinności.

Syntezą badań nad zróżnicowaniem potencjalnej roślinności naturalnej na badanym terenie jest propozycja podziału geobotanicznego tego obszaru.

Wykonując pracę korzystałem z pomocy wielu Osób, którym w tym miejscu chciałbym złożyć podziękowania. W szczególności dziękuję Prof. dr Władysławowi Matuszkiewiczowi za opiekę merytoryczną i pomoc organizacyjną przy kartowaniu, a także za służeńie mi radą i pomocą w trakcie opracowania. Panom: Prof. dr Teofilowi Wojterskiemu, Prof. dr Andrzejowi

Kostrowickiemu i Prof. dr Januszowi Falińskiemu winien jestem wdzięczność za krytyczne, a twórcze uwagi odnośnie koncepcji opracowania i poszczególnych jego zagadnień, a także ostatecznego kształtu pracy. Wszystkim pracownikom Zakładu Fitosocjologii i Ekologii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję za udział w dyskusji nad założeniami, a następnie wynikami badań; wśród nich szczególnie dziękuję dr Anieli Matuszkiewicz także za przejrzenie maszynopisu pracy. Państwu: dr Joannie Plitowej, dr Anieli Matuszkiewicz i mgr Zdzisławowi Kliniewskiemu dziękuję za wykonanie czystorysów map.

II. PROBLEMATYKA I CEL PRACY

Problematyką pracy są zagadnienia struktury organizacyjnej i zmienności przestrzennej roślinności.

Zagadnienie struktury organizacyjnej roślinności jest przedmiotem zainteresowania fitosocjologii już od jej zarania. Stwierdzono już dawno, że roślinność, czyli ogół organizmów roślinnych występujących wspólnie na jakimś terenie, wykazuje pewną strukturę, to znaczy nie jest bezładną mieszaniną osobników, czy populacji roślinnych. Podstawową jednostką struktury organizacyjnej roślinności jest fitocenoza (patrz S c a m o n i 1967), czyli konkretne zbiorowisko roślinne, określane również jako płat zespołu (P a w ł o w s k i 1972). Fitocenoza będąc podstawową jednostką struktury roślinności jest równocześnie składnikiem szerszych układów ekologicznych, jakimi są biocenoza i ekosystem (biogeocenoza).

Zagadnienia związane ze zróżnicowaniem roślinności na poziomie fitocenoz są badane od dawna i dlatego na temat tego zróżnicowania wiemy już stosunkowo wiele. Z interesującego nas punktu widzenia możemy powiedzieć, że znamy już specyfikę tego rodzaju układów (przynajmniej w ogólnym zarysie), a także ich zróżnicowanie typologiczne na jednostki syntaksonomiczne. Również na temat przestrzennego zróżnicowania roślinności na poziomie fitocenoz wiemy już niejedno. Duża liczba prac fitosocjologicznych przedstawiających zmienność przestrzenną roślinności na mapach w różnych skalach jest tego najlepszym dowodem. Aktualnie prowadzone badania (także w niniejszej pracy) mają na celu pogłębienie i rozszerzenie wiadomości na ten temat w ramach wypracowanych już koncepcji ogólnych.

Przyjmując poziom fitocenozy za podstawową jednostkę organizacji roślinności, zastanowić się wypada czy jest to jedyny poziom organizacyjny, czy nie. Szereg danych z literatury fitosocjologicznej wskazuje, że oprócz fitocenoz wyróżnić można także inne poziomy, zarówno niższe, jak i wyższe. W niniejszej pracy interesować nas będą układy roślinności powyżej poziomu fitocenozy.

Wprowadzone przez T ü x e n a (1956) pojęcie krajobrazu roślinnego,

oznaczające pewien typ terenu wyróżniony ze względu na zróżnicowanie i tendencje rozwojowe roślinności występującej na danym obszarze, zakładać musi, nawet jeśli autor tego wyrażnie nie sformułował, istnienie konkretnych, wyodrębnionych układów fitocenoz o specyficznych cechach wyróżniających układ jako całość. Jeżeli można wyróżnić abstrakcyjne jednostki typologiczne roślinności, jakimi są krajobrazy roślinne, to oczekiwać należy, że w rzeczywistości przyrodniczej odpowiadają im jakieś realnie istniejące jednostki krajobrazowe. Podobnie wyróżnienie abstrakcyjnych jednostek syntaksonomicznych (zespołów i in.) jest możliwe tylko dlatego, że istnieją realne układy roślinne (fitocenozy, synuzja), których podobieństwo jest podstawą do wyróżniania jednostek typologicznych. Gdyby roślinność nie była wewnętrznie zorganizowana w pewne układy ekologiczne, wyróżnianie jednostek typologicznych takich jak syntaksy lub krajobrazy roślinne miałyby niewielki sens. Skoro więc fitosocjologowie badający przestrzenną zmienność roślinności wyróżniają abstrakcyjne krajobrazy roślinne (w literaturze polskiej: Wojterski et al., 1973), to jest to pewna wskazówka, że najprawdopodobniej w rzeczywistości przyrodniczej istnieją jakieś jakościowo odrębne układy roślinności obejmujące szereg różnych fitocenoz.

Z drugiej strony należy mieć na uwadze, stwierdzone przez geografę fizyczną, istnienie geokompleksów różnej rangi i wielkości, to znaczy naturalnych części epigeosfery (Isačenko 1965). Geokompleksy mogą być rozmaitej wielkości oraz mieć różną strukturę, ale zawsze są one konkretnie występującymi jednostkami składającymi się na ogół z mniejszych geokompleksów i równocześnie wchodzącymi w skład geokompleksów szerszych. W geografii fizycznej kompleksowej, której głównym przedmiotem badań są geokompleksy różnej rangi, wyróżnia się szereg klas wielkości geokompleksów. Autorzy reprezentujący różne szkoły naukowe niejednakowo ujmują poszczególne klasy wielkości geokompleksów, a także nadają im różne nazwy. Nie wchodząc tu w zagadnienia geograficzne, którymi nie zamierzam się zajmować, i odsyłając zainteresowanych do zwięzłej pracy Kondrackiego „Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej” (1976) dającej przegląd głównych poglądów na te kwestie, warto zwrócić uwagę, że ogromna większość geokompleksów posiada swoją składową roślinną. Powstaje teraz pytanie, czy roślinność pojedynczego geokompleksu jest w pewnym stopniu samodzielny i wyodrębniony układem ekologicznym, czy też nie. Na pytanie to można dać w każdym razie pozytywną odpowiedź, jeżeli ograniczymy swoje zainteresowania do najniższych jednostek podziału fizyczno-geograficznego. Najniższym jednostkom zróżnicowania epigeosfery — niezależnie od tego, jak je będziemy definiowali i nazywali: ekotopami (Troll 1950), geotopami (Schmithüsen, Netzel 1962/63), „płytkami”, komórkami krajobrazowymi, epifacjami, czy facjami — odpowiadają w hierarchii zróżnicowania roślin-

ności konkretne fitocenozy, które z całą pewnością można uznać za autonomiczne w pewnym stopniu układy ekologiczne.

Mając to na uwadze, a także stwierdzając powtarzalność określonych kompozycji przestrzennych zbiorowisk roślinnych, należy przyjąć za wysoce prawdopodobne, że roślinność wchodząca w skład geokompleksów poszczególnych szczebli może tworzyć odrębne układy ekologiczne. Tego typu roślinnymi układami ekologicznymi są, moim zdaniem, fitokompleksy krajobrazowe.

Fitokompleks krajobrazowy jest przestrzennym układem fitocenz realnie występującym w przyrodzie, charakteryzującym się pod względem struktury określonym zestawem zbiorowisk roślinnych specyficznie rozmieszczonych w przestrzeni. Charakterystyczną cechą struktury fitokompleksu krajobrazowego jest zonacja zbiorowisk roślinnych wynikająca ze zróżnicowania siedlisk w warunkach lokalnych. Niejednakowy stopień podobieństwa pod względem struktury pomiędzy poszczególnymi fitokompleksami krajobrazowymi stanowi podstawę wydzielania krajobrazów roślinnych, czyli typologicznych jednostek zróżnicowania roślinności na poziomie fitokompleksu krajobrazowego.

Fitokompleksy krajobrazowe wchodzą w skład biokompleksów krajobrazowych (analogicznie jak fitocenozy wchodzą w skład biocenz) i stanowią roślinną składową układów ekologicznych łączących wiele ekosystemów, określanych mianem fizjocenz (Wodiczko 1950) lub „krajobrazów” (patrz: Matuszkiewicz W. 1974). Zagadnienia związane ze zróżnicowaniem roślinności na poziomie organizacji omówione będą szerzej w dalszej części pracy, tu chciałbym tylko przedstawić ogólny schemat organizacji roślinności, traktowany jako teoretyczne założenie wyjściowe. Praca ma między innymi za zadanie wypełnić ten schemat konkretną treścią, oczywiście w pewnym tylko zakresie. Schemat organizacji roślinności przedstawia rycina 1.

Jak się wydaje, fitokompleks krajobrazowy jest układem uformowanym w pierwszym rzędzie przez warunki zewnętrzne w stosunku do układu, to jest przez warunki siedliska abiotycznego, a także przez działalność człowieka. Czynniki te decydują bowiem w znacznym stopniu o występowaniu takich, a nie innych poszczególnych fitocenz, a także o grupowaniu się fitocenz w przestrzeni. Niewątpliwie w obrębie fitokompleksu krajobrazowego zachodzą oddziaływania pomiędzy poszczególnymi fitocenzami, jaki jest jednak udział tych oddziaływań w integracji układu, trudno w tej chwili powiedzieć.

Sprawą wartą rozpatrzenia jest również zagadnienie jakim jednostkom fizyczno-geograficznym (to znaczy, jakiej klasie geokompleksów) odpowiadają fitokompleksy krajobrazowe. Dokładniejszą analizę tego zagadnienia pozostawić trzeba do czasu pełniejszego poznania specyfiki tych układów ekologicznych; na razie można powiedzieć, że fitokompleksy krajobrazowe odpowiadają najprawdopodobniej jednostkom fizyczno-

Ryc. 1. Schemat struktury organizacyjnej roślinności
Fig. 1. Schematic diagram of organization of vegetation

geograficznym określanym nazwami: mikrochora (Neef 1963), „miestność” (Basalykas, Šleinė 1965), mikroregion (Kondracki 1965, 1976), ekochora (Haase 1967), czy mniej precyzyjnie — krajobraz.

W niniejszej pracy mam zamiar zająć się strukturą (w znaczeniu formą) fitokompleksów krajobrazowych traktowanych jako autonomiczne

układy ekologiczne, natomiast inne zagadnienia związane z tym poziomem organizacji potraktowane będą raczej powierzchownie.

Ogólne rozważania na temat organizacji roślinności prowadzone będą w ramach problematyki dotyczącej tzw. potencjalnej roślinności naturalnej. Wprowadzone przez Tüxena (1965) pojęcie dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej oznacza hipotetyczny stan roślinności, jaki zostałby osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji w przypadku ustania działalności człowieka. Pojęcie roślinności potencjalnej (podobnie jak i roślinności rzeczywistej, pierwotnej i temu podobne) odnosi się w tym samym stopniu do zróżnicowania na poziomie fitokompleksu krajobrazowego, jak i do zróżnicowania na poziomie fitocenozy. Dlatego w niniejszej pracy, badając potencjalną roślinność naturalną na określonym terenie, uwzględniono potencjalne zbiorowiska roślinne i potencjalne fitokompleksy krajobrazowe, przy czym głównym zagadnieniem jest przestrzenne rozmieszczenie typów potencjalnych układów roślinności. Zupełnie inny stopień poznania zróżnicowania roślinności na poziomie fitocenozy i na poziomie fitokompleksów krajobrazowych spowodował nieco inne podejście do tych dwu grup zagadnień. Tym niemniej podstawowym wynikiem badania zróżnicowania roślinności potencjalnej na obu poziomach są prezentowane mapy.

Celem pracy jest:

- wyróżnienie, charakterystyka i typologia jednostek organizacji roślinności na poziomie krajobrazu zwanych fitokompleksami krajobrazowymi;
- analiza zmienności przestrzennej potencjalnej roślinności naturalnej na badanym terenie z uwzględnieniem organizacji roślinności w dwu poziomach układów;
- charakterystyka fitosocjologiczna badanego terenu pod względem potencjalnej roślinności naturalnej.

III. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

Teren objęty opracowaniem jest nieregularnym wycinkiem kraju zawartym między $55^{\circ}15'$ a $52^{\circ}15'$ szerokości geogr. pn. i między $19^{\circ}20'$ a $22^{\circ}20'$ długości geogr. wsch. Jego powierzchnia wynosi prawie 16 tys. km², co stanowi około 5% powierzchni Polski. Maksymalna rozciągłość w kierunku północ—południe wynosi ok. 110 km, a w kierunku wschód—zachód ok. 200 km. Wielkość i kształt terenu objętego opracowaniem są wynikiem ogólnopolskiego podziału prac nad opracowaniem mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski w skali 1 : 300 000 i przyjęcia arkusza mapy topograficznej jako podstawowej jednostki przy pracach kartograficznych.

Przeważająca większość terenu objętego opracowaniem kartograficz-

nym jest zaliczana w fizyczno-geograficznym podziale Europy (Kondracki 1965, 1968, 1977) do podprovincji Niziny Środkowopolskie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, przy czym największą część terenu stanowią obszary należące do makroregionu Nizina Północnomazowiecka.

Poniżej wymieniono jednostki podziału fizyczno-geograficznego według Kondrackiego (1977) objęte w większym lub mniejszym stopniu zasięgiem opracowania.

3. Obszar: Europa Zachodnia

315. Podprovincja: Pojezierze Południowobałtyckie

315.2. Makroregion: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

315.24. Mezoregion: Pojezierze Dobrzyńskie (część płd.-wsch.)

315.26. Mezoregion: Równina Urszulewska (wsch. skrawek)

315.3. Makroregion: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

315.36. Mezoregion: Kotlina Płocka (część wsch.)

315.5. Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie

315.57. Mezoregion: Pojezierze Kujawskie (skrawek wsch.)

318. Podprovincja: Niziny Środkowopolskie

318.1. Makroregion: Nizina Południowowielkopolska

318.15. Mezoregion: Wysoczyzna Kłódzka (skrawek wsch.)

318.6. Makroregion: Nizina Północnomazowiecka. Mezoregiony:

318.61. Wysoczyzna Płońska (prawie w całości)

318.62. Równina Raciąska (prawie w całości)

318.63. Wzniesienia Mławskie (bez części północnej)

318.64. Wysoczyzna Ciechanowska (prawie w całości)

318.65. Równina Kurpiowska (południowy skrawek)

318.66. Dolina Dolnej Narwi (część połud. i środkowa)

318.67. Międzyrzecze Łomżyńskie (część południowa i środkowa)

318.7. Makroregion: Nizina Środkomazowiecka. Mezoregiony:

318.71. Równina Kutnowska (część północna)

318.72. Równina Łowicko-Błońska (północno-zach. skrawek)

318.73. Kotlina Warszawska (część zachodnia i północno-wschodni skrawek)

318.74. Dolina Dolnego Bugu (w całości)

318.78. Równina Wołomińska (prawie w całości)

318.9. Makroregion: Nizina Południowopodlaska. Mezoregiony:

318.91. Podlaski Przełom Bugu (skrawek zachodni)

318.92. Wysoczyzna Kałuszyńska (część północna)

318.93. Obniżenie Węgrowskie (część północna)

318.94. Wysoczyzna Siedlecka (część północno-zachodnia)

8. Obszar: Europa Wschodnia

84. Prowincja: Niż Zachodniorosyjski

843. Podprovincja: Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie

843.3. Makroregion: Nizina Północnopodlaska

Badany teren może być traktowany jako typowy przykład wycinka niżu środkowej Polski. Jest to teren równinny, o na ogół niewielkich różnicach wysokości bezwzględnej, wyniesiony średnio na około 100 m n.p.m. Najwyżej położonymi terenami są obszary Wysoczyzny Kałuszyńskiej (maks. 220 m n.p.m.), a także Wysoczyzny Siedleckiej (maks. 218 m n.p.m.), Wzniesień Mławskich (maks. 211 m n.p.m.) oraz wzgórz Czerwonego Boru na Międzyrzeczu Łomżyńskim (maks. 182 m n.p.m.). Najniżej położone tereny znajdują się w Kotlinie Płockiej (min. 50 m n.p.m.) i Kotlinie Warszawskiej.

Względne różnice wzniesień są na ogół niewielkie, jednak obok niemal całkiem płaskich terenów spotykamy obszary o sporych różnicach wysokości. Na przykład na obszarze Wzniesień Mławskich różnice wysokości pomiędzy dnem dolin a szczytami wzgórz dochodzą do 80 m.

Przeważająca większość terenu została ukształtowana przez zlodowacenie środkowopolskie, jedynie tereny w okolicach Płocka i Gostynina objęte zostały przez fazę leszczyńską zlodowacenia bałtyckiego, czego pozostałością są występujące tam jeziora (tzw. Pojezierze Gostynińskie). Na ukształtowanie terenu, oprócz glacialnych procesów zlodowacenia środkowopolskiego, poważny wpływ miały procesy fluwialne interglacjału eemskiego, następnie procesy denudacji peryglacialnej i akumulacji eolicznej, a w końcu procesy erozji i akumulacji w holocenie.

Rzeźba omawianego terenu jest uformowana, z grubsza biorąc, przez trzy stadiały zlodowacenia środkowopolskiego (stadiały: Warty, Wkry i Mławy) i fazę leszczyńską zlodowacenia bałtyckiego. Każdemu z tych stadiałów odpowiadają ciągi wzgórz stref czołowomorenowych. Szczególnie wyraźne są moreny czołowe stadiału Mławy, tworzące w okolicach Żuromina i Mławy malownicze „góry”. Wzgórza moren czołowych innych stadiałów są w terenie również wyraźnie widoczne, np. stadiału Wkry w okolicach Płońska, Ciechanowa, Nasielska, Makowa Mazowieckiego i Ostrowi Mazowieckiej, stadiału Warty na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej, fazy leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego w okolicach Płocka.

Największą powierzchnię zajmują na badanym terenie wysoczyzny morenowe: Wysoczyzna Gąbińska, W. Płocka, W. Płońska, W. Ciechanowska, W. Nasielska, W. Siedlecka, W. Wyszowska, W. Makowska, W. Zambrowska i W. Ostrołęcka. Mniejszą powierzchnię zajmują tereny pradolin (Pradolina Dolnego Bugu i Wisły oraz Pradolina Raciąska) wypełnione utworami akumulacji rzecznej, zarówno dyluwialnej, jak i współczesnej. Na badanym terenie niewielkie tylko powierzchnie zajmują obszary sandrowe — skraj sandru kurpiowskiego i sandr na północny-zachód od Ciechanowa (Różycki 1972).

Sieć wodna badanego obszaru należy w całości do dorzecza Wisły i wykazuje koncentryczny układ w kierunku Kotliny Warszawskiej. Głównymi rzekami obszaru są: Wisła (ok. 80-kilometrowy odcinek środkowego biegu), Narew (ok. 100-kilometrowy odcinek dolnego biegu) i Bug (ok. 115-kilometrowy odcinek dolnego biegu), a z mniejszych — Skrwa, Wkra, Orzyc, Liwiec i Bzura.

Należy zaznaczyć, że z wyjątkiem Wisły, która otoczona jest częściowo wałami przeciwpowodziowymi, inne rzeki są prawie zupełnie nieuregulowane. Pewną zmianę w stosunku do pierwotnego biegu rzek stanowią zbiorniki zaporowe na Wiśle (próg pod Włocławkiem) poniżej Płocka i u zbiegu Narwi i Bugu (Zalew Zegrzyński).

Wyraźny wpływ na stosunki wodne badanego obszaru mają lokalne systemy melioracyjne. Znaczna część terenów pierwotnie zabagnionych została silnie odwodniona, co ma duży wpływ na stosunki wodne, a co za tym idzie i na roślinność. Szczególnie dużą powierzchnię zajmują zmeliorowane, pierwotnie silnie zabagnione tereny w dorzeczu górnej i środkowej Wkry.

Obszar objęty badaniami jest w ogromnej części pozbawiony jezior, jedynie w okolicach Płocka i Gostynina, na obszarze objętym zasięgiem zlodowacenia bałtyckiego, występuje kilkanaście płytkich na ogół jezior, z których największe to: J. Zdvorskie, Białe, Lucieńskie i Chalińskie.

Na obszarze objętym badaniami spotykamy różne typy podłoża geologicznego, przy czym należy zaznaczyć, że na powierzchni występują niemal wyłącznie utwory czwartorzędowe. Według mapy geologicznej Polski w skali 1 : 300 000 najczęstszym typem są dyluwialne piaski oraz gliny zwałowe, nierzadkie są również dyluwialne piaski rzeczne, piaski i żwiry ozów oraz moreny czołowej, mady rzeczne i torfy. Rzadszymi typami podłoża geologicznego są piaski sandrowe, piaski międzymorenowe, piaski wydymowe, ily i inne.

Użytkowanie ziemi na badanym obszarze jest w przeważającej części typu rolniczego. Lasy zajmują tu niewielką powierzchnię i są głównie skupione w dwu kompleksach, a mianowicie na Międzyrzeczu Łomżyńskim (Biała Puszcza Kurpiowska) i w okolicach Płocka i Gostynina. Poza tymi kompleksami leśnymi na pozostałym terenie lasów jest niewiele, a w niektórych okolicach właściwie brak ich zupełnie.

Z drugiej strony industrializacja i urbanizacja poczyniły na interesującym nas terenie niewielkie postępy. Brak tu na przykład tak silnie wpływającego na środowisko wielkiego przemysłu wydobywczego, nie biorąc pod uwagę licznych, ale na ogół niewielkich żwirowni i piaskowni. Zresztą w ogóle brak tu większych zakładów przemysłowych, z wyjątkiem jedynie płockiej petrochemii.

Tak więc badany teren to obszar rolniczy ze znacznym często udziałem powierzchniowym użytków zielonych (np. w dolinach Narwi i Bugu, w okolicach Żuromina i Mławy), przy czym typ upraw jest różny,

w znacznym stopniu zależny od żyzności podłoża. Obok wysoce urodzajnych terenów, na których dominują uprawy roślin przemysłowych (głównie buraki cukrowe) i pszenicy (np. w okolicach Sochaczewa, Kutna, Płocka, Płońska, Ciechanowa), spotykamy małowartościowe rolniczo, zwykle piaszczyste tereny, na których uprawiane są głównie ziemniaki i żyto.

Pod względem geobotanicznym badany teren nie wyróżnia się niczym szczególnym, nieomal można by powiedzieć, że wyróżnia się swoim ubóstwem w inwentarzu zbiorowisk roślinnych. Teren ten znajduje się poza zasięgiem występowania świerka, buka i jodły, co w znacznym stopniu przesądza o ubóstwie inwentarza potencjalnych zbiorowisk roślinnych. Brak tu jest z jednej strony zbiorowisk o charakterze atlantyckim (np. zbiorowisk z klasy *Quercetea robori-petraeae* lub zbiorowisk ze związku *Fagion*), z drugiej strony — zbiorowisk o charakterze subborealnym, a także zbiorowisk o charakterze pannońsko-pontyjskim i oczywiście zbiorowisk podgórskich. Pewnym urozmaicheniem geobotanicznym jest przebiegająca przez badany teren granica zasięgów dwu regionalnych zespołów borów sosnowych, to znaczy subatlantyckiego boru sosnowego (*Leucobryo-Pinetum*) i subkontynentalnego boru sosnowego (*Peucedano-Pinetum*).

W najnowszym podziale geobotanicznym Polski dokonany przez Szafera (1972) właściwie cały badany teren został zaliczony do Prowincji Niżowo-Wyżynnej Środkowoeuropejskiej, a w jej obrębie — do Działu Bałtyckiego. Zdecydowana większość terenu jest w tym podziale zaliczona do Krainy Mazowieckiej, jedynie tereny położone na północny-zachód od Płocka zaliczone są do Krainy „Pomorski Południowy Pas Przejściowy” (Okręg Wysoczyzny Dobrzyńskiej), tereny na zachód od Gostynina — do Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej (Okręg Kujawski), a tereny na wschodnim i południowo-wschodnim skraju terenu objętego badaniami — do Krainy Podlaskiej (Okręg Łukowsko-Siedlecki w okolicy Węgrowa i Sokołowa Podlaskiego oraz Okręg Północnopodlaski w okolicy Zambrowa). Dodać tu jeszcze wypada, że w omawianym podziale geobotanicznym obszar Równiny Kurpiowskiej, której najbardziej południowy skrawek został objęty opracowaniem, jest zaliczony do Działu Północnego (Kraina Mazursko-Kurpiowska, Okręg Kurpiowsko-Piski).

Spśród trzech okręgów wyróżnionych w omawianym podziale geobotanicznym w obrębie Krainy Mazowieckiej badany teren obejmuje swym zasięgiem dwa z nich, a mianowicie niemal w całości Okręg Północnomazowiecki oraz dość znaczne obszary Okręgu Warszawskiego.

Naturalna roślinność jest na badanym obszarze zachowana zupełnie szczątkowo. Odbiciem tego jest fakt, że na tak dużym obszarze (ok. 1/20 część Polski) utworzone zostały tylko dwa rezerваты roślinne (w ostatnim okresie, już po zakończeniu opracowania jeszcze dwa dalsze), a mianowicie rezerwat Dziektarzewo w okolicach Płońska i re-

zerwat Dębina koło Klembowa w okolicach Tłuszcza. Ponadto zasięgiem opracowania objęty został skrajnie zachodni skrawek Kampinoskiego Parku Narodowego.

Poza wymienionymi rezerwatami fragmenty roślinności zbliżonej do naturalnej spotkać można na obszarze leśnym między Płockiem a Goścyninem, w Puszczy Białej, w północnej części Okręgu Łukowsko-Siedleckiego, w okolicach Ciechanowa, Mławy i Łochowa, w sumie rzadko i zawsze tylko na niewielkich powierzchniach.

Następstwem tego jest słaby stopień zbadania fitosocjologicznego roślinności leśnej tego obszaru. W literaturze spotkałem jedynie trzy prace fitosocjologiczne opisujące zbiorowiska leśne występujące na interesującym nas obszarze (Bednarek 1958; Boińska 1970; Sokółowski 1963). Obszar ten uważany był najwidoczniej za „nieciekawy” pod względem fitosocjologicznym, co może niezupełnie odpowiada prawdzie.

IV. POTENCJALNE ZBIOROWISKA ROŚLINNE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

1. Uwagi wstępne

Głównym celem opracowania było przedstawienie zróżnicowania potencjalnej roślinności naturalnej na poziomie fitocenoz i wykonanie mapy w skali 1 : 300 000 dla badanego terenu. Prace nad tym zagadnieniem prowadziłem uczestnicząc w szerokiej, ogólnopolskiej akcji naukowej mającej na celu opracowanie przeglądowej mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski.

Zarówno teoria, jak i metodyka prac nad mapą potencjalnej roślinności naturalnej opracowane są już od dawna, wydaje się więc zbędne omawianie ich tutaj. Podstawy teorii i metodyki opracowane zostały przez Tüxena (1956) jeszcze w latach pięćdziesiątych i od tego czasu pogłębione i rozwinięte również przez fitosocjologów polskich (Faliński 1966, 1971, 1972a, 1972b; Matuszkiewicz W. 1966, 1967, 1974; Wojterski et al. 1973). W obecnej chwili jesteśmy na etapie jednolitego dla całej Polski, dalece zaawansowanego wykonywania mapy, co jednak nie znaczy, że w trakcie jej wykonywania nie pojawia się szeregu problemów tak teoretycznej, jak i metodycznej natury.

Prezentowana w niniejszej pracy mapa potencjalnej roślinności naturalnej w skali 1 : 300 000 przedstawia, podobnie jak inne dotychczas publikowane mapy, zasięgi jednostek, którym w systematyce naturalnych zbiorowisk roślinnych odpowiadają określone jednostki syntaksonomiczne (najczęściej w randze zespołu).

Oczywiście, w zależności od skali mapy różna będzie dokładność przedstawiania poszczególnych zasięgów fitocenoz. W skali dostatecznie dużej możliwe jest przedstawienie zasięgów wszystkich fitocenoz, w mia-

rę zmniejszania skali zachodzi konieczność z jednej strony generalizacji kartograficznej, a z drugiej — generalizacji typologicznej.

Prezentowana mapa potencjalnej roślinności naturalnej w skali 1 : 300 000 przedstawia rzeczywistość przyrodniczą w sposób mocno uproszczony, to znaczy nie przedstawia zasięgów wszystkich potencjalnych fitocenoz, a jedynie tych, które zajmują wystarczająco duży obszar i których odrębność w sensie syntaksonomicznym jest dostatecznie wyraźna.

2. Metoda kartowania potencjalnych zbiorowisk roślinnych

Terenowe prace kartograficzne prowadzone były w latach 1972-1974. Ogólnie rzecz biorąc, mapa wykonywana była w sposób zbliżony do tego, jaki jest stosowany przez wszystkich uczestników opracowania „Przeglądowa mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski” (Faliński 1966, 1971, 1972a, 1972b).

W procesie powstawania mapy należy wyróżnić trzy podstawowe etapy, tj: wstępne rozpoznanie terenu i prace przygotowawcze, kartowanie terenowe prowadzące do wykonania pierwowysu autorskiego mapy, oraz prace techniczno-kartograficzne, których efektem jest czystorys mapy przekazywany specjalistycznemu wydawnictwu. Omówię tu szerzej tylko dwa pierwsze etapy powstawania mapy.

W skład wstępnych prac przed przystąpieniem do kartowania terenowego wchodzi: przygotowanie podkładu do kartowania, rozpoznanie zróżnicowania roślinności oraz warunków środowiska geograficznego terenu na podstawie analizy publikacji naukowych, a w szczególności materiałów kartograficznych, oraz zaplanowanie prac terenowych.

Najważniejszym z fitosocjologicznego punktu widzenia etapem powstawania mapy roślinności jest niewątpliwie kartowanie terenowe. Polega ono na identyfikacji roślinności potencjalnej wzdłuż pewnych tras oraz na interpolacji zasięgów jednostek. W kartowaniu terenowym wyróżnić należy trzy elementy stwarzające zupełnie różne problemy przy pracy.

Elementem pierwszym jest wykonanie sieci transektów, to znaczy przejazd po pewnych trasach w celu badania zmienności potencjalnej roślinności naturalnej. Przejazd ten wykonywany był przy użyciu samochodu osobowego i w związku z tym odbywać się musiał po dostatecznie dobrych drogach. Przy wykonywaniu poszczególnych arkuszy mapy (powierzchnia ponad 900 km²) pokonywano trasę o długości około 1300-1700 km wliczając w to dojazdy do terenu. Uzyskiwano sieć transektów o różnej długości (ryc. 2), średnio po około 600 km. Różna długość sieci transektów, a co za tym idzie, różna wielkość terenu rzeczywiście analizowanego, spowodowana była zarówno przez niejednakowy stopień skomplikowania potencjalnej roślinności naturalnej w różnych

Ryc. 2. Długość sieci transektów na poszczególnych arkuszach mapy
Fig. 2. Length of transect network on particular sheets of map

terenach, jak i przez ograniczoną rozkładem dróg możliwość dowolnego dobierania tras przejazdów.

Drugim elementem kartowania terenowego jest identyfikacja potencjalnej roślinności naturalnej w poszczególnych punktach, wzdłuż przejechanych tras. Czynność ta jest procesem myślowym, dla którego przesłanki stwarza analiza rzeczywiście występującej roślinności i warunków siedliska. Identyfikacja potencjalnej roślinności naturalnej może mieć różny przebieg w zależności od tego, czy w terenie mamy do czynienia z roślinnością naturalną, czy też z roślinnością antropogeniczną. W jednych przypadkach wnioskuje się o potencjalnej roślinności naturalnej wychodząc niemal wyłącznie od poznania realnie występującej roślinności, w innych — poprzez poznanie warunków siedliska metodami fitoindykacyjnymi. W praktyce, kartujący musi ustalić przewodnie cechy siedlisk poszczególnych typów potencjalnych zbiorowisk roślinnych. Cechami tymi mogą być zarówno fitosocjologiczne opisy zbiorowisk roślinności rzeczywistej (występowanie określonych jednostek syntaksonomicznych), jak i bezpośrednio obserwowane cechy siedliska abiotycznego.

Mówiąc ogólnie, typy potencjalnych zbiorowisk roślinnych identyfikuje się poprzez rozpoznanie dynamicznych kręgów zbiorowisk roślinnych (Schwickerath 1954) i określenie specyfiki siedliska abiotycznego.

Po wyznaczeniu zasięgu potencjalnych zbiorowisk roślinnych na tran-

sektach konieczne jest przeprowadzenie interpolacji ich zasięgów na całym terenie. Czynność ta stanowi trzeci element kartowania terenowego i daje w efekcie pierworys mapy. Interpolację zasięgów wieloprzestrzennych potencjalnych zbiorowisk roślinnych (to znaczy takich wydzielen, które nie mogły być w całości objęte wzrokiem z trasy przejazdu) starano się przeprowadzić przez ustalenie korelacji ich rozprzestrzenienia z rzeźbą terenu, wodami powierzchniowymi lub innymi elementami środowiska uwidocznionymi na podkładzie kartograficznym. Korelacja ta musiała być rzecz jasna ustalona na transektach, i oczywiście im gęstsza była sieć transektów, tym łatwiej było interpolować zasięgi poszczególnych jednostek roślinności potencjalnej. W tej pracy mogły być też przydatne kartograficzne materiały przedstawiające w jakiejś postaci zróżnicowanie siedliska (np. mapy siedliskowo-leśne).

Niewielkie wydzielenia jednostek potencjalnej roślinności, w całości widoczne z trasy przejazdu, wyznaczane były od razu w trakcie wykonywania transektów. Jako minimalną wielkość powierzchni wydzielen uwzględnianych na mapie przyjęto obszar, którego przynajmniej jeden wymiar przekraczał 600 m. Wyjątek robiono jedynie dla zbiorowisk borów bagiennych i torfowisk wysokich, które w przypadku gdy zajmowały całkiem niewielką powierzchnię zaznaczane były znakiem punktowym.

Prace kartograficzne w terenie zajmowały około tydzień na jeden arkusz. Prace kameralne przed i po pracach terenowych zajmowały około 3 do 4 dni.

3. Charakterystyka jednostek potencjalnej roślinności naturalnej przedstawionych na mapie

Na badanym obszarze wydzielono 13 jednostek potencjalnych zbiorowisk roślinnych. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę jednostek legendy przewidzianą dla całej Polski jest to, jak na tak duży obszar, liczba raczej niewielka. Szczupłość inwentarza jednostek potencjalnej roślinności naturalnej jest wynikiem, jak już powiedziano, dość specyficznego położenia badanego terenu pod względem biogeograficznym.

Z punktu widzenia systematyki naturalnych zbiorowisk roślinnych wydzielone jednostki zaliczyć należy do następujących grup:

4 jednostki do klasy *Vaccinio-Piceetea*, związku *Dicrano-Pinion* (zespoły: *Peucedano-Pinetum*, *Leucobryo-Pinetum*, *Pino-Quercetum* i *Vaccinio uliginosi-Pinetum*);

1 jednostkę do klasy *Oxycocco-Sphagnetum* (zespół *Sphagnetum medio-rubelli*);

1 jednostkę do klasy *Alnetum glutinosae* (zespół *Carici elongatae-Alnetum*);

1 jednostkę do klasy *Salicetea purpureae* (zespół *Salici-Populetum*);

3 jednostki do klasy *Quercus-Fagetea*, związku *Alno-Padion* (zespół *Circaeo-Alnetum* i zespół *Ficario-Ulmetum* z dwoma podzespołami: *F.-U. typicum* i *F.-U. chrysosplenietosum*);

2 jednostki do klasy *Quercus-Fagetea*, związku *Carpinion betuli* (zespół *Tilio-Carpinetum* w odmianie mazowieckiej z dwoma seriami ubogą i żyzną);

1 jednostkę do klasy *Quercus-Fagetea*, związku *Quercion pubescentis* (zespół *Potentillo albae-Quercetum*).

Zespół *Peucedano-Pinetum* W. Mat. 1962 — subkontynentalny bór sosnowy

Jednostka ta została ujęta szeroko (Matuszkiewicz W. 1962), to znaczy łącznie z postaciami najsuchszymi i najwilgotniejszymi subkontynentalnych borów sosnowych na podłożu mineralnym. W najnowszym ujęciu systematyki zbiorowisk borowych ze związku *Dicrano-Pinion* Libb. 1933 (Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J. 1973) jednostce tej odpowiadają: subkontynentalna odmiana zespołu *Cladonio-Pinetum*, zespół *Peucedano-Pinetum* s. str. i niektóre postaci regionalne zbiorowiska *Pinus-Molinia*. Ponieważ jednak zdecydowanie najczęstszą i zajmującą największe powierzchnie postacią borów subkontynentalnych jest postać boru świeżego (*Peucedano-Pinetum* s. str.), ujęcie jednostki jako *Peucedano-Pinetum* s.l. jest dla mapy przeglądowej zupełnie wystarczające.

Zespół *Peucedano-Pinetum* wykształcający się na badanym obszarze w odmianie sarmackiej jest regionalnie wikaryzującym zespołem w stosunku do zespołu *Leucobryo-Pinetum*. Granica zasięgu zespołu (zachodnia) przebiega przez badany teren wzdłuż doliny dolnego Bugu i środkowej Wisły.

Fitocenozy należące do zespołu *Peucedano-Pinetum* występują na skrajnie oligotroficznych siedliskach piasków różnego pochodzenia, wykazując dużą zmienność w zależności od wilgotności siedlisk — od skrajnie suchych do wilgotnych.

Głównym obszarem rozprzestrzenienia zespołu na badanym terenie jest Puszcza Biała na Międzyrzeczu Łomżyńskim i obszary Kotliny Płockiej. Fitocenozy tej jednostki występują również na innych terenach, jednak jej rozprzestrzenienie jest wyraźnie nierównomierne.

Siedliska omawianego zespołu, na skutek ich małej przydatności dla rolnictwa, są zajęte na ogół przez lasy, z których dość liczne fragmenty mają charakter zbiorowisk zbliżonych do naturalnych. Najczęściej jednak na siedliskach borów sosnowych spotykamy kultury leśne przedstawiające sobą różne fazy regeneracji zespołu *Peucedano-Pinetum*. Oprócz lasów na siedliskach borów sosnowych występują niekiedy uprawy polne kompleksu żytnio-ziemniaczanego słabego, częściej jednak nieużytki w postaci niedorębów, muraw piaskowych, a także niedawne za-

lesienia gruntów porolnych. Trzeba tu jeszcze zaznaczyć, że na skutek degradacji niektóre siedliska, pierwotnie zajęte przez bory mieszane, obecnie są siedliskami borów.

Liczba materiałów zdjęciowych z zespołu *Peucedano-Pinetum* z badanego terenu jest w porównaniu z innymi typami zbiorowisk stosunkowo duża. Dostępne mi materiały zdjęciowe pochodziły z doliny Wisły pomiędzy Wyszogrodem a Płockiem (Boińska 1970), z nadleśnictw Duninów, Góra i Łąck w Kotlinie Płockiej, Lemany koło Pułtuska oraz z okolic Ostrowi Mazowieckiej. Analiza tych zdjęć nie pozostawia wątpliwości, że mamy tu do czynienia z odmianą sarmacką zespołu *Peucedano-Pinetum*.

Identyfikacja potencjalnych zbiorowisk zaliczanych do zespołu *Peucedano-Pinetum* następuje niekiedy znaczne trudności, szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z silnie zniekształconymi kulturami leśnymi lub obszarami nieużytków. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo uznania siedlisk borów mieszanych, a nawet dąbrów świetlistych, za potencjalne siedliska *Peucedano-Pinetum*. Nieodzowne jest wówczas orientacyjne choćby zbadanie stosunków glebowych.

Oddzielny problem stanowi ustalenie w obszarach granicznych *Peucedano-Pinetum* i *Leucobryo-Pinetum* przynależności poszczególnych płatów borów do jednego z zespołów regionalnych. Praktycznie w obszarze tym tylko dobrze wykształcone fitocenozy dają się pod tym względem rozróżnić, tak że w niektórych przypadkach linię rozdziału zasięgu *Peucedano-Pinetum* i *Leucobryo-Pinetum* trzeba było przyjąć umownie.

Identyfikując w poszczególnych przypadkach potencjalne zbiorowiska borów, tak *Peucedano-Pinetum*, jak i *Leucobryo-Pinetum*, gdy nie można było znaleźć płatów dobrze wykształconych fitocenoz leśnych, kierowano się następującymi cechami diagnostycznymi.

Za uznaniem boru jako typu potencjalnej roślinności naturalnej w danym miejscu przemawiają: silny rozwój warstwy mszaków, masowe występowanie wrzосу, silnie zaawansowany proces bielcowania w glebie, typowy pokrój sosen, na siedliskach suchych masowy rozwój porostów, szczególnie z rodzaju *Cladonia*, na siedliskach wilgotnych występowanie *Ledum palustre* i *Vaccinum uliginosum*, na siedliskach wilgotnych gruba warstwa próchnicy nakładowej i bardzo wyraźny poziom wymycia w glebie.

Przeciwko uznaniu boru jako typu potencjalnej roślinności naturalnej w danym miejscu przemawia: występowanie dorodnych dębów w drzewostanie, występowanie (choćby nielicznie) gatunków charakterystycznych dla klasy *Quercus-Fagetum* (np. grab, lipa, leszczyna i inne), masowe występowanie paproci orlicy, duży udział traw szerokolistnych w runie (z wyjątkiem *Molinia coerulea*), brak wyraźnie zaznaczonego procesu bielcowania w glebie, występowanie w podłożu warstw z większym udziałem frakcji drobnoziarnistych, występowanie pastwisk, dobra bo-

nitacja zbóż (żyto) na polach będących w przeciętnej kulturze rolnej, występowanie bujnych zbiorowisk chwastów przy zabudowaniach.

Zaliczenia płatów borów do jednego z dwu regionalnych zespołów dokonywałem na podstawie analizy składu florystycznego fitocenozy dostatecznie dobrze wykształconych, przyjmując za kryterium występowanie lub brak gatunków wyróżniających zespół *Peucedano-Pinetum* (*Convalaria maialis*, *Peucedanum oreoselinum*, *Solidago virga-aurea*, *Scorsonera humilis* i inne).

Zespół *Leucobryo-Pinetum* W. Mat. 1962 — suboceaniczny bór sosnowy

Podobnie jak poprzednio omawiana jednostka, zespół *Leucobryo-Pinetum* ujęty jest w znaczeniu szerokim (Matuszkiewicz W. 1962). Zespół *Leucobryo-Pinetum* jest regionalnie wikaryzującym zespołem w stosunku do *Peucedano-Pinetum* i w związku z tym wszystko, co powiedziano na temat *Peucedano-Pinetum*, z wyjątkiem zasięgu geograficznego, odnosi się w równym stopniu do omawianego zespołu.

Fitocenozy zaliczone do zespołu *Leucobryo-Pinetum* występują na badanym terenie jedynie w części południowo-wschodniej, na południe od dolnego Bugu, przy czym największe powierzchnie zajmują na obszarze mezoregionów: Równina Wołomińska i Dolina Dolnego Bugu.

Suboceaniczne bory sosnowe tego obszaru w ujęciu dawniejszym (Matuszkiewicz W. 1962) powinny być zaliczone do odmiany niżowej (przeciwstawna jej, była odmiana podgórska); według najnowszego ujęcia systematyki zbiorowisk borów sosnowych (Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J. 1973) należy je zaliczyć do odmiany środkowopolskiej (przeciwstawna jest odmiana pomorsko-śląska), a w jej obrębie — do postaci przejściowej ku *Peucedano-Pinetum*.

Bory tego obszaru badane były przez Sokołowskiego (1963). Analiza opublikowanych przez tego autora zdjęć fitosocjologicznych pochodzących z interesującego nas obszaru (ok. Łochowa, Sadownego, Kosowa i Ceranova w nadleśnictwach Łochów i Sokołów Podlaski) w pełni uzasadnia słuszność zaliczenia borów tego obszaru do zespołu *Leucobryo-Pinetum*, pomimo sporadycznego występowania w nich gatunków wyróżniających *Peucedano-Pinetum*. Stanowiło to podstawę do uznania ich za postać przejściową w obrębie odmiany środkowopolskiej.

Znaczną większość wydzieleń na mapie potencjalnej roślinności naturalnej, określonych jako *Leucobryo-Pinetum*, zajmują lasy, jednak w większości mamy do czynienia z lasami silnie zniekształconymi. Tylko fragmenty mają charakter zbliżony do naturalnego.

Zespół *Pino-Quercetum* Kozł. 1925 — sosnowo-dębowy bór mieszany

Zbiorowisko to w warunkach naturalnych jest mezotroficznym lasem sosnowo-dębowym. Fitocenozy należące do zespołu *Pino-Quercetum* wy-

stępują na siedliskach różniących się, tak pod względem wilgotności, jak i żyzności, czemu odpowiada zróżnicowanie zespołu na niższe jednostki nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

Zespół *Pino-Quercetum* reprezentowany jest powszechnie na całym obszarze objętym badaniami, jednak stopień jego rozpowszechnienia w poszczególnych regionach jest różny. Tak na przykład na Równinie Wołomińskiej, czy na Międzyrzeczu Łomżyńskim bór mieszany jest dominującym przestrzennie potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym, podczas gdy na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, a szczególnie na Wysoczyźnie Płońskiej, jego udział powierzchniowy jest niewielki.

Fitocenozy należące do zespołu *Pino-Quercetum* występują na różnych typach podłoża geologicznego, z tym że na ogół są to piaski różnego pochodzenia. Amplituda wilgotności siedlisk jest stosunkowo szeroka; bory mieszane występują na siedliskach od prawie suchych, przez świeże do wilgotnych.

Potencjalne siedliska borów mieszanych zajęte są obecnie częściowo przez lasy, a częściej przez uprawy polne należące do kompleksu żytnio-ziemniaczanego. Łąki i pastwiska trafiają się na tych siedliskach niezbyt często (tylko na siedliskach borów mieszanych wilgotnych — *Pino-Quercetum populetosum tremulae*), przy czym są to mało wydajne użytki zielone (łąki ze związku *Molinion*).

Identyfikacja *Pino-Quercetum*, jako potencjalnego zbiorowiska naturalnego, jest w wielu przypadkach, gdy nie mamy do czynienia ze zbiorowiskami leśnymi zbliżonymi do naturalnych, dość trudna. Na siedliskach uboższych powstaje problem oddzielenia borów mieszanych od borów, natomiast na siedliskach żyzniejszych — problem oddzielenia od uboższych grądów (np. *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum*), a także świetlistych dąbrów. Na temat kryteriów oddzielania uboższych postaci borów mieszanych od borów była już mowa poprzednio, teraz zajmujemy się omówieniem kryteriów pozwalających oddzielić bory mieszane od grądów.

W stosunku do grądów bory mieszane, jako jednostka potencjalnej roślinności naturalnej, wyróżniają się szeregiem cech, podzielonych tu na pozytywnie i negatywnie wyróżniające.

Pozytywnie:

W lesie: występowanie gatunków charakterystycznych dla klasy *Vaccinio-Piceetea* (np. *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idaea*, *Trientalis europaea*, *Pirola secunda*), a także *Melampyrum pratense*, *Molinia coerulea*, *Calluna vulgaris*, *Frangula alnus*; występowanie mszaków: *Dicranum undulatum*, *D. scoparium*, *Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens*. Duży udział wąskolistnych traw na przydrożach. Wyraźnie piaszczyste podłoże. Ubogie zbiorowiska chwastów polnych, szczególnie w uprawach zbożowych. Ubogie zbiorowiska chwastów we wsiach. Ubogie pastwiska z sitami. Kolor świeżo zaoranej gleby rolnej żółto-brązowy na siedli-

skach suchszych, a brązowo-szary z zimnym odcieniem na siedliskach wilgotniejszych.

Negatywnie:

Występowanie w lesie „dobrych” gatunków grądowych, np. *Galeobdolon luteum*, *Aegopodium podagraria*, *Paris quadrifolia*, *Poa nemoralis* i inne. Bardzo silny rozwój leszczyny i grabu w lesie. Na przydrożach duży udział szerokolistnych traw. Występowanie zarośli śródpolnych z rzędu *Prunetalia* (czyżnie). Występowanie bogatych łąk ze związku *Arrhenatherion*. Występowanie bogatych pastwisk. Duży udział powierzchniowy upraw pszenicy i buraka cukrowego. Wyraźnie widoczny proces brunatnienia w glebie. Gleba rolna o barwie brunatnej lub czarno-brunatnej z tendencją do tworzenia trwałych brył i bryłek. Podłoże gliniaste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie słabo kwaśnym lub obojętnym. Rozwój wielkolistnych chwastów na przypłociach i przychaciach we wsiach. Tendencja do tworzenia się mazistego błota na drogach polnych po deszczu, a w czasie suszy zasychanie błota w postaci brył. Występowanie krzaków róż (głównie *Rosa canina*) na miedzach i przy drogach.

Rozróżnienie siedlisk borów mieszanych i świetlistych dąbrów jest względnie proste jedynie w przypadkach, gdy mamy do czynienia ze zbiorowiskami zbliżonymi do naturalnych, jednak nawet wtedy, z powodu istnienia postaci borów mieszanych bardzo zbliżonych do dąbrów (*Pino-Quercetum serratuletosum*), co szczególnie częste jest w północno-wschodniej części badanego terenu, mogą wystąpić poważne trudności przy identyfikacji potencjalnej roślinności naturalnej. Trzeba pamiętać, że dąbrowy świetliste osiągają północny kres swego zasięgu niezbyt daleko na północ od granic badanego terenu, w związku z czym w kierunku północno-wschodnim zawęża się ich amplituda ekologiczna. Wiele siedlisk, które w środkowej Polsce zajęte były by przez dąbrowy świetliste, dalej na północnym-wschodzie opanowane zostały przez bory mieszane. Dla rozróżnienia niektórych postaci borów mieszanych i dąbrów świetlistych konieczne jest wypracowanie kryteriów, nieraz o ściśle lokalnym charakterze. Kwestia ta szerzej omówiona będzie przy charakterystyce zespołu *Potentillo albae-Quercetum* jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej.

Zespół *Vaccinio uliginosi-Pinetum* Kleist 1929 — bór bagienny

Jednostka ta na badanym obszarze reprezentowana jest rzadko i na bardzo niewielkich powierzchniach, głównie na obszarze Równiny Wołomińskiej.

Siedliskami zespołu *Vaccinio uliginosi-Pinetum* są bezodpływowe zagłębienia w ubogich pod względem podłoża terenach, wypełnione pokładami (tu na ogół płytkimi) torfu wysokiego.

Siedliska omawianego zespołu zajęte są przez lasy (bór bagienny) lub przez nieużytki. Jednostka ta jest bardzo łatwa do zidentyfikowania, tak w przypadku roślinności zbliżonej do naturalnej, jak i roślinności zastępczej. Dobrym kryterium identyfikacji jest występowanie licznych torfowców oraz krzewinek *Vaccinium uliginosum* i *Ledum palustre*.

Zbiorowiska z klasy *Oxycocco-Sphagnetea* — torfowiska wysokie

Torfowiska wysokie są dynamicznie pokrewne poprzednio omówionemu zespołowi, są jednak zbiorowiskami nieleśnymi. Występują one w bezodpływowych zagłębieniach wypełnionych torfem, przy czym mamy tu do czynienia z żywym procesem torfotwórczym.

Torfowiska wysokie na badanym terenie pojawiają się bardzo rzadko, ich występowanie stwierdzono jedynie w Kotlinie Płockiej, na Równinie Wołomińskiej i Międzyrzeczu Łomżyńskim. Siedliska torfowisk wysokich są pod względem gospodarczym najczęściej nieużytkami lub miejscami pozyskiwania torfu. Identyfikacja jednostki jest łatwa i opiera się na występowaniu licznych torfowców oraz innych gatunków, jak np. *Eriophorum vaginatum*, *Drosera rotundifolia*, *Oxycoccus quadripetalus*, a także nieleśnym charakterze zbiorowiska.

Zespół *Salici-Populetum* R.Tx.1931 (= *Salicetum albo-fragilis* R.Tx.1955)

— nadrzeczny łęg topolowo-wierzbowy

Jednostka ta w warunkach naturalnych obejmuje łęgowe lasy topolowo-wierzbowe, występujące na piaszczystych madach większych rzek.

Na badanym obszarze siedliska łęgów topolowo-wierzbowych występują przede wszystkim nad Wisłą, Bugiem i Narwią, a ponadto nad Skrwą, Wkrą, Bzurą, Liwcem i Orzycem.

W warunkach naturalnych zespół *Salici-Populetum* jest zróżnicowany na dwie postaci ekologiczne, a mianowicie na postać typową (*S.-P. typicum*) i postać zabagnioną (*S.-P. phragmitetosum*) (Matuszkiewicz J. 1976).

Siedliskiem łęgów topolowo-wierzbowych są aktualne tarasy akumulacyjne rzek w zasięgu corocznych wysokich stanów wody. Występowanie tych łęgów jest więc uwarunkowane z jednej strony rodzajem podłoża (mada piaszczysta), a z drugiej — corocznym wylewem rzeki. W warunkach uregulowanych rzek zasięg łęgów topolowo-wierzbowych, jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej, jest często sztucznie zawężony do obszaru ograniczonego wałami przeciwpowodziowymi, tak jak to ma miejsce na badanym terenie na odcinku środkowej Wisły. Drugim czynnikiem, tym razem o charakterze w znacznym stopniu naturalnym, mającym wpływ na rozprzestrzenienie potencjalnych łęgów topolowo-wierzbowych nad dużą rzeką, jest ilość przynoszonych przez

wody powodziowe drobnoziarnistych namulów. Nad rzekami niosącymi niewiele namulów (np. Bug i Narew) zespół *Salici-Populetum* zajmował, zarówno pierwotnie, jak i obecnie zajmuje potencjalnie prawie całą szerokość aktualnego terasu zalewowego, natomiast nad rzekami niosącymi większe ilości drobnoziarnistych namulów osadzanych w czasie powodzi na skrzydłach doliny, zasięg siedlisk *Salici-Populetum* ograniczony jest do pasa w pobliżu koryta rzeki, podczas gdy na skrzydłach doliny występują siedliska łągów jesionowo-wiązowych (*Ficario-Ulmetum typicum*).

Siedliska potencjalnych zbiorowisk *Salici-Populetum* są zajęte aktualnie przez użytki zielone: łąki i pastwiska. Fragmenty lasów spotyka się bardzo rzadko i to raczej nad mniejszymi rzekami (np. nad Skrwą), przy czym są to na ogół lasy bardzo odkształcone.

W pobliżu koryta większych rzek (Narew, Bug i szczególnie Wisła), na łachach piaszczystych częstym zbiorowiskiem zastępczym są wikliny nadrzeczne (zespół *Salicetum triandro-viminalis*) mające charakter zbiorowisk antropogenicznych lub naturalnych. Bezpośrednio w pobliżu nurtu rzeki zespół *Salicetum triandro-viminalis* jest zbiorowiskiem trwałym, uwarunkowanym corocznym spływem kry lodowej eliminującym rozwój roślinności drzewiastej; w niniejszym opracowaniu jednak włączono go do kręgu zbiorowisk zastępczych *Salici-Populetum* ze względu na charakter stadium sukcesyjnego tego zbiorowiska, a także ze względu na małopowierzchniowe występowanie.

Na siedliskach potencjalnego łągu topolowo-wierzbowego nie spotyka się użytków ornych, jak również osiedli, co jest naturalną konsekwencją specyfiki tych siedlisk.

Identyfikacja zespołu *Salici-Populetum*, jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej, jest na ogół łatwa dzięki wyraźnemu przywiązaniu zespołu do określonego typu siedlisk oraz wyraźnej fizjonomii zastępczych zbiorowisk roślinnych. Nad mniejszymi rzekami (np. Liwiec, Wkra) zachodzi konieczność oddzielenia siedlisk *Salici-Populetum* od siedlisk *Circae-Alnetum*. Dobrym kryterium jest w tych przypadkach udział wierzb, szczególnie drzewiastych (np. *Salix alba*, *S. fragilis*, *S. purpurea*), oraz występowanie dużych skupień lepieznika (*Petasites spurius*).

Nad wielkimi rzekami (tu przede wszystkim nad Wisłą) zachodzi konieczność oddzielenia siedlisk zespołu *Salici-Populetum* od siedlisk łągów jesionowo-wiązowych (*Ficario-Ulmetum typicum*). Rozróżnienie to nie sprawia na ogół trudności. Jako kryteria identyfikacji siedlisk *Salici-Populetum* mogą służyć z jednej strony występowanie wierzb drzewiastych, skupień *Petasites spurius*, uboższych łąk, piaszczysto-żwirowego podłoża, a z drugiej — brak wiązków, żyznych łąk, gruntów ornych oraz ilastego podłoża. Nad Wisłą w wielu przypadkach granicę między siedliskami tych dwu zbiorowisk stanowią wały przeciwpowodziowe.

W niektórych przypadkach (np. nad Bugiem) zachodziła konieczność oddzielenia łągów topolowo-wierzbowych w zabagnionej postaci (*Salici-Populetum phragmitetosum*) od występujących na skrzydle doliny olsów, co narażało pewne trudności.

Zespół *Carici elongatae*-*Alnetum* Koch. 1926 — ols

Zbiorowiska olsów są w warunkach naturalnych olszowymi lasami bagiennymi występującymi w miejscach stagnowania wód. Cechą charakterystyczną tych zbiorowisk jest bardzo wyraźna struktura kępowo-dolinkowa. Na kępach występują rośliny leśne, natomiast w dolinkach rośliny wodno-szuwarowe. W warunkach naturalnych dolinki są zwykle przez znaczną część roku zalane wodą.

Olsy występują na siedliskach, w których decydującym czynnikiem jest wysoki poziom wód gruntowych, utrzymujący się przez większą część roku, co powoduje zabagnienie. Warunki takie występują w lokalnych nieckach terenu, w dolinach niewielkich cieków wodnych o bardzo powolnym przepływie oraz na skrzydłach dolin większych rzek. Podłożem geologicznym tych siedlisk są torfy niskie i przejściowe.

Na skutek tego, że występowanie olsów związane jest ściśle z wysokim stanem stagnujących wód, wszelkie prace melioracyjne bardzo silnie wpływają na te zbiorowiska. Odwodnione siedliska olsów (szczególnie eutroficznych postaci) zmieniają się często w siedliska łągów przystrumykowych (*Circaeo-Alnetum*) i to w wielu przypadkach trwale i prawdopodobnie nieodwracalnie.

Na siedliskach olsów aktualną roślinność rzeczywistą stanowią na badanym terenie: lasy olszowe (na ogół silnie odkształcone przez wypas bydła i gospodarkę przerębowo-odroślową), nieużytki gospodarcze (zbiorowiska szuwarowe ze związku *Magnocaricion*, młaki turzycowe), torfowiska niskie niekiedy eksploatowane, a najczęściej — łąki i pastwiska o różnej wartości gospodarczej.

Identyfikacja olsu jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej jest bardzo łatwa gdy roślinność rzeczywistą stanowią lasy zbliżone do naturalnych. W tych miejscach nawet w okresach, gdy brak jest roślinności zielnej można ols rozpoznać po bardzo charakterystycznej strukturze. Znacznie częstsze są jednak powierzchnie o roślinności zmienionej pod wpływem działalności człowieka, przy czym działalność ta skierowana jest nie tylko bezpośrednio na roślinność (wyrąb lasu, koszenie), lecz także na siedlisko i to na najważniejszy czynnik tego siedliska, to znaczy na stosunki wodne (melioracje). I tu musimy każdorazowo ustalić czy zmiany są tak daleko posunięte, że siedlisko pierwotnie olsowe jest już potencjalnym siedliskiem innego typu roślinności (najczęściej łągu jesionowo-olszowego), czy też siedlisko, choć zmienione, pozostaje jeszcze potencjalnym siedliskiem olsu.

Potencjalną roślinność naturalną identyfikowałem jako olsową w przypadku występowania następujących typów roślinności rzeczywistej:

— las o składzie florystycznym i strukturze odpowiadający zespołowi *Carici elongatae-Alnetum*;

— stadia odroślowe lasu wykazujące tendencje do rozwoju w kierunku *Caricie elongatae-Alnetum*;

— łożowisko (zespół *Salicetum pentandro-cinereae* Pass. 1961);

— szuwały ze związku *Magnocaricion*;

— torfowiska przejściowe i niskie;

— kwaśne łąki turzycowe z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*;

— łąki z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*, rzędu *Molinietalia* na zmeliorowanych głębokich torfach, tylko w przypadku gdy proces mineralizacji torfu jest słabo zaawansowany a zmiany w siedlisku spowodowane melioracją i uprawą wydają się być nietrwałe (np. bagno Pulwy w dolinie Narwi).

Jako trwale odkształcone siedliska pierwotnie olsowe uznawano takie, w których warstwa torfu była raczej cienka, a proces mineralizacji torfu był daleko zaawansowany; siedliska te zaliczane były do grupy siedlisk *Circae-Alnetum*.

Trzeba tu jeszcze dodać, że przejście siedlisk olsowych do grupy siedlisk łęgowych nie jest jedynym możliwym kierunkiem zmian wywołanych odwodnieniem. Odwodnione siedliska ubogich postaci olsów ewoluują w kierunku siedlisk wilgotnych borów mieszanych, jednak praktycznie na badanym terenie ten kierunek zmian był nieporównanie rzadszy niż poprzednio omówiony. Przyczyną tego jest mała przydatość siedlisk uboższych olsów dla gospodarki łkowej, przez co rzadko kiedy są one intensywnie meliorowane. Skutkiem tego na badanym terenie olsy, jako roślinność potencjalna w większym stopniu niż to było pierwotnie reprezentowane, są w postaci uboższej, gdyż znaczna część siedlisk żywniejszych olsów została przekształcona na siedliska łęgów.

Zespół *Circae-Alnetum* Oberd. 1953 — przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy

W warunkach naturalnych jest to łęgowy las olszowy z większym lub mniejszym udziałem jesionu w drzewostanie, porastający płaskie dna dolin mniejszych cieków wodnych. Łęgi należące do zespołu *Circae-Alnetum* występują na podłożu mąd rzecznych i płytkich torfów niskich.

Jednostka ta reprezentowana jest na całym obszarze objętym badaniami i jest zdecydowanie najpospolitsza z grupy zbiorowisk łęgowych. Aktualne rozprzestrzenienie *Circae-Alnetum* jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej jest szersze w stosunku do stanu pierwotnego wskutek przejścia niektórych siedlisk olsów na grupy siedlisk omawianego zespołu w wyniku przeprowadzonych melioracji.

Siedliskami *Circae-Alnetum* są (przynajmniej potencjalnie) różnej

szerokości doliny niewielkich strumieni i rzeczek, a także bezodpływowe pierwotnie zagłębienia, które na skutek prac melioracyjnych uzyskały odpływ, jak również niekiedy obszary źródliskowe oraz skrajne skrzydła dolin wielkich rzek, gdzie następuje wysięk wód spływających z wyżej położonych terenów. Siedliska zespołu *Circaeο-Alnetum* odznaczają się umiarkowaną żyznością, znacznym nawilgoceniem przez niezbyt ruchliwe wody i w związku z tym lekką skłonnością do zabagnienia. Wody gruntowe, choć znajdują się przez cały rok blisko powierzchni ziemi, nie występują na ogół na powierzchnię, a tym bardziej brak tu dłużej trwającego zalewu, co wyraźnie odróżnia te siedliska od siedlisk olsowych.

Pod względem składu florystycznego fitocenozy należące do zespołu *Circaeο-Alnetum* wykazują dużą zmienność. Poszczególne płaty mogą wykazywać „odchylenia” do olsów (w warunkach silniejszego zabagnienia) albo też do łągów jesionowo-wiązowych (w warunkach wyższej żyzności i tylko minimalnego zabagnienia). Ta zmienność wewnętrzna nie ma swojego odbicia w legendzie mapy, jednak obserwacje terenowe pozwalają stwierdzić, że w niektórych terenach mogą przeważać postacie żyźniejsze, a w innym uboższe i bardziej zabagnione.

Roślinność rzeczywista na siedliskach określonych jako potencjalnie należące do zespołu *Circaeο-Alnetum* to najczęściej łąki należące do rzędu *Molinietalia*, w tym szczególnie do związku *Calthion*. Zbiorowiska leśne trafiają się na omawianym typie siedlisk raczej rzadko, przy czym w większości przypadków są to lasy bardzo znacznie odkształcone. Na siedliskach *Circaeο-Alnetum* nie spotyka się użytków ornych ani osiedli. Związek pomiędzy występowaniem łąk a rozprzestrzenieniem siedlisk *Circaeο-Alnetum* jest w wielu przypadkach tak ścisły, że kartując bardzo często można było przyjąć zasięg potencjalnego *Circaeο-Alnetum* za równy (przynajmniej w skali mapy przeglądowej) zasięgowi łąk, przy ciekach wodnych, przedstawionemu na podkładzie topograficznym.

Praktyczna identyfikacja *Circaeο-Alnetum*, jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej, jest w terenie dość łatwa, gdyż zwykle nie ma problemów z odgraniczeniem jej od innych kontaktujących się z nią w przestrzeni typów potencjalnych zbiorowisk roślinnych (grądy, dąbrowy, bory mieszane). Trudności może natomiast sprawiać oddzielenie *Circaeο-Alnetum* z jednej strony od olsów, a z drugiej od łągów jesionowo-wiązowych, a także niekiedy od łągów topolowo-wierzbowych. Trudności te są w znacznym stopniu obiektywne, gdyż jak już powiedziano, nawet w warunkach zbliżonych do naturalnych spotkać można wiele fitocenoz, które można określić jako typologicznie przejściowe pomiędzy typowym *Circaeο-Alnetum* a poprzednio wymienionymi zbiorowiskami higrofilnymi. Oznacza to, że w tej grupie zbiorowisk zaznacza się duża „nieostrość” granic typologicznych. Jeżeli dodać do tego

jeszcze dużą podatność na zmiany spowodowane działalnością człowieka jaką wykazują zbiorowiska higrofilne, co jest wynikiem bezpośredniego oddziaływania przez człowieka na najważniejszy czynnik siedliskowy, to znaczy na warunki wodne, trudności w identyfikacji potencjalnej roślinności naturalnej w tej grupie siedlisk nie powinny nikogo dziwić. Na ogół jednak trudne do identyfikacji przypadki trafiają się niezbyt często, stosunkowo najczęściej w szerokich, płaskich dolinach małych rzeczek poddanych silnej melioracji.

Podzespół *Ficario-Ulmetum typicum* J. Mat. 1976 — dolinowy łąg jesionowo-wiązowy

Jednostka ta obejmuje łągowe lasy jesionowo-wiązowe występujące na skrzydłach dolin wielkich rzek w zasięgu epizodycznych wylewów rzeki. Podłożem geologicznym tych siedlisk są drobnoziarniste mady rzeczne, a wykształcające się gleby należą do mad rzecznych czarnoziemnych lub mad rzecznych brunatniejących. Siedliska omawianego zbiorowiska są bardzo żyzne i umiarkowanie wilgotne.

Na badanym terenie siedliska *Ficario-Ulmetum typicum* występują w dolinach Wisły i Bzury, natomiast w dolinach Bugu i Narwi są zdecydowanie rzadsze, co jest wynikiem tego, iż rzeki te nie osadzają w swoich dolinach większej ilości drobnoziarnistych namulów.

Na obszarze objętym badaniami płaty dolinowych łągów jesionowo-wiązowych nie zachowały się właściwie nigdzie (jedynie fragmenty w parku w Pułtusk). Potencjalne siedliska łągów jesionowo-wiązowych zajęte są aktualnie przez łąki i przede wszystkim przez pola orne. Łąki na siedliskach *Ficario-Ulmetum typicum* należą do rzędu *Arrhenatheretalia* i są wysokowartościowymi użytkami zielonymi. Pola orne również odznaczają się wysoką żyznością i zajęte są głównie przez uprawy roślin przemysłowych (buraki cukrowe) i warzyw. Na siedliskach tych znaczne powierzchnie zajmują także sady owocowe.

Praktyczna identyfikacja *Ficario-Ulmetum typicum*, jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej jest dość łatwa, gdyż jest to zbiorowisko przywiązane do ściśle określonego typu siedliska (drobnoziarniste mady w dolinie wielkiej rzeki). Oddzielenie tej jednostki od innych zbiorowisk potencjalnych wchodzących w skład kompleksu zonacyjnego doliny wielkiej rzeki (*Salici-Populetum* w pobliżu nurtu, *Ficario-Ulmetum typicum* na skrzydle, *Circae-Alnetum* lub *Carici elongatae-Alnetum* niekiedy w pobliżu krawędzi doliny) jest na ogół łatwe.

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że na skutek znacznego ograniczenia wylewów rzeki przez wybudowanie wałów przeciwpowodziowych następuje stały proces upodabniania się siedlisk łągów jesionowo-wiązowych do siedlisk żyznych postaci grądów. Określenie na ile ten proces jest

zaawansowany i czy spowodował już jakościowe zmiany w siedlisku, bywa w poszczególnych przypadkach dość trudne.

Podzespół *Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum* (Faliński 1960) J. Mat. 1976 —
łąg jesionowo-wiązowy

Jednostka ta w warunkach naturalnych obejmuje lasy jesionowo-wiązowe o charakterze łągów występujące na specjalnych siedliskach nie związanych z doliną wielkiej rzeki. Łągi te spotkać można w dolinach małych cieków wodnych lub w rynnach pozbawionych stałego cieku w warunkach, bardzo wysokiej żyzności, dobrego nawilgocenia i braku tendencji do stagnacji wody. Gleby w zbiorowiskach tych należą do typu czarnych ziem i wykształcają się na podłożu żyznych glin i ilów.

Pod względem florystyczno-fitosocjologicznym łągi należące do podzespołu *Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum* mają w pewnym stopniu charakter pośredni pomiędzy łągami dolinowymi (*F.-U. typicum*) a łągami jesionowo-olszowymi (*Circaeo-Alnetum*). Łągi tego typu są także stosunkowo najbardziej podobne do grądów (Matuszkiewicz J. 1976).

Omawiany typ zbiorowiska łągowego występuje na badanym terenie rzadko i tylko na niewielkich powierzchniach.

Przy praktycznej identyfikacji *Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum*, jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej, zachodzi konieczność oddzielenia jej z jednej strony od grądów, a z drugiej od łągów, jesionowo-olszowych (*Circaeo-Alnetum*). W przypadku, gdy mamy do czynienia z roślinnością zbliżoną do naturalnej (co zdarza się bardzo rzadko) odróżnienie omawianej jednostki nie jest zbyt trudne, natomiast w przypadku braku roślinności leśnej sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana.

Jako cechy wyróżniające w stosunku do siedlisk niskich i żyznych grądów służyć mogą: występowanie (liczne) czeremchy, wiązów, chmielu w zaroślach, wysoka wilgotność, gleba typu czarnej ziemi.

Cechami wyróżniającymi w stosunku do siedlisk *Circaeo-Alnetum* mogą być: występowanie wiązów, występowanie łąk z rzędu *Arrhenatheretalia*, brak roślinności bagiennej, gleba typu czarnej ziemi, występowanie użytków ornych.

Zespół *Potentillo albae-Quercetum* Libb. 1933 — świetlista dąbrowa

Jednostka ta jest w warunkach naturalnych ciepłolubnym zbiorowiskiem lasu dębowego (na ogół z dominacją *Quercus sessilis*) wykazującym przynależność do zbiorowisk obszaru pontyjsko-pannońskiego. Zbiorowiska dąbrów świetlistych występują na badanym terenie na pagór-

kach strefy czołowomorenowej, na kemach i ozach oraz często na eksponowanych ku południowi krawędziach dolin.

Siedliska dąbrów świetlistych odznaczają się umiarkowaną żyznością, niewielką wilgotnością oraz dobrze przepuszczalnym, na ogół bogatym w wapń podłożem. Podłożem geologicznym tych siedlisk są najczęściej piaski i żwiry akumulacji czołowomorenowej, a także utwory pyłowe. Na podłożu tym wykształcają się gleby brunatne.

Potencjalne siedliska dąbrów świetlistych są na badanym obszarze częste i w wielu przypadkach rozprzestrzenione na dużych powierzchniach, daje się jednak zauważyć znaczna nierównomierność ich rozpowszechnienia w poszczególnych regionach. Do mezoregionów, w których siedliska dąbrów są szczególnie rozpowszechnione należą: Wysoczyzna Płońska, Wysoczyzna Ciechanowska i Wzniesienia Mławskie. Natomiast w takich mezoregionach, jak: Kotlina Płocka, Kotlina Warszawska, Dolina Dolnej Narwi, Dolina Dolnego Bugu czy Równina Wołomińska, siedlisk dąbrowy świetlistej niemal się nie spotyka. W rozprzestrzenieniu siedlisk świetlistej dąbrowy widać wyraźny związek pomiędzy występowaniem zbiorowisk tego typu a budową geologiczną terenu.

Siedliska potencjalnych zbiorowisk *Potentillo albae-Quercetum* zajęte są w stosunkowo znacznej części przez zbiorowiska leśne, przy czym jednak płaty o charakterze zbiorowisk zbliżonych do naturalnych trafiają się rzadko. Znacznie częściej są to kultury leśne (głównie sosnowe) w większym lub mniejszym stopniu zbliżone do zbiorowisk borów mieszanych.

Najczęstszym typem użytkowania ziemi na siedliskach dąbrów są użytki rolne. Pola na siedliskach tych należą najczęściej do kompleksu żytnio-ziemniaczanego mocnego. W niektórych rejonach (np. na Wysoczyźnie Płońskiej) znaczne powierzchnie zajmują uprawy malin i truskawek stanowiąc tam dość charakterystyczny typ gospodarki rolniczej.

Użytki zielone trafiają się na siedliskach świetlistej dąbrowy raczej rzadko, przy czym są to na ogół słabo wydajne pastwiska o charakterze kserotermicznych muraw. Łąk na siedliskach omawianego zespołu właściwie nie ma. Jest to wynikiem zbyt słabego uwilgotnienia tych siedlisk.

Na badanym obszarze rzadko tylko można spotkać na siedliskach świetlistej dąbrowy zarośla z rzędu *Prunetalia*, związków *Berberidion* i *Prunion fruticosae*, tak charakterystyczne dla tego kręgu zbiorowisk zastępczych w południowej Polsce.

Praktyczna identyfikacja świetlistej dąbrowy, jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej, jest dość trudna, gdy mamy do czynienia z roślinnością silnie zmienioną pod wpływem działalności człowieka. Z jednej strony odgraniczyć należy siedliska *Potentillo albae-Quercetum* od siedlisk grądów wysokich, a z drugiej — od borów mieszanych, co bywa niekiedy niezmiernie trudne.

W stosunku do grądów *Potentillo albae-Quercetum*, jako jednostka

potencjalnej roślinności naturalnej, wyróżnia się następującymi cechami:

— Występowanie w lesie lub w pozostałościach lasu takich gatunków jak: *Anthericum ramosum*, *Betonica officinalis*, *Melittis melissophyllum*, *Campanula persicifolia*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla alba*, *Pulmonaria angustifolia*, *Polygonatum odoratum*, *Peucedanum oreoselinum*, *P. cervaria* czy *Ranunculus polyanthemos*.

— Brak w lesie takich gatunków jak: *Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Galeobdolon luteum*, *Stellaria holostea*, *Polygonatum multiflorum*, *Milium effusum*, *Viburnum opulus*.

— Wyraźnie piaszczysto-żwirowe podłoże, szczególnie w głębszych warstwach.

— Występowanie ciepłolubnych muraw i zbiorowisk okrajkowych.

— Brak zarośli śródpolnych typu „czyżni”.

— Występowanie dużych skupień *Artemisia absinthium* w sąsiedztwie zabudowań.

— Brak większych ilości łopianów w sąsiedztwie domostw.

— Brak łąk i pastwisk.

Rozróżnienie siedlisk dąbrów świetlistych i borów mieszanych jest w niektórych przypadkach bardzo trudne. Trudności te wynikają z jednej strony z tego, iż w obrębie *Pino-Quercetum* wydzielić można postaci bardzo zbliżone pod względem składu florystycznego do dąbrów. Taka postać borów mieszanych występuje, jak się wydaje, tylko w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, zastępując tam w znacznym stopniu świetliste dąbrowy. We wschodniej części badanego terenu zaznacza się już w pewnym stopniu zawężanie amplitudy ekologicznej dąbrów na korzyść borów mieszanych (*Pino-Quercetum serratuletosum* Sołkowski 1963), co znajduje odbicie w rozprzestrzenieniu dąbrów przedstawionemu na mapie. Z drugiej strony jednostronna gospodarka leśna, polegająca na czysto sosnowych zalesieniach, jak również ekstensywna gospodarka rolna powodują w mniejszym lub większym stopniu degradację siedlisk świetlistej dąbrowy i upodobnienie do siedlisk borów mieszanych, a w szczególnie drastycznych przypadkach nawet do siedlisk borów sosnowych. W tych przypadkach bardzo trudno jest określić, czy proces degradacji jest już do tego stopnia posunięty, że siedliska pierwotnie zajmowane przez dąbrowy są potencjalnie siedliskami borów mieszanych, czy też pozostają jeszcze potencjalnymi siedliskami dąbrów. Odpowiedź na to pytanie mogą dać raczej badania glebowe (określenie stopnia zbielcowania, zakwaszenia i inne), niż analiza składu florystycznego, często w tych przypadkach bardzo ubogiego i nie dającego podstaw do identyfikacji.

Niżej wymienione cechy można uznać za wyróżniające *Potentilla albae-Quercetum* jako jednostkę potencjalnej roślinności naturalnej w stosunku do borów mieszanych:

— Występowanie w lesie gatunków: *Potentilla alba*, *Melittis melis-*

sophyllum, *Betonica officinalis*, *Primula officinalis*, *Ranunculus polyanthemos* i innych, szczególnie gdy reprezentowane są przez większą liczbę osobników.

— Mały udział w lesie: *Dicranum undulatum*, *Vaccinium myrtillus*, *V. vitis-idaea*, *Calluna vulgaris*, *Molinia coerulea*.

— Wyraźny poziom brunatnienia w profilu glebowym.

— Brak wyraźnego procesu bielcowania w glebie.

— Obojętny odczyn gleby w niższych poziomach.

— Brak próchnicy nakładowej i silnego zakwaszenia górnych warstw gleby.

— W podłożu (zwykle piaszczysto-żwirowym) występowanie wyraźnego warstwowania oraz cienkich niejednokrotnie warstw drobnoziarnistych, często z dużą zawartością węglanu wapnia.

— Występowanie muraw kserotermicznych i ciepłych zbiorowisk okrajkowych (z klasy *Trifolio-Geranietae sanguinei*, związku *Geranion sanguinei*).

— Występowanie pojedynczych róż przy drogach i na miedzach.

— Występowanie skupień *Artemisia absinthium* w sąsiedztwie zabudowań.

Zespół *Tilio-Carpinetum* Tracz. 1962 w odmianie mazowieckiej — subkontynentalne grądy obszaru nizin mazowieckich

Zbiorowiska grądowe — to w warunkach naturalnych mezotroficzne i eutroficzne lasy dębowo-grabowe, będące na tym obszarze zbiorowiskiem zonalnym. Grądy badanego obszaru reprezentują regionalny zespół *Tilio-Carpinetum*, jedynie w skrajnie południowo-zachodniej części terenu (zachodnia część Równiny Kutnowskiej) występuje regionalna postać grądów, która być może powinna zostać zaliczona do zespołu *Galio-Carpinetum* w odmianie kujawskiej.

Grądy występują we wszystkich regionach badanego obszaru i choć ich udział powierzchniowy jest w poszczególnych regionach różny, to są one zdecydowanie najpospolitszym typem potencjalnego zbiorowiska roślinnego.

Amplituda ekologiczna grądów obejmuje szeroki wachlarz siedlisk; występują one na bardzo różnych typach podłoża geologicznego, jednak najczęściej na glinach zwałowych, ilach, piaskach zalegających na glinach lub na ilach i innych utworach drobnoziarnistych, rzadziej na dyluwalnych piaskach, piaskach rzecznych tarasów akumulacyjnych, sandrach, czy innych gruboziarnistych typach podłoża.

Ogólnie rzecz biorąc amplituda siedliskowa grądów, jeśli chodzi o żyzność, jest bardzo szeroka, zdecydowanie najszerza w porównaniu z innymi typami zbiorowisk, natomiast amplituda wilgotnościowa siedlisk

grądów jest stosunkowo węższa w porównaniu z takimi typami zbiorowisk, jak bory¹ i bory mieszane, jednak znacznie szersza niż w łęgach, olsach, a także w dąbrowach.

Zmienność siedliskową zbiorowisk grądowych przedstawić można jako wynik częściowo niezależnej kombinacji dwu głównych czynników siedliskowych, a mianowicie wilgotności i żyzności siedliska. Podziałowi siedlisk pod względem wilgotności odpowiada podział na grądy wysokie (*T.-C. calamagrostietosum*), grądy typowe (*T.-C. typicum*) i grądy niskie (*T.-C. stachyetosum*, *T.-C. corydaletosum*, *T.-C. polytrichetosum*). Zmienność ta nie została uwzględniona w legendzie mapy na skutek tego, iż ma charakter zdecydowanie lokalny (to znaczy zachodzi na ogół na niewielkich powierzchniach) i w większości przypadków nie mogłaby być przedstawiona na mapie w skali 1 : 300 000.

Zróżnicowaniu siedlisk pod względem żyzności również odpowiada zróżnicowanie zbiorowisk grądowych. Ta zmienność została uwzględniona w legendzie mapy przez wydzielenie dwu serii grądów, a mianowicie serii ubogiej i żyznej. Podział ten jest moim zdaniem niezbyt jasny, gdyż tak ujętym jednostkom legendy nie odpowiadają ściśle dotychczas opisane syntaksony, co było przecież naczelną zasadą konstrukcji legendy. Oczywiście, można niektóre z dotychczas opisanych syntaksonów jednoznacznie zaliczyć do jednej lub drugiej serii (np. *T.-C. calamagrostietosum* i *T.-C. polytrichetosum* do serii ubogiej, natomiast *T.-C. corydaletosum* czy *T.-C. stachyetosum* do serii żyznej), jednak znaczna większość grądów określanych jako *T.-C. typicum* jest trudna do zaliczenia do jednej lub drugiej serii. Być może, odpowiedniejszy byłby trójpodział na grądy ubogie, umiarkowanie żyzne i wybitnie żyzne.

Na badanym obszarze grądy zaliczone do serii ubogiej stanowią przeważającą część zbiorowisk grądowych i występują na większej lub mniejszej powierzchni we wszystkich regionach. Natomiast grądy zaliczone do serii żyznej są na badanym terenie rzadsze i występują na większych powierzchniach tylko w niektórych regionach (głównie: Wysoczyzna Płńska, Równina Kutnowska i Wysoczyzna Ciechanowska).

Siedliska grądowe są na obszarze objętym opracowaniem w olbrzymiej większości użytkowane rolniczo przede wszystkim jako użytki orne. Powierzchni leśnych na siedliskach grądowych jest bardzo niewiele, przy czym są to na ogół niewielkie fragmenty lasów, często silnie zniekształcone.

Pola orne na siedliskach grądowych zaliczane są do kompleksu żytnio-ziemniaczanego lub pszenno-buraczanego, przy czym na siedliskach grądów serii żyznej mamy do czynienia niemal wyłącznie z tym drugim kierunkiem produkcji. Dość częste na siedliskach grądów, ale na ogół małopowierzchniowe, są użytki łąkowo-pastwiskowe; są to zwykle żyzne dwu- lub trzykośne łąki pod względem fitosocjologicznym należące do rzędu *Arrhenatheretalia*, związku *Arrhenatherion*, albo pastwiska na-

leżące do związku *Cynosurion*. Na siedliskach grądowych częste są (szczególnie w niektórych okolicach) sady owocowe i uprawy warzyw.

Charakterystycznym typem roślinności zastępczej na siedliskach grądów są zarośla śródpolne i otulinowe należące do zespołu *Carpino-Prunetum spinosae* R. Tx. 1952, czyli tak zwane czyżnie. Na badanym obszarze ich bujny rozwój ma miejsce głównie na siedliskach grądów serii żyznej.

Inną charakterystyczną cechą siedlisk grądowych jest bujny rozwój różnorodnej roślinności synantropijnej na przypłociach i przychaciach we wsiach (szczególnie z daleka widoczne łopiany), jak również przy drogach, na miedzach itp:

Praktyczna identyfikacja grądów, jako jednostki potencjalnej roślinności naturalnej, jest raczej łatwa (duża liczba zbiorowisk zastępczych o wyraźnej fizjonomii, ściśle związanych z tym typem siedliska i dość dobrze zbadanych pod względem fitosocjologicznym). Natomiast pewne trudności sprawia niekiedy oddzielenie ubogich postaci grądów od borów mieszanych i dąbrów świetlistych, co omówiono przy charakterystyce tych jednostek.

Zespół *Galio (silvatici)-Carpinetum* Oberd. 1957 w odmianie kujawskiej — środkowoeuropejskie grądy obszaru Kujaw

(Jednostka nie uwzględniona na mapie!)

Zespół *Galio-Carpinetum* jest regionalnie wikaryzującym zespołem grądowym w stosunku do poprzednio omówionego zespołu *Tilio-Carpinetum*. Zespół *Galio-Carpinetum* występuje, być może, na badanym terenie w szczególnej postaci regionalnej, określonej jako odmiana kujawska. Tę postać regionalną wyróżnił po raz pierwszy Olaczek (mscr.), zaliczając ją jednak do zespołu *Tilio-Carpinetum*. Charakterystyka fitosocjologiczna tej jednostki sprowadza się do współwystępowania gatunków wyróżniających obydwie zespoły regionalne (*Tilio-Carpinetum* i *Galio-Carpinetum*) jednak jak wykazują ostatnie opracowania syntaksonomiczne, właściwsze jest chyba zaliczenie jej do zespołu *Galio-Carpinetum*.

Jednostka ta nie została wydzielona na mapie, ponieważ pierwotnie nie była przewidziana w legendzie mapy, podobnie jak szereg innych lokalnych postaci. Jeżeli jednak przy opracowaniu mapy dla całej Polski zostanie ona uwzględniona w legendzie, posiadane przeze mnie dane pozwolą na wykreślenie jej zasięgu.

Grądy, które mogą być zaliczone do zespołu *Galio-Carpinetum* w odmianie kujawskiej, występują w południowo-zachodniej części badanego terenu na Równinie Kutnowskiej. Przeprowadzenie ścisłej granicy pomiędzy grądami środkowoeuropejskimi a zastępującymi je dalej na północy i wschodzie grądami subkontynentalnymi (*Tilio-Carpinetum*) jest

dość trudne na skutek małej lesistości terenu, a być może, w tej skali nawet niemożliwe.

Wszystko co powiedziano na temat warunków siedliskowych, zmienności i kręgów zbiorowisk zastępczych zespołu *Tilio-Carpinetum* odnosi się także do omawianej tu jednostki.

4. Rozmieszczenie potencjalnych zbiorowisk roślinnych na badanym terenie

Rzut oka na mapę potencjalnych zbiorowisk roślinnych pozwala stwierdzić, że roślinność potencjalna badanego obszaru, choć stosunkowo mało zróżnicowana pod względem typologicznym (zaledwie 13 jednostek legendy), wykazuje znaczną niejednorodność w rozmieszczeniu przestrzennym.

Zmienność przestrzenną potencjalnej roślinności naturalnej omówię regionalnie, przyjmując za podstawę podział fizyczno-geograficzny Polski według Kondrackiego (1977). Jako jednostkę podstawową przyjmuję mezoregion, przy czym omawiać będę tylko te mezoregiony, które zostały w większym stopniu objęte zasięgiem opracowania.

Mezoregion Pojezierze Dobrzyńskie

Opracowanie objęło południowo-wschodnią część tego regionu w okolicach Płocka i Dobrzynia nad Wisłą.

Na obszarze tym dominującym przestrzennie potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są grądy (*Tilio-Carpinetum*) zarówno uboższej jak i żyźniejszej serii. Częste są tu również siedliska borów mieszanych, a w dolinach cieków wodnych — siedliska łęgów jesionowo-olszowych (*Circaeo-Alnetum*). Na krawędzi doliny Wisły, a także w niektórych innych miejscach, potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są świetliste dąbrowy (*Potentillo albae-Quercetum*). W dolinie Skrwy wąskim pasem rozciągają się siedliska łęgów topolowo-wierzbowych (*Salici-Populetum*), natomiast w niektórych dolinkach małych cieków wodnych spotkać można siedliska łęgów jesionowo-wiązowych (*Ficario-Ulmetum chrysosplenetosum*). Brak na tym terenie borów sosnowych.

Mezoregion Kotlina Płocka

Na obszarze wschodniej części tego mezoregionu objętej zasięgiem opracowania, dominującym potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są bory mieszane (*Pino-Quercetum*) i — szczególnie w kierunku zachodnim — subkontynentalne bory sosnowe (*Peucedano-Pinetum*). Częste są tu siedliska olsów (*Carici elongatae-Alnetum*), występujące jednak zwykle na małych powierzchniach. Niekiedy na bardzo małych powierzchniach

spotkać można torfowiska wysokie. Siedliska grądów są tu raczej rzadkie, a siedliska dąbrów świetlistych trafiają się zupełnie wyjątkowo. Należy jeszcze zaznaczyć, że w regionie tym zbiorowiska leśne zajmują stosunkowo znaczne powierzchnie.

Mezoregion Wzniesienia Mławskie

Region ten, objęty opracowaniem w znacznej części, podzielić można pod względem zróżnicowania potencjalnej roślinności naturalnej na dwie części.

W części zachodniej i południowej, w okolicach Żuromina, Mławy, Działdowa i Ciechanowa zdecydowanie najczęstsze są siedliska grądów, dąbrów świetlistych i łęgów jesionowo-olszowych.

W części wschodniej najczęstszym typem potencjalnej roślinności naturalnej są bory mieszane; znaczny jest także udział subkontynentalnych borów sosnowych oraz olsów (szczególnie w dolinie Orzycy).

Mezoregion Równina Raciąska

Potencjalna roślinność naturalna na obszarze tego regionu jest bardzo zróżnicowana tak, że trudno jest powiedzieć jakie zbiorowisko dominuje tu przestrzennie. Największe powierzchnie zajmują grądy i bory mieszane, jednak w niektórych terenach znaczny jest udział dąbrów świetlistych, a w innych — subkontynentalnych borów sosnowych. Często są też siedliska łęgów jesionowo-olszowych i olsów.

Mezoregion Wysoczyzna Płońska

Na Wysoczyźnie Płońskiej zdecydowanie dominują siedliska grądów, szczególnie serii żyznej. W części centralnej, wschodniej i na skraju doliny Wisły na zachód od Wyszogrodu większe powierzchnie zajmują siedliska świetlistych dąbrów. Na całym obszarze bardzo częste są siedliska łęgów jesionowo-olszowych. Siedliska borów mieszanych i olsów trafiają się tu zupełnie wyjątkowo, brak natomiast siedlisk borów sosnowych. Zwrócić należy uwagę na bardzo znaczny stopień odlesienia tego terenu.

Mezoregion Wysoczyzna Ciechanowska

Dominującym przestrzennie potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym tego obszaru są grądy. Obok nich znaczne powierzchnie zajmują świetliste dąbrowy (szczególnie w części południowej w okolicach Nasielska i Serocka) oraz bory mieszane w części północno-wschodniej w okolicach Makowa Mazowieckiego i Różana. Często są tu, podobnie jak w innych terenach, siedliska łęgów jesionowo-olszowych. Brak niemal zupełnie borów sosnowych.

Najczęstszymi potencjalnymi zbiorowiskami tego obszaru są subkontynentalne bory i bory mieszane, a w pobliżu koryta rzeki, na aktualnym tarasie akumulacyjnym, łęgi topolowo-wierzbowe. Częste są tu również siedliska olsów zajmujące szczególnie dużą powierzchnię na tzw. Bagnie Pulwy. Siedliska grądów są na tym terenie mniej częste. Zupełnie wyjątkowo spotkać można siedliska dolinowych łęgów jesionowowiązowych (*Ficario-Ulmetum typicum*). Region ten ma stosunkowo dobrze zachowaną roślinność leśną, szczególnie na siedliskach borowych (np. w okolicach Pułtusza i Różana).

Mezoregion Międzyrzecze Łomżyńskie

Opracowanie objęło znaczną część tego regionu, z wyjątkiem części północnej w okolicach Ostrołęki i Łomży.

Obszar Międzyrzecza Łomżyńskiego jest pod względem zróżnicowania potencjalnej roślinności naturalnej wyraźnie niejednorodny. W części zachodniej, na zachód od Wyszkowa, dominują grądy i świetliste dąbrowy. W części środkowej między Wyszkowem a Ostrowią Mazowiecką zdecydowanie przeważają subkontynentalne bory i bory mieszane. W części północnej, na północny-zachód od Ostrowi Mazowieckiej, najczęstszymi potencjalnymi zbiorowiskami roślinnymi są grądy i bory mieszane, nierzadkie są też olsy, trafiają się dąbrowy. Natomiast wzniesienia Czerwonego Boru na zachód od Zambrowa zajmują bory mieszane i subkontynentalne bory.

Zachował się tu duży kompleks leśny Puszczy Białej.

Mezoregion Równina Kutnowska

Na obszarze tego regionu dominują siedliska grądów w znacznym stopniu serii żyznej, przy czym prawdopodobnie część zbiorowisk grądowych (w części zachodniej terenu) powinna być zaliczona do grądów środkowoeuropejskich (*Galio-Carpinetum*).

Na południowy zachód od Gostynina rozciąga się dość znaczny obszar występowania borów mieszanych i subkontynentalnych borów, natomiast na wschód od Gąbina większe powierzchnie zajęte są przez siedliska świetlistych dąbrow. Poza tymi dwoma obszarami Równina Kutnowska jest bardzo mało urozmaicona pod względem potencjalnej roślinności naturalnej. Odlesienie tego terenu jest bardzo znaczne.

Mezoregion Kotlina Warszawska

Badania objęły tylko zachodnią część oraz skrajnie północno-wschodni skrawek tego regionu.

Ze względu na rozmieszczenie jednostek potencjalnej roślinności naturalnej w obrębie Kotliny Warszawskiej wydzielić należy trzy strefy: dolinę Wisły w wąskim ujęciu z siedliskami łągów jesionowo-wiązowych (*Ficario-Ulmetum typicum*) i w mniejszym stopniu — łągów topolowo-wierzbowych (*Salici-Populetum*) oraz dwie strefy starego tarasu akumulacyjnego po obu stronach doliny, na których dominują siedliska borów mieszanych i w mniejszym stopniu — borów lub grądów. Bory sosnowe w Kotlinie Warszawskiej należą na ogół do zespołu *Peucedano-Pinetum*, choć dość liczne, ale na ogół niewielkie fragmenty mogą być zaliczone do zespołu *Leucobryo-Pinetum*.

Na obszarze omawianego mezoregionu brak jest niemal zupełnie siedlisk świetlistej dąbrowy.

Mezoregion Dolina Dolnego Bugu

Dominującym przestrzennie potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym na tym terenie są łągi topolowo-wierzbowe (*Salici-Populetum*). Oprócz nich, szczególnie w części wschodniej, w okolicach Sadownego i Małkini, znaczne powierzchnie zajmują siedliska olsów, łągów jesionowo-olszowych i borów mieszanych. Siedliska grądów są raczej rzadkie; siedliska łągów jesionowo-wiązowych trafiają się zupełnie wyjątkowo. Bory sosnowe są niezbyt pospolite, przy czym w części wschodniej należą do zespołu *Leucobryo-Pinetum*, a w części zachodniej raczej do zespołu *Peucedano-Pinetum*.

Mezoregion Równina Wołomińska

Najszerzej rozpowszechnionym potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym tego regionu są bory mieszane. Bardzo częste są również subcepaniczne bory sosnowe (*Leucobryo-Pinetum*) i w mniejszym — stopniu grądy. Zwraca uwagę szerokie rozprzestrzenienie olsów oraz stosunkowo częste występowanie borów bagiennych (*Vaccinio uliginosi-Pinetum*). Zupełnie brak tu siedlisk dąbrów świetlistych. Lesistość tego terenu jest stosunkowo duża.

Mezoregion Wysoczyzna Kałuszyńska

Potencjalna roślinność naturalna objętej badaniami północnej części mezoregionu jest wyraźnie niejednolita. Dominują tu siedliska grądów, dąbrów świetlistych i borów mieszanych, a także znaczny jest udział łągów jesionowo-olszowych. Brak tu borów sosnowych, a także olsów.

Mezoregion Obniżenie Węgrowskie

W objętej badaniami północnej części regionu najczęstszym potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są łągi jesionowo-olszowe (głównie w

szerokiej dolinie Liwca) oraz bory mieszane. Częste są tu również suboceaniczne bory sosnowe i olsy, natomiast siedliska grądów trafiają się stosunkowo rzadko, a siedliska dąbrów świetlistych brak całkowicie.

Mezoregion Wysoczyzna Siedlecka

Zróźnicowanie objętej badaniami, potencjalnej roślinności naturalnej północno-zachodniej części tego regionu jest bardzo znaczne. Najpospolitsze są tu siedliska grądów, jednak na niektórych obszarach znaczne powierzchnie zajmują siedliska borów mieszanych. Siedliska świetlistych dąbrów nie są zbyt pospolite, z wyjątkiem pasa ciągnącego się od Węgrowa do Kosowa Lackiego. Dość często można spotkać w tym regionie siedliska olsów, znacznie rzadziej — suboceanicznych borów sosnowych, borów bagiennych i łęgów jesionowo-wiązowych (*Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum*).

Mezoregion Wysoczyzna Wysokomazowiecka

W podziale fizyczno-geograficznym (Kondracki 1968, 1977) mezoregion ten zaliczony jest do Obszaru Europy Wschodniej, co nie znajduje potwierdzenia geobotanicznego. W podziale geobotanicznym (Szafer 1972) tereny te zaliczone zostały do Działu Bałtyckiego, a nie do Działu Północnego.

Na objętej badaniami zachodniej części tego mezoregionu dominującym przestrzennie typem potencjalnej roślinności naturalnej są grądy (*Tilio-Carpinetum* w odmianie mazowieckiej). W południowej części regionu, w okolicach Małkini i Nuru szeroko rozprzestrzenione są bory mieszane i w mniejszym stopniu subkontynentalne bory sosnowe. Dąbrowy świetliste nie są tu zbyt częste; ich siedliska grupują się w okolicach Zambrowa.

V. POTENCJALNE FITOKOMPLEKSY KRAJOBRAZOWE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

1. Określenie jednostki i rozważania ogólne

W części II niniejszej pracy omówiono ogólnie zarys organizacji roślinności na tzw. poziomie, co przedstawiono schematycznie na ryc. 1. Stwierdzono tam, że w hierarchicznej strukturze organizacji roślinności wyróżnić można poziom jednostek krajobrazowych określonych mianem fitokompleksów krajobrazowych. Spróbujmy teraz bliżej zająć się tym rodzajem układów roślinności.

Fitokompleks krajobrazowy zdefiniowany został jako przestrzenny układ fitocenoz realnie występujący w przyrodzie, charakteryzujący się

określonym zestawem i przestrzennym rozmieszczeniem zbiorowisk roślinnych. Definicja ta określając ogólnie charakter tej jednostki nie zawiera jednak charakterystyki pozwalającej na ścisłe odgraniczenie fitokompleksu krajobrazowego od innych przestrzennych układów roślinności. Podanie ścisłego „*diferentia specifica*” nie wydaje mi się w tej chwili możliwe, wobec czego określe tę jednostkę przez omówienie.

Fitokompleks krajobrazowy jest komórką organizacyjną i przestrzenną roślinności, to znaczy jest strukturalną częścią roślinności obejmującą ogół organizmów roślinnych określonego wycinka przestrzeni geograficznej. Zatem roślinność jest podzielona na wielką, lecz skończoną liczbę fitokompleksów krajobrazowych, a w określonym punkcie przestrzeni reprezentowana przez jeden i tylko jeden fitokompleks krajobrazowy.

Elementami składowymi fitokompleksu krajobrazowego są przede wszystkim fitocenozy. Wchodzą one w skład fitokompleksu krajobrazowego w dużej liczbie, przy czym pod względem typologicznym należą one do różnych syntaksonów, a często także do różnych formacji. Dla przykładu, fitokompleks krajobrazowy składać się może z fitocenoz boru sosnowego, lasu dębowo-grabowego, łąk kośnych, pól uprawnych i szuwarów turzycowych. Poszczególne typy (syntaksony) reprezentowane są przez różną liczbę fitocenoz. Wynika z tego, że fitokompleks krajobrazowy jest jednostką roślinności zajmującą znacznie większą przestrzeń niż fitocenoza. O ile powierzchnię zajmowaną przez konkretną fitocenozę podajemy zwykle w arach lub najwyżej w hektarach, to powierzchnię fitokompleksu krajobrazowego podawać będziemy w kilometrach kwadratowych.

Komponentami fitokompleksu krajobrazowego, oprócz fitocenoz, są również inne układy roślinne. Układami takimi są zbiorowiska zależne, pod którym to pojęciem rozumiem zbiorowiska roślinne, na ogół małcopowierzchniowe, występujące zwykle na styku dwu fitocenoz (np. na styku lasu i pola), w swojej egzystencji uzależnione od sąsiadującej fitocenozy stwarzającej warunki dla ich występowania, ale ostro oddzielone przestrzennie od sąsiadujących fitocenoz. Przykładami zbiorowisk zależnych w tym rozumieniu są zbiorowiska okrajkowe z klas *Trifolio-Geranietae* i *Artemisietae* (podzwiałek *Alliarion* z rzędu *Onopordetalia acanthii*, rząd *Convolvuletalia sepium*), a także zbiorowiska otulinowe i inne.

W skład fitokompleksu krajobrazowego wchodzić mogą także układy roślinne, nazwane tu prowizorycznie lokalnymi agregacjami fitocenoz. Pod tym pojęciem rozumiem układy roślinne zajmujące dość znaczne powierzchnie (mierzone w arach lub w hektarach), a składające się ze zbiorowisk roślinnych należących do różnych syntaksonów. Zbiorowiska wchodzące w skład lokalnej agregacji fitocenoz powiązane są ze sobą związkami dynamiczno-sukcesyjnymi lub też odzwierciedlają mi-

kromozaikę siedlisk, mogą też być zbiorowiskami periodycznie się zastępującymi. Przykładami lokalnych agregacji fitocenozy mogą być: roślinność torfowiska wysokiego, roślinność pasa przybrzeżnego nad jeziorem, roślinność wydmy nad morzem, zbiorowiska utrwalonych piargów w górach, a także roślinność „szachownicy pól”, gdzie na poszczególnych łanach są bądź uprawy okopowe, bądź zbożowe, wymieniające się w kolejnych latach. Jak się wydaje wprowadzane ostatnio pojęcie „sigma-socjacja” (Géhu 1977) oznacza typ jednostki realnej, określonej tu mianem lokalnej agregacji fitocenozy.

Niektóre populacje roślinne (szczególnie lekkonasiennych drzew) mogą być traktowane również jako samodzielny składnik fitokompleksu krajobrazowego. Pomimo, że poszczególne osobniki wchodziły w skład fitocenozy (mogą tam odgrywać nawet dużą rolę) to populacja jako całość „nie mieści się” w żadnej z nich.

Jak z powyższego widać, w skład fitokompleksu krajobrazowego wchodzi kilka rodzajów układów roślinnych, przy czym każdy z tych rodzajów jest zróżnicowany na jednostki typologiczne. Jeżeli dodamy do tego relacje przestrzenne pomiędzy tymi komponentami otrzymamy przybliżony obraz skomplikowanej struktury fitokompleksu krajobrazowego.

W niniejszej pracy interesujący nas poziom układów ekologicznych wyróżniony został na podstawie struktury przestrzennej, są jednak podstawy aby sądzić, że nie jest to jedyny aspekt tego rodzaju układów. Wydaje się, że pomiędzy komponentami układu zachodzą zależności nie tylko natury przestrzennej, lecz również zależności o charakterze biologicznym.

Jak wiadomo, występowanie takiej, a nie innej fitocenozy jest, między innymi, wynikiem występowania określonego zespołu warunków środowiska, na kształtowanie którego mają przecież wpływ fitocenozy sąsiednie.

Wpływ fitocenozy sąsiednich wyrażać się może: modyfikacją warunków siedliska abiotycznego (np. stosunków termicznych i wilgotnościowych), wkraczaniem populacji roślinnych mających swoją ostoję w fitocenozie sąsiedniej, a także wpływem zwierząt, których obecność w interesującej nas fitocenozie może być uzależniona od występowania takich, a nie innych fitocenozy w sąsiedztwie. Przykładowo na charakter konkretnej łąki mają wpływ nie tylko takie czynniki, jak podłoże geologiczne, stosunki wodne, czy użytkowanie przez człowieka, ale również to, czy w sąsiedztwie jest las czy pole. Bowiem w zależności od tego na interesującej nas łące inaczej będą się kształtowały warunki mikroklimatu, inne populacje roślinne będą wykazywały tendencje do wkraczania, a także inne zwierzęta będą się tu pojawiały.

Ze stwierdzenia oddziaływań pomiędzy fitocenozami położonymi w niedalekiej od siebie odległości, przy czym charakter tych oddziaływań

jest zależny od specyfiki tych fitocenoz, wynika, że można przyjąć za wysoce prawdopodobne istnienie specyficznych związków pomiędzy komponentami fitokompleksu krajobrazowego. Pozwala to z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać fitokompleks krajobrazowy za układ ekologiczny w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie tylko i wyłącznie za układ przestrzenny wynikający ze zróżnicowania warunków środowiska abiotycznego.

Jeżeli zgodzimy się z tym, że fitokompleks krajobrazowy jest strukturalną jednostką roślinności, to pojęcia potencjalnej, rzeczywistej czy pierwotnej roślinności odnoszą się w tym samym stopniu do poziomu fitokompleksu krajobrazowego, jak i do poziomu fitocenozy.

Przedmiotem badania niniejszej pracy jest potencjalna roślinność naturalna, w związku z tym w tej części opracowania zajmować się będą potencjalnymi fitokompleksami krajobrazowymi. Zakładam przy tym, że relacja pomiędzy potencjalnymi a rzeczywistymi fitokompleksami krajobrazowymi jest analogiczna jak pomiędzy potencjalnymi a rzeczywistymi zbiorowiskami roślinnymi.

Zróżnicowanie roślinności na potencjalne fitokompleksy krajobrazowe, a także ich struktura wewnętrzna ma swoje źródło przede wszystkim w warunkach siedliska abiotycznego. Każdy większy wycinek powierzchni Ziemi, nawet jednorodny pod względem pewnych czynników siedliskowych (np. typu budowy geologicznej czy klimatu), jest niejednorodny pod względem szeregu innych czynników (np. stosunków wodnych, mikroklimatu, żyzności podłoża czy innych). Ta niejednorodność powoduje powstanie „mozaiki siedlisk”, czemu odpowiada zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych.

Wszystko to wskazuje, że w warunkach lokalnych na ogół można doszukać się jakiejś prawidłowości w przestrzennym rozmieszczeniu fitocenoz naturalnych i określić typowe dla danych warunków lokalnych serie zonacyjne. Lokalna seria zonacyjna jest przestrzennym szeregiem fitocenoz będącym następstwem kierunkowej zmienności czynnika siedliskowego (np. wilgotności gleby) powodującego zróżnicowanie roślinności w danych warunkach lokalnych.

Przykładowo, na obszarze wydmyowym typowa seria zonacyjna przedstawiać się może następująco: na szczytach wydmy występuje bór chrobotkowy (*Cladonio-Pinetum*); niżej na stokach występuje bór świeży (*Leucobryo-Pinetum s.str.* lub *Peucedano-Pinetum s.str.*); jeszcze niżej w zagłębieniu między wydmyami w miejscach okresowo podtapianych przez wody gruntowe występuje bór wilgotny („*Molinio-Pinetum*”); w końcu, jeśli zagłębienie jest trwale podtopione wodą znajdziemy tam zbiorowisko boru bagiennego (*Vaccinio uliginosi-Pinetum*) lub nawet torfowisko wysokie. Nie jest to jedyna możliwa seria zbiorowisk roślinnych w obszarze wydmyowym, lecz może najbardziej charakterystyczna dla te-

go typu warunków, grupująca zbiorowiska skrajnie oligotroficznych siedlisk.

Inny przykład z obszaru czołowo-morenowego w Polsce centralnej: na szczycie i górnych partiach zboczy pagórka występuje świetlista dąbrowa (*Potentillo albae-Quercetum*), niżej grąd typowy (*Tilio-Carpinetum typicum*), jeszcze niżej grąd wilgotny (*Tilio-Carpinetum stacheytosum*), a w końcu w dolinie strumienia łęg jesionowo-olszowy (*Circaeo-Alnetum*).

W dotychczasowych badaniach fitosocjologicznych omawiany poziom organizacji roślinności, określony jako fitokompleks krajobrazowy, rzadko kiedy był wyróżniany. W niektórych pracach dotyczących potencjalnej roślinności naturalnej wprowadzono pojęcie krajobrazu roślinnego (Tüxen 1956; Wojterski et. al. 1973) w pewnym stopniu zapożyczonego z dziedziny nauk geograficznych. W naukach geograficznych termin krajobraz bywa rozumiany dwojako, a mianowicie w znaczeniu typologicznym jako fizjonomiczny typ terenu (Kondracki 1965) oraz rzadziej (głównie przez autorów niemieckich i radzieckich) w znaczeniu regionalnym, jako określenie geokompleksu pewnej klasy mniej więcej na szczeblu mikroregionu (Kondracki 1965, 1976).

Termin „krajobraz roślinny” w moim rozumieniu jest odpowiednikiem geograficznego pojęcia „krajobraz naturalny”, to znaczy należy go rozumieć w znaczeniu typologicznym. Natomiast fitokompleks krajobrazowy oznacza konkretny układ ekologiczny i dlatego pojęciowo odpowiada on geokompleksowi pewnej klasy.

Zastanawiając się, jaka klasa geokompleksów odpowiada fitokompleksowi krajobrazowemu, dochodzę do wniosku, że jest nią klasa tzw. „typów terenu” czyli „terenów”. Według poglądów Marsza (1975) „teren” jest geokompleksem składającym się z szeregu różnych pod względem typologicznym uroczysk (Kondracki 1976), stanowiącym pewne indywiduum geograficzne i mającym określoną genezę. Obszerniejsze wyjaśnienia oraz przykłady podane przez tego autora skłaniają mnie do wniosku, że zróżnicowanie roślinności (przynajmniej potencjalnej) na fitokompleksy krajobrazowe jest odbiciem zróżnicowania epigeosfery na „typy terenu” czyli w terminologii innych badaczy: mikrochory (Neef 1963), „miestności” (Basalykas, Šleinie 1965), eko-chory (Haase 1967).

Akcentując nadzieję określenia jednoznacznych zależności pomiędzy fitokompleksami krajobrazowymi czy szerzej biokompleksami krajobrazowymi a jednostkami fizyczno-geograficznymi chciałbym równocześnie podkreślić, że traktuję biokompleks krajobrazowy jako w pewnym stopniu autonomiczny układ ekologiczny. Stawiam hipotezę, że biokompleks krajobrazowy, którego formę nadaje wchodzący w jego skład fitokompleks, jest nie tylko odbiciem zróżnicowania warunków siedliska ale także układem ekologicznym, to znaczy układem organizmów żywych

powiązanych specyficznymi zależnościami o charakterze biologicznym.

W. Matuszkiewicz (1974) używa terminu „krajobraz” na oznaczenie „strukturalno-funkcjonalnych i dynamicznych układów ekologiczno-przestrzennych, obejmujących mniejsze i większe wycinki biosfery i składających się z grup ekosystemów powiązanych określonymi stosunkami biocenotycznymi i biotopowymi”, a składową roślinną tak rozumianego krajobrazu określa jako „roślinność”. Prezentowane w niniejszej pracy ujęcie stanowi rozbudowę przytoczonego powyżej. W miejsce określenia „roślinność”, które nie powinno być rozumiane w znaczeniu szczegółowym, zastosowano określenie „fitokompleks krajobrazowy”. Można mieć też zastrzeżenia co do nazwy „krajobraz” na oznaczenie tego typu konkretnych układów ze względu na bardzo różne rozumienie tego terminu, tak w fitosocjologii, jak w geografii, a także w języku potocznym. Może warto na oznaczenie tych układów stosować nazwę fizjocenoza (W o d z i c z k o 1950).

Pozostałoby teraz rozstrzygnąć jaki stosunek zachodzi pomiędzy pojęciami fitokompleksu krajobrazowego i krajobrazu roślinnego (w ujęciu T ü x e n a 1956). Określiłbym ten stosunek następująco. Tak jak typ fitocenozy określony jest przez syntakson (zespół), tak typ fitokompleksu krajobrazowego określony jest przez krajobraz roślinny. Mamy tu więc do czynienia ze stosunkiem jednostki realnej do jednostki abstrakcyjno-typologicznej.

Trzeba tu jeszcze zwrócić uwagę, że w literaturze spotkać można pojęcia, których nazwy mogą być wysoce podobne do proponowanej tu nazwy fitokompleks krajobrazowy. Tak np. S c h m i t h ü s e n (1968) wprowadza pojęcie, którego nazwa brzmi (po polsku): krajobrazowy kompleks roślinności. Ponieważ podobieństwo pomiędzy nazwami „fitokompleks krajobrazowy” i „krajobrazowy kompleks roślinności” jest bardzo duże, należy się tym bardziej dobrze zastanowić, czy pojęcia odpowiadające tym nazwom są tożsame czy nie. Według S c h m i t h ü s e n a: „Inwentarz zbiorowisk charakterystyczny dla pewnego obszaru stanowi krajobrazowy kompleks roślinności” (S c h m i t h ü s e n 1968, str. 303). Z wyjaśnień i przykładów wynika, że pojęcie to ma zastosowanie w odniesieniu do obszarów bardzo różnej wielkości. Autor ten określa krajobrazowe kompleksy roślinności zarówno dla niewielkich jednostek regionalnych (rzędu mikro- i mezoregionów), jak i dla dużych obszarów, np. obszaru borealnych lasów szpilkowych. Jak z tego wynika krajobrazowy kompleks roślinności to fitosocjologiczna charakterystyka jednostki regionalnej różnej rangi pod względem występujących tam zbiorowisk roślinnych, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych, z uwzględnieniem dynamicznych związków pomiędzy zbiorowiskami poszczególnych typów. Natomiast fitokompleks krajobrazowy, według proponowanego ujęcia, to specyficzny układ ekologiczny będący struktural-

nym elementem roślinności. Tak więc analiza znaczenia tych pojęć dowodzi, że są one gatunkowo różne.

2. Zasady wydzielania potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych

Jak już powiedzieliśmy, fitokompleksy krajobrazowe są specyficznymi jednostkami strukturalnymi pokrywy roślinnej a ich elementami składowymi są układy niższego poziomu organizacji roślinności, to znaczy zbiorowiska roślinne. Zbiorowiska roślinne wchodzące w skład fitokompleksu krajobrazowego tworzą określony zestaw oraz są w specyficzny sposób rozmieszczone w przestrzeni. Zatem możemy powiedzieć, że fitokompleks krajobrazowy jest układem roślinności charakteryzującym się jednolitością zróżnicowania zbiorowisk roślinnych, czyli układem homotonicznym. Wobec tego, potencjalne fitokompleksy krajobrazowe możemy wyznaczyć i scharakteryzować na podstawie znajomości zasięgów i wzajemnych relacji przestrzennych potencjalnych zbiorowisk roślinnych przedstawionych na mapie.

W skład jednego potencjalnego fitokompleksu krajobrazowego wchodzi szereg potencjalnych zbiorowisk roślinnych należących do kilku typów (zespołów lub innych jednostek syntaksonomicznych). Jest to wynikiem niejednorodności siedliska pod względem pewnych czynników, choć pod względem innych czynników warunki siedliskowe są w zasięgu konkretnego fitokompleksu krajobrazowego wyrównane. Czyli jedne czynniki siedliskowe powodują wyodrębnienie się fitokompleksu w całości, podczas gdy inne powodują jego wewnętrzne zróżnicowanie na poszczególne fitocenozy. Ścisły rozdział czynników siedliskowych według powyższego kryterium nie jest możliwy, gdyż niejednokrotnie ten sam czynnik (dajmy na to stosunki wodne) w jednych przypadkach powoduje jedynie wewnętrzne zróżnicowanie roślinności w obrębie fitokompleksu krajobrazowego, natomiast kiedy indziej powoduje wyodrębnienie fitokompleksu w całości.

Związek zróżnicowania roślinności ze zmiennością warunków środowiska w interesującym nas aspekcie zacznijmy omawiać od przedstawienia kilku konkretnych przykładów.

Potencjalny fitokompleks krajobrazowy oznaczony numerem kolejnym 88 położony jest w dolinie Narwi na starym tarasie akumulacyjnym. Podłożem geologicznym są tam (według Przeglądowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 300 000, arkusz „Warszawa” opracowany przez R ó ż y c k i e g o i Z w i e r z a 1952): piaski wydmore, piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych oraz mady i piaski rzeczne. Natomiast na obszarze sąsiadujących potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych (numery 86, 87, 92, 93, 97, 123) warunki są zdecydowanie inne. Jedne z tych fitokompleksów położone są na aktualnym tarasie zalewowym Narwi i Bugu, gdzie głównym typem podłoża są mady i piaski rzeczne, podczas gdy inne położone są na wysoczyźnie morenowej (Wysoczyzna

Wyszkowska według Różyckiego 1972), gdzie podłożem geologicznym są gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej z głazami, piaski i żwirzy ozów lub moreny czołowej, mady i piaski rzeczne. Widać z tego, że odrębność siedliskowa omawianego fitokompleksu jest wyraźna i sprowadza się w znacznym stopniu do różnic budowy geologicznej terenu.

W skład omawianego potencjalnego fitokompleksu krajobrazowego (nr 88) wchodzi potencjalne zbiorowiska roślinne zaliczone do następujących typów: subkontynentalnych borów sosnowych, borów mieszanych, subkontynentalnych grądów, łęgów jesionowo-olszowych i olsów. Rozpatrujemy przy tym tylko te typy zbiorowisk, które występują na powierzchniach na tyle dużych, że mogły być przedstawione na mapie w skali 1 : 300 000 (np. pomijamy występowanie dąbrów świetlistych zajmujących tam bardzo niewielkie powierzchnie). Największy obszar zajmują zbiorowiska borów sosnowych (*Peucedano-Pinetum*) występujące na wydmach a także na płaskich terenach. Bory mieszane (*Pino-Quercetum*) występują w miejscach o żyzniejszym nieco podłożu, położonych stosunkowo niżej, często w pobliżu cieków wodnych. Grądy (*Tilio-Carpinetum*) spotyka się tu zupełnie wyjątkowo, zawsze bezpośrednio w sąsiedztwie cieków. Na siedliskach mokrych, położonych w obniżeniach terenu występują łęgi jesionowo-olszowe (*Circae-Alnetum*) i olsy (*Carex elongatae-Alnetum*), zależnie od stopnia ruchliwości wód. W miejscach gdzie brak jest przepływu albo gdy przepływ jest mocno zahamowany występują olsy, natomiast gdy przepływ jest wyraźny — łęgi jesionowo-olszowe. Jak z tego widać, o zróżnicowaniu zbiorowisk w obrębie tego fitokompleksu krajobrazowego decydują stosunki wodne oraz niewielkie nawet różnice w żyzności podłoża. Widać tu bardzo wyraźny związek z rzeźbą terenu.

Typowa w obrębie tego fitokompleksu seria zonacyjna może być przedstawiona następująco: na szczytach wydm — bory sosnowe, na wyższej wyniesionych, płaskich częściach tarasu — również bory sosnowe, w pobliżu cieków — bory mieszane, w dolinie cieku — łęgi jesionowo-olszowe. Jeżeli seria rozpatrywana będzie od szczytu wydmy do bezodpływowego zagłębienia (lub doliny o bardzo zahamowanym odpływie) ostatnim zbiorowiskiem w serii będzie nie łęg lecz ols.

Zupełnie inaczej przedstawia się zróżnicowanie potencjalnych zbiorowisk roślinnych w obrębie sąsiadującego z dotychczas omawianym fitokompleksu krajobrazowego oznaczonego numerem 92, a położonego na wysoczyźnie morenowej. Na szczytach i w górnych partiach zboczy wyniesień strefy czołowomorenowej (stadium Wkry), na podłożu piasków akumulacji lodowcowej oraz piasków i żwirów ozów lub moreny czołowej potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są świetliste dąbrowy (*Potentillo albae-Quercetum*). W niższych partiach zboczy, a także na niżej położonych płaskich terenach oraz na brzegach dolin cieków wodnych, gdzie podłożem geologicznym są gliny zwałowe lub piaski aku-

mulacji lodowcowej, mamy do czynienia z siedliskami grądów. W dolinach strumieni, na podłożu mad rzecznych potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są łęgi jesionowo-olszowe.

Porównując teraz potencjalne fitokompleksy krajobrazowe oznaczone numerami 88 i 92 stwierdzić możemy, że zachodzą pomiędzy nimi duże różnice w zestawie potencjalnych zbiorowisk roślinnych wchodzących w ich skład. Typowe serie zonacyjne w tych fitokompleksach różnią się więc składem zbiorowisk roślinnych.

O ile pomiędzy omówionymi fitokompleksami zachodzą wyraźne różnice jakościowe w zestawie zbiorowisk roślinnych, to przy porównywaniu na przykład fitokompleksów oznaczonych numerami 139 i 150 różnic tego rodzaju nie ma. W obu tych potencjalnych fitokompleksach krajobrazowych występują bowiem zbiorowiska borów mieszanych i grądów. Różnice pomiędzy tymi fitokompleksami polegają przede wszystkim na innej sekwencji zbiorowisk potencjalnych w seriach zonacyjnych.

W fitokompleksie 139 na szczytach pagórków potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są bory mieszane, na niżej położonych terenach — grądy. Natomiast w fitokompleksie 150 w górnych partiach wyniesień (na podłożu gliniastym) potencjalnym zbiorowiskiem są grądy, podczas gdy piaszczyste obniżenia terenu są siedliskami borów mieszanych.

Jak już podkreślano wielokrotnie, fitokompleksy krajobrazowe są konkretnymi i niepowtarzalnymi układami roślinności, jednak porównywanie ich wzajemne jest sensowne, gdyż różnice pomiędzy nimi są niejednakowe. Porównania poszczególnych fitokompleksów dokonać z pewnością można uwzględniając różne cechy. W niniejszym opracowaniu uwzględniono przede wszystkim trzy, zdaniem autora najważniejsze, cechy struktury. Są nimi według przyjętej hierarchii:

- zestaw potencjalnych zbiorowisk roślinnych wchodzących w skład potencjalnego fitokompleksu krajobrazowego,

- sekwencja potencjalnych zbiorowisk roślinnych w seriach zonacyjnych,

- udział powierzchniowy poszczególnych zbiorowisk roślinnych.

O ile charakterystyka pod względem zestawu zbiorowisk jest prosta, o tyle przedstawienie sekwencji zbiorowisk roślinnych w seriach zonacyjnych, tak aby było można porównywać je między sobą, jest znacznie trudniejsze. Aby sprostać temu zadaniu przyjęto, że wydzielić można pewne typy siedlisk, których współwystępowanie powoduje zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w obrębie każdego potencjalnego fitokompleksu krajobrazowego. Chodzi przy tym o taką klasyfikację siedlisk aby mogła być ona stosowana przy porównywaniu wszystkich potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych abstrahując od bardzo nieraz dużych różnic w warunkach siedliska panujących w poszczególnych przy-

padkach. Te „typy siedlisk” określić by można inaczej jako „siedliskowe elementy fitokompleksu krajobrazowego”.

Tak rozumianą klasyfikację siedlisk przedstawiono poniżej. Oparta jest ona na wyróżnieniu pewnych elementów rzeźby terenu a także typu stosunków wodnych. Przyjęto, że w ściśle lokalnych warunkach na obszarze zajęтым przez konkretny potencjalny fitokompleks krajobrazowy (a więc przy wyrównanym klimacie, ogólnej budowie geologicznej itp.) o wewnętrznym zróżnicowaniu roślinności na zbiorowiska roślinne decydują w pierwszym rzędzie lokalna rzeźba terenu i związane z nią stosunki wodne. Oczywiście jest, że rzeźba terenu nie wywiera wpływu na roślinność bezpośrednio lecz poprzez kształtowanie stosunków wodnych, troficznych, świetlnych i innych. Klasyfikacja siedlisk rozumianych jako siedliskowe elementy fitokompleksu krajobrazowego przedstawia się następująco.

I typ siedlisk

Górne partie lokalnych wyniesień terenu. Siedliska te są stosunkowo najsuchsze w warunkach lokalnych, ich gospodarka wodna jest w znacznym stopniu ombrofilna, na ogół mają inne warunki mikroklimatu w porównaniu z niżej położonymi terenami (inne warunki nasłonecznienia, większy wpływ wiatrów, brak stagnacji zimnego powietrza itp.), a także często, lecz nie zawsze, różnią się od otaczających terenów rodzajem substratu glebowego i w związku z tym szeregiem cech jak żyzność, przepuszczalność podłoża itp.

Przykładami tego typu siedlisk w centralnej Polsce mogą być: górne partie wydm, pagórków morenowych, ozów, kemów, wierzchowinowe partie wysoczyzn, lokalne wyniesienia gruntu mineralnego wśród bagien itp.

Na tego typu siedliskach na badanym terenie potencjalnymi zbiorowiskami roślinnymi mogą być: bory sosnowe (*Leucobryo-Pinetum* i *Peucedano-Pinetum*), bory mieszane (*Pino-Quercetum*), dąbrowy świetliste (*Potentillo albae-Quercetum*), grądy serii uboższej i wyjątkowo serii żyznej (*Tilio-Carpinetum*).

II typ siedlisk

Stoki wyniesień i wyżej położone płaskie tereny. Siedliska te są nieco wilgotniejsze w porównaniu z poprzednio omówionymi, inne są tu też na ogół pozostałe warunki siedliskowe. W przypadku znacznych różnic wysokości względnej w lokalnych warunkach, ten typ siedlisk mógłby być rozdzielony na warianty w zależności od wystawy, jeśli oczywiście miałyby ona wpływ na zróżnicowanie potencjalnych zbiorowisk roślinnych. Na badanym terenie nie stwierdzono wyraźnego występowania tej zależności, głównie chyba na skutek małych różnic wysokości.

Siedliska zaliczane do II typu są na ogół najbardziej rozpowszechnione i dlatego potencjalne zbiorowiska roślinne zajmujące ten typ siedlisk są zwykle dominujące w potencjalnym fitokompleksie krajobrazowym.

Na siedliskach zaliczonych do omawianego typu występować mogą w północnej części Mazowsza następujące potencjalne zbiorowiska roślinne: bory sosnowe (*Leucobryo-Pinetum* i *Peucedano-Pinetum*), bory mieszane (*Pino-Quercetum*), dąbrowy świetliste (*Potentillo albae-Quercetum*), oraz grądy serii uboższej i żyźniejszej (*Tilio-Carpinetum*).

III typ siedlisk

Siedliska wilgotne występujące na brzegach zagłębień bezodpływowych i dolin cieków wodnych. Zaznacza się tu wyraźny wpływ wód gruntowych dochodzących, choćby okresowo, blisko powierzchni ziemi. Siedliska te są często stosunkowo żyźniejsze w porównaniu z zaliczonymi do typu II, gdyż często ma miejsce użyźnianie spływami z wyżej położonych terenów.

Ten typ siedlisk można zróżnicować w zależności od ruchliwości wód gruntowych na dwa podtypy oznaczone symbolami IIIa i IIIb. Siedliska wilgotne o ruchliwych wodach gruntowych zaliczono do podtypu IIIa. Są to na ogół siedliska stosunkowo najżyźniejsze w warunkach lokalnych. Na siedliskach zaliczonych do tego podtypu potencjalnymi zbiorowiskami roślinnymi mogą być: bory mieszane, grądy serii ubogiej i żyźnej oraz łągi jesionowo-wiązowe (*Ficario-Ulmetum typicum* i niekiedy *F.-U. chrysosplenietosum*).

W podtypie IIIb zebrane są siedliska wilgotne związane z mało ruchliwymi wodami. Pod względem żyzności siedliska te mogą być bardzo zróżnicowane poczynając od skrajnie oligotroficznych do wyraźnie eutroficznych, jednak na ogół są stosunkowo uboższe od siedlisk poprzedniego podtypu.

Na siedliskach zaliczonych do omawianego podtypu spotkać można bory sosnowe (wilgotne), bory mieszane oraz grądy serii uboższej i rzadziej serii żyźnej.

IV typ siedlisk

Typ ten grupuje siedliska stosunkowo najniżej położone w warunkach lokalnych i w związku z tym wyraźnie mokre, a także siedliska umiarkowanie mokre, pozostające jednak pod bardzo silnym wpływem wód powierzchniowych. Odrębność siedlisk tego typu w porównaniu z poprzednio omówionymi jest szczególnie dobrze widoczna. Zwykle siedliska te mają inne podłoże geologiczne w porównaniu z wyżej położonymi terenami. Podłożem geologicznym są tu mianowicie utwory alu-

wialne: mady lub torfy. Mikroklimat w tej grupie siedlisk jest również wyraźnie inny niż na otaczających terenach.

Ze względu na stopień ruchliwości wód wydzieliłem tu dwa podtypy, a mianowicie podtyp IVa grupujący siedliska, w których wody nie mają tendencji do stagnowania, oraz podtyp IVb obejmujący siedliska, w których brak jest przepływu wody lub jest on poważnie zahamowany, co powoduje zabagnienie.

Przykładami siedlisk zaliczonych do podtypu IVa są doliny potoków lub niedalekie od nurtu partie dolin dużych rzek. Jako przykłady siedlisk reprezentujących podtyp IVb podać można: dno bezodpływowej misy, brzeg jeziora bezodpływowego, dolinę bardzo powoli płynącego cieklu wodnego, zatorfione starorzecza na skrzydle doliny wielkiej rzeki.

Siedliska zaliczone do tych dwu podtypów różnią się pomiędzy sobą podłożem geologicznym. Podłożem siedlisk podtypu IVa są na ogół mady, natomiast siedlisk podtypu IVb — torfy.

Na siedliskach należących do podtypu IVa występować mogą następujące naturalne zbiorowiska roślinne: łągi topolowo-wierzbowe (*Salici-Populetum*), łągi jesionowo-wiązowe (*Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum*), łągi jesionowo-olszowe (*Circae-Alnetum*) i niekiedy olsy (*Carici elongatae-Alnetum*). Natomiast na siedliskach zaliczonych do podtypu IVb spotkać można: bory bagienne (*Vaccinio uliginosi-Pinetum*), torfowiska wysokie (*Sphagnetum medio-rubelli*), olsy (*Carici elongatae-Alne-*

Tabela 1 — Table 1

Możliwości występowania poszczególnych zbiorowisk roślinnych na siedliskach wyróżnionych typów

Probability of occurrence of the particular plant communities on habitats of the distinguished types

Potencjalne zbiorowiska roślinne Potential plant communities	Typy siedlisk Types of habitats					
	I	II	IIIa	IIIb	IVa	IVb
<i>Potentillo albae-Quercetum</i>	×	×				
<i>Peucedano-Pinetum</i>	×	×		×		
<i>Leucobryo-Pinetum</i>	×	×		×		
<i>Pino-Quercetum</i>	×	×	×	×		
<i>Tilio-Carpinetum</i> (ubogi — poor)	×	×	×	×		
<i>Tilio-Carpinetum</i> (bogaty — rich)		×	×	×		
<i>Ficario-Ulmetum typicum</i>			×	(×)	?	
<i>Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum</i>				×	(×)	
			(×)		×	
<i>Salici-Populetum</i>					×	
<i>Circae-Alnetum</i>					×	×
<i>Carici elongatae-Alnetum</i>					(×)	×
<i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i>						×
<i>Sphagnetum medio-rubelli</i>						×

tum) i niekiedy, wyraźnie na skutek działalności ludzkiej, łągi jesionowo-olszowe (*Circaeo-Alnetum*).

Jak widać z tego, zestaw możliwych zbiorowisk roślinnych jest dla siedlisk zaliczonych do typu IV zdecydowanie inny niż dla siedlisk pozostałych typów. Ilustruje to wyraźnie tabela 1, w której zestawiono występowanie różnych, uwzględnionych w opracowaniu, jednostek potencjalnych zbiorowisk roślinnych na siedliskach poszczególnych typów.

Uszeregowanie wyróżnionych tu typów siedlisk przedstawia dwa warianty zonacji: od szczytów lokalnych wyniesień do dolin cieków wodnych oraz od szczytów wyniesień do zabagnionych zagłębień bezodpływowych. Założono, że taka zmienność zonacyjna jest powszechna i zaobserwować ją można w każdych warunkach lokalnych (niekiedy może nie występować seria prowadząca do bezodpływowych zagłębień, co jest swojego rodzaju specyfiką obszaru).

Przedstawiona powyżej klasyfikacja typów siedlisk w obrębie obszaru zajmowanego przez jeden potencjalny fitokompleks krajobrazowy została przeprowadzona na podstawie znajomości związków pomiędzy potencjalną roślinnością naturalną a warunkami siedliska w północno-zachodniej części centralnej Polski. W innych warunkach środowiska geograficznego, być może, należy wydzielić inne typy siedlisk w obrębie obszarów zajmowanych przez poszczególne potencjalne fitokompleksy krajobrazowe. Wydaje się jednak, że ogólny schemat lokalnego zróżnicowania siedlisk może być podobny. Własne obserwacje poczynione podczas kartowania potencjalnej roślinności naturalnej na obszarze Sudetów, to znaczy na obszarze o zdecydowanie innych warunkach środowiska geograficznego w porównaniu z terenem północnego Mazowsza, pogląd ten potwierdzają. Również i tam na obszarze pojedynczego fitokompleksu krajobrazowego, a więc na obszarze o wyrównanej budowie geologicznej (rodzaj skały, typ rzeźby) i wyrównanym klimacie, lokalna zmienność siedlisk, której odpowiada lokalne zróżnicowanie roślinności potencjalnej, może być przedstawiona na tle pionowego zróżnicowania terenu.

Spróbujmy teraz zebrać i przedstawić w skrócie najważniejsze zasady wydzielania potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych.

a. Zasada komplikacji budowy: fitokompleks krajobrazowy składa się z szeregu potencjalnych zbiorowisk roślinnych należących do różnych typów (syntaksonów), przy czym przynajmniej część z tych zbiorowisk ma charakter wielkopowierzchniowy.

b. Zasada jednolitości struktury: w obrębie potencjalnego fitokompleksu krajobrazowego serie zonacyjne lokalnego zróżnicowania potencjalnych zbiorowisk roślinnych są podobne pod względem zestawu, sekwencji i udziału poszczególnych typów.

c. Zasada ciągłości terytorialnej.

d. Zasada realności występowania i indywidualnego charakteru: każ-

dy fitokompleks krajobrazowy istnieje w określonym miejscu i przedziale czasowym mając charakter niepowtarzalnego indywiduum ekologicznego.

e. Zasada powtarzalności typologicznej: fitokompleksy krajobrazowe są do siebie w różnym stopniu podobne i na tej podstawie wyróżnić można ich typy. Poszczególne typy są reprezentowane przez szereg fitokompleksów krajobrazowych rozmieszczonych niezależnie od siebie, co jest wynikiem powtarzalności zespołu czynników formujących fitokompleksy.

3. Praktyczne wydzielenie potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych na badanym terenie

W ramach poprzednio omówionej koncepcji wydzielono na objętym badaniami obszarze 155 konkretnych potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych i przedstawiono ich rozmieszczenie na mapie w skali 1 : 500 000.

Wydzielenie potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych przeprowadziłem na mapie potencjalnych zbiorowisk roślinnych w skali 1 : 300 000 z pomocą map w skali 1 : 100 000 (mapa topograficzna i pierworysy autorskie mapy potencjalnej roślinności naturalnej), wykorzystując obserwacje i notatki poczynione w terenie podczas prowadzenia prac kartograficznych. Obszary poszczególnych potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych wydzielałem na podstawie jednolitości przestrzennego zróżnicowania potencjalnych zbiorowisk roślinnych. Praktycznie, jako obszar konkretnego potencjalnego fitokompleksu krajobrazowego uznawałem obszar, na którym jednemu typowi siedliska (według poprzednio omówionej klasyfikacji) odpowiada jeden typ potencjalnego zbiorowiska roślinnego, lub przynajmniej, gdy na jednym typie siedliska, jedno potencjalne zbiorowisko roślinne jest dominujące. Ważnymi kryteriami wydzielania były też ciągłość i jednolitość struktury przestrzennej. Każdy konkretny potencjalny fitokompleks krajobrazowy charakteryzowałem zestawem potencjalnych zbiorowisk roślinnych na poszczególnych typach siedlisk wykonując odpowiednie tabelki, z których kilka w formie ilustracji przedstawiam (tab. 2). Charakterystyki poszczególnych fitokompleksów wykonywałem na oddzielnych kartkach papieru, na jednej stronie wykonując schematyczny opis zróżnicowania potencjalnych zbiorowisk roślinnych, a na drugiej wpisując różne informacje dodatkowe, jak warunki siedliska, użytkowanie ziemi, czy inne.

Przedstawione w tabeli 2 przykłady ilustrują formę schematycznego opisu struktury potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych. Na ich podstawie, wyciągnąć możemy wniosek, że choć stosowanie schematu jest jak najbardziej uzasadnione ze względu na umożliwienie łatwego porównywania poszczególnych opisów między sobą, to z drugiej strony powoduje pewne deformacje w opisie rzeczywistości. Dlatego też sche-

Tabela 2 — Table 2

Przykłady zapisu różnicowania potencjalnych zbiorowisk roślinnych
w fitokompleksach krajobrazowych

Examples of recording differentiation of potential plant communities in
landscape phytocomplexes

Nr 5 Zbiorowiska — Communities	Typy siedlisk — Types of habitats					
	I	II	IIIa	IIIb	IVa	IVb
<i>Potentillo-Quercetum</i>	5	4	—	—	—	—
<i>Tilio-Carpinetum</i> (ubogi — poor)	—	2	4	5	—	—
„ „ (żywny — rich)	—	—	2	—	—	—
<i>Circae-Alnetum</i>	—	—	—	—	5	4
<i>Carici elongatae-Alnetum</i>	—	—	—	—	—	2
<i>Pino-Quercetum</i>	—	1	—	1	—	—
Nr 128 Zbiorowiska — Communities	Typy siedlisk — Types of habitats					
	I	II	IIIa	IIIb	IVa	IVb
<i>Leucobryo-Pinetum</i>	5	5	—	4	—	—
<i>Pino-Quercetum</i>	—	—	5	2	—	—
<i>Circae-Alnetum</i>	—	—	—	—	4	—
<i>Carici elongatae-Alnetum</i>	—	—	—	—	2	4
<i>Vaccinio uliginosi-Pinetum</i>	—	—	—	—	—	2
<i>Sphagnetum medio-rubelli</i>	—	—	—	—	—	2
Nr 95 Zbiorowiska — Communities	Typy siedlisk — Types of habitats					
	I	II	IIIa	IIIb	IVa	IVb
<i>Pino-Quercetum</i>	5	—	—	—	—	—
<i>Carici elongatae-Alnetum</i>	—	—	—	—	—	5

Oznaczenia od 1 do 5 przedstawiają rozpowszechnienie zbiorowiska na danym typie siedliska — Notations 1 to 5 denoted the frequency of the community on the given type of habitat.

mat ten nie może być stosowany „mechanicznie”, lecz uwzględniać należy każdorazowo, gdy jest to potrzebne, również specyfikę fitokompleksu krajobrazowego „nie mieszczącą się” w schemacie. Tak na przykład, w opisach wielu fitokompleksów widać, że na jednym typie siedliska występować może więcej niż jedno zbiorowisko roślinne (potencjalne). Czy oznacza to, że w danym fitokompleksie nie ma powtarzalności serii zonacyjnych i typowa seria zbiorowisk roślinnych jest w bardzo wielu przypadkach zakłócona? Okazuje się, że na ogół nie! Stosunkowo często mamy do czynienia z przypadkiem takim, jak na przykład w potencjalnym fitokompleksie krajobrazowym oznaczonym numerem 5, w którego opisie zaznaczone jest, że na siedliskach II typu przeważają dąbrowy świetliste a grądy występują rzadziej, co w tym przypadku oznacza zajmowanie przez dąbrowy górnych i środkowych partii zboczy, a dolnych przez grądy. A więc zonacja jest tu jak najbardziej regularna, choć opis nie wykazuje tego w całej pełni. Ogólnie rzecz biorąc, z sytuacją, w której na jednym typie siedliska spotykamy tylko

jedno potencjalne zbiorowisko roślinne mamy do czynienia tylko na terenach o bardzo jednorodnej budowie geologicznej i jednakowo użytkowanych.

Inną ważną sprawą, której nie uwzględnia schematyczny opis jest udział powierzchniowy poszczególnych zbiorowisk potencjalnych. Najczęściej największą powierzchnię zajmują siedliska zaliczone do II typu, jednak w pewnych przypadkach może być inaczej. I tak w przypadku fitokompleksu krajobrazowego oznaczonego numerem 95 zdecydowanie największą powierzchnię zajmują siedliska typu IVb. Dlatego też we wszystkich tych przypadkach, gdzie nie dominował II typ siedlisk, zaznaczono siedlisko najszerzej rozpowszechnione.

Należy tu jeszcze zaznaczyć, że wydzielenie potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych przeprowadzone zostało na podstawie przeglądowej mapy potencjalnych zbiorowisk roślinnych, przez co w pewnych przypadkach mogło się zdarzyć zlanie podobnych fitokompleksów lub ich niezbyt precyzyjne rozdzielanie.

4. Klasyfikacja potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych badanego obszaru

Celem wzajemnego porównania wydzielonych fitokompleksów krajobrazowych pod względem zestawu budujących je potencjalnych zbiorowisk roślinnych, jak również sekwencji zbiorowisk w seriach zonacyjnych, zestawiono razem tabelarycznie schematyczne opisy fitokompleksów. Tabela 3 przedstawia właśnie to zestawienie, uporządkowane już ze względu na podobieństwo poszczególnych fitokompleksów krajobrazowych. W tabeli tej poziome szeregi odpowiadają poszczególnym fitokompleksom ponumerowanym zgodnie z numeracją na mapie. Pionowe kolumny odpowiadają natomiast typom siedlisk, przy czym dla uproszczenia III typ nie został rozdzielony na podtypy. Skrótami literowymi oznaczono typy potencjalnych zbiorowisk roślinnych zajmujące w określonym fitokompleksie dany typ siedlisk. W przypadkach gdy jakiś typ siedliska nie występował w konkretnym fitokompleksie, stawiano poziomą kreskę. Znaki zapytania oznaczają, że nie jest pewne jakie potencjalne zbiorowisko roślinne zajmuje dany typ siedliska ze względu na tylko częściowe poznanie fitokompleksu (fragmenty na brzegu badanego terenu). Jeśli na określonym typie siedlisk występowały różne zbiorowiska potencjalne, sygnaturę zbiorowiska dominującego podano bez nawiasu, a zbiorowiska mającego mniejszy udział powierzchniowy w nawiasie. Zbiorowiska występujące na danym typie siedlisk tylko sporadycznie (w schematycznych opisach oznaczenie „1”) w tabeli pominięto.

W obrębie tabeli 3 wyróżnić można szereg grup potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych. Omówmy wyróżnione grupy i postaraj-

Tabela 3 — Table 3

Porównanie wyróżnionych potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych pod względem zestawu potencjalnych zbiorowisk roślinnych
Comparison of distinguished potential landscape phytocomplexes as regards the set of potential plant communities

Nr kolejny No	Nr porządkowy Recording No.	Typ siedliska — Type of habitat				
		I	II	III	IVa	IVb
1	46	Gż(G)	Gż	Gż	Fc(L)	L
2	48	G	Gż	Gż	Fc(L)	L
3	39	G(D)	Gż(G)	Gż(G)	L(Fc)	L
4	18	G(D)	G(Gż)	Gż(G)	L(Fc)	L
5	66	G	Gż	Gż	L	L
6	57	G	Gż	Gż	L	L
7	6	G	Gż(G)	Gż	L	O(L)
8	74	G	G(Gż)	Gż(G)	L	L
9	72	G	G	Gż	L(S)	?
10	112	G	G	G(Gż)	L	L
11	65	G(M)	G	G(Gż)	L	L
12	18a	G(M)	G	G	L	O(L)
13	55	G	G	G	L	L
14	4	D(G)	G	G	L	L
15	144	D	G	Gż(G)	L(Fc)	—
16	14	D	G	Gż(G)	L	L(O)
17	34	D	G	G(Gż)	L	L(O)
18	47	D	G	Gż(G)	L	O(L)
19	42	D	G	Gż	L	—
20	43	D	G	Gż	L	—
21	147	D	G	G	L(Fc)	—
22	102	D	G	G	L	—
23	96	D	G	G	L	—
24	96a	D	G	G	L	—
25	93	D	G	G	L	—
26	79	D	G	G	L	—
27	77	D	G	G	L	—
28	76	D	G	G	L	—
29	54	D	G	G	L	—
30	51	D	G	G	L	L
31	38	D	G	G	L	—
32	15	D	G	G	L	L
33	111	D	G(D)	G	L	—
34	108	D(M)	G(D)	G	L	—
35	94	D	G(D)	G	L	L
36	73	D	G(D)	G	L	O(L)
37	12	D	G(D)	G	L	—
38	25	D	G(D)	G	L(Fc)	L(O)
39	32	D	G(D)	G	L	L(O)
40	130	D	G(D)	G(Gż)	L	—
41	75	D(M)	G(D)	G(Gż)	L	L

42	44	D(M)	G(D)	G(Gž)	L	L
43	92	D	G(D)	G(Gž)	L(Fc)	—
44	40	D	G(D)	G(Gž)	L	—
45	22	D(M)	G(D)	G(Gž)	L	L
46	16	D	G(D)	G	L	L(O)
47	19	D	G(D)	G	L	L
48	64	D	G(D)	Gž(G)	L	—
49	35	D	D(G)	G(M)	L	O(L)
50	5	D	D(G)	G(Gž)	L	L(O)
51	37	D	D(G)	G(Gž)	L	O(L)
52	132	D	G(M)	G(M)	L	O
53	8	D	D(M)	G(M)	L	L
54	27	D	M	G(M)	L	—
55	36	D	M(G)	G(M)	L(S)	O(L)
56	141	D	M(D)	M(G)	L	O(L)
57	145	D	M	G(M)	L	—
58	21	D	M	M(G)	L	L
59	28	D	M	G(M)	L	L
60	104	D	M	M(G)	L	L
61	2	D	M	M(G)	L	—
62	3	D(M)	M	G(M)	L	L
63	59	M(G)	G	G	L	L
64	67	M	G	Gž(G)	L	L
65	41	M	G(Gž)	Gž(G)	L	—
66	100	M	G	G(Gž)	L(Fc)	—
67	20	M	G	Gž	L	—
68	49	M(D)	G	G	S(Fc)	L
69	139	M	G	G	L(Fc)	L
70	146	M	G	G	L	—
71	103	M	G	G	L	L
72	70	M	G	G	L	L
73	30	M	G	G	L	L(O)
74	114	M	G	G	?	?
75	110	M	G	G(M)	L	—
76	89	M	G	G(M)	L	L
77	143	M	G	G(M)	L	O
78	135	G	G(M)	M	?	?
79	105	G	G(M)	M	L	—
80	148	G	M	M	L	O
81	150	G	M	M	L	L
82	133	G(M)	M(G)	M(G)	L	—
83	78	M(D)	M(G)	G(M)	L	L
84	80	M(G)	M	M(G)	L	L
85	151	M	M(G)	M(G)	L	O(L)
86	17	M	M(G)	G(M)	L(S)	O(L)
87	24	M	M(G)	G(M)	L(S)	L
88	84	M	M(G)	G(M)	L	L

89	33	M	M(G)	G(M)	L	L
90	60	M	M(G)	G(M)	L	O
91	81	M	M(G)	G(M)	L	O
92	11	M(Bp)	M(G)	M(G)	L	L
93	149	M	M	G(M)	L	L
94	7	M	M	G	L	—
95	82	M	M(G)	M	L	L(O)
96	50	M	M	G(M)	L	L
97	24a	M	M(G)	G(M)	S	L
98	56	M	M	G(M)	L	L
99	152	M	M	G(M)	L	L
100	9	M	M	M(G)	L	O
101	140	M(Bl)	M	M(G)	L	O(L)
102	97	M	M	M(G)	L	O(L)
103	129	M	M	M(G)	L	O(L)
104	109	M	M	M(G)	L	O(L)
105	101	M	M	M(G)	L	O(L)
106	31	M	M	M(G)	L	O(L)
107	131	M	M	M(G)	L	L
108	53	M(Bp)	M	G(M)	L	O
109	63	M(Bp)	M	M(G)	L	L
110	106	M(Bp)	M	M	L	O(L)
111	142	M(Bl)	M	M(G)	L	O
112	138	Bl(M)	M(D)	M	L	O
113	136	M(Bl)	M	M(G)	L	O
114	126	Bl	M(G)	M(G)	L	O(L)
115	119	Bl	M	M(G)	L	L
116	137	Bl	M	M(G)	L	O(V)
117	127	Bl	M	M(G)	L	O(V)
118	134	Bl	M	M	L	O(L)
119	120	Bl	M	M	L	O(L)
120	116	Bl	M(Bl)	M	L	O(L)
121	113	Bp(M)	M	M(G)	L	L
122	61	Bp	M	G	L	L
123	68	Bp	M	G(M)	L	L
124	58	Bp	M	M(G)	L	O(L)
125	99	Bp	M	M(G)	L	O
126	23	Bp	M	M(G)	L	O(L)
127	26	Bp	M	M	L	O(L)
128	29	Bp	M	M	L	O(L)
129	90	Bp	M	M	L	L
130	124	Bp	M	M	L	O
131	45	Bp	M	G	L	L
132	1	Bp	M(Bp)	G(M)	L	O(L)
133	85	Bp	M(Bp)	M	L	O
134	10	Bp	M(Bp)	M(G)	L	O(L)
135	71	Bp	M(Bp)	M(G)	L	L
136	125	Bl	Bl(M)	M(Bl)	L	O
137	121	Bl	Bl(M)	M(Bl)	L(O)	O(V)

138	128	Bl	Bl	M(Bl)	Ł(O)	O(V)
139	98	Bp	Bp(M)	M(G)	Ł	O(V)
140	122	Bp	Bp(M)	M	Ł	Ł
141	83	Bp	Bp(M)	M(G)	Ł	O
142	88	Bp	Bp(M)	M(Bp)	Ł	O
143	91	Bp	Bp	M	Ł	O
144	107	Bp	Bp	M	Ł	O(Ł)
145	52	Bp	Bp	M(G)	Ł	O(T)
146	95	M	—	—	—	O
147	118	M	—	—	—	O
148	86	M	(M)	G(Ft)	S	Ł(O)
149	117	M	(M)	G(Ft)	S	O(Ł)
150	87	M	—	—	S	O
151	123	M	—	—	S	—
152	115	M	—	—	S	—
153	62	—	(Ft)	Ft	S	O
154	69	—	(Ft)	Ft	S	—
155	13	G	—	—	Ł	Ł

Oznaczenia — Notations

G — *Tilio-Carpinetum* <ubogie — poor>, Gz — *Tilio-Carpinetum* <żyzne — rich>, D — *Potentillo albae-Quercetum*, M — *Pino-Quercetum*, Bl — *Leucobryo-Pinetum*, Bp — *Peucedano-Pinetum*, V — *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, T — *Sphagnetum medio-rubelli*, O — *Carici elongatae-Alnetum*, Ł — *Circae-Alnetum*, Ft — *Ficario-Ulmetum typicum*, Fc — *Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum*, S — *Salici-Populetum*.

my się określić jakie krajobrazy roślinne one reprezentują. Zróżnicowanie potencjalnych zbiorowisk roślinnych w obrębie fitokompleksów krajobrazowych należących do poszczególnych typów (krajobrazów roślinnych) przedstawiane będzie na schematach ilustrujących zonację zbiorowisk roślinnych.

Grupa I (numery 1—13)

Grupa ta obejmuje potencjalne fitokompleksy krajobrazowe, w których zbiorowiska grądowe zdecydowanie dominują przestrzennie i zajmują siedliska typów I, II i III. Na siedliskach typu IVa występują łągi jesionowo-olszowe (*Circae-Alnetum*) lub rzadziej łągi jesionowo-wiązowe (*Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum*). Na siedliskach IVb potencjalnymi zbiorowiskami roślinnymi są najczęściej łągi jesionowo-olszowe (pierwotnie były tam prawdopodobnie olsy), co jest wynikiem silnych melioracji, gdyż antropopresja w tych terenach jest stosunkowo najbardziej intensywna. Zróżnicowanie potencjalnych zbiorowisk roślinnych przedstawione jest schematycznie na rycinie 3.

Tę grupę potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych zaliczyć wypada do krajobrazu wybitnie grądowego.

Ryc. 3. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu gądownego

Fig. 3. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes of landscape of oak-hornbeam mixed forest landscape

Należy jeszcze zaznaczyć, że gądy w fitokompleksach oznaczonych numerami 55, 57 i częściowo może 65 należą prawdopodobnie do zespołu *Galio-Carpinetum* w odmianie kujawskiej, podczas gdy w pozostałych z tej grupy do zespołu *Tilio-Carpinetum* w odmianie mazowieckiej.

Grupa II (numery 14—52)

Zgrupowane są tu potencjalne fitokompleksy krajobrazowe, w skład których wchodzi przede wszystkim dąbrowy świetliste, gądy oraz łągi jesionowo-olszowe. Ze względu na stopień rozpowszechnienia dąbrów świetlistych wydzielić można tu dwie podgrupy.

Podgrupa pierwsza, której stosunki rozmieszczenia potencjalnych zbiorowisk roślinnych obrazuje rycina 4, wyróżnia się niewielkim udziałem dąbrów świetlistych zajmujących wyłącznie siedliska typu I. Ponadto w fitokompleksach tej podgrupy brak jest często siedlisk IVb, to znaczy mokrych z zahamowanym odpływem wód.

Ryc. 4. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu dąbrowo-gądownego w wariancie z małym udziałem dąbrów

Fig. 4. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes of landscape of oak-hornbeam mixed and thermophilous oak forests, variant with small proportion of oak forest

Podgrupa druga (numery 33—52) obejmuje natomiast fitokompleksy krajobrazowe, w których dąbrowy świetliste są szeroko rozprzestrzenione zajmując nie tylko siedliska typu I lecz także górne części siedlisk typu II. Zwraca też uwagę stosunkowo znaczny udział olsów, co jest spowodowane z jednej strony specyfiką rzeźby terenu, a z drugiej stosunkowo mniejszą antropopresją na tych terenach. Schemat zróżnicowania zbiorowisk w fitokompleksach tej podgrupy przedstawia rycina 5.

Ryc. 5. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu dąbrowowo-grądowego w wariantcie z dużym udziałem dąbrów

Fig. 5. Schematic diagram of zonation of potential plant communities of landscape phytocomplexes classified to oak-hornbeam landscape variant with large proportion of oak forest

Potencjalne fitokompleksy krajobrazowe zaliczone do omawianej grupy reprezentują krajobraz dąbrowowo-grądowy w wariantach z małym i dużym udziałem dąbrów.

Grupa III (numery 53—62)

Zebrane są tu potencjalne fitokompleksy krajobrazowe, w skład których wchodzi przede wszystkim dąbrowy świetliste, bory mieszane i łęgi jesionowo-olszowe. Schemat rozmieszczenia potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych tej grupy przedstawia rycina 6. Szczyty wyniesień (zwykle ozy, kemy lub pagórki strefy czołomorenowej), czyli siedliska typu I, zajmują dąbrowy świetliste, niżej położone tereny są siedliskami borów mieszanych (II i częściowo III typ siedlisk), w pobliżu dolin cieków wodnych spotykamy często siedliska grądów (na siedliskach IIIa), natomiast na siedliskach mokrych mamy do czynienia z łęgami jesionowo-olszowymi lub olsami. Skwencja zbiorowisk roślinnych (potencjalnych) w typowej serii zonacyjnej jest tu więc następująca: dąbrowa świetlista — bór mieszany — grąd — łęg jesionowo-olszowy lub ols.

Potencjalne fitokompleksy krajobrazowe tej grupy reprezentują krajobraz dąbrów świetlistych i borów mieszanych (dąbrowowo-borowy).

Ryc. 6. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu dąbrów i borów mieszanych

Fig. 6. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes classified to landscapes of oak and mixed forests

Grupa IV (numery 63—82)

Grupa ta obejmuje potencjalne fitokompleksy krajobrazowe, w skład których wchodzi przede wszystkim grądy i bory mieszane. W obrębie grupy wydzielić należy dwie podgrupy różniące się nie tyle składem zbiorowisk lecz ich sekwencją w seriach zonacyjnych. W fitokompleksach należących do podgrupy pierwszej (numery 63—77) sekwencja potencjalnych zbiorowisk roślinnych w seriach zonacyjnych jest następująca: bory mieszane — grądy — łągi lub olsy (ryc. 7). Natomiast w fitokompleksach drugiej podgrupy sekwencja jest częściowo odwrócona i przedstawić ją można następująco: grądy — bory mieszane — grądy — łągi lub olsy (ryc. 8).

Zgrupowane tu potencjalne fitokompleksy krajobrazowe reprezentują krajobraz borów mieszanych i grądów, przy czym pierwsza podgrupa reprezentuje wariant typowy tego krajobrazu, a druga wariant „odwrócony”.

Ryc. 7. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu borów mieszanych i grądów w wariantie typowym

Fig. 7. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes of typical variant of landscape of mixed pine-oak and oak-hornbeam forests

Ryc. 8. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu borów mieszanych i grądów w wariantcie „odwróconym”

Fig. 8. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes of "inverse" variant of landscape of mixed pine-oak and oak-hornbeam forests

Grupa V (numery 83—113)

W potencjalnych fitokompleksach krajobrazowych tej grupy dominującym przestrzennie potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są bory mieszane (*Pino-Quercetum*). Zajmują one siedliska I, II i III typu. Natomiast na siedliskach IVa mamy do czynienia z łągami jesionowo-olszowymi a na siedliskach IVb, z reguły bardzo częstych, z olsami lub rzadziej łągami (*Circae-Alnetum*).

W obrębie tej grupy są takie fitokompleksy, w których udział grądów jest stosunkowo znaczniejszy (głównie na siedliskach typu III, lecz niekiedy również na siedliskach typu II). Tworzą one podgrupę obejmującą fitokompleksy o numerach od 83 do 92 (tab. 3), których zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych jest przedstawione na rycinie 9. Natomiast w typowych fitokompleksach omawianej grupy (numery 93—113), których schemat zróżnicowania na zbiorowiska roślinne przedstawia rycina 10, udział grądów jest niewielki.

Ryc. 9. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu borów mieszanych w wariantcie z dużym udziałem grądów

Fig. 9. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes classified to landscape of pine-oak mixed forest, variant with large proportion of oak-hornbeam forest

Ryc. 10. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu borów mieszanych w wariantie typowym
 Fig. 10. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes classified to landscape of pine-oak mixed forest, typical variant

Ta grupa potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych reprezentuje krajobraz borów mieszanych w wariantie typowym i wariantie z większym udziałem grądów.

Grupa VI (numery 114—135)

Zebrane tu potencjalne fitokompleksy krajobrazowe odznaczają się następującym zestawem potencjalnych zbiorowisk roślinnych: na siedliskach typu I — bory sosnowe, na siedliskach typu II — bory mieszane, na siedliskach typu III — głównie bory mieszane i w mniejszym stopniu grądy, na siedliskach IVa — łągi jesionowo-olszowe, a na siedliskach IVb — najczęściej olsy, czasem łągi jesionowo-olszowe lub bory bagienne. Schemat struktury tych fitokompleksów przedstawiony jest na rycinie 11.

Ryc. 11. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu borów i borów mieszanych
 Fig. 11. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes classified to coniferous and pine-oak mixed forests

Reprezentowany przez omawianą grupę fitokompleksów krajobrazowych typ określić można jako krajobraz borów i borów mieszanych.

W obrębie tej grupy fitokompleksów wydzielić należy dwie podgrupy w zależności od tego, do którego z regionalnych zespołów należą zbiorowiska borów. Mamy fitokompleksy krajobrazowe z suboceanicznymi borami sosnowymi (*Leucobryo-Pinetum*) albo z subkontynentalnymi borami sosnowymi (*Peucedano-Pinetum*). Jednostkami typologicznymi odpowiadającymi tego rodzaju zróżnicowaniu fitokompleksów krajobrazowych są, moim zdaniem, odmiany regionalne krajobrazu. Wyróżnić by więc należało krajobraz suboceanicznych borów i borów mieszanych oraz krajobraz subkontynentalnych borów i borów mieszanych.

Grupa VII (numery 136—145)

Grupa ta łączy potencjalne fitokompleksy krajobrazowe, w których dominującym zbiorowiskiem roślinnym są bory sosnowe. Bory sosnowe zajmują tam siedliska typu I w całości, siedliska typu II w większości oraz częściowo siedliska typu III (zbiorowisko boru wilgotnego „*Molinio-Pinetum*”). Bory mieszane występują powszechnie, lecz na ogół na niewielkich powierzchniach — przede wszystkim na siedliskach typu III. Siedliska typu IVa zajęte są przez łąki jesionowo-olszowe lub olsy, natomiast siedliska typu IVb — głównie przez olsy i, w mniejszym stopniu, przez bory bagienne lub torfowiska wysokie. Schemat tego typu struktury fitokompleksu krajobrazowego przedstawiony jest na rycinie 12.

Ryc. 12. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu borowego

Fig. 12. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes classified to pine forest landscape

Potencjalne fitokompleksy krajobrazowe omawianej grupy reprezentują krajobraz borowy zróżnicowany na odmiany regionalne w zależności od przynależności borów do jednego z dwu zespołów regionalnych. Tam gdzie bory sosnowe należą do zespołu *Peucedano-Pinetum* mamy do czynienia z krajobrazem subkontynentalnych borów sosnowych, natomiast tam gdzie należą one do zespołu *Leucobryo-Pinetum* — z krajobrazem suboceanicznych borów sosnowych.

W fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do tej grupy dominującym potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są olsy zajmujące szeroko rozprzestrzenione siedliska typu IVb. Oprócz olsów w fitokompleksach tych występują bory mieszane, zajmując piaszczyste góry wśród bagien, uznane za siedliska typu I. Innych typów siedlisk właściwie tu nie ma, przynajmniej nie zajmują one na tyle dużej powierzchni, aby mogły być uwzględnione przy tym stopniu generalizacji jaki był stosowany. Schemat rozmieszczenia zbiorowisk przedstawia rycina 13.

Ryc. 13. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu olsowego

Fig. 13. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes classified to alder forest landscape

Potencjalne fitokompleksy krajobrazowe tej grupy należą do krajobrazu olsowego. Typ ten jest na badanym terenie reprezentowany jedynie przez dwa fitokompleksy krajobrazowe położone w dolinach rzek (Narwi i Bugu). Ponadto fitokompleks krajobrazowy (nr 9) położony w górnej części doliny Orzyca (w okolicach Mławy) ma charakter przejściowy pomiędzy omawianym tu typem a typem odpowiadającym krajobrazowi borów mieszanych.

Grupa IX (numery 148—152)

Stanowią ją fitokompleksy krajobrazowe występujące w dolinach Narwi i Bugu na aktualnych tarasach akumulacyjnych. Głównym potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są w tych fitokompleksach nadrzeczne łągi topolowo-wierzbowe (*Salici-Populetum*). Zajmują one siedliska typu IVa zdecydowanie najszerzej rozpowszechnione w tych fitokompleksach. Obok łąg topolowo-wierzbowych w fitokompleksach krajobrazowych tej grupy występują: bory mieszane na siedliskach typu I (są to piaszczyste „wyspy” w obrębie aktualnego tarasu zalewowego), czasem fragmenty grądów i dolinowych łąg jesionowo-wiązowych (*Ficario-Ulmetum typicum*) na siedliskach typu III, często olsy lub rzadziej łągi jesionowo-olszowe (*Circae-Alnetum*) na siedliskach typu IVb (zarastające starorzecza, skrzydła doliny, gdzie następuje wy-

ływ wód z sąsiadujących terenów). Schemat struktury fitokompleksów krajobrazowych tego typu przedstawia rycina 14.

Ryc. 14. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu nadrzecznych łęgów topolowo-wierzbowych

Fig. 14. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes classified to landscape of riverside poplar-willow flood-plain forest

Omawiana grupa potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych reprezentuje krajobraz nadrzecznych łęgów topolowo-wierzbowych.

Grupa X (numery 153 i 154)

Potencjalne fitokompleksy krajobrazowe tej grupy występują na badanym terenie jedynie w dolinie Wisły i częściowo Bzury. Dominującym przestrzennie potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są tu dolinowe łągi jesionowo-wiązowe (*Ficario-Ulmetum typicum*) zajmujące siedliska III typu. W pobliżu nurtu rzeki (na ogół w obrębie wałów przeciwpowodziowych) na siedliskach typu IVa potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym są łągi topolowo-wierzbowe (*Salici-Populetum*), natomiast na brzegach doliny na siedliskach typu IVb występują olsy (*Carici elongatae-Alnetum*) lub łągi jesionowo-olszowe (*Circae-Alnetum*). Schemat tego rozmieszczenia potencjalnych zbiorowisk roślinnych przedstawiony jest na rycinie 15.

Ryc. 15. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksach krajobrazowych zaliczonych do krajobrazu dolinowych łęgów jesionowo-wiązowych

Fig. 15. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes classified to valley ash-elm flood-plain forest landscape

W przyszłości trzeba będzie określić, czy zbocza dolin należy włączać w zasięg fitokompleksów krajobrazowych omawianego typu (potencjalnymi zbiorowiskami roślinnymi są tam grądy i dąbrowy świetliste), czy też traktować jako obszary odrębnych fitokompleksów krajobrazowych (włączenie zboczy doliny do fitokompleksów położonych na sąsiedniej wysoczyźnie raczej nie wydaje się właściwe).

Omawiana grupa potencjalnych fitokompleksów reprezentuje krajobraz dolinowych łągów jesionowo-wiązowych.

Odrębny charakter w obrębie całości ma potencjalny fitokompleks krajobrazowy oznaczony numerem 13, a zestawiony w tabeli 3 na końcu (nr 155). Jest to fitokompleks, w którym dominującym potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym jest łąg jesionowo-olszowy (*Circae-Alnetum*) zajmujący siedliska typu IV. Na lokalnych wyniesieniach gruntu mineralnego (siedliska typu I) potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym jest grąd (schemat na ryc. 16).

Ryc. 16. Schemat zonacji potencjalnych zbiorowisk roślinnych w fitokompleksie krajobrazowym reprezentującym prawdopodobnie krajobraz łągów jesionowo-olszowych

Fig. 16. Schematic diagram of zonation of potential plant communities in landscape phytocomplexes representing the probable landscape of flood-plain ash-alder forest

Fitokompleks ten położony jest w dolinie rzeczki Mławki w okolicach miasta Mława. Wydaje się, że reprezentuje on odrębny typ krajobrazu roślinnego, a mianowicie krajobraz łągów jesionowo-olszowych. Trzeba zaznaczyć, że jest dość prawdopodobne występowanie tu pierwotnie krajobrazu olsowego.

Należy jeszcze powiedzieć, że niektóre fitokompleksy krajobrazowe mają charakter przejściowy pod względem typologicznym, to znaczy pod względem jednych cech zaliczyć by je można do jednego typu, podczas gdy pod względem innych do drugiego. Takimi fitokompleksami są np. fitokompleks nr 9 (pośredni pomiędzy krajobrazem borów mieszanych a krajobrazem olsów), fitokompleks nr 132 (pośredni pomiędzy krajobrazem dąbrowowo-grądowym a krajobrazem borów mieszanych) oraz pare innych.

Ponadto zdaje sobie sprawę, że na skutek wykorzystania przeglądowej (a nie szczegółowej) mapy potencjalnych zbiorowisk roślinnych

jako podstawy wydzielania fitokompleksów krajobrazowych, mogło się zdarzyć nierozdzielenie leżących obok siebie a podobnych pod względem struktury fitokompleksów. Dlatego nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi do liczby 155 potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych, jakie zostały wydzielone, gdyż przy dokładniejszych badaniach prawdopodobnie ich liczba uległaby pewnemu (lecz myślę, niewielkiemu) powiększeniu.

W obrębie wyróżnionych 11 typów fitokompleksów krajobrazowych, czyli w obrębie spotykanych na badanym terenie krajobrazów roślinności potencjalnej, wyodrębnić można dwie wielkie grupy krajobrazów, a mianowicie krajobrazy borowe (związek *Dicrano-Pinion*) oraz krajobrazy lasów liściastych z klasy *Quercu-Fagetea*. Podział ten nie jest wprawdzie ani wyczerpujący, ani zupełny, gdyż z jednej strony wyróżnione krajobrazy olsowy i nadrzecznych łęgów topolowo-wierzbowych są poza tym podziałem, a z drugiej krajobrazy dąbrów i borów mieszanych oraz borów mieszanych i grądów mają charakter pośredni, jednak odzwierciedla najbardziej ogólne zróżnicowanie roślinności w tym obszarze.

VI. PRÓBA PODZIAŁU GEOBOTANICZNEGO BADANEGO TERENU

Syntezą badań zróżnicowania potencjalnej roślinności naturalnej badanego terenu jest propozycja podziału geobotanicznego objętego badaniami wycinka Polski (ryc. 17).

Przedstawione na mapie rozmieszczenie wyróżnionych potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych stanowić może podstawę dla geobotanicznego podziału terenu. Jako podstawową i niepodzielną jednostkę podziału przestrzennego przyjmuję fitokompleks krajobrazowy. Fitokompleks krajobrazowy jest tu więc najmniejszą jednostką regionalną.

Podział geobotaniczny badanego terenu wykonałem wychodząc od podziału geobotanicznego Polski przeprowadzonego przez Szafera (1972). Jak już mówiono poprzednio, znaczna większość terenu objętego badaniami jest w wyżej wspomnianym podziale zaliczona do Krainy Mazowieckiej w Dziale Bałtyckim. Niniejsze opracowanie obejmuje, mimo wszystko, zbyt mały wycinek terenu, aby na jego podstawie wypowiadać się na temat słuszności wydzielenia jednostek tego rzędu co kraina; w związku z tym, podział na krainy przyjmuję w całości według podziału Szafera, zainteresowania swoje kierując na wydzielanie i charakterystykę jednostek niższego rzędu (okrąg i podokrąg) oraz ściślejsze wyznaczenie granic poszczególnych krain.

Ogólnie rzecz biorąc wydaje się, że zasięg Krainy Mazowieckiej jest w geobotanicznym podziale Polski właściwie wyznaczony. Proponowałbym jedynie pewne przesunięcia granic.

Granicę pomiędzy Krainą Mazowiecką a Krainą Pomorski Południo-

Ryc. 17. Propozycja podziału geobotanicznego badanego terenu
Fig. 17. Proposal of geobotanical classification of the territory under study

Dział Bałtycki

I — Kraina: Pomorski Południowy Pas Przejściowy

1 — Okręg Wysoczyzny Dobrzyńskiej

II — Kraina Wielkopolsko-Kujawska

1 — Okręg Kujawski. Podokręgi: a — Włocławski, b — Gostyniński, c — Kutnowski, d — Lubieński

III — Kraina Mazowiecka

1 — Okręg Wkry. Podokręgi: a — Płoński, b — Raciąski, c — Mławski, d — Działdowski, e — Opinogórski, f — Nasielski

2 — Okręg Warszawski. Podokręgi: a — Sochaczewski, b — Doliny Środkowej Wisty, c — Puszczy Kampinoskiej, d — Wołomiński, e — Doliny Dolnego Bugu

3 — Okręg Południowokurpiowski. Podokręgi: a — Przasnysko-Różański, b — Doliny Dolnej Narwi, c — Wyszowski, d — Brocki, e — Wzgórz Czerwonego Boru, f — Ostrołęcki

IV — Kraina Podlaska

1 — Okręgi Łukowsko-siedlecki. Podokręgi: a — Sokołowski, b — Siedlecki, c — Kałuszyński, d — Doliny Liwca, e — Doliny Środkowego Bugu

2 — Okręg Północnopodlaski

Dział Północny

V — Kraina Mazursko-kurpiowska, Okręg Kurpiowsko-Piski

Baltic section

I — Region: Pomeranian Southern Transitional Zone

1 — District of Dobrzyń Upland

II — Wielkopolska-Kujawy Region

1 — Kujawy District. Subdistricts: a — Włocławek, b — Gostynin, c — Kutno, d — Lubień

III — Mazowsze Region

1 — Wkra District. Subdistricts: a — Płońsk, b — Raciąż, c — Mława, d — Działdowo, e — Opinogóra, f — Nasielsk

2 — Warszawa District. Subdistricts: a — Sochaczew, b — Middle Vistula Reach valley, c — Puszcza Kampinoska, d — Wołomin, e — Lower Bug Reach valley

3 — South Kurpie District. Subdistricts: a — Przesnysz-Różan, b — Lower Narew Reach valley, c — Wyszów, d — Brok, e — Wzgórza Czerwonego Boru, f — Ostrołęka

IV — Podlasie Region

1 — Łuków-Siedlce District. Subdistricts: a — Sokołów, b — Siedlce, c — Kałuszyn, d — Liwiec valley, e — Middle Bug Reach valley

2 — North Podlasie District

Northern Section

V — Mazury-Kurpie Region;

District Kurpie-Pisz

wy Pas Przejściowy (nazwa chyba niezbyt szczęśliwie wybrana) wyznaczyłbym nieco na wschód od Płocka. Granicę tę wyznaczyć można na podstawie zmiany kierunku przebiegu granic potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych, gdyż pod względem typologicznym różnic tu nie widać. Jeśli w tej części Krainy Mazowieckiej układ fitokompleksów krajobrazowych ma z grubsza biorąc kierunek równoleżnikowy, to we wschodniej części Okręgu Wysoczyzny Dobrzyńskiej, należącym do poprzednio wspomnianej krainy, przyjmuje kierunek mniej więcej południkowy. Ta zmiana kierunku granic fitokompleksów krajobrazowych pokrywa się z zasięgiem fazy leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego.

Także granicę pomiędzy Krainą Mazowiecką a Krainą Wielkopolsko-Kujawską (tu Okręg Kujawski) ustaliłbym bardziej na wschód niż to zostało zrobione w podziale Szafera, włączając okolice Gostynina i Kutna do Okręgu Kujawskiego, głównie ze względu na występowanie nieco innej postaci regionalnej grądów na tym obszarze (*Galio-Carpinetum* odmiana kujawska).

Natomiast wschodnia granica Krainy Mazowieckiej z Krainą Podlaską, przedstawiona w podziale geobotanicznym dokonany przez Szafera, znajduje pełne potwierdzenie na mapie potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych.

W obrębie Krainy Mazowieckiej Szafer (l.c.) wydzielił trzy okręgi, z których dwa zostały objęte zasięgiem niniejszego opracowania: Okręg Północnomazowiecki niemal w całości, natomaist Okręg Warszawski tylko częściowo.

Wyniki opracowania wskazują raczej na konieczność rozdzielenia Okręgu Północnomazowieckiego na dwa niezależne okręgi, dla których zaproponowałbym nazwy: Okręg Wkry (zachodnia część dotychczasowego okręgu) i Okręg Południowokurpiowski (na wschodzie). Tak wydzielone okręgi można dobrze scharakteryzować pod względem geobotanicznym, podczas gdy dotychczasowy Okręg Północnomazowiecki miał bardzo słabą charakterystykę.

Okręg Wkry wyznaczają następujące granice: na południu — krawędź doliny Wisły; na wschodzie — krawędź doliny Narwi do ujścia Orzyca, dolina Orzyca i Węgierki, dalej linia do źródeł Orzyca; na północy i zachodzie — zasięg zlodowacenia bałtyckiego, czyli granica Krainy Mazowieckiej.

Okręg Wkry wyróżnia się wyraźną dominacją krajobrazów: dąbrowo-grądowego i wybitnie grądowego. Udział zbiorowisk z klasy *Vaccinio-Piceetea* jest tu niewielki, przy czym skupione są one głównie w jednej części okręgu (w jednym z podokręgów).

W obrębie okręgu Wkry wydzieliłbym następujące jednostki w randze podokręgu:

— Podokręg Płoński odznaczający się dominacją zbiorowisk grądowych;

— Podokręg Raciąski odznaczający się występowaniem subkontynentalnych borów sosnowych, borów mieszanych i dużym udziałem olsów;

— Podokręg Mławski w którym dominują fitokompleksy krajobrazowe reprezentujące krajobraz dąbrowowo-grądowy;

— Podokręg Działdowski wyróżniający się dominacją zbiorowisk grądowych i w mniejszym stopniu borów mieszanych oraz stosunkowo niewielkim (zwłaszcza w porównaniu z sąsiadującym od południa podokręgiem Mławskim) udziałem dąbrów świetlistych;

— Podokręg Opinogórski będący obszarem dominacji krajobrazu wybitnie grądowego;

— Podokręg Nasielski charakteryzujący się dominacją krajobrazu dąbrowowo-grądowego.

Okręg Południowokurpiowski wyznaczają granice: na południu — dolina dolnego Bugu; na północy — dolina Narwi i południowy skraj sandru kurpiowskiego; na wschodzie — linia wzgórz Czerwonego Boru; na zachodzie — linia źródeł Orzyca, rzeczki Węgierki i dolnej Narwi.

Okręg ten odznacza się dominacją borów mieszanych jako potencjalnego zbiorowiska roślinnego. Znaczny jest tu udział subkontynentalnych borów sosnowych (*Peucedano-Pinetum*). Udział grądów i świetlistych dąbrów jest tu stosunkowo mniejszy, szczególnie w porównaniu z poprzednio omawianym Okręgiem Wkry. Ogólnie dominują tu krajobrazy zbiorowisk borowych ze związku *Dicrano-Pinion*.

W obrębie Okręgu Południowokurpiowskiego wydzielić można następujące podokręgi:

— Podokręg Przasnysko-Różański wyróżniający się dominacją borów mieszanych;

— Podokręg Doliny Dolnej Narwi odznaczający się występowaniem fitokompleksów krajobrazowych reprezentujących krajobrazy: nadrzecznych łągów topolowo-wierzbowych, subkontynentalnych borów sosnowych i olsowy;

— Podokręg Doliny Dolnej Narwi odznaczający się występowaniem Podokręgu Nasielskiego z Okręgu Wkry, wyróżniający się występowaniem fitokompleksów krajobrazowych reprezentujących krajobraz dąbrowowo-grądowy;

— Podokręg Brocki, na terenie którego dominują zbiorowiska subkontynentalnych borów sosnowych;

— Podokręg Wzgórz Czerwonego Boru o krajobrazie subkontynentalnych borów sosnowych;

— Podokręg Ostrołęcki o dość zmiennej roślinności potencjalnej z przewagą grądów i borów mieszanych.

W ramach objętej badaniami części Okręgu Warszawskiego wydzielić można następujące podokręgi:

— Podokrąg Sochaczewski odznaczający się zdecydowaną dominacją przestrzenną zbiorowisk grądowych;

— Podokrąg Doliny Środkowej Wisły z dominacją krajobrazu dolinowych łęgów jesionowo-wiązowych;

— Podokrąg Puszczy Kampinoskiej z dominacją krajobrazu subkontynentalnych borów i borów mieszanych;

— Podokrąg Wołomiński, w którym najczęstszymi potencjalnymi zbiorowiskami roślinnymi są bory mieszane i suboceaniczne bory sosnowe;

— Podokrąg Doliny Dolnego Bugu wyróżniający się występowaniem fitokompleksów reprezentujących krajobraz nadrzecznych łęgów topolowo-wierzbowych.

Poza wymienionymi jednostkami w Okręgu Warszawskim wydzielić można kilka innych podokręgów, leżących jednak poza badanym terenem.

Charakterystyka geobotaniczna Okręgu Warszawskiego jest dość trudna przede wszystkim ze względu na jego niejednorodność. W okręgu tym, obok obszarów borowych (np. Podokrąg Wołomińsko-Łochowski), spotykamy obszary, na których zdecydowanie przeważają siedliska zbiorowisk z klasy *Querco-Fagetea* (np. Podokrąg Sochaczewski). Ponadto mamy tu do czynienia z dwoma regionalnymi zespołami borów sosnowych. W Puszczy Kampinoskiej bory sosnowe należą głównie do zespołu *Peucedano-Pinetum*, natomiast na południe od doliny Bugu, w Podokręgu Wołomińsko-Łochowskim, bory sosnowe reprezentują zespół *Leucobryo-Pinetum*. Wszystko to powoduje, że charakterystyka geobotaniczna tego okręgu jest słaba. W porównaniu z otaczającymi terenami Okrąg Warszawski wyróżnia się niewielkim udziałem dąbrów świetlistych. Pomimo słabej charakterystyki nie wydaje się możliwe ani rozdzielenie tego okręgu na dwa lub więcej innych, ani włączenie go w całości do jakiegokolwiek innego.

Na temat charakterystyki geobotanicznej regionów objętych tylko w części zasięgiem opracowania nie można zbyt wiele powiedzieć, jednak tam, gdzie to możliwe, spróbuję wydzielić niższe jednostki regionalne.

W ramach objętej badaniami części Okręgu Kujawskiego należącego do Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej wydzieliłbym cztery podokręgi, z których żaden nie został w pełni objęty i dlatego mogą one być scharakteryzowane tylko prowizorycznie:

— Podokrąg Włocławski wyróżniający się dominacją subkontynentalnych borów sosnowych;

— Podokrąg Gostyniński o silnie zróżnicowanej potencjalnej roślinności naturalnej z przewagą łąk i borów mieszanych;

— Podokrąg Kutnowski wyróżniający się dominacją siedlisk łąkowych;

— Podokrąg Lubieński (?) objęty tylko w minimalnym stopniu za-

sięgiem opracowania, a odznaczający się panowaniem krajobrazu wybitnie grądowego.

W obrębie objętej zasięgiem opracowania części Okręgu Łukowsko-Siedleckiego należącego do Krainy Podlaskiej wydzieleć można na podstawie map potencjalnej roślinności naturalnej następujące podokręgi:

— Podokrąg Sokołowski odznaczający się występowaniem fitokompleksów reprezentujących krajobrazy: dąbrowowo-grądowy, dąbrów i borów mieszanych oraz borów mieszanych i grądów w wariacie typowym;

— Podokrąg Siedlecki wyróżniający się w stosunku do poprzedniego występowaniem fitokompleksów krajobrazowych reprezentujących krajobraz borów mieszanych i grądów w wariacie „odwróconym”;

— Podokrąg Kałuszyński, w którym najczęstsze są fitokompleksy należące do krajobrazu dąbrowowo-grądowego;

— Podokrąg Doliny Liwca (?) odznaczający się dużym udziałem łągów jesionowo-olszowych, olsów, borów mieszanych i suboceanicznych borów sosnowych.

Odnosnie do okręgów objętych tylko w małym stopniu zasięgiem opracowania nie mam podstaw ani do ich charakterystyki, ani do zróżnicowania na podokręgi. Tym niemniej na podstawie mapy potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych określić można ich granice. Dotyczy to: Okręgu Północnopolaskiego obejmującego północno-wschodni skraj badanego terenu, Okręgu Wysoczyzny Dobrzyńskiej w zachodniej części, oraz Okręgu Kurpiowsko-Piskiego, do którego wypada zaliczyć niewielki fragment terenu w części północnej.

Przedstawiając propozycję podziału geobotanicznego badanego terenu, zdaję sobie sprawę, że nie uwzględniłem wszystkich elementów w charakterystyce regionów. Nie uwzględniłem tu ani zróżnicowania roślinności rzeczywistej, ani zasięgów poszczególnych gatunków, ani także historii flory i roślinności tego obszaru. Dlatego też sądzę, że przedstawiony podział należy traktować raczej jako podstawę do dyskusji niż jako zamknięte opracowanie.

W porównaniu z podziałem zaproponowanym przez S z a f e r a (1972) podział przedstawiony w niniejszej pracy jest niewątpliwie bardziej szczegółowy, lecz z drugiej strony oparty na węższych podstawach. Myślę, że wydzielanie jednostek niskiego szczebla może być zupełnie poprawnie wykonywane na podstawie mapy potencjalnej roślinności naturalnej (szczególnie mapy fitokompleksów krajobrazowych), natomiast przy wydzielaniu wyższych jednostek (od szczebla krainy w górę) należy uwzględniać także szereg innych elementów charakteryzujących szatę roślinną.

SUMMARY

The present study was undertaken to characterize the differentiation of what is called the potential natural vegetation (Tüxen 1956) of Northern Masovia. The differentiation of the potential natural vegetation is considered in the aspects of two organisation levels of the vegetation — phytocenoses or plant communities and landscape units called landscape phytocomplexes (Fig. 1).

The result of studies on the differentiation of potential plant communities is the included coloured map. The methods of mapping in the field potential plant communities are briefly described. Attention is called to the problem of the length of the transect network indispensable for preparation of the map (Fig. 2).

On the territory investigated 13 types of potential plant communities have been distinguished:

- *Leucobryo-Pinetum* — suboceanic pine forest growing in mineral habitats with poor sands in the southern part of the studied area;

- *Peucedano-Pinetum* — subcontinental pine forest substituting the previous type in the northern part of the territory;

- *Vaccinio uliginosi-Pinetum* — bog pine forest on peat;

- *Pino-Quercetum* — mixed pine-oak forest growing in mesotrophic sandy habitats;

- *Potentillo albae-Quercetum* — thermophilous oak forest overgrowing mainly gravel hillocks;

- *Tilio-Carpinetum* — oak-linden-hornbeam forest occurring on clay and more fertile sandy soils. A poorer and richer form is distinguished;

- *Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum* — ash-elm flood-plain forest, rare, in valleys of large rivers;

- *Ficario-Ulmetum chrysosplenietosum* — ash-elm flood-plain forest, rare, occurring along small streams;

- *Circaeo-Alnetum* — alder-ash flood-plain forest common in slightly wet valleys;

- *Salici-Populetum* — willow-poplar flood-plain forest occurring on sandy alluvial soil near large rivers;

- *Carici elongatae-Alnetum* — wet alder forest on low peat;

- *Sphagnetum medio-rubelli* — nonforest community of high peat.

The particular units are characterised mainly as regards their phytosociological and habitat features. The diagnostic characters of the particular types of potential plant communities are discussed in detail and so is the spatial variability

of these communities in reference to the physical-geographical classification of the studied territory (Kondracki 1977).

As regards the problem of classification of vegetation differentiation at the landscape level, the author suggests his concept for distinguishing what he calls landscape phytocomplexes. The latter are defined as spatial systems of plant communities characterised by a specific spatial structure. The nature of this structure consists in a regular succession in space of plant community types, that is zonation.

According to the author, the variability of potential plant communities within the landscape phytocomplex results from the differences between habitats in space. This variability may be presented in a relatively simple way as the dependence of the potential plant communities from the terrain relief and water conditions. Therefore, for characterising the potential landscape phytocomplexes the author distinguished a number of habitat types in reference to the terrain relief and water relations. The following types of habitats are distinguished: type I — the tops of local eminences, type II — slopes of eminences and flat and showing no major influence of ground water, type III — area at the foot of slopes and other places where the influence of ground water is distinct, Type IV — valleys with water courses and sodden depressions. Types III and IV are divided into subtypes in dependence whether the water is mobile (subtype a) or stagnant (subtype b). The author stresses that the here presented classification is only applicable for considering the structure of landscape phytocomplexes, but not of the plant communities. The types of habitats in this sense determine the "place" or "position" of the corresponding plant community in the zonation series.

The author claims that the differences in the potential plant communities within the landscape phytocomplexes are mainly due to the differentiation of the terrain relief (hence water relations and fertility). However, the differentiation of the vegetation into landscape phytocomplexes is mainly dependent on the different geological structure of the particular larger terrain fragments.

On the area studied 155 potential landscape phytocomplexes are distinguished and classified (Table 3). Eleven basic types or units, that is plant landscapes are distinguished, partly divided into subtypes. The vegetation landscapes are considered as abstract typological units of vegetation differentiation at the landscape phytocomplex level. The ranges of the distinguished potential landscape phytocomplexes are shown in the attached map. The successive figures (Figs 3-16) present diagrammatically the differentiation of the potential plant communities in various types of landscape phytocomplexes.

The investigated territory was classified geobotanically on the basis of the prepared map of potential natural vegetation (Fig. 17). As outset point was adopted the proposal advanced by Szafer (1972) of a geobotanical classification of the whole of Poland. The distinguished regions are characterised from the aspect of differentiation of the potential plant communities and potential landscape phytocenoses.

LITERATURA

- Basalykas A., Šleinite O., 1965. Zagadnienia mikroregionalizacji i typizacji miast. Przegl. Zagr. Lit. Geogr. 1965 z. 4.
- Bednarek A., 1958. Zespoły leśne Rezerwatu Lipka. Zesz. nauk. SGGW, Leśn. 1.
- Boińska U., 1970. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne uroczysk Podgórze i Nakwasin w nadleśnictwie Płock. Stud. Soc. Sci. Tor. Sec. D. 9.2.
- Faliński J. B., 1966. Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna Wzniesień Górskich i Niziny Orneckiej. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW 11.
- Faliński J. B., 1971. Methodical basis for Map of Potential Natural Vegetation of Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 40.1.
- Faliński J. B., 1972 a. Potencjalna roślinność naturalna Wysoczyzny Bielskiej. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW 24.
- Faliński J. B., 1972 b. Potencjalna roślinność naturalna Pojezierza Mazurskiego (część środkowa). Phytocoenosis 1.1.
- Géhu J.-M., 1977. Le concept de sigmassociation et son application a l'étude du paysage vegetal des falaises atlantiques Françaises. Vegetatio 34.2.
- Haase G., 1967. Zur Methodik grossmasstäbiger landschaftsökologischer und naturräumlicher Erkundung. Probleme der Landschaftsökologischer Erkundung und naturräumlichen Gliederung. Lipsk.
- Isačenko A., 1965. Osnovy landszaftowiedienija i fiziko-geograficzeskije rajonirovanije. Moskwa.
- Kondracki J., 1965. Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.
- Kondracki J., 1968. Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym. Pr. geogr. 69.
- Kondracki J., 1976. Podstawy regionalizacji fizyczno-geograficznej. PWN, Warszawa.
- Kondracki J., 1977. Regiony fizycznogeograficzne Polski. Wyd. UW, Warszawa.
- Marsz A., 1975 mscr. Opracowanie podstawowej jednostki typologicznej dla oceny środowiska geograficznego w skali przeglądowej i metoda oceny środowiska za pomocą jednostek typologicznych, manuskrypt w IGiPZ PAN w Warszawie.
- Matuszkiewicz J., 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 3. Lasy i zarośla łęgowe. Phytocoenosis 5.1.
- Matuszkiewicz W., 1962. Zur Systematik der natürlichen Kiefernwälder des mittel- und osteuropäischen Flachlandes. Mitt. flor.-soz. Arb. Gem. N.F. 9.
- Matuszkiewicz W., 1966. Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW 15.

- Matuszkiewicz W., 1967. Potencjalna roślinność naturalna Niziny Śląskiej (część środkowa). Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW 17.
- Matuszkiewicz W., 1974. Teoretyczno-metodyczne podstawy badań roślinności jako elementu krajobrazu i obiektu użytkowania rekreacyjnego. Wiad. ekol. 20.1.
- Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J., 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 2. Bory sosnowe. Phytocoenosis 2.4.
- Neef E., 1963. Topologische und chorologische Arbeitsweise in der Landschaftsforschung. Patermanns Geogr. Mitt.
- Pawłowski B., 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. (w: Szafer W., Zarzycki K., (red.) Szata roślinna Polski t. 1), PWN, Warszawa.
- Różycki S. Z., 1972. Nizina Mazowiecka. (w: Galon R. (red.) Geomorfologia Polski t. 1. Niż Polski), PWN, Warszawa.
- Różycki S. Z., Zwierz S., 1952. Arkusz Warszawa (w: Rüle E., (red.), Przeglądowa mapa geologiczna Polski), Instytut Geologiczny, Warszawa.
- Scamoni A., 1967. Wstęp do fitosocjologii praktycznej. PWRiL, Warszawa.
- Schmithüsen J., 1968. Allgemeine Vegetationsgeographie. Walter de Gruyter et Co., Berlin.
- Schmithüsen J., Netzel E., 1962/63. Vorschläge zu einer internationalen Terminologie geographischer Begriffe. Geogr. Taschenbuch.
- Schwickerath M., 1954. Die Landschaft und ihre Wandlung auf geobotanischer und geographischer Grundlage entwickelt und erläutert im Bereich des Messtischblattes Stolberg. Aachen.
- Sokołowski A. W., 1963. Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. Monogr. Bot. 16.
- Szafer W., 1972. Szata roślinna Polski niżowej. (w: Szafer W., Zarzycki K., (red.) Szata roślinna Polski t. 1), PWN, Warszawa.
- Troll C., 1950. Die geographische Landschaft und ihre Erforschung. Studium Generale 3. Bonn.
- Tüxen R., 1956. Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. Angew. Pflanzensoz. 13.
- Wojterski T., Leszczyńska M., Piaszyk M., 1973. Potencjalna roślinność naturalna Pojezierza Lubuskiego. Bad. fizjogr. nad Pol. zach. Ser. B. 26.
- Wodziczko A., 1950. O biologii krajobrazu. Przegl. geogr. 22.

JAN MAREK MATUSZKIEWICZ

POTENCJALNE ZBIOROWISKA ROŚLINNE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

POTENTIAL PLANT COMMUNITIES OF NORTHERN MASOVIA

0 5 10 15 20 km

INSTYTUT BOTANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ZAKŁAD FITOSOCJOLOGII I EKOLOGII ROŚLIN

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
ZAKŁAD BIOGEOGRAFII