MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. 65, 1985

JANINA JAKUBOWSKA-GABARA

ZESPOŁY LEŚNE
WYSOCZYNY RAWSKIEJ
I ICH ANTROPOGENICZNE
ZNIEKSZTAŁCENIA

Forest associations of the Rawa Mazowiecka Upland
and their antropogenic deformations

WARSZAWA

Wydano z pomocą finansową
Polskiej Akademii Nauk

KOMITET REDAKCYJNY

R. Olaczek (Łódź), E. Sidorkiewicz (Warszawa)

RADA REDAKCYJNA

W. Matuszkiewicz (Warszawa), Z. Podbielkowski (Warszawa), E. Sidorkiewicz
(Warszawa), R. Olaczek (Łódź), H. Piotrowska (Gdańsk), K. Rostański (Katowice),
W. Żukowski (Poznań)

ADRES REDAKCJI: Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

© Copyright by Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985

ISBN 83-01-03791-1

ISSN 0077-0655

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE. WARSZAWA 1985

Wydanie I. Nakład 340+90 egz. Arkuszy wyd. 16,5. Arkuszy druk. 9,25+3 wklejki. Papier druk. sat.
kl. III, 80 g, 70×100. Oddano do składania w czerwcu 1984 r. Podpisano do druku w marcu 1985 r.
Druk ukończono w maju 1985 r. Zam. 310/84/M – Z-24 Cena zł 240,–

WROCŁAWSKA Drukarnia Naukowa

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
1. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ	8
1.1. Położenie	8
1.2. Ukształtowanie powierzchni	8
1.3. Sieć rzeczna	11
1.4. Gleby	13
1.5. Klimat	15
2. ZARYS HISTORII GOSPODARCZEJ LASÓW BADANEGO TERENU	17
3. METODY PRACY I OBJAŚNIENIE UŻYWANYCH SKRÓTÓW	21
4. PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH ZESPOŁÓW LEŚNYCH I ICH POSTACI DEGE- NERACYJNYCH	24
4.1 <i>Carici elongatae-Alnetum</i>	25
4.2 <i>Poa trivialis-Alnetum</i>	33
4.3 <i>Fraxino-Alnetum</i>	39
4.4 <i>Tilio-Carpinetum</i>	43
4.5 <i>Potentillo albae-Quercetum</i>	87
4.6 <i>Pino-Quercetum</i>	111
4.7 <i>Peucedano-Pinetum</i>	124
4.8 Chojniak sosnowy z murawą kserotermiczną	131
5. PODSUMOWANIE	137
6. LITERATURA	142
7. SUMMARY	147

WSTĘP

Problematyka niniejszej pracy mieści się w kompleksowym zagadnieniu wpływu człowieka na szatę roślinną, określanym terminem synantropizacji (Faliński 1966 a, b). Działalność człowieka powoduje nie tylko powstawanie nowych kombinacji gatunków oraz nowych synantropijnych zbiorowisk roślinnych. Prowadzi ona także do różnych modyfikacji, zniekształceń naturalnych fitocenozy (Olaczek 1972). Kierunek badań procesu synantropizacji, zajmujący się zmianami zaszłyimi pod wpływem człowieka w naturalnych zbiorowiskach roślinnych, rozpatruje problemy tzw. degeneracji tych zbiorowisk. Temat niniejszej pracy dotyczy tego właśnie kierunku badań.

Wysoczyzna Rawska jest regionem Polski środkowej o typowo rolniczym krajobrazie (fot. 1). Występujące tu lasy są rozdrobnione, rozrzucone niewielkimi kompleksami po całym terenie, od dawna użytkowane przez miejscową ludność oraz strukturalnie zmienione przez gospodarkę leśną. Być może dlatego obszar ten nie przyciągał uwagi florystów i nie stanowił atrakcyjnego obiektu badań geobotanicznych. Notatek z przeszłości o florze tego terenu jest niewiele, a opracowania florystyczno-fitosocjologiczne, dotychczas opublikowane, dotyczą wyłącznie nielicznych rezerwatów przyrody.

Pierwsze dane florystyczne, pochodzące z XIX i początku XX w., zawdzięczamy: Berdau'owi, Jastrzębowskiemu, Leppertowi, Szubertowi, Łapczyńskiemu, Drymmerowi i Wadze. Stanowiska oraz listy niektórych gatunków roślin, stwierdzonych przez pierwszych czterech autorów, zostały opublikowane przez Rostafińskiego (1871). I tak: Berdau zebrał w okolicach Nowego Miasta n. Pilicą następujące gatunki: *Rhynchospora alba*, *Tofieldia calyculata*, *Gladiolus imbricatus*, *Cimicifuga foetida*, *Gypsophila fastigiata*, *Dianthus superbus*, *Spiraea salicifolia*; w okolicach Rawy: *Cimicifuga foetida*, *Gypsophila fastigiata* i *Dianthus superbus*; w Mogielnicy: *Thalictrum aquilegifolium*; w Świdnie: *Scirpus tabernaemontani*. Jastrzębowski stwierdził w Boguszycach k. Rawy — *Wolffia arrhiza*, w Żdżarach — *Adenophora liliifolia*. Jastrzębowski i Leppert stwierdzili występowanie modrzewia w Węgrzynowicach i Modrzewku. O występowaniu *Larix europaea* w puszczy Lubocheńskiej pisał Waga (1848). O stanowisku *Abies alba* w okolicach Rawy wspomina Szubert (Rostafiński 1871) oraz Łapczyński (1892), który podaje również stanowiska *Teesdalea nudicaulis* z Huty Gzdowskiej i Jeruzala. Drymmer (1908) donosi o występowaniu w Rawie i Łęgonicach *Xanthium spinosum*

Fot. 1. Krajobraz Wysoczyzny Rawskiej
Photo. 1. Rawa Upland landscape

Fot. J. Siciński

oraz podaje stanowiska innych ciekawszych roślin z okolic Rawy – z lasu wsi Węgrzynowice: *Melittis melissophyllum*, *Hypericum montanum*, *Cephalanthera rubra*, *Potentilla alba*, *Cytisus nigricans*, *Digitalis ambigua*; z lasu koło wsi Konopnica: *Lilium martagon*, *Melittis melissophyllum*; ze wsi Krzemienica: *Phaegopteris dryopteris*; z Rawy: *Falcaria rivini*, *Hippuris vulgaris*; z Trębaczewa: *Trollius europaeus*; ze wsi Zglinna: *Dipsacus silvester*.

Prace Kobendzy (1925, 1930) zawierają dane dotyczące stanowiska *Larix polonica* w Modrzewinie k. Małej Wsi. Autor, oprócz obszernej charakterystyki drzewostanu, podaje ogólny opis roślinności lasu z zaznaczeniem ciekawszych gatunków. Rezerwatu Modrzewina dotyczą również prace: Zery (1930) i Tumiłowicza (1955). O rezerwacie Tomczyce n. Pilicą pisał Grabda (1935). Szereg danych florystycznych z badanego obszaru podaje Mowszowicz (1960). Flora i roślinność rezerwatu lipowego Babsk została omówiona w pracy Urbanek (1961), natomiast rezerwatu Trębaczew w pracach: Hereźniaka (1961) oraz Mowszowicza i in. (1963). Roślinność potencjalną północnych krańców Wysoczyzny, przylegających do Kotliny Warszawskiej, przedstawia praca Matuszkiewicza (1966). Ponadto, dane dotyczące grzybów i porostów rezerwatu Trębaczew znajdują się w pracach: Ławrynowicz (1973) i Czyżewskiej (1974).

Słaby stopień zbadania flory i roślinności leśnej Wysoczyzny Rawskiej, jak również bardzo wyraźne antropogeniczne zniekształcenia występujących tu fitocenoz – przy jednoczesnej atrakcyjności turystycznej tego obszaru (Olaczek 1974 c), potęgującej te zmiany – ujawniły potrzebę pełnego opracowania florystyczno-fitosocjologicznego zbiorowisk leśnych tego terenu.

Celem pracy jest:

- poznanie flory leśnej badanego obszaru;
- poznanie roślinności i określenie stanowiska systematycznego wyróżnionych fitocenoz leśnych;
- przedstawienie antropogenicznych zniekształceń, jakie nastąpiły w tych fitocenozach w wyniku antropopresji;
- określenie podstawowych przyczyn wywołujących zmiany degeneracyjne w zbiorowiskach leśnych.

Prawdziwą wdzięczność winna jestem panu prof. dr hab. Romualdowi Olaczekowi za troskliwą opiekę, liczne konsultacje, cenne rady i wskazówki, które pozwoliły mi zobaczyć wiele problemów we właściwym świetle, oraz za sprawdzenie materiałów zielnikowych.

Serdecznie dziękuję panu prof. dr hab. Jakubowi Mowszowiczowi za szereg życzliwych uwag oraz zainteresowanie przebiegiem i postępami pracy.

Panu prof. dr hab. Julianowi Ławrynowiczowi serdecznie dziękuję za opracowanie wzoru i programu do obliczeń matematycznych, a pani mgr Krystynie Pelasiak za wykonanie obliczeń na maszynie cyfrowej.

Wdzięczna jestem koledze dr Janowi Sicińskiemu za wykonanie zdjęć fotograficznych oraz pomoc w sporządzaniu tabel fitosocjologicznych. Dziękuję również panu mgr inż. Mieczysławowi Jastrzębskiemu za konsultację oraz udostępnienie materiałów do mapy gleb. Pani mgr Ewie Filipiak dziękuję za pomoc w oznaczaniu mszaków.

1. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

1.1. POŁOŻENIE

Obszar objęty badaniami położony jest pomiędzy $20^{\circ} 04'$ i $20^{\circ} 50'$ długości geograficznej wschodniej oraz $51^{\circ} 35'$ i $52^{\circ} 03'$ szerokości geograficznej północnej (ryc. 1). Powierzchnia badanego terenu wynosi około 3000 km². Według regionalizacji geograficznej Kondrackiego (1968) Wysoczyzna Rawska, jako meżoregion, należy do makroregionu Wzniesień Południowo-mazowieckich i podprowincji Nizin Środkowopolskich. Od zachodu graniczy z meżoregionami Wzniesień Łódzkich i Równiny Piotrkowskiej, od południa z Doliną Białobrzeską. Natomiast od północy i wschodu Wysoczyzna styka się z meżoregionami Kotliny Warszawskiej i Równiny Warszawskiej, należącymi do makroregionu Nizin Środkowomazowieckich. Dylikowa (1973) opisuje Wysoczyznę Rawską jako jeden z regionów Niziny Mazowieckiej, położony między Kotliną Warszawską, doliną Rawki i doliną Pilicy.

W regionalizacji geobotanicznej Szafera (1972) badany obszar jest ujęty jako Okręg Rawski (Południowomazowiecki). Obejmuje on południową część Krainy Mazowieckiej, która należy do Poddziału Pasa Wielkich Dolin i Działu Bałtyckiego.

Naturalne, fizjograficzne granice Wysoczyzny Rawskiej wyznaczają: od południa dolina dolnej Pilicy, od północy krawędź morfologiczna (nadarzyńska) opadająca ku Kotlinie Warszawskiej, od wschodu doliny Jezioroki i Kraski (Różycki 1972), od zachodu dolina Rawki (Kondracki 1968). Dolina Rawki, przecinająca krawędź Wysoczyzny na odcinku od Rawy Mazowieckiej do Dolecka, jest wąska i głęboko wcięta. Poza „blokiem wysoczyznowym” Rawka płynie wolniej, jej dolina staje się szeroka.

Według nowego podziału administracyjnego, wprowadzonego w 1975 roku, Wysoczyzna Rawska leży w granicach trzech województw: skierniewickiego, radomskiego i piotrkowskiego.

1.2. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Wysoczyzna Rawska jest regionem dobrze zbadanym pod względem geomorfologicznym. Szczególnie dużo uwagi poświęciła temu obszarowi Balińska-Wuttke, opracowując szeroko zagadnienia geomorfologii oraz

Ryc. 1. Położenie terenu badań na mapie Polski
 Fig. 1. Situation of territory under study on map of Poland

stratygrafii czwartorzędu okolic Rawy Mazowieckiej i Skierniewic. W dolinie Pilicy wykonali badania geologiczne: Ciuk i Rühle (1952), Karaszewski (1952), Rączczyńska-Szenajch (1966).

Ogólną charakterystykę ukształtowania powierzchni badanego terenu przedstawiono przede wszystkim w oparciu o prace Balińskiej-Wuttke 1960, 1961, 1963, 1965).

Wysoczyzna Rawska pokryta jest osadami zlodowacenia środkowopolskiego, które było ostatnim na tym obszarze (Balińska-Wuttke 1963). Rzeźba tego terenu zaczęła się kształtować w czasie recesji młodszej glacyfazy (glacyfazy Grójca) tego zlodowacenia (Różycki 1967). Powierzchnia Wysoczyzny do czasów obecnych zachowała stosunkowo świeżą rzeźbę lodowcową.

Osady czwartorzędowe, których przeciętna grubość na tym terenie wynosi około 40 m, zalegają na wschodnim skrzydle antyklinorium kujawsko-pomorskiego, utworzonego przez wapienie, margle i iłowce jury górnej (Balińska-Wuttke 1961).

W dolinie Rawki i Rylki w wyniku denudacji osadów zlodowacenia środkowopolskiego, miąższość czwartorzędowej pokrywy jest najmniejsza i wynosi w miejscowości Byliny zaledwie 11 m. Odsłonięte na skutek erozji rzeki osady czwartorzędowe występują na wysokich krawędziach doliny Rawki w miejscowościach: Doleck, Kamion, Kurzeszyn oraz koło Rawy Mazowieckiej.

Lencewicz (1927) określił Wysoczyznę Rawską jako równinę zbudowaną z moren dennych, porożcinaną licznymi rzekami z najwyższym punktem 210 m n.p.m. w okolicach Mszczonowa. Ta rozległa, lekko falista, często zdenudowana równina moreny dennej, urozmaicona jest łańcuchami moren czołowych.

Balińska-Wuttke (1965) wyróżnia w osadach czwartorzędowych tego obszaru trzy poziomy glin zwałowych. Poziom najniższy, dwu- lub trójwarstwowy, autorka zalicza do zlodowacenia południowopolskiego. Jednolity poziom wyższy został uznany za reprezentujący stadiał najstarszego zlodowacenia środkowopolskiego. Poziom najwyższy, najczęściej dwudzielny, zaliczony jest do stadium Warty zlodowacenia środkowopolskiego.

W okresie stadiału Warty (stadiału mazowiecko-podlaskiego) rozpoczęło się formowanie rzeźby terenu, kontynuowane podczas ustępowania zlodowacenia środkowopolskiego. Kształtowanie się dolin miało miejsce w interglacjale eemskim oraz podczas zlodowacenia północnopolskiego. Pierwszym obszarem, którego powierzchnia została ukształtowana w wyniku akumulacji topniejącego lądolodu, w czasie ustępowania zlodowacenia środkowopolskiego, były moreny żelechlińskie. W następnym etapie tworzyła się powierzchnia równinnej i falistej moreny Wysoczyzny Rawskiej (Balińska-Wuttke 1960). Różycki (1972) wyróżnił na tym obszarze trzy glacyfazy: Nowego Miasta. Grójca i Mszczonowa oraz odpowiadające tym glacyfazom strefy akumulacji czołowo-morenowej. Od Żelechlinka przez Cielądz, Żdżary i w kierunku Mogielnicy przebiega główne pasmo moren glacyfazy Nowego Miasta. Największe wzgórza występują koło Żelechlinka. Moreny żelechlińskie, ciągnące się wzdłuż linii Żelechlinek – Bukowiec – Czerwonka – Podkonice – Ossowice, wyznaczają granicę zasięgu stadiału warciańskiego (Klatkova 1972). Formą, kończącą na wschodzie ciąg tych moren jest oz Rylska. Pagórki ozowe występują także w pobliżu miejscowości: Byliny, Gutkowice, Małgorzatów (Balińska-Wuttke 1960). Szereg niewielkich wzgórz o charakterze ozu stwierdzono w okolicach wsi Złota. Między Złotą a Głuchowem znajdują się także skupienia wzgórz kemowych. Bardziej na południe, na linii Węgrzynowice, Czerniewice, Bieliny i Nowe Miasto ciągnie się niższe pasmo pagórków morenowych, określające najdalszy zasięg glacystadiału Warty. W strefie moren glacyfazy Grójca stwierdzono również szereg dobrze rozwiniętych ozów, występujących w okolicach Grójca i Zalesia. Strefa morenowa tej glacyfazy ujawnia się także w rejonie Białej Rawskiej. Zasięg glacyfazy Mszczonowa wyznaczają niewielkie moreny położone między Adamowicami i Tarczynem. Między poszczególnymi strefami morenowymi rozciąga się

falista równina, zbudowana z gliny zwałowej urozmaicona nielicznymi, zwirowymi pagórkami.

W interstadiale, po ustąpieniu starszego stadium zlodowacenia środkowopolskiego, następowała denudacja i przemywanie powierzchni gliny zwałowej przez wody płynące. W wyniku erozji powstały szerokie doliny, którymi spływały wody polodowcowe i które następnie zostały wykorzystane przez współczesną sieć rzeczną Rawki i Skierniewki (Balińska-Wuttke 1960).

Część Wysoczyzny Rawskiej położona na wschód od doliny Rawki i na północ od linii Rawa-Babisk – Biała Rawska – Mogielnica, to płaska lub lekko falista wysoczyzna gliny zwałowej, porozcinana dolinami: Białki, Chojnatki, Jeziorki, Mogielanki. Między Jeruzalem, Wolą Pękoszewską i Korabiewiczami występuje wyżyna falista, związana genetycznie z morenami faz postojowych lodowca. W krajobrazie tego terenu, na północ od rzeki Chojnatki, wyraźnie zaznaczają się wzgórza, stanowiące strefę moren mszczonowskich. Między Cielądzem a Rylskiem na długości 4 km ciągnie się oz Rylska, będący jedną z ciekawszych form faz postojowych lodowca. W okolicach wsi Budy Chojnackie występuje niewielkie wzgórze kemowe.

1.3. SIĘĆ RZECZNA

Wysoczyzna Rawska leży w dorzeczu dwu dopływów Wisły: Bzury (przez Rawkę) i Pilicy. Część wschodnia badanego terenu należy do dorzecza Pilicy, natomiast część zachodnia znajduje się w dorzeczu Rawki. Z północy na południe przechodzi przez Wysoczyznę wododział Pilicy i Bzury. W okolicach Rylska i Gortatowic zmienia on kierunek na zachodni. Należy zaznaczyć, że większa część badanego obszaru znajduje się w dorzeczu Rawki, największego dopływu Bzury (ryc. 2).

Rawka zmienia kierunek na północno-wschodni. Po przyjęciu w Rawie w górnym swym biegu płynie z zachodu na wschód, zbierając wody spływające małymi ciekami z przyległych terenów. Przed Rawą Mazowiecką, w okolicach wsi Garłów, wpada do Rawki dość duży jej dopływ Krzemionka, Rawka zmienia kierunek na północno-wschodni. Po przyjęciu w Rawie drugiego, większego, prawobrzeżnego dopływu – Rylki, płynie już zdecydowanie na północ aż do ujścia. Rylka, Białka i Chojnatka, płynące ze wschodu na zachód, kolejno zasilają wody Rawki. Chojnatka, przepływająca między innymi przez wyraźnie sfałdowany teren okolic Kowies, Woli Pękoszewskiej i Jeruzala, ma w tym miejscu całą sieć mniejszych dopływów meandrujących między wyniosłościami. Należy dodać, że największe dopływy Rawki, a mianowicie: Rylka, Białka i Chojnatka, odprowadzają większość wód z Wysoczyzny i w porównaniu z nimi dopływy lewobrzeżne tej rzeki są bardzo małymi ciekami.

W strefie przełomu przez północną krawędź Wysoczyzny Rawka posiada dolinę dość głęboko wciętą. W kilku miejscach, zwłaszcza w jej środkowym biegu, obserwować można strome stoki doliny o znacznych wysokościach.

Ryc. 2. Ukształtowanie powierzchni i sieć rzeczna
Fig. 2. Surface formation and river network

Rawka należy do nielicznych rzek, których koryto nie było regulowane. Płynie tworząc liczne zakola, najczęstsze na odcinku między Rawą Mazowiecką a Doleckiem. Jedynie w górnym biegu, w okolicy wsi Józefin, przeprowadzona była na kilkukilometrowym odcinku regulacja koryta Rawki.

Dolinie Rawki towarzyszą często źródła i wysięki (Balińska-Wuttke 1960). Najczęściej źródła takie spotyka się powyżej Rawy Mazowieckiej, w okolicach wsi: Łochówek, Trojanów, Psianogi, Radwanka, Byliny. Na północ od Rawy podobne źródła występują koło wsi: Ścieki, Moczydła, Wałowice, Gaj oraz między Żydomicami a Kurzeszynem po wschodniej stronie rzeki.

W dorzeczu Rawki spotyka się kilka kompleksów stawów do hodowli ryb. Dość duże stawy znajdują się między Bylinami a Łochowem. Liczne, duże stawy zgrupowane są nad Białką w Białej Rawskiej, mniejsze znajdują się we wsi Ossowice nad Rylką. Również w pobliżu Nowego Miasta n. Pilicą, we wsi Gostomia, skupione są duże stawy o powierzchni 140 ha (Żmudziński 1965). Przepływa przez nie rzeczka Lubanka, wpadająca do Pilicy.

Największą rzeką, odprowadzającą wody ze wschodniej części Wysoczyzny, jest Mogielanka. Ma ona swe źródła w pobliżu wsi Uciąchy. Płynie następnie przez Wilków, Błędów i Mogielnicę zmieniając kilkakrotnie kierunek i zbierając wody z mniejszych cieków. Do Pilicy wpada w pobliżu wsi Osuchów. Płynąca z zachodu na wschód Jeziorka odprowadza wody z północno-wschodniej części badanego obszaru wprost do Wisły. Na północnych krańcach Wysoczyzny biorą swój początek mniejsze rzeki, do których należą: Tarczynka – dopływ Jeziorki, Pisia, Utrata i Sucha – dopływy Bzury, Korabiewka – dopływ Rawki.

Wysoczyzna Rawska stanowi węzeł hydrograficzny, z którego biorą początek liczne rzeki, spływające promieniście we wszystkich kierunkach (ryc. 2). Środkiem tego węzła jest najwyższy punkt Wysoczyzny, w okolicach wsi Osuchów, położony na wysokości 210 m n.p.m. Badany obszar jest „blokiem wysoczyznowym” wyraźnie wyniesionym w stosunku do terenów sąsiadujących. Różnice wysokości między najwyższym położonym punktem a dolinami rzek oraz najbliższymi regionami są znaczne. I tak: Rawka płynie tu na wysokości od 140 do 117 m n.p.m., Pilica – od 138 do 120 m n.p.m. Najbliżej położone kulminacje terenu, w mezoregionach sąsiadujących z Wysoczyzną wynoszą: na Wzniesieniach Łódzkich – 160 i 180 m n.p.m., w Dolinie Białobrzeskiej – 146 i 162 m n.p.m., w Kotlinie Warszawskiej – 106 i 128 m n.p.m.

1.4. GLEBY

Gleby na obszarze Wysoczyzny Rawskiej powstały na utworach dyluwialnych. Ich ogólny opis przedstawiono w oparciu o mapę glebowo-rolniczą, opracowaną w Zakładzie Gleboznawstwa i Kartografii Gleb IUNG w Puławach (ryc. 3).

Ryc. 3. Mapa gleb (wg mapy glebowo-rolniczej IUNG w Puławach)

Typy i podtypy gleb

A – gleby bielcowe i pseudobielcowe, B – gleby brunatne, AB – kompleks gleb pseudobielcowych i brunatnych, D – czarne ziemie, F – mady. Gleby hydrogeniczne: E – gleby mułowo-bagienne, M – gleby murszowe.

Rodzaje i gatunki gleb

Gleby piaszkowe: pl – piaski luźne, ps – piaski słabogliniaste, pg – piaski gliniaste, pgs – kompleks piasków słabogliniastych i gliniastych.

Gleby gliniaste: gl – gleby z glin lekkich, gs – gleby z glin średnich, ptw – gleby pyłowe.

Gatunki i rodzaje gleb wytworzonych ze skał masowych (niewapiennych): p – gleby piaszczyste, g – gleby gliniaste, pt – gleby pyłowe.

Znaki dodatkowe: lp – w podłożu zalega piasek, lg – w podłożu zalega glina.

Fig. 3. Map of soils (according to soil-agricultural map of IUNG in Puławy)

Soil types and subtypes

A – podsoils and pseudopodsoils, B – brown soils, AB – complex of pseudopodsoils and brown soils, D – black soils, F – alluvial loam.

Hydrogenic soils: E – silt-bog soils, M – muck soils.

Kinds of soils

Sandy soils: pl – loose sand, ps – slightly argillaceous sand, pg – clayey sand, pgs – complex of slightly argillaceous and clayey sands.

Clay soils: gl – light loam soils, gs – moderate loam soil, ptw – silt soil.

Species and kinds of soil from massive (noncalcium) rock: p – sandy soil, g – clayey soil, pt – silt soil.

Additional symbols: lp – sand in subsoil, lg – clay in subsoil.

Zdecydowaną większość gleb badanego terenu stanowią gleby bielcowe i pseudobielcowe. Zajmują one obszar między Nowym Miastem, Białą Rawską, Grójcem, Skierniewicami i Mszczonowem. Należy dodać, iż w okolicach Mszczonowa są to gleby gliniaste powstałe z glin lekkich, natomiast w okolicach Nowego Miasta, Grójca i Białej Rawskiej występują gleby pyłowe, zalegające na glinie. Na niewielkiej powierzchni między Rawą Mazowiecką a Nowym Miastem oraz w okolicach Skierniewic spotyka się piaski luźne lub słabogliniaste, często z dużą domieszką pyłów.

Na Wysoczyźnie Rawskiej dość często występują gleby piaskowe o nie-zdecydowanym typie, tzw. kompleks gleb bielcowych i brunatnych (AB), z licznymi wkładkami o składzie mechanicznym pyłów lub glin lekkich pylastych. I tak: w okolicach Grójca, Mszczonowa i Nowego Miasta spotykane są piaski gliniaste i słabogliniaste, zalegające na różnym podłożu, najczęściej na glinie, natomiast między Rawą Mazowiecką a Skierniewicami oraz między Rawą Mazowiecką a Nowym Miastem występują piaski luźne lub słabogliniaste całkowite.

Niewielką powierzchnię w okolicach Babska i Białej Rawskiej oraz między Nowym Miastem a Rawą Mazowiecką zajmują gleby brunatne wylugowane, wytworzone z pyłów, zalegające na glinie lub na piaskach.

Bardzo rzadko występują w badanym terenie czarne ziemie. Małe płyty tych gleb, wytworzone z glin lekkich lub średnich, rzadziej z piasków gliniastych, spotyka się w okolicach Grójca, Skierniewic oraz w dolinie Białki.

W dolinie Pilicy występują gleby aluwialne (mady) o różnym składzie mechanicznym, a na terenach bezodpływowych gleby mułowo-torfowe. Natomiast w dolinie Rawki, jak również mniejszych rzek i cieków, występują gleby hydrogeniczno-torfowe, mułowo-torfowe i murszowe, rzadziej mady.

1.5. KLIMAT

Obszar Wysoczyzny Rawskiej należy według Romera (1949) do klimatycznej dzielnicy warszawskiej i krainy wielkich dolin.

Na badanym terenie, podobnie jak na całym obszarze Polski środkowej, brak jest odpowiedniej liczby stacji meteorologicznych a w związku z tym i materiałów obserwacyjnych. Z tego względu klimat tego regionu był do niedawna przedstawiany w sposób ogólny i niepełny. Dokładniejszych danych dostarczają prace Dubaniewicza i in. (1971) i Dubaniewicza (1974). Klimat Wysoczyzny Rawskiej scharakteryzowano w oparciu o te opracowania. Większość danych klimatycznych pochodzi ze stacji meteorologicznych w Skierniewicach i Nowym Mieście n. Pilicą.

Na obszarze Wysoczyzny przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Różne wiatrów dla stacji w Skierniewicach, Nowym Mieście, i Rawie Mazowieckiej dowodzą, że częste na tym terenie są także wiatry z kierunków południowo-wschodnich i południowych.

Wartości wskaźnika termicznego na badanym obszarze wynoszą 23,0-23,3°C. Wskaźnik termiczny jest to według Dubaniewicza (1972, 1974) suma trzech wartości: średniej rocznej temperatury powietrza, średniej miesięcznej temperatury powietrza miesiąca najchłodniejszego, średniej miesięcznej temperatury powietrza miesiąca najcieplejszego. Przez teren Wysoczyzny Rawskiej przebiega izoterma roczna 7,7°C. Na bezpośrednio przyległych do Wysoczyzny Wzniesieniach Łódzkich średnie roczne temperatury są niższe (7,5-7,6°C).

Tabela I – Table I

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w okresie 1951-1960 (wg Dubaniewicza 1974)

Mean monthly and annual air temperatures in the period 1951-1960 (after Dubaniewicz 1974)

Miejscowość Locality	I Jan	II Feb	III March	IV Apr	V May	VI June	VII July	VIII Aug	IX Sept	X Oct	XI Nov	XII Dec	Rok Year
Nowe Miasto	-2,6	-3,3	0,5	7,2	12,4	17,0	18,6	17,7	13,2	8,2	3,0	0,3	7,7
Skierniewice	-2,3	-3,2	0,6	7,0	12,7	16,9	18,4	17,7	13,2	8,3	3,1	0,6	7,7

Wysoczyzna Rawska leży w „cieniu opadowym” wyżynnego półwyspu Wzniesień Łódzkich (Dubaniewicz 1974), między izohietą 550 mm a 500 mm. Stwierdzono tu bardzo małe wielkości sum rocznych opadów atmosferycznych w porównaniu z terenami położonymi na południe i południowy zachód od Wysoczyzny. Tendencja do zmniejszania się ilości opadów ma kierunek wschodni, do doliny Wisły.

Tabela II – Table II

Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych za okres 1954-1964 dla wybranych miejscowości z terenu Wysoczyzny Rawskiej (wg Dubaniewicza 1974)

Mean annual precipitation in period 1954-1964 in some chosen localities on the territory of the Rawa Upland (after Dubaniewicz 1974)

Miejscowość Locality	mm
Białobrzegi	502
Brzostowiec	539
Nowe Miasto	550
Rzeczyca	535
Skierniewice	485
Żdźary	508

Okres wegetacyjny na badanym terenie trwa 205-210 dni, rozpoczyna się przed 25 marca, a kończy między 15 i 20 października (Dubaniewicz 1974).

Tabela III – Table III

Daty początku i końca oraz długości trwania okresu wegetacyjnego obliczonego na podstawie wartości progowych 5°C i 3°C, 1951-1960 (wg Dubaniewicza 1974)

Dates of beginning, end and duration of vegetation period calculated on the basis of threshold values 5°C and 3°C, 1951-1960 (after Dubaniewicz 1974)

Miejscowość Locality	Okres wegetacyjny – Vegetation period							
	„próg” 5°C „threshold” 5°C			„próg” 3°C „threshold” 3°C			różnica w datach między „progami” (dni) difference in dates between „thresholds” (days)	
	początek beginning	koniec end	długość trwania duration	początek beginning	koniec end	długość trwania duration	początek beginning	koniec end
Nowe Miasto	6 IV	3 XI	211	27 III	15 XI	233	10	12
	6 Apr	3 Nov	211	27 March	15 Nov	233	10	12
Skierniewice	7 IV	4 XI	211	28 III	16 XI	233	10	12
	7 Apr	4 Nov	211	28 March	16 Nov	233	10	12

2. ZARYS HISTORII GOSPODARCZEJ LASÓW BADANEGO TERENU

Zarówno o powierzchni zajmowanej obecnie przez lasy, jak i o stanie zachowania istniejących zbiorowisk leśnych, zadecydowała trwająca od kilku tysięcy lat działalność człowieka.

Najstarsze ślady osadnictwa znane są na Wysoczyźnie Rawskiej ze wsi Ginetówka. Znalezione tam paciorki i bransolety brązowe pochodzą z wczesnej epoki żelaza tj. około VII-V w. p.n.e. (Żmudziński 1965). We wsi Zawady odkryto cmentarzysko z tzw. okresu kultury łużyckiej. Z tego samego okresu pochodzi cmentarzysko z 60 grobami tzw. popielnicowymi z Podkonic koło Rawy Mazowieckiej (Chłudziński i in. 1961). Osadę z III-IV w. n.e. znaleziono we wsi Otałążka. W okolicach Rawy Mazowieckiej stwierdzono ośrodek starego osadnictwa, trzy grodziska pierścieniowe i trzy stożkowe oraz kilka osad z III okresu wczesnohistorycznego (Dylik 1971). W tych czasach Wysocznę Rawską porastały bez wątpienia rozległe puszcze a użytkowanie lasu przez człowieka miało charakter lokalny i niewielkie rozmiary. W wiekach późniejszych, wraz z rozszerzaniem się osadnictwa, wzmożło się trzebieenie lasów i ich penetracja.

Oprócz Rawy, grodem istniejącym już w pierwszych wiekach czasów historycznych był Grodziec, obecny Grójec (Buczek 1960). Okolice Grójca, o żyznych ziemiach, od początku dziejów Mazowsza należały do najgęściej zaludnionych terenów. Istniały tu skupienia osadnictwa rolnego jeszcze przed XIII wiekiem (Dobrowolska 1961).

W XII i XIII w. Grójec i Rawa są najważniejszymi miastami południo-

wego Mazowsza. Przechodziły tędy ważne szlaki komunikacyjne. Rozwój osadnictwa dokonywał się kosztem lasów, które były coraz intensywniej karczowane. Oprócz łągów w dolinach rzek i grądów, niszczone były świetliste dąbrowy na terenach wysoczyznowych. Były to zbiorowiska dostępne, łatwe do trzebieży a jednocześnie dostarczały dębowego drewna, odpowiedniego na budulec i inne wyroby. Wzmoczenie osadnictwa oraz rozwój uprawy roli były przyczyną powstania wyrw w pierwotnej szacie leśnej Wysoczyzny. Nie były one jednak w tym czasie zbyt duże, skoro Połujański (1854), pisząc o wieku XIII wspomina iż wtedy „...Mazowsze w większej części pokryte było lasem, gdzie książęta świetnie odbywali łowy na tury, łosie, niedźwiedzie...”.

Wraz z rozwojem gospodarki towarowej i rzemiosła w miastach wzrosło zapotrzebowanie na drewno, węgiel drzewny, smołę i inne produkty leśne. Wielcy właściciele ziemscy zachęcali ludność do osiedlania się i trzebieżenia lasów, widząc w tym zyski dla siebie. Osiedlającym się udzielano tzw. wolnizny lub woli, czyli zwolnienia od świadczeń na rzecz pana w określonym czasie (Dembińska 1967). Z tego okresu jak i czasów późniejszych pochodzą nazwy wsi typu Wola i Wólka. Miejscowości z tego rodzaju nazwami jest na Wysoczyźnie Rawskiej dużo, około 21, np.: Wola Chojnata, Wola Pękoszewska, Wola Pobiedzińska, Wólka Lesiewska, Wólka Gostomska.

Rawa była początkowo grodem myśliwskim, następnie od połowy XIII wieku była stolicą jednej z linii książąt mazowieckich. Po roku 1462, po przyłączeniu do Korony, stała się stolicą województwa rawskiego.

W wieku XIV i XV następuje okres wzmożonej ekspansji na obszary leśne, związany z rozwojem wsi i miast. Wykarczowano w tym czasie dąbrowy w pradolinie Bzury oraz na znacznych powierzchniach Wysoczyzny (Dobrowolska 1961). Prawa miejskie uzyskały na tym terenie w XIV i XV wieku: Mogielnica, Grójec, Tarczyn, Nowe Miasto n. Pilicą. Do końca XIV wieku, oprócz powstałych miast, znanych było na tym terenie szereg miejscowości jak: Boguszyce, Chociw, Głuchów, Kanice, Kawęczyn, Kurzeszyn, Niwna, Rogowiec, Wale, Żydomice i inne (Dylik 1948). Ilość miejscowości, które znane były z kolei w XV i XVI wieku jest zbliżona do ilości wsi znanych do końca XIV wieku. Jeśli w ciągu dwóch stuleci ilość miejscowości wzrosła o 100%, znaczy to, iż osadnictwo intensywnie się w tym czasie rozwijało. Wśród nazw jest wiele takich, które mogą być świadectwem tego, że wsie i osiedla powstawały na terenach wydartych lasom i jednocześnie mówią o składzie gatunkowym drzewostanów na tym obszarze. Należy tu wymienić takie nazwy jak: Łęg, Łęgonice, Łochówek, Zalesie, Młodrzewek, Dąbrowa, Lipie, Gaj, Pniewy, Dąbrówka i inne.

W XV wieku następuje dalsze zubożenie zasobów leśnych. Złożyło się na to szereg przyczyn a mianowicie: otwarcie drogi do morza i związany z tym handel drewnem, spławianym do Gdańska, rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej oraz dalsze rozszerzanie na Mazowszu sieci osadniczej. W XVI wieku handel towarami leśnymi ma miejsce w całym

dorzeczu Wisły, a najwcześniej do handlu gdańskiego przystąpiły ziemie plocka i rawska (Obuchowska-Pysiowa 1964). Mazowsze w tym czasie odgrywało w handlu centralną rolę. W handlu drewnem uczestniczyli między innymi dzierżawcy dóbr królewskich. Trzebiłł lasy i sprzedając drewno czerpali dla siebie zyski. W 1564 r. lustratorzy królewscy województwa rawskiego stwierdzili, że Anzelm Gostomski, starosta rawski, pustoszył w celach handlowych lasy we wsi Regnów, czasowo przez niego dzierżawione (Broda 1965).

Najbardziej pożądanym gatunkiem drewna, zarówno w handlu jak i do miejscowego użytku, był dąb. Toteż w lasach było go coraz mniej, podobnie jak i innych gatunków liściastych. Jedną z najbardziej wyniszczających form eksploatacji lasu było wypalanie popiołów. Użytkowanie lasu nie ograniczało się do trzebieży oraz płdrowniczego wycinania co cenniejszych drzew. Do ogólnej degeneracji zbiorowisk leśnych przyczyniały się także różne formy użytkowania runa leśnego jak np. wypas zwierząt w lasach, grabienie ściółki, pozyskiwanie łyka, zbiór żołądzi.

Mimo znacznego uszczuplenia powierzchni leśnej na Wysoczyźnie w XVI wieku, znaczne obszary były jeszcze zajęte przez puszcze z naturalnymi drzewostanami. Świadczy o tym notatka z lustracji przeprowadzonej w 1564 roku na obszarze puszczy, wchodzącej w skład dzierżawy Nowe Miasto: „...jest też leśnego drzewa dosyć, dębiny, grabiny, olszyny, lipiny” (Heymanowski 1970). Natomiast w pobliżu osiedli lasy były albo zupełnie wycięte, lub też były zmienione, zdegenerowane, bez dorodnych dębów, lip i klonów. O stanie lasów w dolinie Rawki w XVII wieku świadczą wzmianki o niektórych miejscowościach z województwa rawskiego, zawarte w lustracjach dóbr królewskich z tego okresu. Mówią one, iż w okolicach wsi Księża Wola, Stara Rawa czy Nowy Dwór występują tylko bory lub „chrusty”, w których brak drzew nadających się na budulec.

Do ogromnej dewastacji lasów przyczynili się w XVIII wieku budnicy (Heymanowski 1969). Siedziby swoje budowali w głębi puszczy. W sposób płdrowniczy wycinali najokazalsze drzewa liściaste jak dęby, jesiony, lipy, graby czy wiązy, a następnie zamieniali je na popiół, potaż, smołę, klepki, węgiel drzewny. Połujański (1854) pisał wręcz, że budnicy „...słyneli w kraju z umiejętności niszczenia lasów”. Świadectwem pobytu budników na terenach Wysoczyzny są też nazwy topograficzne miejscowości: Budy Chojnackie, Budy Strzybowskie, Budki Petrykoskie.

W XVIII wieku rozwija się także przemysł tartaczny. O budowie tartaku w dzierżawie Budziszew w województwie rawskim w 1772 roku wspomina Heymanowski (1970).

Dalszy rozwój uprzemysłowienia kraju, komunikacji, a następnie pełny rozwój gospodarki kapitalistycznej oraz obszarnczego rolnictwa – to były czynniki, decydujące o ogromnym wzroście zapotrzebowania na drewno w XIX wieku. Wyręby lasów w tym okresie przybrały wielkie rozmiary (Kornaś 1959). Powierzchnia leśna uległa dalszemu, wyraźnemu zmniejszeniu.

W efekcie lasy zostały zepchnięte na najgorsze siedliska, zwykle nieprzydatne dla rolnictwa.

Gospodarka leśna wprowadza w tym czasie metody zrębowe oraz sztuczne odnowienia. Już wtedy drzewostany sosnowe zajmowały 80% powierzchni leśnej (Żabko-Potopowicz 1965). W lasach prywatnych, stanowiących w I połowie XIX wieku 72,5% ogólnej powierzchni, w dalszym ciągu trwała płądrownicza eksploatacja, a właściciele nie wykazywali dbałości o stan lasów. Wśród lasów prywatnych w powiecie rawskim były w tym okresie urządzone tylko cztery kompleksy: Babsk, Sadkowice, Trębaczew, Żdżary. Natomiast 11 było przeznaczonych do urządzania i aż 58 kompleksów były to lasy prywatne, w których gospodarowano bezplanowo (Połujański 1854).

Lasy na terenie Wysoczyzny Rawskiej były już w XIX wieku bardzo rozdrobnione. W tym czasie funkcjonowały różnego rodzaju zakłady, jak potażarnie, popielarnie i huty, o dużym zapotrzebowaniu na drewno. W dobrach Osuchów była huta szkła, w Woli Naropińskiej papiernia. Wskaźnikiem istnienia tego typu zakładu są również nazwy topograficzne miejscowości: Huta Zawadzka, Huta Wałowska, Huta Błędowska, Papiernia, Tartaczek. Z kolei w Grójcu i Mogielnicy odbywał się niemały handel drewnem.

O tym jak ogromnemu wylesieniu uległ badany obszar w XIX wieku świadczą następujące dane: w 1909 roku lesistość dla powiatu Rawa Mazowiecka wynosiła 14,6% a dla powiatu Grójec 12,1% (Żabko-Potopowicz 1965). Zmiany zalesienia na terenie województwa łódzkiego w okresie od końca XVIII wieku do czasów obecnych przedstawiła Pietrzak (1971). Dla zobrazowania zmian powierzchni zajmowanej przez lasy, w części byłego województwa łódzkiego, znajdującej się w obrębie Wysoczyzny Rawskiej, cytuję za Pietrzak (1971) dane dla byłych powiatów: rawskiego i skierniewickiego.

- Na podstawie mapy zdjęcia pruskiego z 1796-1802 r. lasy w powiecie rawskim zajmowały 37,0% powierzchni, w powiecie skierniewickim 37,5%.

- Według mapy Gilly'ego „Spezialkarte von Südpreussen” z lat 1802-1803, lesistość powiatu rawskiego wynosiła 33,8%, skierniewickiego – 37%.

- Według mapy topograficznej Królestwa Polskiego tzw. „kwatremistrzostwa” z lat 1822-1839, powiat rawski należał w owym czasie do najlepiej zalesionych, lasy zajmowały tu 30,4% natomiast w powiecie skierniewickim 23,1%.

- Na podstawie mapy niemieckiej „Karte des Westlichen Russlands” z lat 1911-1921, lasy stanowiły w powiecie rawskim tylko 16,2% powierzchni, a w skierniewickim 13,4%. Tak więc w XIX wieku wyrąbano i wykarczowano połowę istniejących lasów.

- Według map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 1929-1938, lesistość powiatu rawskiego wynosiła zaledwie 13,9%, skierniewickiego – 11,2%.

W roku 1968 lasy zajmują na terenie powiatu rawskiego 20,3%, skierniewickiego – 17,1% (dane WUS w Łodzi).

Powyższe dane obrazują ciągle postępujące rugowanie lasów, trwające aż do lat międzywojennych. Wyrąbane zostały dąbrowy i grądy zajmujące największą powierzchnię Wysoczyzny, nie oszczędzono też borów mieszanych.

Powierzchnia lasów uległa w ostatnich latach zwiększeniu po zalesieniach nieużytków i ubogich gleb rolniczych. Te sadzone lasy to monokultury sosny, tworzące antropogeniczne fitocenozy leśne. „I oto na miejsce naturalnych mieszanych lasów, zaczęły wyrastać pierwotnie piękne młodniki jednogatunkowe sosny, które zajęły nieodpowiednie dla nich siedliska” (Stecki 1935). „...siedliska nadające się pod uprawy dębowe przeznaczone były pod zagospodarowanie sosną pospolitą, jako jedną z najładniejszych i najtańszych upraw...” (Matuszewski 1929). Metody gospodarki leśnej wprowadzone na początku XIX wieku, polegające na zrębach i sztucznych odnowieniach, wyjaśniają genezę zdegenerowanych, współczesnych zbiorowisk leśnych (Olaczek 1972) na Wysoczyźnie, podobnie jak na innych obszarach kraju. Szybko rosnące i łatwe w uprawie nasadzenia sosny były i są do dziś protegowane w gospodarce leśnej, zarówno ze względów technicznych jak i ekonomicznych. W rezultacie, w zbiorowiskach grądowych, w świetlistej dąbrowie oraz w borach mieszanych, na badanym terenie, sosna jest gatunkiem panującym w drzewostanie.

Tak więc, odwiecznie trwająca i nasilająca się z czasem działalność człowieka sprawiła, że zmieniła się nie tylko powierzchnia zajmowana przez lasy, ale również ich struktura i skład florystyczny.

3. METODY PRACY I OBJAŚNIENIE UŻYWANYCH SKRÓTÓW

Badania terenowe prowadzono w latach 1970-1974. Polegały one na wykonywaniu zdjęć fitosocjologicznych, zbieraniu materiałów zielnikowych i obserwacjach florystycznych badanych zbiorowisk. Poza tym w czasie prac terenowych czyniono notatki odnoszące się do: ogólnej fizjonomii zbiorowisk oraz ich struktury, warunków ekologicznych, aktualnie prowadzonych zabiegów gospodarczych lub form użytkowania lasu, stopnia rozwoju poszczególnych warstw oraz wieku i dynamiki rozwojowej drzewostanu. Zdjęcia fitosocjologiczne wykonywano metodą Braun-Blanqueta (Pawłowski 1972). Zwracano uwagę na jednorodność płatów oraz ich reprezentatywność dla większych powierzchni fitocenozy. Starano się także objąć badaniami płaty zbiorowisk, położone blisko siebie, w tych samych kompleksach leśnych, w tych samych warunkach siedliskowych, lecz w różnym stopniu zniekształcone, tworzące tzw. szeregi degeneracyjne (Olaczek 1972).

Badaniami objęto ogółem 45 kompleksów leśnych (ryc. 4). Większość z nich to lasy państwowe, wchodzące w skład nadleśnictw : Rawa Mazowiecka, Grójec, Radziwiłłów, Skuły, Białobrzegi.

Wykonano w terenie 424 zdjęcia fitosocjologiczne, z których 264 zostały

Ryc. 4. Rozmieszczenie zbadanych kompleksów leśnych

1 – granice Wysoczyzny Rawskiej według Kondrackiego (1968)

Fig. 4. Distribution of studied forest complexes

1 – boundaries of Rawa Upland according to Kondracki (1968)

umieszczone w tabelach. Po opracowaniu materiałów zielnikowych przystąpiono do zestawiania zdjęć w tabele, uwzględniając przy tym największe podobieństwo florystyczne oraz dodatkowe informacje zebrane w terenie.

Przy zestawianiu i porządkowaniu grup zdjęć, reprezentujących bardziej zniekształcone płaty zbiorowisk, zastosowano metody matematyczne. Przy użyciu komputera zostały wykonane obliczenia współczynników podobieństwa

zdjęć w oparciu o wzór Jaccarda:
$$W_{(A, B)} = \frac{c}{a + b + c} \cdot 100$$
, gdzie: a – cechy zbioru A, b – cechy zbioru B, c – cechy wspólne zbiorów A i B. Sposób wykorzystania tego wzoru wraz z rozwinięciem i interpretacją omawia praca Olaczka (1972).

Drugim etapem obliczeń matematycznych było liniowe uporządkowanie zdjęć fitosocjologicznych przez maszynę cyfrową, według najwyższych wartości współczynników podobieństwa. Uporządkowanie zostało dokonane przy użyciu wzoru, opracowanego przez prof. dra hab. J. Ławrynowicza.

Wyniki obliczeń posłużyły do uporządkowania trzech tabel roboczych, reprezentujących silnie zniekształcone, zdegenerowane, trudne do rozgraniczenia zbiorowiska. Tabele te zawierały łącznie 130 zdjęć fitosocjologicznych. Zastosowanie metod matematycznych pozwoliło na, w miarę dokładne i obiektywne, wydzielenie i uporządkowanie grup zdjęć, reprezentujących postaci degeneracyjne zbiorowisk: grądu typowego, dąbrowy świetlistej i boru mieszanego.

W opisach antropogenicznych zniekształceń zbiorowisk leśnych przyjęto za Olaczkiem (1972) nazwy form degeneracji, a mianowicie: monotypizacja, pinetyzacja, neofityzacja, fruticetyzacja, cespityzacja.

Podstawą do określenia wieku drzewostanów w poszczególnych płatach były mapy drzewostanowe, w konfrontacji z własnymi obserwacjami. Do wieku drzewostanu podanego na mapie, dodawano różnicę lat między rokiem wydania mapy a datą wykonania zdjęcia fitosocjologicznego. Wykorzystano mapy drzewostanowe w skali 1:20 000 następujących nadleśnictw: Rawa Mazowiecka (1968), Grójec (1967), Skuły (1967), Radziwiłłów (1959), Białobrzegi (1963).

Objaśnienia skrótów przyjętych w tabelach fitosocjologicznych

- Aln – *Alnetea glutinosae*
- AP – *Alno-Padion*
- Art – *Artemisietea*
- FB – *Festuco-Brometea*
- MA – *Molinio-Arrhenatheretea*
- NC – *Nardo-Callunetea*
- QF – *Quercu-Fagetea*
- Qrp – *Quercetia robori-petraeae*
- Phr – *Phragmitetea*
- SS – *Sedo-Scleranthetea*
- VP – *Vaccinio-Piceetea*

- Klasa: *Quercus-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger 1937
 Rząd: *Fagetalia silvaticae* Pawł. 1928
 Związek: *Alno-Padion* (Knapp 1942) em. Medw.-Korn. ap. Mat. et Bor. 1957
 Zespół: *Poo trivialis-Alnetum* Olaczek 1972
 Zespół: *Fraxino-Alnetum* Mat. 1952
 Związek: *Carpinion betuli* Oberd. 1953
 Zespół: *Tilio-Carpinetum* Tracz. 1962
 odmiana geograficzna mazowiecka
 Podzespół: *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae* Tx. 1937
 Podzespół: *Tilio-Carpinetum typicum* Tx. 1937
 Postać degeneracyjna z *Larix polonica*
 Postać degeneracyjna z *Pinus silvestris*
 Zdegenerowany grąd typowy
 Rząd: *Quercetalia pubescentis* Br.-Bl. 1931
 Związek: *Quercion pubescenti-petraeae* Br.-Bl. 1931
 Zespół: *Potentillo albae-Quercetum* Libb. 1933
 Podzespół: *Potentillo albae-Quercetum typicum* A. i W. Mat. 1956
 Podzespół: *Potentillo albae-Quercetum poëtosum* Sokoł. 1963
 Dąbrowa świetlista w zaawansowanym stadium degeneracji
 Chojniak sosnowy na siedlisku dąbrowy świetlistej
 Klasa: *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. 1939
 Rząd: *Vaccinio-Piceetalia* Br.-Bl. 1939
 Związek: *Dicrano-Pinion* Libb. 1933
 Zespół: *Pino-Quercetum* Kozł. 1925
 Chojniak sosnowy na siedlisku boru mieszanego
 Zespół: *Peucedano-Pinetum* Mat. (1962) 1974
 Podzespół: *Peucedano-Pinetum typicum*
 Chojniak sosnowy z murawą kserotermiczną

4.1. *CARICI ELONGATAE-ALNETUM*. OLS -- TABELA IV

Zespół olsu na Wysoczyźnie Rawskiej występuje rzadko i zajmuje bardzo małą powierzchnię. Niewielkie jego płaty spotyka się w dolinach Rawki i Pilicy, jak również niektórych mniejszych cieków. Nieliczne i małe są również lokalne, bezodpływowe obniżenia terenowe. Pojedyncze płaty stwierdzono w uroczyskach: Wale, Rawski Las (ndl. Rawa Mazowiecka), Świdno (ndl. Grójec), Głuchów (Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie), Las Jeruzalski (nadm. Radziwiłłów). Na gruntach prywatnych ols występuje w miejscowościach: Jajkowie, Kurzeszyn (woj. skierniewickie), Trzylatków (woj. radomskie).

Carici elongatae-Alnetum występuje na glebach mułowo-bagiennych i murszowych. Są to siedliska o dużej wilgotności, gdzie woda stagnuje przez większą część roku. Odczyn gleby jest obojętny lub słabo kwaśny.

Ols, w porównaniu z innymi zbiorowiskami leśnymi, posiada specyficzną fizjonomię. Dno lasu jest zbudowane z kęp i dolinek, które decydują o mozaikowym charakterze runa. Na badanym terenie, budowa ta nie we wszystkich płatach zespołu zaznacza się jednakowo (fot. 2 i 3). W partiach olsu z najmłodszymi drzewostanami kępy są słabo wykształcone, nieznacznie wyniesione wokół podstawy pni drzew, a dolinki po części zarośnięte. Taki charakter posiada podzespół torfowcowy. W przypadku płatu z dominacją *Carex riparia* (zdjęcie 10) kęp brak zupełnie. W podzespole żywokostowym, gdzie drzewostany olszowe są na ogół nieco starsze, kępy są dobrze wykształcone, dolinki wypełnione wodą. Średnica kęp wynosi przeciętnie od 0,5 do 2,5 m.

Drzewostan, o dużym zwarcie koron (przeciętnie 75-80%), zbudowany jest wyłącznie z olszy czarnej. W większości są to olsze odroślowe, rzadziej pochodzące z samosiewu. Przeważają drzewostany młode, nie przekraczające 40 lat, rzadko spotykane są drzewa starsze – 60-80-letnie. W skład skąpo rozwiniętego podszycia wchodzi głównie: *Frangula alnus*, *Ribes nigrum* i *Padus avium*.

Za gatunki charakterystyczne dla zespołu uznano wg Matuszkiewicza (1967) *Carex elongata* i *Ribes nigrum*. Występują one w III klasie stałości. Większy udział w bujnie rozwiniętym runie mają gatunki charakterystyczne

Fot. 2. *Carici elongatae-Alnetum* w uroczysku Wale
Photo. 2. *Carici elongatae-Alnetum* in Wale range

Fot. 3. Ols z młodym drzewostanem odroślowym. Miejscowość Kurzeszyn k. Rawy Mazowieckiej
 Photo. 3. *Carici elongatae-Ahnetum* with young stool-shoot stand. Locality Kurzeszyn near
 Rawa Mazowiecka

Fot. J. Siciński

klasy *Ahnetea glutinosae*: *Solanum dulcamara*, *Lycopus europaeus*, występujące w V klasie stałości i ze znacznym pokryciem. Licznie reprezentowane są gatunki klas *Phragmitetea* i *Molinio-Arrhenatheretea*. Obfitość *Urtica dioica* w zdjęciach 1 i 2 jest skutkiem obniżenia poziomu wód gruntowych i przyspieszonej mineralizacji torfu. Na fakt ten zwrócił uwagę Sokołowski (1963). Warstwa mszaków jest na ogół słabo rozwinięta i ograniczona raczej do kęp. W płatach, należących do podzespołu torfowcowego, mszaków jest nieco więcej, zajmują w tym przypadku także częściowo dolinki. W całym zbiorowisku najczęściej spotykanymi gatunkami tej warstwy są: *Mnium undulatum* i *Calliergon cuspidatum*.

Eksploracja lasów olsowych jest utrudniona ze względu na ich niedostępność oraz wysoki poziom wody. Mimo to, rosnące szybko drzewostany olszowe, ulegają częstym zrębom. Na skutek tego, drzewostany w olsach badanego terenu tworzą w przeważającej części młode olsze odroślowe (fot. 3).

Podstawowym czynnikiem wywołującym zmiany degeneracyjne tej fitocenozy jest obniżenie poziomu wody, spowodowane najczęściej zabiegami melioracyjnymi. W wyniku przesuszenia górnej warstwy gleby, wzrostu jej aeracji i żyzności, następuje inwazja w zbiorowisko gatunków łąkowych, np.

Deschampsia caespitosa czy *Poa trivialis*, jak również gatunków nitrofilnych np. *Urtica dioica* (zdjęcia 1 i 2). Przemiany te powodują, iż zbiornisko nabiera charakteru przejściowego między olsem i łągiem. Zjawisko to obserwowali: Wojterski (1960), Sokołowski (1963), Rejewski (1971).

Podsumowanie wyników polskich prac fitosocjologicznych, dotyczących olsów, zostało przedstawione w pracy Matuszkiewicza i in. (1958). Autorzy stwierdzili występowanie na terenie Polski dwu odmian geograficznych olsu: *Carici elongatae-Alnetum medioeuropaeum*, występującej w Polsce zachodniej i *Carici elongatae-Alnetum dryopteridetosum cristatae*, zajmującej wschodnie obszary kraju. Mimo ukazania się w latach późniejszych wielu prac, opisujących ten zespół z całego kraju (Wojterski 1960, Denisiuk 1963, Izdebski 1963, Sokołowski 1963, 1969, 1970, Tokarz 1964, Faliński 1965, Kępczyński 1965, Fijałkowski 1966, Matuszkiewicz 1966, Mowszowicz i in. 1967, Urbanek 1966, 1969, Zaręba 1971, Boińska 1970, Rejewski 1971, Olaczek 1972, Kuczyńska 1973, Boiński 1973, Głazek 1973), nie została jak dotąd ustalona dokładna granica między obu odmianami.

Ols z terenu Wysoczyzny Rawskiej został zaliczony do odmiany środkowo-europejskiej. Nie stwierdzono na obszarze badań gatunków wyróżniających wschodnią odmianę geograficzną z *Dryopteris cristata*. Za takim ujęciem przemawia również sporadyczny udział gatunków z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, a także stosunkowo znaczny udział gatunków z klasy *Quercu-Fagetea*. Teren Wysoczyzny Rawskiej znajduje się na obszarze granicznym między wschodnią i zachodnią odmianą olsu. Świadczy o tym fakt, iż w jego sąsiedztwie, w kierunku południowo-zachodnim, w dolinie Pilicy oraz w okolicach Łodzi występuje już ols z *Dryopteris cristata* (Fagasiewicz 1967, Mowszowicz i in. 1969).

Analiza zdjęć fitosocjologicznych zestawionych w tabeli IV dała podstawy do przeprowadzenia podziału olsu na dwa podzespoły:

a) *Carici elongatae-Alnetum symphytetosum* Bodeux 1955 – ols żywokostowy,

b) *Carici elongatae-Alnetum sphagnetosum* – ols torfowcowy.

Gatunkami wyróżniającymi dla olsu żywokostowego są: *Humulus lupulus*, *Symphytum officinale*, *Eupatorium cannabinum* (zdjęcia 1-5). Zwraca uwagę fakt, że wszystkie płaty tego podzespołu stwierdzono w dolinach rzek lub cieków, gdzie zaznacza się stały, powolny przepływ wód powierzchniowych. Ols żywokostowy sąsiaduje zwykle z nadrzeczными łąkami, jedynie w uroczysku Świdno (zdjęcie 1) towarzyszy mu łąg jesionowo-olszowy. W dolinkach występują licznie gatunki szuwarowe, z których w poszczególnych płatach dominują: *Carex paniculata* (zdjęcie 4 i 5), *Calla palustris* (zdjęcie 3), *Phragmites communis* i *Glyceria aquatica* (zdjęcie 2). Na kępach licznie występuje *Humulus lupulus*. Nie stwierdzono natomiast *Valeriana officinalis*, którą Bodeux (1955) uznał za gatunek wyróżniający podzespół.

W olsie żywokostowym z Wysoczyzny Rawskiej występuje natomiast *Valeriana sambucifolia* (w II klasie stałości). Podobne ujęcie tego podzespołu przedstawił Jasnowski (1962) z Pomorza Szczecińskiego oraz Olaczek (1972) z Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.

Ols torfowcowy występuje w lokalnych, terenowych zagłębieniach, gdzie odpływ wody jest utrudniony. Jedynie zdjęcie 8 reprezentuje płat położony nad małym ciekim, pozostałe wykonano w zagłębieniach lokalnych. Zbiorowisko to sąsiaduje najczęściej z zespołami borowymi (zdjęcie 6, 7 i 9) lub grądowymi (zdjęcie 8). Jako gatunki wyróżniające ten podzespół uznano: *Viola palustris*, *Polytrichum commune* i *Sphagnum squarrosum*. Poza grupą gatunków wyróżniających, podzespół ten, w porównaniu z olsem żywokostowym, charakteryzuje się większym udziałem mszaków, jak również częstszym występowaniem gatunków z klasy *Quercu-Fagetea*. Mniej jest tu z kolei gatunków szuwarowych z klasy *Phragmitetea*. Kępy są niższe niż w olsie żywokostowym, a dolinki częściowo zarośnięte mszakami. Poza tym obydwie podzespoły mają podobną strukturę warstwową oraz podobną dynamikę roślinności.

Podział olsu z Wysoczyzny Rawskiej, ze względu na podobny charakter zbiorowiska oraz sąsiedztwo terenu badań, został przeprowadzony w oparciu o rozróżnienie przedstawione przez Olaczka (1972). W pracach z innych obszarów kraju, uwzględniających zróżnicowanie wewnętrzne tego zespołu, jednostki odpowiadające wymienionym podzespołom są różnie interpretowane, poszczególni autorzy używają dla nich wielu określeń. Sokołowski (1963) wyróżnia na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej wariant typowy oraz w Puszczy Augustowskiej (Sokołowski 1969) wariant z *Polytrichum strictum*. Kępczyński (1965) podaje z terenu Wysoczyzny Dobrzyńskiej wariant z *Calla palustris* i *Sphagnum recurvum*. Głazek (1973) z Przedpoła Gór Świętokrzyskich wyróżnił wariant z *Calla palustris* i wariant typowy.

Specjalnego omówienia wymaga płat zespołu reprezentowany przez zdjęcie 10, gdzie dominuje *Carex riparia*, która jednolitym łanem porasta dno lasu. Płat ten jest przykładem młodocianego stadium powstawania olsu w wyniku sukcesji wtórnej. Olsza, która tu występuje, pochodzi prawdopodobnie z samosiewu, świadczy o tym brak kęp. Należy przypuszczać, że w miarę starzenia się drzewostanu i zmian wśród roślinności zielnej, będzie zachodzić stopniowo kształtowanie się kęp. Zespoły turzycowe są dla olsu zbiorowiskami zastępczymi. Jeśli przestają być użytkowane jako kośne łąki, pojawia się olsza, która w przypadku turzyc kępiastych osadza się na kępach, a powstające zbiorowisko ma pierwotnie charakter dolinkowo-kępkowy, natomiast w przypadku turzyc rosnących łanowo, występuje nieregularnie, nie tworząc kęp. Procesy sukcesji wtórnej obu podzespołów olsu zostały przedstawione przez Olaczka (1972). Boiński (1973) wyróżnia z terenu Pojezierza Krajeńskiego wariant olsu z *Carex riparia* z zaznaczeniem różnych stadiów sukcesyjnych zespołu.

Numer kolejny zdjęcia /Successive number of record/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Numer zdjęcia /No. of record/	386	414	420	419	401	398	11	417	62	384	
Data /Date/	5	27	9	9	16	5	16	3	18	5	
	07	08	09	09	08	08	07	09	09	07	
	73	73	73	73	73	73	70	73	70	73	
Miejscowość /Locality/	Sw	Tl	Ks	Ks	Jk	Wl	Gz	LJ	RL	Sw	
Zwarcie warstwy drzew "a" w % /Density of tree layer "a" in %/	80	75	75	75	80	75	65	60	50	60	Constancy
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub layer "b" in %/	5	15	20	10	10	10	20	20	40	10	
Pokrycie warstwy runa "c" w % /Cover of herb layer "c" in %/	100	90	60	50	60	50	80	80	80	90	
Pokrycie warstwy masyści "d" w % /Cover of moss layer "d" in %/	5	5	5	5	5	5	10	10	10	5	
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of record in m ² /	300	200	200	200	400	200	400	400	200	300	
Liczba gatunków w zdjęciu /Number of species in record/	35	38	34	38	34	37	42	37	32	23	Stażność

Drzewa i krzewy

/Trees and shrubs/

Ad	Alnus glutinosa	a	5	4	5	5	5	4	4	4	3	3	V
	"-" "	b	.	.	1	1	1	1	1	1	2	1	IV
	"-" "	c	.	+	.	+	+	+	+	.	+	+	
QF	Padus avium	b	.	.	.	.	1	.	1	1	1	.	II
	"-" "	c	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	
	Salix fragilis	b	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I
	"-" "	c	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	
B	Frangula alnus	b	1	1	1	1	.	1	1	1	2	1	V
	"-" "	c	.	.	+	+	.	.	+	.	+	+	V
ACh	Ribes nigrum	b	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	III
	"-" "	c	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
QF	Rhamnus cathartica	b	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	II
	"-" "	c	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Viburnum opulus	b	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	I
	"-" "	c	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	
	Buonymus europaeae	c	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I
B	Sorbus aucuparia	b	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I
	"-" "	c	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	
	Salix caprea	c	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I

Runo zielne i mssaki

/Herbs and moss/

ACh	Carex elongata		1	2	3	.	.	1	.	3	.	.	III
KVCh	Solanum dulcamara		1	2	2	2	3	2	1	2	2	2	V
	Lycopus europaeus		2	2	2	3	3	2	1	2	1	1	V
	Dryopteris thelypteris		.	.	.	.	.	3	2	4	2	.	II
	Sphagnum squarrosum		.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	I

dsas	Humulus lupulus	+	2	2	1	1	.	.	.	.	.	III
	Symphytum officinale	.	1	+	+	.	.	.	.	.	.	II
	Eupatorium cannabinum	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	II
dsas	Viola palustris	.	.	.	.	.	1	+	1	1	+	III
	Polytrichum commune	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	I
QF	Mnium undulatum	1	1	.	1	1	.	.	1	1	1	IV
	Carex ramota	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	II
	Scrophularia nodosa	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	I
	Equisetum silvaticum	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	I
	Catharina undulata	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I
	Burhynchium zetterstedtii	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I
	Aegopodium podagraria	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	Rumex sanguineus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I
Phr	Galium palustre	2	2	2	1	1	2	1	+	.	2	V
	Peucedanum palustre	1	2	2	2	.	2	.	2	.	.	III
	Iris pseudoacorus	1	1	1	1	.	1	.	.	.	1	III
	Scutellaria galericulata	1	.	1	.	1	1	.	+	2	.	III
	Carex paniculata	.	.	.	3	4	1	2	.	.	.	II
	Cicuta virosa	.	1	1	+	+	.	.	.	.	.	II
	Glyceria fluitans	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	II
	Calla palustris	.	.	2	1	.	1	.	.	.	.	II
	Alisma plantago-aquatica	+	1	.	.	.	+	.	.	.	.	II
	Veronica beccabunga	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	I
	Equisetum limosum	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	Phragmites communis	.	3	.	.	1	.	.	.	.	.	I
	Carex pseudocyperus	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	I
	Carex riparia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	I
	Epilobium parviflorum	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I
	Rumex hydrolapathum	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I
	Ranunculus lingua	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I
	Sium latifolium	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I
	Glyceria aquatica	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	Scrophularia alata	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	I
MA	Filipendula ulmaria	1	3	.	1	2	1	2	2	1	2	V
	Lysimachia vulgaris	+	1	1	+	1	1	2	.	1	.	IV
	Lythrum salicaria	1	1	1	1	1	1	1	.	.	1	IV
	Deschampsia caespitosa	2	1	1	1	2	1	1	2	.	.	IV
	Myosotis palustris	1	.	.	1	1	1	.	1	1	3	IV
	Scirpus silvaticus	.	2	1	1	2	1	1	2	.	.	IV
	Equisetum palustre	+	1	1	2	1	.	.	1	.	.	III
	Angelica silvestris	.	1	.	+	+	+	1	.	1	.	III
	Cirsium palustre	.	1	.	.	.	.	.	+	1	.	II
	Olimacium dendroides	.	.	1	.	+	.	1	1	.	.	II
	Lotus uliginosus	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	II
	Juncus effusus	.	.	.	.	.	.	1	+	1	1	II
	Lychnis flos-cuculi	.	.	+	.	.	.	1	.	.	.	I
	Galium uliginosum	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.	I
	Stachys palustris	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	I
	Cirsium oleraceum	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	I
	Crepis paludosa	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	I
	Poa trivialis	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	Caltha palustris	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	Rumex acetosa	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	Selinum carvifolia	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I
	Cardamine pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	I

B	<i>Ranunculus repens</i>	1	1	+	1	.	+	1	1	2	2	V
	<i>Calliargon cuspidatum</i>	+	1	1	+	+	+	.	1	+	.	IV
	<i>Dryopteris spinulosa</i>	1	.	2	1	+	+	.	1	.	1	IV
	<i>Urtica dioica</i>	3	3	.	2	1	1	.	1	.	1	IV
	<i>Geum rivale</i>	.	1	.	.	1	+	1	1	.	1	III
	<i>Lysimachia nummularia</i>	1	1	.	+	1	.	.	.	.	1	III
	<i>Mnium offline</i>	+	.	+	+	.	.	+	.	.	+	III
	<i>Athyrium filix-femina</i>	.	1	.	.	1	1	.	2	1	.	III
	<i>Epilobium palustre</i>	+	1	.	.	1	+	+	.	.	.	III
	<i>Valeriana sambucifolia</i>	1	1	.	.	.	.	.	.	1	+	II
	<i>Bidens tripartita</i>	2	.	+	.	.	1	.	.	.	.	II
	<i>Polygonum hydropiper</i>	1	.	.	.	.	1	1	.	1	.	II
	<i>Rubus idaeus</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	II
	<i>Geranium robertianum</i>	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I
	<i>Cardamine amara</i>	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	I
	<i>Mentha aquatica</i>	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	I
	<i>Geum urbanum</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	I
	<i>Comarum palustre</i>	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Malachium aquaticum</i>	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	I
	<i>Ranunculus flammula</i>	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	I
	<i>Oxalis acetosella</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	I
	<i>Impatiens parviflora</i>	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I

Gatunki sporadyczne

/Sporadic species/ : zdjęcie /record/ 1 - *Glechoma hederacea* /1/,
Galeopsis speciosa /+/, 3 - *Rubus* sp. /+/,
Menyanthes trifoliata /+/, 4 - *Veronica scu-*
tellata /+/, *Lemna minor* /1/, 6 - *Brachythe-*
cium rutabulum /+/, 7 - *Prunella vulgaris* /1/,
Mnium rostratum /+/, *Gnaphalium uliginosum* /+/,
9 - *Thuidium tamariscifolium* /1/, *Valeriana*
dioica /1/.

Gatunki sporadyczne

/Sporadic species/ : zdjęcie /record/ 2 - *Mentha arvensis* /1/, *Plantago maior* /+/,
Fragaria vesca /+/, 6 - *Stellaria media* /1/, 9 - *Bidens tri-*
partita /+/, *Vicia sepium* /1/, 10 - *Maianthemum bifolium* /+/,
Polygonum convolvulus /1/, *Oxymacium dendroides* /1/, *Mnium cus-*
pidatum /+/, 11 - *Rumex acetosa* /1/, *Brachythecium rutabulum* /+/,
12 - *Brachythecium rutabulum* /+/, 13 - *Rhytidadelphus trigue-*
trus /1/, 15 - *Mnium punctatum* /+/, *Selinum carvifolia* /1/, 16 -
Polygonum persicaria /+/, 18 - *Mentha piperica* /1/, *Oscuta eu-*
ropaea /+/.

Stanowiska zdjęć w tabeli IV

- (386) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 313k, dolina Pilicy, 31-letni drzewostan olszowy, odroślowy, o dużym zwarcu koron.
- (414) woj. radomskie, miejscowość Trzylatków, dolina małego cieku, dopływu Mogielanki, drzewostan około 30-letni, odroślowy, dolinki częściowo zarosłe.
- (420) woj. skierniewickie, miejscowość Kurzeszyn, dolina Rawki, w sąsiedztwie łąki, drzewostan około 40-letni, odroślowy.
- (419) woj. skierniewickie, miejscowość Kurzeszyn, dolina Rawki, około 280 m od poprzedniego zdjęcia, drzewostan około 60-letni z młodszymi olszami odroślowymi.
- (401) woj. skierniewickie, miejscowość Jajkowie, dolina cieku, dopływu Pilicy, drzewostan tworzy około 30-letnia olsza, duży udział *Carex paniculata*.
- (398) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Wale, oddział 166a, lokalne obniżenie terenowe, południowy kraniec uroczyska, drzewostan odroślowy 46-letni.
- (11) woj. skierniewickie, Lasy Dośw. A. R. w Warszawie, uroczysko Głuchów, oddział

- 187, dolina Rawki, u podnóża, krawędzi terasy porośniętej borem mieszanym, drzewostan około 50-letni, dolinki częściowo zarośnięte.
8. (417) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 241a, dolina niewielkiego dopływu Chojnatki, drzewostan tworzy 49-letnia olsza odroślowa, w domieszcze młodsze okazy.
9. (62) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 145b, obniżenie terenowe, drzewostan około 40-letni, dolinki częściowo zarośnięte mszakami.
10. (384) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 312k, dolina Pilicy, drzewostan około 50-letni, dolinki częściowo zarośnięte.
lan *Carex riparia*.

4.2. *POA TRIVIALIS-ALNETUM* OLACZEK 1972, ŁĘG OLSOWY – TABELA V

Na badanym terenie łąg olsowy występuje rzadko i zajmuje, podobnie jak ols, nieznaczną powierzchnię. Niewielkie płaty tego zespołu spotyka się głównie w dolinie Pilicy, w uroczyskach Świdno i Tomczyce, rzadziej w dolinach: Chojnatki (miejscowość Chojnata), Mogielanki (uroczysko Wilków), Jezioraki (miejscowość Jeziora). *Poa trivialis-Alnetum* sąsiaduje najczęściej z zespołem łągu jesionowo-olszowego, rzadziej olsu. Występuje na torfiastych piaskach w odróżnieniu od tegoż zespołu z terenu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, powstałego na odwodnionych torfach niskich (Olaczek 1972).

Zespół łągu olsowego jest zbiorowiskiem podobnym do łągu jesionowo-olszowego pod względem bogactwa florystycznego, fizjonomii i struktury. Dno lasu jest płaskie, dolinki zarosłe zupełnie roślinnością zielną (fot. 4). Drzewostan występuje w kępiastych skupieniach, co jest pozostałością po poprzedzającym zespole *Carici elongatae-Alnetum*. Przeciętnie w jednym zdjęciu fitytosocjologicznym występuje 45 gatunków. W skład drzewostanu wchodzi wyłącznie olsza czarna, najczęściej z odrośli, rzadko z samosiewu. Zwarcie koron drzew wynosi przeciętnie 70%. Podszycie jest o wiele bujniejsze w porównaniu z olsem, przeciętnie zwarcie tej warstwy wynosi 45%. Największy udział wśród krzewów mają: *Padus avium*, *Frangula alnus*.

Runo osiąga najczęściej 100% pokrycia. We wszystkich płatach rośnie *Poa trivialis*, zajmująca duże powierzchnie. Dużą rolę w warstwie runa odgrywają gatunki związku *Alno-Padion*, z których najobficiej występuje *Impatiens noli-tangere*. Klasę *Alnetea glutinosae* najczęściej reprezentuje *Solanum dulcamara* i *Lycopus europaeus*, nieliczne są natomiast gatunki klasy *Querco-Fagetea*. Lista gatunków klasy *Phragmitetea* jest dość długa, ale osiągają one tylko I i II klasę stałości, jedynie *Galium palustre* rośnie pospolicie. Znaczny udział w runie mają gatunki wyróżniające związek *Alno-Padion*: *Galium aparine*, *Humulus lupulus* i *Glechoma hederacea*.

Łęg olsowy ma charakter zbiorowiska przejściowego między olsem a łągiem jesionowo-olszowym. Świadczy o tym skład florystyczny zespołu, udział zarówno gatunków olsowych z klasy *Alnetea glutinosae*, jak i łągowych ze związku *Alno-Padion*. W wielu pracach opisujących olsy i łągi można znaleźć wzmianki o istnieniu tego rodzaju zbiorowisk. Najczęściej są one charak-

Fot. 4. *Poo trivialis-Alnetum*. Uroczysko Świdno

Photo. 4. *Poo trivialis-Alnetum*. Świdno range

Fot. J. Siciński

teryzowane jako ogniwo powiązania sukcesyjnego między olsem a łęgiem. Zabiegi melioracyjne, powodujące odwodnienie terenu, są głównym czynnikiem decydującym o tworzeniu się tego typu przejściowych zbiorowisk. Problem ten przedstawił w swej pracy Wojterski (1960). Autor zamieścił jednocześnie oddzielną tabelę zdjęciową, ilustrującą charakter tego zbiorowiska z terenu Polski Zachodniej. Rejewski (1971) opisuje podobne zbiorowisko z terenu Ziemi Chełmińskiej zaznaczając, że jest ono wynikiem obniżenia poziomu wody na skutek prowadzonych prac melioracyjnych. Autor załącza także 7-zdjęciową tabelę. Płaty *Carici elongatae-Alnetum* o charakterze przejściowym do łęgu charakteryzuje również Głazek (1973). Postacie przejściowe między olsem a łęgiem są najczęściej wynikiem działania czynników antropogenicznych, co nie wyklucza możliwości ich występowania w naturalnych warunkach, na pograniczu obu zespołów.

Zespół *Poo trivialis-Alnetum* został wyróżniony i opisany przez Olaczka (1972). Autor zaznacza, że jest to zespół o charakterze antropogenicznym. Ponieważ jednak czynniki, decydujące o jego powstaniu, działają od dawna i cechy siedliska w tym czasie ustabilizowały się, również powstała fitocenoza, po okresie przystosowań do zmian siedliskowych, stała się zbiorowiskiem ustabilizowanym. Ze względu na to, że zbiorowisko wykazuje trwałość

i różni się zarówno od olsu jak i łągu jesionowo-olszowego autor stwierdza, że należy je traktować jako odrębny zespół. Jako gatunki lokalnie charakterystyczne dla łągu olsowego z terenu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej podaje: *Poa trivialis*, *Eupatorium cannabinum* i *Symphytum officinale*. Zgodnie z tym ujęciem przyjęto również dla obszaru Wysoczyzny Rawskiej wymienione gatunki za lokalnie charakterystyczne z pominięciem *Symphytum officinale*, który nie występuje w tym zbiorowisku na badanym terenie. Z kolei jako gatunki lokalnie wyróżniające zespół w stosunku do *Fraxino-Alnetum* przyjęto: *Iris pseudoacorus*, *Sium latifolium* i *Bidens tripartitus*. *Malachium aquaticum* i *Carex acutiformis* uznano za lokalnie wyróżniające łąg olsowy w stosunku do *Carici elongatae-Alnetum*. Większość z tych gatunków występuje z niewielką stałością, osiągają jednak w tym zbiorowisku wysoki współczynnik pokrycia i na tej podstawie uznane zostały za wyróżniające. Poza tym łąg olsowy w stosunku do *Carici elongatae-Alnetum* różni się obecnością gatunków łągowych ze związku *Alno-Padion*, mniejszym udziałem gatunków szuwarowych z klasy *Phragmitetea* oraz zanikiem mozaikowego charakteru dna lasu. W porównaniu z *Fraxino-Alnetum*, zbiorowisko to różni się większym udziałem gatunków olsowych z klasy *Alnetea glutinosae* i mniejszym gatunków z klasy *Querco-Fagetea*. Występowanie w warstwie podszycia podrostów jesionu świadczy, iż gatunek ten znajduje w łągu olsowym odpowiednie siedlisko.

Struktura i skład florystyczny łągu olsowego uwarunkowany jest nie tylko jego antropogenicznym pochodzeniem, ale także sposobem obecnego użytkowania lasu. Na badanym terenie na skutek częstych, nieregularnych zrębów olszy, przeważają drzewostany młode, odroślowe. Innym sposobem użytkowania łągu olsowego jest wypas, powodujący zwiększenie udziału w runie gatunków łąkowych i jednocześnie ubożenie w gatunki łągowe (zdjęcie 1). Płat łągu olsowego w uroczysku Tomczyce (zdjęcie 6) jest przykładem neofityzacji zespołu. W warstwę podszycia wniknął tu *Acer negundo*, zawleczoney najprawdopodobniej z wodami Pilicy.

Stanowiska zdjęć w tabeli V

1. (383) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 312l, dolina Pilicy, drzewostan olszowy 31-letni.
2. (385) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 313k, dolina Pilicy, 31-letni drzewostan olszowy w kępiastych skupiskach.
3. (220) woj. radomskie, miejscowość Jeziora, dolina Jeziorki, drzewostan olszowy odroślowy, około 40-letni.
4. (2) woj. skierniewickie, miejscowość Chojnata, dolina Chojnatki, drzewostan tworzy około 40-letnia olsza odroślowa.
5. (151) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wilków, oddział 189f, dolina Mogielanki, drzewostan olszowy 41-letni, kępiasto skupiony.
6. (369) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 318j, dolina Pilicy, drzewostan 36-letni z domieszką młodszych okazów.

Numer kolejny zdjęcia /Successive number of record/	1	2	3	4	5	6	7	8	
Numer zdjęcia /No. of record/	383	385	220	2	151	369	370	1	
Data /Date/	5	5	2	29	20	25	25	29	
Miejscowość /Locality/	Sw	Sw	Js	Oh	Wil	Tm	Tm	Oh	Constancy
Zwarcie warstwy drzew "a" w % /Density of tree layer "a" in %/	70	75	80	60	70	60	70	60	
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub layer "b" in %/	25	15	30	50	15	60	70	50	Stažnosť
Pokrycie warstwy runa "c" w % /Cover of herb layer "c" in %/	100	100	95	100	90	100	100	100	
Pokrycie warstwy mchystej "d" w % /Cover of moss layer "d" in %/	-	5	10	10	5	5	5	10	
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of record in m ² /	200	300	300	400	400	200	400	400	
Liczba gatunków w zdjęciu /Number of species in record/	50	38	41	44	41	50	47	50	

Drzewa i krzewy
/Trees and shrubs/

Vd	<i>Alnus glutinosa</i>	a	4	4	4	4	4	4	4	4	V
	-"- -"	b	1	1	1	1	+	.	.	1	
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	.	.	+	IV
VCh	<i>Padus avium</i>	b	.	1	2	2	1	2	3	3	V
	-"- -"	c	.	+	+	+	+	1	1	+	V
	<i>Salix fragilis</i>	b	.	.	1	.	1	.	1	.	II
KOh	<i>Fraxinus excelsior</i>	b	1	.	.	.	.	1	1	.	
	-"- -"	c	+	.	.	.	.	+	.	.	II
	<i>Acer platanoides</i>	b	.	.	.	.	.	.	1	1	
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	.	.	1	II
	<i>Ulmus laevis</i>	b	.	.	.	.	.	1	.	.	I
B	<i>Betula verrucosa</i>	b	.	.	.	1	.	.	.	.	I
VCh	<i>Acer negundo</i>	b	.	.	.	.	.	2	.	.	
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	+	.	.	I
KOh	<i>Ulmus campestris</i>	b	.	.	.	.	.	2	.	.	
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	+	.	.	I
B	<i>Quercus robur</i>	c	.	.	.	.	.	.	.	+	I
B	<i>Frangula alnus</i>	b	1	1	1	2	1	.	1	1	
	-"- -"	c	+	.	+	+	+	.	+	+	V
	<i>Sorbus aucuparia</i>	b	+	.	1	1	.	.	.	1	
	-"- -"	c	.	.	.	+	.	.	.	1	III
Aln	<i>Ribes nigrum</i>	b	1	1	.	.	1	.	.	+	
	-"- -"	c	1	+	.	.	+	.	.	+	III
KOh	<i>Rhamnus cathartica</i>	b	1	.	.	.	1	.	1	1	
	-"- -"	c	+	.	.	.	.	.	.	+	III
	<i>Sambucus nigra</i>	b	.	.	1	.	.	2	.	2	
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	+	.	+	II
	<i>Buonymus europaea</i>	b	.	.	.	.	.	1	1	.	
	-"- -"	c	+	.	.	.	.	+	+	.	II
VCh	<i>Ribes schlechtdalii</i>	b	.	.	1	.	.	.	.	1	
	-"- -"	c	.	.	1	.	.	.	.	+	II

KCh	Viburnum opulus	b	1	.	.	.	.	.	.	.	I
	Salix cinerea	b	.	.	.	1	.	.	.	.	I
	Pirus communis	b	.	.	.	.	.	1	.	.	I
	""_"	c	.	.	.	.	.	+	.	.	
	Lonicera xylosteum	b	.	.	.	.	.	.	1	.	I
	""_"	c	.	.	.	.	.	.	1	.	I
	Crataegus monogyna	b	.	.	.	.	.	.	1	.	I
	Corylus avellana	c	.	.	.	.	.	.	.	+	I
	Sambucus racemosa	b	.	1	.	.	.	.	.	.	I

Rumy zielne i mszaki

/Herbs and moss/

ACh	Poa trivialis	2	2	2	2	1	3	3	2	V
	Eupatorium cannabinum	.	.	2	1	3	.	.	.	II
Adlok	Iris pseudocacorus	2	1	1	.	1	.	+	1	IV
	Sium latifolium	2	.	.	.	.	1	1	.	II
	Malachium aquaticum	1	1	.	.	.	.	.	.	II
	Bidens tripartitus	1	3	.	.	.	.	.	.	II
	Carex acutiformis	.	.	.	3	.	.	.	.	I
VCh	Impatiens noli-tangere	2	4	3	2	2	3	3	3	V
	Mnium undulatum	1	.	.	2	1	+	.	.	IV
	Stellaria nemorum	.	1	.	.	2	2	2	1	IV
	Rumex sanguineus	.	.	.	.	.	2	1	1	II
	Pastuca gigantea	?	.	.	.	1	1	+	.	II
	Chrysosplenium alternifolium	.	.	.	.	1	.	.	3	II
	Eurhynchium swartzii	.	.	.	+	.	.	.	+	II
	Agropyron caninum	.	.	.	.	.	.	1	.	I
	Cardamine impatiens	.	.	.	.	.	.	+	.	I
Vd	Galium aparine	2	2	2	.	1	3	4	+	V
	Humulus lupulus	.	.	1	1	1	2	1	1	IV
	Glechoma hederacea	1	1	.	.	.	3	3	.	III
KCh	Catharina undulata	.	.	.	1	.	.	1	1	II
	Scrophularia nodosa	.	.	.	.	.	+	1	+	II
	Adoxa moschatelina	.	.	1	.	.	.	.	1	II
	Dryopteris filix-mas	.	.	.	.	.	1	1	.	II
	Eurhynchium setostedtii	.	.	.	+	.	.	.	.	I
	Paris quadrifolia	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	Aegopodium podagraria	.	.	.	.	.	.	.	1	I
Aln	Solanum dulcamara	2	2	1	2	1	.	+	.	IV
	Lycopus europaeus	2	2	1	1	1	+	.	.	IV
	Carex elongata	3	2	.	.	.	1	.	.	II
	Dryopteris thelypteris	1	.	1	.	2	.	.	.	II
Art	Urtica dioica	3	3	3	+	2	2	2	3	V
	Chelidonium majus	.	.	.	.	.	+	1	.	II
Phr	Galium palustre	3	2	1	2	.	2	1	1	V
	Scutellaria galericulata	.	1	.	1	.	+	.	.	II
	Phragmites communis	.	.	2	3	1	.	.	.	II
	Peucedanum palustre	1	1	.	.	.	.	.	.	II
	Phalaris arundinacea	.	.	.	.	.	.	+	.	I
	Calla palustris	.	.	.	.	.	+	.	.	I
	Veronica beccabunga	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	Epilobium parviflorum	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	Carex rostrata	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	Equisetum limosum	.	.	.	2	.	.	.	.	I
	Carex paniculata	.	.	.	1	.	.	.	.	I

	<i>Carex riparia</i>	2	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Glyceria fluitans</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Glyceria aquatica</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	I
MA	<i>Lysimachia vulgaris</i>	1	1	1	1	1	1	2	1	V
	<i>Lythrum salicaria</i>	1	1	2	+	2	1	1	+	V
	<i>Filipendula ulmaria</i>	2	2	1	2	2	2	1	.	V
	<i>Myosotis palustris</i>	3	2	2	2	1	2	1	.	V
	<i>Caltha palustris</i>	+	1	1	1	1	1	.	+	V
	<i>Deschampsia caespitosa</i>	3	1	.	.	.	1	1	.	III
	<i>Crepis paludosa</i>	.	.	1	2	1	.	.	+	III
	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	1	+	.	+	.	.	.	.	II
	<i>Veronica longifolia</i>	+	.	.	.	.	.	1	.	II
	<i>Cirsium oleraceum</i>	1	.	.	2	.	.	.	.	II
	<i>Angelica silvestris</i>	.	.	1	.	.	.	.	2	II
	<i>Anthriscus silvestris</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	II
	<i>Rumex acetosa</i>	.	.	1	+	.	.	.	.	II
	<i>Juncus effusus</i>	2	1	.	.	.	.	.	.	II
	<i>Equisetum palustre</i>	.	.	.	.	.	.	.	+	I
	<i>Cardamine pratensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	+	I
	<i>Climacium dendroides</i>	.	.	.	2	.	.	.	.	I
	<i>Scirpus silvaticum</i>	.	.	.	1	.	.	.	.	I
	<i>Selinum carvifolia</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	I
	<i>Lotus uliginosus</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	I
B	<i>Valeriana sambucifolia</i>	1	1	2	2	1	2	1	1	V
	<i>Ranunculus repens</i>	2	2	1	.	1	1	1	2	V
	<i>Geum rivale</i>	1	1	1	2	.	1	2	4	V
	<i>Geranium robertianum</i>	2	1	.	1	2	1	1	2	V
	<i>Lysimachia nummularia</i>	1	.	.	1	.	1	+	1	IV
	<i>Dryopteris spinulosa</i>	1	1	.	+	1	.	.	1	IV
	<i>Cardamine amara</i>	1	1	3	.	1	.	.	.	III
	<i>Rubus idaeus</i>	.	1	+	.	.	1	.	1	III
	<i>Impatiens parviflora</i>	2	.	.	.	.	3	2	.	II
	<i>Polygonum hydropiper</i>	2	1	.	.	.	1	.	.	II
	<i>Calliergon cuspidatum</i>	.	1	.	1	+	.	.	.	II
	<i>Mnium affine</i>	.	+	.	.	.	+	.	1	II
	<i>Mentha aquatica</i>	.	.	1	.	.	+	+	.	II
	<i>Brachythecium rutabulum</i>	.	.	+	+	.	.	.	+	II
	<i>Athyrium filix-femina</i>	.	.	.	1	1	.	.	2	II
	<i>Rumex crispus</i>	+	.	1	.	.	.	.	.	II
	<i>Polygonum convolvulus</i>	1	.	.	.	.	.	1	.	II
	<i>Mnium rostratum</i>	.	.	+	1	.	.	.	.	II
	<i>Moechringia trinervia</i>	.	.	1	.	.	.	.	2	II
	<i>Rubus sp.</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	II
	<i>Lapsana communis</i>	.	.	.	.	.	+	1	.	II
	<i>Geum urbanum</i>	.	.	.	.	.	1	.	2	II
	<i>Galeopsis tetrahit</i>	.	.	.	.	.	1	.	2	II

Gatunki sporadyczne
/Sporadic species/ :

zdjęcie /record/ 1 - *Comarum palustre* /1/, *Ranunculus flammula* /+/, 3 - *Valeriana dioica* /1/, *Brachythecium rutabulum* /+/, 4 - *Menyanthes trifoliata* /+/, 5 - *Viola palustris* /1/, *Epilobium palustre* /1/, 6 - *Stellaria media* /2/, *Rhytidadelphus triquetrus* /+/, 8 - *Oxalis acetosella* /2/, *Oxalis stricta* /1/, *Polygonum persicaria* /+/, *Epilobium montanum* /+/.

7. (370) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 318j, drzewostan buduje 36-letnia olsza czarna.
8. (1) woj. skierniewickie, miejscowość Chojnata, dolina Chojnatki, drzewostan olszowy różnowiekowy, najstarsza olsza około 70-letnia.

4.3. *FRAXINO-ALNETUM* MAT. 1952. ŁĘG JESIONOWO-OLSZOWY – TABELA VI

Łęg jesionowo-olszowy jest zbiorowiskiem często spotykanym na terenie badań. Dość liczne, choć małe płaty tego zespołu, zajmują w sumie niewielką powierzchnię, aczkolwiek w porównaniu z olsem i łęgiem olsowym jest ona znacznie większa. *Fraxino-Alnetum* występuje najczęściej na terasie zalewowej w dolinach większych rzek (Pilicy i Rawki) oraz na dnie dolin ich dopływów (Chojnatki i Mogielanki). Największe płaty spotykamy nad Chojnatką w uroczysku Las Jeruzalski oraz miejscowości Chojnata (woj. skierniewickie). W dolinie Rawki zbiorowisko to stwierdzono w miejscowości Kurzeszyn (woj. skierniewickie) oraz w uroczysku Głuchów (Łasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie), a na terasie zalewowej Pilicy w uroczyskach Tomczyce i Świdno (ndl. Grójec). Małe płaty występują w dolinie Mogielanki w uroczysku Wilków (ndl. Grójec), w pobliżu osady Mogielnica, a także w miejscowościach: Trzylatków, Jeziora (woj. radomskie), Jajkowie (woj. skierniewickie). W większości przypadków łęg jesionowo-olszowy występuje blisko koryta rzek. Sąsiaduje najczęściej z łąkami lub rzadziej z polami uprawnymi, zaś w obrębie uroczysk leśnych także ze zbiorowiskami grądowymi, z borem mieszanym, a nawet świetlistą dąbrową.

Fraxino-Alnetum rośnie na glebach wilgotnych i żyznych. Są to zwykle gleby mułowo-błotne, czarne ziemie lub mady piaszczyste, zmineralizowane, z dość grubą warstwą próchniczną, słabo oglejone. Poziom wody jest zmienny od 0,5 do 1,2 m. Pewien wpływ na użyźnianie gleb w płatach położonych na terasach zalewowych Pilicy i Rawki mają wiosenne wylewy.

Łęg jesionowo-olszowy należy do bogatych florystycznie zespołów. Na badanym terenie przeciętna liczba gatunków w zdjęciu wynosi 36. Drzewostan buduje wyłącznie olsza czarna (fot. 5). Tylko w wyjątkowych przypadkach w skład tej warstwy wchodzi inne gatunki drzew. *Fraxinus excelsior*, występujący z dużym zwarcie koron w zdjęciu 1, pochodzi z sadzenia; jest to młody drzewostan jednowiekowy. *Acer negundo*, stwierdzony w uroczysku Tomczyce (zdjęcie 3), jest neofitem, zawleczonym z wodami Pilicy. Sporadycznie występuje również *Acer platanoides* i *Quercus robur*. Jesion, który w naturalnych warunkach na równi z olszą buduje drzewostan tego zespołu (Matuszkiewicz 1952), został na badanym terenie prawdopodobnie wyeliminowany w wyniku gospodarki. Olsza czarna jest drzewem szybko rosnącym i łatwym do odnowienia, jest więc chętniej uprawiana. Jesion natomiast, ze względu na dużą wartość drewna, od dawna był pozyskiwany aż do zupełnego zniknięcia z drzewostanu. Często spotykane podrosty tego gatunku mogą świadczyć, iż znajduje on w łęgu jesionowo-olszowym odpowiednie siedlisko i że mógłby wchodzić w skład drzewostanu. Zagadnienie udziału

jesionu w drzewostanie tego zespołu poruszało wielu autorów (Kępczyński 1965, Zaręba 1971, Fijałkowski 1972, Olaczek 1972). W drzewostanie *Fraxino-Alnetum* z terenu Pojezierza Krajeńskiego (Boiński 1973) jesion występuje na równi z olszą. Również na Opolszczyźnie (Kuczyńska 1973) zaobserwowano znaczny jego udział w tym zbiorowisku. Na obszarze Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej *Fraxinus excelsior* występuje natomiast tylko sporadycznie (Olaczek 1972). Jeszcze rzadziej jest spotykany w łągach Wysoczyzny Rawskiej.

Fot. 5. *Fraxino-Alnetum*. Uroczysko Las Jeruzalski

Photo. 5. *Fraxino-Alnetum*. Las Jeruzalski range

Fot. J. Siciński

Drzewostan w łągu jesionowo-olszowym osiąga dość duże zwarcie, przeciętnie 75-80%. Warstwa podszycia jest również bujnie rozwinięta. Najliczniej występuje tu *Padus avium*. Duży udział wśród krzewów mają także: *Frangula alnus*, *Sambucus nigra*, *Ribes nigrum*.

Duże zwarcie koron drzew i podszycia nie wywiera hamującego wpływu na runo, które jest bujne, wielogatunkowe i osiąga przeciętnie 95% pokrycia. Występują tu gatunki z różnych grup syngenetycznych, osiągają jednak przeciętnie niskie klasy stałości. Znaczny jest udział gatunków związku *Alno-Padion*, z których 5 występuje w IV i III klasie stałości oraz gatunków wyróżniających ten związek. Klasę *Quercu-Fagetea* reprezentuje 11 gatunków, lecz wszystkie zaledwie w II i I klasie stałości. Często

spotyka się przedstawiciele klasy *Alnetea glutinosae*, ale głównie w wariancie typowym zespołu. Charakterystyczną cechą łągu jesionowo-olszowego jest duży udział gatunków z klasy *Artemisietea*. *Urtica dioica* tworzy często łąny pokrywający znaczne powierzchnie i w wielu płatach jest gatunkiem dominującym.

Obecny stan fitocenoz *Fraxino-Alnetum* na terenie Wysoczyzny Rawskiej został ukształtowany przez wieloletnią działalność czynników antropogenicznych, z których najważniejszymi są sposób użytkowania lasów i zmiany stosunków wodnych. Łęg jesionowo-olszowy, ze względu na łatwą dostępność, jest narażony na wypasanie oraz trzebieenie drzewostanu. Są to zjawiska na ogół nie kontrolowane, gdyż w znacznej części są to lasy prywatne. W wyniku długotrwałego oddziaływania tych czynników nastąpiły w zbiorowisku wielostronne zmiany. Stwierdzono na badanym terenie następujące antropogeniczne zniekształcenia łągu jesionowo-olszowego:

- eliminacja z drzewostanu jesionu w rezultacie gospodarki zrębowej, wytworzenie w związku z tym jednogatunkowych drzewostanów olszowych, pochodzących z odrośli, samosiewu czy też sadzenia – monotypizacja. Jednym z dowodów sztuczności drzewostanów olszowych jest ich wyrównany wiek;
- na skutek nieregularnego wycinania olszy i przersedzania drzewostanu, zwłaszcza w lasach prywatnych, następuje nadmierny rozrost warstwy podszycia – fruticetyzacja, zdjęcia 6, 7, 11, 12;

- zdjęcie 3 jest przykładem neofityzacji zbiorowiska, na skutek wnikania do drzewostanu *Acer negundo*;

- zwiększony udział w runie gatunków łąkowych z klasy *Molinio-Arrhenatheretea* (*Deschampsia caespitosa*) na niekorzyść gatunków leśnych, wywołany wypasaniem, zdjęcia 9 i 15.

Nazwę zespołu *Fraxino-Alnetum* przyjęto zgodnie z ujęciem Matuszkiewicza (1952), który opisał to zbiorowisko z Białowieskiego Parku Narodowego. W późniejszym okresie, pod wpływem opracowania Oberdorfera (1953), łągi jesionowo-olszowe były opisywane z różnych obszarów kraju jako zespół *Circae-Alnetum* (Matuszkiewicz i Borowik 1957, Wojterski 1960, Piotrowska 1960, Tokarz 1961, Celiński 1962, Denisiuk 1963, Sokołowski 1963, Kępczyński 1965, Urbanek 1966, Rejewski 1971). Wśród podanych autorów byli tacy, którzy zgłaszali pewne zastrzeżenia co do ujęcia Oberdorfera. Wojterski (1960) ustosunkował się krytycznie do wydzielenia przez Oberdorfera (1953) dwóch zespołów łągowych: *Pruno-Fraxinetum* i *Circae-Alnetum*. Autor ten podkreśla brak istotnych różnic florystycznych i siedliskowych między tymi jednostkami i proponuje uznanie ich raczej jako podzespołów. Powołując się na ogólnie słabą wierność *Circaea alpina*, sugeruje także zmianę nazwy zespołu na *Fraxino-Alnetum*. Matuszkiewicz (1967) uznał istnienie w Polsce dwóch zespołów łągowych: *Pruno-Fraxinetum*, występującego w zachodniej części kraju, i *Circae-Alnetum*, zajmującego tereny wschodnie. Ponieważ żaden z tych zespołów nie ma dobrych gatunków charakterystycznych, autor

zgadzając się z Wojterskim, zaznacza, że mogą to być odmiany geograficzne jednego zespołu. W ostatnim okresie łągi jesionowo-olszowe są coraz częściej zaliczane do zespołu *Fraxino-Alnetum*. Ujęcie takie jest przedstawione w pracach: Medveckiej-Kornaś (1959), Olaczka (1972), Kuczyńskiej (1972, 1973), Rejewskiego (1971), Pender (1975). Zespół ten nie ma dobrych gatunków charakterystycznych, toteż w poszczególnych pracach przyjmowane były różne gatunki jako charakterystyczne lokalnie (por. Matuszkiewicz 1952, Matuszkiewicz i Borowik 1957, Wojterski 1960, Olaczek 1972).

Na terenie Wysoczyzny Rawskiej nie znaleziono *Circaea alpina*. Jest to gatunek związany z mikrosiedliskiem murszejących pniaków (Wojterski 1960, Rejewski 1971), jego brak może być wyjaśniony młodością drzewostanów olszy na badanym terenie. *Padus avium* wykazuje szeroką skalę ekologiczną i rośnie zarówno w łągu jesionowo-olszowym, jak i w olsie, łągu olsowym, a także w zbiorowiskach grądowych. Nie wyróżniono więc grupy gatunków lokalnie charakterystycznych dla zespołu. Zdecydował o tym fakt, iż gatunki wszystkich występujących tu grup syngenetycznych mają stosunkowo szeroką skalę ekologiczną, świadczącą o powiązaniu łągu jesionowo-olszowego z zespołami pokrewnymi: łągu olsowego i grodu niskiego. Z kolei gatunki o węższej skali ekologicznej wykazują zbyt niską stałość.

Łąg jesionowo-olszowy wykazuje zróżnicowanie na dwa warianty:

a) wariant z *Lamium maculatum*, *Glechoma hederacea* i *Galeopsis speciosa* (zdjęcia 1-8);

b) wariant typowy, wyróżniający się większym udziałem gatunków olsowych (zdjęcia 9-18).

Wariant z *Lamium maculatum* występuje najczęściej w dolinie Rawki, rzadziej Pilicy, zwykle blisko koryta rzek, na najżyźniejszych glebach wzbogacanych przez wiosenne wylewy. W porównaniu z wariantem typowym występuje tu nieco więcej gatunków z klasy *Quercu-Fagetea*. Wariant typowy wykształca się w dolinach mniejszych cieków, głównie nad Chojnatką i Mogielanką. Oprócz gatunków olsowych, w wariantcie tym zaobserwowano częstsze występowanie gatunków szuwarowych z klasy *Phragmitetea* oraz łąkowych z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*. Podobne zróżnicowanie zespołu *Fraxino-Alnetum* przedstawił Olaczek (1972) z obszaru Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.

Stanowiska zdjęć w tabeli VI

1. (415) Trzylatków, woj. radomskie, dolina dopływu Mogielanki, drzewostan jesionowy z sadzenia w wieku około 30 lat.
2. (180) ndl. Grójec, woj. radomskie, uroczysko Stryków-Brzostowiec, oddział 288c, lokalne obniżenie terenowe, jednowiekowy 34-letni drzewostan olszowy.
3. (81) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 318m, dolina Pilicy, bezpośrednio nad brzegiem rzeki, wzniesienie nad poziom wody około 1 m, drzewostan olszowy 34-letni z domieszką *Padus avium* i *Acer negundo*.

Numer kolejny zdjęcia /Successive number of record/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Numer zdjęcia /No. of record/	415	180	81	153	181	182	183	13	404	31	78	219	40	41	300	387	402	312
Data /Date/	27	15	26	20	18	18	20	17	21	23	15	2	25	25	24	5	16	7
	08	08	05	07	08	08	08	07	08	07	05	06	07	07	07	07	08	08
	73	71	71	71	71	71	71	70	73	70	71	72	70	70	72	73	73	72
Miejscowość /Locality/	T1	SB	Tm	Wil	Ks	Ks	Ks	Gz	LJ	LJ	Ch	Jz	LJ	LJ	Sw	Sw	Jk	Mg
Zwarcie warstwy drzew "a" w % /Density of tree layer "a" in %/	85	80	70	60	80	70	70	75	70	70	60	75	70	70	60	70	75	70
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub layer "b" in %/	30	10	40	40	15	60	60	50	20	20	65	50	50	20	40	5	5	20
Pokrycie warstwy runa "c" w % /Cover of herb layer "c" in %/	75	90	100	85	90	100	95	95	95	90	100	90	90	100	100	100	80	100
Pokrycie warstwy masynej "d" w % /Cover of moss layer "d" in %/	5	5	5	5	5	-	-	10	10	10	5	5	10	5	5	5	10	5
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of record in m ² /	200	300	200	400	300	200	200	500	300	400	400	400	400	400	300	300	400	300
Liczba gatunków w zdjęciu /Number of species in record/	25	35	36	30	42	38	32	39	46	44	42	33	31	32	34	32	34	40

Stałość
Constancy

Variant /Variant/		z <i>Lamium maculatum</i> /with <i>Lamium maculatum</i> /										typowy /typicum/									
Drzewa i krzewy /Trees and shrubs/																					
Fd	<i>Alnus glutinosa</i>	a	.	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	V
	-"-	b	.	1	2	2	1	1	1	.	1	.	.	1	1	.	1	.	+	1	V
	-"-	c	.	.	+	+	+	.	+	+	.	+	.	.	+	+	+	+	.	.	
FCh	<i>Padus avium</i>	a	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	I
	-"-	b	1	1	2	2	+	2	2	1	2	2	3	2	3	1	.	.	.	2	V
	-"-	c	+	+	+	1	+	.	+	.	+	1	1	1	1	.	.	.	.	+	
KCh	<i>Acer platanoides</i>	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	I
	-"-	b	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	II
	-"-	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	
	<i>Fraxinus excelsior</i>	a	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	-"-	b	2	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	-"-	c	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3	<i>Quercus robur</i>	a	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	-"-	b	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	-"-	c	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	<i>Betula verrucosa</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Salix fragilis</i>	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I
I	<i>Acer negundo</i>	a	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	-"-	b	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	-"-	c	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ch	<i>Ulmus laevis</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I
I	<i>Frangula alnus</i>	b	.	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	.	2	2	1	1	1	1	V
	-"-	c	.	.	+	+	.	+	.	1	+	1	1	.	1	+	+	+	.	+	
	In	<i>Ribes nigrum</i>	b	.	.	.	1	1	1	1	.	.	1	1	1	.	1	1	1	1	.
	-"-	c	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	+	.	

KCh	<i>Sambucus nigra</i>	b	1	1	1	.	1	2	2	.	1	.	2	2	.	.	.	.	.	.	IV
	"- "	c	.	.	+	.	+	+	+	.	+	1	+	1	.	.	.	.	.	.	
	<i>Rhamnus cathartica</i>	b	.	.	1	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	II
	"- "	c	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	
B	<i>Sorbus aucuparia</i>	b	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	II
	"- "	c	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	
KCh	<i>Eunymus europaea</i>	b	1	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
	"- "	c	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
VCh	<i>Ribes schlechtdandii</i>	b	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	II
	"- "	c	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	
KCh	<i>Corylus avellana</i>	b	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	"- "	c	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	<i>Sambucus racemosa</i>	b	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	"- "	c	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Runo sielne i mssaki																					
/Herbs and moss/																					
VCh	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>		1	2	.	2	/2/	/1/	/2/	/2/	.	2	3	2	.	3	.	.	.	.	IV
	<i>Mnium undulatum</i>		.	.	.	1	.	.	+	1	2	1	+	+	1	1	+	1	+	1	IV
	<i>Ficaria verna</i>		.	.	3	.	/2/	/3/	/2/	/2/	.	2	1	.	2	.	.	.	.	.	III
	<i>Festuca gigantea</i>		+	.	2	1	+	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	+	.	1	III
	<i>Stellaria nemorum</i>		+	1	4	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	2	III
	<i>Rumex sanguineus</i>		.	.	1	1	1	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	II
	<i>Impatiens noli-tangere</i>		.	.	.	2	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	2	.	.	II
	<i>Eurhynchium swartzii</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I
Vd	<i>Galium aparine</i>		.	1	2	1	.	2	1	.	1	1	1	2	2	2	1	2	.	1	IV
	<i>Humulus lupulus</i>		.	.	2	1	1	1	1	+	1	1	.	1	.	.	.	1	1	.	IV
	<i>Lamium maculatum</i>		2	2	1	3	4	4	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
	<i>Glechoma hederacea</i>		2	.	2	.	.	1	3	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
	<i>Galeopsis speciosa</i>		.	.	.	.	1	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
KCh	<i>Scrophularia nodosa</i>		1	1	.	.	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	II
	<i>Dryopteris filix-mas</i>		.	1	1	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
	<i>Eurhynchium zetterstedtii</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	+	1	.	.	.	.	.	II
	<i>Catharina undulata</i>		+	.	.	.	.	.	.	.	+	1	+	.	.	.	.	.	.	.	II
	<i>Aegopodium podagraria</i>		3	.	.	.	2	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Pa-ris quadrifolia</i>		.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Adoxa moschatelina</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Ranunculus lanuginosus</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Stachys silvatica</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Galeobdolon luteum</i>		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Equisetum silvaticum</i>		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Aln	<i>Lycopus europaeus</i>		.	+	.	.	1	1	.	.	1	1	.	1	1	1	1	1	1	2	IV
	<i>Solanum dulcamara</i>		.	.	.	.	1	1	+	.	+	1	.	1	1	2	1	2	2	1	IV
	<i>Dryopteris thelypteris</i>		.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	2	1	1	1	.	.	.	II
	<i>Carex elongata</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I
Art	<i>Urtica dioica</i>		3	4	1	3	3	4	2	3	2	2	3	3	1	2	2	2	1	4	V
	<i>Chelidonium majus</i>		3	.	2	.	1	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	II
	<i>Calystegia sepium</i>		.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	II
	<i>Malachium aquaticum</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Phr	<i>Galium palustre</i>		.	.	.	.	1	.	.	1	1	2	.	.	2	2	3	2	1	2	III
	<i>Scutellaria galericulata</i>		.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	2	2	2	1	+	2	III
	<i>Iris pseudoacorus</i>		.	.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	II
	<i>Phragmites communis</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	.	.	.	2	1	II
	<i>Puccedanum palustre</i>		.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	2	II
	<i>Glyceria aquatica</i>		.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	I

	<i>Epilobium parviflorum</i>	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I
	<i>Carex acutiformis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2	.	I
	<i>Equisetum limosum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	I
	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	+	I
	<i>Veronica beccabunga</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Ranunculus lingua</i>	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I
	<i>Scrophularia alata</i>	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Carex rostrata</i>	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Glyceria fluitans</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I
	<i>Sium latifolium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I
	<i>Calla palustris</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I
MA	<i>Deschampsia caespitosa</i>	2	1	.	1	1	2	1	1	3	1	.	.	.	.	.	3	1	2	1	IV
	<i>Lysimachia vulgaris</i>	.	.	+	1	1	.	+	1	1	2	1	1	2	1	1	1	.	.	.	IV
	<i>Filipendula ulmaria</i>	.	.	.	.	2	3	2	1	1	2	2	.	2	.	2	1	2	1	IV	
	<i>Lythrum salicaria</i>	.	.	.	.	2	1	1	1	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	IV	
	<i>Angelica silvestris</i>	2	.	.	2	1	1	1	2	2	.	4	2	2	.	1	.	1	.	IV	
	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	.	.	.	+	1	.	1	1	.	1	.	1	1	+	1	.	.	.	III	
	<i>Myosotis palustris</i>	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2	1	1	2	1	1	III	
	<i>Caltha palustris</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	+	2	.	1	.	1	+	.	III	
	<i>Cirsium oleraceum</i>	.	.	.	.	.	1	1	1	2	1	.	.	2	2	.	.	.	.	II	
	<i>Equisetum palustre</i>	.	.	.	.	.	+	+	.	.	1	.	1	.	.	.	.	3	1	II	
	<i>Crepis paludosa</i>	.	.	.	1	.	.	.	+	1	.	1	2	1	.	.	.	.	.	II	
	<i>Poa trivialis</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	II	
	<i>Anthriscus silvestris</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Juncus effusus</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I	
	<i>Geranium pratense</i>	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Lotus uliginosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	I	
	<i>Scirpus silvaticus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	.	I	
	<i>Symphytum officinale</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
B	<i>Ranunculus repens</i>	1	1	2	1	1	1	+	1	.	1	1	1	1	.	2	.	.	1	IV	
	<i>Geranium robertianum</i>	1	.	2	.	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	.	+	.	IV	
	<i>Lysimachia nummularia</i>	3	1	2	1	1	2	1	1	.	1	.	.	.	.	.	1	1	1	IV	
	<i>Geum urbanum</i>	2	2	1	.	2	2	1	2	1	.	1	1	.	2	.	.	.	1	IV	
	<i>Polygonum hydropiper</i>	.	1	.	1	1	1	+	1	2	1	.	.	1	.	1	.	.	.	III	
	<i>Eupatorium cannabinum</i>	.	.	.	2	2	.	1	.	2	.	.	2	1	2	1	.	1	2	III	
	<i>Geum rivale</i>	.	.	.	1	.	.	.	.	2	2	3	1	2	1	2	1	1	.	III	
	<i>Dryopteris spinulosa</i>	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	II	
	<i>Epilobium palustre</i>	.	.	.	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	1	II	
	<i>Valeriana sambucifolia</i>	.	.	.	+	1	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	II	
	<i>Athyrium filix-femina</i>	.	2	.	.	.	.	.	1	3	2	2	.	.	.	.	1	1	.	II	
	<i>Oxalis acetosella</i>	.	1	.	.	.	.	.	2	1	+	2	.	.	2	.	.	.	.	II	
	<i>Rubus idaeus</i>	.	1	.	1	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	II	
	<i>Viola palustris</i>	.	1	.	1	.	.	.	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	II	
	<i>Cardamine amara</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	2	.	1	.	.	.	.	.	II	
	<i>Mentha aquatica</i>	.	.	.	.	1	.	+	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Oxalis stricta</i>	.	1	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Rubus sp.</i>	.	3	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Calliergon cuspidatum</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	+	1	.	II	
	<i>Mnium affine</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	II	
	<i>Lapsana communis</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Galeopsis tetrahit</i>	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Ajuga reptans</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Taraxacum officinale</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Prunella vulgaris</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Rumex crispus</i>	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I	
	<i>Moschringia trinervia</i>	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Veronica chamaedrys</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Oscuta epithymum</i>	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Heracleum sphendylium</i>	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	<i>Viola riviniana</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	

zdjęcie /record/ 2 - *Mentha arvensis* /1/, *Plantago maior* +/,
Fragaria vesca +/, 6 - *Stellaria media* /1/, 9 - *Bidens tri-*
partitus +/, *Vicia sepium* /1/, 10 - *Majanthemum bifolium* +/,
Polygonum convolvulus /1/, *Climacium dendroides* /1/, *Mnium cus-*
pidatum +/, 11 - *Rumex acetosa* /1/, *Brachythecium rutabulum* +/,
 12 - *Brachythecium rutabulum* +/, 13 - *Rhytidiadelphus trigue-*
trus /1/, 15 - *Mnium punctatum* +/, *Selinum carvifolia* /1/, 16 -
Polygonum persicaria +/, 18 - *Mentha piperica* /1/, *Cuscuta eu-*
ropaea +/.

4. (153) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wilków, oddział 189f, dolina Mogielanki, drzewostan olszowy 39-letni.
5. (181) woj. skierniewickie, miejscowość Kurzeszyn, dolina Rawki, blisko koryta rzeki, młody drzewostan olszowy około 30-letni.
6. (182) woj. skierniewickie, miejscowość Kurzeszyn, dolina Rawki, około 100 m od poprzedniego zdjęcia, drzewostan różnowiekowy, najwięcej olsz około 60-letnich, okazy młodsze z odrośli i samosiewu.
7. (183) woj. skierniewickie, miejscowość Kurzeszyn, dolina Rawki, nad brzegiem rzeki, drzewostan jak w zdjęciu 6.
8. (13) woj. skierniewickie (Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie), uroczysko Głuchów, oddział 161, dolina Rawki, jednowiekowy drzewostan około 30-letni z sadzenia.
9. (404) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 239f, dolina dopływu Chojnatki, drzewostan tworzy olsza 49-letnia z domieszką młodszych okazów.
10. (31) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 240h, dolina małego cieku, dopływu Chojnatki, jednowiekowy drzewostan olszowy 46-letni z sadzenia.
11. (78) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Chojnata, oddział 267c, dolina Chojnatki, 42-letni drzewostan olszowy z młodszymi odroślowymi okazami.
12. (219) woj. radomskie, miejscowość Jeziora, południowy skraj lasu, dolina Jeziora, drzewostan olszowy około 50-letni z domieszką młodszych okazów.
13. (40) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 252f, dolina Chojnatki, drzewostan olszowy różnowiekowy, najstarsze olsze około 60-letnie.
14. (41) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 252f, dolina Chojnatki, drzewostan olszowy około 70-letni występujący w kępiastych skupieniach.
15. (300) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, dolina Pilicy, oddział 313k, drzewostan olszowy 30-letni z sadzenia.
16. (387) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 312h, dolina Pilicy, drzewostan tworzy 31-letnia olsza odroślowa.
17. (402) woj. skierniewickie, miejscowość Jajkowice, dolina niewielkiego dopływu Pilicy, na sąsiadujących łąkach prace melioracyjne, około 40-letni drzewostan odroślowy, obecność pniaków.
18. (312) woj. radomskie, około 1 km od Mogielnicy w kierunku północnym, dolina Mogielanki, różnowiekowy drzewostan olszowy, odroślowy, w sąsiedztwie łąki.

Grądy zajmowały w przeszłości znaczną powierzchnię badanego terenu. Płaski, wysoczyznowy obszar okolic Grójca stanowi w większości potencjalne siedlisko dla grądów i należy przypuszczać, że przed laty fitocenozy tego

zespołu porastały bez mała całą powierzchnię tych terenów. O żyzności siedlisk okolic Grójca i Mszczonowa świadczy nie tylko skład florystyczny ocalałych zbiorowisk grądowych, ale również sposób użytkowania gruntu przez rolnictwo. Ciepłe i żyzne gleby sprzyjają powszechnej uprawie drzew owocowych. Siedliska grądowe zostały z czasem zajęte pod uprawy rolne, a pozostałe, maksymalnie powierzchniowo ograniczone lasy, zniekształcone na skutek ciągłej ingerencji człowieka.

Grądy są zbiorowiskami zróżnicowanymi zarówno pod względem ekologicznym jak i geograficznym. Według podziału Traczyka (1962 a i b), grądy występujące na terenie Wysoczyzny Rawskiej powinny być zaliczone do zespołu *Tilio-Carpinetum* w odmianie mazowieckiej. Przemawiają za tym następujące fakty:

a) obecność gatunków charakterystycznych i wyróżniających zespołu (*Carpinus betulus*, *Tilia cordata*, *Stellaria holostea*, *Euonymus verrucosa*, *Galium schultesii*, *Isopyrum thalictroides*);

b) brak gatunków wyróżniających odmianę małopolską i mazurską;

c) położenie terenu poza zasięgiem buka, jodły i świerka.

Analiza 103 zdjęć fitosocjologicznych pozwoliła wyróżnić na Wysoczyźnie Rawskiej następujące typy fitocenoz grądowych:

- *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*,
- *Tilio-Carpinetum typicum*,
- *Tilio-Carpinetum typicum* postać degeneracyjna z *Pinus silvestris*,
- *Tilio-Carpinetum typicum* postać degeneracyjna z *Larix polonica*,
- grąd typowy silnie zdegenerowany.

4.4.1. *Tilio-Carpinetum stachyetosum silvaticae*,
grąd niski odmiany mazowieckiej – Tabela VII

Podzespół wilgotny grądu zajmuje na badanym terenie bardzo małą powierzchnię. Występuje równie rzadko jak ols i łęg olsowy. Największe płaty tego zbiorowiska spotyka się w uroczysku Osuchów, na płaskim terenie w oddziałach: 377, 378, 379, 374, 372. W uroczysku Dębina bardzo małe płaty zajmują lokalne, nieckowate zagłębienie terenowe. Równie nieznaczną powierzchnię porasta grąd niski w uroczysku Las Jeruzalski, w dolinie dopływu Chojnatki oraz w uroczyskach Jeziora i Żurawie (fot. 6) w lokalnych obniżeniach terenowych. Wykształca się na nieprzepuszczalnym podłożu z gliny, co decyduje przede wszystkim o odpowiednich warunkach wilgotnościowych dla tego zbiorowiska (Olaczek 1972).

Na Wysoczyźnie Rawskiej nie zachował się ani jeden płat w pełni naturalnego grądu niskiego. Najbardziej naturalną postać reprezentują w tabeli VII zdjęcia 9 i 10. Wszystkie pozostałe zdjęcia obrazują postaci degeneracyjne tego zbiorowiska, będące skutkiem powszechnego zniekształcenia drzewostanu w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej. Przeważającą formą degeneracji jest monotypizacja. Wielogatunkowy drzewostan, o dużym zwarcie koron, tworzy często dwie warstwy. Nie przypomina jednak swym składem drzewo-

Numer kolejny zdjęcia /Successive number of record/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Numer zdjęcia /No. of record/	77	209	335	212	216	210	211	405	20	418
Data /Date/	05 71	05 72	04 73	05 72	06 72	05 72	05 72	08 73	06 70	09 73
Miejscowość /Locality/	Db	Os	Os	Os	Jz	Os	Os	LJ	Db	LJ
Zwarcie warstwy drzew "a ₁ " w % /Density of tree layer "a ₁ " in %/	50	75	70	80	80	50	50	30	55	50
Zwarcie warstwy drzew "a ₂ " w % /Density of tree layer "a ₂ " in %/	-	-	-	-	50	60	65	50	45	20
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub "b" in %/	70	40	30	30	30	10	20	30	60	70
Pokrycie warstwy runa "c" w % /Cover of herb layer "c" in %/	95	90	95	100	100	90	100	100	85	90
Pokrycie warstwy mszyste "d" w % /Cover of moss layer "d" in %/	5	10	5	10	5	10	10	5	15	10
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of record in m ² /	400	400	400	400	400	400	400	200	500	200
Liczba gatunków w zdjęciu /Number of species in record/	53	46	42	47	36	48	50	42	55	45

Stałość
Constancy

Drzewa i krzewy
/Trees and shrubs/

AOh	Carpinus betulus	a ₁	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	V
	-"-	a ₂	.	.	.	.	2	3	3	.	3	1	
	-"-	b	1	2	2	2	2	1	1	2	2	+	V
	-"-	c	.	+	+	+	+	+	+	+	1	.	
B	Populus tremula	a ₁	.	2	2	4	2	1	1	1	1	.	V
	-"-	a ₂	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	
	-"-	b	.	1	1	1	.	1	1	.	.	.	III
	-"-	c	.	+	1	+	.	1	+	.	+	.	
	Betula verrucosa	a ₁	.	4	2	2	1	3	2	2	.	.	IV
	-"-	a ₂	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	
	-"-	b	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	II
	-"-	c	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	
	Quercus robur	a ₁	.	.	.	.	.	1	1	1	3	3	III
	-"-	a ₂	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
	-"-	b	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	
	-"-	c	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	II
AP	Padus avium	b	3	+	+	.	.	1	.	1	.	.	V
	-"-	c	1	1	+	+	+	+	+	+	1	.	
KOh	Crataegus monogyna	a ₂	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	II
	-"-	b	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	
	-"-	c	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	II
B	Alnus glutinosa	a ₁	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I
k	Alnus incana	a ₂	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	I
	-"-	c	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I
KOh	Acer pseudoplatanus	b	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	Cerasus avium	b	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I
	-"-	c	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	
	Fraxinus excelsior	b	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I

B	<i>Picea excelsa</i>	a ₁	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I
	-"- -"	a ₂	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	
	-"- -"	b	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I
	-"- -"	c	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	
	<i>Pinus silvestris</i>	a ₁	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I
KCh	<i>Corylus avellana</i>	b	2	2	.	1	.	2	2	3	2	4	.	IV
	-"- -"	c	.	.	.	+	.	.	+	+	1	+	.	
B	<i>Sorbus aucuparia</i>	b	1	1	.	.	.	1	1	1	1	.	.	IV
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	+	+	.	+	+	.	
	<i>Frangula alnus</i>	b	.	1	1	.	1	.	.	1	1	1	.	III
	-"- -"	c	.	+	1	.	+	.	.	+	+	+	.	
KCh	<i>Viburnum opulus</i>	b	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	III
	-"- -"	c	+	+	+	+	.	+	1	.	.	.	.	
	<i>Buonymus europaea</i>	b	+	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	II
	-"- -"	c	1	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	
	<i>Cornus sanguinea</i>	c	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	I
	<i>Buonymus verrucosa</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I
	-"- -"	c	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	
	<i>Sambucus nigra</i>	b	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
	-"- -"	c	1	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	
B	<i>Juniperus communis</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	
	<i>Firax communis</i>	c	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	I
KCh	<i>Rhamnus cathartica</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	
Rumc sielne i msaki /Herbs and moss/														
AGhd	<i>Stellaria holostea</i>		1	.	.	.	.	2	4	4	3	4	.	III
	<i>Isopyrum thalictroides</i>		/1/	.	+/	.	.	.	.	.	+/	.	.	I
	<i>Galium schultesii</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I
	<i>Ranunculus auricomus</i>		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I
AP	<i>Festuca gigantea</i>		1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	.	V
	<i>Stachys silvatica</i>		2	+	+	.	1	+	+	.	1	1	.	IV
	<i>Carex remota</i>		1	+	.	.	+	.	.	+	+	1	.	III
	<i>Mnium undulatum</i>		1	1	+	+	1	1	.	.	1	+	.	IV
	<i>Picaria verna</i>		/4/	/3/	/2/	/1/	.	/3/	.	.	.	.	.	III
	<i>Stellaria nemorum</i>		+	.	+	.	.	.	.	3	.	2	.	II
	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>		/1/	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Astrantia maior</i>		1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
OCh	<i>Catharina undulata</i>		+	1	1	1	1	1	1	1	2	1	.	V
	<i>Galjebdolen luteum</i>		2	2	3	3	.	4	3	4	2	4	.	V
	<i>Scrophularia nodosa</i>		+	+	+	1	1	1	1	+	1	.	.	V
	<i>Dryopteris filix-mas</i>		.	1	1	1	2	+	1	2	.	1	.	IV
	<i>Sanicula europaea</i>		+	1	1	1	2	1	1	.	1	.	.	IV
	<i>Viola silvestris</i>		.	1	2	1	.	1	1	1	1	1	.	IV
	<i>Ranunculus lanuginosus</i>		+	+	1	1	.	.	1	1	+	2	.	IV
	<i>Polygonatum multiflorum</i>		1	.	.	1	.	+	1	+	1	1	.	IV
	<i>Asarum europaeum</i>		2	3	2	4	.	1	1	.	1	.	.	IV
	<i>Eurhynchium zetterstedtii</i>		1	2	2	.	.	1	.	1	.	1	.	III
	<i>Eurhynchium swartzii</i>		+	.	1	.	+	+	.	.	1	.	.	III
	<i>Paris quadrifolia</i>		+	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	II
	<i>Anemone ranunculoides</i>		/3/	/2/	/3/	.	.	.	.	.	.	.	.	II
	<i>Actaea spicata</i>		+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I
	<i>Epilobium montanum</i>		.	.	.	.	1	.	.	.	+	.	.	I
	<i>Adoxa moschatelina</i>		2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Milium effusum</i>		.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I

KCh	<i>Anemone nemorosa</i>	1	4	4	3	.	3	3	1	2	1	V
	<i>Aegopodium podagraria</i>	1	2	1	.	3	2	2	2	2	2	V
	<i>Melica nutans</i>	.	.	1	1	.	1	1	1	1	3	IV
	<i>Carex digitata</i>	1	1	2	1	.	1	1	.	.	.	III
	<i>Hepatica nobilis</i>	1	1	2	1	.	2	3	.	1	.	IV
	<i>Poa nemoralis</i>	.	.	1	.	1	1	.	1	.	2	III
	<i>Equisetum silvaticum</i>	+	.	.	.	2	.	.	3	+	2	III
	<i>Carex silvatica</i>	.	1	1	1	.	1	1	.	.	.	III
	<i>Hedera helix</i>	.	1	1	.	.	1	2	.	.	.	III
	<i>Gagea pratensis</i>	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Campanula trachelium</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I
	<i>Viola mirabilis</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
B	<i>Oxalis acetosella</i>	2	2	2	4	3	3	3	2	2	1	V
	<i>Ajuga reptans</i>	1	1	+	2	2	2	2	1	2	3	V
	<i>Maianthemum bifolium</i>	1	1	.	1	1	1	1	1	2	+	V
	<i>Moeblingia trinervia</i>	.	1	1	2	1	1	1	1	1	.	IV
	<i>Viola riviniana</i>	.	1	+	1	1	1	1	.	1	+	IV
	<i>Geum urbanum</i>	1	1	+	1	.	.	1	1	1	.	IV
	<i>Geranium robertianum</i>	+	.	.	+	1	.	+	1	1	.	III
	<i>Ranunculus repens</i>	+	.	+	1	1	+	.	.	1	.	III
	<i>Mnium affine</i>	+	.	.	+	.	+	.	+	.	+	III
	<i>Fragaria vesca</i>	.	1	.	+	.	.	1	1	.	+	III
	<i>Mycelis muralis</i>	+	.	.	2	2	1	.	.	1	.	III
	<i>Urtica dioica</i>	2	.	.	.	2	.	.	1	.	1	II
	<i>Deschampsia caespitosa</i>	.	.	.	1	.	.	.	2	1	2	II
	<i>Luzula pilosa</i>	.	.	+	.	.	1	1	.	1	.	II
	<i>Polytrichum commune</i>	1	1	.	.	.	.	.	.	1	+	II
	<i>Veronica chamaedrys</i>	.	.	.	1	.	.	1	.	1	+	II
	<i>Lysimachia vulgaris</i>	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	II
	<i>Lysimachia nummularia</i>	.	.	.	+	1	.	.	.	1	.	II
	<i>Geum rivale</i>	1	.	.	.	1	.	.	.	.	+	II
	<i>Athyrium filix-femina</i>	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	II
	<i>Pohlia nutans</i>	.	+	.	1	.	.	+	.	.	.	II
	<i>Hieracium lachenalii</i>	.	.	.	.	.	+	1	.	1	.	II
	<i>Veronica officinalis</i>	.	.	.	.	.	.	+	.	1	+	II
	<i>Lophocolea bidentata</i>	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Lophocolea heterophylla</i>	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	I
	<i>Mnium punctatum</i>	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	I
	<i>Rubus idaeus</i>	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Dolichotheca seligerii</i>	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	I
	<i>Mnium cuspidatum</i>	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	I
	<i>Brachythecium rutabulum</i>	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	I
	<i>Frientalis europaea</i>	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	I
	<i>Rubus sp.</i>	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	I
	<i>Vaccinium myrtillus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	I

Gatunki sporadyczne
/Sporadic species/ :

zdjęcie /record/ 1 - *Caltha palustris* /1/,
2 - *Climacium dendroides* /+/, 5 - *Galium rotundifolium* /2/, *Anthriscus silvestris* /+/,
Cyrtophyllum piliferum /+/, 6 - *Polytrichum attenuatum*, *Thuidium tamariscifolium* /+/, 7 -
Hieracium murorum /+/, *Dryopteris spinulosa* /1/,
Pteridium aquilinum /1/, *Luzula multiflora* /+/,
Dicranella heteromalla /+/, *Brachythecium velutinum* /+/, 8 - *Galeopsis tetrahit* /+/, 9 - *Solidago virga-aurea* /+/, *Anthoxanthum odoratum* /1/, 10 -
Galium mollugo /+/, *Melampyrum pratense* /1/ *Hypericum perforatum* /+/>.

Fot. 6. Pojedyncza, stara olsza czarna w grądzie wilgotnym. Uroczysko Żurawie
 Photo. 6. Single old black alder in *Tilio-Carpinetum stachyetosum*. Żurawie range

Fot. J. Siciński

stanu właściwego dla grądów, składa się głównie z brzozy i osiki, z domieszką dębu szypułkowego i grabu. *Betula verrucosa* i *Populus tremula* są w większości płatów dominującymi składnikami wyższej warstwy drzewostanu (zdjęcia 2-7). Największe płaty grądu niskiego z drzewostanem brzozowo-osikowym występują w uroczysku Osuchów. *Populus tremula* osiąga wiek 50-70 lat. *Betula verrucosa* 55-60. Ten typ drzewostanu występuje zwykle na nieodnowionym zrębie zupełnym. Na miejsce drzew grądowych (*Quercus robur*, *Tilia cordata*) wkraczają samosiewne gatunki światłolubne.

Płat podzespołu reprezentowany w tabeli VII przez zdjęcie 1 nawiązuje najbardziej swym charakterem do zbiorowiska lęgowego. Panuje tu w drzewo-

stanie *Alnus glutinosa*, a w podszyciu *Padus avium*. Przykładem neofityzacji podzespołu jest zdjęcie 8, gdzie niższą warstwę drzew tworzy sadzona *Alnus incana*. Z kolei zdjęcie 5 reprezentuje płat, w którym obok gatunków światłolubnych (*Betula verrucosa* i *Populus tremula*) występuje *Pinus silvestris* i *Picea excelsa*. Jest to przykład pinetyzacji fitocenozy grądu niskiego. *Quercus robur* jedynie w dwóch zdjęciach (9 i 10) jest podstawowym gatunkiem w drzewostanie. Sporadycznie w niższej warstwie drzew występują: *Crataegus monogyna* i *Padus avium*.

Podszycie jest dobrze rozwinięte, osiąga przeciętnie 40% zwarcia, w niektórych płatach zaobserwowano nadmierny rozwój tej warstwy, będący skutkiem przersedzania drzewostanu. Przykładem fruticetyzacji są zdjęcia 1, 9 i 10.

Podzespół wilgotny grądu jest zbiorowiskiem odznaczającym się dużą odpornością na działanie czynników antropogenicznych. Nawet zupełne przekształcenie drzewostanu nie pociąga za sobą istotnych zmian w składzie runa zielnego. W zdjęciu fitosocjologicznym występuje przeciętnie 46 gatunków, w tym liczne gatunki charakterystyczne związku oraz wyróżniające dla podzespołu.

W rozwoju runa zaznaczają się wyraźnie dwa aspekty sezonowe: wiosenny i letni. W warstwie tej znaczną rolę odgrywają gatunki związku *Alno-Padion*, wyróżniające podzespół grądu niskiego. Wśród nich największą stałość osiągają: *Festuca gigantea*, *Stachys silvatica*, *Mnium undulatum*, *Carex remota* i *Ficaria verna*. Liczna jest grupa gatunków rzędu *Fagetalia* (17 gatunków) i klasy *Quercu-Fagetea*.

Runo mszyste pokrywa przeciętnie 8,5% powierzchni. Głównymi komponentami tej warstwy są: *Catharinea undulata*, *Eurhynchium zetterstedtii*, *Mnium undulatum*.

Stanowiska zdjęć w tabeli VII

1. (77) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Dębina, oddział 31b, nieckowate obniżenie terenowe, drzewostan tworzy 53-letnia olsza czarna z domieszką grabu.
2. (209) woj. skierniewickie, ndl. Skuły, uroczysko Osuchów, oddział 373c, teren równy, drzewostan buduje brzoza i osika w wieku 50 lat.
3. (335) woj. skierniewickie, ndl. Skuły, uroczysko Osuchów, oddział 377h, teren równy, drzewostan składa się z brzozy i osiki z domieszką grabu, wiek drzewostanu 66 lat.
4. (212) woj. skierniewickie, ndl. Skuły, uroczysko Osuchów, oddział 377h, w drzewostanie dominuje *Populus tremula*, domieszka *Betula verrucosa* i *Carpinus betulus*.
5. (216) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Jeziora, oddział 92i, lokalne obniżenie terenu, gleba gliniasta, drzewostan mieszany, dwuwarstwowy i wielogatunkowy, najwięcej jest grabu i osiki, w domieszcze brzoza, sosna i świerk.
6. (210) woj. skierniewickie, ndl. Skuły, uroczysko Osuchów, oddział 373b, drzewostan mieszanv. dwuwarstwowy, dominacja brzozy i grabu, wiek drzewostanu 55 lat.

7. (211) woj. skierniewickie, ndl. Skuły, uroczysko Osuchów, oddział 372c, teren płaski, drzewostan jak w zdjęciu 6.
8. (405) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 240c, dolina niewielkiego dopływu Chojnatki, drzewostan tworzy około 30-letnia *Alnus incana*, w domieszce brzoza, osika i dąb szypułkowy.
9. (20) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Dębina, oddział 31a, niewielkie obniżenie lokalne, drzewostan dwuwarstwowy, warstwę wyższą tworzą 132-letnie dęby, w niższej dominuje grab.
10. (418) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 240h, dolina dopływu Chojnatki, sąsiedztwo łągu olszowego, drzewostan dwuwarstwowy, w warstwie wyższej występują nieliczne około 160-letnie dęby, w niższej brzoza z domieszką grabu i osiki.

4.4.2. *Tilio-Carpinetum typicum*,

grąd typowy odmiany mazowieckiej, postać naturalna – Tabela VIII

Grąd typowy o charakterze naturalnym jest obecnie w badanym terenie rzadko spotykanym zbiorowiskiem. Pojedyncze płaty, zajmujące małą powierzchnię, zachowały się w miejscach niedostępnych lub też na terenach objętych ochroną rezerwatową. Stwierdzono je w rezerwacie Modrzewina k. Małej Wsi (woj. radomskie), w uroczysku Tomczyce (woj. radomskie), gdzie zajmuje teren odgraniczony stromym stokiem doliny Pilicy oraz korytem rzeki, w uroczysku Las Jeruzalski (woj. skierniewickie), gdzie grąd zachował się w dolinie dopływu Chojnatki, na lokalnej „terenowej wyspie”, otoczonej z jednej strony ciekim, a z drugiej pasem sąsiadującego łągu jesionowo-olszowego. W niewielkiej odległości od tego płatu zachowały się nieliczne stare dęby i graby. Są one pozostałością i świadectwem rosnących tu przed laty grądów. Najstarszy, wiekowy dąb z Lasu Jeruzalskiego osiąga obwód 4,5 m i zasługuje na miano pomnika przyrody (fot. 7). O terenach tych pisał Łapczyński (1892), że kraj ten „...przed laty zalegała puszcza korabiewska. Dziś istnieje tylko wieś z nazwą Puszcza Korabiewska”. Wspomina także o „...polach piaszczystych z dawnej puszczy wyrobionych...”.

Tilio-Carpinetum typicum wykształca się na glebach żyznych. Są to gleby płowe, rzadziej brunatne, wytworzone z glin zwałowych i piasków gliniastych.

Grąd typowy na Wysoczyźnie Rawskiej to wielowarstwowe zbiorowisko lasu liściastego o dużym zwarciu drzewostanu, tworzącego wyraźne dwie warstwy (fot. 8). Wyższą warstwę buduje dąb szypułkowy, niekiedy towarzyszy mu z mniejszym udziałem dąb bezszypułkowy. Warstwę niższą drzewostanu tworzy przede wszystkim grab. Znaczny udział w poszczególnych płatach zbiorowiska mają też: lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata i wiąz szypułkowy. Jako niewielka domieszka w niektórych płatach występuje olsza czarna i czeremcha. Warstwa podszycia, sięgająca przeciętnie 30% zwarcia, utworzona jest głównie przez leszczykę oraz podrosty grabu i lipy.

Numer kolejny zdjęcia /Successive number of record/	1	2	3
Numer zdjęcia /No. of record/	275	372	424
Data	13	25	18
/Date/	07	06	05
Miejscowość	72	73	75
/Locality/	Md	Tm	LJ
Zwarcie warstwy drzew "a ₁ " w % /Density of tree layer "a ₁ " in % /	75	40	30
Zwarcie warstwy drzew "a ₂ " w % /Density of tree layer "a ₂ " in % /	30	70	40
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub layer "b" in % /	20	15	60
Pokrycie warstwy runa "c" w % /Cover of herb layer "c" in % /	100	100	90
Pokrycie warstwy mszystej "d" w % /Cover of moss layer "d" in % /	-	5	5
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of recor in m ² /	400	200	200
Liczba gatunków w zdjęciu /Number of species in record/	34	35	45

Drzewa i krzewy

/Trees and shrubs/

B	Quercus robur	a ₁	4	3	3
	"- " -"	b	+	1	+
	"- " -"	c	+	.	1
ACh	Carpinus betulus	a ₂	2	4	2
	"- " -"	b	2	2	2
	"- " -"	c	+	+	+
KCh	Crataegus monogyna	b	1	1	.
	"- " -"	c	+	.	.
VCh	Tilia cordata	a ₂	2	.	.
	"- " -"	b	2	.	.
	"- " -"	c	+	.	.
B	Quercus sessilis	a ₁	2	.	.
KCh	Ulmus laevis	a ₂	.	2	.
	Tilia platyphyllos	a ₂	.	2	.
	"- " -"	c	.	+	.
B	Betula verrucosa	a ₂	.	.	2
	Alnus glutinosa	a ₂	.	.	1
	"- " -"	c	.	.	+
VP	Populus tremula	c	.	.	1
OCh	Padus avium	a ₂	.	.	1
	"- " -"	b	.	.	1
	"- " -"	c	.	.	1
KCh	Corylus avellana	b	2	2	4
	"- " -"	c	+	+	+
	Lonicera xylosteum	b	1	.	.
B	Frangula alnus	b	.	.	1
	"- " -"	c	+	.	1
	Sorbus aucuparia	c	.	.	+
	Juniperus communis	b	.	.	+
	"- " -"	c	.	.	+

Runo zielne i mszaki
/Herbs and moss/

ACh	<i>Stellaria holostea</i>	.	.	4
OCh	<i>Festuca gigantea</i>	2	1	+
	<i>Dryopteris filix-mas</i>	2	4	.
	<i>Epilobium montanum</i>	+	2	.
	<i>Catharinea undulata</i>	.	1	1
	<i>Scrophularia nodosa</i>	.	1	1
	<i>Polygonatum multiflorum</i>	.	2	+
	<i>Sanicula europaea</i>	2	.	.
	<i>Asperula odorata</i>	3	.	.
	<i>Pulmonaria obscura</i>	.	.	1
	<i>Stachys silvatica</i>	.	.	+
KCh	<i>Melica nutans</i>	1	2	2
	<i>Anemone nemorosa</i>	3	1	2
	<i>Calamintha vulgaris</i>	1	+	.
	<i>Poa nemoralis</i>	.	2	2
	<i>Aegopodium podagraria</i>	.	3	2
	<i>Campanula trachelium</i>	1	.	.
	<i>Equisetum silvaticum</i>	.	.	3
	<i>Galeobdolon luteum</i>	.	.	3
	<i>Carex digitata</i>	.	.	1
MA	<i>Deschampsia caespitosa</i>	1	1	1
	<i>Dactylis glomerata</i>	+	1	.
	<i>Anthriscus silvestris</i>	.	2	.
	<i>Lysimachia vulgaris</i>	.	.	1
B	<i>Oxalis acetosella</i>	4	2	2
	<i>Ajuga reptans</i>	2	1	2
	<i>Fragaria vesca</i>	1	1	1
	<i>Veronica chamaedrys</i>	1	1	1
	<i>Moehringia trinervia</i>	+	2	2
	<i>Rubus sp.</i>	.	1	1
	<i>Geranium robertianum</i>	+	2	.
	<i>Lapsana communis</i>	+	1	.
	<i>Urtica dioica</i>	1	.	1
	<i>Athyrium filix-femina</i>	1	.	1
	<i>Viola riviniana</i>	1	.	1
	<i>Majanthemum bifolium</i>	1	.	1
	<i>Luzula pilosa</i>	+	.	+
	<i>Dryopteris spinulosa</i>	2	.	.
	<i>Stellaria media</i>	.	1	.
	<i>Geum urbanum</i>	.	1	.
	<i>Galium aparine</i>	.	1	.
	<i>Convallaria maialis</i>	.	2	.
	<i>Hieracium lachenalii</i>	.	.	1

Gatunki sporadyczne : zdjęcie /record/ 1 - *Hypericum perforatum* /+/, *Galeopsis tetrahit* /+/, 2 - *Astragalus glycyphyllos* /+/, *Sedum maximum* /+/, 3 - *Luzula multiflora* /+/, *Tridentalis europaea* /+/, *Brachythecium rutabulum* /+/, *Mnium affine* /+/>.

Fot. 7. Pomnikowy okaz
Quercus robur. Uroczy-
sko Las Jeruzalski
Photo. 7. Nature monu-
ment — *Quercus robur*.
Las Jeruzalski range

Runo zielne jest bujnie rozwinięte, pokrywa przeciętnie 87% powierzchni. Udział poszczególnych gatunków w tej warstwie jest zróżnicowany, ponieważ jedyne trzy płaty naturalnego grądu typowego, reprezentowane w tabeli VIII, pochodzą z trzech różnych uroczysk leśnych, znacznie od siebie oddalonych. Wykształcają się na odmiennych topograficznie terenach, nie bez znaczenia jest także sąsiedztwo różnych zbiorowisk leśnych. I tak, w grądzie z Modrzewiny dominują w runie: *Asperula odorata*, *Anemone nemorosa* i *Oxalis acetosella*. W płacie z uroczyska Tomczyce panującymi gatunkami są: *Dryopteris filix-mas*, *Aegopodium podagraria*, natomiast w uroczysku Las Jeruzalski — *Stellaria holostea*, *Equisetum silvaticum* i *Galeobdolon luteum*.

W składzie florystycznym grądu typowego, grupę dominującą stanowią gatunki rzędu *Fagetalia* (12) i klasy *Querco-Fagetea* (15). Spośród gatunków charakterystycznych dla zespołu występuje tu *Carpinus betulus* i *Stellaria holostea*. Dość często spotyka się gatunki z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*.

Fot. 8. *Tilio-Carpinetum typicum*. Uroczysko Babsk

Photo. 8. *Tilio-Carpinetum typicum*. Babsk range

Fot. J. Hereźniak

Stanowiska zdjęć w tabeli VIII

1. (275) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Modrzewina, oddział 157a, teren płaski, drzewostan dębowy 70-letni, niższą warstwę tworzy lipa drobnolistna i grab.
2. (372) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 320d, między stromym zboczem doliny Pilicy a korytem rzeki, drzewostan tworzą około 80-letnie dęby, niższą warstwę buduje grab z domieszką lipy.
3. (423) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 241d, w dolinie cieku, dopływu Chojnatki, w sąsiedztwie łąg olszowy, drzewostan tworzą nieliczne około 100-letnie dęby, niższą warstwę buduje grab i brzoza z domieszką czarernchy i olszy czarnej.

4.4.3. *Tilio-Carpinetum typicum*,

postać degeneracyjna z *Larix polonica* – Tabela IX

Modrzewina jest, obok Trębaczewa, jednym z nielicznych poza Górami Świętokrzyskimi, stanowisk modrzewia polskiego na obszarze Polski środkowej (Kobendza 1925, Tumiłowicz 1955). Jest jednocześnie obecnie najbardziej wysuniętym na północ wyspowym skupieniem tego gatunku na badanym terenie.

Larix polonica, występujący w Modrzewinie od dawna był obiektem zainteresowań botaników, leśników i dendrologów. Pierwszą wzmiankę o występowaniu modrzewia krajowego na zachód od Grójca, w prywatnym naówczas lesie, zawiera praca Paxa (1918). Kobendza (1925) podał morfologiczną charakterystykę drzewostanu, cechy siedliska jak również ogólny, florystyczny opis lasu. W pracy tej autor nadmienia, że Kołodziejczyk już w 1922 roku trafnie wyraził przypuszczenie, iż modrzew w Małej Wsi k. Grójca może być modrzewiem polskim. W 1927 roku utworzono rezerwat „Modrzewina”, obejmujący początkowo powierzchnię 7 ha. Obecnie powierzchnia tego rezerwatu wynosi 336,95 ha (Szafer 1959, 1972). Problem naturalnego odnowienia i zachowania modrzewia polskiego z Modrzewiny przedstawił Zera (1930). Tumiłowicz (1955) podał obszerną charakterystykę drzewostanu z Modrzewiny, porównując go jednocześnie z modrzewiem polskim z Trębaczewa. Porusza on także problem naturalnego odnowienia modrzewia polskiego na tym terenie. Autor stwierdza, że tutejsze modrzewie osiągają o wiele większe rozmiary w porównaniu z *Larix polonica* z Trębaczewa. O stanowisku *Larix polonica* w Małej Wsi wspomina też Mowszowicz (1961).

Wymienione prace poświęcone są głównie drzewostanowi modrzewia polskiego z Modrzewiny, niekiedy z uwzględnieniem ogólnej fizjonomiczno-florystycznej charakterystyki lasu. Brak w nich natomiast fitosocjologicznego ujęcia i opisu występujących tu fitocenoz. Praca niniejsza podaje zatem pierwszy pełny opis zbiorowisk roślinnych tego znanego rezerwatu.

Postać grądu typowego z *Larix polonica* zajmuje większą część powierzchni uroczyska Modrzewina. Występuje nie tylko na terenie rezerwatu, ale również poza jego granicami, z wyjątkiem wschodniej części uroczyska. W niewielkiej odległości od Modrzewiny, w uroczyskach: Łęczeszyce, Wiatrowiec-Machnatka, Dańków spotyka się pojedyncze okazy starych modrzewi. Fakt ten pozwala przypuszczać, że *Larix polonica* zajmował w przeszłości na tym terenie o wiele większą powierzchnię.

Uroczysko Modrzewina zajmuje zupełnie płaski, wysoczyznowy teren, otoczony polami uprawnymi i sadami, Podłoże całego obszaru stanowią umiarkowanie wilgotne gliny ciężkie i średnie jak również piaski gliniaste. Rodzaje gleb występujące w uroczysku Modrzewina obrazują opisy profili glebowych, podane według Planu Urzędzeniowego Nadleśnictwa Grójec na lata 1967-1976:

— profil glebowy w oddziale 150d

Gleba brunatna, zdegradowana, wytworzona z utworów pyłowych zwykłych, zalegających na glinie średniej ciężkiej.

A₀ — około 1-2 cm, ściółka;

A₁ — 0-18 cm, szaro-płowy, pulchny, silnie ukorzeniony, średnio próchniczny utwór pyłowy zwykły, pH 4.3

A₁/B — 18-40 cm, jasnoszaro-płowy utwór pyłowy zwykły, u spodu poziomu drobne kamienie, pH 4.25;

- B/D – 40-80 cm, glina średnia o zabarwieniu brunatnym z jaśniejszymi pionowymi smugami piasku, miejscami kamienie, pH 4,4;
- D – poniżej 80 cm, glina ciężka o zabarwieniu szaro-brunatnym, miejscami plamy o odcieniu oliwkowym, pojedyncze, małe kamienie, poniżej 160 cm wykazuje burzenie z kwasem solnym, pH 7.1.

– profil glebowy w oddziale 152a

Gleba brunatna zdegradowana, wytworzona z utworów pyłowych zwykłych, zalegających płytko na glinie lekkiej, średniej.

- A₀ – około 1 cm, ściółka;
- A₁ – 0-10 cm, ciemny, z głębokością stopniowo jaśniejący, silnie próchniczny utwór pyłowy zwykły, struktura gruzelkowata, przejście stopniowe, pH 4,7;
- B – 10-45 cm, płowy utwór pyłowy zwykły, słabo spoisty, pH 4,2;
- B D – 45-70 cm, jasnobrunatna glina lekka z gniazdami, smugami piasku gliniastego, w górnej części poziomu drobne kamienie, pH 4,7;
- D – poniżej 70 cm, glina lekka o zabarwieniu brunatnym, od 150 cm w głąb glina średnia, poniżej 170 cm wykazuje burzenie z kwasem solnym, pH 7,0;

– profil glebowy w oddziale 146h

Gleba bielkowa, oglejona, słabo średnio zbielcowana, wytworzona z utworów pyłowych zwykłych, podścielonych piaskiem gliniastym, lekkim, zalegającym średnio głęboko na glinie średniej ciężkiej.

- A₀ – około 4-5 cm ściółka oraz 3-4 cm butwina włóknista;
- A₁/A₂ – 0-4 cm, jasnoszary, słabo próchniczny utwór pyłowy, pH 4,0;
- A₂/B – 4-40 cm, jasnopłowy utwór pyłowy zwykły, pH 4,7, 40-70 cm, jasnopłowy, drobnoziarnisty piasek gliniasty lekki z warstewką drobnego piasku luźnego pH 5,2;
- D G – poniżej 70 cm, glina średnia, przechodząca stopniowo z głębokością w glinę ciężką, zabarwioną brunatno z sinawymi plamami i smugami.

– profil glebowy w oddziale 157

Gleba bielkowa, skrytozbielcowana, wytworzona z utworów pyłowych zwykłych, zalegających średnio głęboko na glinie średniej

- A₀ – około 1 cm ściółka w dobrym stanie rozkładu;
- A₁ – 0-10 cm, poziom ciemnoszaro-płowy, średnie, próchniczne utwory pyłowe zwykłe, przejście dość wyraźne, pH 4,6;
- B – 10-60 cm, płowy utwór pyłowy zwykły, w zasięgu poziomu drobne kamienie, pH 4,5;
- D – poniżej 60-70 cm, jasnobrunatny, glina lekka, przechodząca z głębokością w glinę średnią, pH 5,1.

– profil glebowy w oddziale 156g

Gleba bielkowa, skrytozbielcowana, wytworzona z utworów pyłowych zwykłych, podścielonych piaskiem gliniastym, pylistym, zalegającym średnio głęboko na glinie lekkiej do średniej.

- A₀ – około 1 cm, ściółka w dobrym stanie rozkładu;
- A₁ – 0-8 cm, szaro-płowy, słabo próchniczny utwór pyłowy, pH 4,5;
- A₂/B – 8-30 cm, jasnopłowy utwór pyłowy zwykły, 30-80 cm, jasnopłowy, drobnoziarnisty piasek gliniasty, pylisty, pH 5,2;
- D – poniżej 80 cm, brunatnawa glina lekka, silnie spiszczona, przechodząca z głębokością stopniowo w glinę średnią.

Fot. 9. Wnętrze lasu w rezerwacie Modrzewina
Photo. 9. Forest interior in Modrzewina reservation

Fot. J. Siciński

Fot. 10. Przestoje *Larix polonica* w rezerwacie Modrzewina
Photo. 10. Superannuated *Larix polonica* in Modrzewina reservation

Fot. J. Siciński

Grąd typowy z modrzewiem polskim posiada specyficzną fizjonomię i skład florystyczny. Jest to wielowarstwowe, bogate w gatunki zbiorowisko leśne z imponującym starodrzewiem (fot. 9). W rezerwacie, obejmującym oddziały 151 i 152, występują najstarsze modrzewie i dęby. Ta część uroczyska posiada najbardziej pierwotny charakter. Przeciętnie w zdjęciu fitosocjologicznym występuje tu 35 gatunków, osiągają one wysoką stałość i pokrycie.

Najwyższą warstwę drzewostanu budują potężne modrzewie o ażurowych koronach i szablanych pniach (fot. 10). Średni wiek drzewostanu modrzewiowego wynosi 170-220 lat, przeciętne wymiary 80 cm pierśnicy i 34 m wysokości (Tumiłowicz 1955). Autor ten ocenił wiek najstarszego modrzewia „Wojewody”, zniszczonego w 1945 r. w czasie działań wojennych, na 300 do 320 lat. Obecnie można oglądać jedynie pozostałe po nim resztki pnia. Kobendza (1925) pisząc o „Wojewodzie” przyjął jego wiek na około 400 lat. Zwrócił także uwagę na modrzewiowo-dębowy charakter drzewostanu na tym terenie. *Larix polonica* nie tworzy litych drzewostanów, nawet gdy występuje w większych skupieniach zawsze zmieszany jest z dębem.

Sędziwy wiek modrzewi przemawia za naturalnością tego stanowiska. Kobendza (1925) twierdził, że rodzimość *Larix polonica* w Małej Wsi nie ulega żadnej wątpliwości. Autor uważał, że oprócz wieku najstarszych okazów przemawia za tym także ogólny charakter lasu, pierwotność roślinności zielnej. Nie stwierdzono natomiast odnawiania się modrzewia w uroczysku Modrzewina. Niższa warstwa drzew liściastych, jak również bujne podszycie, utrudniają przedostanie się wyjątkowo lekkich nasion modrzewia do gleby. Nawet gdy nasionom uda się wykiełkować, to siewki w krótkim czasie zostają zupełnie zagłuszone przez bujną roślinność zielną i giną. Na fakt ten zwrócił uwagę zarówno Kobendza (1925) jak i Tumiłowicz (1955). Podobne wnioski, dotyczące problemu odnawiania modrzewia, przedstawił Głazek (1973), opisując zbiorowisko grądowe z *Larix polonica* z przedpoła Gór Świętokrzyskich.

Wydaje się jednak, że modrzew nie jest naturalnym składnikiem fitocenozy grądu na badanym terenie. Sędziwy wiek modrzewi nie jest dostatecznym argumentem jego naturalnego pochodzenia. *Larix polonica* nie odnawia się w omawianym zbiorowisku, co potwierdza przypuszczenie, iż został tu posadzony. Dlatego też uznano obecność modrzewia polskiego w grądzie z Modrzewiny za przejaw synantropizacji tej fitocenozy sądząc, iż został on w przeszłości sztucznie tu wprowadzony (Bałut 1962, Zaręba 1965). Uwaga ta odnosi się do obecności *Larix polonica* w grądzie z Modrzewiny i nie podważa poglądu o tym, że modrzew polski na Wysoczyźnie Rawskiej mógł rosnąć jako gatunek rodzimy.

W płatach zbiorowiska z młodszym drzewostanem modrzewiowym, w uroczysku Modrzewina, dorównują mu wysokością dęby. Występują tu obydwie gatunki *Quercus robur* i *Q. sessilis*. Najstarsze okazy dębów osiągają wiek około 200 lat. Znacznie większy udział w całym zbiorowisku

mają jednak dęby młodsze, tworzące zwykle drugą, niższą warstwę drzewostanu. W niektórych oddziałach leśnych poza granicami rezerwatu, występują młode drzewostany dębowe (30-50 lat) z domieszką równie młodych modrzewi. W nielicznych przypadkach panuje w drzewostanie *Pinus silvestris* (zdjęcie 18 i 19). Najczęściej sosna występuje jako domieszka, podobnie jak brzoza, świerk, osika i jesion. Niższa warstwa drzew osiąga najczęściej bardzo duże zwarcie. Największy udział mają tu: *Carpinus betulus* i *Tilia cordata*.

Podszycie jest bujnie rozwinięte, osiąga przeciętnie 50-60% zwarcia. Podstawowym gatunkiem tej warstwy, osiągającym największą wysokość i pokrycie, jest *Corylus avellana*. Często występują także: *Frangula alnus*, *Sorbus aucuparia*, *Lonicera xylosteum*, *Sambucus nigra*. W niektórych płatach prześwietlenie w drzewostanie spowodowało nadmierny rozwój podszycia – fruticetyzację (zdjęcie 4, 8, 14, 20-22). Zakrzewienie nie wywołało jednak wyraźnych zmian ani zubożenia runa.

Wśród roślinności zielonej runa można wyróżnić trzy warstwy. Najwyższą tworzą wysokie trawy: *Bromus benekenii* i *Festuca gigantea*, jak również paprocie, z których największym pokryciem i rozmiarami odznacza się *Dryopteris filix-mas*. Niżej rosną: *Asperula odorata*, *Circaea lutetiana* i *Galium rotundifolium*, tworzące najczęściej duże łanowe skupienia. Są to gatunki dominujące w letnim aspekcie runa. Ze znacznym pokryciem występują w tej warstwie także: *Sanicula europaea*, *Geranium robertianum*, *Mycelis muralis* i inne. Warstwa najniższa to głównie rośliny wczesnowiosenne: *Anemone nemorosa*, *Viola silvestris*, *V. riviniana*, *Potentilla sterilis*, *Oxalis acetosella*, *Ajuga reptans*, *Fragaria vesca*. Słabo jest rozwinięta na terenie uroczyska warstwa mszysta, pospolicie występuje tu tylko *Catharinea undulata*. Zwraca uwagę udział w runie gatunków rzędu *Fagetalia*, z których największym pokryciem oznaczają się: *Asperula odorata*, *Dryopteris filix-mas*, *Sanicula europaea* i *Viola silvestris*. Brak natomiast gatunków charakterystycznych dla zespołu. Stosunkowo wysoką stałość oraz znaczne pokrycie wykazują gatunki ze związku *Alno-Padion*, głównie *Festuca gigantea* i *Circaea lutetiana*. Reprezentują one najwilgotniejsze skrzydło grądu typowego w uroczysku Modrzewina. Spośród gatunków, reprezentujących klasę *Querco-Fagetea*, najczęściej występują *Anemone nemorosa* i *Catharinea undulata*.

W grądzie z Modrzewiny stwierdzono degenerację fitocenozy, objawiającą się w formie pinetyzacji. Już Kobendza (1925) pisał: „Na całym lesie odbija się obecnie duży wpływ człowieka. Widać tu próby sadzenia na większą skalę gatunków obcych temu terenowi jak: *Pinus silvestris*, *P. Banksiana*, *Picea excelsa*”. Tak więc wprowadzenie do uprawy sosny, wniknięcie światłolubnej brzozy (zdjęcie 17) wpłynęło na pojawienie się w runie gatunków borowych i łąkowych. Należy przypuszczać, że w płatach, gdzie obecnie sosny nie ma, a gdzie w runie występują gatunki borowe, rosła ona w przeszłości i została wycięta. Pinetyzację stwierdzono w oddziałach uroczyska nie wchodzących w skład rezerwatu. Niewielki na ogół udział gatunków z klasy *Vaccinio-Piceetea* świadczy, iż zbiorowisko grądowe z Modrzewiny

wykazuje dość dużą odporność na działanie zabiegów gospodarczych. Zmiany w składzie drzewostanu nie pociągnęły za sobą istotnych przekształceń w runie. Rośliny borowe stanowią tylko domieszkę w warstwie roślinności zielnej, dominują tu zdecydowanie gatunki grądowe.

Larix polonica bardzo rzadko tworzy czyste modrzewiny; zwykle występuje jako składnik drzewostanów mieszanych (Bałut 1962). Potwierdzają ten fakt liczne prace, opisujące różne zbiorowiska leśne z udziałem *Larix polonica*. I tak z rezerwatu „Trębaczew” został opisany zespół *Potentilla albae-Quercetum* z *Larix polonica* (Mowszowicz i in. 1963). W rezerwacie „Świnia Góra” modrzew polski występuje w wielu zbiorowiskach, między innymi w *Querceto-Carpinetum* (Fabijanowski i Zarzycki 1965). Zbiorowisko grądowe z udziałem *Larix polonica* przedstawia Kępczyński (1965) z terenu Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie modrzew polski występuje w obu podzespołach grądowych: wilgotnym i typowym. Zajmują te zbiorowiska obniżenia u podnóża wzgórz morenowych, rozwijając się na glebach zbliżonych do typu czarnych ziem leśnych. Głazek (1973) opisał *Tilio-Carpinetum typicum* z modrzewiem polskim z przedpoła Gór Świętokrzyskich. Zbiorowisko z tego obszaru zajmuje zbocza lessowego wąwozu. Dane pochodzące z wymienionych prac potwierdzają szeroką skalę ekologiczną modrzewia polskiego.

Fot. 11. *Potentilla sterilis*. Rezerwat Modrzewina
Photo. 11. *Potentilla sterilis*. Modrzewina reservation

postać degeneracyjna s *Larix polonica* /Degeneration form with *Larix polonica*/

Numer kolejny sđjcia /Successive number of record/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Numer sđjcia /No. of record/	277	278	274	272	284	266	285	276	221	273	267	269	222	264	265	268	270	279	283	262	261	271
Data /Date/	13	13	13	12	17	10	17	13	8	12	10	12	8	10	10	10	12	17	17	10	10	12
	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Miejscowość /Locality/	M o d r z e w i n a k / M a z e j W s i																					
Numer oddziału leśnego /No. of forest section/	150	150	156	151	152	152	152	151	146	151	152	146	157	152	153	145	141	144	150	158	145	
Zwarcie warstwy drzew "a ₁ " w % /Density of tree layer "a ₁ " in %/	70	55	65	40	50	50	60	50	65	45	40	30	40	70	20	30	30	80	50	75	40	70
Zwarcie warstwy drzew "a ₂ " w % /Density of tree layer "a ₂ " in %/	20	40	30	50	60	85	80	35	20	50	50	80	50	25	70	70	-	55	20	50	20	
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub layer "b" in %/	30	30	40	70	20	10	10	70	50	65	45	65	60	75	50	55	45	30	35	70	65	80
Pokrycie warstwy runa "c" w % /Cover of herb layer "c" in %/	100	90	95	80	75	95	95	90	100	100	90	95	85	95	95	90	90	95	90	90	90	90
Pokrycie warstwy masywej "d" w % /Cover of moss layer "d" in %/	5	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	10	5	-	5	10	5	10	5	5
Powierzchnia sđjcia w m ² /Surface of record in m ² /	400	400	400	400	400	600	400	400	400	400	400	400	400	400	600	400	400	400	400	600	600	400
Liczba gatunków w sđjciu /Number of species in record/	40	36	40	34	33	30	38	29	32	26	31	39	37	31	32	37	39	43	41	42	32	26

Drzewa i krzewy

/Trees and shrubs/

B	<i>Larix polonica</i>	a ₁	4	3	3	3	1	3	3	3	3	2	2	1	2	3	2	1	1	2	V
	<i>Quercus robur</i>	a ₁	.	.	3	.	3	2	3	2	2	.	.	.	.	2	4	.	.	.	3
	-"-	a ₂	2	3	.	2	2	.	2	1	3	3	3	2	3	2	.	2	3	2	2
	-"-	b	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	2	.	2	.	1
	-"-	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	-"-		+	.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+

Stażość - - - - -

<i>Oralis acetosella</i>	3	2	3	3	4	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	2	3	V
<i>Ajuga reptans</i>	2	3	1	2	1	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	V
<i>Fragaria vesca</i>	1	1	1	2	+	1	1	2	1	+	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	V
<i>Mejanthemum bifolium</i>	1	1	1	1	+	+	1	1	1	+	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	V
<i>Viola riviniana</i>	2	2	3	3	2	2	+	2	3	2	+	2	3	2	2	1	2	2	1	2	V
<i>Stellaria media</i>	1	1	1	1	2	+	1	2	+	2	1	1	1	1	+	1	+	1	2	1	IV
<i>Galeopsis tetrahit</i>	1	1	+	+	+	+	+	1	+	+	1	+	1	+	1	+	+	1	+	+	IV
<i>Nyctelis muralis</i>	1	1	2	2	1	1	1	1	+	+	2	1	2	2	1	2	+	1	+	+	IV
<i>Geranium robertianum</i>	2	3	3	1	1	+	2	3	1	3	2	1	+	+	1	+	+	1	+	2	IV
<i>Dryopteris spinulosa</i>	1	1	2	1	2	1	1	+	2	+	1	1	2	1	+	+	2	1	2	+	IV
<i>Geum urbanum</i>	1	1	1	1	+	+	+	1	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	IV
<i>Dactylis glomerata</i>	+	1	1	+	+	+	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	IV
<i>Hieracium murorum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	III
<i>Noehringia trinervia</i>	+	1	2	+	2	1	+	+	+	+	2	+	1	2	1	2	+	1	+	+	III
<i>Anthriscus silvestris</i>	+	+	+	1	1	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	1	III
<i>Rubus sp.</i>	2	1	1	+	+	+	+	1	+	1	1	+	+	+	+	+	+	1	1	+	II
<i>Bromus benekenii</i>	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	IV
<i>Urtica dioica</i>	1	2	1	1	+	+	1	3	2	4	1	+	+	+	+	+	+	1	+	1	III
<i>Lappula communis</i>	+	+	+	1	1	+	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
<i>Galium rotundifolium</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	III
<i>Hypericum perforatum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
<i>Mniium officine</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
<i>Veronica chamaedrys</i>	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	1	1	+	1	2	1	1	+	+	+	II
<i>Deschampsia caespitosa</i>	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	2	1	1	+	+	+	II
<i>Lesula pilosa</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	1	1	+	+	+	II
<i>Agrostis vulgaris</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	1	+	+	1	I
<i>Polytrichum attenuatum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
<i>Chaerophyllum temulum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	II
<i>Veronica officinalis</i>	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I
<i>Rubus saxatilis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I
<i>Athyrium filix-femina</i>	+	+	+	1	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	I
<i>Carex pallescens</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	+	+	+	+	I
<i>Angelica silvestris</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+	+	I

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/ : sđjćioe /recozi/ 1 - Ranunculus repens /+/, 2 - Mniium rostratum /+/, 3 - Viola canina /1/, 9 - Rubus idaeus /1/, Poa trivialis /1/, Geum rivale /1/, 13 - Pohnia mutans /+/, 15 - Lysimachia nummularia /+/, 17 - Gnaphalium silvaticum /+/, Galium mollugo /+/, Anthoxanthum odoratum /+/, Stellaria graminea /1/, 18 - Lysimachia vulgaris /+/, Potentilla erecta /+/, 19 - Ranunculus repens /+/>.

Postać grądu z *Larix polonica* z terenu Wysoczyzny Rawskiej różni się od zbiorowisk opisywanych we wspomnianych opracowaniach nie tylko cechami siedliska, ale również składem florystycznym. W runie występuje tu szereg gatunków nie notowanych w podobnych zbiorowiskach z innych obszarów kraju. Istotną różnicą jest znaczny udział gatunków związku *Alno-Padion*, jak również masowe występowanie *Asperula odorata*. Na uwagę zasługuje kilka gatunków rzadkich w skali kraju, które w Modrzewinie rosną nieomal pospolicie. Są to: *Potentilla sterilis*, *Galium rotundifolium*, *Bromus benekenii*. Największą florystyczną osobliwością grądu z Modrzewiny jest *Potentilla sterilis* (fot. 11). Jest to gatunek subatlantycki, na terenie naszego kraju ma wschodni kres występowania. W Polsce znanych jest zaledwie kilka stanowisk w zachodniej części kraju (Kobendza 1930). Uwagi, podane przez tego autora odnośnie stanowiska *Potentilla sterilis* w Modrzewinie, są zgodne z aktualnym rozprzestrzenieniem i dynamiką rozwoju tej ciekawej rośliny. Świadczy to, iż gatunek ten znajduje w Modrzewinie odpowiednie dla siebie warunki siedliskowe.

Zróznicowanie wewnętrzne grądu z modrzewiem nie wynika z różnic siedliskowych, lecz podyktowane jest prowadzoną na tym terenie gospodarką leśną. Zdjęcia 1-11 reprezentują zbiorowisko najbardziej zbliżone swym charakterem do naturalnych grądów. Należy zaznaczyć, że większość zdjęć tej grupy została wykonana na terenie rezerwatu, gdzie od lat 40 ingerencja człowieka jest bardzo ograniczona. W płatach, reprezentowanych przez zdjęcia 1-11, występuje więcej gatunków ze związku *Alno-Padion*, brak natomiast zupełnie roślin acidofilnych. Gatunkami wyróżniającymi dla tej grupy są: *Circaea lutetiana*, *Stachys silvatica*, *Bromus benekenii*, *Urtica dioica* i *Lapsana communis*. Grupa zdjęć 12-22 reprezentuje grąd z modrzewiem bardziej antropogenicznie zmieniony. Zdjęcia te były wykonane w większości poza obszarem rezerwatu, a więc w oddziałach leśnych, gdzie gospodarka człowieka wpłynęła silniej na obecny charakter lasu. Zaznacza się tu udział gatunków borowych, a głównie *Vaccinium myrtillus*, jak również częstsze występowanie przedstawicieli klasy *Quercetea robori petraeae*: *Pteridium aquilinum* i *Hieracium lachenalii*. Oprócz wymienionych roślin, rolę wyróżniającą dla tej postaci grądu z Modrzewiny spełniają: *Hypericum perforatum*, *Veronica chamaedrys*, *Mnium affine*, *Deschampsia caespitosa*, *Luzula pilosa*, *Agrostis vulgaris*, *Polytrichum attenuatum*.

Stanowiska zdjęć w tabeli IX

Wszystkie zdjęcia wykonano na terenie uroczyska Modrzewina k/Malej Wsi. woj. radomskie, ndl. Grójec

1. (277) oddział 150d, drzewostan modrzewiowy 165-letni, nieliczne, młode dęby w niższej warstwie drzew.
2. (278) oddział 150d, modrzewie w tym samym wieku co w zdjęciu 1, w niższej warstwie drzewostanu nieco większy udział dębów.
3. (274) oddział 156b, drzewostan tworzy 85-letni *Larix polonica* z domieszką *Quercus robur* i *Tilia cordata*.

4. (272) oddział 151d, wyższą warstwę drzewostanu tworzą 190-letnie modrzewie polskie, niższą budują dęby.
5. (284) oddział 152a, drzewostan modrzewiowy 188-letni, w niższej warstwie duży udział ma grab.
6. (266) oddział 152b, wyższą warstwę drzewostanu tworzą 188-letnie dęby z domieszką modrzewia, w warstwie niższej dominuje grab.
7. (285) oddział 152c, stare 188-letnie modrzewie i dęby tworzą wyższą warstwę drzewostanu, grab buduje warstwę niższą.
8. (276) oddział 151d, wyższą warstwę drzewostanu tworzą 198-letnie modrzewie i dęby, w niższej warstwie występują młodsze dęby i lipa drobnolistna.
9. (221) oddział 146i, w mieszanym, dwuwarstwowym drzewostanie występują 188-letnie modrzewie i różnowiekowe dęby.
10. (273) oddział 151d, wyższą warstwę drzewostanu tworzą 198-letnie modrzewie, warstwę niższą dęby.
11. (267) oddział 152a, drzewostan podobny jak w zdjęciu 10.
12. (269) oddział 146a, drzewostan dębowy 46-letni, górują nad nim nieliczne, 128-letnie modrzewie.
13. (222) oddział 157a, wyższą warstwę drzewostanu tworzą 123-letnie modrzewie, niższą warstwę dęby 66-letnie.
14. (264) oddział 152a, stary drzewostan dębowy, 188-letni, w domieszcze nieliczne modrzewie.
15. (265) oddział 153a, drzewostan dębowy 48-letni, nieliczne okazy modrzewi w domieszcze.
16. (268) oddział 145b, drzewostan dębowy 46-letni, górują nad nim nieliczne egzemplarze 128-letnich modrzewi.
17. (270) oddział 141h, drzewostan tworzą 77-letnie modrzewie, niższą warstwę buduje brzoza z domieszką dębu.
18. (279) oddział 144h, monokultura sosny 34-letniej z domieszką dębu.
19. (283) oddział 150c, drzewostan sosnowy 70-letni, w domieszcze dęby i świerki.
20. (262) oddział 158a, drzewostan modrzewiowo-dębowy, 65-letni, w domieszcze świerk i grab.
21. (261) oddział 158e, 128-letnie modrzewie w najwyższej warstwie drzewostanu, w niższej dęby różnowiekowe z domieszką grabu i sosny.
22. (271) oddział 145a, drzewostan modrzewiowo-dębowy 78-letni, nieliczne sosny w domieszcze, młodsze dęby tworzą niższą warstwę drzewostanu.

4.4.4. *Tilio-Carpinetum typicum*, postać degeneracyjna z *Pinus silvestris* – Tabela X

Grąd typowy z sosną zajmuje na Wysoczyźnie Rawskiej niewielką powierzchnię, znacznie jednak większą w porównaniu ze zbiorowiskami olsu, łągu i grądu wilgotnego. Na całym tym obszarze zachowane fragmenty lasów grądowych nie są naturalnymi fitocenozami, lecz przekształconymi antropogenicznie zbiorowiskami, z powszechnym udziałem sosny w drzewostanie. Największe płaty tej fitocenozy występują na płaskich, wysoczyznowych terenach okolic Grójca, w uroczyskach: Łęczeszycy, Jeziora i Modrzewina. Niewielkie płyty występują w uroczyskach: Osuchów, Las Jeruzalski, Zawady, Kępa (woj. skierniewickie), Tomczyce, Góra, Wilków, Świdno, Dańków, Takiele (woj. radomskie), Dębina, Babsk, Franopol, Ryłsk Mały, Żurawie (woj. skierniewickie).

Omawiane zbiorowisko zajmuje przede wszystkim gleby płowe, wytworzone z pyłów oraz piasków naglinowych i glin zwałowych, rzadziej gleby brunatne wytworzone z pyłów.

Fi li o - C a r p i n e t u m t y p i c u m
Postać degeneracyjna z Pinus silvestris
Degeneration form with Pinus silvestris

Numer kolejny sđjęcia /Successive number of record/		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Numer sđjęcia /No. of record/		204	29	411	337	234	281	280	156	294	388	263	229	35	394	217	325	408	255	422	27
Data		3	23	23	21	11	13	13	5	12	10	24	10	2	26	23	27	9	22		
/Date/		05	07	07	05	06	07	07	07	07	07	06	07	07	06	08	07	06	09	07	
Miejscowość /Locality/		72	70	73	73	72	72	72	71	72	73	72	72	70	73	72	72	73	72	73	70
Zwarcie warstwy drzew "a ₁ " w % /Density of tree layer "a ₁ " in %/		0a	LJ	Łr	LJ	Łc	MA	MA	DA	DA	Łk	Łw	MA	Łc	Zw	JŁ	JŁ	BM	Bb	Łc	Kp
Zwarcie warstwy drzew "a ₂ " w % /Density of tree layer "a ₂ " in %/		20	25	40	50	75	50	60	40	60	40	80	85	40	40	50	80	50	85	40	40
Zwarcie warstwy drzew "b ₁ " w % /Density of tree layer "b ₁ " in %/		60	60	75	20	-	40	-	60	-	75	-	-	60	80	40	-	40	-	60	80
Zwarcie warstwy krzewów "b ₂ " w % /Density of shrub layer "b ₂ " in %/		50	70	10	70	40	30	80	20	60	20	40	40	70	20	70	30	90	10	70	30
Pokrycie warstwy runa "c ₁ " w % /Cover of herb layer "c ₁ " in %/		85	80	90	90	90	100	95	70	100	90	90	70	65	75	80	60	60	30	80	60
Pokrycie warstwy mszystej "c ₂ " w % /Cover of moss layer "c ₂ " in %/		5	10	5	5	10	5	5	-	5	5	10	10	5	5	10	30	15	20	5	10
Powierzchnia sđjęcia w m ² /Surface of record in m ² /		400	400	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Liczba gatunków w sđjęcin /Number of species in record/		40	35	32	39	44	41	34	44	35	46	36	48	34	32	32	38	44	44	44	40

Drzewa i krzewy /Trees and shrubs/																					
VP	Pinus silvestris	a ₁	2	2	3	3	4	3	4	3	4	3	2	1	•	3	3	•	3	3	3
	Quercus robur	a ₁	2	•	•	2	•	•	•	•	•	•	4	4	3	•	2	4	•	4	•
	"a ₂	a ₂	•	3	•	2	•	3	•	4	•	3	•	•	•	•	•	•	2	•	•
	"b ₁	b	•	2	•	2	•	•	3	2	3	•	•	•	•	•	•	2	3	•	2
	"b ₂	c	•	1	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	•	1	•	•
QP	Carpinus betulus	a ₁	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	•	•	•	•	•	3	•
	"a ₂	a ₂	4	4	4	2	•	•	•	•	•	•	•	•	4	5	3	•	2	•	5
	"b ₁	b	3	3	•	3	•	•	•	•	•	•	2	3	2	2	3	2	2	3	2
	"b ₂	c	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	1
	"b ₂	c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

V?	<i>Vaccinium myrtillus</i>	1	2	2	1	2	1	2	1	1	3	2	1	2	2	2	1	1	V
	<i>Solidago virga-aurea</i>	.	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	II
	<i>Fritularia europaea</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	+	.	+	.	+	II
	<i>Melampyrum pratense</i>	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	I
	<i>Entodon schreberi</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I
	<i>Pirola secunda</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I
	<i>Hymen cupressiforme</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	I
MA	<i>Lysimachia vulgaris</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	.	+	II
	<i>Galium mollugo</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	1	+	I
	<i>Campanula patula</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I
	<i>Betonica officinalis</i>	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I
	<i>Deschampsia caespitosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	I
B	<i>Lasula pilosa</i>	1	1	1	1	+	1	1	1	1	1	1	+	1	2	1	1	1	V
	<i>Fragaria vesca</i>	+	1	1	1	2	1	1	1	1	+	1	1	+	1	.	1	1	V
	<i>Ononis acetosella</i>	3	3	4	.	4	3	2	2	4	3	.	3	4	3	2	2	3	V
	<i>Mejanthemum bifolium</i>	3	2	1	2	1	.	2	.	1	2	+	2	1	1	2	.	1	IV
	<i>Mycelis muralis</i>	1	.	1	2	2	1	1	1	2	+	2	1	1	.	2	.	2	IV
	<i>Viola riviniana</i>	3	1	.	+	2	1	.	1	1	.	2	2	2	.	1	1	1	IV
	<i>Ajuga reptans</i>	2	2	.	1	1	.	2	.	.	.	1	.	.	1	2	2	1	IV
	<i>Dryopteris spinulosa</i>	1	.	2	.	.	1	1	.	1	1	1	1	2	.	2	2	1	IV
	<i>Veronica chamaedrys</i>	.	1	.	.	+	+	.	1	2	.	1	2	1	.	.	1	+	III
	<i>Moehringia trinervia</i>	2	.	.	2	.	1	.	2	.	1	1	2	.	2	.	1	2	III
	<i>Veronica officinalis</i>	.	1	.	1	1	.	.	+	1	+	.	1	1	.	.	1	+	III
	<i>Hieracium aurorum</i>	+	.	.	+	1	1	1	+	.	.	+	1	.	+	1	.	.	III
	<i>Mnium affine</i>	.	+	.	.	+	.	+	.	.	+	+	+	+	.	+	+	+	III
	<i>Galium rotundifolium</i>	.	.	.	2	3	2	3	3	.	.	.	3	.	3	4	.	1	III
	<i>Polytrichum attenuatum</i>	+	+	.	1	.	+	.	1	.	.	.	1	1	.	2	1	1	III
	<i>Rubus saxatilis</i>	2	.	1	2	1	1	.	.	.	2	.	2	.	+	1	.	1	III
	<i>Hypericum perforatum</i>	+	.	.	.	+	.	+	+	+	+	+	+	+	.	.	+	+	III
	<i>Geranium robertianum</i>	.	.	.	.	.	1	1	1	2	1	.	.	.	.	1	.	1	II
	<i>Stellaria media</i>	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	2	+	II
	<i>Rubus sp.</i>	.	.	3	.	1	.	.	.	3	2	.	.	.	1	.	3	4	II
	<i>Galeopsis tetrahit</i>	.	.	.	.	1	+	+	.	.	1	.	1	.	.	.	+	.	II
	<i>Urtica dioica</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	+	.	+	1	II
	<i>Geum urbanum</i>	1	.	.	.	.	.	.	1	1	+	.	.	.	.	1	.	.	II
	<i>Polia nutans</i>	+	.	.	.	+	.	+	.	.	.	+	.	.	.	2	.	+	II
	<i>Carex pallescens</i>	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	1	.	1	II
	<i>Galium aparine</i>	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	I
	<i>Convallaria majalis</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	3	I
	<i>Campanula rotundifolia</i>	.	1	.	+	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	I

Tilio-Carpinetum typicum z terenu Wysoczyzny Rawskiej jest zbiorowiskiem ukształtowanym przez wieloletnią gospodarkę człowieka. Zarówno zdjęcia fitosocjologiczne w tabelach, jak i opisy, odnoszą się więc w całości do postaci degeneracyjnych grądu. Odwieczne użytkowanie drzewostanów w lasach grądowych, sprowadzające się do pozyskiwania drewna takich gatunków jak dąb i lipa a wprowadzania – na ich miejsce – sztucznych upraw sosnowych lub sosnowo-dębowych, doprowadziło do zaniku naturalnych grądów typowych i powstania zbiorowisk, które dopiero po wnikliwej analizie składu florystycznego i uwzględnieniu ich przeszłości, można uznać za grądy.

Na całym badanym terenie w drzewostanie grądu typowego podstawowym składnikiem jest sosna pochodząca całkowicie z uprawy. Nawet w tych nielicznych płatach, gdzie obecnie jej nie stwierdzono, rosła w niedalekiej przeszłości, a pozostałością po niej są występujące w runie gatunki borowe. Różne sposoby gospodarowania człowiekiem zdecydowały o wykształceniu się kilku rodzajów drzewostanu w omawianym zbiorowisku. Najpowszechniejszym jest drzewostan dwuwarstwowy, w którym warstwę wyższą tworzą jednowiekowe monokultury *Pinus silvestris* w wieku od 60 do 90 lat, czasami ponad 100 lat, niekiedy z domieszką dębów. Niższą, zwykle gęsto zwartą warstwę, buduje *Carpinus betulus* lub rzadziej *Quercus robur*. W drzewostanach młodszych, jednowarstwowych sosna jest również stałym i w wielu płatach jedynym komponentem (zdjęcia: 5, 7, 9). Dąb i grab w takich przypadkach występują jako podrost w podszyciu i jako siewki w runie. Niekiedy, na skutek nieodnowienia drzewostanu po zrębie zupełnym, opoławiają drzewostan gatunki światłolubne: *Betula verrucosa* i *Populus tremula*. Gatunkami panującymi obecnie w drzewostanach grądu typowego są więc: *Pinus silvestris*, *Quercus robur* i *Carpinus betulus*. Jako domieszka występują dość często: *Populus tremula*, *Picea excelsa*, *Betula verrucosa*. Rzadko natomiast rosną inne gatunki grądowe: *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, *Padus avium*, *Quercus sessilis*, *Fraxinus excelsior* i inne.

Powszechną formą zmian antropogenicznych w grądzie typowym jest więc pinetyzacja. Sosna jest elementem sztucznie wprowadzonym do fitocenozy grądu. Świadczy o tym jednowiekowość drzewostanów oraz zupełny brak odnawiania się sosny, podczas gdy różnowiekowe dęby i graby powszechnie się odnawiają. Na miejsce naturalnych drzewostanów wprowadzono po zrębach zupełnych monokultury sosny lub też uprawy sosny z dębem. W przypadku drzewostanów sosnowo-dębowych, sosna osiągająca wcześniej niż dąb wiek rębności jest wycinana. Pozostaje dąb, ale w płatach z tego rodzaju drzewostanem widoczne są również skutki pinetyzacji, podobnie jak w zbiorowiskach z czystymi uprawami sosny (zdjęcie 16 i 18). Konsekwencją zrębów zupełnych i wprowadzenia do drzewostanu *Pinus silvestris* jest wniknięcie do warstwy roślinności zielnej gatunków acidofilnych, a głównie *Vaccinium myrtillus*. Pinetyzacji towarzyszy druga powszechna forma zniekształceń w drzewostanach grądowych, a mianowicie monotypizacja. Objawia się ona ujednoliceniem,

uproszczeniem struktury drzewostanu, który utworzony jest na ogół przez jednowiekowe uprawy sosnowe lub sosnowo-dębowe.

Zmiany degeneracyjne w zbiorowisku ułatwiają wnikanie elementów obcych, neofitów. Obecność *Acer negundo* w drzewostanie jest przykładem neofityzacji fitocenozy grądu.

Warstwa podszycia wykształcona jest w różnym stopniu, uzależnionym od zwarcia drzewostanu w danym placie. Osiąga zwarcie w granicach od 10 do 90%. Oprócz podrostów dębu szypułkowego i grabu, podstawowym składnikiem tej warstwy jest leszczyna. Również pospolicie lecz z mniejszym udziałem występują: *Sorbus aucuparia*, *Frangula alnus*. W wielu płatach zbiorowiska stwierdzono fruticetyzację, tj. silny rozrost warstwy krzewiastej,

Fot. 12. Zdegenerowany grąd typowy z monokulturą sosny w drzewostanie oraz silną fruticetyzacją. Uroczysko Dębina

Photo. 12. Degenerated *Tilio-Carpinetum typicum* with pine monoculture in stand and high fruticetisation. Dębina range

związany ze zmianami w strukturze drzewostanu, zwykle na skutek prześwietlenia (fot. 12). Większość płatów, gdzie zaobserwowano zakrzewienie, to partie zbiorowiska najbardziej odbiegające swym charakterem od naturalnych grądów (zdjęcia: 2, 4, 7, 13, 15, 17, 19).

Runo zielne w grądzie typowym z sosną jest na ogół bujnie rozwinięte, przeciętnie pokrycie tej warstwy wynosi 80%. W nielicznych płatach wykształca się słabiej (zdjęcie 18). W jednym zdjęciu fitosocjologicznym występuje przeciętnie 38 gatunków.

Zwraca uwagę zaledwie sporadyczne występowanie w runie gatunków charakterystycznych dla zespołu i związku. Trzy stwierdzone gatunki: *Stellaria holostea*, *Melampyrum nemorosum* i *Galium schultesii* osiągają zaledwie I klasę stałości. Rząd *Fagetalia* reprezentowany jest przez 18 gatunków, ale aż 14 z nich występuje w II i I klasie stałości.

W licznej grupie gatunków towarzyszących na szczególną uwagę zasługuje *Galium rotundifolium*. Kobendza (1925) zwrócił uwagę na pospolicieść w uroczysku Modrzewina k. Małej Wsi przytulii okrągłolistnej, gatunku znanego z nielicznych stanowisk na niżu. *Galium rotundifolium* należy do grupy gatunków charakterystycznych dla związku *Vaccinio-Piceion* (Matuszkiewicz 1967, Medwecka-Kornaś 1972). Na obszarze Wysoczyzny Rawskiej gatunek ten nie występuje w zbiorowiskach klasy *Vaccinio-Piceetea*. Jest natomiast przywiązany do zbiorowisk klasy *Quercu-Fagetea*, mianowicie *Tilio-Carpinetum typicum* i *Potentillo albae-Quercetum*. Z tego względu *Galium rotundifolium* włączono do grupy gatunków towarzyszących. W grądzie typowym z sosną przytulia okrągłolistna jest gatunkiem pospolitym, występującym często z dużym pokryciem. Tworzy w niektórych płatach łąny, zajmujące znaczne powierzchnie (zdjęcia: 5, 7, 8, 12, 14, 15). Najliczniej rośnie w uroczyskach Jeziora i Łęczeszycy.

Stanowiska zdjęć w tabeli X

1. (204) woj. skierniewickie, ndl. Skuły, uroczysko Osuchów, oddział 379d, teren równy, drzewostan różnowiekowy i różnogatunkowy, górną warstwę tworzy 65-letnia sosna z domieszką dębu i osiki, niższą głównie grab, w domieszcze osika, dąb szypułkowy, brzoza, olsza czarna.
2. (29) woj. skierniewickie, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 250b, teren nachylony w kierunku południowym, drzewostan sosnowy, jednowiekowy 76-letni, niższą warstwę tworzą dęby i graby.
3. (411) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Żurawie, oddział 51d, drzewostan sosnowy 70-letni, niższą warstwę tworzy grab z domieszką czeremchy zwyczajnej i świerka.
4. (337) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 251g, teren nachylony w kierunku południowo-wschodnim, górną warstwę drzewostanu tworzy 74-letnia sosna, sporadycznie rośnie świerk, w niższej, słabo wykształconej warstwie występuje grab i dąb szypułkowy.
5. (234) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Łęczeszycy, oddział 167j, teren równy, drzewostan sosnowy 70-letni, w domieszcze dąb, rzadko brzoza i modrzew.
6. (281) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Modrzewina, oddział 150a, teren płaski, drzewostan sosnowy 70-letni, niższą warstwę tworzą dęby z domieszką brzozy.

7. (280) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Modrzewina, oddział 144d, teren płaski, drzewostan jednowarstwowy tworzy monokultura sosny 66-letniej.
8. (156) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Dańków, oddział 279b, teren znacznie nachylony, stok doliny małego cieku, drzewostan sosnowy 84-letni z domieszką brzozy, warstwę niższą buduje dąb szypułkowy.
9. (294) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Takiele, oddział 283g, teren równy, drzewostan buduje 90-letnia, jednowiekowa sosna, rzadko w domieszcze brzoza.
10. (388) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 313h, teren lekko nachylony w kierunku południowym, górną warstwę drzewostanu tworzy 61-letnia sosna, warstwę niższą, silnie zwartą, budują: dąb szypułkowy, klon zwyczajny, grochodrzew, z małym udziałem jesion i lipa drobnolistna.
11. (263) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Modrzewina, oddział 159b, teren płaski, drzewostan dębowy 36-letni, w domieszcze nieliczne sosny i brzozy.
12. (229) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Łęczeszyc, oddział 167f, drzewostan dębowy 70-letni, w domieszcze sosna, grab, osika i modrzew.
13. (35) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Zawady, oddział 208a, teren równy, drzewostan sosnowy 86-letni z domieszką świerka, niższą warstwę buduje grab.
14. (394) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Jeziora, oddział 94a, teren lekko nachylony w kierunku południowym, w drzewostanie monokultura sosny 66-letniej, warstwę niższą tworzy grab.
15. (217) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Jeziora, oddział 90d, teren lekko nachylony w kierunku doliny Jeziora, drzewostan tworzy 68-letnia sosna z domieszką dębu, w niższej warstwie drzew występuje grab i dąb szypułkowy.
16. (325) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rylsk Mały, oddział 115b, drzewostan dębowy 75-letni.
17. (408) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Babsk, oddział 11c, warstwę wyższą drzewostanu tworzy 80-letnia sosna, niższą budują dęby i czeremcha amerykańska.
18. (255) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Łęczeszyc, oddział 178b, drzewostan mieszany, 50-letni, tworzy głównie dąb i grab z domieszką osiki.
19. (422) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Kępa, oddział 225d, wyższą warstwę drzewostanu buduje monokultura sosny 79-letniej, niższą tworzy grab i dąb, w domieszcze osika, lipa i czeremcha.
20. (27) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Babsk, oddział 21b, teren nachylony lekko w kierunku południowym, 87-letnia sosna tworzy wyższą warstwę drzew, niższą buduje grab.

4.4.5. Grąd typowy silnie zdegenerowany – Tabela XI

Platy grądu typowego, bardzo odbiegające swym charakterem od naturalnych fitocenoz, występują w wielu uroczyskach leśnych całej Wysoczyzny Rawskiej. Zajmują tereny płaskie lub lekko faliste. Niewielkie powierzchnie takich fitocenoz stwierdzono w uroczyskach: Izabelin, Wiatrowiec-Machnata, Wilczoruda (woj. radomskie), Rylsk Mały, Franopol, Babsk, Głuchów, Zawady, Chojnata, Osuchów (woj. skierniewickie).

Podobnie jak inne fitocenozy grądowe, postać ta wykształca się na glebach żyznych. Są to piaski gliniaste lekkie, słabo zbielcowane, umiarkowanie wilgotne oraz gliny średnie i ciężkie z zewnętrznym poziomem piaszczystym.

Grupa zdjęć fitosocjologicznych, zestawionych w tabeli XI, reprezentuje najbardziej zdegenerowaną postać *Tilio-Carpinetum typicum*. Fizjonomia tego

zbiorowiska kształtuje się w zależności od rodzaju i wieku drzewostanu. W konsekwencji różnych sposobów prowadzonej gospodarki ukształtowały się w omawianym zbiorowisku następujące drzewostany:

a) 60-80-letni drzewostan dębowy z domieszką brzozy, grabu, osiki i sosny;

b) 60-100-letnie monokultury sosnowe z udziałem dębów, grabu, niekiedy brzozy i osiki;

c) młody drzewostan dębowo-sosnowy, około 30-letni z domieszką grabu, brzozy i modrzewia;

d) około 150-letni, stary drzewostan dębowy z nieznacznym udziałem sosny.

Wszystkie płaty zbiorowiska, niezależnie od rodzaju drzewostanu, charakteryzują się znacznym udziałem grabu. Jest to podstawowe i najbardziej dostrzegalne świadectwo florystyczne siedliska grądu. W terenie płaty tej fitocenozy sąsiadują ze zbiorowiskami świetlistej dąbrowy lub z mniej zniekształconymi płatami grądu. Niekiedy zdegenerowany grąd typowy zajmuje tereny bezpośrednio graniczące z polami uprawnymi (np. w uroczysku Izabelin ndl. Grójec) lub z gruntami zajętyymi pod uprawę warzyw i drzew owocowych. Fakt ten jest dodatkowym potwierdzeniem siedlisk grądowych.

Dominujący udział w runie gatunków z klasy *Vaccinio-Piceetea*, wskazuje na daleko zaawansowany stopień „zborowienia” siedliska. Stąd należy przypuszczać, że sosna od dawna była tu uprawiana. Drzewostan dębowy 60-80-letni został prawdopodobnie posadzony po zrębie sosny lub sosny z dębem. Uprawa *Pinus silvestris* w przeszłości tak silnie wpłynęła na zmianę siedliska, że w wiele lat po zrębie i nawet przy obecnym braku sosny w drzewostanie, w runie panują gatunki acidofilne. Ten rodzaj drzewostanu reprezentują zdjęcia: 8, 11, 13, 14.

Następny rodzaj drzewostanu to monokultury sosnowe w różnym wieku, będące z pewnością nie pierwszym, lecz kolejnym pokoleniem *Pinus silvestris* na siedlisku grądu. Sośnie towarzyszy zawsze, z mniejszym lub większym udziałem, dąb szypułkowy oraz grab. W płatach ze starym drzewostanem sosnowym, osiągającym znaczne wysokości, dęby tworzą niższą warstwę, a pod nimi rośnie grab (zdjęcie 7). Częściej jednak występują młodsze drzewostany sosnowe (60-80 lat), gdzie dąb jest domieszką lub wchodzi tylko w skład podszycia (zdjęcie 16). Grab natomiast buduje niższą warstwę, ale nie osiąga tak dużego zwarcia jak w płatach ze starym drzewostanem sosnowym. Niekiedy jego występowanie ogranicza się również do warstwy podszycia (zdjęcia: 12, 15, 16).

W uroczysku Wiatrowiec-Machnanka rośnie młody, około 30-letni drzewostan dębowo-sosnowy, jednowarstwowy, z domieszką brzozy, grabu i modrzewia. Należy przypuszczać, że został on posadzony po zrębie pełnym drzewostanów sosnowo-dębowych. Na terenie Wysoczyzny występują również płaty zdegenerowanego grądu typowego, w których rosną stare, około 150-letnie dęby szypułkowe. Sosny brak lub spotykana jest jako znikoma domieszka.

Tabela XI /Table XI/

Degeneration form Tilio - Carpinetum typicum

Numer kolejny zdjęcia /Successive number of record/																
Numer zdjęcia /No. of record/																
Data /Date/																
Miejscowość /Locality/																
Zwarcie warstwy drzew "a ₁ " w % /Density of tree layer "a ₁ " in % /																
Zwarcie warstwy drzew "a ₂ " w % /Density of tree layer "a ₂ " in %/																
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub layer "b" in % /																
Pokrycie warstwy runa "c" w % / Cover of herb layer "c" in % /																
Pokrycie warstwy masywej "d" w % /Cover of moss layer "d" in % /																
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of record in m ² /																
Liczba gatunków w zdjęciu /Number of species in record/																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
104	105	29	174	55	238	12	241	68	326	240	409	303	302	173	323	26
26	26	25	13	25	27	16	27	22	26	27	23	25	25	13	15	22
06	06	07	08	08	06	07	06	08	08	06	08	07	07	08	08	07
71	71	70	71	70	72	70	72	70	72	70	72	72	72	71	72	70
Is	Is	Zw	RM	Os	WN	GZ	WN	Ch	RM	WN	Bb	Fz	Fz	RM	Wz	Bb
50	60	40	60	40	-	40	70	-	75	70	70	80	85	80	50	50
70	80	50	30	50	85	75	30	75	-	25	-	-	-	30	-	-
40	30	50	90	65	50	40	40	80	50	20	15	10	25	40	85	
40	50	70	50	65	70	60	80	70	60	60	80	80	80	60	50	
15	10	20	10	15	5	-	10	20	20	5	10	20	15	10	30	15
400	400	400	400	600	400	600	400	400	400	400	400	400	400	600	400	400
39	38	33	37	37	32	30	34	35	40	33	45	37	37	35	31	37

Drzewa i krzewy /Trees and shrubs/																	
B	Quercus robur	a ₁	3	4	-	4	-	-	-	4	-	4	4	2	4	4	-
-"-	-"-	a ₂	-	-	-	2	4	2	1	2	-	1	-	-	-	2	-
-"-	-"-	b	1	2	2	+	2	2	+	2	2	+	1	1	1	+	3
-"-	-"-	c	1	1	+	-	1	-	+	1	+	1	1	+	+	+	1

[illegible]

[illegible]

<i>Oytinus retisbonensis</i>	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	1	1	.	1	1	1	1	1	1	III
<i>Rylocoisus splendens</i>	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	.	.	1	2	1	.	.	.	III
<i>Pirela minor</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	I
<i>Lycopodium annotinum</i>	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Rhynchosyris cypripediformis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Dicranum undulatum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
MA <i>Anthoxanthum odoratum</i>	1	1	.	.	2	.	1	.	1	1	.	2	2	1	.	.	.	.	.	III
<i>Galium mollugo</i>	1	1	.	+	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	II
<i>Achillea millefolium</i>	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Deschampsia caespitosa</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I
<i>Galium boreale</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
SS <i>Festuca ovina</i>	2	1	.	1	1	.	1	1	1	1	3	2	2	1	1	2	.	.	.	V
<i>Rumex acetosella</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	1	.	.	I
<i>Thymus serpyllum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I
MC <i>Potentilla erecta</i>	+	+	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
<i>Calluna vulgaris</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	2	2	2	.	.	II
<i>Lycopodium clavatum</i>	.	.	2	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	II
<i>Hieracium pilosella</i>	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	II
<i>Carex leporina</i>	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Genista tinctoria</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Lasula multiflora</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	I
<i>Sieglingia decumbens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	I
B <i>Lasula pilosa</i>	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	.	.	V
<i>Meibomia bifolium</i>	1	1	2	1	1	.	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	.	.	.	V
<i>Viola riviniana</i>	2	1	1	1	.	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	.	.	.	V
<i>Pragaria vesca</i>	2	1	2	2	.	1	2	1	1	1	1	.	.	2	.	1	.	.	.	IV
<i>Polytrichum attenuatum</i>	1	.	2	1	1	1	.	1	2	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	IV
<i>Veronica chamaedrys</i>	1	2	2	1	2	.	+	1	.	+	1	.	2	.	+	1	.	.	.	IV
<i>Ajuga reptans</i>	2	3	1	1	.	.	.	.	+	.	.	1	1	+	.	.	.	.	.	III
<i>Hieracium murorum</i>	1	1	.	1	.	+	.	1	.	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	IV
<i>Veronica officinalis</i>	1	+	1	.	1	.	.	+	.	.	2	1	2	+	+	1	.	.	.	IV
<i>Oxalis acetosella</i>	.	.	3	1	2	.	.	.	1	1	.	2	3	.	.	.	.	.	.	III
<i>Rubus saxatilis</i>	1	.	.	.	1	2	2	.	.	2	.	.	.	2	2	.	.	.	.	III
<i>Maianthemum rostratum</i>	+	.	.	+	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	II

<i>Hypericum perforatum</i>	.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	+	1	+	.	1	1	III
<i>Poblia nutans</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	1	1	.	.	.	II
<i>Gampnula rotundifolia</i>	1	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	II
<i>Agrostis vulgaris</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	II
<i>Carex pallens</i>	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	1	II
<i>Mnium affine</i>	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	II
<i>Dryopteris spinulosa</i>	.	2	.	.	.	.	+	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	II
<i>Myosotis muralis</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.	.	.	I
<i>Pimpinella saxifraga</i>	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	II
<i>Stellaria media</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	I
<i>Gonvallaria maialis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	.	1	.	.	.	.	I
<i>Polytrichum juniperinum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I
<i>Nothofagus trimeria</i>	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Plantago bifolia</i>	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Carex caryophylla</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I

Getunki sporadyenne
/Sporadic species/

sajcie /reced/ 1 - *Carex hirta* /+/, *Dioxanella heteromella* /+/,
Hieracium pratense /+/, *Rhytidadelphus squarrosus* /+/, *Brachythecium rutabulum* /+/, *Ranunculus acer* /+/, *Selinum carvifolia* /+/,
Gampnula patula /+/, *Serratula tinctoria* /+/, 2 - *Lysimachia nummularia* /+/, *Geum urbanum* /+/, *Ranunculus repens* /+/, *Oxycoryphellum temulum* /+/, *Primula vulgaris* /+/, *Ranunculus acer* /+/, *Selinum carvifolia* /+/, 8 - *Galium verum* /+/, 10 - *Mnium punctatum* /+/, *Brachythecium rutabulum* /+/, *Lysimachia vulgaris* /+/, 11 - *Rebinia pseudoscoia* o /+/, 12 - *Gnaphalium silvaticum* /+/, *Rubus ag.* /+/, *Soleropodium purum* /+/, 13 - *Athyrium filix-femina* /+/, 14 - *Athyrium filix-femina* /+/, 17 - *Gnaphalium silvaticum* /+/.

Ten rodzaj drzewostanu powstaje wtedy, gdy sosna posadzona razem z dębem jest stopniowo wycinana w wieku 80-120 lat, natomiast dęby, osiągające znacznie później wiek rębności, pozostają (zdjęcie 10 i 15).

Stopień nasilenia degeneracji zbiorowisk grądowych zależy od rodzaju prowadzonych zabiegów gospodarczych, a także od wyjściowej postaci grądu. Grądy wysokie ulegają o wiele łatwiej degeneracji w porównaniu z podzespołem wilgotnym (Olaczek 1972). Wszelkie zmiany, zachodzące w całości tego zbiorowiska, są następstwem podstawowej i powszechnej formy degeneracji jaką jest pinetyzacja (Olaczek 1974a i b). Uprawy sosny były od dawna wprowadzane na miejsce usuniętych, najczęściej metodą zřębu zupełnego, drzewostanów grądowych. Przeświecenie warstwy drzewostanu sprzyja zwykle nadmiernemu rozrostowi podszycia. Fruticetyzację stwierdzono w zdjęciach: 4, 5, 10, 17. Warstwa ta opanowana jest najczęściej przez grab i leszczynę, znaczny udział mają także podrostry dębu. Często występują również: *Frangula alnus*, *Juniperus communis*, *Sorbus aucuparia* i podrostry: *Betula verrucosa*, *Populus tremula*. Warstwa podszycia osiąga największe zwarcie w płatach ze starszymi drzewostanami.

Runo zielne osiąga przeciętnie 65% zwarcia. Zwraca uwagę udział w tej warstwie gatunków z różnych grup syngenetycznych, obcych fitocenozy grądowej. Jest to jeden z symptomów degeneracji zbiorowiska. Jednoczesnym procesem, towarzyszącym pinetyzacji i fruticetyzacji, jest ubożenie zbiorowiska w gatunki grądowe na korzyść roślin borowych. Podczas stopniowego opanowywania runa przez gatunki acidofilne, wnikają także do tej warstwy rośliny łąkowe i murawowe. Częste występowanie takich gatunków jak: *Anthoxanthum odoratum*, *Festuca ovina*, *Calluna vulgaris*, *Potentilla erecta*, jest świadectwem tendencji do zadarnienia runa.

Klasę *Querceto-Fagetalia* reprezentuje w runie zaledwie 8 gatunków, z których najczęściej występują: *Melica nutans*, *Catharina undulata*, *Anemone nemorosa*. Występują tu również dwa gatunki charakterystyczne dla zespołu: *Melampyrum nemorosum* (II) i *Galium schultesii* (I). Często spotyka się gatunki z klasy *Quercetalia robori-petraeae*. Z nich największym pokryciem i stałością odznacza się *Pteridium aquilinum*. Z licznej grupy roślin borowych (13 gatunków), aż 9 osiąga wysokie klasy stałości (V-III). W warstwie runa rosną również często gatunki łąkowe i murawowe. Stwierdzono 10 gatunków z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*. Najpospolitszą rośliną łąkową jest *Anthoxanthum odoratum*. *Festuca ovina*, reprezentująca klasę *Sedo-Scleranthetea*, wchodzi w skład runa w całym zbiorowisku. Gatunki z klasy *Nardo-Callunetea*, których stwierdzono 8, osiągają zaledwie II i I klasę stałości.

Warstwa runa mszystego wykazuje w tym zbiorowisku niezbyt duże zwarcie, przeciętnie 14%. Oprócz pospolitego *Polytrichum attenuatum* znaczny udział mają tu gatunki borowe: *Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens*. Często spotyka się też *Pohlia nutans*.

W wielu pracach opisujących grądy są wzmianki o postaciach zespołów grądowych zmienionych, ze sztucznymi drzewostanami sosnowymi. Kilka

prac zawiera oddzielne tabele zdjęciowe poświęcone takim zbiorowiskom. Piotrowska (1955) nadmienia, że panująca w drzewostanie *Quercetum medioeuropaetum* z wyspy Wolin sosna, jest sztuczną jednowiekową monokulturą. W runie grądu opisanego przez autorkę znaczny udział mają gatunki borowe. O odnawianiu sosną drzewostanów grądowych, usuniętych zgubną dla całych fitocenoz metodą zrębów zupełnych, pisze Sokołowski (1970). Charakterystykę zdegenerowanych grądów, będących w różnych fazach pinetyzacji, zawiera praca Olaczka (1972). Wśród roślinności zielnej, opisywanego przez autora zbiorowiska, na równi z gatunkami grądowymi rosną borowe. W wyższych fazach degeneracji gatunki acidofilne uzyskują przewagę i panują w warstwie runa. W niższej warstwie drzewostanu z dużym zwarcim występują *Carpinus betulus*. Monokultura sosny na siedliskach grądów wysokich, opisana przez Głazka (1973) z obszaru przedpola Gór Świętokrzyskich, przedstawia nieco inny typ zbiorowiska. Mimo panowania *Pinus silvestris* w drzewostanie, wśród roślinności zielnej nie stwierdzono gatunków z klasy *Vaccinio-Piceetea*. Runo opанowane jest przez *Dryopteris filix-mas* i *Athyrium filix-femina*. Grab występuje jako gatunek sporadyczny.

Zdegenerowany grąd wysoki z terenu Wysoczyzny Rawskiej zbliżony jest do grądów z sosną z obszaru Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej (Olaczek 1972). Jest to postać *Tilio-Carpinetum typicum*, znajdującego się w zaawansowanych fazach pinetyzacji. Porównywalna jest z postacią grądu, określonego przez tego autora jako zbiorowisko będące w IV i V fazie degeneracji, a więc najbardziej odbiegające od naturalnych fitocenoz grądowych. Za przynależnością zbiorowiska, reprezentowanego przez zdjęcia w tabeli XI, do *Tilio-Carpinetum* przemawia występowanie w runie, mimo dominacji roślin borowych, także gatunków grądowych, a przede wszystkim powszechny udział *Carpinus betulus* w drzewostanie, podszyciu i runie.

Stanowiska zdjęć w tabeli XI

1. (104) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Izabelin, oddział 285c, teren równy, drzewostan dębowy 74-letni z domieszką sosny, niższą warstwę tworzy grab.
2. (105) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Izabelin, oddział 285c, drzewostan podobny jak w zdjęciu 1, nieco mniejszy udział *Pinus silvestris*.
3. (39) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Zawady, oddział 221d, drzewostan buduje 71-letnia *Pinus silvestris*, warstwę niższą tworzą: grab, dąb, świerk i brzoza.
4. (174) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Ryłsk Mały, oddział 114b, stary drzewostan dębowy około 143-letni, nieznaczny udział ma sosna, teren równy.
5. (55) woj. skierniewickie, ndl. Skuły, uroczysko Osuchów, oddział 360a, teren płaski, drzewostan tworzy sosna 61-letnia z domieszką dębów, osiki i brzozy, niższą warstwę buduje grab i dąb szypułkowy.
6. (238) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wiatrowiec-Machnatka, oddział 114a, teren płaski, drzewostan młody 23-letni, mieszany.
7. (12) woj. skierniewickie, Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie, uroczysko Głuchów, oddział 166, około 100-letni drzewostan sosnowy, niższą warstwę tworzy grab z domieszką dębów.

8. (241) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wiatrowiec-Machnatka, oddział 116a, drzewostan dębowy 80-letni, niższą warstwę tworzą: grab, osika i dęby.
9. (68) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Chojnata, oddział 261k, teren równy, drzewostan mieszany, jednowarstwowy, sosna 51-letnia z domieszką dębów, świerka i graba.
10. (326) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Ryłsk Mały, oddział 114b, teren równy, 144-letnie dęby górują w drzewostanie, w domieszce nieliczne sosny.
11. (240) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wiatrowiec-Machnatka, oddział 117c, teren płaski, drzewostan dębowy 80-letni, w niższej warstwie rosną: grab, dąb i osika.
12. (409) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Babsk, oddział 11a, drzewostan sosnowy jednowiekowy 50-letni.
13. (303) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Franopol, oddział 34b, teren płaski, drzewostan dębowy 60-letni.
14. (302) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Franopol, oddział 35a, teren równy, 60-letni drzewostan dębowy, w domieszce nieliczne brzozy.
15. (173) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Ryłsk Mały, oddział 110b, różnowiekowy, mieszany, drzewostan dwuwarstwowy. Dęby 83-letnie z domieszką sosny i brzozy tworzą warstwę wyższą, w niższej występują dęby z domieszką świerka.
16. (323) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wilczoruda, oddział 55b, monokultura sosny 70-letniej buduje drzewostan.
17. (26) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Babsk, oddział 21a, teren nachylony w kierunku południowo-zachodnim, drzewostan tworzy 87-letnia *Pinus silvestris*.

4.5. *POTENTILLO ALBAE-QUERCETUM* LIBB, 1933, ŚWIETLISTA DĄBROWA

Wśród zespołów leśnych Wysoczyzny Rawskiej dąbrowa świetlista jest zbiorowiskiem, którego potencjalne siedliska zajmują największą powierzchnię. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie aktualnie stwierdzone na badanym terenie płaty *Potentillo albae-Quercetum* są w różnym stopniu zniekształcone na skutek prowadzonej w przeszłości i obecnie gospodarki leśnej i reprezentują tylko postaci degeneracyjne tego zespołu. W tabelach XII-XIV zgrupowano zdjęcia fitosocjologiczne, reprezentujące płaty świetlistej dąbrowy od najmniej do najbardziej zniekształconych. Tabela XII przedstawia zbiorowisko najbardziej zbliżone do naturalnej, tj. niezdegenerowanej fitocenozy. Tabela ta posłużyła do analizy wewnętrznej zmienności zespołu oraz jako punkt odniesienia do oceny stopnia degeneracji świetlistej dąbrowy na Wysoczyźnie Rawskiej.

Z uwagi na wyraźne zróżnicowanie fizjonomii, struktury i składu florystycznego, wyodrębniono dwa podzespoły świetlistej dąbrowy: *Potentillo albae-Quercetum typicum* i *Potentillo albae-Quercetum poëtosum*.

4.5.1. *Potentillo albae-Quercetum typicum* A. i W. Mat. 1956 – Tabela XII zdjęcia 1-15

Podzespół typowy dąbrowy świetlistej jest zbiorowiskiem szeroko rozprzestrzenionym na badanym terenie. Najlepiej zachowane i największe powierzchniowo płaty stwierdzono w uroczyskach: Rawski Las, Kaleń (woj. skierniewickie), Rykały, Stryków-Brzostowiec (woj. radomskie), Głuchów,

Las Jeruzalski (woj. skierniewickie). Mniejsze płaty występują w uroczysku Petrykozy (woj. radomskie) i w uroczysku Stolniki (woj. skierniewickie).

Siedliskiem dąbrowy świetlistej w podzespole typowym są świeże, żyzne gleby z głębokim poziomem wód gruntowych. Są to gleby piaszczyste, pyłowe lub częściej piaski gliniaste słabo zbielicowane.

Struktura i fizjonomia tego podzespołu kształtuje się w zależności od wieku i składu gatunkowego drzewostanu. Zwarcie koron drzew wynosi od 80 do 50%. W zależności od drzewostanu pozostaje warstwa podszycia, której zwarcie waha się w granicach 5-85%. Jedną z częstych postaci fitocenozy jest postać z drzewostanem dębowym, złożonym z dębu szypułkowego lub rzadziej obydwu gatunków dębów, osiągających znaczne zwarcie koron. Są to zwykle drzewostany młode o przeciętnym wieku 50-70 lat. W przypadku takiego drzewostanu podszycie ma umiarkowane zwarcie (10-35%), właściwe dla zbiorowisk dąbrowy świetlistej (zdjęcia: 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14; fot. 13). Następną jest postać fitocenozy z drzewostanem sosnowo-dębowym, tworzącym często dwie warstwy. Sosna występuje zwykle w warstwie górnej, dąb tworzy warstwę dolną. W płatach z takim drzewostanem warstwa podszycia jest najczęściej bardzo bujnie rozwinięta (zdjęcia: 1, 4, 9, 10). Trzeci rodzaj drzewostanu to monokultura sosny z obfitym podrostem dębowym w podszyciu. Domieszkę w warstwie drzew

Fot. 13. *Potentillo albae-Quercetum typicum*. Uroczysko Żurawie
Photo. 13. *Potentillo albae-Quercetum typicum*. Żurawie range

Fot. J. Siciński

Wzrost kolejny sędziów /Successive number of record/		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Quantum	Standard	1-15 sędziów /records/	16-25 sędziów /records/	26-35 sędziów /records/		
Wzrost sędziów /No. of record/		190	368	367	316	360	339	310	342	177	178	179	347	287	286	353	117	87	88	113	223	128	131	150	150	109							
Data /Date/		21	20	20	10	15	15	25	21	15	15	15	11	19	19	11	27	9	9	27	8	30	30	20	30	27							
Wzrost sędziów /Date/		08	06	06	08	06	06	07	05	07	07	07	06	07	07	06	06	06	06	06	06	06	06	07	06	06							
Wzrost sędziów /Locality/		71	73	73	72	73	73	72	73	71	71	71	73	72	72	73	71	71	71	71	72	71	71	71	71	71							
Wzrost sędziów /Locality/		81	82	82	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84							
Wzrost sędziów /Density of tree layer "a ₁ " in %/		30	75	80	45	70	65	80	70	30	50	80	75	75	75	80	15	70	75	50	80	20	40	30	50	15							
Wzrost sędziów /Density of tree layer "a ₂ " in %/		60	-	-	50	-	-	-	-	50	30	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	50	30	70	-	60							
Wzrost sędziów /Density of shrub layer "b" in %/		70	20	25	60	40	30	10	50	85	80	30	30	30	30	35	35	30	40	80	20	85	70	50	80	50							
Wzrost sędziów /Cover of herb layer "c" in %/		70	90	90	80	100	100	95	100	75	70	90	90	80	80	90	90	95	90	90	75	90	70	50	90	80							
Wzrost sędziów /Cover of moss layer "d" in %/		5	10	10	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	15	5	10	-	-	15	5	5							
Wzrost sędziów /Surface of record in m ² /		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400							
Wzrost sędziów /Number of species in record/		48	53	53	53	76	68	53	46	48	48	47	67	62	57	51	54	60	58	57	51	50	54	54	51	54							
Podsejście /Subassociation/		typicum															pseudotum										1-15 sędziów /records/	16-25 sędziów /records/	26-35 sędziów /records/				
Wariant /Variant/		typowy /typicum															z Euphorbia angulata z Euphorbia angulata																
Drzewa i krzewy /Trees and shrubs/																																	
B Quercus robur		a ₁	2	3	2	2	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	V	V	V				
- " -		a ₂	2	3	2	2	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	V	V	V				
- " -		b	2	2	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	V	V	V				
- " -		c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	V	V	V					
VF Pinus silvestris		a ₁	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		a ₂	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		b	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
B Betula verrucosa		a ₁	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		a ₂	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		b	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
VF Populus tremula		a ₁	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		a ₂	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		b	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
Quercus sessilis		a ₁	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		a ₂	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		b	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
QF Cereus avium		a ₁	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		a ₂	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		b	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
Carpinus betulus		a ₁	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		a ₂	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		b	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
B Larix polonica		a ₁	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		a ₂	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		b	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
QF Crataegus monogyna		a ₁	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		a ₂	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		b	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
VF Picea excelsa		a ₁	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		a ₂	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	III	III	III					
- " -		b	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													

Fot. 14. Zdegenerowana
dąbrowa świetlista z u-
prawą sosny w drzewo-
stanie. Uroczysko Raw-
ski Las

Photo. 14. Degenerated
Potentilla albae-Querce-
tum with pine planta-
tion in stand. Rawski
Las range

stanowi często brzoza a także osika. Tak więc podzespół typowy dąbrowy świetlistej na badanym terenie to cztero- lub pięciowarstwowe, widne zbiorowisko leśne o zmiennych warunkach świetlnych, uzależnionych od wieku i składu gatunkowego drzewostanu.

W skład podszycia, oprócz podrostów dębowych, wchodzi: *Frangula alnus*, *Sorbus aucuparia*, *Juniperus communis*, *Corylus avellana*, *Euonymus verrucosa*, *Pirus communis* i *Rhamnus cathartica*.

Warstwa roślinności zielnej w całym zbiorowisku, niezależnie od składu drzewostanu, jest bujnie rozwinięta i pokrywa przeciętnie 90%. Runo mszyste rozwija się na ogół słabo (przeciętnie 7% pokrycia).

Dąbrowa świetlista jest zbiorowiskiem odznaczającym się wielkim bogactwem flory. W jednym zdjęciu fitosocjologicznym występują przeciętnie 54 gatunki. Cechą charakterystyczną i naturalną jest tu udział gatunków z wielu różnych grup syngenetycznych. Z dużą stałością i znacznym pokryciem rosną gatunki z rzędu *Quercetalia pubescentis*, stanowiące grupę wyróżniającą dla zespołu świetlistej dąbrowy. Największą stałością odznaczają się: *Potentilla alba*,

Calamintha vulgaris, *Campanula persicifolia*, *Polygonatum odoratum*. Klasę *Quercus-Fagetea* reprezentują 22 gatunki, spośród nich wysokie klasy stałości (V-III) osiągają: *Melica nutans*, *Anemone nemorosa*, *Catharinea undulata*, *Lilium martagon*, *Primula officinalis*, *Dryopteris filix-mas*.

Zniekształcenia zbiorowiska dąbrowy świetlistej biorą początek od przebudowy drzewostanu w toku prowadzonej gospodarki leśnej. Naturalne drzewostany dębowe zostają z czasem zamienione na uprawy sosny z dębem lub czyste monokultury sosnowe (fot. 14). Matuszkiewicz i Matuszkiewicz (1956) zwrócił uwagę na zwiększenie udziału sosny w *Potentillo albae-Quercetum*, stanowiącej w naturalnych fitocenozach dąbrowy świetlistej nieznaczną domieszkę.

W podzespole typowym z terenu Wysoczyzny Rawskiej w większości płatów sosna jest głównym składnikiem drzewostanu. Dąb stanowi najczęściej domieszkę (zdjęcia: 3-6). Pinetyzacja i związana z nią monotypizacja, czyli ujednolicenie drzewostanu, to dwie podstawowe i nieomal powszechne formy degeneracji świetlistej dąbrowy. Skutki pinetyzacji znajdują odbicie w składzie florystycznym runa zielnego. W wielu „zborowiałych” płatach dąbrowy świetlistej panują gatunki z klasy *Vaccinio-Piceetea*, a borówka czarna osiąga największe pokrycie wśród roślin zielnych (zdjęcia: 2, 3, 5, 8; fot. 14). Innym objawem degeneracji zbiorowiska na skutek wprowadzenia do drzewostanu sosny jest opanowanie warstwy runa przez jeżyny (zdjęcie 4; fot. 15). W niektórych płatach typowej dąbrowy świetlistej z sosną w drzewostanie stwierdzono fruticetyzację (zdjęcia: 1, 4, 9, 10). Ta forma degeneracji występuje tylko w wariancie typowym podzespołu. Kolejną formą antropogenicznych zniekształceń zbiorowiska jest cespityzacja — zadarnienie runa. W płatach, reprezentowanych w tabeli XII przez zdjęcia 6 i 7, znaczny udział w warstwie runa mają trawy: *Anthoxanthum odoratum* i *Festuca ovina*. Jednocześnie obserwuje się w tych płatach zmniejszenie udziału gatunków rzędu *Quercetalia pubescentis*. Należy zaznaczyć, że stopień zniekształceń antropogenicznych *Potentillo albae-Quercetum typicum* jest znacznie wyższy w wariancie typowym podzespołu i stwierdzone formy degeneracji odnoszą się przede wszystkim do tego zbiorowiska.

Ujęcie systematyczne podzespołu typowego dąbrowy świetlistej zostało ustalone w oparciu o wyróżnienie tej jednostki, zawarte w pracy Matuszkiewicz i Matuszkiewicz (1956). Autorzy, na podstawie analizy wielu prac z terenu całego kraju, stwierdzili występowanie dwu podzespołów: *Potentillo albae-Quercetum typicum* i *Potentillo albae-Quercetum trollietosum*. Spośród grupy gatunków, uznanych przez w.w. autorów za wyróżniające podzespół typowy, na badanym terenie występują (w nawiasie klasa stałości): *Pimpinella saxifraga* (IV), *Anthoxanthum odoratum* (IV), *Hieracium murorum* (IV), *Frangula alnus* (V), *Quercus sessilis* (III), *Achillea millefolium* (III), *Campanula rotundifolia* (III), *Dryopteris filix-mas* (III), *Brachypodium silvaticum* (II), *Asperula tinctoria* (I), *Hieracium pilosella* (I), *Crataegus monogyna et oxyacantha* (I), *Prunus spinosa* (I).

Fot. 15. Fragment runa opanowanego przez jeżyny w zdegenerowanej dąbrowie świetlistej.
Uroczysko Rykały

Photo. 15. Fragment of herb layer infested with blackberries in degenerated *Potentillo albae-Quercetum* habitat. Rykały range

Zbiorowisko *Potentillo albae-Quercetum typicum* cechuje obecność gatunków siedlisk suchych i ciepłych, występuje ono na terenie Polski środkowej, północnej i zachodniej. Natomiast występowanie podzespołu *Potentillo albae-Quercetum trolietosum*, który opisała Matuszkiewiczowa (1955), ograniczone jest do terenu Puszczy Białowieskiej.

Potentillo albae-Quercetum opisano z terenu całego kraju. Stosunkowo najwięcej prac dotyczy obszaru Wielkopolski (Libbert 1933, Preising 1943, Piotrowska 1950, Celiński 1953, Krotoska 1953, Wojterscy 1953, Wojterski 1960). Z Ziemi Dobrzyńskiej zespół ten został opisany przez Kępczyńskiego (1965). Z terenu Roztocza oraz z okolic Lublina dąbrowę świetlistą przedstawili Izdebski (1962) i Szynał (1963). Sokołowski (1963) stwierdził występowanie na terenie Niziny Mazowiecko-Podlaskiej dwóch podzespołów świetlistej dąbrowy o charakterze pośrednim w odniesieniu do podzespołów wyróżnionych przez Matuszkiewicz i Matuszkiewicz (1956). Są to: *Potentillo albae-Quercetum galietosum* i *Potentillo albae-Quercetum poëtosum*. Charakterystykę dąbrowy świetlistej z modrzewiem polskim rezerwatu Trębaczew zawiera praca Mowszowicza i in. (1963). Olaczek (1972) opisuje *Potentillo albae-Quercetum* z terenu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Kaźmierczakowa (1971) wyróżniła na obszarze Wyżyny Małopolskiej

kolejny podzespół dąbrowy świetlistej — *Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae*. Podobne zbiorowisko podał z terenu Przedgórze Ilżeckiego Głazek (1973). Autor ten, na podstawie analizy zdjęć fitosocjologicznych, pochodzących z 17 tabel, reprezentujących dąbrowę świetlistą z różnych części kraju, wyodrębnił w ramach zespołu trzy odmiany geograficzne: pomorsko-wielkopolską, mazowiecko-małopolską i podlaską. Dąbrowa świetlista z terenu Wysoczyzny Rawskiej należy do odmiany mazowiecko-małopolskiej. Z grupy gatunków, podanych przez Głazka (1973) jako wyróżniające dla tej odmiany, na badanym terenie występują: *Melittis melissophyllum*, *Euphorbia angulata*, *Euonymus verrucosa*, *Galium schultesii*. Nie rosną natomiast trzy pozostałe gatunki: *Cytisus nigricans*, *Cerasus fruticosa* i *Rosa gallica*.

Na badanym terenie ustalono listę gatunków, wyróżniających lokalnie dwa podzespoły *Potentillo albae-Quercetum*. Różnice florystyczne między obu podzespołami są tak znaczne, iż dało się stwierdzić gatunki wyróżniające te jednostki nieomal we wszystkich grupach syngenetycznych, łącznie z gatunkami towarzyszącymi (Tabela XV). Podzespół typowy cechuje większy udział ciepłolubnych gatunków z rzędu *Quercetalia pubescentis* oraz z klasy *Festuco-Brometea*. Wśród gatunków z klasy *Quercu-Fagetea*, wyróżniającymi dla tego zbiorowiska są: *Lilium martagon*, *Primula officinalis*, *Sanicula europaea*, *Euphorbia angulata*, *Hepatica nobilis*. Z grupy roślin łąkowych podzespół typowy wyróżnia *Betonica officinalis*.

W podzespole typowym świetlistej dąbrowy wyróżniają się dwa warianty: wariant typowy (zdjęcia 1-10) i wariant z *Euphorbia angulata* (zdjęcia 11-15). Wariant typowy nie posiada grupy gatunków wyróżniających go w obrębie podzespołu. Charakterystyka tego zbiorowiska będzie więc odpowiadać ogólnemu opisowi podzespołu. Wariant z *Euphorbia angulata* wyróżnia grupa gatunków, do których należą: *Euphorbia angulata*, *Dryopteris filix-mas*, *Sanicula europaea*, *Actaea spicata*, *Epilobium montanum*, *Viola silvestris*, *Rhamnus cathartica*. Poza tym odznacza się on nieco mniejszym udziałem gatunków rzędu *Quercetalia pubescentis* i klasy *Vaccinio-Piceetea*. W grupie gatunków towarzyszących wyróżniającą rolę spełniają: *Geum urbanum*, *Geranium robertianum*, *Urtica dioica*. Większość gatunków wyróżniających wariant reprezentuje rząd *Fagetalia*. Są to rośliny siedlisk bardzo żyznych, toteż wariant z *Euphorbia angulata* zajmuje o wiele zasobniejsze gleby niż wariant typowy. Tę postać świetlistej dąbrowy stwierdzono na terenie uroczyska Rykały (ndł. Białobrzegi) i częściowo w uroczysku Stryków-Brzostowiec (ndł. Grójec).

4.5.2. *Potentillo albae-Quercetum poëtosum* Sokolowski 1963—Tabela XII zdjęcia 16-25

Podzespół ten występuje głównie na terenie uroczyska Trębaczew (ndł. Rawa Mazowiecka). Większość zdjęć została wykonana w tym właśnie kompleksie leśnym. Niewielkie płaty stwierdzono w uroczyskach: Las Jeruzalski, Kaleń i Wilków.

Fot. 16. *Potentillo albae-Quercetum poëtosum*.

Uroczysko Trębaczew
Photo. 16. *Potentillo albae-Quercetum poëtosum*. Trębaczew range

Fot. J. Hereźniak

Podzespół wiechlinowy dąbrowy świetlistej wykształca się na glebach słabozbielicowanych, umiarkowanie wilgotnych. Są to piaski gliniaste lub też gleby piaszczysto-pylaste, powstałe na glinie zwałowej lub piaskach i żwirach lodowcowych. Jest to wielowarstwowe zbiorowisko leśne o prześwietlonym drzewostanie i silnie rozrośniętym podszyciu (fot. 16). Drzewostan różnicuje się często na dwie warstwy, przy czym w górnej rośnie zwykle modrzew polski. Warstwa zielna jest bujna, osiąga przeciętnie 85% pokrycia (fot. 17). Mszaki zajmują nieznaczną powierzchnię. Podobnie jak w poprzednim podzespole ich przeciętne pokrycie wynosi 7%.

Podstawowym gatunkiem drzewiastym jest dąb szypułkowy, rosnący zarówno w jedno- jak i dwuwarstwowych drzewostanach. Dąb bezszypułkowy występuje również, ale jego udział jest znacznie mniejszy. Często są to młode drzewostany, o przeciętnym wieku około 60 lat. Rzadko spotyka się stare, przeszło 100-letnie dęby (oddział 100 w uroczysku Trębaczew). Drugim ważnym komponentem drzewostanu jest sosna, Specyficzny charakter dąbrowie w uroczysku Trębaczew nadaje *Larix polonica* (fot. 18). W zależności od wieku modrzew polski albo góruje nad drzewostanem dębowym, ewentual-

Fot. 17. Bujne podszycie i runo w *Potentillo albae-Quercetum poëtosum*. Uroczysko Trębaczew
 Photo. 17. Abundant undergrowth and ground layer in *Potentillo albae-Quercetum poëtosum*.
 Trębaczew range

Fot. J. Hereźniak

nie sosnowo-dębowym, lub też, w przypadku młodszych upraw, stanowi trzeci obok dębu i sosny składnik tej warstwy. W niektórych płatach znaczny udział w drzewostanie ma *Carpinus betulus*. Niekiedy do wysokości warstwy drzewiastej dorasta również *Cerasus avium*. Bardzo często w skład drzewostanu wchodzi *Betula verrucosa*. Rzadko natomiast notuje się w tej warstwie *Populus tremula*.

Bujnie rozwiniętą warstwę krzewiastą tworzy wiele gatunków z klasy *Quercu-Fagetea*. Największym udziałem odznaczają się: *Corylus avellana*, *Cerasus avium*, *Carpinus betulus*, *Quercus robur*, *Q. sessilis*.

Mimo znacznego zacielenia przez krzewy runo zielne jest bujne i wielogatunkowe (fot. 19). Dominują w nim gatunki z klasy *Quercu-Fagetea*, których stwierdzono 21, mniejszy udział mają gatunki rzędu *Quercetalia pubescentis*, klasy *Vaccinio-Piceetea* oraz z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*. Zwraca uwagę sporadyczny udział gatunków murawowych z klas: *Festuco-Brometea*, *Nardo-Callunetea* i *Sedo-Scleranthetea*. Warstwę runa mszystego tworzą głównie: *Catharinea undulata*, *Polytrichum attenuatum*, *Mnium affine*, *Entodon schreberi*.

Antropogeniczne zniekształcenia w podzespole *Potentillo albae-Quercetum poëtosum* są łatwo dostrzegalne przy porównaniu płatów dąbrowy w rezerwacie

Fot. 18. Brzeg lasu z młodnikami *Larix polonica*. Uroczysko Trębaczew
 Photo. 18. Forest edge with young *Larix polonica* stands. Trębaczew range

Fot. J. Hereźniak

Trębaczew ze zbiorowiskiem, występującym poza jego granicami, gdzie wyraźniej zaznaczają się wpływy gospodarki człowieka. Zauważa się zubożenie w gatunki najbardziej typowe dla świetlistej dąbrowy, a mianowicie z rzędu *Quercetalia pubescentis*. Gatunki charakterystyczne dla zespołu rosną tu sporadycznie. *Potentilla alba* występuje w rezerwacie w IV klasie stałości (Mowszowicz i in. 1963), natomiast na pozostałym obszarze uroczyska Trębaczew osiąga zaledwie II klasę stałości. Płaty zbiorowiska w obrębie rezerwatu są na ogół florystycznie bogatsze, w jednym zdjęciu fitytosocjologicznym występują przeciętnie 63 gatunki. Natomiast poza rezerwatem przeciętnie 55 gatunków. *Larix polonica* jest składnikiem drzewostanu na całym terenie rezerwatu, poza jego granicami rośnie, lecz nie we wszystkich oddziałach, osiągając III klasę stałości. Należy również dodać, że są to drzewostany w większości młodsze w porównaniu z okazałymi modrzewiami z rezerwatu. Poza rezerwatem brak niektórych gatunków z klasy *Quercus-Fagetalia*, lub występują one z niską stałością, np. *Lilium martagon* w rezerwacie osiąga III klasę stałości, na pozostałym obszarze zaledwie I klasę. Poza rezerwatem nie występują takie gatunki jak: *Brachypodium silvaticum*, *Festuca gigantea*, *Trifolium rubens*, *Geranium sanguineum*, *Lathyrus niger*, nie stwierdzono również *Trollius europaeus* i *Brachypodium pinnatum*. Różnice są także w liczbie gatunków z klasy *Vaccinio-Piceetalia*. W rezerwacie stwierdzono 11 gatunków borowych, na pozostałym obszarze uroczyska 15.

Fot. 19. *Digitalis grandiflora* w runie dąbrowy świetlistej wiechlinowej.

Uroczysko Trębaczew
Photo. 19. *Digitalis grandiflora* in herb layer of *Potentillo albae-Quercetum poëtosum*. Trębaczew range

Fot. J. Hereźniak

Sosna wchodzi w skład drzewostanu większości płatów podzespołu wiechlinowego. Przejawy pinetyzacji w runie są tu jednak nieco słabsze, gatunki borowe z klasy *Vaccinio-Piceetea* rosną na ogół z mniejszym pokryciem. Zaobserwowano przy tym, że zwarcie podszycia jest największe zwykle w tych płatach, gdzie w drzewostanie występuje sosna. Trudno określić granicę rozwoju warstwy krzewiastej, właściwą naturalnym płatom tego zbiorowiska. Jest ona z pewnością wyższa niż w *Potentillo albae-Quercetum typicum*, chociażby z uwagi na powiązanie podzespołu wiechlinowego z fitocenozaami grądowymi. Z pewnością jednak zwarcie podszycia, dochodzące do 80-90%, jest już przejawem degeneracji zbiorowiska (zdjęcia: 19, 21, 24).

Odrębnym problemem jest udział modrzewia polskiego w drzewostanie tej fitocenozy. Autorzy opracowania o rezerwacie Trębaczew (Mowszowicz i in. 1963) przytaczają szereg danych, świadczących o naturalności stano-

wiska *Larix polonica* na tym terenie; zwrócono uwagę na wysoką dynamikę tego gatunku w Trębaczewie, sposób odnawiania, a także wiek najstarszych modrzewi oraz obecność na obszarze Wysoczyzny Rawskiej starych, kilkunastuletnich budowli modrzewiowych. W Trębaczewie, ze względu na mniejsze zwarcie drzewostanu, ogólne prześwietlenie lasu, gatunek ten znajduje dobre warunki świetlne zarówno do odnawiania jak i do wzrostu. Jedliński (1918) zwraca uwagę na przynależność modrzewia do gatunków światłożądnych oraz na fakt regulującego wpływu dostępu światła przy wzroście i formowaniu się strzały modrzewia. Tak więc uwarunkowania ekologiczne są potwierdzeniem naturalności modrzewia w zbiorowisku świetlistej dąbrowy. Obecna dynamika rozwojowa oraz odnawianie świadczą, iż gatunek ten mógł rosnąć, nawet w bardzo odległej przeszłości, zarówno w Trębaczewie, jak i w innych kompleksach leśnych, gdzie występowały świetliste dąbrowy.

Zdjęcia fitosocjologiczne z Trębaczewa (tabela XII) zostały wykonane w oddziałach leśnych poza granicami rezerwatu oraz w lesie gromadzkim, położonym w zachodniej części uroczyska. Zbiorowisko, występujące w tej części kompleksu leśnego Trębaczew, nie różni się zasadniczo od dąbrowy świetlistej w rezerwacie, lecz ma mniej naturalny charakter i jest nieco florystycznie uboższe. Ograniczenie zabiegów gospodarczych w rezerwacie od 25 lat sprawia, że mniej tu jest gatunków „obcych” dla fitocenozy, flora jest bogatsza i obejmuje kilka rzadkich gatunków.

Dąbrowa świetlista z uroczyska Trębaczew składem florystycznym nawiązuje wyraźnie do wyróżnionego przez Sokołowskiego (1963) podzespołu *Potentillo albae-Quercetum poëtosum*. Z grupy gatunków uznanych przez tego autora za wyróżniające podzespół, na badanym terenie nie rośnie w tym zbiorowisku tylko *Melampyrum nemorosum*. Natomiast — oprócz *Poa nemoralis* i *Viburnum opulus* — rolę wyróżniającą spełniają tu: *Galium schultesii*, *Phyteuma spicatum*, *Lathyrus vernus*, *Milium effusum*, *Lonicera xylosteum*.

Na Wysoczyźnie Rawskiej, *Potentillo albae-Quercetum poëtosum* wyróżniają lokalnie, w stosunku do *Potentillo albae-Quercetum typicum*, następujące gatunki: *Cerasus avium*, *Carpinus betulus*, *Larix polonica*, *Lonicera xylosteum*, *Hieracium umbellatum*, *H. sabaudum*, *Holcus mollis*, *Lysimachia vulgaris*, *Angelica silvestris*, *Selinum carvifolia*, *Galium verum*, *Rubus idaeus*, *Hieracium pratense*, *Bromus benekenii*. Poza tym, stwierdzono tu mniejszy udział gatunków z rzędu *Quercetalia pubescentis*, jak również rzadkie, w porównaniu z podzespołem typowym, występowanie gatunków charakterystycznych dla zespołu. W podzespole wiechlinowym gatunki z klasy *Vaccinio-Piceetea* rosną z mniejszym udziałem, tylko w dwóch zdjęciach (17 i 21) *Vaccinium myrtillus* dominuje wśród roślinności zielnej. Uwagę zwraca natomiast duży udział gatunków z rzędu *Fagetalia* w runie, jak również bujnie rozwinięte podszycie, w którym panują gatunki z klasy *Querco-Fagetea*. Świadczy to o florystycznym pokrewieństwie tego podzespołu ze zbiorowiskami grądowymi. Potwierdzeniem tych powiązań jest także brak w runie gatunków ciepłolubnych, murawowych.

1. (190) woj. skierniewickie, miejscowość Stolniki, własność prywatna, drzewostan dębowy różnowiekowy, najstarsze dęby około 70-letnie.
2. (368) woj. skierniewickie, uroczysko Głuchów, Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie, oddział 148, teren równy, drzewostan tworzy sosna około 60-letnia z domieszką dębu.
3. (367) woj. skierniewickie, uroczysko Głuchów, Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie, oddział 141, teren i drzewostan jak w zdjęciu 2.
4. (316) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Petrykozy, oddział 43h, teren lekko falisty, drzewostan dwuwarstwowy, wyższą warstwę buduje sosna 76-letnia, niższą dąb z domieszką brzozy i osiki.
5. (360) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 138d, teren równy, drzewostan sosnowy 45-letni z domieszką dębu i brzozy.
6. (359) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 138c, młody 45-letni drzewostan sosnowy, w domieszcze dąb i nieliczne brzozy.
7. (310) woj. skierniewickie, uroczysko Kaleń, oddział 86f, teren równy, drzewostan dębowy 54-letni.
8. (342) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 247c, teren nachylony w kierunku południowym, drzewostan sosnowo-dębowy 47-letni.
9. (177) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Stryków-Brzostowiec, oddział 297b, drzewostan stary, dwuwarstwowy, wyższą warstwę tworzą 104-letnie sosny, niższą równie stare dęby.
10. (178) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Stryków-Brzostowiec, oddział 297a, teren nachylony lekko w kierunku zachodnim, drzewostan jak w zdjęciu 9.
11. (179) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Stryków-Brzostowiec, oddział 297a, drzewostan dębowy 100-letni, teren równy.
12. (347) woj. radomskie, ndl. Białobrzegi, uroczysko Rykały, oddział 50, teren nachylony lekko w kierunku zachodnim, drzewostan dębowy 52-letni, w domieszcze rzadko brzoza.
13. (287) woj. radomskie, ndl. Białobrzegi, uroczysko Rykały, oddział 9d, teren równy, drzewostan dębowy 55-letni.
14. (286) woj. radomskie, ndl. Białobrzegi, uroczysko Rykały, oddział 9d, teren i drzewostan jak w zdjęciu 13.
15. (353) woj. radomskie, ndl. Białobrzegi, uroczysko Rykały, oddział 8g, teren płaski, drzewostan dębowy 40-letni, kilka egzemplarzy starszych dębów oraz nieliczne brzozy w domieszcze.
16. (117) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 96b, drzewostan dwuwarstwowy, wyższą warstwę o małym zwarcu tworzą nieliczne modrzewie polskie, niższą buduje dąb szypułkowy 58-letni z domieszką brzozy.
17. (87) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 96b, teren równy, drzewostan dębowy, jednowiekowy, 58-letni.
18. (88) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 96b, drzewostan dębowy 58-letni z domieszką graba i brzozy.
19. (113) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 100b, teren nieznacznie nachylony w kierunku wschodnim, drzewostan budują 108-letnie dęby, w domieszcze nieliczne modrzewie i sosny.
20. (223) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Kaleń, oddział 86h, teren równy, drzewostan dębowy, 59-letni.
21. (128) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 97g, drzewostan dwuwarstwowy, w górnej warstwie rosną tylko modrzewie polskie 53-letnie, niższą tworzą dęby z domieszką brzozy, osiki i sosny.
22. (131) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 100c,

drzewostan dwuwarstwowy, wyższą warstwę tworzy dąb i sosna w wieku 73 lat, niższą dąb i grab.

23. (150) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wilków, oddział 189d, teren falisty, drzewostan dębowy 34-letni z domieszką starszych okazów. Znaczny udział ma grab, jako domieszka występują: brzoza, osika, sosna i lipa.
24. (130) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 99b, teren równy, jednowarstwowy, drzewostan tworzą 53-letnie dęby z domieszką modrzewia polskiego, sosny i brzozy.
25. (109) woj. skierniewickie, uroczysko Trębaczew, las gromadzki, drzewostan dwuwarstwowy, nieliczne stare modrzewie tworzą warstwę wyższą, w niższej występuje dąb szypułkowy i modrzew polski.

4.5.3. Dąbrowa świetlista w zaawansowanym stadium degeneracji – Tabela XIII

Zdjęcia fitosocjologiczne zestawione w tabeli XIII obrazują postaci degeneracyjne obu wyróżnionych podzespółów *Potentillo albae-Quercetum*: typowego i wiechlinowego. Grupy gatunków wyróżniających podzespoły są tu mniej liczne wskutek zubożenia tych zbiorowisk o gatunki z klasy *Quercio-Fagetea*. Zaznacza się to wyraźniej w podzespole typowym. Mimo zaawansowanej degeneracji odróżnienie obu podzespółów nie następuje z trudnością, a gatunki różniące te zbiorowiska występują we wszystkich grupach syngenetycznych.

Płaty typowej dąbrowy świetlistej w zaawansowanym stadium degeneracji (zdjęcia 1-26) stwierdzono w wielu kompleksach leśnych: Rawski Las, Kaleń, Ryłsk Mały, Żurawie, Stolniki, Las Jeruzalski, Głuchów (woj. skierniewickie), Dąbrowa (woj. radomskie). Mniejsze płaty występują w uroczyskach: Petrykozy, Kępa, Tomczyce, Rykały (woj. radomskie), Franopol (woj. skierniewickie). Jak wynika z podanych stanowisk, zbiorowisko to w większości przypadków wykształca się w tych samych kompleksach leśnych, co i naturalne płaty świetlistej dąbrowy. Jest to potwierdzeniem decydującego wpływu gospodarki człowieka na stan zachowania fitocenoz leśnych i dowodem na to, iż różnice pomiędzy zbiorowiskami przedstawionymi w tabelach XII i XIII wynikają z tego wpływu, a nie z ewentualnych różnic siedliskowych.

Różnice między obu tymi postaciami wyrażają się głównie w składzie florystycznym, o czym decyduje stopień nasilenia antropopresji. Daje się zauważyć, że w miarę postępującej degeneracji ustępują przede wszystkim gatunki rzędu *Quercetalia pubescentis* i klasy *Quercio-Fagetea*, natomiast zwiększają swój udział gatunki borowe oraz rośliny murawowe, a także niektóre gatunki z grupy towarzyszących jak: *Agrostis vulgaris*, *Rubus sp.*, *Hypericum perforatum*.

Sosna jest w tej postaci dąbrowy świetlistej głównym komponentem drzewostanu. Dęby – szypułkowy i bezszypułkowy – stanowią w drzewostanie najczęściej domieszkę, licznie natomiast rosną jako podrost. Zwiększenie udziału w runie gatunków z klasy *Vaccinio-Piceetea* (16 gatunków) jest jednym z objawów nasilenia pinetyzacji w tym zbiorowisku. Gatunki borowe

osiągają tu wyższą stałość. Fruticetyzacja występuje w tej postaci typowej dąbrowy świetlistej równie często jak w mniej zdegenerowanych płatach. Zakrzewienie stwierdzono w zdjęciach: 4, 6, 7, 13, 14, 19. Podszycie w tych płatach opанowane jest zwykle przez leszczynę lub rzadziej przez podrostry dębowe i jest to skutek zastąpienia naturalnych drzewostanów monokulturami sosny po zrębach zupełnych.

Gatunki charakterystyczne dla zespołu występują tu sporadycznie. Z mniejszą stałością rosną wśród roślinności zielnej gatunki łąkowe. Dotyczy to zwłaszcza gatunków spotykanych zwykle w świetlistej dąbrowie, jak: *Betonica officinalis*, *Serratula tinctoria*.

Zadarnienie występuje w tym zbiorowisku rzadziej (zdjęcia: 1, 2, 7, 16, 19). Z dużym pokryciem rosną tu takie gatunki jak: *Agrostis vulgaris*, *Deschampsia caespitosa*, *Carex pallescens*, *Festuca ovina*, *Anthoxanthum odoratum*, *Calamagrostis epigeios*. Zadarnione płaty są zwykle jednocześnie opанowane przez jeżyny, co jest również przejawem degeneracji świetlistej dąbrowy. Do cespityzacji przyczynia się kilka czynników: wprowadzenie upraw monokultur sosnowych (często na glebach użytkowanych rolniczo), przerzedzanie drzewostanu oraz niszczenie podszycia. Przy zwiększonym dostępie światła do dna lasu oraz dodatkowo wypasie bydła, tworzą się warunki, w których ustępują gatunki właściwe dla dąbrów, a na ich miejsce wnikają, a następnie opанowują runo, trawy.

Postać dąbrowy świetlistej wiechlinowej w zaawansowanym stadium degeneracji (zdjęcia 27-34) występuje w uroczysku Trębaczew (ndl. Rawa Mazowiecka) oraz na niewielkiej powierzchni w uroczysku Tomczyce (ndl. Grójec). Zajmuje te same siedliska co lepiej zachowane płaty *Potentillo albae-Quercetum poëtosum*.

Drzewostan jest tu zwykle dwuwarstwowy z sosną w warstwie wyższej i dębem w warstwie niższej. *Larix polonica* stwierdzono tylko w dwóch zdjęciach z Trębaczewa (zdjęcia 111 i 112). Brzoza jest częstą domieszką w niższej warstwie drzewostanu, rzadziej występuje osika. Bujnie rozwinięte podszycie osiąga przeciętnie 42% zwarcia. Warstwę tę tworzą głównie podrostry dębów, w niektórych płatach panującym gatunkiem jest leszczyna. W runie, na równi z gatunkami z klasy *Quercio-Fagetea*, występują rośliny borowe. Gatunki rzędu *Quercetalia pubescentis* rosną tu sporadycznie. Wśród 11 gatunków klasy *Quercio-Fagetea*, największym pokryciem i stałością odznaczają się: *Melica nutans*, *Anemone nemorosa*, *Poa nemoralis*, *Galium schultesii* i *Catharinea undulata*. Spośród 12 gatunków z klasy *Vaccinio-Piceetea* z największym pokryciem i stałością występują: *Vaccinium myrtillus*, *Entodon schreberi*, *Trientalis europaea*, *Melampyrum pratense*, *Solidago virga-aurea*. Nielicznie, w tej postaci dąbrowy, rosną gatunki łąkowe i murawowe.

W zbiorowisku tym stwierdzono te same formy degeneracji co w lepiej zachowanych płatach podzespołu. Stopień nasilenia zmian degeneracyjnych jest tu jednak znacznie wyższy, a przejawy zniekształceń fitocenozy o wiele wyraźniejsze. Ujawniają się one przy porównaniu stopni stałości oraz współ-

czynników pokrycia gatunków poszczególnych grup syngenetycznych obu postaci dąbrowy wiechlinowej. W zaawansowanym stadium degeneracji ulega wyraźnemu spadkowi udział gatunków rzędu *Quercetalia pubescentis*, zmniejsza się również lista gatunków z klasy *Quercio-Fagetea*. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie udziału w runie roślin borowych z klasy *Vaccinio-Piceetea*. Wyraźnie zwiększyła się stałość takich gatunków jak: *Entodon schreberi*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Pirola secunda*, *Hylocomium splendens*. O wiele rzadziej spotyka się tu rośliny łąkowe z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*: *Serratula tinctoria*, *Galium boreale*, *Betonica officinalis*, *Lysimachia vulgaris*, *Selinum carvifolia*. Tendencję przeciwną wykazują gatunki z klas: *Nardo-Callunetea* i *Sedo-Scleranthetea*, ich udział w runie uległ zwiększeniu.

Stanowiska zdjęć w tabeli XIII

1. (392) woj. radomskie, uroczysko Dąbrowa k/Mogielnicy, teren płaski, drzewostan tworzy monokultura sosny około 70-letniej, nieliczne brzozy w domieszce.
2. (391) tak jak w zdjęciu 1.
3. (200) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Kaleń, oddział 86h, jednowarstwowy drzewostan dębowy 58-letni.
4. (50) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 137d, teren równy, stary, 163-letni drzewostan dębowo-sosnowy.
5. (9) woj. skierniewickie, Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie, uroczysko Głuchów, oddział 160, na lokalnym wzniesieniu terenowym, około 80-letni drzewostan sosnowy z domieszką dębu.
6. (189) woj. skierniewickie, miejscowość Stolniki, własność prywatna, drzewostan dwuwarstwowy dębowo-sosnowy, różnowiekowy.
7. (317) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Petrykozy, oddział 43h, teren równy, drzewostan dwuwarstwowy, wyższą warstwę tworzy 76-letnia sosna z domieszką osiki, niższą budują dęby, brzoza i osika.
8. (343) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 248d, teren równy, drzewostan sosnowo-dębowy, jednowarstwowy, około 40-letni.
9. (349) woj. radomskie, ndl. Białobrzegi, uroczysko Rykały, oddział 4p, teren równy, młody drzewostan sosnowy 28-letni, niewielka domieszka dębu i brzozy.
10. (201) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Kaleń, oddział 86f, teren równy, jednowarstwowy drzewostan dębowy 53-letni.
11. (309) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Kaleń, oddział 85k, drzewostan dębowy 40-letni.
12. (30) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 245a, teren lekko nachylony w kierunku południowym, dwuwarstwowy drzewostan dębowy około 60-letni.
13. (49) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 137c, drzewostan sosnowy, jednowiekowy 48-letni.
14. (186) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Stolniki, oddział 122g, teren lekko nachylony w kierunku południowym, jednowarstwowy, mieszany drzewostan sosnowo-dębowy 58-letni z udziałem brzozy i osiki.
15. (169) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Ryłsk Mały, oddział 119c, stary drzewostan dębowy 143-letni, teren równy.
16. (406) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 238b, teren równy, drzewostan tworzy monokultura sosny 84-letniej.
17. (63) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 145k,

Zróżnicowanie florystyczne dąbrowy świetlistej Tabela IV /Table IV/
 Potentillo albae - Quercetum
 Floristical differentiation of Potentillo albae - Quercetum

Zespół /Association/			Potentillo albae - Quercetum			
Podzespół /Subassociation/			typicum		pośtosum	
Liczba sędć /Number of record/			27		23	
Przeciętna liczba gatunków w sędziu /Average number of species in record/			55		54	
			S	V	S	V
B	Quercus robur	a ₁ , a ₂	V	4546,3	V	3956,5
	-"-	b, c	V	1430,3	V	1489,1
VF	Pinus silvestris	a ₁ , a ₂	III	2490,7	IV	1260,9
	Betula verrucosa	a ₁ , a ₂	II	370,3	III	423,9
	-"-	b, c	II	94,0	IV	262,2
B	Quercus sessilis	a ₁ , a ₂	II	796,3	II	543,5
	-"-	b, c	II	268,5	III	413,5
VF	Populus tremula	a ₁ , a ₂	I	166,7	I	173,9
	-"-	b, c	III	205,6	III	208,7
	Picea excelsa	a ₂	I	18,5		
	-"-	b, c	I	120,4	I	22,2
ECh	Cornus monogyna	b, c	I	185,2	II	445,6
	Cercasus avina	a ₂	I	18,5	I	152,2
	-"-	b, c	I	74,8	IV	1250,0
	Carpinus betulus	a ₂			II	663,0
	-"-	b, c	I	129,6	IV	1098,7
B	Larix polonica	a ₁ , a ₂			III	1032,6
	-"-	c			I	1,7
B	Frangula alnus	b, c	V	814,8	V	577,4
	Sorbus aucuparia	b, c	IV	557,0	V	446,5
	Juniperus communis	b, c	III	270,0	IV	232,2
ECh	Corylus avellana	b, c	II	1388,9	V	4576,0
	Buonymus verrucosa	b, c	II	157,4	IV	641,3
B	Pirus communis	b, c	II	94,4	III	110,9
	Lonicera xylosteum	b, c	I	18,5	III	533,0
ECh	Viburnum opulus	b, c			III	250,9
	Buonymus europaea	b, c			I	65,6
	Prunus spinosa	b, c	I	37,4	I	65,2
	Cornus sanguinea	b, c	I	55,9	I	119,6
	Rhamnus cathartica	b, c	II	92,9		
	Sambucus nigra	b, c	I	37,0		
ACh	Potentilla alba		V	880,0	II	120,9
	Ranunculus polyanthemus		II	139,6	I	22,6
	Pulmonaria angustifolia		I	18,9		
	Vicia cassubica		I	0,4		
OCh	Calamintha vulgaris		V	880,4	IV	241,3
	Campanula parvifolia		IV	298,1	III	90,9
	Polygonatum odoratum		V	363,3	III	110,9
	Carex montana		III	675,9	III	608,7
	Melittis melissophyllum		III	363,7	III	456,9
	Hypericum montanum		III	186,7	II	163,9
	Trifolium alpestre		II	176,7	II	87,8
	Digitaria grandiflora		III	362,2	I	1,3
	Aquilegia vulgaris		I	0,7	I	21,7
	Laserpitium latifolium				I	1,3
	Geranium sanguineum		I	37,8		
ECh	Malva nutans		V	1602,6	V	1217,4
	Anemone nemorosa		IV	1324,8	V	1424,3
	Catharina undulata		III	223,7	IV	240,9
	Astrantia maior		I	64,8	I	43,5
	Carex digitata		I	18,5	I	21,7
	Dryopteris filix-mas		III	888,9	II	87,8
	Lilium martagon		III	260,7	I	23,0
	Sanicula europaea		II	177,0	I	23,0
	Actaea spicata		II	56,7	I	1,7
	Epilobium montanum		I	101,9	I	43,9
	Viola silvestris		I	53,9	I	21,7
	Euphorbia angulata		II	299,3		
	Hepatica nobilis		I	166,7		
	Brachypodium silvaticum		II	490,7		
	Primula officinalis		III	704,1		
	Phyteum spicatum				III	154,3
	Milium effusum				II	130,4
	Lathyrus vernus				II	109,6
	Festuca heterophylla				I	22,6
	Poa nemoralis		I	305,6	IV	1043,5
	Galium schultzei		I	65,2	V	2347,8
	Scrophularia nodosa		II	56,7	IV	133,9
VF	Vaccinium myrtillus		V	3216,7	V	1782,6
	Trientalis europaea		IV	288,9	V	285,2
	Solidago virga-aurea		IV	253,0	IV	177,4
	Melampyrum pratense		III	205,6	IV	425,6
	Cytisus ratisbonensis		II	76,3	II	45,6
	Entodon schreberi		II	112,2	I	86,9
	Vaccinium vitis-idaea		II	93,7	I	44,3
	Pirola minor		II	2,2	I	22,1
	Peucedanum oreoselinum		I	84,4	I	65,2
	Scorsonera humilis		I	37,4	II	87,8
	Pirola secunda		I	19,6	I	1,3
	Hylacomium splendens		I	18,9	I	22,1
	Monotropa hypopitys		I	1,1	I	21,7
	Pirola rotundifolia				I	0,9
Qry	Pteridium aquilinum		V	1416,7	IV	1282,6
	Hieracium laechemalii		III	131,9	IV	265,2
	Hieracium umbellatum		I	0,4	IV	155,2
	Holcus mollis		I	83,3	II	336,9
	Hieracium sabaudum		I	18,5	II	110,0
MA	Serratula tinctoria		IV	407,5	IV	489,5
	Anthoxanthum odoratum		IV	788,1	III	402,2
	Galium boreale		V	1407,8	II	413,0
	Betonica officinalis		IV	676,3	I	65,6
	Galium mollugo		IV	62,2	II	24,3
	Achillea millefolium		III	40,7	I	0,9
	Deschampsia caespitosa		II	157,8	I	21,7
	Lysimachia vulgaris		II	38,9	IV	219,1
	Angelica silvestris		I	37,4	III	90,4
	Salix carvifolia				II	23,9
	Campanula patula		I	19,3	I	1,7
	Stellaria graminea		I	19,3	I	21,7
	Ranunculus acris		I	11,1	I	0,4
	Festuca rubra		I	101,9	I	21,7
FB	Knapcia arvensis		I	18,9	I	43,5
	Dactylis glomerata		I	101,9	I	21,7
	Pimpinella saxifraga		IV	208,7	I	0,9
	Ajuga reptans		II	195,2	I	0,4
	Viscaria vulgaris		II	75,6		
	Brachypodium pinnatum		I	148,1		
	Anthericum ranunculifolium		I	37,8		
	Asperula tinctoria		I	18,5		
	Carex glauca		I	18,5		
	Thalictrum minus		I	1,5		
	Peucedanum cervaria		I	0,7		
MU	Potentilla erecta		IV	188,5	II	23,9
	Lusula multiflora		I	37,8	I	23,0
	Carex ericetorum		I	55,6	I	1,3
	Gemista germanica		I	18,9		
	Hieracium pilosella		I	18,5		
SS	Festuca ovina		IV	889,3	I	65,2
	Sedum maximum		II	76,3		
	Koeleria polonica		I	38,1		
	Rumex acetosella		I	18,9		
B	Veronica chamaedrys		V	695,6	V	589,6
	Lusula pilosa		V	592,6	V	306,9
	Fragaria vesca		V	907,4	V	793,5
	Convallaria maialis		V	2611,1	IV	1597,9
	Rubus saxatilis		V	1463,0	V	728,3
	Majanthemum bifolium		IV	1009,3	V	836,9
	Viola riviniana		IV	574,8	V	967,4
	Hieracium murorum		IV	115,6	V	264,3
	Veronica officinalis		IV	408,1	IV	176,5
	Polytrichum attenuatum		III	114,4	IV	316,5
	Hypericum perforatum		III	109,9	III	69,6
	Rubus sp.		III	1240,7	III	619,6
	Myosotis muralis		III	491,1	III	370,0
	Nothofagus trichosperma		III	472,6	II	398,7
	Carex pallescens		III	407,4	IV	240,4
	Ajuga reptans		III	574,0	IV	978,7
	Oxalis acetosella		II	592,6	III	804,3
	Calamagrostis arundinacea		II	593,6	II	500,0
	Dryopteris spinulosa		II	175,9	I	98,3
	Astragalus glycyphyllos		II	93,7	III	90,0
	Gemista tinctoria		II	38,5	II	31,2
	Viola canina		I	38,1	I	43,9
	Galeopsis tetrahit		I	19,3	I	1,7
	Chaerophyllum temulum		I	212,9	I	65,2
	Galium silvaticum		I	0,7	I	22,6
	Gem. urbanum		II	21,5	II	67,4
	Geranium robertianum		II	259,3	I	22,2
	Galium rotundifolium		III	1222,2	I	76,0
	Campanula rotundifolia		III	168,5	I	44,3
	Stellaria media		II	195,2		
	Urtica dioica		II	94,4		
	Thalictrum flavum		II	83,7		
	Platanthera bifolia		I	75,2		
	Athyrium filix-femina		I	37,8		
	Agrostis vulgaris		I	55,6		
	Carex hirta		I	37,4		
	Phaeoglossum dryopteris		I	129,6		
	Galium verum		II	388,9	IV	978,3
	Rubus idaeus		I	18,9	II	108,7
	Hieracium pratense				II	60,0
	Bromus nemoralis				II	87,4

Objaśnienie skrótów /Explanation of abbreviations:/
 S - stałość /constancy/, V - współczynnik
 pokrycia /coefficient of coverage/.

stary 173-letni drzewostan sosnowy, w domieszce nieliczne stare dęby, tworzące również niższą warstwę drzewostanu.

18. (165) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Żurawie, oddział 47i, drzewostan dębowy 78-letni, z domieszką sosny tworzy dwie warstwy.
19. (162) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Żurawie, oddział 47f, drzewostan sosnowy, jednowiekowy, 68-letni z domieszką brzozy i świerka, warstwę niższą tworzy dąb bezszypułkowy z udziałem brzozy, świerka i graba.
20. (48) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 139h, teren lekko falisty, drzewostan sosnowy, jednowiekowy, 28-letni.
21. (366) woj. skierniewickie, Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie, uroczysko Głuchów, oddział 143, płaski szczyt wzniesienia terenowego, jednowiekowy, około 60-letni drzewostan sosnowy, nieliczne dęby w domieszce.
22. (5) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Chojnata, oddział 270k, teren znacznie nachylony w kierunku południowym, drzewostan sosnowy 101-letni, żywicowany, przeznaczony do wycięcia.
23. (243) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Kępa, oddział 108a, teren równy, jednowiekowy drzewostan sosnowy 61-letni.
24. (199) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Kaleń, oddział 85k, teren równy, drzewostan dębowy, 38-letni, w domieszce nieliczne sosny i brzozy.
25. (305) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Franopol, oddział 35b, teren płaski, jednowiekowy drzewostan sosnowy 60-letni.
26. (86) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 320d, na krawędzi wysoczyzny, teren nierówny, zryty okopami, różnowiekowy drzewostan dębowo-sosnowy z domieszką lipy i grabu.
27. (125) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 93a, drzewostan tworzy monokultura sosny 48-letniej.
28. (119) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 96g, drzewostan dwuwarstwowy, warstwę wyższą tworzą 68-letnie sosny, niższą budują dęby z domieszką brzozy i osiki.
29. (132) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 101d, drzewostan taki jak w zdjęciu 28.
30. (121) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 99a, jednowarstwowy 48-letni drzewostan dębowo-sosnowy.
31. (111) woj. skierniewickie, uroczysko Trębaczew, las gromadzki, drzewostan różnowiekowy dębowo-sosnowo-modrzewiowy, dwuwarstwowy z domieszką brzozy.
32. (112) woj. skierniewickie, uroczysko Trębaczew, las gromadzki, drzewostan jak w zdjęciu 31.
33. (133) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 99f, drzewostan dwuwarstwowy, wyższą warstwę tworzy 73-letnia sosna z domieszką osiki, niższą budują dęby.
34. (82) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 319c, na krawędzi zbocza doliny Pilicy, drzewostan dwuwarstwowy, sosna 103-letnia tworzy wyższą warstwę, niższą dąb szypułkowy i brzoza.

4.5.4. Chojniak sosnowy na siedlisku dąbrowy świetlistej – Tabela XIV

Chojniak sosnowy jest skrajną, najbardziej zdegenerowaną postacią świetlistej dąbrowy na badanym terenie. Zbiorowisko to powstało w wyniku długotrwałej uprawy monokultur sosnowych lub rzadziej polikultur sosnowo-dębowych, w miejscu naturalnych drzewostanów, ewentualnie po posadzeniu sosny na użytkowanych rolniczo, zdegradowanych glebach, stanowiących potencjalne siedlisko tego zespołu. Chojniak towarzyszy na ogół mniej zniekształconym płatom dąbrowy świetlistej i występuje w tych samych

kompleksach leśnych co dwie poprzednie postacie: Dąbrowa, Petrykozy, Rykały (woj. radomskie), Rylsk Mały, Trębaczew, Rawski Las, Głuchów, Chojnata, Las Jeruzalski (woj. skierniewickie). W trzech uroczyskach chojniak występuje jako jedyna postać dąbrowy świetlistej. Są to: Cielądz, Zawady (woj. skierniewickie), Wiatrowiec-Machnatka (woj. radomskie).

Gleby zajmowane przez to zbiorowisko to zbielicowane piaski gliniaste lub rzadziej gliny piaszczyste o silnie zakwaszonych górnych warstwach i głębokim poziomie wód gruntowych.

Monokultury sosny, tworzące drzewostan w tym zbiorowisku, decydują o ogólnej fizjonomii lasu (fot. 20). Chojniak na siedlisku dąbrowy to widne, czterowarstwowe zbiorowisko leśne. Zwarcie drzewostanu jest niewielkie, dochodzi najczęściej do 50%. Dobrze wykształcona warstwa podszycia osiąga przeciętnie 40-50% zwarcia. Runo zielne, również bujnie rozwinięte, pokrywa przeciętnie 82% powierzchni. Pokrycie warstwy mszystej waha się w granicach od 5 do 40%.

Pinus silvestris jest głównym i na ogół jedynym składnikiem drzewostanu. W nielicznych przypadkach *Quercus robur* i *Q. sessilis* występują jako domieszka lub też tworzą niższą warstwę drzewostanu (zdjęcia: 5, 12, 13, 15, 17). Podrosty dębów są za to dominującym komponentem warstwy podszycia.

Fot. 20. Chojniak sosnowy na siedlisku dąbrowy świetlistej. Uroczysko Rykały
Photo. 20. Pure pine stand on *Potentilla albae-Quercetum* habitat. Rykały range

Numer kolejny sđjcia		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																			
/Successive number of record/																					
Numer sđjcia																					
/No. of record/																					
Data																					
/Date/																					
Miejscowość																					
/Locality/																					
Zwarcie warstwy drzew "a ₁ " w %																					
/Density of tree layer "a ₁ " in % /																					
Zwarcie warstwy drzew "a ₂ " w %																					
/Density of tree layer "a ₂ " in % /																					
Zwarcie warstwy krzewów "b" w %																					
/Density of shrub layer "b" in % /																					
Pokrycie warstwy traw "c" w %																					
/Cover of herb layer "c" in % /																					
Pokrycie warstwy mszystej "d" w %																					
/Cover of moss layer "d" in % /																					
Powierzchnia sđjcia w m ²																					
/Surface of record in m ² /																					
Liczba gatunków w sđjciu																					
/Number of species in record/																					
Drzewa i krzewy																					
/Trees and shrubs/																					
VF	Pinus sylvestris	a ₁	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4
	"-"	a ₂	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	"-"	b	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.
	"-"	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B	Quercus robur	a ₁	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	"-"	a ₂	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	.	.	.	.	.	.
	"-"	b	.	2	1	2	1	4	2	.	.	4	2	2	4	.	3	.	3	2	3
	"-"	o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Statość - Constancy

Dicranum scoparium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Dicranum undulatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II I
Scozonera humilis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II I
MA Anthoxanthum odoratum	.	2	1	1	3	2	2	3	1	1	2	1	1	. .	3	1	3	V V V
Gallium mollugo	1.	+	+	.	1	1	1	+	+	.	.	.	.	.	.	+	+	V III IV
Achillea millefolium	.	+	+	+	+	1	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	IV II III
Koeleria arvensis	1.	1	+	1	1	1	1	.	1	.	1	+	.	1	+	.	+	IV III III
Gallium boreale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	+	.	.	.	.	1	I III II
Ranunculus acer	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I II I
Festuca rubra	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I I I
Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	I II I
Stellaria graminea	.	.	.	.	.	1	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II I
VB Pimpinella saxifraga	1	.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II II II
Viscaria vulgaris	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I I I
Anthericum ramosum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I I I
Potentilla heptaphylla	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I I
Ajuga reptans	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I I
NC Hieracium pilosella	1	.	1	.	.	1	.	1	+	.	.	.	.	.	.	+	1	III IV III
Calluna vulgaris	.	1	.	.	.	1	.	1	.	1	2	1	.	3	+	.	2	II IV III
Potentilla erecta	.	.	.	.	.	2	1	.	+	1	1	+	1	.	1	.	.	II IV III
Sieglingia decumbens	+	.	+	.	.	+	1	1	.	.	1	1	.	.	.	2	2	III III III
Lycopodium clavatum	.	+	.	1	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	II II II
Gemista germanica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	II I
Lusula multiflora	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I I I
Carex pilulifera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I I
SS Rumex acetosella	1	.	.	1	.	2	1	1	.	.	.	1	.	1	1	+	1	III IV III
Festuca ovina	.	1	1	.	.	1	.	.	1	1	1	2	1	.	.	.	2	III IV III
Thymus serpyllum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	II I
Carex ericetorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II I
B Fragaria vesca	1	1	2	3	2	2	1	2	2	.	1	1	1	1	1	2	1	V V V
Lusula pilosa	.	+	.	.	1	1	+	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	IV V V
Viola riviniana	.	1	+	.	1	2	.	.	1	1	1	1	1	.	2	.	2	III V IV
Hypericum perforatum	2	.	1	1	1	1	+	1	1	+	.	.	1	1	1	+	+	V IV IV
Veronica officinalis	1	.	1	1	+	1	+	1	2	.	1	.	1	1	.	1	+	V V V
Polytrichum attenuatum	1	1	1	1	1	+	1	2	.	1	.	+	.	1	+	.	+	IV III IV

<i>Hieracium mirtorum</i>	.	+	1	.	1	1	+	1	.	.	1	.	1	1	+	1	.	+	.	IV	III	III
<i>Campanula rotundifolia</i>	1	.	1	1	.	1	1	.	.	.	1	.	+	.	1	.	1	1	+	III	IV	III
<i>Moehringia trinervia</i>	.	2	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	1	.	.	.	+	.	.	II	III	II
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	2	.	.	2	1	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	1	II	II	II
<i>Gnaphalium silvaticum</i>	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	II	II	II
<i>Carex pallensensis</i>	.	.	1	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	I	II	I
<i>Ajuga reptans</i>	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	I	II	I
<i>Rubus saxatilis</i>	.	.	.	+	1	.	.	2	2	.	.	.	.	1	2	1	.	2	2	II	V	III
<i>Majanthemum bifolium</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	2	.	1	I	V	III
<i>Oxalis acetosella</i>	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	2	.	1	1	I	IV	II
<i>Agrostis vulgaris</i>	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	2	I	III	II
<i>Convallaria maialis</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.	2	I	III	II
<i>Gemista tinctoria</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	+	.	1	.	I	III	II
<i>Galium rotundifolium</i>	.	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	I	II	II
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	I	II	I
<i>Polytrichum juniperinum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	I	II	I
<i>Rubus sp.</i>	4	4	4	3	3	4	3	3	4	.	.	.	.	3	2	.	.	+	.	V	IV	IV
<i>Veronica chamaedrys</i>	1	1	.	1	1	1	1	+	2	+	.	.	.	.	1	.	+	1	.	V	II	IV
<i>Carex hirta</i>	2	1	1	1	1	1	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	II	II
<i>Viola canina</i>	.	+	1	1	+	+	+	1	+	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	IV	I	III
<i>Mycelis muralis</i>	1	1	.	1	2	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	III	I	II
<i>Rubus idaeus</i>	1	.	2	.	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	II	II
<i>Linaria vulgaris</i>	1	.	1	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	I	I
<i>Dryopteris spinulosa</i>	1	1	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	I	I
<i>Carex leporina</i>	1	.	1	.	+	1	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	II	II
<i>Lapsana communis</i>	1	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	I	I
<i>Mnium affine</i>	+	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	I	I
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	1	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	I	I
<i>Mnium rostratum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	I	I
<i>Urtica dioica</i>	.	3	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I
<i>Ranunculus repens</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I
<i>Galeopsis tetrahit</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I
<i>Geum urbanum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I
<i>Fumella vulgaris</i>	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I	I	I
<i>Scleropodium purum</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I
<i>Rhytidadelphus squarrosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I	I	I

Gatunki sporadične
/Sporadic species/

zdjecie /record/ 1 - Chelidonium majus /1/, 2 - Geranium robertianum /2/, Stellaria media /1/, Galium aparine /+, Viola tricolor /+, Dactylis glomerata +/, 4 - Thymus pulegioides /1/, Cerastium vulgatum +/, 5 - Sarrothamnus scoparius /1/, 6 - Carlina vulgaris /+, 7 - Trifolium alpestre /+, 8 - Hypericum humifusum /1/, 11 - Galium verum /1/, Antennaria dioica /+, Selinum carvifolia +/, 14 - Sedum maximum /+, 17 - Campanula patula /1/, 18 - Chimaphila umbellata /+, 21 - Leucobryum glaucum +/, Monotropa hypopitys +/, Molinia caerulea /1/.

Wśród roślinności zielnej dominują gatunki z klasy *Vaccinio-Piceetea* (zdjęcia 11-21) lub też runo opanowane jest przez jeżyny (zdjęcia 1-10). Stwierdzono ogólnie 17 gatunków borowych. Niewielki udział mają w runie gatunki z klasy *Quercio-Fagetea*. Spośród 11 gatunków tej grupy aż 8 występuje zaledwie w I i II klasie stałości. Dość licznie rosną tylko: *Melica nutans*, *Anemone nemorosa* i *Poa nemoralis*. Klasę *Molinio-Arrhenatheretea* reprezentuje 13 gatunków, Ciepłolubne rośliny z klasy *Festuco-Brometea* występują tu sporadycznie, natomiast dość licznie rosną gatunki z klas: *Nardo-Callunetea* i *Sedo-Scleranthetea*.

W pracach, opisujących świetlistą dąbrowę z uwzględnieniem antropogenicznych zniekształceń, zawarte są też dane poświęcone jej zdegenerowanym postaciom. Olaczek (1972) w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej wyróżnił cztery fazy degeneracji świetlistej dąbrowy. Głazek (1973) zamieścił w swej pracy 10-zdjęciową tabelę zbiorowiska scharakteryzowanego jako monokultura sosny na siedlisku dąbrowy.

Wobec braku w omawianym zbiorowisku z terenu Wysoczyzny Rawskiej zarówno gatunków charakterystycznych jak i wyróżniających dla *Potentillo albae-Quercetum*, przynależność systematyczną tego zbiorowiska ustalono na podstawie sąsiedztwa przestrzennego z płacami mniej zdegenerowanej świetlistej dąbrowy oraz ogólnych cech tej fitocenozy, a mianowicie:

- duża przeciętna liczba gatunków w zdjęciu (42);
- obecność gatunków z różnych grup syngenetycznych, w tym gatunków z klasy *Quercio-Fagetea*, mimo dominacji roślin borowych;
- powszechne naturalne odnawianie się dębu;
- udział w runie znacznej grupy gatunków łąkowych, a zwłaszcza gatunków muraw ciepłolubnych.

Jednym z przejawów degeneracji zbiorowiska jest zatarcie różnic pomiędzy jednostkami niższego rzędu, a także zanik swoistych cech fitocenozy, różniących ją od zbiorowisk pokrewnych. W tabeli XIV nie stwierdzono zróżnicowania wewnętrznego zbiorowiska w oparciu o podstawowe grupy syngenetyczne, jak to miało miejsce w przypadku dwu poprzednich postaci świetlistej dąbrowy (tabele XII i XIII), stwierdzono natomiast wyraźne zróżnicowanie florystyczne w grupie gatunków towarzyszących, znajdujące także potwierdzenie wśród roślin z klasy *Vaccinio-Piceetea*. Pozwala to na wyodrębnienie dwu grup zdjęć, stanowiących skrajnie zdegenerowane postaci dwóch fitocenoz świetlistej dąbrowy. Grupa zdjęć 1-11 reprezentuje zbiorowisko odznaczające się przede wszystkim masowym udziałem jeżyn w warstwie runa. Poza tym w podszyciu rosną tu podrosty grabu oraz krzewy liściaste, których brak w pozostałych zdjęciach. W runie częściej występują takie gatunki z klasy *Quercio-Fagetea* jak *Poa nemoralis* i *Dryopteris filix-mas*. Spośród gatunków towarzyszących rolę wyróżniającą dla tej grupy spełniają: *Veronica chamaedrys*, *Carex hirta*, *Viola canina*, *Mycelis muralis*, *Rubus idaeus*, *Linaria vulgaris*, *Dryopteris spinulosa*, *Carex leporina*, *Lapsana communis* i inne.

Postać dąbrowy reprezentowana w tabeli XIV przez zdjęcia 12-21 odznacza

się panowaniem w runie gatunków borowych z klasy *Vaccinio-Piceetea*, większym udziałem roślin murawowych z klas: *Nardo-Callunetea* i *Sedo-Scleranthetea*, występowaniem takich gatunków towarzyszących jak: *Rubus saxatilis*, *Majanthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Agrostis vulgaris*, *Convallaria maialis*, *Genista tinctoria*, *Astragalus glycyphyllos*, *Polytrichum juniperinum*. Skład florystyczny płatów reprezentowanych przez zdjęcia 12-21 sugeruje, iż jest to silnie zniekształcona postać podzespołu typowego świetlistej dąbrowy, natomiast cechy grupy zdjęć 1-11 wskazują, iż może to być kolejna faza degeneracyjna (Faliński 1966b i c) podzespołu wiechlinowego.

Analiza porównawcza postaci *Potentillo albae-Quercetum*, reprezentowanych przez tabele XII, XIII, XIV, pozwala dostrzec kierunki zmian zachodzących w zbiorowisku wraz z nasilaniem się procesu degeneracji. W tabeli XVI zestawiono stopnie stałości, współczynniki pokrycia oraz liczby gatunków w poszczególnych grupach syngenetycznych trzech postaci degeneracyjnych obu wyróżnionych podzespołów świetlistej dąbrowy. W miarę postępującej degeneracji zmiany w składzie florystycznym obu fitocenoz mają ten sam kierunek:

- a) duży spadek udziału gatunków z rzędu *Quercetalia pubescentis* oraz gatunków charakterystycznych dla zespołu aż do ich zupełnej eliminacji;
- b) znaczne zmniejszenie udziału gatunków z klasy *Querco-Fagetea*;
- c) stopniowe zwiększenie udziału roślin borowych z klasy *Vaccinio-Piceetea* oraz murawowych z klas: *Nardo-Callunetea* i *Sedo-Scleranthetea*;
- d) ograniczenie występowania gatunków z klasy *Festuco-Brometea* jak również roślin łąkowych z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*.

Stanowiska zdjęć w tabeli XIV

1. (191) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Cielądz, oddział 130b, drzewostan tworzy monokultura sosny 43-letniej, teren równy.
2. (352) woj. radomskie, ndl. Białobrzegi, uroczysko Rykały, oddział 4g, teren nieznacznie nachylony w kierunku południowym, w drzewostanie monokultura sosny 56-letniej.
3. (138) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Petrykozy, oddział 37g, teren lekko nachylony ku zachodowi, jednowiekowy, 66-letni drzewostan sosnowy.
4. (137) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 101d, drzewostan buduje monokultura sosnowa w wieku 58 lat.
5. (140) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Petrykozy, oddział 41b, teren równy, drzewostan dwuwarstwowy, wyższą warstwę tworzy jednowiekowa 69-letnia sosna, niższą buduje głównie dąb bezszypułkowy.
6. (403) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Ryłsk Mały, oddział 116d, teren lekko nachylony w kierunku zachodnim, w drzewostanie występuje tylko jednowiekowa, 48-letnia *Pinus silvestris*.
7. (102) woj. radomskie, uroczysko Dąbrowa k. Mogielnicy, teren płaski, własność prywatna, drzewostan tworzy około 60-letnia monokultura sosny.
8. (101) woj. radomskie, uroczysko Dąbrowa k. Mogielnicy, podobny płat lasu z drzewostanem sosnowym nieco młodszym.
9. (382) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Zawady, oddział 207a, teren równy, drzewostan sosnowy 64-letni.

10. (378) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Zawady, oddział 216d, drzewostan buduje 69-letnia monokultura sosny.
11. (134) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Trębaczew, oddział 101b, drzewostan sosnowy 45-letni z niewielką domieszką dębu.
12. (10) woj. skierniewickie, Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie, uroczysko Głuchów, oddział 168, drzewostan dwuwarstwowy, górną warstwę tworzą nieliczne stare około 100-letnie sosny, dolną buduje dąb z domieszką świerka i brzozy.
13. (237) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wiatrowiec-Machnatka, oddział 114a, teren płaski, młody drzewostan 23-letni, dębowo-sosnowy z domieszką brzozy, modrzewia i osiki.
14. (361) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 141b, teren lekko nachylony w kierunku zachodnim, jednowiekowy drzewostan sosnowy 55-letni w domieszcze brzoza, dąb i modrzew.
15. (34) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Zawady, oddział 204f, teren nieznacznie nachylony w kierunku zachodnim, drzewostan dwuwarstwowy, w górnej warstwie występuje 81-letnia sosna, niższą tworzą: świerk, brzoza, dąb, osika i grab.
16. (376) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Zawady, oddział 218a, drzewostan tworzy monokultura sosny 79-letniej.
17. (4) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Chojnata, oddział 365f, teren wzniesiony, pochylony ku południowi, drzewostan dwuwarstwowy, wyższą warstwę tworzy sosna 86-letnia, przerzedzona, niżej rośnie dąb bezszypułkowy z domieszką brzozy.
18. (377) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Zawady, oddział 219a, teren równy, jednowarstwowy drzewostan buduje monokultura sosny 64-letniej.
19. (28) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 253f, na wzniesieniu terenowym, drzewostan tworzy jednowiekowa uprawa sosny 76-letniej.
20. (32) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 241c, teren również wzniesiony, w drzewostanie monokultura sosny 46-letniej.
21. (407) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Las Jeruzalski, oddział 235g, teren lekko nachylony w kierunku południowym, drzewostan sosnowy jednowarstwowy, jednowiekowy 59-letni.

4.6.1. *Pino-Quercetum* Kozł. 1925. bór mieszany sosnowo-dębowy – Tabela XVII

Zespół *Pino-Quercetum* zajmuje na terenie Wysoczyzny Rawskiej niezbyt dużą powierzchnię. Płaty tego zbiorowiska są niewielkie, ale rozproszone w wielu kompleksach leśnych na całym badanym terenie. Partie boru mieszanego sąsiadują zwykle z postaciami degeneracyjnymi dąbrowy świetlistej lub rzadziej ze zdegenerowanymi zbiorowiskami grądowymi. Należy zaznaczyć, że zbiorowisko przedstawione w tej pracy jako *Pino-Quercetum* prawdopodobnie nie jest na badanym terenie naturalną fitocenozą. Jest to zbiorowisko antropogeniczne, ukształtowane pod wpływem gospodarki leśnej. Występuje na obszarze Wysoczyzny Rawskiej w następujących uroczyskach leśnych: Kępa, Petrykozy, Tomczyce, Świdno, Wilczoruda (woj. radomskie), Żurawie, Stolniki, Wale, Dębina, Cielądz, Rylsk Mały, Grabina, Zawady, Chojnata, Głuchów, Osuchów (woj. skierniewickie). Wykształca się na glebach bielcowych, piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych, o silnie zakwaszonych górnych warstwach i o głębokim poziomie wód gruntowych.

Bór mieszany to dość widne zbiorowisko leśne z jedno- lub rzadziej

dwuwarstwowym drzewostanem, w którym zdecydowanie dominuje sosna (fot. 21). Dąb tylko w nielicznych płatach osiąga znaczne zwarcie w drzewostanie (zdjęcia: 4, 8, 14). Natomiast w partiach zbiorowiska z dwuwarstwowym drzewostanem tworzy zwykle warstwę niższą. Przeciętne zwarcie koron drzew wynosi 55%. Brzoza i osika są często spotykaną domieszką.

Fot. 21. *Pino-Quercetum* z panującą sosną w drzewostanie. Uroczysko Tomczyce
Photo. 21. *Pino-Quercetum* with prevailing pine in stand. Tomczyce range

Warstwa podszycia jest na ogół bujnie rozwinięta, jej przeciętne zwarcie wynosi 37%. Przeważający udział mają tu podrosty dębów, a zwłaszcza dębu szypułkowego, który powszechnie odnawia się. Sosna odnawia się słabo, znacznie gorzej niż w borze sosnowym. Pospolicie rosną podrosty brzozy, osiki i świerka. Znaczny udział mają także: *Juniperus communis*, *Frangula alnus*, *Sorbus aucuparia*, *Corylus avellana*. W warstwie podszycia boru mieszanego, spotyka się, częściej niż w innych zbiorowiskach, gatunki geograficznie obce, podsadzane. Do nich należą: *Quercus rubra*, *Fagus silvatica*, *Padus serotina*.

Runo zielne wykształca się dość bujnie. Pokrywa przeciętnie 85% powierzchni. Zdecydowaną przewagę mają tu gatunki borowe, z których największym pokryciem wyróżnia się borówka czarna. W niektórych płatach (zdjęcia: 1, 4-6, 9, 11, 12) runo opanowane jest przez trawy: *Anthoxanthum*

Starobc - Constancy

[illegible]

Polytrichum juniperinum

Veronica chamaedrys

Majanthemum bifolium

Calamagrostis arundinacea

Carex palliata

Gemista tinctoria

Convallaria maialis

Linaria vulgaris

Rubus sp.

Agrostis vulgaris

Galeopsis tetrahit

Moechringia trinervia

Mnium rostratum

Pohlia nutans

Sarothamnus scoparius

Calamagrostis epigios

Rubus idaeus

Scleropodium purum

Oxalis acetosella

Mycelis muralis

Dryopteris spinulosa

Ajuga reptans

Hieracium pratense

Carex oarophylla

Mnium affine

Astragalus glycyphyllos

Galium verum

Stellaria media

Stellaria graminea

Chelidonium majus

Dicranella heteromalla

Gatunki sporadyczne /Sporadic species/ : zdjécie /record/ 1 - Anthriscus silvestris +/-, Festuca rubra +/-, Silene otites +/-, 3 - Lysimachia vulgaris +/-, 5 - Gnaphalium silvaticum +/-, 6 - Sedum maximum +/-, Acer platanoides b/+, Carex hirta /2/, 7 - Lysimachia vulgaris +/-, 8 - Hypericum humifusum +/-, 9 - Dianthus carthusianorum +/-, Veronica spicata /1/, Thymus pulegioides /1/, Viola tricolor +/-, Brachythecium rutabulum +/-, Eurychium striatum +/-, 10 - Brachythecium velutinum +/-, 11 - Holcus lanatus +/-, Arrhenatherum elatius /2/, Galium verum /1/, Chamaenerion angustifolium /1/, 12 - Ranunculus acris +/-, Carex pilulifera /1/, Plantago lanceolata +/-, 17 - Antennaria dioica /1/, 25 - Viscaria vulgaris +/-, 24 - Eurychium striatum +/-.

odoratum, *Festuca ovina*, *F. psammophila*, *Agrostis vulgaris*, *Calamagrostis epigeios*.

Warstwa mszysta rozwinięta jest dość dobrze, jej przeciętne pokrycie wynosi 18%. Najliczniej wśród mszaków występują: *Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens* i *Polytrichum attenuatum*.

W omawianym zbiorowisku stwierdzono ogółem 142 gatunki, natomiast w jednym zdjęciu fitosocjologicznym występuje przeciętnie 38. Dominującą grupę stanowią gatunki z klasy *Vaccinio-Piceetea*, których zanotowano 20. Z gatunków klasy *Quercetea robori-petraeae*, pospolicie rosną: *Pteridium aquilinum* i *Hieracium lachenalii*. Wśród roślinności zielnej stwierdzono 8 gatunków z klasy *Querco-Fagetea*. Wszystkie jednak osiągają zaledwie II i I klasę stałości. Do częściej spotykanych należą: *Polygonatum odoratum*, *Anemone nemorosa*, *Catharinea undulata*, *Poa nemoralis*.

Bory mieszane sosnowo-dębowe należą do szeroko rozprzestrzenionych zbiorowisk leśnych w naszym kraju i były opisywane przez wielu autorów: Piotrowską (1950), Matuszkiewicza (1955), Tokarz (1961), Celińskiego (1962), Sokołowskiego (1963, 1969), Denisiuka (1963), Kępczyńskiego (1965), Piotrowską i Żukowskiego (1967), Zarębę (1971), Rejewskiego (1971), Olaczka (1965, 1972), Głazka (1973). Zbiorowisko o charakterze zbliżonym do *Pino-Quercetum* opisała Urbanek (1961, 1966) z rezerwatu Babsk na terenie Wysoczyzny Rawskiej.

Pino-Quercetum jest zespołem o charakterze pośrednim między borami a zbiorowiskami lasów liściastych. Odznacza się florystyczno-ekologicznym powiązaniem zarówno z ubogimi grądami, dąbrowami jak i borami sosnowymi (Matuszkiewicz i Polakowska 1955).

Opisywana postać boru mieszanego wykształca się na zdegradowanych siedliskach grądów i świetlistej dąbrowy. Potwierdzeniem tego jest chociażby przestrzenne sąsiedztwo tych zbiorowisk. Ze względu na powszechną uprawę sosny, postaci degeneracyjne grądu typowego, dąbrowy świetlistej i boru mieszanego stały się zbiorowiskami podobnymi i dokładne ich rozgraniczenie nastęrcza niemałe trudności. Przed sporządzeniem tabeli, reprezentującej postać degeneracyjną zespołu *Pino-Quercetum*, zdjęcia fitosocjologiczne, wchodzące w jej skład, zestawiono w zbiorczej tabeli łącznie z wieloma innymi zdjęciami, przypominającymi składem florystycznym bór mieszany. Następnie zdjęcia te zostały uporządkowane według największych współczynników podobieństwa za pomocą komputera. Zestawienie to pozwoliło na, w miarę dokładne i obiektywne, wydzielenie grup zdjęć, reprezentujących postaci degeneracyjne boru mieszanego, grądu typowego i dąbrowy świetlistej. Mimo to nie ma pewności, że wszystkie płaty uznane za postać *Pino-Quercetum* były w przeszłości borem mieszanym. Geneza tego zespołu związana jest bowiem z prowadzoną od lat gospodarką leśną.

Spośród gatunków, podanych przez Matuszkiewicza i Polakowską (1955) za charakterystyczne dla zespołu, w zbiorowisku tym występują: *Veronica officinalis* (V), *Hieracium lachenalii* (III), *H. umbellatum* (I), *Populus*

tremula (III). Na badanym terenie gatunki te rosną pospolicie również w zbiorowiskach świetlistej dąbrowy, grądu typowego, a także w borze sosnowym.

Zbiorowiska *Pino-Quercetum* szybciej ulegają antropogenicznym zniekształceniom w porównaniu z grądami czy też ze świetlistą dąbrową. Degeneracja fitocenozy na skutek pinetyzacji jest tu procesem bardziej zaawansowanym. Świadczy o tym znikomy udział w runie gatunków z klasy *Querco-Fagetea* przy jednoczesnym panowaniu gatunków borowych. Sosna, tworząca drzewostan na równi z dębem w naturalnych fitocenozach, w tej postaci boru mieszanego, w większości płatów jest gatunkiem panującym lub też tworzy jednogatunkowe drzewostany (fot. 21).

W niektórych płatach zbiorowiska zaobserwowano nadmierny rozwój podszycia (zdjęcia: 5, 14, 21-23), będący skutkiem, podobnie jak w innych zbiorowiskach, przerzedzenia drzewostanu. Największy udział w warstwie krzewów mają podrostry dębu szypułkowego, a także leszczyna. Przejawem neofityzacji boru mieszanego na badanym terenie jest obecność w podszyciu takich gatunków jak: *Quercus rubra*, *Padus serotina*, *Fagus sylvatica*.

Dość często spotyka się płaty *Pino-Quercetum* gdzie warstwa runa opanowana jest przez trawy (zdjęcia: 1, 4-6, 9, 12, 11, 23-25). Wyrazem cespityzacji jest występowanie takich gatunków jak: *Festuca ovina*, *Anthoxanthum odoratum*, w mniejszym stopniu: *Agrostis vulgaris*, *Sieglingia decumbens*, *Festuca psammophila*, *Calamagrostis epigeios*.

Stanowiska zdjęć w tabeli XVII

1. (390) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 314c, drzewostan buduje monokultura sosny 76-letniej, teren lekko nachylony ku zachodowi, znaczne zadarnienie runa.
2. (242) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Kępa, oddział 109b, teren równy, jednowiekowy drzewostan sosnowy 62-letni.
3. (244) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Kępa, oddział 107g, jednowiekowy drzewostan sosnowy 55-letni.
4. (161) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Grabina, oddział 69f, teren wzniesiony, drzewostan dębowy 48-letni z niewielką domieszką sosny.
5. (175) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rylsk Mały, oddział 115a, teren równy, drzewostan tworzy monokultura sosny 48-letniej.
6. (202) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Cielądz, oddział 130b, teren lekko nachylony w kierunku południowym, drzewostan buduje sosna 43-letnia.
7. (245) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Kępa, oddział 107i, teren równy, drzewostan sosnowy 55-letni z domieszką osiki.
8. (141) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Petrykozy, oddział 41a, teren równy, drzewostan dębowy 51-letni z domieszką brzozy.
9. (295) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 315h, teren znacznie nachylony w kierunku południowo-wschodnim, drzewostan tworzy sosna 75-letnia, runo zadarnione.
10. (38) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Zawady, oddział 218b, teren lekko nachylony w kierunku zachodnim, jednowiekowy drzewostan sosnowy 76-letni.

11. (373) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 319f, teren równy, drzewostan buduje monokultura 66-letniej sosny, w runie silne zadarnienie.
12. (83) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 319f, teren nieznacznie nachylony ku południowi, jednowiekowy drzewostan sosnowy 64-letni.
13. (71) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Chojnata, oddział 264i, lokalne wzniesienie terenowe, w drzewostanie sosna 66-letnia.
14. (167) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Żurawie, oddział 48f, drzewostan dębowy 78-letni z domieszką brzozy, teren falisty.
15. (142) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Petrykozy, oddział 35f, teren równy, drzewostan dwuwarstwowy, warstwę wyższą tworzy sosna 79-letnia, niższą dęby z domieszką brzozy.
16. (16) woj. skierniewickie, Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie, uroczysko Głuchów, oddział 186, teren lekko nachylony w kierunku południowym, około 100-letni drzewostan sosnowy, niższą warstwę tworzy dąb szypułkowy.
17. (57) woj. skierniewickie, ndl. Skuły, uroczysko Osuchów, oddział 364f, teren lekko wzniesiony, drzewostan sosnowy 64-letni z domieszką osiki.
18. (324) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wilczoruda, oddział 53g, teren równy, drzewostan tworzy monokultura 71-letniej sosny.
19. (82) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 319c, przy krawędzi zbocza doliny Pilicy, drzewostan dwuwarstwowy, wyższą warstwę buduje sosna 104-letnia, niższą dąb i brzoza.
20. (53) woj. skierniewickie, ndl. Skuły, uroczysko Osuchów, oddział 356b, teren płaski, drzewostan dwuwarstwowy sosnowo-dębowy 64-letni.
21. (19) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Dębina, oddział 29b, teren równy, drzewostan dwuwarstwowy, wyższą warstwę tworzy 123-letnia sosna, w niższej rosną dęby z domieszką brzozy.
22. (18) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Dębina, oddział 29c, teren lekko nachylony w kierunku południowo-wschodnim, drzewostan jak w zdjęciu 21.
23. (164) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Żurawie, oddział 47c, na wzniesieniu terenowym, jednowiekowy drzewostan sosnowy 68-letni, z niewielką domieszką dębu.
24. (188) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Stolniki, oddział 121d, teren lekko nachylony w kierunku południowym, jednowiekowy 58-letni drzewostan sosnowy z domieszką brzozy.
25. (399) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Wale, oddział 153b, teren równy, w drzewostanie monokultura sosny 60-letniej.

4.6.2. Chojniak sosnowy na siedlisku boru mieszanego – Tabela XVIII

Chojniak sosnowy jest postacią degeneracyjną skrajnie zniekształconego zbiorowiska boru mieszanego. Niewielkie płyty tej postaci fitocenozy sąsiadują na ogół z partiami mniej zniekształconego boru mieszanego. Stwierdzono je w następujących uroczyskach leśnych: Ryłsk Mały, Żurawie (ndl. Rawa Mazowiecka), Tomczyce, Wilków, Jeziora (ndl. Grójec), Chojnata, Zawady (ndl. Radziwiłłów), Głuchów (Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie).

Zbiorowisko to powstało w wyniku uprawy monokultur sosnowych na siedliskach borów mieszanych. Jednogatunkowe uprawy sosny, sadzone po zrębach zupełnych lub na glebach porolnych, tworzą drzewostan niemal we wszystkich stwierdzonych płatach zbiorowiska. Tylko w czterech zdjęciach fitosocjologicznych zanotowano w drzewostanie dąb szypułkowy. Brzoza występuje również rzadko, stanowiąc domieszkę wśród drzew. Odnawianie

sosny stwierdzono w nielicznych płatach, natomiast podrosty dębu są głównym składnikiem podszycia w całym zbiorowisku. Pospolicie w podszyciu rośnie też jałowiec oraz podrosty brzozy. Warstwa ta jest uboższa w gatunki oraz osiąga przeciętnie mniejsze zwarcie (25%) w porównaniu z postacią lepiej zachowanego zbiorowiska boru mieszanego. Zwraca uwagę dalsze ograniczenie udziału w tej warstwie gatunków z klasy *Quercio-Fagetea*.

Runo rozwinięte jest dość dobrze, pokrywa przeciętnie 68% powierzchni. W składzie florystycznym tej warstwy decydującą grupę stanowią gatunki borowe z klasy *Vaccinio-Piceetea*, osiągające największe pokrycie oraz wysokie klasy stałości. W niektórych płatach zbiorowiska runo opanowane jest przez trawy (zdjęcia 2-5), z których największym udziałem odznaczają się: *Anthoxanthum odoratum*, *Festuca ovina*, *Agrostis vulgaris*. Licznie występują także gatunki z klasy *Nardo-Callunetea*, przyczyniające się również do zadarnienia runa (*Calluna vulgaris*, *Hieracium pilosella*, *Carex ericetorum*, *Sieglingia decumbens*). Warstwa runa mszystego jest tu dobrze rozwinięta. Głównymi jej składnikami są: *Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens*, *Dicranum undulatum*, *Polytrichum attenuatum*.

Chojniak na siedlisku boru mieszanego jest zbiorowiskiem antropogenicznym, znacznie uboższym florystycznie w porównaniu z lepiej zachowaną postacią *Pino-Quercetum*. W jednym zdjęciu fitosocjologicznym występuje tu przeciętnie zaledwie 27 gatunków. Zubożenie florystyczne zaznacza się we wszystkich warstwach zbiorowiska. Zwraca uwagę zupełna eliminacja gatunków z klasy *Quercio-Fagetea*. Są to przejawy daleko zaawansowanej degeneracji zbiorowiska boru mieszanego. Siedlisko zostało tu zmienione, zdegradowane na skutek powtarzającego się uprawiania monokultur sosnowych, a także stosowania metody zrębów zupełnych. Nie wykluczone, że częściowo zbiorowisko to wykształciło się po posadzeniu sosny na wyjałowionych glebach porolnych.

Stanowiska zdjęć w tabeli XVIII

1. (331) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Ryłsk Mały, oddział 116d, teren równy, drzewostan sosnowy jednowiekowy 48-letni.
2. (374) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 321c, teren lekko nachylony w kierunku zachodnim, drzewostan tworzy monokultura sosny 51-letniej.
3. (395) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Jeziora, oddział 88g, teren nieznacznie nachylony ku południowi, młody drzewostan sosnowy 30-letni.
4. (346) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 319f, teren równy, w drzewostanie monokultura sosny 66-letniej, silne zadarnienie runa.
5. (410) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Żurawie, oddział 50f, jednowiekowy drzewostan sosnowy 50-letni, runo zadarnione.
6. (152) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wilków, oddział 188h, na wzniesieniu terenowym, drzewostan sosnowy, jednowiekowy 84-letni.
7. (172) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Ryłsk Mały, oddział 109a, teren lekko nachylony w kierunku południowym, jednowiekowy drzewostan sosnowy 63-letni.

Numer kolejny zdjęcia /Successive number of record/		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Stażność - Constancy
Numer zdjęcia /No. of record/		331	374	395	346	410	152	172	412	72	396	36	75	333	69	
Data /Date/		26 08 72	25 06 73	12 07 73	23 05 73	23 08 73	20 07 71	13 08 71	26 08 73	22 09 70	14 07 73	25 07 70	22 09 70	26 08 72	22 09 70	Stażność - Constancy
Miejscowość /Locality/		RM	Tm	Jz	Tm	2r	Wil	RM	Gz	Ch	2r	2w	Ch	RM	Ch	
Zwarcie warstwy drzew "a" w % /Density of tree layer "a" in %/		60	50	50	60	55	45	60	60	60	50	50	70	60	65	Stażność - Constancy
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub layer "b" in %/		10	5	20	20	10	50	20	30	40	20	10	60	30	30	
Pokrycie warstwy runa "c" w % /Cover of herb layer "c" in %/		70	50	90	95	60	40	70	60	80	40	60	70	90	80	Stażność - Constancy
Pokrycie warstwy masyści "d" w % /Cover of moss layer "d" in %/		30	50	20	10	30	30	15	30	20	60	50	15	40	10	
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of record in m ² /		400	300	400	400	300	400	400	400	400	400	400	400	400	600	Stażność - Constancy
Liczba gatunków w zdjeciu /Number of species in record/		22	24	29	30	24	22	23	25	31	29	30	26	31	29	
Drzewa i krzewy /Trees and shrubs/																Stażność - Constancy
VP	Pinus silvestris	a	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	V
	-"-	b	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	.	.	.	II
	-"-	c	.	+	.	.	.	1	.	1	+	.	.	.	.	II
B	Quercus robur	a	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	3	.	V
	-"-	b	2	1	2	2	.	1	1	3	2	2	.	2	.	II
	-"-	c	+	+	+	+	1	.	+	1	1	+	.	1	+	V
	Betula verrucosa	a	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	II
	-"-	b	1	.	1	1	.	1	1	.	1	.	1	.	1	IV
	-"-	c	+	+	+	+	.	+	+	+	1	.	+	.	+	IV
	Quercus sessilis	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	I
	-"-	b	.	.	.	.	.	2	2	.	1	.	1	2	1	III
	-"-	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
VP	Picea excelsa	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I
	-"-	b	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	II
	-"-	c	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	II
K	Fagus sylvatica	b	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	-"-	c	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	Quercus rubra	c	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
VP	Populus tremula	c	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I
B	Juniperus communis	b	.	1	.	1	.	1	.	.	1	.	1	1	.	IV
	-"-	c	.	+	+	+	.	+	.	.	1	+	+	.	+	IV
	Frangula alnus	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	II
	-"-	c	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	+	+	1	II
	Sorbus aucuparia	b	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	II
	-"-	c	.	+	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.	II
QF	Corylus avellana	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	I
	-"-	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	I
B	Pinus communis	c	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I

Runc sielne i msaki
/Herbs and moss/

VF	<i>Antodon schreberi</i>	2	4	2	1	2	2	1	3	1	3	4	2	3	2	V
	<i>Vaccinium myrtillus</i>	.	.	2	1	1	2	2	4	2	2	3	3	4	4	V
	<i>Malampyrum pratense</i>	.	.	1	1	1	.	1	.	1	1	1	1	1	2	IV
	<i>Solidago virga-aurea</i>	.	1	1	1	.	1	1	.	1	.	1	.	1	1	IV
	<i>Cytisus ratisbonensis</i>	.	2	.	.	.	1	.	2	2	1	1	1	1	1	IV
	<i>Hylocomium splendens</i>	.	.	.	1	.	.	1	2	.	1	.	1	1	1	III
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	.	.	.	.	.	.	3	1	.	2	1	1	1	1	III
	<i>Dicranum undulatum</i>	.	.	.	.	1	.	1	.	.	2	1	1	.	1	
	<i>Trientalis europaea</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	2	II
	<i>Pirola secunda</i>	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	II
	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	II
	<i>Dicranum scoparium</i>	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	II
	<i>Scorsonera humilis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	I
	<i>Pirola minor</i>	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Hypnum cupressiforme</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	I
Qrp	<i>Pteridium aquilinum</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	2	1	1	II
	<i>Hieracium lachenalii</i>	+	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	II
	<i>Holcus mollis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I
MA	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	3	4	4	3	.	1	2	2	2	2	.	.	.	IV
	<i>Knautia arvensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I
	<i>Achillea millefolium</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
SS	<i>Festuca ovina</i>	.	3	.	3	1	2	1	2	1	2	3	.	2	.	IV
	<i>Rumex acetosella</i>	2	1	+	1	2	+	.	.	.	1	1	.	.	.	III
	<i>Thymus serpyllum</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Festuca psammophila</i>	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Koeleria polonica</i>	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
SC	<i>Calluna vulgaris</i>	.	1	.	1	2	2	2	2	3	2	2	.	1	2	IV
	<i>Hieracium pilosella</i>	.	+	1	.	1	1	+	1	1	1	1	1	.	1	IV
	<i>Carex ericetorum</i>	.	1	+	1	2	1	1	1	.	1	1	.	.	1	IV
	<i>Sieglingia decumbens</i>	.	.	.	.	2	1	1	2	1	1	2	.	1	.	III
	<i>Viola canina</i>	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Lycopodium clavatum</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I
	<i>Potentilla erecta</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	I
	<i>Lusula multiflora</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Carex leporina</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Gemista germanica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I
B	<i>Lusula pilosa</i>	1	.	1	.	1	.	1	1	2	1	1	1	1	2	IV
	<i>Veronica officinalis</i>	1	+	1	1	1	.	.	.	1	1	1	.	+	1	IV
	<i>Hieracium murorum</i>	1	.	1	.	.	+	+	+	.	+	1	.	+	+	IV
	<i>Polytrichum attenuatum</i>	1	.	1	1	+	.	.	.	.	1	1	.	1	1	III
	<i>Polytrichum juniperinum</i>	1	1	1	1	.	.	1	.	1	1	.	.	1	.	III
	<i>Hypericum perforatum</i>	1	+	+	+	+	.	.	.	.	+	1	.	.	.	III
	<i>Fragaria vesca</i>	1	.	1	.	.	.	1	.	1	.	.	2	1	1	III
	<i>Campanula rotundifolia</i>	1	.	.	1	.	.	.	1	.	+	1	.	+	.	III
	<i>Viola riviniana</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	II

<i>Carex pallescens</i>	1	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	II
<i>Agrostis vulgaris</i>	.	.	2	.	3	.	.	1	.	.	1	.	.	II
<i>Sarothamnus scoparius</i>	.	.	3	.	.	1	2	.	.	1	.	.	.	II
<i>Rubus saxatilis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	II
<i>Rubus sp.</i>	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	II
<i>Calamagrostis epigeios</i>	2	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	II
<i>Convallaria maialis</i>	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	I
<i>Mnium rostratum</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	II
<i>Carex caryophylla</i>	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Gnaphalium silvaticum</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	.	I

Gatunki sporadyczne

/Sporadic species/:

zdjęcie /record/ 1 - *Linaria vulgaris* /1/, *Viola tricolor* /1/,
2 - *Dianthus carthusianorum* /+/, *Polypodium vulgare* /+/, *Calamintha acinos* /+/, *Armeria elongata* /+/, 3 - *Scleropodium purum* /1/, 4 - *Galeopsis tetrahit* /+/, *Moehringia trinervia* /1/,
Chamaenerion angustifolium /+/, *Poa pratensis* /1/, *Luzula campestris* /+/, 5 - *Rubus idaeus* /1/, 8 - *Polygonatum odoratum* /2/,
11 - *Genista tinctoria* /1/, 12 - *Melica nutans* /2/, 13 - *Pimpinella saxifraga* /+/, *Calamagrostis arundinacea* /1/, 14 - *Majanthemum bifolium* /1/.

8. (412) woj. skierniewickie, Lasy Dośw. SGGW-AR w Warszawie, uroczysko Głuchów, oddział 162, teren nachylony w kierunku południowym, jednowiekowy drzewostan sosnowy około 70-letni.
9. (72) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Chojnata, oddział 264d, teren równy, drzewostan sosnowy, jednowiekowy 66-letni.
10. (396) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Żurawie, oddział 44a, teren lekko falisty, drzewostan tworzy monokultura sosny 70-letniej.
11. (36) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Zawady, oddział 209i, na wzniesieniu terenowym, jednowiekowy drzewostan sosnowy 46-letni.
12. (75) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Chojnata, oddział 263f, teren nachylony w kierunku południowym, drzewostan sosnowy 62-letni, niższą warstwę tworzą dęby.
13. (333) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Ryłsk Mały, oddział 116f, teren równy, młody drzewostan sosnowy jednowiekowy 32-letni.
14. (69) woj. skierniewickie, ndl. Radziwiłłów, uroczysko Chojnata, oddział 261k, teren równy, drzewostan sosnowy 51-letni z domieszką dębu.

4.7. PEUCEDANO-PINETUM TYPICUM MAT. (1962) 1973. BÓR SOSNOWY SUBKONTYNTENTALNY – TABELA XIX

Subkontynentalny bór sosnowy występuje na badanym terenie jedynie w podzespole typowym. Wykształca się na terenach płaskich lub lekko falistych. Powierzchnia jaką zajmuje jest niewielka. Dość duże płyty boru sosnowego z goryszem stwierdzono w nadleśnictwie Rawa Mazowiecka, w uroczyskach leśnych: Bogusławki-Sanogoszcz, Zagórze, Nowizna-Kolduny, Rawski Las, Kaleń, Wale. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmuje to zbiorowisko na terenie nadleśnictwa Grójec. Pojedyncze, niewielkie płyty stwierdzono w uroczyskach: Petrykozy, Wilczoruda, Jastrzębia-Otałążka. *Peucedano-Pinetum typicum* rośnie na glebach piaszczystych, zbielicowanych, z głębokim poziomem wód gruntowych.

Jest to widne, czterowarstwowe zbiorowisko leśne (fot. 22). Sztucznie odnawiane drzewostany tworzą jednowiekowe monokultury sosny, niekiedy z domieszką dębu szypułkowego lub brzozy. Przeciętnie zwarcie koron drzew wynosi 50%. Sosna w większości płatów odnawia się, świadczy o tym

obecność siewek oraz znaczny udział podrostu w warstwie podszycia. Sporadycznie występuje w drzewostanie świerk oraz osika i dąb bezszypułkowy.

Podszycie jest dość dobrze rozwinięte, osiąga przeciętnie 28% zwarcia. Głównymi komponentami tej warstwy są podrostry sosny i dębu szypułkowego oraz jałowiec. Rzadziej spotyka się: *Sorbus aucuparia*, *Frangula alnus*, podrostry *Populus tremula* i *Picea excelsa*.

Runo zielne rozwija się w różnym stopniu, pokrycie tej warstwy waha się w granicach od 40 do 100%. W płatach, gdzie runo wykształcone jest słabiej, większe pokrycie wykazuje warstwa mszysta, jej zwarcie dochodzi do 60%. Wśród roślinności zielnej dominuje *Vaccinium myrtillus*. Duży

Fot. 22. *Peucedano-Pinetum typicum*. Uroczysko Bogusławki-Sanogoszcz

Photo. 22. *Peucedano-Pinetum typicum*. Bogusławki-Sanogoszcz range

Numer kolejny adjecta /Successive number of record/ Numer adjecta /No. of record/		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Data /Date/		313	143	315	196	198	397	61	59	314	350	58	318	192	194	306	197	307	60	195	301	67	66	319	320	308
Miejscowość /Locality/		8	19	8	30	19	5	18	18	8	11	18	10	30	30	25	19	25	18	30	24	18	18	10	10	25
Zwarcie warstwy drzew "a" w % /Density of tree layer "a" in %/		08	07	08	09	09	08	09	08	06	08	08	08	08	08	07	09	07	09	08	07	09	09	08	08	07
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub layer "b" in %/		72	71	72	71	71	73	70	72	73	70	72	73	71	71	72	71	72	70	71	72	70	70	72	72	72
Pokrycie warstwy trawy "c" w % /Cover of herb layer "c" in %/		BS	Wr	MK	BS	KL	WL	RL	RL	KL	RL	KL	RL	KL	BS	Zg	KL	Zg	KL	BS	JO	RL	KL	KL	Pt	Zg
Pokrycie warstwy masywej "d" w % /Cover of moss layer "d" in %/		50	60	50	60	50	50	50	40	55	45	40	55	50	50	40	60	60	70	40	55	40	40	60	60	50
Powierzchnia adjecta w m ² /Surface of record in m ² /		10	20	10	40	30	50	20	50	20	20	50	10	30	50	50	40	20	60	15	20	20	10	20	15	15
Liczba gatunków w adjectu /Number of species in record/		50	80	90	70	50	60	60	50	100	90	70	70	60	80	40	60	90	40	40	40	60	80	70	70	60
		60	20	30	10	20	40	30	40	10	10	20	30	40	20	60	40	20	40	20	40	20	20	20	30	20
		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		34	38	36	38	33	36	36	26	35	34	31	34	38	40	28	32	36	32	33	25	32	35	34	37	30

Stażec - Constancy

Drzewa i krzewy /Trees and shrubs/																										
VCh Pinus silvestris		a	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4
- " - "		b	1	1	1	1	2	2	3	1	1	3	1	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
- " - "		c	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
B Quercus robur		a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- " - "		b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- " - "		c	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Betula verrucosa		a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- " - "		b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- " - "		c	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Och	Populus tremula	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VCh	Dicranum undulatum	2	.	.	1	1	3	.	2	1	.	1	2	2	1	2	2	2	.	1	1	.	.	.	.	1	IV	
	Monotropa hypopitys	+	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
KCh	Entodon schreberi	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	4	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	V
	Vaccinium myrtillus	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	2	1	1	4	4	4	3	1	V	
	Vaccinium vitis-idaea	2	1	1	1	2	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	IV	
	Melampyrum pratense	1	1	1	+	+	.	2	1	1	1	1	1	.	2	1	.	1	.	1	1	1	1	1	2	+	IV	
	Hylacomium splendens	2	2	1	1	.	3	.	.	1	1	.	1	1	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	1	III	
	Pirola secunda	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	1	1	.	1	2	.	2	.	III	
	Dicranum scoparium	2	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	1	3	.	.	.	.	.	II	
	Trientalis europaea	.	1	1	.	.	.	1	1	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	
	Hymn cupressiforme	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	II	
	Leucobryum glaucum	1	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	II	
	Pirola minor	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	I	
	Lycopodium annotinum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	Linnaea borealis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	I	
	Ptilium crista-castrensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	Arctostaphylos uva-ursi	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
Qrp	Hieracium umbellatum	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	II	
	Holcus mollis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
QF	Anemone nemorosa	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	
	Melica nutans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	I
NC	Calluna vulgaris	3	2	2	1	1	3	3	3	2	3	1	2	1	1	.	2	2	.	1	2	1	.	.	1	.	V	
	Hieracium pilosella	+	.	.	1	1	+	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	V	
	Sieglingia decumbens	1	1	1	1	2	1	1	1	1	.	1	.	+	1	2	1	2	1	+	1	1	.	.	1	.	V	
	Carex ericetorum	1	1	.	.	1	.	1	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	III	
	Viola canina	.	+	.	+	.	+	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	1	.	+	.	.	.	.	+	.	II	
	Lycopodium clavatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3	2	1	2	.	1	.	.	.	.	3	II		
	Potentilla erecta	.	+	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	II	
	Genista germanica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	I	
	Antennaria dioica	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	I	
SS	Festuca ovina	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	.	2	.	1	1	2	2	.	1	3	3	.	3	.	V	
	Rumex acetosella	.	.	.	+	.	1	1	1	.	1	1	1	+	.	.	+	1	1	+	1	.	1	.	1	+	IV	
	Thymus serpyllum	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I

udział mają również: *Vaccinium vitis-idaea*, *Melampyrum pratense*, *Calluna vulgaris*, *Cytisus ratisbonensis*, *Festuca ovina*, *Anthoxanthum odoratum*, *Solidago virga-aurea*. W warstwie mszaków panują zdecydowanie: *Entodon schreberi*, *Hylocomium splendens*, *Dicranum undulatum*.

W składzie florystycznym, oprócz dominującego udziału roślin borowych, zwraca uwagę licznie reprezentowana grupa gatunków z klasy *Nardo-Callunetea*. Spośród 12 gatunków tej grupy najwyższe klasy stałości osiągają: *Calluna vulgaris*, *Hieracium pilosella*, *Sieglingia decumbens*, *Carex ericetorum*, *Lycopodium clavatum*. Bardzo pospolita w całym zbiorowisku jest *Festuca ovina*, reprezentująca klasę *Sedo-Scleranthetea*. Do często spotykanych roślin należy również *Rumex acetosella*.

Peucedano-Pinetum typicum jest jedynym, stwierdzonym na badanym terenie zbiorowiskiem borowym. Przynależność systematyczną ustalono na podstawie prac Matuszkiewicza (1962, 1967) oraz Matuszkiewicza i Matuszkiewicza (1973). Jest to podzespół typowy subkontynentalnego boru świeżego w odmianie sarmackiej. W zbiorowisku tym, na obszarze Wysoczyzny Rawskiej, występują wszystkie trzy gatunki uznane przez Matuszkiewicza (1967) oraz Matuszkiewicza i Matuszkiewicza (1973) za charakterystyczne dla zespołu. Są to: *Chimaphila umbellata*, *Pirola chlorantha* i *Lycopodium complanatum*. Dość liczna jest grupa gatunków geograficznie wyróżniających zespół. Najwyższe klasy stałości osiągają: *Cytisus ratisbonensis*, *Solidago virga-aurea* i *Rubus saxatilis*.

Niektóre płaty, gdzie udział gatunków z tej grupy jest mniejszy (zdjęcia: 8, 13, 20, 25), wykazują charakter przejściowy. Ma to związek z położeniem badanego terenu w Polsce środkowej, który to obszar cechuje przejściowość pod wieloma względami. Wysoczyzna Rawska według opracowania Matuszkiewicza i Matuszkiewicza (1973) znajduje się na pograniczu zasięgów *Peucedano-Pinetum* i *Leucobryo-Pinetum*.

Stanowiska zdjęć w tabeli XIX

1. (313) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Bogusławki-Sanogoszcz, oddział 151c, teren nieznacznie nachylony ku południowi, drzewostan buduje monokultura sosny 60-letniej.
2. (143) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Wilczoruda, oddział 55d, teren lekko nachylony w kierunku południowym, drzewostan sosnowy 75-letni z domieszką dębu.
3. (315) woj. piotrkowskie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Nowizna, oddział 178c, teren równy, drzewostan sosnowy 65-letni.
4. (196) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Bogusławki-Sanogoszcz, oddział 151l, teren płaski, jednowiekowy drzewostan sosnowy 63-letni.
5. (198) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Kaleń, oddział 87b, teren nachylony lekko, w kierunku zachodnim, w drzewostanie 58-letnia monokultura *Pinus silvestris*.
6. (307) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Wale, oddział 164f, teren równy, 80-letni przerzedzony drzewostan sosnowy.
7. (61) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 145k,

- teren lekko nachylony ku zachodowi, stary, przeszło 100-letni drzewostan sosnowy z domieszką dębów.
8. (59) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 144f, teren nachylony nieco ku zachodowi, stary, przeszło 100-letni drzewostan sosnowy, liczne młodsze podrosty *Pinus silvestris*.
 9. (314) woj. piotrkowskie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Nowizna, oddział 177b, teren równy, drzewostan buduje 75-letnia monokultura sosnowa.
 10. (350) woj. radomskie, ndl. Białobrzegi, uroczysko Rykały, oddział 4g, teren lekko nachylony w kierunku południowym, drzewostan tworzy jednowiekowa, 56-letnia *Pinus silvestris*.
 11. (58) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 145k, teren najbardziej wzniesiony w oddziale 145, stary drzewostan sosnowy, 173-letni, podlega żywicowaniu.
 12. (318) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Petrykozy, oddział 42c, teren lekko nachylony ku południowi, drzewostan sosnowy 61-letni.
 13. (192) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Bugaj, oddział 170a, teren równy, drzewostan tworzy monokultura sosny 73-letniej.
 14. (194) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Bogusławki-Sanogoszcz, oddział 158b, teren płaski, w drzewostanie panuje 78-letnia jednowiekowa *Pinus silvestris*.
 15. (306) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Zagórze, oddział 74b, teren nachylony ku południowi, drzewostan buduje 52-letnia, jednowiekowa monokultura sosny.
 16. (197) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Kaleń, oddział 87a, teren nieznacznie nachylony w kierunku zachodnim, 58-letni drzewostan sosnowy.
 17. (307) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Zagórze, oddział 77a, teren równy, drzewostan tworzy 52-letnia uprawa *Pinus silvestris*.
 18. (60) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 145k, teren nachylony lekko ku zachodowi, stary 173-letni drzewostan sosnowy z domieszką nielicznych, równie starych dębów.
 19. (195) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Bogusławki-Sanogoszcz, oddział 158a, teren równy, drzewostan tworzy monokultura 78-letniej sosny.
 20. (301) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Jastrzębia-Otałążka, oddział 290g, teren równy, drzewostan buduje 85-letnia *Pinus silvestris*.
 21. (67) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 142l, teren równy, drzewostan tworzy 43-letnia monokultura *Pinus silvestris*, nieznaczna domieszka dębu.
 22. (66) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Rawski Las, oddział 142k, siedlisko i drzewostan taki jak w zdjęciu 21.
 23. (319) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Petrykozy, oddział 42g, teren położony na niewielkim wzniesieniu, drzewostan buduje 48-letnia sosna z domieszką dębu.
 24. (320) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Petrykozy, oddział 39i, teren równy, drzewostan buduje 48-letnia monokultura sosny.
 25. (308) woj. skierniewickie, ndl. Rawa Mazowiecka, uroczysko Zagórze, oddział 75a, teren nachylony lekko w kierunku południowo-zachodnim, drzewostan tworzy 50-letnia uprawa sosny.

4.8. CHOJNIAK SOSNOWY Z MURAWĄ KSEROTERMICZNĄ - TABELA XX

Chojniak sosnowy z murawą kserotermiczną występuje na małej powierzchni w kompleksach leśnych Świdno i Tomczyce. Obydwa uroczyska ciągną się wąskimi pasami lasu wzdłuż biegu rzeki Pilicy. Las Tomczyce leży bezpośrednio nad rzeką, w odległości 12 km na wschód od Nowego Miasta

Numer kolejny zdjęcia /Successive number of record/		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Stażność Constancy
Numer zdjęcia /No. of record/		400	389	356	357	397	358	374	371	85	84	
Data /Date/		16	5	14	14	15	14	25	25	26	26	
		08	07	06	06	07	06	06	06	05	05	
		73	73	73	73	73	73	73	73	71	71	
Miejscowość /Locality/		Sw	Sw	Sw	Sw	Sw	Sw	Tm	Tm	Tm	Tm	
Zwarcie warstwy drzew "a" w % /Density of tree layer "a" in %/		40	40	40	40	35	40	50	55	50	40	
Zwarcie warstwy krzewów "b" w % /Density of shrub layer "b" in %/		5	-	5	-	10	20	5	40	15	20	
Pokrycie warstwy runa "c" w % /Cover of herb layer "c" in %/		95	80	90	100	90	100	50	30	15	15	
Pokrycie warstwy mszystej "d" w % /Cover of moss layer "d" in %/		5	10	5	5	5	5	40	30	40	30	
Powierzchnia zdjęcia w m ² /Surface of record in m ² /		200	200	200	200	200	200	200	200	400	300	
Liczba gatunków w zdjęciu /Number of species in record/		47	49	55	52	41	46	28	46	31	26	

Drzewa i krzewy /Trees and shrubs/													
VP	Pinus silvestris	a	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	V
	-"- -"	b	.	.	.	.	.	.	.	1	1		III
	-"- -"	c	.	.	+	.	.	.	.	+	+	+	
B	Quercus robur	b	.	.	.	.	.	.	1	2	1	1	III
	-"- -"	c	.	+	.	.	.	.	+	1	+	+	
	Betula verrucosa	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I
	-"- -"	b	1	.	1	.	.	.	1	.	.	1	III
	-"- -"	c	+	.	+	.	.	.	+	.	.	+	
k	Quercus rubra	b	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	
VP	Populus tremula	b	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	
QF	Tilia cordata	c	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I
	Acer platanoides	c	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I
B	Sorbus aucuparia	b	.	.	.	.	2	.	1	2	.	.	III
	-"- -"	c	.	.	+	+	.	.	+	+	.	.	
QF	Berberis vulgaris	b	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	III
	-"- -"	c	1	+	+	+	.	.	.	.	.	.	
B	Juniperus communis	b	.	.	.	.	.	.	1	2	1	2	III
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	.	+	+	+	+	
QF	Rhamnus cathartica	b	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	II
	-"- -"	c	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	
B	Frangula alnus	b	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	II
	-"- -"	c	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	
N	Robinia pseudacacia	b	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I
	-"- -"	c	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	

B	Pirus communis	b	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I
QF	Sambucus nigra	b	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I
	Corylus avellana	c	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I
Runo zielne i mszaki /Herbs and moss/													
VF	Peucedanum ereoselinum		4	3	3	3	4	2	2	+	+	.	V
	Solidago virga-aurea		1	+	1	2	1	1	1	1	+	.	V
	Entodon schreberi		1	1	1	+	.	+	3	2	3	2	V
	Cytisus ratisbonensis		+	.	.	+	1	.	2	+	1	.	IV
	Hypnum cupressiforme		+	+	+	.	+	.	.	.	1	1	IV
	Dicranum undulatum		1	.	.	+	.	.	.	+	1	1	III
	Dicranum scoparium		.	1	1	.	.	.	.	1	1	1	III
	Vaccinium myrtillus		.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	I
	Cytisus nigricans		.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	I
	Pirola secunda		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I
FB	Dianthus carthusianorum		2	1	1	1	1	.	+	+	.	+	V
	Potentilla arenaria		2	1	2	1	2	.	+	1	+	.	V
	Anthericum ramosum		2	2	1	.	2	+	+	1	+	.	V
	Phleum boeomerii		3	3	2	3	1	2	.	1	.	.	IV
	Salvia pratensis		1	1	2	1	2	1	.	+	.	.	IV
	Euphorbia cyparissias		1	1	+	1	+	.	.	1	+	.	IV
	Veronica spicata		2	1	1	2	1	+	.	.	.	.	IV
	Pimpinella saxifraga		1	1	.	1	1	1	.	1	.	.	IV
	Scabiosa ochroleuca		2	1	1	+	.	1	.	.	.	.	III
	Helianthemum ovatum		3	1	2	2	+	.	.	.	.	.	III
	Stachys recta		1	1	+	1	.	.	.	.	.	.	III
	Calamintha acinos		.	1	1	1	.	.	+	.	.	.	III
	Centaurea rhenana		1	1	1	1	1	+	.	.	.	.	III
	Allium montanum		1	+	1	+	.	.	.	.	.	.	III
	Centaurea scabiosa		.	+	.	1	.	.	+	.	.	.	II
	Bromus inermis		.	+	.	.	.	1	.	1	.	.	III
	Viola rupestris		1	.	1	1	+	.	.	.	.	.	III
	Campanula bononiensis		1	+	.	.	+	.	.	.	.	.	II
	Hieracium echinoides		1	1	+	.	.	.	.	.	.	.	II
	Vincetoxicum officinale		1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I
	Lotus corniculatus		.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	I
	Thalictrum minus		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	Filipendula hexapetala		.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I
	Asparagus officinalis		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I
	Medicago falcata		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	Erigeron acer		1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
SS	Festuca psammophila		2	3	3	2	2	.	1	2	2	2	V
	Rumex acetosella		1	1	1	1	1	+	1	1	1	1	V
	Thymus serpyllum		2	2	2	1	.	1	.	1	1	2	V
	Helichrysum arenarium		1	1	1	.	1	.	.	+	+	.	IV
	Festuca ovina		.	.	2	1	.	1	3	2	1	1	IV
	Silene otites		1	1	+	+	.	.	.	+	.	.	III
	Sedum acre		1	1	2	1	.	.	.	.	.	.	III
	Jasione montana		1	1	.	.	+	.	.	.	.	.	II
	Koeleria glauca		.	.	3	2	.	.	1	.	.	.	II
	Armeria elongata		.	+	+	.	.	.	+	+	.	.	II
	Pulsatilla pratensis		/+/-	.	.	/1/	/+/-	.	.	.	.	.	I
	Rhacomitrium canescens		.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	II
	Polytrichum piliferum		.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	I
	Dianthus arenarius		.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	I

HC	<i>Hieracium pilosella</i>	1	1	2	1	1	.	+	1	1	1	V
	<i>Carex ericetorum</i>	.	1	1	1	.	.	1	1	.	1	IV
	<i>Carex pilulifera</i>	.	.	1	1	+	.	.	1	1	1	IV
	<i>Calluna vulgaris</i>	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	I
	<i>Sieglingia decumbens</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I
	<i>Antennaria dioica</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I
MA	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	.	3	.	1	2	3	2	+	1	IV
	<i>Achillea millefolium</i>	+	.	1	1	+	1	.	1	.	.	IV
	<i>Galium boreale</i>	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	II
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	.	.	2	2	.	2	.	.	.	.	II
	<i>Knautia arvensis</i>	.	.	+	.	1	1	.	.	.	.	II
	<i>Festuca rubra</i>	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	I
	<i>Dactylis glomerata</i>	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	I
	<i>Poa trivialis</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I
	<i>Anthriscus silvestris</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I
	<i>Deschampsia caespitosa</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I
	<i>Crepis biennis</i>	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I
B	<i>Hypericum perforatum</i>	1	1	.	1	1	.	+	1	.	.	IV
	<i>Hieracium umbellatum</i>	1	+	1	+	.	.	.	.	+	+	IV
	<i>Galium verum</i>	1	1	1	+	.	1	.	.	.	.	III
	<i>Thalictrum flexuosum</i>	1	+	+	1	.	.	.	.	.	.	III
	<i>Viola tricolor</i>	.	+	1	1	1	.	.	.	.	.	III
	<i>Fragaria vesca</i>	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	II
	<i>Veronica officinalis</i>	.	.	.	+	.	.	1	1	.	.	II
	<i>Stellaria media</i>	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	II
	<i>Chelidonium majus</i>	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	II
	<i>Galium verum</i>	.	1	1	+	.	.	.	.	.	.	II
	<i>Cynoglossum officinale</i>	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	II
	<i>Oenothera biennis</i>	1	+	.	.	+	.	.	.	.	.	II
	<i>Galeopsis tetrahit</i>	.	.	+	.	+	.	.	+	.	+	II
	<i>Moehringia trinervia</i>	.	.	.	1	+	1	.	.	.	.	II
	<i>Carex hirta</i>	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	I
	<i>Hypochoeris radicata</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	I
	<i>Viola canina</i>	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.	I
	<i>Polypodium vulgare</i>	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	I
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Cystopteris fragilis</i>	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Galium aparine</i>	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	I
	<i>Trifolium alpestre</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I

Gatunki sporadyczne : zdjęcie /record/ 1 - *Agrostis vulgaris* /1/,
 /Sporadic species/ : *Echium vulgare* /1/, *Tanacetum vulgare* /+/, *Gnaphalium silvaticum* /+/, 2 - *Cetraria islandica* /+/, 3 - *Calamagrostis epigeios* /2/, *Arenaria serpyllifolia* /1/, *Erophila verna* /1/, 4 - *Campanula rotundifolia* /1/, *Phyteuma spicatum* /+/, 5 - *Coronilla varia* /+/, *Mycelis muralis* /+/, 6 - *Rubus* sp. /3/, *Urtica dioica* /1/, *Geranium robertianum* /1/, *Geum urbanum* /+/, *Alopecurus pratensis*, 7 - *Polytrichum juniperinum* /1/, 8 - *Hieracium lichenalii* /+/, 9 - *Polytrichum attenuatum* /1/, 10 - *Polygonatum odoratum* /+/, *Eurhynchium striatum* /+/.

n. Pilicą. Uroczysko Świdno jest oddzielone od koryta rzeki pasem łąk, znajduje się w odległości około 5 km od Tomczyc w kierunku wschodnim. Położenie na wysokim i stromym zboczu doliny Pilicy sprawia, że tereny tych uroczysk odznaczają się ogromnym urozmaicheniem topograficznym. Chojniak z murawą kserotermiczną zajmuje najbardziej nachylone partie zboczy doliny o ekspozycji południowej lub, rzadziej, południowo-wschodniej. Większe płaty tego zbiorowiska wykształciły się w uroczysku Świdno, gdzie różnice wysokości między górną krawędzią zboczy a terasą zalewową rzeki są wyższe niż w uroczysku Tomczyce. Omawiana fitocenoza występuje na glebach piaszczystych. Są to piaski gliniaste, zbielicowane. Znaczne nachylenie zboczy oraz ich południowa ekspozycja sprzyjają oświetleniu i nagrzewaniu gleby. Tworzą się, w wyniku tego, warunki odpowiednie dla rozwoju roślinności kserotermicznej.

W stosunku do wszystkich innych zbiorowisk leśnych, chojniak z murawą kserotermiczną odznacza się lepszymi warunkami świetlnymi. Sosna w formie monokultur 50-70-letnich jest tu jedynym składnikiem drzewostanu (fot. 23). Jej ażurowe korony nie osiągają dużego zwarcia (przeciętnie 40%). Warstwa podszycia jest na ogół bardzo skąpo rozwinięta, w niektórych płatach zupełnie jej brak (zdjęcie 2). Płaty zbiorowiska w uroczysku Tomczyce mają podszycie nieco bujniej rozwinięte. W skład tej warstwy wchodzi

Fot. 23. Chojniak sosnowy z murawą kserotermiczną. Uroczysko Świdno
Photo. 23. *Peucedano-Pinetum*. Świdno range

głównie: *Juniperus communis*, *Sorbus aucuparia* oraz podrosty *Quercus robur* i *Betula verrucosa*.

Runo zielne jest w uroczysku Świdno bardzo bujne i wielogatunkowe (przeciętne pokrycie wynosi 95%). W Tomczycach warstwa runa wykształcona jest znacznie słabiej. Jej pokrycie wynosi przeciętnie zaledwie 25%. Z kolei, na terenie tym, zwraca uwagę duży udział mszaków.

W skład runa wchodzi gatunki reprezentujące różne grupy syngenetyczne. Charakterystyczny jest przeważający udział gatunków murawowych z klas: *Festuco-Brometea*, *Sedo-Scleranthetea* i *Nardo-Callunetea*. Należy zaznaczyć, że w uroczysku Świdno dominują w runie gatunki z klasy *Festuco-Brometea*, natomiast w Tomczycach z klasy *Sedo-Scleranthetea*. Ogólnie stwierdzono 26 gatunków, reprezentujących klasę *Festuco-Brometea*. Z grupy tej 11 gatunków osiąga wysoką stałość (V-III). Największą stałością i pokryciem odznaczają się: *Dianthus carthusianorum*, *Phleum boemerii*, *Anthericum ramosum*, *Salvia pratensis*, *Veronica spicata*, *Potentilla arenaria*, *Euphorbia cyparissias*. Klasę *Sedo-Scleranthetea* reprezentuje 14 gatunków. Z największym udziałem występuje *Festuca psammophila*. Pospolicie rosną także: *Rumex acetosella*, *Thymus serpyllum*, *Helichrysum arenarium*, *Festuca ovina*, *Silene otites*. Spośród gatunków klasy *Nardo-Callunetea* najwyższe klasy stałości osiągają: *Hieracium pilosella*, *Carex ericetorum*, *Carex pilulifera*. Stwierdzono także 11 gatunków łąkowych z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*, pospolite z tej grupy są tylko dwa: *Anthoxanthum odoratum* i *Achillea millefolium*. W runie tego zbiorowiska rośnie też 10 gatunków borowych z klasy *Vaccinio-Piceetea*. Z największym pokryciem występują: *Peucedanum oreoselinum*, *Solidago virga-aurea*, *Entodon schreberi*. Gatunki towarzyszące osiągają na ogół niskie klasy stałości. Do pospolitszych należą tylko: *Hypericum perforatum*, *Hieracium umbellatum*, *Galium verum*.

W uroczysku Świdno, wśród bogatej roślinności runa, zaobserwowano występowanie kilku aspektów sezonowych. Na uwagę zasługuje na tym terenie kilka gatunków rzadkich w skali całego kraju a na obszarze Wysoczyzny Rawskiej, mających tu jedyne stanowiska. Należą do nich: *Pulsatilla pratensis*, *Viola rupestris*, *Asplenium ruta-muraria*, *Cystopteris fragilis*, *Campanula bononiensis*, *Hieracium echinoides*.

W wyniku posadzenia sosny na zboczach, gdzie występowała murawa kserotermiczna, wykształciło się obecnie sztuczne zbiorowisko leśne, trudne do określenia pod względem systematycznym. W runie tego zbiorowiska, w Tomczycach, wśród dominujących gatunków z klasy *Sedo-Scleranthetea* rośnie kilka, charakterystycznych dla związku *Koelerion glaucae* Klika 1935. Są to: *Festuca psammophila*, *Koeleria glauca*, *Dianthus arenarius* i *Silene otites*. Pozwala to na stwierdzenie, iż na terenie tym, przed posadzeniem sosny, występował zespół *Festuco-Koelerietum glaucae* Klika 1931. W obrębie rzędu *Festuco-Sedetalia* te piaszkowe murawy najbardziej nawiązują do kserotermicznych muraw z klasy *Festuco-Brometea* (zdjęcie 7-10). W omawianym zbiorowisku z uroczyska Świdno przeważający udział

w runie mają gatunki z klasy *Festuco-Brometea*. Świadczy to o przynależności występującej tu murawy do związku *Cirsio-Brachypodietum pinnati* Hadač et Klika 1944 em. Krausch 1961 (zdjęcia 1-6).

Stanowiska zdjęć w tabeli XX

1. (400) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 311l, na silnie nachylonym zboczu doliny Pilicy, drzewostan buduje monokultura sosny 76-letniej.
2. (389) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 311k, zbocze doliny Pilicy o ekspozycji południowej, drzewostan tworzy sosna 61-letnia.
3. (356) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 311l, zbocze doliny Pilicy o ekspozycji południowo-wschodniej, 76-letni drzewostan sosnowy.
4. (357) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 311l, siedlisko i drzewostan jak w zdjęciu 3.
5. (397) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 312c, zbocze doliny Pilicy nachylone ku południowi, drzewostan tworzy 61-letnia monokultura sosny.
6. (358) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Świdno, oddział 311k, zbocze nachylone w kierunku Pilicy, drzewostan sosnowy 61-letni.
7. (374) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 321c, teren nachylony lekko w kierunku południowo-zachodnim, drzewostan tworzy 51-letnia *Pinus silvestris*.
8. (371) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 319f, teren znacznie nachylony w kierunku Pilicy, drzewostan buduje monokultura sosny 66-letniej.
9. (85) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 320d, znacznie nachylone, erodowane zbocze doliny Pilicy, drzewostan sosnowy 66-letni.
10. (84) woj. radomskie, ndl. Grójec, uroczysko Tomczyce, oddział 319f, teren nachylony w kierunku południowym, drzewostan tworzy 66-letnia sosna.

5. PODSUMOWANIE

1. W wyniku badań przeprowadzonych nad lasami Wysoczyzny Rawskiej wyróżniono siedem zespołów:

- *Carici elongatae-Alnetum* — ols,
- *Poo trivialis-Alnetum* — łęg olsowy,
- *Fraxino-Alnetum* — łęg jesionowo-olszowy,
- *Tilio-Carpinetum* — grąd,
- *Potentillo albae-Quercetum* — dąbrowa świetlista,
- *Pino-Quercetum* — bór mieszany,
- *Peucedano-Pinetum* — bór sosnowy z goryszem.

W obrębie zespołów: olsu, grądu i dąbrowy świetlistej stwierdzono zróżnicowanie na podzespoły. Ponadto zostały określone postaci degeneracyjne wyróżnionych jednostek fitosocjologicznych. Wyróżniono także antropogeniczne zbiorowisko chojnika sosnowego z murawą kserotermiczną. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż dotychczas opisano z badanego obszaru tylko dwa zespoły: dąbrowę świetlistą z rezerwatu Trębaczew i bór mieszany z rezerwatu Babsk.

2. Największą powierzchnię wśród lasów badanego terenu zajmują zbiorowiska grądowe i świetlistej dąbrowy, natomiast najmniejszą zajmuje ols,

łęg olsowy oraz chojnik sosnowy z murawą kserotermiczną. Grądy stwierdzono w 23 kompleksach leśnych Wysoczyzny, dąbrowę świetlistą w 20 uroczyskach. Należy dodać, że zbiorowiska *Tilio-Carpinetum* przeważają we wschodniej części badanego obszaru w okolicach Grójca, z kolei w części zachodniej, w okolicach Rawy Mazowieckiej, panują fitocenozy *Potentillo albae-Quercetum*.

3. Wszystkie zbiorowiska leśne, występujące na terenie Wysoczyzny Rawskiej, są w mniejszym lub większym stopniu zniekształcone w wyniku działalności ludzkiej. Zniekształcenia te objawiają się zmianami w strukturze zbiorowisk oraz w ich składzie florystycznym. Zmiany degeneracyjne zbiorowisk leśnych były zwykle poprzedzone zaburzeniem struktury i składu gatunkowego drzewostanu. Stwierdzono, iż w trakcie postępujących w czasie zmian degeneracyjnych, skład florystyczny zbiorowisk zmienia się według kolejnych etapów. W pierwszych etapach degeneracji ustępują z fitocenozy gatunki o najwyższej skali ekologicznej, a więc charakterystyczne dla danego zespołu i związku. Następnie zmniejsza się udział gatunków charakterystycznych dla rzędu i klasy. Etapy zmian degeneracyjnych następujące w czasie Faliński (1966 b) nazwał za Braun-Blanquetem (1951) fazami degeneracji. Na skutek zachwiania wewnętrznej organizacji zbiorowisk, ich równowagi biologicznej, w miarę ustępowania gatunków właściwych dla danej fitocenozy, następuje wnikanie elementów obcych.

4. W zbiorowiskach leśnych badanego terenu stwierdzono następujące formy degeneracji antropogenicznej, wyrażające jakościowe zmiany jakie zaszły w historycznym formowaniu się tych fitocenoz:

- pinetyzacja,
- monotypizacja,
- fruticetyzacja,
- neofityzacja,
- cespityzacja.

Pinetyzacja jest najpowszechniejszą i najbardziej zaawansowaną formą zmian degeneracyjnych lasów na obszarze Wysoczyzny Rawskiej. Drzewostany sosnowe panują zarówno w zbiorowiskach grądowych, jak w świetlistej dąbrowie i w borze mieszanym. Ujednolicenie, uproszczenie składu gatunkowego drzewostanów czyli monotypizację stwierdzono w łęgu jesionowo-olszowym, w zbiorowiskach grądowych i częściowo, w borze mieszanym. Fruticetyzacja, nadmierny rozwój podszycia, występuje najczęściej w grądach, rzadziej w dąbrowie świetlistej i w borze mieszanym. Obecność neofitów stwierdzono w łęgu jesionowo-olszowym oraz w grądzie typowym. Cespityzację, zadarnienie runa, obserwowano w borze mieszanym i dąbrowie świetlistej oraz w silnie zdegenerowanych płatach grądu typowego.

5. Do zniekształceń zbiorowisk leśnych badanego terenu przyczyniły się i zadecydowały o uformowaniu się obecnej postaci tych fitocenoz następujące czynniki:

- eliminacja z naturalnych drzewostanów gatunków liściastych (dąb, lipa, jesion);

Fot. 24. *Lycopodium complanatum*. Uroczysko Bogusławki-Sanogoszcz
 Photo. 24. *Lycopodium complanatum*. Bogusławki-Sanogoszcz range

Fot. J. Hereźniak

Fot. 25. *Pulmonaria angustifolia*, bardzo rzadki gatunek na obszarze Wysoczyzny. Uroczysko
 Rykały

Photo. 25. *Pulmonaria angustifolia*, a species very rare on the Upland area. Rykały range

Fot. 26. *Galium rotundifolium* w dąbrowie świetlistej. Uroczysko Stryków-Brzostowiec
 Photo. 26. *Galium rotundifolium* in *Potentillo albae-Quercetum*. Stryków-Brzostowiec range

Fot. J. Hereźniak

- trwające od dawna i aktualne w obecnej gospodarce leśnej, protegowanie upraw sosnowych na siedliskach lasów liściastych i mieszanych;
- stosowanie zrębów zupełnych oraz wprowadzanie na tereny odlesione i grunty porolne monokultur sosnowych;
- przerzedzanie drzewostanów, pociągające za sobą zmiany w strukturze niższych warstw zbiorowiska w wyniku zmiany warunków świetlnych;
- wypas bydła w lesie;
- grabienie ściółki;
- zmiany stosunków wodnych na skutek melioracji.

6. Największym zmianom degeneracyjnym uległy zbiorowiska *Pino-Quercetum* i *Potentillo albae-Quercetum*. Z nieco mniejszym nasileniem zniekształcenia antropogeniczne występują w zbiorowiskach *Tilio-Carpinetum*, *Fraxino-Alnetum* i *Carici elongatae-Alnetum*. Fakt ten pozostaje w związku z odpornością fitocenozy na antropopresję (Olaczek 1972).

7. W lasach Wysoczyzny Rawskiej stwierdzono łącznie 537 gatunków roślin, w tym 34 gatunki mszaków. Jest wśród nich dość liczna grupa gatunków rzadko występujących w skali regionu lub nawet kraju. Należą do nich: *Lycopodium complanatum* (fot. 24), *Abies alba*, *Larix polonica*, *Cucubalus baccifer*, *Silene otites*, *Euphorbia angulata*, *Aquilegia vulgaris*,

Pulsatilla pratensis, *Viola rupestris*, *Hypericum montanum*, *Potentilla sterilis*, *Vicia cassubica*, *Daphne mezereum*, *Astrantia maior*, *Armeria elongata*, *Arctostaphylos uva-ursi*, *Pulmonaria angustifolia* (fot. 25), *Asperula tinctoria*, *Galium rotundifolium* (fot. 26), *Linnaea borealis* (Jakubowska-Gabara 1973), *Campanula bononiensis*, *Adenophora lillifolia*, *Hieracium echinoides*, *Allium montanum*, *Lilium martagon*, *Asparagus officinalis*, *Carex umbrosa*, *Avenastrum pratense*, *Koeleria polonica*, *Bromus benekenii*, *Festuca psammophila*, *Cephalanthera rubra*, *C. alba*.

6. LITERATURA

- Balińska-Wuttke K. 1960. Geomorfologia obszaru między Skierniewicami a Rawą Mazowiecką. Pr. Geogr. IG PAN 23: 1-112.
- Balińska-Wuttke K. 1961. Przekrój geologiczny czwartorzędu okolic Rawy Mazowieckiej. Kwart. Geol. 5.1.
- Balińska-Wuttke K. 1963. Badania morfometryczne ziarn piasku plejstoceńskiego w dorzeczu Rawki. Biul. Geol. Wydz. Geol. UW.
- Balińska-Wuttke L. 1965. Stratygrafia czwartorzędu okolic Rawy Mazowieckiej i Skierniewic. Z badań czwartorzędu w Polsce 11: 293-329.
- Bałut St. 1962. Zmienność niektórych cech w populacjach modrzewi z Gór Świętokrzyskich, Beskidów i Sudetów jako podstawa wyróżniania gospodarczo cennych ekotypów. Acta Agr. Silv. 2: 3-43.
- Bodeux A. 1955. *Alnetum glutinosae*. Mitt. Flor.-soziol. Arbeitsgem. N. F. 5: 114-137.
- Boińska U. 1970. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne uroczysk Podgórze i Nakwasiń w nadleśnictwie Płock. Stud. Soc. Sc. Tor. Sect. D 9 (2): 1-59.
- Boiński M. 1973. Lasy liściaste środkowej części Pojezierza Krajeńskiego. Stud. Soc. Sc. Tor. Sect. D 9 (5): 1-104.
- Braun-Blanquet J. 1951. Pflanzensoziologie. Wien.
- Broda J. 1965. Skutki rabunkowej eksploatacji lasu. W: Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. s. 122-128, PWRiL, Warszawa.
- Buczek K. 1960. Ziemie polskie przed tysiącem lat. (Zarys geograficzno-historyczny). Pr. Komis. Nauk Hist. PAN 5: 1-100.
- Celiński F. 1953. Czynniki glebowe a roślinność kserotermiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Pr. Monogr. nad Przyr. Wielk. Parku Narod. 2 (8): 191-251.
- Celiński F. 1962. Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Mon. Bot. Suppl. 13: 1-207.
- Chłudziński T., Maczubski T., Rutkowski K., Żmudziński J. 1961. Województwo warszawskie. Przewodnik, s. 555. Sport i Turystyka, Warszawa.
- Ciuk E., Rühle E. 1952. Dwa przekroje geologiczne przez dolinę Pilicy pod Białobrzegami. Inst. Geol. Biul. 68. Z badań Czwartorzędu 4: 199-274.
- Czyżewska K. 1974. Materiały do flory porostów województwa łódzkiego. Porosty rezerwatu modrzewia polskiego Trębaczew. Fragm. Flor. Geobot. 20 (2): 243-253.
- Dembińska M. 1967. Las średniowieczny – eksploatacja rabunkowa czy gospodarka? Kwart. Hist. Kult. 15 (1): 3-14.
- Denisiuk Z. 1963. Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat.-Przyr. Pr. Kom. Biol. 27 (2): 1-132.
- Dobrowolska M. 1961. Przemiany środowiska geograficznego Polski do XV wieku. s. 172. PWN, Warszawa.
- Drymmer K. 1908. *Xanthium spinosum*. Wszechświat 27 (39): 621-622.
- Dubaniewicz H. I. 1972. Wskaźnik termiczny (Wt). Próba konstrukcji współczynnika charakteryzującego roczną wielkość ciepła. Prz. Geof. 2.

- Dubaniewicz H. I. 1974. Klimat województwa łódzkiego. ŁTN. Acta Geogr. Łódz. 34: 120
- Dubaniewicz H., Maksymiuk Z., Zych S. 1971. Bioklimatyczna bonitacja obszaru województwa łódzkiego dla potrzeb rekreacji. Zesz. Nauk. UŁ. Biol. 43: 3-60.
- Dylik J. 1948. Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi. s. 88. ŁTN, Łódź.
- Dylik J. 1971. Województwo ze stolicą bez antenatów. s. 187. ŁTN, Łódź.
- Dylikowa A. 1973. Geografia Polski. Krainy geograficzne, s. 816. PZWS, Warszawa.
- Fabijanowski J., Zarzycki K. 1965. Roślinność rezerwatu leśnego „Świnia Góra” w Górach Świętokrzyskich. Acta Agr. Silv. Ser. leśna 5.
- Fagasiewicz L. 1967. Rezerwat Wolbórka. Zesz. Nauk. UŁ. Biol. 23: 101-111.
- Faliński J. B. 1965. O roślinności Zielonej Puszczy Kurpiowskiej na tle stosunków geobotanicznych tzw. Działu Północnego. Acta Soc. Bot. Pol. 34: 719-752.
- Faliński J. B. 1966a. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego, s. 256. Rozpr. UW, Warszawa.
- Faliński J. B. 1966b. Próba określenia zniekształceń fitocenozy. System faz degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych. Ekol. Pol. 12 (1): 31-42.
- Faliński J. B. 1966c. Degeneracja zbiorowisk roślinnych lasu miejskiego w Iławie. Mat. Zakł. Fitosoc. Stos. UW 13: 1-13.
- Fijałkowski D. 1966. Zbiorowiska roślinne lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach województwa lubelskiego. Ann. UMCS, Sect. C 21 (17): 247-312.
- Fijałkowski D. 1972. Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny, s. 285. Ossolineum, Wrocław-Warszawa.
- Głazek T. 1973. Zespoły leśne północno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich. Mon. Bot. 38: 1-149.
- Grabda E. 1935. Brzegi Pilicy pod Tomczycami. Ochr. Przyr. 15: 311-314.
- Hereźniak J. 1961. Rezerwat modrzewiowy — Trębaczew. Pr. magister. UŁ.
- Heymanowski K. 1969. Budnicy i holendrzy w dziejach gospodarstwa leśnego na Mazowszu. Sylwan 113 (5): 21-40.
- Heymanowski K. 1970. Gospodarka leśna na Mazowszu w okresie feudalizmu (dobra królewskie). s. 179. Wyd. WSR, Kraków.
- Izdebski K. 1962. Grądy na Roztoczu Środkowym. Ekol. Pol. 10 (18): 523-584.
- Izdebski K. 1963. Olsy i bory mieszane na Roztoczu Środkowym. Ann. UMCS, Sect. C 18 (14): 327-365.
- Jakubowska-Gabara J. 1973. Nowe stanowisko *Linnaea borealis* w Polsce środkowej. Chrońmy Przyr. 2: 66-68.
- Jasnowski M. 1962. Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego. Soc. Sc. Stetin. Wyd. Nauk Przyr.-Roln. 10: 1-340.
- Jedliński W. 1918. Modrzew polski — jego znaczenie ze stanowiska leśnego oraz analiza pionowa. Spraw. Kom. Fizjogr. 52. Kraków.
- Karaszewski W. 1952. Stratygrafia utworów czwartorzędowych i występowanie lessów podmorenowych w rejonie Warki nad Pilicą. PIG Biul. 66: 309-334.
- Każmierczakowa R. 1971. Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy w rezerwach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej. Studia Naturae. Ser. A. 5. Kraków.
- Kępczyński K. 1965. Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej, s. 325. Wyd. UMK, Toruń.
- Klatkowa H. 1972. Paleografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego. ŁTN. Wyd. III Nauk. Mat.-Przyr. Acta Geogr. Łódz. 28: 220.
- Kobendza R. 1925. „Modrzewina” w Małej Wsi pod Grójcem. Las Polski 8: 372-379.
- Kobendza R. 1930. O kilku nowych gatunkach dla flory polskiej. Acta Soc. Bot. Pol. 7 (1): 73-78.
- Kondracki J. 1968. Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym. Pr. Geogr. 69: 13-38.
- Kornaś J. 1959. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski — flora synantropijna. W: Szata roślinna Polski. 1. Opr. zbior. pod red. W. Szafera. s. 89-125. PWN, Warszawa.

- Krotoska T. 1953. Zespoły leśne Parku Natury w Promnie pod Poznaniem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Pr. Kom. Biol. 14 (3): 63-114.
- Kuczyńska I. 1972. Zbiorowiska leśne Gór Opawskich. Acta Univ. Wratisl. 149: 1-60.
- Kuczyńska I. 1973. Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. 1. Zbiorowiska leśne. Acta Univ. Wratisl. 162.
- Lencewicz S. 1927. Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla. Pr. PIG 2 (2): 67-200.
- Libbert W. 1933. Die Vegetationseinheiten der neumärkischen Staubeckulandschaft unter Berücksichtigung der angrenzenden Landschaften. Verh. Bot. Ver. Provinz. Brandenburg 74. Berlin-Dahlem.
- Łapczyński K. 1892. Z powiatu Trockiego do Szczawnicy. Pam. Fizjogr. 12. Warszawa.
- Ławrynowicz M. 1973. Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski środkowej. Acta Mycol. 9 (2): 133-204.
- Matuszewski Z. 1929. Powiat Rawsko-Mazowiecki. s. 321. Nakład autora. Rawa Maz.
- Matuszkiewicz A. 1955. Stanowisko systematyczne i tendencje rozwojowe dąbrów białowieskich. Acta Soc. Bot. Pol. 24 (2): 459-494.
- Matuszkiewicz W. 1952. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Ann. UMCS Sect. C, Suppl. 6: 1-218.
- Matuszkiewicz W. 1962. Zur Systematik der natürlichen Kiefernwäldern des mittel- und osteuropäischen Flachlandes. Mitt. Flor.-soziol. Arbeitsgem. N. F. 9: 145-186.
- Matuszkiewicz W. 1966. Potencjalna roślinność naturalna Kotliny Warszawskiej. Mat. Zakł. Fitosoc. Stos. UW 15: 1-12.
- Matuszkiewicz W. 1967. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski. W: Scamoni A. Wstęp do fitosocjologii praktycznej. s. 175-229. PWRiL, Warszawa.
- Matuszkiewicz W., Borowik M. 1957. Materiały do fitosocjologicznej systematyki lasów łągowych w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 26: 719-756.
- Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1956. Materiały do fitosocjologicznej systematyki ciepłolubnych dąbrów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 25 (1): 27-72.
- Matuszkiewicz W., Polakowska M. 1955. Materiały do fitosocjologicznej systematyki borów mieszanych w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 24 (2): 421-458.
- Matuszkiewicz W., Traczyk H., Traczyk T. 1958. Materiały do fitosocjologicznej systematyki zespołów olsowych w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 27 (1): 21-44.
- Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J. 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. 2. Bory sosnowe. Phytocoenosis 2.(4): 273-356.
- Medwecka-Kornaś A. 1959. Zespoły leśne i zaroślowe. W: Szata roślinna Polski, pod red. Wł. Szafera. 1. s. 368-427. PWN, Warszawa.
- Mowszowicz J. 1960. Conspectus Florae Lodziensis. 1. ŁTN. Nauki Mat.-Przyr. 69: 375.
- Mowszowicz J. 1961. Drzewa i inne rośliny godne uwagi i ochrony w województwie łódzkim. Chrońmy Przyr. 4: 18-23.
- Mowszowicz J., Hereźniak J., Olaczek R., Urbanek H. 1963. Rezerwat modrzewia polskiego Trębaczew. ŁTN. Pr. Wydz. III Mat.-Przyr. 94: 1-99.
- Mowszowicz J., Olaczek R., Sowa R., Urbanek H. 1967. Rezerwat lipy szerokolistnej (*Tilia platyphyllos* Scop.) w uroczysku Dębowiec, s. 64, ŁTN, Łódź.
- Mowszowicz J., Olaczek R., Sowa R., Urbanek H. 1969. Zespoły roślinne uroczyska Żądłowice. s. 37. ŁTN, Łódź.
- Oberdorfer E. 1953. Der europäische Auenwald. Beitr. naturkundl. Forsch. Südwestdeutschl. 12 (1): 23-70.
- Obuchowska-Pysiowa H. 1964. O handlu drewnem w Polsce w XVI wieku. Sylwan 108 (4): 55-64.
- Olaczek R. 1965. Rezerwat jodłowy „Murowaniec”. Zesz. Nauk. UŁ. Nauki Mat.-Przyr. Sect. II 18: 113-130.
- Olaczek R. 1972. Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski niżowej. s. 170. UŁ, Łódź.

- Olaczek R. 1974a. Kierunki degeneracji fitocenozy leśnych i metody ich badania. *Phytocoenosis* 3 (3/4).
- Olaczek R. 1974b. Etapy pinetyzacji grądu. *Phytocoenosis* 3 (3/4).
- Olaczek R. 1974c. Rejony turystyczne województwa łódzkiego na tle zasobności terenu w walory turystyczne. *Region Łódzki. Studia i Materiały* 4: 121-141.
- Pax F. 1918. *Pflanzengeographie von Polen*. s. 28-29. Berlin.
- Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: *Szata roślinna Polski*. t. I, s. 237-268. PWN, Warszawa.
- Pender K. 1975. Zbiorowiska leśne Gór Sowich. *Acta Univ. Wratisl.* 269. Pr. Bot. 20: 74.
- Pietrzak A. 1971. Zmiany zalesienia terytorium województwa łódzkiego od okresu porzobiorowego Polski do czasów współczesnych. s. 51. Maszynopis pr. magister. UŁ.
- Piotrowska H. 1950. Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego. *PTPN. Pr. Monogr. nad Przyr.* WPN 2 (5): 1-31.
- Piotrowska H. 1955. Zespoły leśne wyspy Wolin. *PTPN. Wydz. Mat.-Przyr. Pr. Kom. Biol.* 16: 1-169.
- Piotrowska H. 1960. Lasy południowo-wschodniego Uznamu. *Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach.* 6.
- Piotrowska H., Żukowski W. 1967. Bory mieszane wyspy Wolin. *Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach.* 20: 45-57.
- Połujański A. 1854. *Opisanie lasów Królestwa Polskiego i guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym*. I. s. 226. Warszawa.
- Preising E. 1943. *Die Waldgesellschaften des Warthe- und Weichsellandes*. (Als Manuscript vervielfältigt) Arbeiten aus d. Zentralstelle f. Vegetationskart d. Reiches. Stolzenau.
- Rejowski M. 1971. Lasy liściaste Ziemi Chełmińskiej. *Stud. Soc. Sc. Torun. Sect. D* 9 (3): 1-118.
- Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. *Pr. Wrocł. Tow. Nauk. Biol.* 16: 1-27.
- Rostafiński J. 1871. *Florae Polonicae Prodromus*.
- Różycki S. Z. 1967. Plejstocen Polski środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. s. 250. PWN, Warszawa.
- Różycki S. Z. 1972. Nizina Mazowiecka. W: *Geomorfologia Polski pod red. Galona*. 2. s. 283-285. PWN, Warszawa.
- Ruszczyńska-Szenajch H. 1966. Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia w rejonie doliny Pilicy. *Studia Geol. Pol.* 16: 3.
- Sokołowski A. W. 1963. Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. *Mon. Bot.* 16: 1-176.
- Sokołowski A. W. 1969. Zespoły leśne nadleśnictwa Balinka w Puszczy Augustowskiej. *Mon. Bot.* 28.
- Sokołowski A. W. 1970. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych nadleśnictwa Józefów koło Biłgoraja. *Pr. IBL* 368/370: 65-131.
- Stecki K. 1935. Lasy Polski, ich historia, stan obecny i metody badań. *Odczyt. Łódzka Izba Rolnicza, Inspektorat Leśnictwa*, No. 2, Drukarnia Polska, Łódź.
- Szafer W. 1972. Szata roślinna Polski niżowej. W: *Szata roślinna Polski*, pod red. Szafera i Zarzyckiego. 2. s. 13-188. PWN, Warszawa.
- Szynał T. 1963. Ogólna analiza florystyczno-ekologiczna zespołów roślinnych nadleśnictwa Kosobudy na Równinie Środkowej. *Ann. UMCS, Sect. C* 17 (11): 363-426.
- Tokarz H. 1961. Zespoły leśne Wysoczyzny Elbląskiej. *Acta Biol. Med. Soc. Sc. Ged.* 5: 121-244.
- Tokarz H. 1964. Zespół *Carici elongatae-Alnetum* w nadleśnictwie Elbląg na Wysoczyźnie Elbląskiej. *Acta Biol. Med. Soc. Sc. Ged.* 8 (3): 271-296.
- Traczyk T. 1962a. Materiały do geograficznego rozmieszczenia grądów w Polsce. *Acta Soc. Bot. Pol.* 31 (2): 275-304.
- Traczyk T. 1962b. Próba podsumowania badań nad ekologicznym zróżnicowaniem grądów w Polsce. *Acta Soc. Bot. Pol.* 31 (4): 621-635.

- Tumiłowicz J. 1955. Modrzew polski (*Larix polonica* Rac.) w powiecie grójeckim. Rocz. Sekc. Dendr. 10: 209-220.
- Urbanek H. 1961. Rezerwat lipowy Babsk. Zesz. Nauk. UŁ, Nauki Mat.-Przyr. Sect. II 10: 151-156.
- Urbanek H. 1966. Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. 1. Zespoły olchowe i łęgowe. Acta Soc. Bot. Pol. 35: 511-527.
- Urbanek H. 1969. Udział i rola diagnostyczna mszaków oraz stosunki florystyczno-fitosocjologiczne w przewodnich zespołach roślinnych regionu łódzkiego i jego pobraży. UŁ, Łódź.
- Waga J. 1848. Flora polska. 1.2. Warszawa.
- Wojterski T. 1960. Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy z Zachodniej Wielkopolsce. PTPN Wyd. Mat.-Przyr. Pr. Kom. Biol. 33 (3): 1-231.
- Wojterscy H. i T. 1953. Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem. PTPN Pr. Kom. Biol. 14 (4): 115-240.
- Zaręba R. 1965. Wprowadzenie modrzewia polskiego (*Larix polonica* Rac.) w lasach skarbowych Królestwa Polskiego w połowie XIX w. Sylwan 6: 69-75.
- Zaręba R. 1971. Badania geobotaniczne i fitosocjologiczne zespołów leśnych Puszczy Kozienickiej i Okręgu Radomsko-Kozienickiego. Zesz. Nauk. SGGW, Rozpr. Nauk. 11: 1-167.
- Zera M. 1930. Wnioski gospodarcze dotyczące Modrzewiny w Małej Wsi pod Grójcem. Sylwan 48 (5): 445-471.
- Żabko-Potopowicz A. 1965. Leśnictwo i drzewnictwo od połowy XIX wieku do I wojny światowej. W: Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. s. 209-226. PWRiL, Warszawa.
- Żmudziński J. 1965. Grójec, Warka i okolice, s. 158. Sport i Turystyka, Warszawa.

7. SUMMARY

Seven associations were distinguished as the result of investigations performed in the forests of the Rawa Upland:

- *Carici elongatae-Alnetum*,
- *Poo trivialis-Alnetum*,
- *Fraxino-Alnetum*,
- *Tilio-Carpinetum*,
- *Potentillo albae-Quercetum*,
- *Pino-Quercetum*,
- *Peucedano-Pinetum*.

The *Carici elongatae-Alnetum*, *Tilio-Carpinetum* and *Potentillo albae-Quercetum* associations were subdivided into subassociations. Moreover degenerative forms of the distinguished phytosociological units were established. The anthropogenic community of *Peucedano-Pinetum* was also distinguished. It should be noted that so far only two associations from the studied area have been described – *Potentillo albae-Quercetum* from the Trębaczew reservation and *Pino-Quercetum* from the Babsk reservation.

The largest area in the forests of the examined territory is occupied by *Tilio-Carpinetum* and *Potentillo albae-Quercetum* communities, and the smallest by *Carici elongatae-Alnetum*, *Poo trivialis-Alnetum* and *Peucedano-Pinetum*. *Tilio-Carpinetum* were found in 23 forest complexes of the Upland, *Potentillo albae-Quercetum* in 20 forest ranges. It should be added that *Tilio-Carpinetum* communities prevail in the eastern part of the studied area in the environs of Grójec, while in the western part around Rawa Mazowiecka phytocenoses of *Potentillo albae-Quercetum* dominate.

All forest communities occurring on the area of the Rawa Upland are more or less deformed by human activity. These deformations appear in changes of the community structure and their floristic composition. Degenerative changes in the forest communities are usually preceded by disturbances of the structure and specific composition of the stands. It was found that in the course of degenerative changes progressing in time, the floristic composition of the communities changes in successive steps. In the first stages of degeneration species with the narrowest ecological scale disappear, thus those characteristic for the given association and alliance. Next the contribution of species characteristic for the order and class declines. The degeneration steps occurring in time are called by Faliński (1966) after Braun-Blanquet (1951) degeneration phases. Owing to the disturbance of the internal organisation of the communities, and of their biological balance, foreign elements penetrate into the phytocenosis as the specific species disappear.

In the forest communities on the studied territory the following forms of anthropogenic degeneration were observed, manifesting qualitative changes which occurred in the historical formation of these phytocenoses: pinetisation, monotypisation, fruticetisation, neophytisation, caespitisation. Pinetisation is the commonest and most advanced form of degenerative changes in the forests on the Rawa Upland. Pine stands dominate both in *Tilio-Carpinetum* and in *Potentillo albae-Quercetum* communities as well as in *Pino-Quercetum*. A tendency to uniformity and simplification of the specific composition of the stands, that is monotypisation

was noted in *Fraxino-Alnetum*, in *Tilio-Carpinetum* and partly in *Pino-Quercetum*. Fruticetisation excessive development of the undergrowth — is commonest in *Tilio-Carpinetum*, less frequent in *Potentillo albae-Quercetum* and in *Pino-Quercetum*. The presence of neophytes was noted in *Fraxino-Alnetum* and in *Tilio-Carpinetum typicum*, Caespitisation — a change of the ground layer to a sward was observed in *Pino-Quercetum* and *Potentillo albae-Quercetum* and in highly degenerated patches of *Tilio-Carpinetum typicum*.

Deformation of the forest communities on the area investigated are due to the following factors which decided of the formation of the present pattern of these phytocenoses:

- elimination of natural stands of deciduous species (oak, linden, ash);
- long lasting and still continuing in present forest management favouring of pine plantations on habitats of deciduous and mixed forest;
- clear felling and introduction on the deforested areas and old farmland of pine monocultures;
- thinning of stands causing changes in the structure of the lower community layer owing to changes in light conditions;
- cattle grazing in the forest;
- litter raking;
- changes of water conditions owing to melioration.

Pino-Quercetum and *Potentillo albae-Quercetum* suffered the most severe degenerative changes. The anthropological deformations are somewhat less intensive in *Tilio-Carpinetum*, *Fraxino-Alnetum* and *Carici elongatae-Alnetum*. This fact is due to the resistance of these phytocenoses to anthropopressure (Olaczek 1972).

In the forests of the Rawa Upland a total of 537 plant species were found, including 34 species of bryophytes. There is among them a rather numerous group of species rare for the region or even the country. To these belong: *Lycopodium complanatum* (fot. 24), *Abies alba*, *Larix polonica*, *Cucubalus baccifer*, *Silene otites*, *Euphorbia angulata*, *Aquilegia vulgaris*, *Pulsatilla pratensis*, *Viola rupestris*, *Hypericum montanum*, *Potentilla sterilis*, *Vicia cassubica*, *Daphne mezereum*, *Astrantia maior*, *Armeria elongata*, *Arctostaphylos uva-ursi*, *Pulmonaria angustifolia* (fot. 25), *Asperula tinctoria*, *Galium rotundifolium* (fot. 26), *Linnaea borealis* (Jakubowska-Gabara 1973), *Campanula bononiensis*, *Adenophora lillifolia*, *Hieracium echinoides*, *Allium montanum*, *Lilium martagon*, *Asparagus officinalis*, *Carex umbrosa*, *Avenastrum pratense*, *Koeleria polonica*, *Bromus benekenii*, *Festuca psammophila*, *Cephalanthera rubra*, *C. alba*.