MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. 66, 1985

RYSZARD OCHYRA

**ROŚLINNOŚĆ LEJKÓW KRASOWYCH
W OKOLICACH STASZOWA
NA WYŻYNIE MAŁOPOLSKIEJ**

Vegetation of the karst sink-holes
in the vicinity of
Staszów on the Małopolska Upland

Wydano z pomocą finansową
Polskiej Akademii Nauk

KOMITET REDAKCYJNY

R. Olaczek (Łódź), E. Sidorkiewicz (Warszawa)

RADA REDAKCYJNA

W. Matuszkiewicz (Warszawa), Z. Podbielkowski (Warszawa),
E. Sidorkiewicz (Warszawa), R. Olaczek (Łódź),
H. Piotrowska (Gdańsk), K. Rostański (Katowice), W. Żukowski (Poznań)

ADRES REDAKCJI: Al. Ujazdowskie 4. 00-478 Warszawa

© Copyright by Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985

ISBN 83-01-04486-1

ISSN 0077-0655

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

Nakład 330+90 egz. Ark. wyd. 12,25. Ark. druk. 8,5+8 wklejek. Papier offsetowy kl. III 80 g
70×100 cm. Oddano do składania w czerwcu 1984 r. Podpisano do druku w lutym 1985 r. Druk
ukończono w kwietniu 1985 r. Zam. 308/84/M Z-24. Cena zł 200.—

WROCŁAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	5
1.1. Cel i zakres opracowania	5
1.2. Uwagi metodyczne	6
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU	8
2.1. Położenie i ukształtowanie powierzchni	8
2.2. Budowa geologiczna	10
2.2.1. Tektonika i litologia	10
2.2.2. Hydrogeologia i zjawiska krasowe	11
2.3. Klimat	12
2.4. Ogólna charakterystyka szaty roślinnej Okręgu Staszowskiego	14
3. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH LEJKÓW KRASOWYCH	15
3.1. Opis badanych lejków krasowych	15
3.1.1. Rozmieszczenie i topografia	15
3.1.2. Zróżnicowanie lejków krasowych pod względem szaty roślinnej	16
3.2. Czynniki siedliskowe	17
3.2.1. Środowisko wodne	17
3.2.2. Gleby	23
4. ZBIOROWISKA ROŚLINNE LEJKÓW KRASOWYCH	25
4.1. System zespołów i zbiorowisk roślinnych	25
4.2. Zbiorowiska wodne	28
4.2.1. Prymitywne zbiorowiska roślin wodnych o charakterze limnopleuston (<i>Lemnetalia</i>)	28
4.2.2. <i>Hydrocharitetalia</i>	32
4.2.3. Zbiorowiska ramienic (<i>Charetalia</i>)	35
4.2.4. Zbiorowiska roślin naczyniowych zakorzenionych na dnie (<i>Potamogetone- talia</i>)	39
4.2.5. Zbiorowiska roślinne wód dystroficznych (<i>Utricularietea intermedio-minoris</i>)	46
4.2.6. Zbiorowiska roślinne wód mniej lub bardziej oligotroficznych (<i>Litorelletea</i> – fragmenty)	53
4.3. Naturalne zbiorowiska mulistych brzegów i okresowo zalewanych zagłębień	57
4.3.1. Pionierskie zbiorowiska terofitów na mulistych, wilgotnych glebach (<i>Isoëto- -Nanajuncetia</i>)	57
4.3.2. Zbiorowiska ziołorośli mulowych (<i>Bidentetia tripartiti</i>)	59
4.3.3. Zbiorowiska roślinne muraw zalewiskowych (<i>Agropyro-Rumicion crispi</i>)	62
4.4. Zbiorowiska szuwarowe	62
4.4.1. Zbiorowiska szuwarów wysokich (<i>Phragmition</i>)	62
4.4.2. Zbiorowiska szuwarów niskich (<i>Eleocharito-Sagittarion</i>)	69
4.4.3. Zbiorowiska szuwarów wysokoturzycowych (<i>Magnocaricion</i>)	71
4.5. Zbiorowiska roślinne torfowisk przejściowych i wysokich	81

4.5.1. Mszarne torfowiska przejściowe (<i>Scheuchzerietalia palustris</i>)	81
4.5.2. Mszarne torfowiska wysokie (<i>Sphagnetalia fusci</i>)	88
4.6. Zbiorowiska roślinne obrzeżeń lejków krasowych	90
4.6.1. Antropogeniczne zbiorowiska łąkowe (<i>Calthion palustris</i>)	90
4.6.2. Zbiorowiska roślinne acidofilnych muraw bliźniczkowych (<i>Nardetalia</i>)	94
4.7. Zbiorowiska leśne i zaroślowe	95
4.7.1. Olsy (<i>Alnetalia glutinosae</i>)	95
4.7.2. Zbiorowiska borowe (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	100
5. ROZWÓJ SZATY ROŚLINNEJ LEJKÓW KRASOWYCH	100
5.1. Strefowy układ roślinności	100
5.2. Tendencje rozwojowe zbiorowisk roślinnych	107
5.2.1. Stadia inicjalne	108
5.2.2. Stadia przejściowe	109
5.2.3. Stadia końcowe	110
5.3. Torfowce jako wskaźniki tendencji rozwojowych zbiorowisk roślinnych	111
6. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ	112
7. SUMMARY	115
8. LITERATURA	124

1. WSTĘP

1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Okręg Staszowski, położony w obrębie Krainy Miechowsko-Sandomierskiej, stanowi jedną z wielu jeszcze „białych plam” na mapie geobotanicznej Polski. W przeciwieństwie do dobrze zbadanych pod względem botanicznym sąsiednich Okręgów: Miechowsko-Pińczowskiego (Łapczyński 1882; Dziubałtowski 1915, 1916; Szafer 1918; Kozłowska 1923, 1931; Szafran 1950; Medwecka-Kornaś 1952, 1959; Waclawska 1959, 1964) i Sandomiersko-Opatowskiego (Łapczyński 1887; Dziubałtowski 1922; Kuc 1959a), szata roślinna Okręgu Staszowskiego nigdy nie była przedmiotem szczegółowych badań. Jedynie brioflorze tego obszaru nieco uwagi poświęcił Kuc (1959b, 1964). W związku z tym palącą potrzebą stało się bliższe poznanie jego szaty roślinnej, które ostatecznie wyjaśniłoby geobotaniczną pozycję tego Okręgu. Konieczność dokładnego zbadania szaty roślinnej została podyktowana również tym, że w chwili obecnej ulega ona szybkim i nieodwracalnym przeobrażeniom pod wpływem gospodarki ludzkiej.

Ze względu na dużą rozległość terenu i znaczne zróżnicowanie jego szaty roślinnej, w badaniach skoncentrowano się tylko na lejkach krasowych, które stanowią wielką osobliwość geologiczną Okręgu Staszowskiego. Lejki krasowe stwarzają szczególny typ siedlisk do rozwoju roślinności wodnej, bagiennej i torfowiskowej, tak niezwykle rzadkiej w całym pasie wyżyn południowej Polski.

Celem niniejszego opracowania jest w pierwszym rzędzie dokładna inwentaryzacja florystyczna (Ochyra 1979, 1980) i fitosocjologiczna lejków krasowych. Badaniami, które przeprowadzono w latach 1973-1975, objęto 179 lejków krasowych wypełnionych wodą lub osadami organogenicznymi. Pominięto lejki o dnie suchym, chłonnym wody opadowe i roztopowe. Należą one do rzadkości, a opracowanie ich szaty roślinnej pociągnęłoby za sobą konieczność badania zbiorowisk leśnych i murawowych, w obrębie których są położone. Z tych też względów zrezygnowano z fitosocjologicznego badania zboczy lejków krasowych.

Na podstawie bogatego materiału fitosocjologicznego odtworzono obraz sukcesji zbiorowisk roślinnych i ustalono jej zależność od charakteru badanego zbiornika. W obserwacjach dotyczących sukcesji zbiorowisk roślinnych stoso-

wano powszechnie przyjętą metodę florystyczno-porównawczą, która, przy wielkiej liczbie przebadanych lejków krasowych będących w różnych stadiach zarastania, wydaje się być wystarczająca do wysunięcia najbardziej prawdopodobnej hipotezy rozwoju roślinności. Badań stratygraficznych nie przeprowadzono, gdyż były one przedmiotem obszernych studiów Szczepanka (1968, 1971), Karczmarza, Szczepanka (1984).

Osobny rozdział badań stanowią obserwacje nad zarastaniem lejków krasowych. W badaniach starano się ustalić pewne prawidłowości zachodzące w tym procesie, zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Bardzo pomocne w tym względzie okazały się obserwacje nad biologią i ekologią gatunków odgrywających dominującą rolę w procesie zasiedlania swobodnej powierzchni wody. W celu ustalenia dokładnych zależności pomiędzy środowiskiem a roślinnością wykonano szereg analiz hydrochemicznych i glebowych.

1.2. UWAGI METODYCZNE

Materiały fitosocjologiczne obejmują 440 zdjęć, wykonanych we wszystkich zbiorowiskach biorących bezpośredni udział w zarastaniu lejków krasowych. Przy ich wykonywaniu, jak też przy zestawianiu tabel fitosocjologicznych i wyróżnianiu zespołów, posługiwano się powszechnie przyjętą metodą Braun-Blanqueta (por. Pawłowski 1959; Braun-Blanquet 1964). Obok składu florystycznego zwracano również uwagę na wiele czynników abiotycznych środowiska wodnego, takich jak charakter podłoża i osadów dennych, głębokość wody, amplituda wahań poziomu wody w zbiornikach, odczyn wody itp. Zdjęcia wykonywano w optymalnej fazie fenologicznego rozwoju roślinności, tj. od połowy czerwca do końca sierpnia, dzięki czemu jednocześnie można było notować pełne listy florystyczne. W zdjęciach uwzględniono również stopnie towarzyskości gatunków. Liczby te nie oddają wprawdzie rozmieszczenia osobników poszczególnych gatunków ze względu na powszechne u roślin wieloletnich zjawisko polikormii czyli wielopędowości (Penzes 1960), jednak jest to najprostszy i wiele mówiący sposób charakteryzowania poziomej struktury płatów roślinności.

Układ systematyczny i nomenklaturę fitosocjologiczną przyjęto za Oberdorferem i in. (1967). Przy wyróżnianiu zespołów opierano się na gatunkach charakterystycznych i dominujących, rzadziej na charakterystycznej kombinacji gatunków. Pozostaje to w ścisłym związku z charakterem nielicznogatunkowych zbiorowisk wodnych i bagiennych. Identyfikacja i klasyfikacja tego typu zbiorowisk jest niesłychanie utrudniona ze względu na ich niezwykle dynamikę rozwojową. Zbiorowiska te przenikają się nawzajem, tworzą większe lub mniejsze enklawy i kompleksy mozaikowe (por. Krause 1952; Passarge 1964c; Grosser 1964), w wyniku czego powstaje niekiedy trudny do rozszyfrowania pod względem systematycznym kompleks roślinności. Efektem tego jest wąskie ujęcie niektórych syntaksonów, np. w przypadku związku *Phragmition*. Stanowisko takie oddaje jednak w pełni rzeczywisty obraz

roślinności, a poza tym pozwala na orientację w dynamice jej przemian, ułatwiając tym samym uzyskanie względnie realnego obrazu sukcesji.

Przyjmując uzasadnioną propozycję wprowadzania do fitosocjologii polskiego nazewnictwa, wszystkim wyróżnionym zespołom i zbiorowiskom nadano nazwy polskie, wzorując się na terminologii Falińskiego (1966), Jasnowskiego (1967) i Nowińskiego (1967). W kilku przypadkach utworzono zupełnie nowe nazwy, będące – zgodnie z propozycją – dokładnym tłumaczeniem łacińskich nazw na język polski.

Nomenklaturę roślin naczyniowych przyjęto za Ehrendorferem (1973), mchów – za Ochryą i Szmajdą (1978), wątrobowców – za Grollem (1976), a ramienic – za Dąmbką (1964).

Objaśnienie skrótów:

Ch. – gatunek charakterystyczny	War. – wariant
D. – gatunek wyróżniający	Zdj. – zdjęcie

Badania hydrochemiczne miały na celu z jednej strony poznanie stosunków chemicznych panujących w wodach lejków krasowych, a tym samym dostarczenie pomocniczych danych do dokładniejszego scharakteryzowania siedlisk roślinności wodnej, z drugiej zaś zebranie materiału do ogólniejszej charakterystyki limnologicznej niewielkich jeziorok pochodzenia krasowego.

Pobrano ogółem 12 prób wody z lejków reprezentujących możliwie różne typy zarastania zbiorowisk roślinnych i warunki środowiska. W dniu pobrania poddano je analizie jakościowej w laboratorium. Ze względu na niewielką głębokość akwenów wodę pobierano z głębokości 20-30 cm. W większości wypadków mierzono przy tym jej temperaturę w celu późniejszego obliczenia nasycenia tlenem. Do pojemników pobierano po 1000 ml wody, a oprócz tego osobno do specjalnych butelek po 100 ml do badania zawartości CO₂.

Analizy fizyczno-chemiczne wód wykonano w Zakładzie Hydrografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego według metod ogólnie przyjętych w hydrochemii. Ich szczegółowe opisy zawierają opracowania Alekina (1956), Justa i Hermanowicza (1964) oraz Dynowskiego i Gołdyna (1973).

Oprócz badań laboratoryjnych gromadzono bezpośrednio w terenie obserwacje nad ilością zawieszin, przejrzystością i barwą wody. Niemalże w każdym zdjęciu mierzono pH wody pehametrem Hellige'a.

Charakterystykę gleb poszczególnych zbiorowisk roślinnych oparto na obserwacjach dokonanych bezpośrednio przy wykonywaniu zdjęć fitosocjologicznych oraz na 11 odkrywkach glebowych wykonanych w ważniejszych zbiorowiskach bagiennych, leśnych i zaroślowych. Opisy profili i wyniki analiz zamieszczono w tekście oraz w tabeli 6.

Przy analizach glebowych zastosowano ogólnie przyjęte metody. Wartości pH mierzono w terenie kwasomierzem Hellige'a (wyniki w tabelach fito-

socjologicznych) oraz potencjometrycznie przy użyciu elektrody szklanej S-60 i kalomelowej K-60. Azot ogólny oznaczono metodą Kjeldahla, wapń i potas za pomocą fotometru płomieniowego „Flapho-4” w wyciągu gęstym 0,03N CH_3COOH . Fosfor oznaczano za pomocą kolorymetru „Elmed”, a popielność – metodą spalania w piecu muflowym w temperaturze 550°C.

Systematyka gleb oparta na kryteriach genetycznych oraz oznaczenie symbolami warstw i poziomów glebowych dostosowane zostały do ostatnich wskazań PTG (Kuźnicki i in. 1974).

Symbole zastosowane przy opisie profili glebowych:

A_o	–	poziom lub warstwa organiczna
$A_1 T_n$	–	„ akumulacji próchnicy w torfie niskim
$A_1 T_{pr}$	–	poziom akumulacji próchnicy w torfie przejściowym
$A_1 T_w$	–	„ „ „ „ wysokim
CG	–	„ skały macierzystej z cechami gruntowoglejowymi
D	–	„ podłoża mineralnego
Mł	–	„ mułowy
T_n	–	„ niskotorfowy
T_{pr}	–	„ przejściowotorfowy
T_w	–	„ wysokotorfowy

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przysłali mi z pomocą w czasie wykonywania pracy, pragnę złożyć serdeczne podziękowania. Panu Doc. drowi K. Szczepankowi dziękuję za wskazanie mi interesującego tematu badań oraz stałe interesowanie się postępami pracy; Panu Prof. drowi K. Karczmarszowi za liczne uwagi i rady udzielone mi w trakcie pisania tekstu, jak również podczas wspólnych wycieczek w teren. Dziękuję serdecznie Panom Prof. drowi J. Kornasiowi i Doc. drowi H. Tomaszewiczowi za uwagi co do systematyki zespołów i układu tabel fitosocjologicznych.

Za bezinteresowne wykonanie analiz hydrochemicznych winien jestem wdzięczność Panu mgr. J. Dynowskiemu, a Panu drowi A. Górskiemu za pomoc w badaniach glebowych i liczne cenne informacje z tego zakresu. Panom drowi Z. Dzwonco i drowi J. Bohdanowiczowi zawdzięczam wykonanie wszystkich fotografii.

Osobne podziękowania pragnę złożyć Państwu Karasiom z Golejowa, z których gościny wielokrotnie korzystałem w czasie wykonywania badań terenowych.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. POŁOŻENIE I UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Badany teren położony jest w obrębie Wysoczyzny Połanieckiej (Gilewska 1972), zwanej również Działami Połaniecko-Koprzywnickimi (Flis 1956). Stanowi ona jeden z regionów geomorfologicznych Niziny Nidziańskiej, rozległego obniżenia między Górami Świętokrzyskimi a Wyżyną Krakowsko-Częstochowską (ryc. 1).

W rzeźbie Wysoczyzny Połanieckiej zaznaczają się dwa wyraźne poziomy: niższy – o wysokości bezwzględnej 180-190 m i wyższy – o wysokości bez-

Ryc. 1. Podział Niecki Nidziańskiej na regiony geomorfologiczne (wg Flisa 1956, nieco zmienione)

I – Wzgórza Radomszczańskie, II – Niecka Włoszczowska, III – Próg Lelowski, IV – Płaskowyż Jędrzejowski, V – Pogórze Szydłowskie, VI – Wyżyna Miechowska, VII – Garb Wodzisławski, VIII – dolina Nidy, IX – Wysoczyzna Połaniecka, X – Garb Wojczańsko-Pińczowski, XI – Niecka Solecka, XII – Płaskowyż Proszowicki

Fig. 1. Division of the Nida Basin into geomorphological regions (after Flis 1956, modified)
I – Radomsko Hills, II – Włoszczowa Basin, III – Lelów Range, IV – Jędrzejów Plateau, V – Szydłów Plateau, VI – Miechów Upland, VII – Wodzisław Hills, VIII – valley of Nida, IX – Połaniec Plateau, X – Wojcza-Pińczów Hills, XI – Solec Basin, XII – Proszowice Plateau

względnej 210-220 m n.p.m. Okolice Staszowa położone są na poziomie wyższym, zwanym ogłędowskim. Składa się on z szeregu kilkukilometrowej szerokości płaskowyżów rozczłonkowanych szerokimi dolinami Sanicy, Czarnej, Kacanki, Koprzywianki i dolnej Gorzyczanki o deniwelacjach terenu dochodzących do 24 m.

Płaską powierzchnię wzniesień międziodolinnych z resztkami dolnoplioceńskiego zrównania (Klimaszewski 1958) urozmaicają wały gliny morenowej, a w lasach golejowskich zwydmione piaski zlodowacenia krakowskiego. W okolicach Staszowa i Skadli koło Szydłowa na podłożu gipsowym występują liczne zagłębienia krasowe, reprodukowane w nierozpuszczalnych utworach pokrywowych wieku trzeciorzędowego i czwartorzędowego.

Badane lejki krasowe zajmują obszar położony w obszernym zapadlisku staszowsko-połanieckim, którego główne rysy tektoniki wiążą się z orogenezą alpejską. Na północy przylega ono bezpośrednio do starego, paleozoicznego cokołu Gór Świętokrzyskich, którego powstanie łączy się z orogenezą hercyńską.

Rysem charakterystycznym litologii omawianego terenu jest występowanie skał niekrasowiejących, przedzielonych warstwą skał bardzo podatnych na krasowienie. Nie ulegające procesowi krasowienia, wodoszczelne podłoże stanowią nieco zmetamorfizowane iłolupki, szarogłazy i piaskowce kwarcytowe wieku prekambryjskiego. Na nim osadzone są skały krasowiejące; są to zbite i krystaliczne gipsy górnotortońskie o miąższości do 44 m (Krach 1967). Podścielone są one warstwą wapieni marglistych i litotamnionowych wieku dolnotortońskiego. Warstwa skał krasowiejących znajduje się bezpośrednio pod piaskowcami i wapieniami detrytycznymi sarmatu w części północnej i łożami krakowieckimi ku południowi. Te ostatnie pokryte są plejstocenijskimi piaskami i żwirami fluwioglacjalnymi oraz glinami zwałowymi (ryc. 2).

Ryc. 2. Przekrój geologiczny południkowy przez badany obszar (linia profilowa przebiega przez południk Staszowa)

Podziałka pozioma 1 : 100 000, podziałka pionowa 1 : 10 000. I – Kacanka; II – Strefa przejściowa; III – Zapadlisko Staszowsko-Połanieckie; a – kras odkryty w wapieniach i gipsach miocenijskich; b – kras w gipsach; c – kras w gipsach pod pokrywą iłów krakowieckich (kras reprodukowany) 1 – plejstocenijskie piaski i żwiry oraz glina zwałowa; 2 – detrytyczny wapień sarmacki; 3 – iły krakowieckie; 4 – gipsy; 5 – wapień litotamnionowy; 6 – prekambryjskie szarogłazy, iłolupki i piaskowce kwarcytowe (według Walczowskiego 1964)

Fig. 2. Geological meridional section through the investigated area (the profile line runs through the meridian of Staszów)

Horizontal scale 1 : 100 000, vertical scale 1 : 10 000. I – Kacanka river; II – transition zone; III – Staszów-Połaniec Basin; a – open karst in Miocene limestones and gypsum; b – karst in gypsum; c – karst in gypsum under the layer of Krakowice clays (reproduced karst) 1 – Pleistocene sands, gravels and boulder clay; 2 – detritic Sarmatian limestone; 3 – Krakowice clays; 4 – gypsum beds; 5 – lithotome limestone; 6 – Precambrian greywacke, clay slates, and quartzite sandstones (after Walczowski 1964)

Powstawanie lejków krasowych na obszarze zapadliska staszowsko-polańskiego związane jest z istnieniem dwóch poziomów wód gruntowych. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w utworach czwartorzędowych, drugi zaś w trzeciorzędowych gipsach znajdujących się pod pokrywą ilów krakowieckich (Walczowski 1964, 1965).

Najważniejszym źródłem wód pierwszego poziomu są opady atmosferyczne. W hydrologii, obok ukształtowania terenu, ważną rolę odgrywa również szata roślinna. Różnice w czasie topnienia śniegu między obszarami zalesionymi a bezleśnymi wynoszą w tych okolicach około 10 dni (Mitosek 1957). Ma to duże znaczenie dla rozwoju form krasowych. Na obszarach zalesionych w okolicach Golejowa okres przepływu zimnych i bogatych w CO_2 wód roztopowych (wody zimne zawierają znacznie więcej rozpuszczonego CO_2 niż ciepłe) przedłuża się i dlatego skały gipsowe na tym terenie łatwiej ulegają krasowieniu niż na obszarach niezalesionych.

Wody drugiego poziomu są allochtoniczne i pochodzą ze strefy brzeżnej ilów krakowieckich, gdzie zalegają one z wapieniami detrytycznymi. Wody te wciskają się w wypełnione piaskami fugi między warstwami gipsów a ilami krakowieckimi. Stąd przenikają one w system szczelin warstwy gipsowej, gdzie w wyniku stałego rozpuszczania skał siarczanowych dochodzi do powstania obszernych próżni. Znajdująca się nad nimi pokrywa ilasta, straciwszy oparcie na większej powierzchni, załamuje się i osiada na dnie próżni. Powstają w ten sposób wertebry wymodelowane w utworach pokrywowych — piaskach i żwirach plejstocénskich. Tylko 3 z badanych lejków (nr 1-3), położone w strefie brzeżnej na północny wschód od Żabnej Wólki, reprodukowane są w detrytycznych wapieniach sarmackich, pozbawionych pokrywy czwartorzędowej. Opisane wyżej zjawiska reprezentują kras zakryty.

Zjawiska krasowe w okolicach Staszowa były przedmiotem szczegółowych studiów prowadzonych przez Walczowskiego (1964, 1965). Wyróżnił on tu kilka form krasowych. Do najpospolitszych należą wertebry, czyli lejki krasowe. Występują one bądź pojedynczo, bądź też tworzą pole wertebów, np. stawy golejowskie, skupienia lejków w okolicach Woli Wiśniowskiej i Czajkowa. Niekiedy można obserwować charakterystyczny układ łańcuchowy lejków krasowych (np. w oddziałach leśnych 13, 14, 15, 65), świadczący o przebiegu głównych linii spękań skał gipsowych.

Same lejki krasowe zróżnicowane są na szereg typów: suche, z aluwiami na dnie, okresowo zalewane wodą, z wodą na dnie, zatopione (jeziora krasowe) i zatorfione. Przedstawiają one zatem różne stadia rozwojowe, np. lejki suche są najczęściej formami początkowymi, posiadającymi otwarte szczeliny i ponory w dnie. W miarę ich uszczelniania lejki są zalewane przez wody gruntowe, które utrzymują się stale po całkowitym zatankowaniu otworów chłonnych. W ten sposób lejki suche mogą przekształcić się w jeziora krasowe. Bujny rozwój roślinności wodnej i bagiennej w tych je-

ziorach powoduje z kolei ich zatorfienie i wypełnienie osadami organogenicznymi.

Część zatorfionych lejków krasowych została wyeksploatowana i ponownie zamieniona na jeziora krasowe. Połączone są one kanałami, którymi odprowadzano wodę w czasie eksploatacji torfów. Niekiedy eksploatacji torfowiska nie doprowadzono do końca, lecz pozostawiono część złoża, które po wtórnym zalaniu wertebu przez wodę pozostało jako wyspa.

Rzadką formą krasową w okolicach Staszowa są kotliny krasowe z druzgordnymi lejkami na dnie. Powstanie ich wiąże się ze spękaniami pionowymi w krasowiejących skałach gipsowych. Reprezentuje je ciąg lejków krasowych położonych w lasach na wschód od Poczeski (oddziały leśne 22, 23, 30 i 31), oznaczonych numerami od 51 do 55.

Inne formy krasowe, jak strugi wodne, wywierzyska, źródła krasowe, w badanym terenie nie występują, gdyż związane są one z krasem odkrytym cokołu Gór Świętokrzyskich.

Zagadnienie wieku lejków krasowych w okolicach Staszowa zostało obszernie i wyczerpująco omówione przez Szczepanka (1968, 1971). Wyniki badań paleobotanicznych nad osadami wypełniającymi lejki wykazały, że ich rozwój odbywał się co najmniej w dwóch fazach: w Allerødzie i Młodszym Dryasie, w związku z zanikiem wiecznej marzłoci i ożywieniem krążenia wód podziemnych oraz od schyłku okresu atlantyckiego, w związku ze zwilgotnieniem klimatu i intensywną gospodarką człowieka.

Proces powstawania nowych lejków krasowych trwa na badanym terenie do chwili obecnej. Następuje również pogłębianie się i rozrastanie form istniejących, o czym świadczą płytkie zerwy na zboczach lejków krasowych (Jońca 1963; Walczowski 1964). Zjawisko to, częste np. na krasowych obszarach Polesia i Wołynia (Tołpa 1932; Tymrakiewicz 1935; Kulczyński 1939-1940), miało w przeszłości miejsce także w okolicach Staszowa. Świadczy o tym nietypowy rozwój olsów na torfach ombrotroficznych, obserwowany w kilku lejkach krasowych w Woli Wiśniowskiej (por. 4.7.1.).

2.3. KLIMAT

Pod względem stosunków makroklimatycznych okolice Staszowa są obszarem przejściowym pomiędzy stosunkowo chłodnymi Górami Świętokrzyskimi na północy a nieco cieplejszą Kotliną Sandomierską na południu. Romer (1949) i Schmuck (1959) zaliczają je do grupy klimatów wyżyn środkowych. Na całym obszarze Niecki Nidziańskiej stosunki makroklimatyczne układają się bardzo podobnie, czego wyrazem są zbliżone wartości średnich temperatur i sum opadów poszczególnych miesięcy (ryc. 3).

Najchłodniejszy miesiąc, styczeń, ma średnią wieloletnią temperaturę poniżej $-3,0^{\circ}\text{C}$. Okres wegetacyjny trwa tu ponad 210 dni, a okres bezprzymrozkowy średnio 160-170 dni (Mitosek 1957).

Okolice Staszowa pod względem ilości opadów tworzą wyraźną wyspę na całym obszarze wyżyn południowej Polski. Według danych wieloletnich za lata 1881-1930 obszar ten otrzymuje zaledwie 481 mm opadów rocznie.

Ryc. 3. Diagramy klimatyczne kilku stacji meteorologicznych położonych na badanym terenie (Busko, Rytwiany, Staszów) wykonane metodą Gaussena-Waltera

Fig. 3. Climatic diagrams for several meteorological stations in the area investigated (Busko, Rytwiany, Staszów) drawn by the Gaussien-Walter method

co wiąże się bezpośrednio z jego położeniem w „cieniu” Gór Świętokrzyskich. Ostatnio istnieje jednak tendencja do podnoszenia się sum rocznych opadów, na co najwyraźniej wskazują dane dla Staszowa za lata 1958-1965. Szata śnieżna zalega w okolicach Staszowa niewiele ponad 70 dni.

Na całym obszarze Niecki Nidziańskiej najczęstsze są wiatry północno-zachodnie i zachodnie, które dominują przez cały rok z wyjątkiem jesieni.

Najrzadsze są natomiast wiatry północno-wschodnie, co jest związane z osłonięciem Niecki Nidziańskiej od północnego wschodu przez Góry Świętokrzyskie.

Poważny wpływ na rozwój roślinności w zagłębieniach krasowych mają stosunki mikroklimatyczne. Według Rewskiej (1967) uwydatnia się on przede wszystkim w niższych temperaturach, w dobowych inwersjach termicznych oraz w częstszym występowaniu przyziemnych, radiacyjnych mgieł.

2.4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ OKRĘGU STASZOWSKIEGO

Okręg Staszowski należy do bardzo słabo zbadanych pod względem botanicznym. Jedynie dane Kuca (1959b), Szczepanka (1971), Karczmarza i in. (1976), Bróža (1977) oraz Ochyry (1979, 1980) rzucają nieco światła na charakter jego szaty roślinnej. Przyczyną tego stanu rzeczy była z jednej strony jednostajność i mała atrakcyjność florystyczna Okręgu Staszowskiego, z drugiej zaś bliskie sąsiedztwo interesujących dla botanika Okręgów: Miechowsko-Pińczowskiego i Sandomiersko-Opatowskiego oraz Krainy Świętokrzyskiej.

Budowa geologiczna i związany z nią charakter gleb sprawiają, że Okręg Staszowski stanowi wyraźnie odróżniającą się jednostkę geobotaniczną (Szafer 1972). Jego rysem charakterystycznym jest zdecydowana przewaga lasów nad obszarami niezalesionymi oraz ubóstwo roślinności kserotermicznej, tak niezwykle bogatej w sąsiednich Okręgach. Jej niewielkie fragmenty występują w bezpośrednim sąsiedztwie Staszowa na gipsach i wapieniach mioceńskich oraz na lessach. Większe skupienia roślinności kserotermicznej rozwijają się na wydmach piaszczystych.

W krajobrazie przeważają lasy. Są to przeważnie lasy sosnowe i sosnowo-dębowe. Nie brak tutaj również lasów grądowych z udziałem buka (np. w okolicach Rytwian i Strzegomia) oraz dobrze zachowanych fragmentów łągów nadrzecznych i olszyn.

W dolinach rzek i potoków duże powierzchnie zajmują łąki z klasy *Molinio-Arrhenatheretea* i torfowiska niskie z rzędu *Caricetalia fuscae*. Te ostatnie są obecnie w znacznej mierze zmeliorowane, w związku z czym właściwa dla nich roślinność jest tu obecnie na wyginieciu. Kuc (1959b) wymienia kilka interesujących, reliktowych gatunków mchów z torfowisk niskich takich jak *Bryum neodamense*, *Paludella squarrosa*, *Meesia triquetra*, *Helodium blandowii*, *Calliargon trifarium*, *Scorpidium scorpioides*, *Tomentypnum nitens*.

Ostatnim wreszcie elementem pierwotnej szaty roślinnej są zbiorowiska wodne i torfowiskowe w licznych na tym obszarze zagłębieniach krasowych. Ich skład florystyczny, dynamika rozwojowa i rola w procesie zarastania stanowią przedmiot niniejszej pracy.

3. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH LEJKÓW KRASOWYCH

3.1. OPIS BADANYCH LEJKÓW KRASOWYCH

3.1.1. ROZMIESZCZENIE I TOPOGRAFIA

Obserwacje nad roślinnością i procesem zarastania przeprowadzono w 179 lejkach krasowych. W celu ułatwienia ich identyfikacji oznaczono je kolejnymi numerami od 1 do 179, poczynając od położonych najbardziej na zachód (ryc. 4). Większość bowiem lejków jest nie nazwana. Tylko większe jeziora mają swoje miejscowe nazwy, np. „Pod Dębem” (54), „Kaczy Staw” (152), „Przedpole” (167), „Ogradzany Smug” (60), „Rozlany Staw” (171), „Biały Staw” (132), „Czarny Staw” (175), „Jasny Staw” (89), „Donica” (168), „Kania” (51), „Torfy” (79). Spośród wszystkich badanych, 114 lejków krasowych (63,7%) znajduje się w lasach Nadleśnictwa Golejów, a pozostałych 65 jest porozrzucanych wśród pól i łąk w okolicach Żabiej Wólki, Małeńca, Staszowa, Golejowa, Wólki Wiśniowskiej i Czajkowa.

Wszystkie lejki krasowe wykazują bardzo duże zróżnicowanie pod względem kształtu, stopnia nachylenia zboczy, głębokości, powierzchni, jak też szaty roślinnej. Najczęściej spotykane są formy o zarysie kolistym lub owalnym, rzadziej nieregularnym. Zbocza są z reguły strome, o nachyleniu 20° - 50° , przeważnie zadarnione lub zalesione. W lejkach śródpolnych ich górna krawędź bywa zwykle wyraźnie podkreślona przez orkę.

W jeziorach głębokość wody waha się od kilkunastu centymetrów do 18 m (tab. 1, 2). Jednakże wysokość zboczy w tych lejkach mieści się w granicach od kilku do kilkunastu metrów. W lejkach wypełnionych osadami organogenicznymi grubość złóż według Szczepanka (1968, 1971) wynosi 1-13 m (ryc. 5, tab. 3). Największe głębokości występują często nie

Ryc. 5. Maksymalne miąższości osadów organogenicznych wypełniających lejki krasowe koło Staszowa

1 – torf sfagnowy; 2 – torf wełniankowy; 3 – torf mszysty; 4 – torf leśny; 5 – torf sapropelowy podobny do gytii; 6 – woda; 7 – il; 8 – piasek (według Szczepanka 1971). 25, 26,... 179 – numery lejków

Fig. 5. Maximum thickness of organogenic sediments filling karst sink-holes near Staszów
1 – *Sphagnum* peat; 2 – cotton-grass peat; 3 – moss peat; 4 – forest peat; 5 – sapropelic peat resembling gyttia; 6 – water; 7 – clay; 8 – sand (after Szczepanek 1971). 25, 26,... 179 – numbers of karst sink-holes

na środku, lecz są przesunięte na południowo-zachodnią stronę lejków.

Rozpiętość powierzchni lejków waha się od 0,01 do 3,5 ha. W przypadku dużych zbiorników dysponowano dokładnymi danymi. Powierzchnię małych lejków obliczano z mapy 1:25 000 lub na podstawie pomiarów.

3.1.2. ZRÓŻNICOWANIE LEJKÓW KRASOWYCH POD WZGLĘDEM SZATY ROŚLINNEJ

Lejki krasowe wykazują ogromne zróżnicowanie pod względem szaty roślinnej. Pomimo to można wyróżnić wśród nich pewne grupy odznaczające się obecnością i dominacją określonego typu zbiorowisk torfotwórczych. Na tej podstawie wyróżniono 3 duże grupy lejków krasowych:

- a) z wyłącznym udziałem zbiorowisk torfowisk niskich,
- b) z udziałem roślinności torfowisk przejściowych,
- c) z udziałem roślinności torfowisk wysokich.

Zaproponowany podział ma tylko znaczenie orientacyjne. Istnieją bowiem lejki, których zaliczenie do jednej z tych grup nasuwa wątpliwości. Przykładem tego mogą być jeziora krasowe powstałe po eksploatacji torfu. W niektórych z nich pozostawiono część złoża, która po zalaniu wyrobiska wodą została zamieniona na wyspę. Przy brzegach takich jezior rozwija się roślinność szuwarowa, natomiast wyspa stanowi typowe torfowisko wysokie. Tego typu lejki zostały zaliczone do grupy trzeciej. Podobnie przedstawia się sprawa z lejkami krasowymi, w których występują mszarne odmiany *Thelypteridi-Phragmitetum*, czy wariant z *Calla palustris* zespołu *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*. Lejki, w których występują te zbiorowiska, zostały zaliczone do grupy drugiej.

Ze względów praktycznych zrezygnowano z opisywania każdego lejka z osobna. Nawet najbardziej lakoniczne opisy zajęłyby w sumie zbyt dużo miejsca, a poza tym w wielu przypadkach byłyby one bardzo podobne. Najważniejsze dane o badanych lejkach krasowych zostały zebrane w tabelach 1, 2, 3.

a. Lejki krasowe z wyłącznym udziałem roślinności torfowisk niskich to najliczniejsza grupa, obejmująca 80 lejków (tab. 1). Mają one często postać jezior z wyraźnie strefowym układem roślinności. W wodzie panują zbiorowiska roślin zakorzenionych na dnie (*Potamogetonetea*) lub wolno pływających (*Lemnetea*), przy brzegach zaś wykształca się gorzej lub lepiej pas szuwarów (*Phragmitetea*). W przypadku małych obiektów brak jest zwykle lustra wody, a cała ich powierzchnia zajęta jest przez zbiorowiska szuwarowe lub zaroślowe. Przeważająca większość lejków z tej grupy położona jest na terenach nie zalesionych, wśród pól i łąk. Ogólnie rzecz biorąc, odznaczają się one większym zeutrofizowaniem, co powoduje, że w pierwszej kolejności rozwijają się w nich zbiorowiska roślinne właściwe torfowiskom niskim. Dopiero później następuje inwazja torfowców i skierowanie sukcesji w stronę zbiorowisk właściwych torfowiskom przejściowym.

b. Lejki krasowe z udziałem roślinności torfowisk przejściowych odznaczają się występowaniem fitocenozy zespołu *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*,

Warszawa, PWN 1985

Ryc. 4. Mapa okolic Staszowa ilustrująca występowanie badanych lejków krasowych

Lejki są czarno zamalowane i oznaczone kolejnymi numerami (małe liczby); duże liczby – oddziały leśne

Fig. 4. Map of the environs of Staszów, illustrating the occurrence of the investigated karst sink-holes

Sink-holes are painted black and denoted by consecutive numbers (small numbers); large numbers – forest sections

Tabela 1. Wykaz lejzków krasowych z wyłącznym udziałem roślinności torfowisk niskich

Table 1. List of karst sink-holes exclusively with fens vegetation

Numer kolejny Consecutive No	Numer lejka No of sink-hole	Położenie Position	Powierzchnia Area in ha	Głębokość wody Depth of water in cm	Najważniejsze zbiorowiska roślinne Main plant communities
1	1	ŻW	0,30	200	Charetum aculeolatae, Salvinio-Spirodeletum, Phragmitetum
2	2	ŻW	0,80	150	Charetum aculeolatae, Phragmitetum, Caricetum elatae
3	5	M	0,20	100	Charetum vulgaris, Typhetum latifoliae, Equisetum fluviatilis
4	7	M	1,00	150	Zbior. Potamogeton alpinus, Phragmitetum, Typhetum latifoliae, Sparganietum erecti, Scirpetum lacustris, Caricetum rostratae
5	6	M	1,00	40	Typhetum angustifoliae, Phragmitetum, Equisetum fluviatilis, Caricetum paniculatae, C. rostratae, Salicetum pentandro-cinereae, Carici elong.-Alnetum
6	8	M	0,30	160	Zbior. Potamogeton alpinus, Glycerietum maxinae
7	9	M	0,40	80	Scirpetum lacustris, Typhetum angustifoliae, T. latifoliae
8	10	M	0,90	100	Typhetum angustifoliae, Phragmitetum
9	11	S	0,20	300	Ceratophylletum demersi, Phragmitetum
10	12	S	0,70	200	Ceratophylletum demersi, Scirpetum lacustris, Typhetum latifoliae, Sparganietum erecti, Eleocharitetum palustris
11	13	S	0,10	200	Ceratophylletum demersi, Phragmitetum
12	14	S	0,02	100	Phragmitetum
13	15	S	0,05	30	Glycerietum maxinae, Oenanther-Rorippetum, Typhetum latifoliae
14	16	S	0,02	20	Oenanther-Rorippetum, Typhetum angustifoliae
15	17	S	0,40	80	Scirpetum lacustris, Oenanther-Rorippetum, Typhetum angustifoliae
16	18	S	0,02	40	Glycerietum maxinae, Sparganietum erecti
17	25	G	0,07	-	Caricetum elatae
18	26	G	0,08	20	Caricetum elatae
19	28	G	0,30	60	Scirpetum lacustris, Typhetum angustifoliae, T. latifoliae, Sparganietum erecti, Caricetum elatae
20	29	G	0,10	40	Scirpetum lacustris, Typhetum latifoliae, Cicuto-Caricetum pseudocyperi
21	30	G	0,06	-	Caricetum gracilis
22	31	G	0,07	20	Caricetum elatae
23	35	43	0,30	60	Oenanther-Rorippetum, zbior. Iris pseudacorus
24	36	43	0,10	150	Oenanther-Rorippetum, Spirodelo-Lemnetum minoris
25	37	43	0,25	40	Caricetum elatae, Salicetum pentandro-cinereae
26	38	43	0,10	60	Charetum vulgaris, Salicetum pentandro-cinereae
27	39	43	0,04	-	Thelypteridi-Phragmitetum
28	43	43	0,15	40	Salicetum pentandro-cinereae, Carici elong.-Alnetum
29	44	43	0,10	-	Thelypteridi-Phragmitetum
30	47	42	0,15	40	Caricetum rostratae, Salicetum pentandro-cinereae
31	56	15	0,01	30	Lemno-Utricularietum vulgaris
32	58	15	0,01	40	Riocietum fluitantis
33	59	15	0,04	60	Lemno-Utricularietum, Polygono-Bidentetum
34	60	15	0,03	50	Lemno-Utricularietum, Polygono-Bidentetum
35	61	P	0,01	30	Sagittario-Sparganietum emersi
36	62	P	0,15	-	Typhetum latifoliae, Caricetum rostratae, C. elatae
37	63	P	0,03	20	Typhetum latifoliae, Polygono-Bidentetum, Rumici-Alopecuretum geniculati
38	64	P	0,02	30	Typhetum latifoliae
39	65	14	0,02	-	Cicuto-Caricetum pseudocyperi
40	67	14	0,02	-	Cicuto-Caricetum pseudocyperi
41	68	14	0,01	-	Cicuto-Caricetum pseudocyperi
42	71	14	0,03	-	Cicuto-Caricetum, Salicetum pentandro-cinereae
43	75	13	0,01	50	Lemno-Utricularietum vulgaris
44	78	13	0,10	70	Salicetum pentandro-cinereae
45	79	12	0,54	350	Salicetum pentandro-cinereae
46	85	25	0,03	20	Caricetum vesicariae, Salicetum pentandro-cinereae
47	89	25	0,70	150	Equisetum fluviatilis, Caricetum vesicariae, Carici elongatae-Alnetum
48	96	WW	0,11	40	Acroetum calami, Sparganietum erecti, Typhetum latifoliae, Oenanther-Rorippetum, Caricetum elatae
49	97	WW	0,12	20	Acroetum calami, Typhetum latifoliae
50	98	WW	0,30	-	Scirpetum lacustris, Epilobio-Juncetum effusi
51	102	33	0,05	-	Salicetum pentandro-cinereae
52	104	33	0,15	170	Charetum vulgaris, Thelypteridi-Phragmitetum
53	107	WW	0,02	30	Acroetum calami
54	109	WW	0,15	-	Carici elongatae-Alnetum
55	117	WW	0,02	-	Carici elongatae-Alnetum
56	118	WW	0,03	-	Caricetum rostratae, Carici elongatae-Alnetum
57	123	C	0,20	100	Charetum vulgaris, Scirpetum lacustris
58	126	C	0,10	60	Rumici-Alopecuretum, Carici elongatae-Alnetum
59	127	C	0,20	30	Phragmitetum, Caricetum elatae
60	129	60	0,03	-	Rumici-Alopecuretum, Salicetum pentandro-cinereae
61	134	65	0,08	75	Caricetum rostratae
62	141	65	0,12	50	Caricetum gracilis
63	146	66	0,08	-	Caricetum rostratae, Salicetum pentandro-cinereae
64	148	53	0,14	150	Cicuto-Caricetum, Salicetum pentandro-cinereae
65	150	66	1,26	400	Salicetum pentandro-cinereae, Carici elong.-Alnetum
66	155	54	0,17	-	Caricetum rostratae, Salicetum pentandro-cinereae
67	156	54	0,10	80	Nuphareto-Nymphaeetum albae, Caricetum rostratae
68	157	67	1,04	450	Nuphareto-Nymphaeetum albae, Salicetum pent.-cin.
69	158	67	0,20	380	Elodeetum canadensis, Cicuto-Caricetum pseudocyperi
70	159	54	3,99	1800	Phragmitetum, Typhetum latifoliae, Caricetum rostratae, Cicuto-Caricetum pseudocyperi
71	161	55	0,11	80	Lemno-Utricularietum, Cicuto-Caricetum pseudocyperi
72	162	55	0,10	90	Lemno-Utricularietum, Salicetum pentandro-cinereae
73	163	42	0,07	60	Oenanther-Rorippetum, Polygono-Bidentetum
74	164	55	0,07	110	Cicuto-Caricetum pseudocyperi
75	165	55	0,10	70	Lemno-Utricularietum, Cicuto-Caricetum pseudocyperi
76	167	54	0,50	80	Caricetum rostratae
77	169	69	0,13	-	Cicuto-Caricetum pseudocyperi
78	170	68	0,05	60	Spirodelo-Lemnetum, Salicetum pentandro-cinereae
79	171	68	0,31	150	Charetum rudis, Myriophylletum verticillati, Phragmitetum
80	176	34	0,15	60	Zbior. Potamogeton alpinus, Elodeetum canadensis, Cicuto-Caricetum, Salicetum pentandro-cinereae

Objaśnienie skrótów (explanation of abbreviations): C - Czajków, G - Golejów, M - Maleniec, S - Staszów, WW - Wola Wiśniowska, ŻB - Żabna Wólka, 42, 43.... - numery oddziałów leśnych (numbers of forest sections).

budujących zwykle silnie uginający się pomost torfowcowy, który nasuwa się na lustro wody. Niektóre mniejsze lejki są nawet w całości zajęte przez pło torfowcowe. Może się ono tworzyć w wyniku masowej inwazji torfowców (najczęściej *Sphagnum recurvum*) w zbiorowiska szuwarowe lub na unoszące się w wodzie darnie *Sphagnum cuspidatum*.

Szata roślinna tego typu lejków jest bardzo zróżnicowana. W wodzie występują najczęściej silnie zubożałe zbiorowiska z rzędu *Potamogetonalia* oraz z klasy *Utricularietea intermedio-minoris*. Przy brzegach natomiast tworzy się węższy lub szerszy pomost torfowcowy, chociaż w wielu przypadkach występują miejscami nie opanowane przez torfowce zbiorowiska szuwarowe i zarośla wierzbowe (*Salicetum pentandro-cinereae*). Jest to grupa równie liczna, jak i poprzednia. Obejmuje 72 lejki krasowe występujące głównie w lasach (tab. 2).

c. Lejki krasowe z udziałem roślinności torfowisk wysokich, zupełnie zarośnięte i wypełnione osadami organogenicznymi, tworzą najmniej liczną grupę (tab. 3). W przeszłości było ich jednak znacznie więcej. W początkach XX wieku były one eksploatowane na skalę przemysłową. Lejki krasowe z tej grupy zajęte są przez typowe torfowiska wysokie, na których panuje zespół *Sphagnetum magellanici boreale*. Na obrzeżach rozwinięty jest zwykle węższy lub szerszy okrajek zajęty przez zbiorowiska szuwarowe, lub przez mszary torfowisk przejściowych. Większość obecnie istniejących torfowisk wysokich zajmuje niewielkie śródpolne lejki krasowe w Woli Wiśniowskiej, Czajkowie oraz między Golejowem a Pocieszką. Największe osiągają powierzchnię 1,5 ha.

3.2. CZYNNIKI SIEDLISKOWE

3.2.1. ŚRODOWISKO WODNE

Lejki krasowe są niewielkimi i stosunkowo płytkimi zbiornikami wodnymi, wskutek czego panuje w nich mniej więcej jednakowa temperatura. Tylko w miejscach gdzie woda jest bardzo płytka, np. przy płaskich brzegach lub nad „łakami” roślin podwodnych, może nastąpić okresowo intensywne nagrzanie się wody i czasowa, ale za to znaczna, różnica temperatury w porównaniu z resztą zbiornika. Szczególnie korzystne warunki termiczne układają się przy osłoniętych od wiatru, wysokich i niezarośniętych brzegach o wystawie południowej.

Wody wypełniające lejki są nieruchome. Nieznaczne ich przepływy można obserwować w dużych akwenach połączonych kanałami, którymi odprowadzano wodę podczas eksploatacji torfu. Również wtórne lejki w dolinach krasowych mogą być niekiedy połączone naturalnymi ciekami wodnymi o bardzo słabym przepływie, który nie wywiera większego wpływu na rozwijającą się roślinność.

Zdecydowana większość lejków krasowych ma charakter dystroficzny. Jedynie kilka akwenów położonych w zachodniej części badanego terenu

Tabela 2. Wykaz lejków krasowych z udziałem roślinności torfowisk przejściowych
Table 2. List of karst sink-holes with transitional bogs vegetation

Numer kolejny Consecutive No	Numer lejka No of sink-hole	Położenie Position	Powierzchnia Area in ha	Głębokość wody Depth of water in cm	Najważniejsze zbiorowiska roślinne ¹ Main plant communities ¹
1	19	G	0,17	-	Zbior. <i>Nardus stricta</i> - <i>Calluna vulgaris</i>
2	22	G	0,25	-	Zbior. <i>Nardus stricta</i> - <i>Calluna vulgaris</i>
3	23	G	0,03	-	Zbior. <i>Nardus stricta</i> - <i>Calluna vulgaris</i>
4.	32	G	0,04	-	<i>Caricetum elatae</i>
5	33	G	0,30	-	<i>Caricetum rostratae</i> , <i>Carici elongatae</i> - <i>Alnetum</i>
6	34	G	0,50	-	Zbior. <i>Iris pseudacorus</i> , <i>Carici elongatae</i> - <i>Alnetum</i>
7	40	43	0,10	-	<i>Caricetum elatae</i> , <i>Epilobio-Juncetum effusi</i>
8	41	43	0,10	30	<i>Phragmition</i>
9	42	43	0,05	20	<i>Sparganietum minimi</i> , <i>Salicetum pentandro-cinereae</i>
10	45	43	0,07	40	<i>Sparganietum minimi</i> , <i>Salicetum pentandro-cinereae</i>
11	46	42	0,06	30	<i>Sparganietum minimi</i>
12	48	42	0,06	20	_____
13	49	40	0,15	30	<i>Caricetum elatae</i> , <i>C. rostratae</i> , <i>Vaccinio ulig.-Pinetum</i>
14	50	40	0,60	500	<i>Caricetum rostratae</i> , <i>Cicuto-Caricetum pseudocyperii</i>
15	52	31	0,83	80	<i>Carici elongatae</i> - <i>Alnetum</i>
16	53	23	0,10	60	<i>Spirodello-Lemnetum minoris</i> , <i>Caricetum paniculatae</i>
17	54	23	0,66	100	Zbior. <i>Potamogeton alpinus</i> , <i>Elodeetum canadensis</i>
18	55	22	0,15	70	<i>Elodeetum canadensis</i> , <i>Caricetum paniculatae</i>
19	57	15	0,12	-	<i>Cicuto-Caricetum pseudocyperii</i>
20	66	14	0,03	30	<i>Spirodello-Lemnetum minoris</i>
21	69	14	0,03	-	_____
22	70	14	0,25	-	_____
23	72	14	0,01	25	<i>Sparganietum minimi</i>
24	74	13	0,01	-	_____
25	76	13	0,03	-	<i>Salicetum pentandro-cinereae</i>
26	77	13	0,17	60	<i>Sparganietum minimi</i> , <i>Vaccinio uliginosi</i> - <i>Pinetum</i>
27	80	12	0,77	350	<i>Caricetum vesicariae</i> , <i>Salicetum pentandro-cinereae</i>
28	81	17	0,14	30	<i>Eleocharitetum palustris</i> , zbior. <i>Riccia huebenerana</i> , <i>Salicetum pentandro-cinereae</i>
29	82	17	0,07	-	<i>Salicetum pentandro-cinereae</i>
30	83	17	0,05	-	<i>Salicetum pentandro-cinereae</i>
31	84	26	0,15	80	<i>Cicuto-Caricetum pseudocyperii</i>
32	86	25	0,39	150	_____
33	87	25	0,08	60	<i>Sparganietum minimi</i>
34	88	25	0,15	100	<i>Nuphareto-Nymphaeetum albae</i>
35	90	25	0,30	400	<i>Scorpidio-Utricularietum</i>
36	91	25	0,03	-	<i>Salicetum pentandro-cinereae</i>
37	92	25	0,20	100	<i>Nuphareto-Nymphaeetum albae</i>
38	93	25	0,22	150	Zbior. <i>Juncus bulbosus fluitans</i>
39	94	27	0,35	140	<i>Sphagnetum cuspidati-obesi</i> , zbior. <i>Iris pseudacorus</i> , <i>Salicetum pentandro-cinereae</i>
40	95	WW	0,08	-	<i>Acetum calami</i> , <i>Carici elongatae</i> - <i>Alnetum</i>

41	99	33	0,02	40	Lemno-Utricularietum minoris, Caricetum rostratae
42	100	33	0,05	25	Cicuto-Caricetum pseudocyperii
43	103	33	0,05	-	8
44	110	WW	0,07	-	Zbior. Iris pseudacorus
45	116	WW	0,25	-	Caricetum elatae, Acroetum oalami, Epilobio-Juncetum
46	121	C	0,12	30	Caricetum gracilis, Equisetum fluviatilis
47	130	62	0,40	200	Sphagnetum cuspidati-obesi
48	131	62	0,16	250	Sphagnetum cuspidati-obesi, Vaccinio uliginosi-Pinetum
49	132	62	0,70	150	Sphagnetum cuspidati-obesi, Caricetum rostratae
50	133	76	0,10	200	
51	135	65	0,05	30	Sparganietum minimi
52	136	65	0,02	-	
53	137	65	0,06	-	Caricetum vesicariae
54	138	65	0,12	70	Caricetum elatae
55	139	65	0,03	30	Caricetum vesicariae
56	140	65	0,06	30	Sparganietum minimi
57	142	65	0,12	-	
58	143	65	0,03	-	
59	144	65	0,05	50	Caricetum vesicariae
60	145	65	0,01	-	
61	151	53	0,16	250	Nuphareto-Nymphaeetum albae, Caricetum rostratae
62	152	54	0,72	250	Typhetum latifoliae, zbior. Juncus bulbosus fluitans
63	153	54	0,05	-	Caricetum vesicariae
64	154	54	0,16	50	Sparganietum minimi, Caricetum vesicariae
65	160	55	0,10	30	Sphagnetum cuspidati-obesi, Salicetum pent.-cinereae
66	166	55	0,10	90	Sphagnetum cuspidati-obesi, Caricetum rostratae
67	172	92	0,50	120	Sparganietum minimi, Phragmitetum
68	173	34	0,28	200	Potamogetonetum natantis, Nuphareto-Nymphaeetum albae
69	174	34	0,05	-	Salicetum pentandro-cinereae
70	175	34	0,70	1100	Myriophylletum spicati, Ceratophylletum demersi
71	177	34	0,15	400	Myriophylletum spicati, Ceratophylletum demersi
72	178	30	0,03	70	Zbior. Nardus stricta-Calluna vulgaris

¹ Dla uproszczenia w kolumnie "Najważniejsze zbiorowiska roślinne" została pominięta nazwa Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi powtarzająca się w każdym lejku krasowym

For simplification in column "Main plant communities" name Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi has been omitted. This association occurs in every karst sink-hole of this group.

wykazuje pewne tendencje do eutrofizacji. Wiąże się to bezpośrednio z wapiennym podłożem, w którym są wymodelowane. Ich wody wyróżniają się znaczną mineralizacją, alkalicznym odczynem oraz dużą przezroczystością (tab. 4, 5). W przeciwieństwie do nich, wody lejków dystroficznych odznaczają się brunatnym zabarwieniem spowodowanym obecnością substancji humusowych. Intensywność tego zabarwienia waha się od 40 do 340° skali Pt. Wywiera ono wielki wpływ na przezroczystość wody, chociaż duże znaczenie ma tu również ilość zawiesin.

Tabela 3. Wykaz lejków krasowych z udziałem roślinności torfowisk wysokich

Table 3. List of karst sink-holes with raised bogs vegetation

Numer kolejny Consecutive No	Numer lejka No of sink-hole	Położenie Position	Powierzchnia Area in ha	Głębokość osadów Depth of deposits in cm	Najważniejsze zbiorowiska roślinne ¹ Main plant communities ¹
1	3	ZW	0,30	-	Caricetum elatae, Salicetum pentandro-cinereae
2	4	M	0,40	-	Eriophoro-Sphagnetum, Epilobio-Juncetum effusi
3	20	G	0,07	-	Zbior. Nardus stricta-Calluna vulgaris
4	21	G	1,20	-	Zbior. Nardus stricta-Calluna vulgaris
5	24	G	0,07	1050	Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi
6	27	G	0,12	-	Zbior. Nardus stricta-Calluna vulgaris
7	51	30	1,57	-	Cicuto-Caricetum pseudocyperici, Thelypteridi-Phragmitetum, Salicetum pentandro-cinereae, Eriophoro-Sphagnetum
8	73	13	0,14	-	Salicetum pentandro-cinereae, Eriophoro-Sphagnetum
9	101	33	0,45	5	Nupharcto-Nymphaeetum albae, Thelypteridi-Phragmitetum, Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi
10	105	33	0,25	-	Zbior. Nardus stricta-Calluna vulgaris
11	106	44	0,15	-	Salicetum pentandro-cinereae, Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi, zbior. Nardus stricta-Calluna vulgaris
12	108	WW	0,06	-	Zbior. Iris pseudacorus
13	111	WW	0,03	-	Acroetum calami
14	112	WW	0,12	-	Cicuto-Caricetum, Salicetum pentandro-cinereae
15	113	WW	0,10	-	Salicetum pentandro-cinereae
16	114	WW	0,60	-	Acroetum calami, Eriophoro-Sphagnetum
17	115	WW	0,10	-	Acroetum calami, zbior. Iris pseudacorus, Epilobio-Juncetum effusi, Eriophoro-Sphagnetum
18	119	WW	0,04	660	Phragmitetum, Alnion glutinosae
19	120	WW	0,06	350	Caricetum elatae
20	122	C	0,04	1050	Phragmitetum
21	124	C	0,04	400	Sparganietum erecti, Thelypteridi-Phragmitetum
22	125	C	0,06	700	Typhetum latifoliae
23	128	C	0,12	-	Caricetum elatae, Eriophoro-Sphagnetum
24	147	53	0,15	-	Salicetum pentandro-cinereae, Eriophoro-Sphagnetum
25	149	53	0,18	250	Hottonietum palustris, Eriophoro-Sphagnetum
26	168	61	1,04	200	Charetum vulgaris, Caricetum gracilis
27	179	C	0,06	700	Utricularietum neglectae, Caricetum rostratae

¹Dla uproszczenia w kolumnie "Najważniejsze zbiorowiska roślinne" została pominięta nazwa Sphagnetum magellanici boreale powtarzająca się w każdym lejku krasowym

¹For simplification in column "Main plant communities" name Sphagnetum magellanici boreale has been omitted. This association occurs in every karst sink-hole of this group.

Tabela 4. Własności fizyczne i pH wód z lejów krasowych

Table 4. Physical properties and pH of water from karst sink-holes

Numer próby No of sample	Tab. i zdj. fitosoc. Phytosoc. table and record No	Numer lejka No of sink-hole	Barwa wody Water colour Opt	Tempera- tura Temp- ature °C	pH	Przewodnio- stwo elektro- lityczne Electrolytic conductivity S cm ⁻¹	Twardość ogólna Total hardness mval/l	Twardość zasadowa Alcaline hardness mval/l	Sucha po- zostałość Total residue mg/l	Zespół roślinny Plant association
1	7; 7	176	85,0	4,1	5,9	117,0	1,4	4,9	92,0	Riocletum fluitantis
2	8; 1	53	40,0	4,4	6,6	225,1	6,0	4,2	167,0	Spirodelo-Lemnetum minoris
3	10; 2	69	315,0	4,2	5,8	50,0	3,0	2,5	74,0	Lemno-Utricularietum
4	12; 2	1	17,5	3,8	7,5	349,3	12,1	10,4	219,0	Charetum aculeolatae
5	13; 3	171	50,0	4,9	6,3	205,5	5,8	3,6	143,0	Charetum rudis
6	14; 6	104	252,0	-	6,2	43,0	2,2	1,4	45,0	Charetum vulgaris
7	15; 5	7	144,0	4,0	5,9	156,1	5,1	2,5	122,0	Zbior. Potamogeton alpinus
8	20; 5	101	337,5	-	6,4	154,2	5,2	2,2	138,0	Potamogeton natantis
9	20; 2	151	64,8	4,3	6,1	39,3	1,4	2,8	68,0	Nuphareto-Nymphaeetum albae
10	17; 5	175	76,0	-	6,2	77,9	3,6	1,7	69,0	Myriophylletum spioati
11	22; 8	131	270,0	6,9	5,9	42,3	1,4	1,1	38,0	Sphagnetum cuspidati-obesi typicum
12	22; 15	132	148,0	-	6,3	78,6	2,4	1,4	54,0	Sphagnetum cuspidati-obesi nupharetosum

Tabela 5. Skład chemiczny wody z lejków krasowych

Table 5. Chemical composition of the water from karst sink-holes

Numer prób No of sample	Tab. i zdj. fitosoc. Phytosoc. table and record No	Numer lejka No of sink- holes	CO ₂ mg/l	O ₂ mg/l	O ₂ %	NH ₃ mg/l	Ca ⁺⁺ mg/l	Fe ⁺⁺ Fe ⁺⁺⁺ + mg/l	Cl ⁻ mg/l	HCO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	NO ₃ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼⁼ mg/l	Utlenialność Oxidability O ₂ mg/l
1	7; 7	176	28,6	8,0	62,5	1,70	-	ślad trace	19,8	36,6	0,0002	0,46	19,2	17,5
2	8; 1	53	33,0	9,4	71,6	0,75	38,4	0,50	13,5	91,5	ślad trace	0,46	60,1	6,8
3	10; 2	69	74,8	1,4	10,7	3,15	-	0,83	15,6	97,6	0,001	1,06	38,4	37,2
4	12; 2	1	39,6	11,8	89,9	1,55	51,2	-	17,7	323,3	ślad trace	0,07	19,2	11,8
5	13; 3	171	44,0	6,6	51,6	1,20	54,4	-	17,7	73,2	0,002	0,62	48,0	23,8
6	14; 6	104	22,0	3,9	-	1,90	-	-	11,3	48,8	0,006	0,16	9,6	8,6
7	15; 5	7	48,4	4,8	36,6	1,70	24,0	0,83	17,7	61,0	0,005	0,27	165,7	11,4
8	20; 5	101	50,6	0,5	-	2,00	-	0,50	11,3	73,2	0,008	0,60	24,0	9,2
9	20; 2	151	22,0	9,2	70,1	1,85	-	-	10,6	48,8	-	0,50	-	17,4
10	17; 5	175	26,4	9,8	-	1,70	-	0,50	9,9	42,7	0,004	0,40	2,4	7,3
11	22; 8	131	44,0	12,0	98,6	1,60	-	-	9,9	48,8	0,007	0,62	-	9,2
12	22; 15	132	24,2	5,2	-	2,10	-	-	12,7	61,0	0,005	0,40	2,4	7,7

Wyniki analiz właściwości fizyczno-chemicznych wód z lejków krasowych, przedstawione w tabelach 4 i 5, pozostają w daleko idącej zgodności z danymi Podbielkowskiego (1960) dla wód dołów potorfowych. Wynika to stąd, że spora liczba badanych zbiorników powstała, podobnie jak torfianki, wskutek eksploatacji torfowisk zajmujących zagłębienia krasowe. Są one zatem faktycznie dołami potorfowymi. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka nieco odmiennych danych. Wyrażna jest większa zawartość amoniaku w wodach lejków krasowych. W porównaniu z wodami gruntów mineralnych, gdzie zawartość NH_3 osiąga setne części miligramów na liter (Alekin 1956), w lejkach krasowych jest ona bardzo duża i przekracza zwykle 1,5 mg/l. Maksymalną zawartość amoniaku (3,15 mg/l) zaobserwowano w małym lejku krasowym zajęтым przez zespół *Lemno-Utricularietum*, co może pozostawiać w ścisłym związku z owadożernością *Utricularia vulgaris*. W przeciwieństwie do amoniaku, fosforany występują albo w ilościach śladowych, albo nie stwierdza się ich obecności. Również żelazo występuje w ilościach śladowych, podczas gdy w dołach potorfowych jego zawartość osiąga średnio 1-2 mg/l.

Jednym z ważnych czynników decydujących o charakterze roślinności w lejkach krasowych jest odczyn wody. Waha się on w szerokich granicach pH od 3,5 do 7,5. Istnieje dość wyraźna zależność między wartościami pH a rozwijającymi się tu zbiorowiskami roślinnymi. W wodzie o pH (4,5)5,0-6,0(6,5) optimum rozwoju osiągają zbiorowiska wodne z klas *Utricularietea intermedio-minoris* i *Litorelletea*, natomiast w wodzie o pH (6,0)6,5-7,5 – zbiorowiska wodne z klas *Lemnetea* i *Potamogetonetea*.

Wody bardzo kwaśne o pH 4,5 i mniejszym występują na torfowiskach przejściowych (*Rhynchosporo-Sphagnion*) i wysokich (*Oxycocco-Sphagnetum*). Są to typowe wody acidotroficzne (Olsen 1950).

3.2.2. GLEBY

Gleby lejków krasowych należą prawie wyłącznie do klasy gleb bagiennych. Odznaczają się one nadmiernym uwilgotnieniem spowodowanym najczęściej wysokim poziomem wody gruntowej i procesami beztlenowymi zachodzącymi w całym profilu glebowym, a także nagromadzeniem substancji organicznej w postaci torfu i namulów organicznych (Tomaszewski 1969). Zgodnie z podziałem PTG (Kuźnicki i in. 1974) dzieli się je na dwa typy: gleby mułowe i gleby torfowe.

Gleby mułowe stanowią podłoże, na którym rozwijają się liczne zbiorowiska szuwarowe, zaroślowe i leśne. Większość z nich należy do podtypu gleb torfowo-mułowych. Tworzą się one w zmiennych warunkach wodnych: w okresie intensywnego działania wód spływowych osiadają namuły organiczne i mineralne, na których w okresie zahamowania spływów i stagnacji wód osiedla się różnego typu roślinność torfotwórcza i powstają wtedy przewarstwienia torfowe. Profil takiej gleby wygląda następująco: $A_0 - Ml_1 - T_1 - Ml_2 - T_2 - Ml_3 - \dots$. W zbadanych profilach występuje zwykle tylko jeden

Tabela 6. Niektóre właściwości chemiczne gleb

Table 6. Some chemical features of soils

Numer profilu Profile No	Poziom Horizon	Głębokość Depth in cm	C organiczny Organic C	Materia organiczna Organic matter	N organiczny Organic N	Popiół Ash	K ₂ O mg/100 g of soil	P ₂ O ₅ mg/100 g of soil	CaO	pH		Zespół roślinny Plant association
										H ₂ O	KCl	
Gleby torfowo-mułowe (alluvial muck soils on peat subsoil)												
240	A ₀	0 - 14	10,24	17,66	0,75	85,34	5,6	1,4	13,6	4,4	4,2	ACCRETUM CALAMI
	T _n	14 - 51	5,51	9,50	0,45	80,50	2,2	3,1	10,6	4,8	4,5	
	D	> 51	0,97	1,68	0,10	98,32	1,4	4,4	-	5,2	4,5	
14	T _{pr}	0 - 20	35,40	61,03	2,55	36,97	13,8	-	16,4	4,1	3,8	Zbiór. IRIS PSEUDACORUS
	M ₂	20 - 33	6,34	10,92	0,45	89,08	1,0	1,8	7,2	3,8	3,5	
	D	> 33	0,84	1,45	1,10	88,56	1,0	1,0	-	4,9	4,1	
372	T _n	20 - 38	2,90	5,00	0,25	95,00	1,8	1,4	8,4	5,0	4,5	Zbiór. IRIS PSEUDACORUS
197	T _n	0 - 12	7,90	17,12	0,72	65,72	6,2	-	13,6	4,5	4,1	CARICETUM ELATAE
	M ₂	12 - 38	4,09	7,06	0,48	92,95	1,8	1,6	8,8	4,5	4,1	
	D	> 38	1,00	1,73	0,20	98,27	1,4	1,8	2,0	4,7	4,4	
183	T _n	0 - 8	8,80	15,19	0,04	84,81	10,0	-	28,2	5,2	5,0	SPARGANIETUM ERECTI
	M ₂ ₁	8 - 18	5,45	9,39	0,54	90,41	6,6	5,6	11,0	5,2	4,5	
	M ₂ ₂	18 - 60	0,43	0,75	0,08	99,25	1,0	2,6	6,6	5,5	5,1	
116	T _n	3 - 33	12,24	36,57	0,51	63,43	2,2	3,6	4,8	3,2	2,7	CARICETUM ROSTRATAE
414	T _n	5 - 40	13,43	23,15	1,04	76,85	1,8	6,6	22,4	5,4	5,2	SALICETUM PENTANDRO-CINEREAE
Gleby mułowe właściwe (proper alluvial muck soils)												
277	A ₀	0 - 25	8,99	15,51	0,11	84,50	2,2	7,6	22,0	5,4	5,2	CARICI ELONGATAE-ALNETUM
	M ₂ ₁	25 - 50	0,60	1,03	0,54	98,97	1,0	3,6	5,4	6,3	6,2	
Gleby torfowe torfowisk przejściowych (peat soils of transitional peatlands)												
305	T _{pr}	0 - 40	38,99	72,13	0,85	37,50	7,5	4,8	8,8	3,6	3,2	SALICETUM PENTANDRO-CINEREAE
	M ₂	13 - 23	2,29	3,94	0,14	96,06	1,0	2,8	12,1	3,4	3,2	
Gleby torfowe torfowisk wysokich * (peat soils of raised peatlands)												
381	A ₀	0 - 5	40,60	70,00	1,22	30,00	6,6	5,6	7,6	3,6	3,4	CARICI ELONGATAE-ALNETUM
	T _w	5 - 100	43,89	75,67	0,40	24,33	-	-	-	3,0	2,9	

poziom torfowy pochodzenia niskiego lub przejściowego, osiągający miąższość do kilkudziesięciu centymetrów.

Odczyn we wszystkich badanych profilach jest wyraźnie kwaśny (tab. 6). Zawartość substancji organicznej w górnych poziomach A_0 i T jest duża i waha się od 5,0 do 61,03%, a węgla od 7,9 do 35,4%. Zawartość przyswajalnego potasu (K_2O) i fosforu (P_2O_5) jest niewielka i nie przekracza zwykle 10 mg/100 g gleby. Największe ilości tych pierwiastków gromadzą się w poziomach A_0 i T, w których najbujniej rozwijają się systemy korzeniowe roślin. Popielność torfów jest niewielka, co wiąże się z ich zamuleniem przez składniki mineralne.

Oprócz gleb torfowo-mułowych w lejkach krasowych występują gleby mułowe właściwe o profilu $A_0 - Ml - CG$. Są one znacznie rzadsze od poprzedniego podtypu. Gleby te mają pochodzenie limnetyczne i tworzą się w wyniku zarastania płytkich zbiorników wodnych. Charakteryzują się znaczną ilością dobrze rozłożonej i zhumifikowanej próchnicy, tworzącej się z roślinności szuwarowej i wodnej. Zawartość substancji organicznej w profilu 277 wynosi 15,5% (tab. 6), a popielność 84,5%.

Gleby torfowe występują powszechnie w lejkach krasowych o dość daleko posuniętym procesie zarastania, w których stwierdzono warunki szczególnie sprzyjające procesowi torfotwórczemu i gromadzeniu się substancji organicznej. Procesy torfotwórcze zachodzą w warunkach trwałego, nadmiernego uwilgotnienia gleby i anaerobiozy. Typ gleb torfowych obejmuje następujące podtypy:

a. Gleby torfowisk niskich charakteryzuje profil o następujących poziomach genetycznych: $A_0 - A_1 T_n - T_n$. Powstają one w wyniku procesów torfotwórczych w środowisku wodnym bogatym w składniki mineralne. W lejkach krasowych są one bardzo rzadkie ze względu na brak sprzyjających warunków.

b. Gleby torfowisk przejściowych o budowie profilu: $A_0 - (A_1) T_{pr} - T_{pr}$, odznaczają się cechami pośrednimi między glebami torfowisk niskich i wysokich. Są one bardzo kwaśne, słabiej zamulone niż gleby torfowisk niskich. Tworzą siedliska boru bagiennego i łożowisk.

c. Gleby torfowisk wysokich charakteryzują poziomy: $A_0 - (A_1) T_w - T_w$. Są dość częste w zupełnie zarośniętych lejkach krasowych. Powstają one z gleb torfowych torfowisk przejściowych wskutek ciągłego narastania warstw torfu i utraty kontaktu z wodami gruntowymi.

4. ZBIOROWISKA ROŚLINNE LEJKÓW KRASOWYCH

4.1. SYSTEM ZESPOŁÓW I ZBIOROWISK ROŚLINNYCH

Badaniami objęto wszystkie naturalne zbiorowiska roślinne występujące w lejkach, a także niektóre antropogeniczne. Ogółem wyróżniono 45 zespołów i 7 zbiorowisk bliżej nie określonej rangi. Reprezentują one 14 klas, 16 rzędów i 22 związki.

Podany niżej wykaz systematyczny ułożony jest zgodnie z progresją fitosocjologiczną (Braun-Blanquet 1964), czyli od najprościej zbudowanych zbiorowisk pleustonowych do coraz wyżej uorganizowanych zespołów bagiennych i lądowych. Jest on najbardziej zgodny z systemem zespołów roślinnych zaproponowanym przez Oberdorfer i in. (1967) (por. także Oberdorfer 1970). Kwestia odmiennej rangi syntaksonomicznej niektórych jednostek jest dokładnie dyskutowana przy ich szczegółowej charakterystyce.

Skróty (abbreviations): kl. — klasa (class), rz. — rząd (order), zw. — związek (alliance), zbior. — zbiorowisko (community of).

- Kl. *Lemnetea* W. Koch i R. Tx. 1954 *apud* Oberd. 1957
 - Rz. *Lemnetalia* W. Koch i R. Tx. 1954 *apud* Oberd. 1957
 - Zw. *Lemnion minoris* W. Koch i R. Tx. 1954 *apud* Oberd. 1957
 - Riccietyum fluitantis* Slavnič 1956
 - Spirodelo-Lemnetum minoris* Th. Müll. i Görs 1960
 - Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae* Slavnič 1956
 - Rz. *Hydrocharitetalia* Rübel 1933
 - Zw. *Hydrocharition* Rübel 1933
 - Lemno-Utricularietum vulgaris* Soó (1928) 1938
 - Utricularietum australis* Th. Müll. i Görs 1960
 - Kl. *Potamogetonetea* R. Tx. i Prsg. 1942
 - Rz. *Charetalia* Sauer 1937
 - Zw. *Charion fragilis* (Sauer 1937) Krausch 1964
 - Charetum aculeolatae* (Corillion 1957) Dąmbska 1966
 - Charetum rudis* Dąmbska 1966
 - Charetum vulgaris* Corillion 1957
 - Rz. *Potamogetonetalia* W. Koch 1926
 - Zw. *Potamogetonion* (W. Koch 1926) Oberd. 1957
 - Zbior. *Potamogeton alpinus*
 - Myriophylletum verticillati* Soó 1927
 - Myriophylletum spicati* Soó 1927
 - Elodeetum canadensis* (Pign. 1953) Pass. 1964
 - Ceratophylletum demersi* Hild 1956
 - Zw. *Nymphaeion* W. Koch 1926
 - Nuphareto-Nymphaetum albae* Tomaszewicz 1977
 - Potamogetonetum natantis* Soó 1927
 - Zw. *Hottonion* Segal 1964
 - Hottonietum palustris* R. Tx. 1937
- Kl. *Utricularietea intermedio-minoris* Pietsch 1964
 - Rz. *Utricularietalia intermedio-minoris* Pietsch 1964
 - Zw. *Sphagno-Utricularion* Th. Müll i Görs 1960 em. Pietsch 1964
 - Sphagnetum cuspidati-obesi* R. Tx. i v. Hübschm. 1958
 - Zw. *Scorpidio-Utricularion* Pietsch 1964

- Scorpidio-Utricularietum* (Ilshner 1959 mscr.) Th. Müll. i Görs
1960
- Sparganietum minimi* Schaaff 1925
- Kl. *Litorelletea* Br.-Bl. i R. Tx. 1943
- Rz. *Litorelletalia* W. Koch 1926
- Zw. *Eleocharition acicularis* Pietsch 1965
- Zbior. *Eleocharis acicularis*
- Zbior. *Juncus bulbosus fluitans*
- Kl. *Isoëto-Nanojuncetea* Br.-Bl. i R. Tx. 1943
- Rz. *Cyperetalia fusci* (Klika 1943) Müller-Stoll i Pietsch 1961
- Zw. *Elatini-Eleocharition ovatae* Pietsch 1965
- Zbior. *Riccia huebenerana*
- Zw. *Eu-Nanocyperion flavescentis* (W. Koch 1926 s. str.) Rivas Goday
1961
- Cyperetum flavescentis* W. Koch 1926
- Kl. *Bidentetea tripartiti* R. Tx., Lohm. i Prsg. 1950
- Rz. *Bidentetalia tripartiti* Br.-Bl. i R. Tx. 1943
- Zw. *Bidention tripartiti* Nordh. 1940
- Polygono-Bidentetum* (W. Koch 1926) Lohm. 1950
- Kl. *Plantaginetea maioris* R. Tx. i Prsg. 1950
- Rz. *Plantaginetalia maioris* R. Tx. 1950
- Zw. *Agropyro-Rumicion crispus* Nordh. 1940
- Rumici-Alopecuretum geniculati* R. Tx. (1937) 1950
- Kl. *Phragmitetea* R. Tx. i Prsg. 1942
- Rz. *Phragmitetalia* (W. Koch 1926) R. Tx. i Prsg. 1942
- Zw. *Phragmition* W. Koch 1926
- Scirpetum lacustris* (Allorge 1922) Chouard 1924
- Typhetum angustifoliae* (Allorge 1922) Soó 1927
- Phragmitetum* (Gams 1927) Schmale 1939
- Equisetetum fluviatilis* Steffen 1931
- Typhetum latifoliae* Soó 1927
- Sparganietum erecti* Roll 1938
- Glycerietum maximae* Hueck 1931
- Acoretum calami* (Eggler 1933) Kobendza 1948
- Zbior. *Iris pseudoacorus*
- Zw. *Eleocharito-Sagittarion* Pass. 1964
- Oenanthro-Rorippetum* Lohm. 1950
- Sagittario-Sparganietum emersi* R. Tx. 1953
- Eleocharitetum palustris* Schennikov 1919
- Zw. *Magnocaricion* W. Koch 1926
- Cicuto-Caricetum pseudocyperi* de Boer 1942
- Thelypteridi-Phragmitetum* Kuiper 1957
- Caricetum elatae* W. Koch 1926
- Caricetum paniculatae* Wang. 1916

- Caricetum rostratae* Rübel 1912
Caricetum vesicariae Br.-Bl. i Denis 1926
Caricetum gracilis (Graebn. i Hueck 1931) R. Tx. 1937
- Kl. *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Nordh. 1936
 Rz. *Scheuchzerietalia palustris* Nordh. 1936
 Zw. *Rhynchosporo-Sphagnion* M. Jasn., J. Jasn. i Mark. 1968
Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi M. Jasn., J. Jasn. i Mark. 1968
- Kl. *Oxycocco-Sphagnetum* Br.-Bl. i R. Tx. 1943
 Rz. *Sphagnetalia fusci* R. Tx. 1955
 Zw. *Sphagnion fusci* Br.-Bl. 1920
Sphagnetum magellanici boreale M. Jasn., J. Jasn. i Mark. 1968
- Kl. *Molinio-Arrhenatheretea* R. Tx. 1937
 Rz. *Molinietalia* W. Koch 1926
 Zw. *Calthion* R. Tx. 1937
 Zbior. *Scirpus sylvaticus*
Epilobio-Juncetum effusi Oberd. 1957
- Kl. *Nardo-Callunetea* Prsg. 1949
 Rz. *Nardetalia* Prsg. 1949
 Zw. *Nardo-Galion saxatilis* Prsg. 1949
 Zbior. *Calluna vulgaris-Nardus stricta*
- Kl. *Alnetea glutinosae* Br.-Bl. i R. Tx. 1943
 Rz. *Alnetalia glutinosae* R. Tx. 1937
 Zw. *Alnion glutinosae* (Malc. 1929) Meijer Drees 1936
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961
Carici elongatae-Alnetum W. Koch 1926
- Kl. *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. 1939
 Rz. *Vaccinio-Piceetalia* Br.-Bl. 1939
 Zw. *Dicrano-Pinion* Libbert 1933
Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929

4.2. ZBIOROWISKA WODNE

4.2.1. PRYMITYWNE ZBIOROWISKA ROŚLIN WODNYCH O CHARAKTERZE LIMNOPLEUSTONU (*LEMNETALIA*)

W badanym terenie typowo wykształcone płaty zbiorowisk roślin pleustonowych najczęściej występują w małych, silnie ocienionych lejkach krasowych, w których osłabiony jest proces sukcesji roślinności wodnej. W wielu przypadkach są one jedynymi zbiorowiskami wodnymi, zajmującymi całą powierzchnię wody. Poza tym dobrze wykształcone płaty zbiorowisk pleustonowych spotyka się w lukach między roślinnością szuwarową oraz w torfiankach na torfowiskach.

Od czasu opisanie i ujęcia w tabele fitosocjologiczne pierwszych zespołów pleustonowych (Slavnič 1956) wyróżniono bardzo dużo nowych asocjacji (np. Miyawaki i Tüxen 1960; Müller i Görs 1960). Traktowanie ich

Tabela 7

Klasa (Class): Lemnetae
Rząd (Order): Lemnetales
Związek (Alliance): Lemnion minoris

RICCIETUM FLUITANTIS Slavnič 1956

Nr adż. w tabelli (table number of record) ..	1	2	3	4	5	6	7	8	Stalok (constancy)	(Index of coverage) Wskaźnik pokrycia
Nr adż. w terenie (field number of record) ..	424	327	288	425	270	426	293	294		
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	175	79	7	177	7	173	176	176		
Data (date)	15.7	6.8	28.7	15.7	26.7	15.7	30.7	30.7		
Powierzchnia zdjcia (area of sample plot) m ²	1975	1974	1974	1975	1974	1975	1974	1974		
Pokrycie roślinności (total plant cover) % ..	4	6	10	6	4	4	8	9		
Głębokość wody (depth of water) cm	80	80	85	85	100	60	100	75		
pH wody (pH of water)	7.0	50	35	50	40	40	50	40		
Liżba gatunków (total number of species) ..	6.0	6.0	6.5	6.0	6.0	5.5	6.5	6.5		
	10	7	8	9	6	7	13	11		

I. Ch. Riocletum fluitantis:	4.4	3.3	3.3	4.4	5.5	3.3	4.4	3.3	100	V	5313
Riocia fluitans	.	.	.	.	.	.	.	+	25	II	64
Riocioarpos natans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
II. Ch. Lemnetae:											
Lemna minor	2.3	3.3	1.2	3.3	1.2	2.2	1.2	+	100	V	1563
Lemna trianlos	2.2	1.2	1.3	+	+	+	1.3	2.3	75	IV	625
Hydrocharis morsus-ranae	+	1.2	+	+	1.2	+	+	1.2	63	IV	129
Utricularia vulgaris	+	1.2	.	.	.	1.1	.	.	50	III	189
Spirodela polyrrhiza	1.2	.	.	.	.	+	+	1.2	38	II	125
III. Ch. Potamogetonetes:											
Nriophyllum spicatum	+	1.2	.	+	.	+	+	1.2	50	III	5
Niocea oblongoides	.	.	.	1.1	.	.	.	.	38	II	125
Niocephyllum sparsum	.	.	.	.	1.2	1.2	.	.	25	II	64
Potamogetonetes	.	.	.	.	.	.	.	.	25	II	125
Ranunculus circinatus	.	.	.	.	.	.	+	+	25	II	3
IV. Inne (other spp.):											
Potentilla palustris	+	.	.	.	+	1.1	+	.	50	III	66
Drepanocladus fluitans	1.2	.	.	+	+	.	.	.	38	II	65
Gelia palustris	+	.	.	.	.	.	.	.	38	II	4
Sagittaria sagittifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	25	II	3
Sparganium cuspidatum var. plumosum	.	.	.	.	.	+	+	+	25	II	3

Gatunki sporadyczne (sporadic species): III. Potamogeton peotinatus 2: 2.2; Callitriche verna 3: +; Potamogeton orisipus 1; Fontinalis antipyretica 1: +2. IV. Typha latifolia 3; Alisma plantago-aquatica 7; Chiloscyphus polyanthos 4: +2; Scorpoidium scorpioides 4.

Gatunki sporozyme (sporadio species): III. *Potamogeton pectinatus* 2; 2-2; Callitriche verna 3; +2; *Potamogeton crispus* 6; *Pontanalis antipyrifolia* 1; +5. IV. *Nypha latifolia* 3; *Allisma plantago-aquatica* 7; *Chiloscyphus polyanthus* 4; +8; *Scorpidium scorpioides* 4.

jako odrębne jednostki nasuwa niejednokrotnie poważne wątpliwości. Ostatnie, krytyczne opracowania zespołów pleustonowych (Tüxen 1974; Wołek 1974) poważnie zmniejszyły ich liczbę.

Riccietym fluitantis Slavnič 1956 — zespół wgłębki wodnej (tabl. 7)

Wgłębka wodna (*Riccia fluitans*) jest dość często spotykana w okolicach Staszowa (Ochyra 1980), jednakże fitocenozy utworzone przez nią należą do rzadkości. Rozwijają się one w wodzie o głębokości 40-70 cm, w najbliższym sąsiedztwie roślinności szuwarowej bądź zarośli wierzbowych. Dno w tych miejscach jest zwykle silnie muliste, woda ma odczyn lekko kwaśny i odznacza się słabą mineralizacją.

Fitocenozy zespołu mają typową, dwuwarstwową strukturę podobną do tej, jaką stwierdzono u nas w stawach rybnych (Podbielkowski 1968), dołach potorfowych (Kępczyński 1965; Hereźniak 1972) i w starorzeczach (Krzywański 1974; Piórecki 1975). W płatach dominują gatunki pleustnowe, spośród których na uwagę zasługuje występowanie rzadkiego w Polsce wątrobowca *Ricciocarpos natans* (Ochyra i Tomaszewicz 1979).

Riccietym fluitantis jest szeroko rozpowszechnione w środkowej i południowo-wschodniej Europie (Sauer 1937; Panknin 1945; Soó 1957; Passarge 1957a, 1959a, 1964a; Freitag i in. 1958; Sukopp 1959/60; Jeschke 1959; Tüxen 1962, 1974; Müller-Stoll i Neubauer 1965; Philippi 1969; Weber-Oldecop 1970, 1971; Hilbig 1971a; Tüxen i Dierschke 1974a). Na podstawie danych badaczy skandynawskich (Lohammar 1940; Luther 1951; Almestrand i Lundh 1951; Uotila 1971) można sądzić, że zespół ten jest nierzadki w południowej Szwecji i Finlandii, chociaż znajduje się tu północna granica jego zasięgu.

Spirodelo-Lemnetum minoris Th. Müller i Görs 1960 — zespół rzęs i spirodeli wielokorzeniowej (tab. 8)

Należy do najczęściej spotykanych zbiorowisk limnopleustonowych w badanych lejkach krasowych. Występuje w wodach o różnej głębokości, a w skrajnych przypadkach był nawet obserwowany na mokrym podłożu stałym. Podobnie jak i inne zbiorowiska rzęs, występuje w małych zbiornikach wodnych, zwykle dość silnie ocienionych nadbrzeżnymi zaroślami wierzbowymi i drzewami lub pod osłoną dużych bylin ze zbiorowisk szuwarowych i wysokoturzycowych. W wielu małych lejkach fitocenozy zespołu pokrywają całą swobodną powierzchnię wody.

Odczyn wody jest kwaśny i waha się w granicach pH 5,5-6,7. Dno pokryte jest zazwyczaj grubą warstwą osadów organicznych. Zespół odznacza się niewielkimi wymaganiami ekologicznymi i rozwija się w różnych warunkach środowiska wodnego. Największy wpływ na jego wykształcenie się, podobnie

jak i w przypadku innych zbiorowisk pleustonowych, ma temperatura wody (Weber-Oldecop 1970/71).

Fitocenozy zespołu mają typową, wielokrotnie już opisywaną, 2-3-warstwową strukturę (Koch 1954; Passarge 1957a; Miyawaki i J. Tüxen 1960; Krausch 1964a; Horst i in. 1966). W badanym terenie można wyróżnić dwie facje zespołu: z *Lemna minor* i ze *Spirodela polyrrhiza*.

Facja z *Lemna minor* rozwija się zwykle w miejscach mniej zacienionych, a często zupełnie wolnych od zacienienia. W niektórych płatach dominuje *Lemna minor*, pokrywając zwartym kożuchem całe lustro wody.

Facja ze *Spirodela polyrrhiza* tworzy płaty, w których panuje *Spirodela polyrrhiza* z niewielką domieszką *Lemna minor* i *Hydrocharis morsus-ranae* w warstwie nawodnej, oraz *Lemna trisulca* w warstwie podwodnej.

W Polsce *Spirodela-Lemna minoris* należy do pospolitych i było wielokrotnie już opisywane w literaturze fitosocjologicznej (Kępczyński 1965; Tomaszewicz 1969a, 1977a; Hereźniak 1972; Krzywański 1974). Wołek (1974) uważa za tożsame z niniejszym zespołem opisywane u nas zbiorowisko *Lemna minor-Lemna trisulca* R. Tx. 1955 (Faliński 1966; Podbielkowski 1967, 1968, 1969; Piórecki 1975) i *Lemno-Spirodeletum* W. Koch 1954 (Krzywańska i Krzywański 1972). Struktura fitocenz oraz warunki ich występowania podane przez tych autorów są bardzo zbliżone do tych, jakie stwierdzone zostały w omawianym zespole w lejkach krasowych.

Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae Slavnič 1956 – zespół salwinii pływającej (tab. 8)

Należy do najrzadziej spotykanych zespołów roślinnych w lejkach krasowych. Wykształca się w silnie nagrzananej, dość głębokiej wodzie, w miejscach osłoniętych od wiatru wysokimi łanami trzciny pospolitej (*Phragmites australis*). Woda odznacza się znaczną zawartością wapnia i ma pH 7,5 (tab. 4, 5). Dno jest silnie muliste, z płytko zalegającymi złożami wapienia, z rzadka porośnięte przez *Chara aculeolata*.

Salvinio-Spirodeletum najczęściej występuje w południowej i południowo-wschodniej Europie (Timar 1954; Koch 1954; Slavnič 1956, Karpati 1963; Krausch 1965b). W Polsce należy do rzadkich zespołów roślinnych (Podbielkowski 1968; Kępczyński i Fabiszak 1972; Piórecki 1975). Pod względem struktury i składu florystycznego płaty zespołu z lejków krasowych wykazują daleko idące podobieństwo do fitocenz zespołu opisanych przez wyżej wymienionych autorów.

4.2.2. HYDROCHARITETALIA

Stanowisko systematyczne rzędu *Hydrocharitetalia* jest do tej pory nieustalone i wzbudza najwięcej kontrowersji (den Hartog i Segal 1964;

Oberdorfer i in. 1967; Segal 1968; Krzywański 1969; Polakowski i Dziedzic 1972; Podbielkowski i Tomaszewicz 1974).

Przyjęte w tej pracy stanowisko jest powrotem do starej koncepcji Rübla (1933), uwzględniającej szczególną pozycję tych zbiorowisk. Należą tu bowiem zbiorowiska roślin wodnych niezakorzenionych, ale o wyższej organizacji fitocenozy niż w przypadku zbiorowisk z rzędu *Lemnetalia*. Płaty tych zbiorowisk nie ulegają łatwemu przemieszczaniu pod wpływem wiatru i falowania wody, wykazują tendencje rozwojowe w kierunku innych zbiorowisk wodnych i szuwarowych oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do ładowania zbiorników wodnych dzięki wielkiej produkcji masy roślinnej.

Lemno-Utricularietum vulgaris Soó (1928) 1938 – zespół pływacza pospolitego (tab. 9)

Pomimo, że pływacz pospolity (*Utricularia vulgaris*) należy do pospolitych roślin wodnych w okolicach Staszowa (Ochyra 1979), to budowany przez niego zespół należy do dość rzadko spotykanych tu zbiorowisk roślinnych. Typowo wykształcone płaty tego zespołu zostały stwierdzone w kilku małych, położonych wśród lasów jeziorach krasowych.

Zbiorniki te są z reguły płytkie, silnie zamulone i zwykle pozbawione innych zbiorowisk roślinności wodnej. Jako zbiorowiska kontaktowe, rozwijające się przy brzegach jezior, występują fitocenozy *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*, *Phragmitetum*, *Typhetum latifoliae* i *Scirpetum lacustris*. Tendencje rozwojowe w kierunku zbiorowisk roślin wodnych zakorzenionych (*Potamogetonalia*) zaznaczają się w badanym terenie bardzo słabo, o czym świadczy niewielki udział gatunków z tego rzędu w poszczególnych fitocenozach zespołu.

Płaty *Lemno-Utricularietum* wykazują budowę dwuwarstwową, przy czym warstwa podwodna ma największy udział w produkcji masy roślinnej. Tworzą ją głównie ceratophyllidy (*Utricularia vulgaris*) i ricciellidy (*Lemna trisulca*, *Riccia fluitans*). Warstwa nawodna jest słabiej rozwinięta i w jej skład wchodzi głównie lemneidy i hydrocharidy (*Lemna minor*, *Spirodela polyrrhiza*, *Hydrocharis morsus-ranae*).

Jak dotychczas, omawiany zespół był podawany z Polski bardzo rzadko (Krzywański 1974; Piórecki 1975; Tomaszewicz 1977a). Sądząc jednak po ogólnym rozmieszczeniu *Utricularia vulgaris* w Polsce (Żukowski 1974), należy się spodziewać, że omawiany zespół znajdzie się również w innych regionach kraju.

Ogólny zasięg geograficzny zespołu jest bardzo duży. Szczególnie często jest on podawany z Węgier (Soó 1957; Timar 1954; Karpati 1963) i z Rumunii (Nedelcu 1967a). Z RFN i NRD podają go Carstensen (1955), Görs (1968), Philippi (1969), Hilbig (1971a) oraz Hilbig i Reichhoff (1974).

Utricularietum australis nie było dotychczas podawane z obszaru Polski, chociaż jedno zdjęcie fitosocjologiczne podane przez Krzywańskiego (1974) w tabeli *Lemno-Utricularietum* bez wątpienia reprezentuje ten zespół.

W badanym terenie wykształca się w dołach potorfowych na torfowiskach przejściowych w Pocięszce i Czajkowie. Woda w tych zbiornikach jest płytka (30-40 cm), ma odczyn kwaśny (pH 5,5-6,0) i jest uboga w związki mineralne. Dno jest pokryte grubą warstwą torfiastego mułu. Ponieważ są to zbiorniki nie osłonięte, ich woda ulega silnemu nagrzewaniu w okresie letnim.

Fitocenozy te mają wyraźną dwuwarstwową strukturę. Warstwę podwodną tworzy głównie *Utricularia australis* (= *U. neglecta*). Rzadko towarzyszą temu gatunkowi *Lemna trisulca* i *Sphagnum cuspidatum*. Warstwa nawodna utworzona jest przez wolnopływające *Lemna minor* i *Hydrocharis morsus-ranae* oraz zakorzeniony *Potamogeton natans*. Obecność gatunków minerotroficzných (*Carex limosa*, *Menyanthes trifoliata*, *Potentilla palustris*, *Sphagnum obtusum*, *S. cuspidatum*) nasuwa przypuszczenie o bardzo prawdopodobnym kierunku sukcesji tego zespołu do zbiorowisk ze związku *Rhynchosporo-Sphagnion*.

Dotychczas *Utricularietum australis* było znane tylko z Niemiec (Müller i Görs 1960, Hilbig 1971a).

4.2.3. ZBIOROWISKA RAMIENIC (*CHARETALIA*)

Typowo wykształcone łąki ramienic zostały stwierdzone zaledwie w kilku małych lejkach krasowych, w wodzie płytkiej i średnio głębokiej (do 140 cm), gdzie w znacznym stopniu osłabiony jest proces sukcesji roślinności wodnej i szuwarowej.

W lejkach z wodą o większym pH i bardziej zasobnych w substancje pokarmowe (tab. 4, 5) panują *Chara aculeolata* i *Ch. rudis*. Gatunki te odznaczają się większymi wymaganiami troficznymi. Dane te potwierdzają stosunki panujące w jeziorach pochodzenia krasowego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (Karczmarz i Malicki 1972).

W płytkich lejkach krasowych położonych wśród pól i lasów sosnowych, gdzie warstwy wapieni zalegają pod grubą warstwą piasków i torfu, a duże ilości cząstek rozproszonych w wodzie zmniejszają jej przezroczystość nawet na głębokości 100-140 cm, występują *Chara vulgaris*, *Ch. delicatula* i *Ch. fragilis*. Twardość ogólna wody i jej pH mają tu małe wartości. Podobne stosunki stwierdzili wcześniej również Stroede (1933) i Olsen (1944).

Charetum aculeolatae (Corillion 1957) Dąbska 1966 – zespół ramienicy kolczastej (tab. 10)

Podwodne łąki ramienic z dominacją *Chara aculeolata* zostały stwierdzone w dwóch niewielkich lejkach krasowych położonych na północny wschód od Żabiej Wólki. Rozwijają się one na głębokości 80-150 cm, na dnie

CHARETUM ACULEOLATAE (Corillion 1957) Dąbska 1966

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	Stalność (constancy)	Wskaźnik pokrycia (index of coverage)
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	250	251	253	254	252		
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	1	1	2	2	2		
Data (date)	8.7 1974	8.7 1974	8.7 1974	8.7 1974	8.7 1974		
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	12	8	10	15	8		
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .	95	100	100	90	100		
Głębokość wody (depth of water) cm	100	120	80	100	100		
pH wody (pH of water)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
Liczba gatunków (total number of species) . .	11	10	9	6	9		
I. Ch. Charetum aculeolatae:							
Chara aculeolata	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	100 V	8250
II. Ch. Charetalia:							
Chara fragilis	+	+	.	1.1	.	60 III	104
III. Ch. Potamogetonetea:							
Potamogeton natans	1.1	+	1.1	.	+	80 IV	204
Potamogeton compressus	.	+	.	+	.	60 III	6
Nymphaea alba	.	.	+	+	+	60 III	6
Elodea canadensis	.	.	+	+	.	40 II	4
Myriophyllum spicatum	.	.	.	.	+	40 II	4
Nuphar luteum	+	+	.	.	.	40 II	4
IV. Inne (other spp.):							
Lemna minor	+	+	+	.	2.2	80 IV	356
Typha latifolia	+	.	+	.	.	60 III	6
Carex rostrata	+	+	.	+	.	60 III	6
Alisma plantago-aquatica	+	.	+	+	+	60 III	6
Phragmites australis	.	+	.	.	+	40 II	4
Salvinia natans	+	.	.	.	.	20 I	2
Lemna trisulca	.	+	.	.	.	20 I	2
Utricularia australis	.	.	+	.	.	20 I	2
Sagittaria sagittifolia	.	.	+	.	.	20 I	2

mulistym lub gytii jeziornej, która tworzy się w wyniku obumierania plech *Chara aculeolata*. Woda jest czysta i przezroczysta, bogata w węglan wapnia (tab. 5). Zaznacza się tu wyraźnie wpływ płytko zalegających wapieni litotamionowych. Plechy ramienicy są bardzo silnie inkrustowane węglanem wapnia. Warunki hydrochemiczne, w których rozwija się *Ch. aculeolata* są bardzo podobne do tych jakie stwierdzili wcześniej Stroede (1931) w Niemczech i Olsen (1944) w Danii.

Omawiany zespół jest bardzo ubogi pod względem florystycznym. W sukcesyjnym rozwoju roślinności wodnej *Charetum aculeolatae* jest zastępowane w lejkach przez *Phragmitetum*.

Zespół po raz pierwszy opisał Corillion (1957) pod nazwą *Magnocharetum aculeolatae*. Z Polski został on podany z okolic Poznania i Augustowa (Dąbska 1966), Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Fijałkowski 1959; Karczmarz i Malicki 1972), okolic Mikołajek (Polakowski i in. 1973) oraz z Borów Tucholskich (Boiński i in. 1974).

Charetum rudis Dąbska 1966 – zespół ramienicy grubej (tab. 11)

Fitocenozy *Charetum rudis* zostały stwierdzone tylko w jednym jeziorze krasowym, zwanym „Rozlane”, położonym wśród lasów mieszanych. Rozwijają

Klasa (Class): Potamogetonetea
Rząd (Order): Charettalia
Związek (Alliance): Charion fra

A. CHARETUM RUDIS Dąbska 1966

[illegible]

się one na silnie mulistym dnie, w wodzie czystej i przezroczystej, na głębokości 90-140 cm. Woda ma odczyn lekko kwaśny i odznacza się dużą zawartością wapnia i chlorków (tab. 5).

Płaty zespołu porastają prawie całe dno i osiągają z reguły pokrycie 100%. Ich struktura jest przeważnie jednowarstwowa. Jest to zespół trwały dzięki obecności gatunków wieloletnich. *Chara rudis* osiąga znaczne rozmiary, przez co miąższość warstwy ramienic może dochodzić do 70 cm. Jest to jedyny gatunek charakterystyczny i dominujący zespołu.

Pomiędzy poszczególnymi płatami widoczne są różnice florystyczne, będące podstawą wyróżnienia dwóch wariantów. Płaty wariantu typowego są silnie zubożałe florystycznie i mają charakter synuzjalny. Poza *Ch. rudis* brak jest innych gatunków. Dąbbska (1966) zalicza ten wariant do zubożalszej postaci zespołu. Wariant z *Chara fragilis* jest nieco bogatszy. Jego płaty rozwijają się w miejscach nieco płytszych (90-100 cm), gdzie obok *Ch. rudis* i *Ch. fragilis* występuje jeszcze nielicznie *Ch. delicatula*, a z roślin naczyniowych *Elodea canadensis*, *Myriophyllum verticillatum* i *Potamogeton natans*.

Obserwowane fitocenozy *Charetum rudis* wykazują tendencje rozwojowe z jednej strony w kierunku zbiorowisk ze związków *Potamogetonion* i *Nymphaeion*, z drugiej zaś w kierunku zbiorowisk szuwarowych ze związku *Phragmition*.

Charetum rudis należy do rzadkich zespołów ramienic. Często spotykane jest w dużych jeziorach północnej Polski, rzadziej w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie (Dąbbska 1966; Karczmarsz i Malicki 1972; Michna 1976). Poza Polską zespół dotychczas nie został stwierdzony.

Charetum vulgaris Corillion 1957 – zespół ramienicy zwyczajnej (tab. 11)

Jest to często spotykany zespół ramienic w badanym terenie. Jego fitocenozy wykształcają się przeważnie na dnie silnie bagnistym lub mulistym, torfiasto-piaszczystym lub piaszczysto-mulistym. Pełny rozwój osiągają przy dużym dopływie światła i w płytkiej wodzie (30-60 cm). W zbiornikach tych wyraźnie zaznaczają się procesy gnilne, o czym świadczy intensywny zapach siarkowodoru w okresie jesiennym. Dowodem pogarszania się stosunków troficznych zbiorników, w których wykształcają się fitocenozy *Charetum vulgaris*, jest zwiększenie się udziału acidofilnej *Chara delicatula* (Karczmarsz 1973).

Charetum vulgaris wyraźnie różni się od innych zbiorowisk ramienic. Dąbbska (1966) postuluje nawet zaliczenie go do osobnego związku *Charion vulgaris*. Jego fitocenozy mają zwykle dwu- lub trójwarstwową strukturę, przy czym znaczne wartości osiąga nie tylko pokrycie dna (60-100%), ale również pokrycie w warstwie nadwodnej (do 40%).

W badanym terenie płaty zespołu budują trzy gatunki ramienic, z których często *Ch. delicatula* osiąga dużą wartość pokrycia i jest dobrym wskaźnikiem

oligotrofizacji zbiornika (Karczmarz 1973). W porównaniu z innymi zespołami ramienic, w *Charetum vulgaris* zaznacza się większy udział roślin naczyniowych.

Charetum vulgaris jest zespołem bardzo pospolitym w Polsce. Najczęściej występuje w stawach, rowach i torfiankach (Dąmbaska 1966; Podbielkowski 1967, 1968; Popiołek 1971; Karczmarz i Malicki 1972). Spoza Polski znany jest z Francji (Corillion 1957), RFN (Krause 1969), Rumunii (Ionescu-Tuculescu 1967, 1968).

4.2.4. ZBIOROWISKA ROŚLIN NACZYNIOWYCH ZAKORZENIONYCH NA DNIE (*POTAMOGETONETALIA*)

Zbiorowiska roślinne z rzędu *Potamogetonetalia* rzadko występują w badanym terenie, nie znajdując dostatecznie dogodnych warunków do swego rozwoju. Z tego też powodu nie odgrywają na ogół większej roli w spłycaniu i zarastaniu jezior krasowych.

W niniejszej pracy przyjęto nową koncepcję syntaksonomiczną fitocenoz *Myriophyllo-Nupharetum* według Tomaszewicza (1977b).

Zbiorowisko *Potamogeton alpinus* — zbiorowisko rdestnicy alpejskiej (tab. 12)

Stosunkowo rzadko w płytkich wodach, na silnie mulistym dnie, występują podwodne łąny rdestnicy alpejskiej (*Potamogeton alpinus*). Towarzyszą jej często inne gatunki rdestnic (*P. pectinatus*, *P. pusillus*, *P. compressus*) oraz moczarka kanadyjska (*Elodea canadensis*). Warstwę nadwodną tworzą nympheidy, głównie *Potamogeton natans*, *Nymphaea alba*, *Polygonum amphibium* for. *natans*. Rośliny szuwarowe, np. *Sagittaria sagittifolia*, *Sparganium erectum*, *Oenanthe aquatica*, *Alisma plantago-aquatica* występują tylko sporadycznie.

W obrębie zbiorowiska z *Potamogeton alpinus* można wyróżnić, obok facji typowej, fację z *Eleocharis acicularis* for. *inundata*, która tworzy zwarte łąki porastające całe dno. W przypadku znacznego obniżenia się poziomu wody lub jej zupełnego wyschnięcia łąki przekształcają się w zbiorowisko z *Eleocharis acicularis*, nawiązujące do zespołu *Litorello-Eleocharitetum acicularis* Malc. 1929 (por. 4.2.6.).

Pod względem fizjonomicznym opisywane zbiorowisko bardzo przypomina szeroko rozpowszechniony na niżu zespół *Potamogetonetus lucentis*. Związany jest on jednak z żyznymi wodami, podczas gdy zbiorowisko z *Potamogeton alpinus* występuje raczej w wodach ubogich. Bardzo podobne zbiorowisko opisał Podbielkowski (1967) z rowów melioracyjnych na torfowiskach w okolicach Warszawy. Analogiczne zbiorowisko podano również z południowej Finlandii (Vaarama 1938) oraz z południowych terenów NRD (Hilbig 1971a).

Klasa (Class): Potamogetonetea
 Rząd (Order): Potamogetonalia
 Związek (Alliance): Potamogetonion

Tabela 12
 Table 12

A. Zbiornik (Community) POTAMOGETON ALPINUS

B. ELODEETUM CANADENSIS Pignatti 1953

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Stażół (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)	Stażół (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	260	12	46	262	263	264	52	132	11	108	45				
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	8	176	54	8	7	7	55	51	176	158	54				
Data (date)	26.7 19.7 1973	22.7 1973	26.7 1973	26.7 1974	26.7 1974	26.7 1974	23.7 1973	12.8 1973	11.7 1973	10.8 1973	22.7 1973				
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	40	30	20	30	40	30	40	20	50	35	40				
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .	90	90	90	80	85	100	65	90	80	60	100				
Głębokość wody (depth of water) cm	60	50	70	60	100	80	80	60	50	35	40				
pH wody (pH of water)	6,5	5,5	6,5	7,0	7,0	7,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,5				
Liczba gatunków (total number of species) . .	9	7	6	8	10	14	12	8	9	12	8				
Zespół (association)	A											B			
I. Ch. Potamogetonion:	Potamogeton alpinus	4.4	5.5	5.5	4.4	5.5	3.3	4.4	5.5	3.3	5.4	100 V	7917	100 V	6550
	Elodea canadensis	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	33 II	85	33 II	85
	Potamogeton pectinatus	1.2	1.1	1.1	2.2	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	67 IV	268	67 IV	268
	Potamogeton pusillus	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	50 III	667	50 III	667
	Nyriophyllum verticillatum	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	20 I	1	20 I	1
II. Ch. Potamogetonetea:	Potamogeton lucens	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	80 IV	400	80 IV	400
	Ranunculus aquatilis	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	60 III	6	60 III	6
	Potamogeton natans	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	40 II	200	40 II	200
	Nymphaea alba	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	20 I	100	20 I	100
	Hottonia palustris	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	33 II	3	33 II	3
III. Inne (other spp.):	Polygonum amphibium for. natans	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	17 I	1	17 I	1
	Sagittaria sagittifolia	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	83 V	253	83 V	253
	Ceratophyllum demersum	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	33 II	3	33 II	3
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	17 I	1	17 I	1
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	83 V	253	83 V	253
IV. Inne (other spp.):	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	33 II	3	33 II	3
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	17 I	1	17 I	1
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	83 V	253	83 V	253
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	33 II	3	33 II	3
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	17 I	1	17 I	1
V. Inne (other spp.):	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	83 V	253	83 V	253
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	33 II	3	33 II	3
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	17 I	1	17 I	1
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	83 V	253	83 V	253
	Sparganium angustifolium	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	33 II	3	33 II	3

Gatunki sporadyczne (sporadic species): I. Potamogeton compressus 3; 1.1; Ranunculus circinatus 7; 1.1; Nyriophyllum spicatum 8; II. Chara fragilis 8; 2; Fontinalis antipyretica 10; 1.2; Nuphar luteum 7; III. Elodea palustris 1; Glycyrrhiza maxima 4; Sparganium angustifolium 5, 10; Agrostis gigantea 5; Thragis australis 6; Schoenoplectus lacustris 6; Calligonum giganteum 6; Calligonum fluitans 6; Drepanocladus fluitans 6; Lemna trisulca 9; 1.2; Spirodela polyrrhiza 7; Sparganium angustifolium ssp. neglectum 11.

Typowe fitocenozy tego zespołu zostały stwierdzone tylko w jednym lejku krasowym. Rozwijają się one w bezpośrednim kontakcie z *Charetum rudis*, w wodzie o głębokości około 150 cm; dno jest silnie muliste. Płaty zespołu są mało zwarte, a ich struktura jest przeważnie dwuwarstwowa.

Myriophylletum verticillati jest typowym zespołem wód eutroficznych. Znane jest z rozproszonych stanowisk z całego kraju (Tomaszewicz 1977b).

Myriophylletum spicati Soó 1927 – zespół wywłócznika kłosowego (tab. 13)

Występuje w kilku dużych i głębokich jeziorach krasowych, rozwija się zwykle w wodzie słabo przejrzystej, o głębokości 150-250 cm, na dnie wysielonym namulami jeziornymi. Woda ma odczyn kwaśny i typowe właściwości dystroficzne.

Zespół reprezentują najczęściej jedno- lub dwuwarstwowe, facjalnie wykształcone płaty roślinności zanurzonej, w których dominują *Myriophyllum spicatum* i mech wodny *Fontinalis antipyretica*. Znamienny jest dość liczny udział gatunków minerotroficznych ze związku *Sphagno-Utricularion*. Ich obecność zdaje się przemawiać za bardzo prawdopodobnym kierunkiem rozwoju w stronę zbiorowisk wód dystroficznych z klasy *Utricularietea intermedio-minoris*.

W badanym terenie zespół zróżnicowany jest na dwa warianty. Wariant typowy cechuje się masowym występowaniem *Myriophyllum spicatum* oraz dość liczным udziałem *Nuphar luteum*, *Myriophyllum verticillatum* i *Potamogeton natans*.

Wariant z *Fontinalis antipyretica* wyróżnia się przede wszystkim masowym występowaniem wodnych mchów: *Fontinalis antipyretica*, *Drepanocladus fluitans* oraz *Calliergonella cuspidata* for. *fluitans*.

Myriophylletum spicati było wielokrotnie opisywane w literaturze fitosocjologicznej, najczęściej jako wariant *Myriophyllo-Nupharetum* (Philippi 1969a; Tomaszewicz 1969a; Dziedzic i Asztemborski 1969; Hilbig 1971a; Popiołek 1971, 1973; Boiński i in. 1974). Wariant mszysty jak dotąd nie był opisywany.

Elodeetum canadensis (Pign. 1953) Pass. 1964 – zespół moczarki kanadyjskiej (tab. 12)

Płaty *Elodeetum canadensis* wykształcają się zwykle w płytkich, nieocienionych zbiornikach wodnych, na dnie mulistym lub bardzo bagnistym. W lecie woda silnie nagrzewa się i ma odczyn obojętny lub nawet lekko zasadowy. W poszczególnych fitocenozach dominuje *Elodea canadensis*, z gatunków towarzyszących większą stałość wykazują tylko gatunki pleustonowe. *Elodeetum canadensis* odgrywa dużą rolę w zarastaniu i wypłycaaniu zbiorników wodnych. *Elodea canadensis* jest bowiem gatunkiem bardzo ekspansywnym i szybko

Tabela 13

Związek (Alliance): Potamogetonion

Rzad (Order): Potamogetonalia

Związek (Alliance): Potamogetonion

A. MYRIOPHYLLETUM VERTICILLATI S&P 1927

B. MYRIOPHYLLETUM SPICATI SOŁ 1927

[illegible]

rozmnażającym się wegetatywnie, dzięki czemu utworzone przez nią fitocenozy wypierają wiele innych zbiorowisk roślin zanurzonych.

W Polsce jest to zespół pospolity, występujący w różnego typu zbiornikach wodnych (Kępczyński 1960; Dąmbaska 1965; Izdebska 1969; Popiołek 1971; Kępczyński i Ceynowa-Gieldon 1972; Dubiel 1973).

Ceratophylletum demersi Hild 1956 – zespół rogatka sztywnego (tab. 14)

Występuje w kilku dużych i głębokich jeziorach krasowych, odznacza się masowym występowaniem *Ceratophyllum demersum*, który tworzy rozległe podwodne łąki. Optymalne warunki rozwoju fitocenozy panują w miejscach, gdzie brak jest roślin o liściach pływających, głębokość wody wynosi 2,5-5,0 m, a dno pokryte jest grubą warstwą mułu bądź gytii jeziornej. W kilku miejscach natrafiono na płaty *Ceratophyllum demersi* jeszcze na głębokości 7 m.

Pod względem florystycznym jest to zespół bardzo ubogi. Stanowi on inicjalne stadium rozwoju roślinności wodnej w głębokich jeziorach krasowych. W miarę spływania się zbiorników wodnych jego fitocenozy przechodzą w płaty innych zbiorowisk ze związku *Potamogetonion*, zwłaszcza zaś w *Myriophylletum spicati*. W niektórych płytszych jeziorach *Ceratophylletum demersi* wchodzi w bezpośredni kontakt ze zbiorowiskami szuwarowymi ze związku *Phragmition*.

Nazwa *Ceratophylletum demersi* jako *nomen nudum* bardzo często pojawiała się w literaturze (Baumann 1911; Rübel 1933; Corillion 1957; den Hartog i Segal 1964; Segal 1965). Jednakże dopiero Hild (1964a, b) ujął omawiany zespół w formie tabel fitosocjologicznych. Należy on do dość częstych zespołów w Polsce, występujących w różnych typach zbiorników wodnych (Fijałkowski 1959; Dąmbaska 1961; Fijałkowski i Kozak 1970; Popiołek 1971; Kępczyński i Ceynowa-Gieldon 1972).

Nuphareto-Nymphaeetum albae Tomaszewicz 1977 – zespół grążela żółtego i grzybieni białych (tab. 14)

Spśród wszystkich zespołów z rzędu *Potamogetonetalia*, występujących w badanym terenie, *Nuphareto-Nymphaeetum albae* jest najuboższe pod względem florystycznym. W licznych jeziorach krasowych można spotkać dość często jednogatunkowe skupienia *Nuphar luteum*, rozwijające się w wodzie o głębokości 50-200 cm i kwaśnym odczynie. Podłoże w tych miejscach jest zwykle silnie muliste. W przypadku pogarszania się warunków troficznych w akwenach zespół ten wykazuje tendencje rozwojowe w kierunku *Sphagnetum cuspidati-obesii nupharetosum*. Zwykle w tych lejkach przy brzegach wykształcony jest pomost torfowcowy.

Silnie zubożałe fitocenozy *Nuphareto-Nymphaeetum albae* wielokrotnie opisywano z wód oligo- i dystroficznych (Passarge 1955; Eicke-Jenne 1960; van Donselaar 1961; Dąmbaska 1965; Kępczyński 1965; Sobotka

Klasa (Class): Potamogetonetea

Rząd (order): Potamogetonetalia

Związek (Alliance): Potamogetonion (A), Nymphaeion (B, C), Hottonion (D)

A. CERATOPHYLLITUM DEMERSI HILD 1956 B. NUPHARETO-NYMPHAEITUM ALBAE Tomaszewicz 1977

C. POTAMOGETONITUM MANANIS SOD 1927 D. HOTTONIETUM PALUSTRIS R. Ex. 1937

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	Stażość (constancy)	% pokrycia (Index of coverage)	A					B					C					D				
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5			100 V 8750	1.1 100	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	12	11	175	177	13																						
Date (date)	24.8	11.8	4.8	4.8	11.8			1974	1974	1974	1974	16.8	23.7	24.7	23.7	16.8	4.8	10.8	6.8	8.8	9.8	1974	1974	1974	1974	1974	1974
Powierzchnia zdj. (area of sample plot) m ²	40	40	25	60	40																						
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .	90	100	100	100	90																						
Głębokość wody (depth of water) cm	250	300	450	450	300																						
pH wody (pH of water)	6.2	6.2	6.0	6.0	6.5																						
Liczba gatunków (total number of species) . .	6	3	3	5	4																						
Zespół (association)	A							B					C					D									
I. Ch. Potamogetonion:	5.5 5.5 5.5 5.5 5.5							100 V 8750					1.1 100					1.1 1.1									
Ceratophyllum demersum	1.1	+	+	+	+			60 III 104					20 I 2					1.1	2.2	2.1	2.1	2.1					
Najas	+	+	+	+	+			20 I 2					20 I 2					2.2	2.2	2.1	2.1	2.1					
Elodea canadensis	+	+	+	+	+			20 I 2					20 I 2					2.2	2.2	2.1	2.1	2.1					
II. Ch. Nymphaeion (+), Potamogetonetea:	1.1							20 I 100					20 I 100					5.5 5.5 4.4	4.4	4.4	4.4	4.4					
+Potamogeton natans													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas													20 I 2					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
+Najas																											

1967; Görs 1968; Tomaszewicz 1969b; Hereźniak 1972, Lang 1973; Boinński i in. 1974; Popiołek 1974). Natomiast typowo wykształcone płaty tego zespołu są pospolite w wodach eutroficznych w całej Polsce (Tomaszewicz 1977b).

Potamogetonetus natantis Soó 1927 – zespół rdestnicy pływającej (tab. 14)

Fitocenozy *Potamogetonetus natantis* są szeroko rozpowszechnione w wodach lejków krasowych. Są przeważnie dwuwarstwowe, mniej lub bardziej zwarte, zbudowane głównie przez gatunek charakterystyczny zespołu. Udział innych gatunków roślin o liściach pływających i zanurzonych z klasy *Potamogetonetea* jest raczej niewielki. Rozwijają się najczęściej w miejscach osłoniętych, w małym stopniu narażonych na falowanie, na podłożu zwykle silnie mulistym lub bagnistym. Woda ma przeważnie 100-200 cm głębokości. W układzie strefowym graniczy bezpośrednio ze zbiorowiskami szuwarowymi, zwłaszcza z *Typhetum latifoliae*.

W Polsce *Potamogetonetus natantis* należy do stosunkowo częstych zespołów wodnych (Solińska 1963; Dąmbaska 1965; Sobotka 1967; Tomaszewicz 1969a, b; Kępczyński i Ceynowa-Gieldon 1972; Ceynowa-Gieldon i in. 1972; Dubiel 1973; Krzywański 1974). Wydaje się na podstawie danych z literatury, że jest to zespół częsty w całej Europie (Müller i Görs 1960; Knapp i Stoffers 1962; Rodi 1963; Krausch 1964; Nedelcu 1967a, b; Görs 1968; Tüxen i Dierschke 1974b).

Hottonietum palustris R. Tx. 1937 – zespół okrzężnicy bagiennej (tab. 14)

Zespół ten został stwierdzony tylko w trzech lejkach krasowych, chociaż sama *Hottonia palustris* jest dość częsta w okolicach Staszowa (Ochyra 1979). Na wszystkich stanowiskach zajmuje niewielką powierzchnię i odgrywa małą rolę w procesie zarastania. W typowej postaci (tab. 14, zdj. 12, 13) występuje w wodzie płytkiej, o odczynie obojętnym. Zupełnie inną postać ma *Hottonietum palustris* w lejku krasowym nr 149 (tab. 14, zdj. 14, 15), w zbiorniku głębokim, z wodą o odczynie kwaśnym, gdzie tworzy kilkumetrowej szerokości pas wokół wyspy torfowcowej. Znamionym rysem jest liczny udział gatunków ze związku *Sphagno-Utricularion*.

Hottonietum palustris jest rozpowszechnione w całej niżowej Polsce (Kępczyński 1960, 1965; Faliński 1966; Podbielkowski 1967; Izdebska 1969; Urbanek 1969; Kraska 1971; Krzywańska i Krzywański 1972; Dubiel 1973; Krzywański 1974). Spoza Polski znane jest z całej niżowej Europy zachodniej (Tüxen 1937; Lebrun i in. 1949; Passarge 1957b, 1959a, 1964a; Gehu 1961; Konczak 1968).

Zbiorowiska roślinne wód dystroficznych należą do bardzo słabo zbadanych, pomimo że wyraźnie odróżniają się od innych zbiorowisk roślinności wodnej, zarówno składem florystycznym, jak i wymaganiami ekologicznymi. Odznaczają się ubóstwem florystycznym. Dominują w nich rośliny nie zakorzenione, biernie unoszone w wodzie, głównie *Utricularia minor* i *U. intermedia*. Podstawową masę roślinności tworzą jednak mchy wodne: *Sphagnum cuspidatum*, *S. obtusum*, *Drepanocladus fluitans*, *Calliergonella cuspidata*, *Calliergon giganteum*. Optimum występowania osiągają w dystroficznych zbiornikach wodnych, takich jak doły potorfowe, małe bezodpływowe jeziora, zabagnione starorzecza i zagłębienia z wodą na torfowiskach wysokich i przejściowych.

W staszowskim obszarze krasowym zbiorowiska pływaczy należą do stosunkowo często spotykanych. Występują przeważnie w większych lub mniejszych lejkach krasowych inicjując ich zarastanie. Spełniają one zatem w wodach dystroficznych rolę analogiczną do tej, jaka w wodach eutroficznych przypada zbiorowiskom z klasy *Potamogetonetea*. Niektóre z nich, zwłaszcza te, w których dominują mchy wodne, produkują znaczne ilości masy organicznej, przez co przyczyniają się do szybkiego spływania zajmowanych przez siebie zbiorników wodnych. W szeregu sukcesyjnym fitocenozy tej klasy są opanowywane przez mszyste zbiorowiska torfowisk przejściowych ze związku *Rhynchosporo-Sphagnion*, które tworzą silnie uginające się pło.

Pozycja syntaksonomiczna zbiorowisk wód dystroficznych była do niedawna nieustalona. Müller i Görs (1960) w swym znanym opracowaniu zbiorowisk roślinności wodnej zaliczyli je do związku *Sphagno-Utricularion*, który umieścili w klasie *Litorelletea*. Ujęcie to od razu nasunęło poważne wątpliwości (Müller-Stoll i Neubauer 1965), ponieważ florystyczne pokrewieństwo pomiędzy *Sphagno-Utricularion* i *Litorellion* jest niewielkie. Dlatego zupełnie słuszne jest stanowisko Pietscha (1963/64, 1977), który zaliczył te bardzo odrębne zbiorowiska do osobnej klasy *Utricularietea intermedio-minoris*.

Wyróżniona przez Pietscha (1963/64) klasa nie może być utożsamiana z klasą *Utricularietea* w ujęciu den Hartoga i Segala (1964), nic bowiem, poza formalnym podobieństwem nazw, nie łączy tych jednostek. Autorzy ci swój system zbiorowisk roślinności wodnej oparli na biologicznych formach i morfologicznych typach roślin wodnych. Z tego powodu ich klasa *Utricularietea* jest jednostką heterogeniczną, obejmującą zbiorowiska ceratophyllidów, tj. roślin wolnopływających, tworzących kwiatostany nad powierzchnią wody (*Ceratophyllum*, *Utricularia*), różniące się w sposób zasadniczy między sobą składem florystycznym, ekologią i dynamiką rozwojową.

Zbiorowiska roślinne wód dystroficznych należą w Polsce do bardzo słabo zbadanych, chociaż jak się zdaje, są częste w odpowiednich typach zbiorników wodnych. Szczególnie rozpowszechnione są na północy kraju, gdzie ich występowanie związane jest z dużymi kompleksami torfowisk przejściowych

i wysokich (Gams i Ruoff 1929; Reimers i Hueck 1929; Steffen 1931; Pacowski 1967; Sobotka 1967). W innych regionach też nie są rzadkie, szczególnie na Lubelszczyźnie (Fijałkowski 1959) i w środkowej Polsce (Podbielkowski 1960, 1967; Urbanek 1969). Zbiorowiska te wymagają dalszych, szczegółowych badań.

Sphagnetum cuspidato-obesi R. Tx. i v. Hübschm. 1958 — zespół torfowców wodnych (tab. 15)

Jest to często spotykany w badanym terenie zespół roślinny, którego płyty rozwijają się w wodach dystroficznych, zwykle w bezpośrednim sąsiedztwie płyta zbudowanego ze *Sphagnum recurvum* i roślin naczyniowych. Woda jest mało przejrzysta, o barwie żółtawej i dużej zawartości substancji humusowych. Ma poza tym silnie kwaśny odczyn i jest skrajnie uboga w związki mineralne (tab. 4, 5). Fitocenozy zespołu rozwijają się w wodzie o głębokości 30-200 cm. Podłoże w tych miejscach jest silnie muliste lub torfiaste.

Sphagnetum cuspidato-obesi inicjuje proces zarastania w akwenach dystroficznych. Najważniejszą rolę odgrywają w nim mchy wodne: *Sphagnum cuspidatum*, *S. obtusum* i *Drepanocladus fluitans*. Tworzą one niezbyt ruchliwe skupienia, pływające zwykle tuż pod powierzchnią wody albo, w przypadku większego zwarcia darni, wypiętrzające się nad lustro wody. Wypiętrzone nad powierzchnią wody darnie *Sphagnum cuspidatum* są zwykle opanowywane przez rośliny naczyniowe i mniej hydrofilne torfowce (zwłaszcza *S. recurvum*), dzięki czemu następuje szybka ekspansja pomostu torfowcowego w stronę swobodnego lustra wody.

Zespół cechuje duża produkcja masy roślinnej. Overbeck i Happach (1957) stwierdzili, że przyrost długości łodyżek u *Sphagnum cuspidatum* wynosi na wiosnę 1,22 mm dziennie, a późnym latem dochodzi do 2,36 mm na dzień. Pomimo tego, co zaobserwowano w badanym terenie, roślinność nie osiąga dużego zwarcia. Jest to wynikiem dynamicznej równowagi między obumierającymi a nowo tworzącymi się darniami, która ustala się na pewnym etapie zagęszczenia populacji *S. cuspidatum*.

W badanym terenie *Sphagnetum cuspidato-obesi* wykazuje zróżnicowanie florystyczne, które stało się podstawą do wyróżnienia w nim dwóch podzespółów i kilku wariantów.

a. *Sphagnetum cuspidato-obesi typicum* charakteryzuje się masowym występowaniem mchów wodnych (*Sphagnum cuspidatum*, *S. obtusum*, *Drepanocladus fluitans*). Z roślin naczyniowych najczęściej występuje *Utricularia minor*, osiągająca niekiedy duży stopień pokrycia.

Płyty tego podzespołu utworzone prawie wyłącznie przez wodne torfowce, zaliczone zostały do wariantu ze *Sphagnum cuspidatum*. Występują one najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie pomostów torfowcowych i w znacznym stopniu przyczyniają się do ich ekspansji.

Bardzo często pływające kożuchy *Sphagnum cuspidatum* przerośnięte są przez *Drepanocladus fluitans*. Skupienia takie zaliczono do odrębnego wariantu.

Występują one zwykle w głębokiej wodzie i wykazują mniejsze zwarcie darni. Dlatego też nie stanowią one tak dogodnego podłoża do ekspansji roślin naczyniowych i *S. recurvum*.

W obrębie *Sphagnetum cuspidato-obesi typicum* można wyróżnić w Europie dwie odmiany geograficzne: atlantycką i subkontynentalną. Pierwsza z nich odznacza się udziałem *Sphagnum obesum* (Jonas 1935; Schwickerath 1944; Grosser 1955; Tüxen 1958; Dierschke 1969). W odmianie subkontynentalnej brak jest *S. obesum*, często natomiast występuje wodny wątrobowiec *Cladopodiella fluitans* (Osvald 1923; Gams i Ruoff 1929; Kästner i Flössner 1933; Passarge 1964a; Sofron i Šandová 1972). Do niej odnoszą się wszystkie dotychczasowe dane z Polski (Fijałkowski 1959; Podbielkowski 1960, 1967; Pacowski 1967; Sobotka 1967; Urbanek 1969).

b. *Sphagnetum cuspidato-obesi nupharetosum* subass. nov. (= *Sphagnon-Nupharetum* Oberd. 1957). Zbiorowiska, w których dominują mszaki wodne i „lilie wodne”, występują bardzo rzadko w kilku dystroficznych lejkach krasowych. Budowa płatów jest dwuwarstwowa. Warstwę nawodną tworzą liście pływające *Nuphar luteum* i *Nymphaea candida*, którym niekiedy towarzyszą *Potamogeton natans* i *Polygonum amphibium* for. *natans*. Warstwę podwodną, nieraz wypiętrzającą się nad lustro wody, tworzą *Sphagnum cuspidatum*, *S. obtusum* i *Drepanocladus fluitans*. Fizjonomicznie fitocenozы omawianego podzespołu bardzo przypominają płaty *Nuphareto-Nymphaeetum albae* i dlatego błędnie zaliczano je do związku *Nymphaeion* (Oberdorfer 1957; Jasnowski 1967), związanego z wodami eutroficznymi.

Sphagnetum cuspidato-obesi nupharetosum nie różni się ekologicznie od podzespołu typowego. Poszczególne jego warianty odznaczające się dominacją *Nuphar luteum* i *Nymphaea candida*, rozwijają się z silnie zubożałych fitocenoz *Nuphareto-Nymphaeetum albae* w związku z pojawieniem się mchów wodnych.

Opisywane zbiorowisko należy do bardzo rzadkich. Dotychczas zostało podane tylko z Litwy (Reimres i Hueck 1929) i z południowych obszarów RFN (Oberdorfer 1957). Skład florystyczny, podany przez tych autorów, jest prawie identyczny z opisanym z okolic Staszowa. Z Polski dotychczas nie notowane. Tylko Krzaczek (1967) wspomina o zbiorowisku *Nuphar luteum* i *Sphagnum cuspidatum* var. *plumosum* w Kotlinie Sandomierskiej. Nie podaje jednak żadnych bliższych danych o jego składzie florystycznym i warunkach występowania.

Scorpidio-Utricularietum minoris (Ilschner 1959 mscr.) Th. Müller i Görs 1960 – zespół skorpionowca i pływacza drobnego (tab. 16)

Fitocenozы *Scorpidio-Utricularietum minoris* zostały zaobserwowane w dwóch lejkach krasowych. Rozwijają się one w strefie przybrzeżnej małych jeziorzek, w wodzie o głębokości 10-150 cm. Dno w tych miejscach jest silnie

bagniste lub torfiaste, a woda ma odczyn kwaśny i jest uboga w związki mineralne. W poszczególnych płatach dominuje *Scorpidium scorpioides*, pokrywające zwartym kobiercem całe dno. Towarzyszą mu najczęściej *Drepanocladus fluitans*, *Sphagnum obtusum*, *Calliergonella cuspidata* for. *fluitans* oraz *Utricularia minor*.

Klasa (Class): Utricularietea intermedio-minoris
Rząd (Order): Utricularietalia intermedio-minoris
Związek (Alliance): Scorpidio-Utricularion

Tabela 16
Table 16

SCORPIDIO-UTRICULARIETUM MINORIS (Ilsehn 1959 msoc.) Th. Müll. et Görs 1960

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	Stażość (constancy)	Wskaźnik pokrycia (index of coverage)
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	443	442	309	310	350		
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	90	90	90	90	51		
Data (date)	20.8 1975	20.8 1975	4.8 1974	4.8 1974	8.8 1974		
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	6	15	12	15	8		
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .	80	100	100	100	90		
Głębokość wody (depth of water) cm	130	120	60	40	10		
pH wody (pH of water)	6,0	6,0	6,5	6,5	5,5		
Liczba gatunków (total number of species) . .	4	3	7	7	7		
I. Ch. Scorpidio-Utricularietum:							
Scorpidium scorpioides	5.5	5.5	5.5	5.5	4.4	100	V 8250
II. Ch. Utricularietea intermedio-minoris:							
Utricularia minor	+	.	2.2	3.3	2.2	80	IV 1452
Drepanocladus fluitans	1.2	1.2	+2	+2	.	80	IV 204
Sparganium minimum	+	.	.	.	+	40	II 4
Sphagnum obtusum	.	.	1.2	.	.	20	I 100
Calliergonella cuspidata for. fluitans . .	.	.	1.2	.	.	20	I 100
Campylium stellatum	.	.	.	.	+	20	I 2
III. Inne (other spp.):							
Utricularia vulgaris	.	.	2.2	1.2	.	40	II 450
Potamogeton natans	.	.	+	+	.	40	II 350
Chara fragilis	.	.	2.2	.	.	40	I 4
Juncus bulbosus	.	.	.	.	1.1	20	I 100
Phragmites australis	.	.	.	+	.	20	I 2
Carex rostrata	.	.	.	+	.	20	I 2
Chara delicatula	.	.	.	.	+	20	I 2
Drepanocladus revolvens	.	.	.	.	+	20	I 2

Wskutek produkcji znacznej ilości masy roślinnej fitocenoza w poważnym stopniu przyczynia się do spływania zbiorników wodnych. W rozwoju sukcesyjnym opanowywana jest przez zbiorowiska szuwarowe, najczęściej *Phragmitetum*, względnie przez *Eriophoro-Sphagnetum* wariant z *Phragmites australis*.

Składem florystycznym, ekologią i dynamiką rozwojową zespół odpowiada opisom podanym przez innych autorów (Müller i Görs 1960; Jeschke 1963; Krausch 1968; Braun 1968, 1970; Görs 1969; Rybniček 1970, 1974; Lang 1973). Ogólny zasięg geograficzny zespołu jest słabo poznany. *Scorpidium scorpioides* należy do rzadkich gatunków mchów, reprezentujących we florze Holarktydy grupę reliktywów glacialnych (Szafran 1948; Kuc 1964). Wnosić z tego należy, że tworzony przez niego zespół ma również charakter reliktowy i nie należy do częstych w Europie zachodniej i środkowej.

Sparganietum minimi Schaaf 1925 — zespół jeżogłównki najmniejszej (tab. 17)

Sparganietum minimi występuje dość często w dystroficznych lejkach krasowych. Jego fitocenozy, zajmujące niekiedy duże powierzchnie, rozwijają

Klasa (Class): Utricularietes intermedio-minoris
 Rząd (order): Utricularietalia intermedio-minoris
 Związek (Alliance): Scorpidio-Utricularion

SPARGANIETUM MINIMI Schaaf 1925

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Stażek (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Nr zdj. w terenie (field number of record) . . .	356	360	348	440	343	439	342	363	306	331	353	352	8	80	1		
Numer lejka krassowego (number of karst sink-hole)	72	58	140	72	137	154	135	64	94	154	77	77	175	168	172		
Data (date)	8-8	8-8	7-8	18-8	17-8	17-8	8-8	8-8	6-8	6-8	8-8	8-8	18-8	25-7	17-7		
Powierzchnia sdcioła (area of sample plot) m ²	1974	1974	1974	1975	1974	1975	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1973	1973		
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . . .	25	20	20	9	15	15	12	15	20	20	20	20	10	20	100		
Głębokość wody (depth of water) cm	95	100	100	90	100	85	100	75	75	75	60	70	70	100	100		
pH wody (pH of water)	30	20	30	20	15	25	20	10	20	20	20	30	100	100	100		
Liczba gatunków (total number of species) . . .	5,0	5,5	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	6,0	6,8	6,5	6,5	6,0	6,2	6,5	6,5		
Wariant z (variant with)	6	5	5	5	7	3	6	12	12	16	11	10	11	10	7		
Nymphaea alba																	
I. Ch. Sparganietum minimi:																	
Sparganium minimum	+	1,1	+	1,1	+	2,1	+	3,3	3,3	4,4	3,3	3,2	2,2	3,3	5,5	93	V
II. Ch. Utricularietes intermedio-minoris:																	
Drepanocladus fluitans (incl. for. submersus)	5,5	5,5	5,5	4,4	5,5	4,4	5,5	+	1,1	1,1	+	2,2	1,2	+	+	73	IV
Utricularia minor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	33	II
Drepanocladus aduncus for. pseudofluitans . .	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	27	II
Utricularia intermedia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20	I
Calliergonella cuspidata for. fluitans	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20	I
Calliergon giganteum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20	I
Sparganium cuspidatum var. plumeum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20	I
III. Ch. Litorelletes:																	
Juncus bulbosus (incl. for. fluitans)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	47	III
Ranunculus flammula	+	+	+	+	+	+	+	2,1	+	+	+	+	+	+	+	13	I
IV. Inne (other spp.):																	
Lemna minor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	53	III
Cladophora fluitans	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	40	II
Alisma plantago-aquatica	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	33	II
Carax rostratus	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	27	II
Myriophyllum spicatum	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	23	II
Nymphaea alba	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7	I
Gatunki sporadyczne (sporadic species):																	
9; 1, 1, 10; Utricularia vulgaris 12; 2, 2, 13; Juncus articulatus 8; 1, 1, 11; Carex lasiocarpa 1; Lysimachia vulgaris 1; Carex gracilis 3; Spi-																	
lobum palustre 3; Callitriche ophocarpa 3, 12; Agrostis gigantea 5; Sontallaria galericulata 5; Carex vesicaria 5; 10; Juncus effusus 7;																	
Sparganium recurvum 7; Typha latifolia 8; Rumex maritimus 8; Potentilla palustris 9; 1, 1, 13; Veronica scutellata 9; 12; 1, 1; Rorippa fluitans 9;																	
Lemna trisulca 9; Sparganium emersum 10; Oenanthe aquatica 10; Calla palustris 10; Eleocharis palustris 11; 1, 1; Spirodela polyrrhiza 13; Dre-																	
panocladus exannulatus 12; Philonotis fontana 14, 15.																	

się na głębokości 10-110 cm, na podłożu torfiastym lub silnie mulistym. W płytkich lejkach krasowych woda niekiedy latem wysycha, wobec czego *Sparganium minimum* oraz inne gatunki wodne, a w szczególności mchy, tworzą formy lądowe.

Gatunkiem charakterystycznym i najczęściej dominującym w płatach zespołu jest *Sparganium minimum*, którego wąskie, jasnozielone liście pływające w wodzie nadają temu zbiorowisku charakterystyczny wygląd. Poza tym bardzo często występują inne gatunki charakterystyczne dla związku *Scorpidio-Utricularion*. Poszczególne fitocenozy zespołu różnią się florystycznie i ekologicznie, co stało się podstawą do wyróżnienia w jego obrębie trzech wariantów.

a. Wariant typowy odznacza się masowym występowaniem *Sparganium minimum*, któremu towarzyszą liczne gatunki ze związku *Scorpidio-Utricularion minoris*. Szczególnie licznie spośród nich występuje *Drepanocladus fluitans*. Na tej podstawie fitocenozy w których masowo występuje ten gatunek opisano tu jako osobny wariant *Sparganietum minimi*, traktując go jako stadium inicjalne zespołu. Bardzo podobny skład florystyczny dla tego zespołu podaje Pfeiffer (1951).

b. Wariant z *Drepanocladus fluitans* należy traktować jako inicjalne stadium zespołu. Występuje w płytkich lejkach krasowych, w wodzie o głębokości 15-30 cm. W lecie i na jesieni woda może zupełnie wyschnąć. Fitocenozy reprezentujące ten wariant odznaczają się dużym ubóstwem florystycznym. Dominuje w nich prawie wyłącznie *Drepanocladus fluitans*, któremu towarzyszy *Sparganium minimum*, nie osiągające jednak większego zwarcia. Udział innych gatunków jest znikomy; w szczególności brak gatunków z klasy *Potamogetonetea*.

Mszyste warianty *Sparganietum minimi* były dotąd kilkakrotnie opisywane w literaturze fitosocjologicznej. Sukopp (1959/60) podaje bardzo zbliżony florystycznie wariant z *Drepanocladus exannulatus* (być może zaszła tu pomyłka w oznaczeniu, gdyż *Drepanocladus exannulatus* i *D. fluitans* są bardzo zbliżone systematycznie, i w wodzie wytwarzają formy paralelne, które są często źródłem pomyłek przy oznaczaniu), Müller-Stoll i Neubauer (1965) – wariant z *Leptodictyum riparium*, a Kępczyński (1965) – wariant z *Calliergon giganteum*.

c. Wariant z *Nymphaea alba* został stwierdzony tylko w jednym jeziorze krasowym, gdzie zajmuje około 0,3 ha powierzchni. Optymalne warunki rozwoju znajduje on w wodzie o głębokości 80-110 cm. Fizjonomicznie fitocenozy te przypominają płaty *Nuphareto-Nymphaeetum albae*. Skłoniło to niektórych autorów (Koch 1926, Müller i Görs 1960; Hilbig 1971a) do zaliczenia analogicznych zbiorowisk do związku *Nymphaeion*. Dystroficzny charakter środowiska, brak gatunków charakterystycznych dla *Potamogetonetea* oraz masowe występowanie *Sparganium minimum* skłania raczej do zaliczenia tego zbiorowiska do klasy *Utricularietea intermedio-minoris*. Opisywany wariant wykazuje tendencje rozwojowe w kierunku *Phragmitetum* i *Typhetum latifoliae*.

Sparganietum minimi inicjuje zarastanie niewielkich, śródleśnych lejków krasowych. W sukcesyjnym rozwoju roślinności jest ono opanowywane najczęściej przez *Caricetum rostratae* lub *Caricetum vesicariae*.

Spśród wszystkich zespołów roślinnych wód dystroficznych zespół ten należy do najczęściej stwierdzanych (Fijałkowski 1959; Podbielkowski 1960; Kępczyński 1960, 1965; Urbanek 1969; Izdebska 1969; Hereźniak 1972; Kępczyński i Ceynowa-Giełdon 1972). Ogólny zasięg geograficzny zespołu należy do typu borealno-subatlantyckiego. Na całym obszarze swego występowania fitocenozy *Sparganietum minimi* wykazują podobny skład florystyczny, ekologię i dynamikę rozwojową (Tüxen 1937; Vollmar 1947; Jeschke 1963; Pietsch 1963; Krausch 1968; Slavik 1969; Philippi 1969).

4.2.6. ZBIOROWISKA ROŚLINNE WÓD MNIEJ LUB BARDZIEJ OLIGOTROFICZNYCH (LITORELLETEA) – FRAGMENTY

W okolicach Staszowa stwierdzono fragmenty zbiorowisk wód oligotroficznych, które opisane zostały jako zbiorowisko z *Eleocharis acicularis* i zbiorowisko z *Juncus bulbosus*. Typowo wykształcone zbiorowiska z klasy *Littorelletea* nie występują w badanym terenie.

Zbiorowisko z *Eleocharis acicularis* – zbiorowisko ponikła igłowatego (tab. 18)

W jednym z płytkich lejków krasowych w Maleńcu występują na znacznej powierzchni masowe skupienia *Eleocharis acicularis*. Porastają one okresowo zalewane, piaszczysto-muliste dno, o odczynie zbliżonym do obojętnego. *Eleocharis acicularis* tworzy zwarte łany, a jego igielkowate łodyżki nadają zbiorowisku osobliwy wygląd (ryc. 6). Jest to zbiorowisko trwałe, utrzymujące się po zalaniu wodą. W głębszej wodzie *Eleocharis acicularis* wytwarza modyfikację siedliskową – formę *fluitans* (Doll.) Svenson – o wydłużonych łodyżkach, z wierzchołkami pływającymi po powierzchni wody i bardzo rzadko kwitnącą. Natomiast w wodzie bardzo głębokiej (powyżej 100 cm) ten sam gatunek wytwarza jeszcze inną modyfikację – formę *inundata* Svenson. Należą tu rośliny płone, całkowicie zanurzone w wodzie. Okresowe wysychanie wody umożliwia generatywne rozmnażanie i rozsiewanie się owoców *Eleocharis acicularis*.

Z gatunków charakterystycznych klasy *Littorelletea* poza *Eleocharis acicularis*, występują tylko *Juncus bulbosus* i *Ranunculus flammula*. Znamiennym rysem jest udział licznych gatunków ze związku *Eleocharis-Sagittarion*, zwłaszcza zaś *Sagittaria sagittifolia* i *Sparganium emersum*.

Opisywane zbiorowisko swym składem florystycznym i warunkami występowania przypomina wielokrotnie opisywane przez zachodnioeuropejskich fitosocjologów zespoły *Littorello-Eleocharitetum acicularis* Malc. 1929 (Oberdorfer 1957; Pietsch 1963, 1968; Lang 1967) i *Eleocharitetum acicularis* W. Koch 1926 (Braun-Blanquet i Tüxen 1952; Ant i Diekjobst 1967). Jednakże brak wielu gatunków charakterystycznych dla zespołu i związku,

A. Zbiorowisko (Community) ELEOCHARIS ACICULARIS

B. Zbiorowisko (Community) JUNCUS BULBOSUS FLUITANS

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	6
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	160	161	280	281	19	57
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	8	8	5	5	93	152
Data (date)	15.8 1973	26.7 1974	27.7 1974	27.7 1974	20.7 1973	23.7 1973
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	20	30	15	10	20	30
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .	100	100	75	84	75	80
Głębokość wody (depth of water) cm	10	-	-	20	100	50
pH wody (pH of water)	6,5	-	-	6,0	6,0	5,5
Liczba gatunków (total number of species) . .	19	17	16	16	6	7
Zbiorowisko (community)	A		B			
I. Ch. Litorelletea:						
Juncus bulbosus for. fluitans	.	.	3.3	4.3	4.4	5.5
Ranunculus flammula	+	1.1	+	+	.	.
Eleocharis acicularis	5.5	5.5	.	.	.	.
Juncus bulbosus for. bulbosus	1.1	.	.	.	.	.
II. Ch. Utricularietea intermedio-minoris:						
Utricularia minor	1.2	+2	+2	1.1	.	1.1
Calliergonella cuspidata for. fluitans . .	.	+2	.	1.2	.	.
Sparganium minimum	1.1	+	.	.	.	.
Calliergon giganteum for. immersum . . .	.	.	.	+2	.	.
III. Ch. Phragmitetea:						
Alisma plantago-aquatica	1.1	+	1.1	.	.	+
Typha latifolia	+	+	.	+	+	.
Carex rostrata	1.1	.	1.1	+	.	.
Galium palustre	.	+	.	.	.	+
Eleocharis palustris	1.1	1.1	.	.	.	.
Sparganium emersum	.	+	.	.	.	.
Equisetum fluviatile	.	.	.	+	.	.
Glyceria fluitans	.	.	.	.	.	.
Rumex hydrolapathum	.	.	.	.	.	.
Sagittaria sagittifolia	.	+	.	.	.	.
Oenanthe aquatica	.	+	.	.	.	.
IV. Inne (other spp.):						
Potentilla palustris	1.1	.	.	+	1.1	+
Potamogeton natans	1.2	.	.	+	.	+
Lemna minor	+2	+2	+3	+2	.	.
Utricularia vulgaris	.	.	1.1	2.1	1.1	.
Carex canescens	.	.	.	+	+	+
Cicuta virosa	.	.	1.1	.	.	.
Lycopus europaeus	.	.	.	+	.	.
Polygonum amphibium for. natans	+	.	.	.	.	.
Spirodela polyrrhiza	+	.	.	.	.	.
Bidens cernua	.	.	.	.	.	.
Nymphaea alba	.	+	.	.	.	.
Drepanocladus exannulatus	.	.	.	.	.	.
Riccia fluitans for. terrestris	.	+3	.	.	.	.

jak *Pilularia globulifera*, *Litorella uniflora*, *Elatine gymnosperma* (Pietsch 1965/66), nie pozwala na zaliczenie tego zbiorowiska do któregoś z wyżej wymienionych zespołów. Z Polski bardzo zbliżone florystycznie i ekologicznie zbiorowisko z *Eleocharis acicularis* podali dotychczas Fabiszewski i Fałński (1967), Podbielkowski (1968) oraz Hereźniak (1972).

Zbiorowisko *Juncus bulbosus fluitans* – zbiorowisko pływającego situ drobnego (tab. 18)

W kilku lejkach krasowych, na szlamistym dnie w strefie przybrzeżnej, występują skupienia pływającej i niezupełnie zanurzonej odmiany situ drob-

Ryc. 6. Płat zbiorowiska *Eleocharis acicularis* na mulistym dnie wyschniętego lejka krasowego nr 8 w Maleńcu

Fig. 6. Patch of *Eleocharis acicularis* community on a slimy bottom of the dried karst sink-hole no. 8 in Maleniec

Ryc. 7. Fragment płatu *Scirpetum lacustris* przy wschodnim brzegu jeziora krasowego (lejek nr 12) w Staszowie

Fig. 7. Fragment of a *Scirpetum lacustris* patch on east side of the karst lake (sink-hole no. 12) in Staszów

Ryc. 8. Płat *Typhetum angustifoliae* w lejku krasowym nr 6 w Małenicy
 Fig. 8. Patch of *Typhetum angustifoliae* in the karst sink-hole no. 6 in Malenec

Ryc. 9. Płat *Typhetum latifoliae* w lejku krasowym nr 123 w Czajkowie
 Fig. 9. Patch of *Typhetum latifoliae* in the karst sink-hole no. 123 in Czajków

nego — *Juncus bulbosus* for. *fluitans* Fries. Rosną one w wodzie o odczynie kwaśnym, na głębokości 20-100 cm. W najgłębszych miejscach, fitocenozy tego zbiorowiska mają postać prawie jednogatunkowych skupień *Juncus bulbosus* for. *fluitans*.

Podobnie jak opisywane wcześniej *Sparganietum minimi*, zbiorowisko *Juncus bulbosus fluitans* ma charakter zbiorowiska inicjującego proces zarastania dystroficznych zbiorników wodnych. Jest ono opanowywane przez płyty zbiorowisk szuwarowych ze związku *Phragmition*, najczęściej przez *Typhetum latifoliae*.

Zbliżone składem florystycznym i warunkami występowania zbiorowisko opisał z Łużyc Pietsch (1965). Autor ten wyróżnił zbiorowiska trzech różnych form *Juncus bulbosus*: for. *submersus*, for. *fluitans* i for. *terrestris*, rozwijające się na różnych głębokościach i przechodzące wzajemnie w siebie w zależności od wahań poziomu wody. Podobne zjawisko obserwowano również w okolicach Staszowa, gdzie w wodzie powyżej 100 cm głębokości występowały skupienia *Juncus bulbosus* for. *submersus*. Opisy podobnych zbiorowisk z *Juncus bulbosus* zawierają także prace Grossera (1956, 1967), Passarge'a (1964b), Klemma (1970) oraz Hereźniaka (1972).

4.3. NATURALNE ZBIOROWISKA MULISTYCH BRZEGÓW I OKRESOWO ZALEWANYCH ZAGŁĘBIŃ

Do tej grupy należy kilka zespołów i zbiorowisk roślinnych z całkiem odmiennych klas. Są one przestrzennie związane z wodami, a wspólną ich cechą jest to, że ulegają periodycznemu zalewaniu przez wodę.

Szczególne warunki panujące w lejkach krasowych wyraźnie nie sprzyjają rozwojowi tych przeważnie nitrofilnych zbiorowisk. Dlatego zajmują one niewielką powierzchnię w lejkach krasowych o płaskich brzegach, w których woda w lecie wysycha całkowicie lub obniża swój poziom do tego stopnia, że przy brzegach odsłania się nagie dno. Tego typu lejki położone są wśród pól, a od innych odróżniają się znacznym osłabieniem sukcesji roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. Zaznacza się w nich natomiast wyraźny wpływ działalności ludzkiej (wydeptywanie, nawożenie, wypasanie).

4.3.1. PIONIERSKIE ZBIOROWISKA TEROFITÓW NA MULISTYCH, WILGOTNYCH GLEBACH (*ISOËTO-NANOJUNCETEA*)

Zbiorowisko *Riccia huebenerana* — zbiorowisko wgłębki Huebenera (tab. 19)

W płytkim, wyschniętym lejku krasowym położonym w lesie sosnowo-dębowym, niedaleko gajówki Strzelcówka, obserwowano latem 1974 roku pionierskie zbiorowisko interesującego wątrobowca *Riccia huebenerana*. Płyty jego wykształcają się na wilgotnej, mulistej glebie o kwaśnym odczynie, w miejscach pozbawionych roślinności szuwarowej. Dominującym gatunkiem

jest *Riccia huebenerana*, której zielone plechy, tworzące luźne, nieregularne rozetki o średnicy 5-20 mm, osiągają wysoki stopień pokrycia. W lukach pomiędzy plechami *R. huebenerana* rosną obficie inne gatunki mszaków, wyróżniające związek *Eu-Nanocyperion flavescentis* (Pietsch 1963).

Klasa (Class): Isoëto-Nanojuncetea

Tabela 19

Rząd (Order): Cyperetalia fusci

Table 19

Związek (Alliance): Elatini-Elleocarition ovatae

Zbiorowisko (Community) RICCIA HUEBENERANA

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	402	403
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	81	81
Data (date)	12.8	12.8
	1974	1974
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	1	0,8
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .	75	80
pH gleby (pH of soil)	6,0	6,0
Liczba gatunków (total number of species) . .	12	11
I. Ch. Isoëto-Nanojuncetea:		
<i>Riccia huebenerana</i>	4.4	4.4
<i>Riccia fluitans</i> for. <i>terrestris</i>	1.2	2.2
<i>Physcomitrium pyriforme</i>	1.3	.
<i>Pleuroidium subulatum</i>	.	+2
<i>Juncus bufonius</i>	+	.
II. Inne (other spp.):		
<i>Callitriche ophocarpa</i>	1.2	+2
<i>Juncus bulbosus</i>	+	+
<i>Potentilla anserina</i>	+	+
<i>Eleocharis palustris</i>	+	+
<i>Juncus articulatus</i>	1.1	.
<i>Ranunculus flammula</i>	+	+
<i>Utricularia minor</i>	.	+
<i>Glyceria fluitans</i>	.	+
<i>Drepanocladus exannulatus</i>	.	+
<i>Rorippa palustris</i>	.	+
<i>Polygonum amphibium</i>	+	.
<i>Funaria hygrometrica</i>	.	+

Opisywane zbiorowisko można uważać za skrajnie zubożały fragment *Eleocharito-Caricetum bohemicæ*, subatlantyckiego zespołu mulistych siedlisk. Pietsch i Müller-Stoll (1968) podają z Łużyc szereg zdjęć fitosocjologicznych silnie zubożonych fragmentów tego zespołu o bardzo zbliżonym składzie florystycznym do tego, jaki stwierdzono w okolicach Staszowa.

Cyperetum flavescentis W. Koch 1926 – zespół cibory żółtej

Cyperetum flavescentis obserwowano tylko raz, latem i jesienią 1974 roku, na płaskim brzegu w południowo-wschodniej części Jeziora Jasnego. Fitocenozy zespołu zajmują kilkanaście metrów kwadratowych powierzchni i wykształcają się na mokrej, piaszczysto-gliniastej glebie o odczynie kwaśnym. Ich skład florystyczny obrazuje poniższe zdjęcie fitosocjologiczne:

Zdj. 256. Lejek krasowy nr 89 w oddziale 25 (Jezioro Jasne). Gleba wilgotna, piaszczysto-gliniasta, pH 6,0. 10.08.1974. 80%, 6 m², 17 gat.

Ch. *Cyperetum flavescentis*: *Cyperus flavescentis* 4.4; Ch. *Nanocyperion flavescentis*: *Juncus bufonius* 1.1, *Plantago maior* ssp. *intermedia*+, *Sagina nodosa* + 2; Gatunki towarzyszące: *Juncus tenuis* 1.1, *Sparganium minimum* 1.1, *Ranunculus flammula* 1.1, *Lycopus europaeus*

1.1. *Agrostis gigantea* +, *Trifolium fragiferum* +, *Glyceria fluitans* +, *Bidens cernuus* +, *Juncus bulbosus* +, *Potentilla anserina* +, *Triglochin palustre* +, *Calliergonella cuspidata* + 2. *Drepanocladus exannulatus* + 2.

Z Polski zespół cibory żółtej był podawany kilkakrotnie przez Śliwińską (1961), Falińskiego (1966), Fijałkowskiego i Kozaka (1970) oraz Hezeźniaka (1972). Skład florystyczny i warunki występowania *Cyperetum flavescentis* są bardzo podobne na całym obszarze występowania, który obejmuje zachodnią i środkową Europę (Koch 1926, 1934; Aichinger 1933; Moor 1936, 1958; Tüxen 1937; Schwickerath 1944; Vollmar 1947).

4.3.2. ZBIOROWISKA ZIOŁOROŚLI MUŁOWYCH (*BIDENTETEA TRIPARTITA*)

Polygono-Bidentetum (W. Koch 1926) Lohm. 1950 – zespół rdestowo-uczepowy (tab. 20)

Jest to zespół dość często spotykany w badanym terenie. Jego fitocenozy występują zwykle w grupach śródpolnych lejków krasowych, znacznie rzadziej w lejkach położonych w lasach. Rozwijają się na wilgotnych, mułowych lub torfiastych glebach, okresowo zalewanych przez wodę. Zbiorniki wodne, w których wykształcają się płaty *Polygono-Bidentetum*, uległy przeważnie wtórnej eutrofizacji w wyniku intensywnego nawożenia otaczających je pól. Szczególne znaczenie ma zwiększenie zawartości azotu w glebie, gdyż jest to zespół o wyraźnych tendencjach nitrofilnych (Korniak 1966).

Fitocenozy *Polygono-Bidentetum* rozwijają się stosunkowo późno, a optymalne warunki ich rozwoju przypadają na sierpień i początek września. W tym okresie woda w małych zbiornikach wysycha całkowicie lub znacznie obniża poziom. Wody gruntowe występują przeważnie na głębokości 40-50 cm. Skupienia rdestów opanowują cały wyschnięty zbiornik lub tworzą koncentryczny, kilkumetrowej szerokości pas wokół lustra wody. Dominującą rolę odgrywają letnie terofity z rodzajów *Polygonum*, *Bidens* i *Rumex*. W zależności od aktualnie panującego gatunku, ich fizjonomia bywa różna. Najczęściej spotykane są płaty, w których dominuje *Polygonum hydropiper*, rzadziej płaty z dominującymi *Polygonum minus*, *P. tomentosum* i *Rumex maritimus*. Te ostatnie nawiązują swym składem do *Rumici-Ranunculetum scelerati* Oberd. 1957, którego płaty rosną w eutroficznych zbiornikach wodnych (Passarge 1959a; Sukopp 1959/60; Kutschera 1966).

Znamionym rysem w strukturze fitocenz *Polygono-Bidentetum* w badanym terenie jest znaczny udział gatunków szuwarowych. Nigdy nie osiągają one jednak większego stopnia pokrycia. Bardzo podobną postać tego zespołu opisali Müller-Stoll i Neubauer (1965) z Brandenburgii oraz Podbielkowski (1968) z okolic Warszawy.

Fitocenozy *Polygono-Bidentetum* pozostają w lejkach krasowych w przetrzennym kontakcie z płatami *Rumici-Alopecuretum geniculati*, rozwijającymi się w zbliżonych warunkach. Wynikiem tego jest obecność w płatach opisywanego zespołu wielu gatunków z klasy *Rlantaginetes maioris*. Zespół

Tabela 20

Klasa (Class): Bidentetea tripartiti
Rząd (Order): Bidentetalia tripartiti
Związek (Alliance): Bidention tripartiti

POLYGONO-BIDENTE TUM (W. KooH 1926) Lohm. 1950

[illegible]

ma charakter wybitnie pionierski i przy zmianie warunków siedliskowych zanika. Przy życiu pozostają tylko gatunki szuwarowe, które z czasem kształtują odpowiednie zbiorowisko.

Polygono-Bidentetum jest bardzo pospolitym, wielokrotnie już opisywanym zespołem w Polsce niżowej (np. Kornaś 1952; Drabowicz-Piekarska i in. 1959; Fijałkowski 1960, 1963, 1967; Krzywański 1974). Silnie ubożające, w miarę wzrostu wysokości nad poziom morza, fragmenty tego zespołu występują w Karpatach Zachodnich (Kornaś 1968; Grodzińska 1975). Ogólny zasięg geograficzny *Polygono-Bidentetum* obejmuje prawie całą Europę środkową (Poli i Tüxen 1960; Passarge 1964a). Na południu przenika on w obszar śródziemnomorski (Slavnić 1951; Oberdorfer 1954).

Klasa (Class): Plantaginetea maioris
Rząd (Order): Plantaginetalia maioris
Związek (Alliance): Agropyro-Rumicion crispi

Tabela 21
Table 21

RUMICI-ALOPECURETUM GENICULATI R. Tx.(1937) 1950

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	Stalność (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	417	156	182	230	244		
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	35	63	126	129	35		
Data (date)	15.8 1974	15.8 1973	18.8 1973	26.8 1973	29.8 1973		
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	20	15	20	40	20		
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .	100	100	95	90	80		
pH gleby (pH of soil)	6,5	6,5	-	7,0	6,5		
Liczba gatunków (total number of species) . .	18	22	20	12	10		
I. Ch. Rumici-Alopecuretum geniculati:							
<i>Alopecurus geniculatus</i>	5.5	3.3	3.3	2.2	4.4	100	V
<i>Rorippa sylvestris</i>	1.1	+	1.1	.	.	60	III
<i>Rumex crispus</i>	2.2	+	.	.	.	40	II
II. Ch. Agropyro-Rumicion crispi:							
<i>Potentilla anserina</i>	+	+	.	1.1	.	60	III
<i>Lysimachia nummularia</i>	.	.	1.1	.	.	20	I
III. Ch. Bidentetea tripartiti:							
<i>Bidens tripartita</i>	+	1.1	+	1.1	+	100	V
<i>Alopecurus aequalis</i>	1.1	.	+	.	.	40	II
<i>Polygonum hydropiper</i>	1.1	.	.	+	.	40	II
<i>Polygonum lapathifolium</i> ssp. <i>incanum</i> . .	.	+	+	.	.	40	II
IV. Ch. Phragmitetea:							
<i>Lycopus europaeus</i>	+	.	1.1	+	+	80	IV
<i>Glyceria plicata</i>	.	.	1.1	2.1	1.1	60	III
<i>Iris pseudacorus</i>	+	.	+	.	1.1	60	III
<i>Drepanocladus aduncus</i> var. <i>polycarpos</i> . .	.	2.2	.	2.3	.	40	II
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	.	.	2.1	.	1.1	40	II
<i>Cenante aquatica</i>	1.1	1.1	.	.	.	40	II
<i>Glyceria fluitans</i>	1.1	.	+	.	.	40	II
<i>Eleocharis palustris</i>	+	1.1	.	.	.	40	II
<i>Scutellaria galericulata</i>	.	.	.	1.1	+	40	II
<i>Galium palustre</i>	.	+	.	+	.	40	II
V. Inne (other spp.):							
<i>Epilobium palustre</i>	.	2.1	+	.	+	60	III
<i>Mentha arvensis</i>	1.1	1.1	.	.	+	60	III
<i>Callitriche cophocarpa</i>	+2	.	.	3.2	.	40	II
<i>Scirpus sylvaticus</i>	.	+	2.1	.	.	40	II
<i>Veronica scutellata</i>	.	1.1	+	.	.	40	II
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+	.	+	.	.	40	II
<i>Ranunculus flammula</i>	+	+	.	.	.	40	II
<i>Myosotis scorpioides</i>	+	+	.	.	.	40	II
<i>Junos effusus</i>	.	.	.	+	.	40	II
Gatunki sporadyczne (sporadic species): III. <i>Polygonum minus</i> 4; 1.1; <i>Bidens cernuus</i> 1; 1.1; <i>Rumex maritimus</i> 2; <i>Polygonum mite</i> 3; IV. <i>Carex pseudocyperus</i> 1; 1.2; <i>Typha latifolia</i> 3; <i>Puccedanon palustre</i> 3; V. <i>Potentilla palustris</i> 3; 1.1; <i>Lychnis flos-ovculi</i> 2; <i>Epilobium parvifolium</i> 2; <i>Stelaria palustris</i> 2; <i>Hypochaeris radiata</i> 2; <i>Menyanthes trifoliata</i> 3; <i>Crepis biennis</i> 3							

Rumici-Alopecuretum geniculati R. Tx. (1937) 1950 – murawa wyczyńcowa (tab. 21)

W kilku niewielkich lejkach krasowych, zupełnie wysychających latem, pojawia się dywanowe zbiorowisko, w którym dominuje *Alopecurus geniculatus*. Płaty tego zbiorowiska rosną na wilgotnych, mulistych glebach, które przez pasące się bydło są wzbogacane w azot. Mają one odczyn lekko kwaśny lub zbliżony do obojętnego.

Rumici-Alopecuretum geniculati ma postać niskiej, dość zwartej murawy z rzadko rozrzuconymi, wysokimi bylinami. Pod względem florystycznym jest ubogie. Większość gatunków tego zespołu jest dość odporna na różnego rodzaju uszkodzenia spowodowane przez wypas. Z chwilą ponownego zalania siedliska przez wodę, płaty zespołu ulegają zniszczeniu, a utrzymują się tylko gatunki szuwarowe, które z biegiem czasu mogą ukształtować odpowiednie zbiorowisko.

Rumici-Alopecuretum geniculati należy do najczęstszych w Polsce zespołów ze związku *Agropyro-Rumicion crispi*. Pomimo to jego opisy są rzadko spotykane w krajowej literaturze fitosocjologicznej (Kępczyński 1960, 1965, Faliński 1966, Szoszkiewicz 1967). Bardzo zbliżone florystycznie i ekologicznie zbiorowisko (*Rumex crispus*) – *Alopecurus geniculatus* R. Tx. 1950 opisała Solińska (1963) z małych, astatycznych zbiorników wodnych w okolicach Mikołajek. Ogólny zasięg geograficzny zespołu obejmuje prawie całą Europę (Timar 1947; Braun-Blanquet i Tüxen 1952; Lohmeyer 1953; Oberdorfer 1957; Moor 1958).

4.4. ZBIOROWISKA SZUWAROWE

4.4.1. ZBIOROWISKA SZUWARÓW WYSOKICH (*Phragmition*)

Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Chouard 1924 – szuwar oczeretowy (tab. 22)

Szuwar oczeretowy należy do zbiorowisk roślinnych stosunkowo rzadkich w lejkach krasowych. Wykształca się w postaci niewielkich płatów przy brzegach jezior, na twardym podłożu mineralnym lub na torfie (ryc. 7). Typowe płaty, będące niemal jednogatunkowymi skupieniami oczeretu jeziornego, rosną w głębokiej wodzie jako najdalej wysunięte w stronę lustra wody fragmenty roślinności szuwarowej. Przenikają się one wzajemnie z płatami zbiorowisk z rzędu *Potamogetonetalia*. Większość płatów *Scirpetum lacustris* występuje jednak w miejscach bardzo płytkich, które okresowo mogą być nawet pozbawione zalewu. Są one często penetrowane przez pasące się bydło, które w zasadniczy sposób wpływa na zmianę warunków siedliskowych. Wynikiem tego jest udział w fitocenozach tego zespołu licznych helofitów o szerszej skali ekologicznej niż *Schoenoplectus lacustris*.

Sukcesja *Scirpetum lacustris* idzie najczęściej w kierunku *Sparganietum*

erecti, *Phragmitetum* i innych zespołów ze związku *Phragmition*, co przejawia się zwiększonym udziałem, w poszczególnych płatach zespołu, *Sparganium erectum* i *Phragmites australis*. Bardzo podobne pod względem składu florystycznego i dynamiki rozwojowej fitocenozy *Scirpetum lacustris* opisał Krzywański (1974) ze starorzeczy Warty.

W Polsce szuwar oczeretowy należy do pospolitych zbiorowisk roślinnych, opisywanych najczęściej jako wariant *Scirpo-Phragmitetum* (Nowiński 1930; Jasnowski 1962; Tomaszewicz 1969a, b; Dziedzic i Asztemborski 1969; Rusińska 1974).

Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soó 1927 – szuwar pałki wąskolistnej (tab. 22)

Fitocenozy *Typhetum angustifoliae* są dość rzadko spotykane w badanym terenie. Rozwijają się w podobnych warunkach jak *Scirpetum lacustris*. Woda osiąga głębokość do 50 cm, a w pewnych okresach może wyschnąć zupełnie. Dno jest przeważnie piaszczyste, pokryte warstwą mułu i detrytusu roślinnego. *Typhetum angustifoliae* jest zespołem ubogim pod względem florystycznym (ryc. 8). Częstymi składnikami zespołu są *Oenanthe aquatica* i *Rorippa amphibia*, co jest wyrazem tendencji rozwojowych tej fitocenozy w kierunku *Oenanthe-Rorippetum*, z którym najczęściej kontaktuje się w terenie. Podobne stosunki florystyczne w *Typhetum angustifoliae* opisuje Lańg (1973).

U nas zespół należy do bardzo pospolitych w eutroficznych jeziorach, starorzeczach, stawach i torfowiskach (Nowiński 1967, Tomaszewicz 1978),

Phragmitetum (Gams 1927) Schmale 1939 – szuwar trzcinowy (tab. 22)

Phragmitetum jest najpospolitszym obok *Typhetum latifoliae* zespołem szuwarowym w lejkach krasowych. Zwarte łany *Phragmites australis* mogą opanowywać całe płytkie lejki lub też opasywać szerokim, nieprzerwanym pierścieniem lustro wody w głębszych jeziorach. Rozwijają się zarówno w miejscach stale zalanych wodą, jak też okresowo wysychających lub nawet nigdy nie zalewanych. Jest to wynikiem szerokiej skali ekologicznej trzciny pospolitej, największej spośród wszystkich roślin szuwarowych (Hejny 1960). Poszczególne płaty *Phragmitetum* rozwijają się na bardzo różnym podłożu: piaszczystym, piaszczysto-mulistym, bagnistym lub torfiastym.

Skład florystyczny fitocenozy omawianej asocjacji zmienia się w zależności od warunków siedliskowych. Płaty wysunięte w głąb jeziora, porastające podłoże piaszczyste lub piaszczysto-muliste, wykazują znaczne ubóstwo florystyczne, przybierając postać niemalże jednogatunkowych skupień *Phragmites australis* z udziałem gatunków wodnych. Na siedliskach silnie zamulonych pojawia się domieszka roślinności bagiennej, głównie *Lycopus europaeus* i *Typha latifolia*. Opisane wyżej płaty od strony lądu graniczą przeważnie

z *Salicetum pentandro-cinereae*, *Caricetum rostratae* i ze zbiorowiskiem *Iris pseudoacorus*.

Phragmitetum rosnące na podłożu torfowym wyróżnia się bardzo dużym udziałem gatunków z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, zwłaszcza *Sphagnum recurvum*, które tworzy dość zwarty, silnie uginający się dywan. Płaty te są więc inicjalnymi stadiami rozwojowymi mszarów torfowisk przejściowych ze związku *Rhynchosporo-Sphagnion*.

Phragmitetum jest bardzo ekspansywnym zespołem, który podobnie jak i inne zespoły związku *Phragmition*, odgrywa ważną rolę w zarastaniu lejków krasowych. *Phragmitetum* należy do najpospolitszych zbiorowisk szuwarowych w całej środkowej i południowo-wschodniej Europie. W Polsce jest również bardzo pospolity (Tomaszewicz 1973, 1979), wielokrotnie opisywany w różnych ujęciach syntaksonomicznych.

Equisetum fluviatilis Steffen 1931 – szuwar skrzypowy (tab. 22)

Rzadkie w lejkach krasowych płaty *Equisetum fluviatilis* rozwijają się na siedliskach silnie zabagnionych lub zatorfionych i zalanych przez większą część sezonu wegetacyjnego. Małe zacienienie, jakie daje skrzyp bagienny, wyraźnie sprzyja rozwojowi, w poszczególnych płatach zespołu, roślin wodnych z klas *Lemnetea* i *Potamogetonetea*, takich jak *Utricularia vulgaris*, *Hottonia palustris*, *Lemna trisulca*, *L. minor*. Są one składnikami zbiorowisk wodnych wypieranych przez bardzo ekspansywne *Equisetum limosum*, który intensywnie rozmnaża się wegetatywnie. Z tej racji szuwar skrzypowy można uważać za zbiorowisko pionierskie, odgrywające poważną rolę w opanowywaniu lustra wody przez helofity. Szuwar skrzypowy jest pośrednim ogniwem w sukcesji roślinnej idącej od zespołów z rzędu *Potamogetonetalia* do zespołów ze związku *Magnocaricion* (*Caricetum paniculatae*, *Caricetum gracilis*).

Mimo szerokiej amplitudy ekologicznej skrzypu bagiennego, płaty *Equisetum fluviatilis* optimum swego rozwoju mają w miejscach, które w strefowym układzie roślinności zajmują zespoły ze związku *Phragmition*. Mając na uwadze skład florystyczny i miejsce w szeregu sukcesyjnym, należy nadać płatom, w których dominuje *Equisetum fluviatile*, rangę zespołu. Takie stanowisko zajęli wcześniej Mattick (1929), Steffen (1931), Sinicynówna (1936), Tomaszewicz (1969a, 1977a) i inni. Traktowanie zaś tego zbiorowiska jako wariantu czy facji *Scirpo-Phragmitetum* (Kępczyński 1960, 1965; Olaczek 1967; Kraska 1969; Popiołek 1971 i in.) jest nieuzasadnione, gdyż stanowisko takie nie określa dokładnie ani miejsca, ani roli fitocenozy tego syntaksonu w strefowym układzie roślinności w akwenach.

Typhetum latifoliae Soó 1927 – szuwar pałki szerokolistnej (tab. 23)

Jest to najpospolitszy w lejkach krasowych zespół wysokich szuwarów. Mniejsze lub większe jego płaty wykształcają się na podłożu bagnistym,

Klasa (Class): Phragmitetea
Rząd (Order): Phragmitetalia
Związek (Alliance): Phragmition

Tabela 22
Table 22

A. SCIRPETUM LACUSTRIS (Allorge 1922) Chouard 1924
C. EQUISETETUM FLUVIATILE Steffen 1931
E. PHRAGMITETUM (Gams 1927) Schmale 1939
B. TYPHETUM ANGUSTIFOLIAE (Allorge 1922) Soó 1927
D. SPARGANIETUM ERECTI Roll 1938
F. GLYCEETUM MAXIMAE Hueck 1931

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Stałość (constancy)							
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	424	180	175	159	168	224	174	423	422	105	279	271	278	308	295	217	183	236	266	176	2	185	268	269	4	259	293	385								
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	9	123	28	29	123	17	28	9	10	159	5	6	5	89	121	12	124	96	7	104	172	127	7	7	172	8	18	15								
Data (date)	18.8 1974	18.8 1973	17.8 1973	15.8 1973	16.8 1973	24.8 1973	17.8 1973	18.8 1974	18.8 1974	9.8 1974	27.7 1974	26.7 1974	27.7 1974	4.8 1974	29.7 1974	23.8 1973	18.8 1973	26.8 1973	26.8 1973	17.8 1973	17.7 1973	18.8 1973	26.7 1974	26.7 1974	27.7 1973	26.7 1974	28.7 1974	11.8 1974								
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	60	100	30	35	20	100	80	100	100	60	25	60	30	25	30	20	100	40	20	30	150	100	100	100	100	100	30	30								
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .	100	100	95	100	95	100	90	100	100	60	80	90	85	60	90	85	95	80	85	85	100	100	100	100	100	95	100	100								
Głębokość wody (depth of water) cm	70	0	0	10	0	10	0	50	40	50	30	0	25	60	30	40	30	40	20	30	50	0	20	25	0	50	30	30								
pH wody (pH of water)	6,5	-	-	7,0	-	7,0	-	7,0	7,0	6,5	7,0	-	6,5	6,5	6,5	7,0	6,5	7,0	6,5	7,5	6,0	-	6,0	5,5	-	6,5	6,5	6,5								
Liczba gatunków (total number of species) . .	12	13	12	9	13	10	11	8	10	9	11	22	10	8	15	15	14	9	17	12	8	9	23	24	9	13	10	12								
Zespół (association)	A					B					C					D					E					F					1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	
I. Ch. Phragmition:																															V	IV	I	III	V	
Schoenoplectus lacustris	5.5	5.5	4.4	3.3	5.5	1.1	1.1	1.1	1.1	.	+	.	.	.	.	1.1	+	.	.	1.1	.	.	.	.	.	1.1	+	.	.	III						
Typha latifolia	.	1.1	.	1.1	+	.	.	1.1	+	.	+	.	1.1	1.1	.	4.4	5.5	5.5	4.4	5.5	.	1.1	+	1.1	+	1.1	+	.	.	IV						
Sparganium erectum ssp. erectum	+	+	1.1	2.2	.	+	+	.	.	.	+	1.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.1	.	.	+	.	.	IV						
Equisetum fluviatile	+	.	1.1	+	.	.	.	.	1.1	.	4.4	4.3	5.4	3.3	3.2	.	.	+	2.1	.	.	.	1.1	1.1	.	.	.	.	.	III						
Typha angustifolia	1.1	.	+	.	+	5.5	5.5	5.5	5.5	4.4	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	.	.	.	III						
Phragmites australis	+	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II						
Glyceria maxima	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	5.5	5.5	.	I						
II. Ch. Phragmitetea:																															II	III	I	V	II	
Oenanthe aquatica	.	+	1.1	.	.	1.1	1.1	+	.	.	.	2.1	.	.	.	+	1.1	1.1	1.1	2.1	.	1.1	.	+	.	1.1	.	+	.	II						
Rumex hydrolapathum	.	1.1	.	.	.	.	.	1.1	+	.	.	1.1	.	.	2.1	1.1	1.1	.	1.1	.	.	.	+	.	.	.	1.1	2.1	.	I						
Galium palustre	.	1.1	+	+	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III						
Eleocharis palustris	.	.	.	+	1.1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1.1	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	II						
Rorippa amphibia	.	.	1.1	.	.	+	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I						
Carex pseudocyperus	.	.	.	1.2	.	.	.	.	+	+	2.2	.	+	.	.	1.1	1.1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II						
Lysimachia thyrsiflora	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	1.1	.	+	.	.	1.1	1.1	1.1	.	+	.	.	+	+	1.1	.	.	.	.	.	II						
Lycopus europaeus	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	I						
Sagittaria sagittifolia	+	.	.	.	.	.	.	+	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	I						
Alisma plantago-aquatica	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	III						
Drepanocladus aduncus var. kneiffii	.	2.2	2.2	.	2.2	2.2	1.2	.	.	.	1.1	1.1	+	.	.	.	.	+	+	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I						
Cicuta virosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II						
Carex elata	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I						
Glyceria fluitans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	I						
Ranunculus lingua	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	II						
III. Inne (other spp.):																															III	I	I	II	II	
Lythrum salicaria	.	+	+	+	.	.	.	.	1.1	.	.	+	.	1.1	1.1	+	1.1	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	I						
Potentilla palustris	.	.	.	1.1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.1	+	3.2	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	I						
Hottonia palustris	.	.	.	.	+	.	2.1	.	.	.	1.2	.	+	.	.	+	.	.	+	.	1.1	.	.	.	.	1.1	.	.	.	I						
Potamogeton natans	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II						
Myriophyllum verticillatum	.	2.1	.	.	2.2	1.1	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II						
Ranunculus flammula	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I						
Epilobium palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.1	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	1.1	+	+	.	.	.	.	II						
Juncus articulatus	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	1.1	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III						
Carex canescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1.2	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I						
Hydrocharis morsus-ranae	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I						
Lemna trisulca	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II						
Sphagnum recurvum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	3.3	2.2	.	.	.	.	III						

Gatunki sporadyczne (sporadic species): I. Butomus umbellatus 1; Acorus calamus 15; 18: 1.1; Phalaris arundinacea 22; II. Carex rostrata 14: 2.1, 28: 1.1; Peucedanum palustre 12: 1.1, 19; Scutellaria galericulata 12: 1.1; Poa palustris 12, 14; Iris pseudacorus 19; Sium latifolium 16, 23; Carex vesicaria 19; Mentha aquatica 12, 15, 28; Glyceria plicata 17, 20, 27: 1.1; III. Drepanocladus exannulatus 1, 2: 2.2, 28; Nuphar luteum 1, 9; Lysimachia vulgaris 28; Ruscus aculeatus 4; Teucrium scordium 6, 23; Juncus effusus 10, 28; Fontinalis antipyretica 10; Cirsium palustre 12; Menyanthes trifoliata 15: 2.2; Veronica scutellata 15; Agrostis stolonifera 15, 19; Flissidens adianthoides 12; Campylium stellatum 12; Utricularia vulgaris 13, 15; Lemna minor 14, 15; Bidens cernua 11, 12; Ceratophyllum demersum 16: 2.2; Myosotis scorpioides 19, 20; Potamogeton lucens 26; Polygonum amphibium for. natans 26, 28; Scirpus sylvaticus 28; Epilobium hirsutum 22; Alnus glutinosa c 22; Nymphaea alba 28; Utricularia australis 28; Polygonum mite 21; Stellaria palustris 21; Geranium pratense 21; Ohilioscyphus polyanthos 21; Bryum pseudotriquetrum 21; Riccia fluitans 21; Calliergonella cuspidata 22; Sparganium minimum 5, 10, 13, 21; Drepanocladus fluitans 4, 12; Calliergon giganteum 2: 3.2, 3: 1.2, 4, 5: 1.2; Calla palustris 10, 23: 2.2, 24.

B. ACORETUM CALAMI (Eggler 1933) Kobenda 1948

[illegible]

mułowo-torfowym lub torfowym. Odczyn górnych warstw gleby jest obojętny lub kwaśny. Głębokość wody stagnującej waha się średnio od 10 do 40 cm. W niektórych suchych latach woda może tu zupełnie wyschnąć. Pod względem florystycznym jest to zespół bardzo ubogi. Dominująca *Typha latifolia* tworzy mniej lub bardziej zwarte agregacje (ryc. 9). Zróżnicowanie florystyczne i ekologiczne stało się podstawą do wyróżnienia w obrębie zespołu dwóch wariantów:

a. Wariant typowy rozwija się na podłożu bagnistym lub mułowo-torfistym. W poszczególnych jego płatach występują liczne helofity ze związku *Phragmition* i z klasy *Phragmitetea*. Ich udział ilościowy jest jednak bardzo mały, gdyż nie wytrzymują one konkurencji bujnie rozrośniętej pałki szerokolistnej. Gatunki te określają w pewnej mierze dynamikę zespołu, obejmującą sukcesję roślinności od *Scirpetum lacustris* i *Sparganium erecti* poprzez *Typhetum latifoliae* do *Oenanthe-Rorippetum* i *Phragmitetum*.

Jest to bardzo pospolity, wielokrotnie u nas opisywany wariant (np. Nowiński 1930; Kępczyński 1960, 1965; Jasnowski 1962; Kraska 1969; Tomaszewicz 1969b, 1977a; Kępczyński i Zielski 1974).

b. Wariant mszarny rozwija się w dystroficznych lejkach krasowych na podłożu torfowym. Powstaje w wyniku masowej inwazji *Sphagnum recurvum* w szuwar. Torfowcowi temu towarzyszą inne gatunki z klasy *Scheuchzeria-Caricetea fuscae*. Wariant ten reprezentuje odrębny kierunek rozwojowy zbiorowisk szuwarowych w stronę zbiorowisk torfowisk przejściowych ze związku *Rhynchosporo-Sphagnion*.

Sparganium erecti Roll 1938 — szuwar jeżogłówkowy (tab. 22)

Płaty rzadkiego w badanym terenie *Sparganium erecti* wykształcają się w postaci wąskich przybrzeżnych pasów lub dużych, zwartych łąnów porastających całe dna lejków krasowych. Zalew wodny osiąga głębokość 20-40 cm, ale czasami woda może zupełnie wyschnąć. Fitocenozy zespołu występują na glebach mułowo-piaszczystych lub mineralno-torfowych, o słabo wykształconym profilu, namywanych i w różnym stopniu zamulonych. Ilustruje to profil glebowy.

Profil nr 183 (tab. 22, zdj. 17). Lejek krasowy nr 124, 8.10.1975.

T _n	0-8 cm	—	torf barwy jasnobrazowej, ze słabo rozłożonymi szczątkami roślin i korzeniami, wydzielający gnilny zapach, silnie zamulony; przechodzi w
Mł ₁	8-18 cm	—	il barwy ciemnobrazowej, z dobrze rozłożonymi szczątkami organicznymi, o zbitym układzie, dość silnie zamulony; przechodzi w
Mł ₂	18-60 cm	—	piasek pylasty, zbitý, barwy jasnobrunatnej z występującym w tej warstwie poziomem wody gruntowej (60 cm).

Diagnoza typologiczna: gleba torfowo-mułowa.

W poszczególnych płatach zespołu dominuje *Sparganium erectum* ssp. *erectum*. W lejkach krasowych fitocenozy *Sparganium erecti* kontaktują się najczęściej z *Typhetum latifoliae*, *Caricetum elatae* i *Caricetum rostratae*. Od strony wody przenikają natomiast w *Potamogetonalia*.

Jako samodzielny zespół *Sparganietum erecti* po raz pierwszy opisał Roll (1938) z brzegów wód płynących, chociaż optimum swego występowania *Sparganium erectum* ma w wodach stojących. W Polsce należy do bardzo pospolitych zespołów (Tomaszewicz 1979).

Glycerietum maximae Hueck 1931 — szuwar mannowy (tab. 22)

Rozwija się na niewielkich powierzchniach w trzech śródpolnych lejkach krasowych. Cechą charakterystyczną siedlisk są duże wahania poziomu wód, powodowane okresowym ich wysychaniem, i silna eutrofizacja związkami mineralnymi spływającymi z nawożonych pól otaczających te lejki. Gleby są piaszczyste, mniej lub bardziej zamulone.

Glycerietum maximae odznacza się masowym występowaniem manny mielec, która osiągając duże zwarcie, uniemożliwia przenikanie innych roślin szuwarowych. Sprawia to, że zespół jest florystycznie ubogi. Jako zbiorowiska kontaktowe występują najczęściej płaty *Scirpetum lacustris*, *Typhetum latifoliae*, *Oenantho-Rorippetum* i zbiorowisko *Potamogeton alpinus*.

Szuwar mannowy jest bardzo pospolitym zbiorowiskiem w całej środkowej i południowo-wschodniej Europie. Jako samodzielny zespół opisali go Nowiński (1928) i Hueck (1931). Wielokrotnie był opisywany w polskiej literaturze fitosocjologicznej (np. Jasnowski 1962; Faliński 1966; Olaczek 1967; Podbielkowski 1968, 1969; Gołdyn 1975); rzadziej podawano go jako wariant *Scirpo-Phragmitetum* (Kępczyński 1960; Dąbska 1961).

Acoretum calami (Eggle 1933) Kobendza 1948 — szuwar tatarakowy (tab. 23)

Na badanym terenie jest to fitocenoza pospolita w wielu śródpolnych lejkach krasowych w Woli Wiśniowskiej, na żyznych, piaszczystych glebach, zamulonych osadami pochodzenia organicznego. Woda stagnuje zwykle tylko na wiosnę, w lecie opada poniżej poziomu gleby do 60 cm. Ilustruje to odkrywka glebowa:

Profil nr 240 (tab. 23, zdj. 13). Lejek krasowy nr 95, 8.10.1975

A₀ 0-14 cm — poziom organiczny z licznymi szczątkami roślinnymi częściowo rozłożonymi i z dużą zawartością części mineralnych;

T_n 14-51 cm — torf brunatny, słabo rozłożony, włóknisty, silnie zamulony, z licznymi korzeniami i kłaczami;

D od 51 cm — podłoże mineralne, które stanowi piasek pylasty z poziomem wody gruntowej na 60 cm.

Diagnoza typologiczna: gleba torfowo-mułowa.

Gatunkiem dominującym i równocześnie charakterystycznym dla zespołu jest *Acorus calamus*, tworzący rozległe i dość zwarte łany. Gatunki charakterystyczne związku *Phragmition* są nielicznie reprezentowane (jakościowo i ilościowo). Spora liczba gatunków sporadycznych, przede wszystkim łąkowych, wiąże się z bezpośrednim kontaktem płatów zespołu z fitocenozami

łąkowymi i pastwiskowymi oraz niszczeniem zbiorowiska przez pasące się lub zdążające do wodopoju bydło. Jako naturalne zbiorowiska kontaktowe szuwaru tatarakowego występują w lejkach krasowych fitocenozy *Typhetum latifoliae*, *Sparganietum erecti*, *Salicetum pentandro-cinereae* oraz zbiorowisko *Iris pseudoacorus*.

Pomimo obcego pochodzenia tataraku, *Acoratum calami* jest w pełni zdomowionym zbiorowiskiem szuwarowym. Wielokrotnie też było opisywane ze wszystkich krain niżu polskiego jako samodzielny zespół (np. Solińska 1963; Podbielkowski 1968, 1969; Kraska 1969; Dziedzic i Asztemborski 1969; Popiołek 1973; Gołdyn 1975) lub jako wariant *Scirpo-Phragmitetum* (Jasnowski 1962; Olaczek 1967; Tomaszewicz 1969a, b; Izdebska 1969).

Zbiorowisko *Iris pseudoacorus* – szuwar kosaćcowy (tab. 23)

Iris pseudoacorus jest pospolitym gatunkiem szuwarowym wchodzącym w skład różnych zespołów z klasy *Phragmitetea*. W kilku lejkach krasowych, silnie ocienionych przez drzewa i krzewy, wykształca własne zbiorowisko, w którym dominuje. Jego płaty rozwijają się na glebach mułowo-torfowych lub piaszczysto-gliniastych, zalanych przez większą część sezonu wegetacyjnego przez stagnującą wodę. Obrazują to następujące odkrywki glebowe:

Profil nr 14 (tab. 23, zdj. 20). Lejek krasowy nr 94, 7.10.1975

T_{pr} 0-20 cm – torf ciemnobrunatny, średnio rozłożony, bardzo słabo zamulony;

Mł 20-33 cm – il brązowy, zbity, z licznymi korzeniami i kłaczami oraz z poziomem wody gruntowej na głębokości 30 cm;

D od 33 cm – podłoże mineralne, które stanowi piasek pylasty, luźny.

Diagnoza typologiczna: gleba torfowo-mułowa.

Profil nr 372 (tab. 23, zdj. 16). Lejek krasowy nr 124, 7.05.1975

A_o 0-5 cm – poziom organiczno-próchniczy, silnie uwilgotniony, z bardzo słabo rozłożonymi szczątkami roślin i licznymi korzeniami;

A₁ T_n 5-20 cm – piasek drobnoziarnisty, zamulony, z dość dobrze rozłożonymi szczątkami roślin i licznymi korzeniami;

T_n 20-38 cm – warstwa silnie rozłożonego i zamulonego torfu barwy brunatnej, silnie ukorzenionego;

Mł 38-70 cm – il jasnobrązowy, oglejony, z występującym w tej warstwie poziomem wody gruntowej na głębokości 65 cm.

Diagnoza typologiczna: gleba torfowo-mułowa.

W omawianym zbiorowisku, obok *Iris pseudoacorus* tworzącego mniej lub bardziej zwarte łany, zaznacza się udział licznych helofitów z klasy *Phragmitetea*. Niektóre z nich, jak np. *Sparganium erectum*, *Equisetum fluviatile* czy *Carex rostrata*, tworzą w miejscach nasłonecznionych własne zbiorowiska. W rozwoju sukcesyjnym zbiorowisko *Iris pseudoacorus* opanowują leśne i zaroślowe zbiorowiska z *Alnion glutinosae*.

Rozproszone, niezbyt liczne stanowiska tego zbiorowiska znane są z róż-

nych regionów kraju (Krzywański 1974). Passarge (1964a) traktuje podobne zbiorowisko jako wariant *Oenantherorippetum*, a Podbielkowski i Tomaszewicz (1979) nadają mu rangę zespołu, który umieszczają w związku *Magnocaricion*.

4.4.2. ZBIOROWISKA SZUWARÓW NISKICH (*ELEOCHARITO-SAGITTARION*)

Zbiorowiska szuwarów niskich występują we wszystkich typach zbiorników wodnych. W układzie strefowym roślinności w jeziorach zajmują podobne miejsce jak i zespoły ze związku *Phragmition*. Różnią się jednak od nich fizjonomią, mniejszą ekspansywnością i mniejszą produkcją masy roślinnej. Stagnująca woda może wysychać na dłuższy czas, zwłaszcza późnym latem i jesienią. W badanym terenie niektóre zespoły z tego związku odgrywają ważną rolę w procesie zarastania małych lejków krasowych.

Oenantherorippetum Lohm. 1950 — ziołorośla wodne kropidła i rzepichy (tab. 24)

W płytkich, zeutrofizowanych wodach ładowacielających lejków krasowych rozwijają się płaty *Oenantherorippetum*. Mają one pionierski charakter i pojawiają się w strefie przejściowej między zbiorowiskami z klasy *Potamogetonetea* a szuwarami wysokimi ze związku *Phragmition*. Z tego powodu mają one często postać wąskich pasów. Zajmują siedliska żyzne, silnie muliste, na których woda latem i jesienią znacznie obniża poziom lub nawet zupełnie wysycha. W płatach zespołu dominuje *Oenanthe aquatica*. *Rorippa amphibia* wraz z innymi helofitami tworzy niższe piętro. Z roślin wodnych najliczniej reprezentowane są *Hottonia palustris* i *Lemna minor*. W rozwoju sukcesyjnym *Oenantherorippetum* opanowuje ekspansywne fitocenozy szuwarów wysokich.

Podobnie pod względem florystycznym i ekologicznym fitocenozy *Oenantherorippetum* opisali u nas między innymi Solińska (1963), Izdebska (1969), Kraska (1969), Hereźniak (1972), Dubiel (1973), Rusińska (1974). Oprócz płatów z dominującym kropidłem wodnym opisano postać zespołu, w której dominuje rzepicha ziemnowodna (Kępczyński 1965; Faliński 1966; Podbielkowski 1968). Zespół jest pospolity w całym obszarze eurazjatyckim (Lohmeyer 1950).

Sagittario-Sparganietum emersi R. Tx. 1953 — szuwar strzałkowy (tab. 24)

Szuwar strzałkowy jest najrzadszym zbiorowiskiem szuwarowym w lejkach krasowych. Jego fitocenozy zostały stwierdzone tylko w dwóch lejkach krasowych, gdzie rozwijają się na piaszczysto-mulistym dnie, w wodzie o głębokości do 30 cm. W poszczególnych płatach dominują *Sagittaria sagittifolia* i *Sparganium emersum*, z roślin szuwarowych towarzyszy im *Eleocharis palustris*. Inne występują tylko sporadycznie.

A. SAGITTARIO-SPARGANETUM EHEMERI R. TX. 1953 B. ELEOCHARITETUM PALUSTRIS Schennikov 1919

C. OENANTHO-RORIPSETUM Lohmeyer 1950

Mr zdj. w tabeli (table number of record) . .										Mr zdj. w terenie (field number of record) . .										Mr lejka kolorowego (number of karst sink-hole)										Data (date)										Powierzchnia zdjeńca (area of sample plot) m ²										Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .										Głębokość wody (depth of water) cm										pH wody (pH of water)										Liczba gatunków (total number of species) . .										Zespół (association)										Statość (constancy)										Współczynnik pokrycia (Index of coverage)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459

W wodzie pojawiają się w dużych ilościach hydrofity z klas *Lemneta* i *Potamogetoneta*. Ich obecność świadczy o pionierskiej roli *Sagittario-Sparganium emersi* w opanowywaniu lustra wody przez rośliny lądowe. Faliński (1966) wyodrębnił płaty z przewagą hydrofitów jako osobny podzespół *Sagittario-Sparganium potametosum*. Podobną asocjację opisali również Podbielkowski (1969) i Krzywański (1974).

Sagittario-Sparganium emersi jest nierzadkim zespołem szuwarowym w środkowej i południowej Europie. Opisy jego znajdują się między innymi w pracach Tüxena (1953), Passarge'a (1957a, 1964a), Freitag'a i in. (1958), Krauscha (1965b), Konczaka (1968), Hilbiga (1971b) i van Donselaara (1973).

Eleocharitetum palustris Schennikov 1919 – szuwar ponikłowy (tab. 24).

Eleocharitetum palustris jest bardzo rzadkim zespołem szuwarowym w badanym terenie. Wykształca się najczęściej w postaci pasa niskich szuwarów przy brzegach jezior, na podłożu piaszczystym lub mulistym. Głębokość wody dochodzi do 40 cm, niekiedy może ona zupełnie wyschnąć. Najbardziej typowe płaty zespołu stwierdzono w jez. Kania. Od strony lustra wody kontaktują się one z *Elodeetum canadensis*, a od strony brzegu z *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*. Dominującą rolę odgrywa *Eleocharis palustris*, tworzące zwarte łany. Udział innych gatunków szuwarowych jest znikomy.

Eleocharitetum palustris należy do słabo zbadanych zespołów. Z Polski jako samodzielny zespół opisali go Podbielkowski (1969), Dziedzic i Asztemborski (1969), Ceynowa-Giełdon i in. (1972) oraz Krzywański (1974). Tomaszewicz (1969b), Popiołek (1974) oraz Kępczyński i Zielski (1974) traktują go jako wariant *Scirpo-Phragmitetum*.

4.4.3. ZBIOROWISKA SZUWARÓW WYSOKOTURZYCOWYCH (*MAGNOCARICION*)

Zbiorowiska szuwarów wysokoturzycowych występują pospolicie w lejkach krasowych o zaawansowanym procesie zarastania. W strefowym układzie roślinności zajmują one miejsce za pasem szuwarów wysokich, w miejscach płytszych, wykazujących duże wahania poziomu wód gruntowych. W procesie zarastania zbiorników wodnych odgrywają one bardzo ważną rolę. Produkowana przez nie ogromna ilość masy organicznej powoduje odkładanie się grubych pokładów torfu turzycowego.

Cicuto-Caricetum pseudocyperi de Boer 1942 – pło szalejowe (tab. 25)

Fitocenozy *Cicuto-Caricetum pseudocyperi* należą do pospolitych w lejkach krasowych. Rozwijają się one na mulistych lub bagnistych trzęsawiskach, podtopionych przez cały rok. Podłoże tworzą gleby mineralne lub silnie zamulone torfy niskie. Mają one odczyn kwaśny lub zbliżony do obojętnego. W okresie niskiego stanu wód rośliny sięgają korzeniami do podłoża i utwierdza-

CICUTO-CARIOETUM PSEUDOCYPRI de Boer 1942

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Stażok (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Nr zdj. w terenie (field number of record) . . .	358	362	92	103	111	94	95	88	84	109	130	44	10	206		
Nr łęka krasowego (number of karst sink-hole) . . .	66	60	164	157	148	169	169	165	160	158	51	60	176	114		
Data (date)	8-8	8-8	26,7	9-8	10-8	8-8	8-8	26,7	25,7	10-8	12-8	22,7	19,7	21-8		
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ² . . .	1974	1974	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973		
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . . .	15	25	10	15	25	80	60	10	20	15	30	15	80	25		
pH gleby (pH of soil)	90	85	85	95	95	95	80	100	75	95	100	95	100	100		
Liczba gatunków (total number of species) . . .	-	-	-	5,5	5,5	6,0	6,0	-	6,5	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5		
Liczba gatunków (total number of species) . . .	16	17	11	17	19	17	18	13	12	13	15	10	15	11		
Calla palustris																
Typowy (typical)																
1,1	1,1	1,1	1,1	3,2	1,2	2,2	2,2	5,5	4,3	5,5	4,4	4,4	5,4	4,3	86	4161
1,2	2,2	1,1	1,1	3,2	3,2	3,3	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	57	1428
1,1	1,1	3,2	+	2,1	2,2	2,2	2,2	+	2,2	+	2,2	+	2,2	+	57	984
1,1	1,1	1,1	2,1	+	+	+	1,1	+	1,1	+	+	+	1,1	+	50	110
1,1	1,1	1,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1,1	+	43	111
1,1	1,1	1,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1,1	+	29	111
1,1	1,1	1,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1,1	+	29	111
1,1	1,1	1,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1,1	+	50	501
1,1	2,2	+	+	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	2,1	+	71	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	57	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	43	111
1,1	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	+	1,1	+	36	111
1,1	1,1	1,1	1,1</

Ryc. 10. *Calla palustris* w płacie *Cicuto-Caricetum pseudocyperi* przy brzegu lejka krasowego nr 176 w Woli Wiśniowskiej

Fig. 10. *Calla palustris* in patch of *Cicuto-Caricetum pseudocyperi* at edge of the karst sink-hole no. 176 in Wola Wiśniowska

ją się w nim. Gdy poziom wód podnosi się — odrywają się od dna i pływają po powierzchni wody. W ten sposób tworzy się silnie uginające się pło, w wielu przypadkach zupełnie niedostępne.

Pło szalejowe jest pionierskim zbiorowiskiem szuwarowym, którego płaty w strefowym układzie roślinności bezpośrednio kontaktują się ze zbiorowiskami roślin wodnych z rzędu *Potamogetonalia*.

W badanym terenie fitocenozy *Cicuto-Caricetum pseudocyperi* są dobrze określone przez gatunki charakterystyczne zespołu. Szalej jadowity i turzycza ciborowata tworzą dość duże kępy, wokół których skupiają się liczne helofity. Długie kłacza czermieni błotnej przyczyniają się w dużym stopniu do utrzymywania się zwartej struktury uginającego się pła. Duże zróżnicowanie florystyczne stało się podstawą do wyróżnienia dwóch wariantów zespołu:

a. Wariant typowy odznacza się mniej więcej równym udziałem wszystkich gatunków charakterystycznych zespołu. Towarzyszą im liczne gatunki z klasy *Phragmitetea*. Bardzo duży jest udział gatunków w klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, które wskazują na mezotroficzny charakter zbiorowiska. Pod tym względem wariant przypomina niektóre płaty tego zbiorowiska opisane przez Görs (1968).

Ryc. 11. Ekspansja pła mszarnego na wody dystroficznego jeziora (lejek krasowy nr 101 w Woli Wiśniowskiej)

Najbliżej wody strefa panowania *Thelypteridi-Phragmitetum*; za nią rozwój dywanu *Sphagnum recurvum* (*Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*)

Fig. 11. Expansion of floating moss lawn into the waters of a dystrophic lake (the karst sink-hole no. 101 in Wola Wiśniowska)

Nearest to the water, the dominance zone of *Thelypteridi-Phragmitetum*; beyond it development of a peat moss lawn of *Sphagnum recurvum* of *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*

Pło szalejowe, jak wynika z dotychczasowych danych, obejmuje swym zasięgiem geograficznym całą północną i wschodnią Europę (Nowiński 1928, 1930; de Boer 1942; Freitag i in. 1958; Kępczyński 1960; Krausch 1964b; Horst i in. 1966; Denisiuk 1967a, 1980; Podbielkowski 1968; Krzywański 1974; Pałczyński 1975 i in.).

b. Wariant z *Calla palustris*, czyli pło czermieniowe, jest w lejkach krasowych znacznie częściej spotykany niż wariant typowy. W płatach tego zbiorowiska dominuje *Calla palustris*, tworząca bardzo zwarte, niskie łany (ryc. 10). *Carex pseudocyperus* i *Cicuta virosa* występują tylko sporadycznie w niektórych płatach. W bezpośrednim sąsiedztwie tego zbiorowiska rozwijają się często fitocenozy *Salicetum pentadro-cinereae*. Pozwala to przypuszczać, że w toku sukcesji zostanie ono opanowane przez zbiorowiska z rzędu *Alnetalia glutinosae*. *Calla palustris* jest zresztą gatunkiem do tego stopnia przywiązanym do zbiorowisk olszynowych, że niektórzy autorzy (Bodeaux 1955, Matuszkiewicz i in. 1958) uważają go za charakterystyczny dla *Alnion glutinosae*.

Pło czermieniowe opisywane jest niekiedy jako odrębny zespół *Calletum palustris* Vanden Berghen 1952 (Neuhäusl 1959; Dierschke 1969). Biorąc pod uwagę podobne wymagania ekologiczne *Calla palustris*, *Cicuta virosa* i *Carex pseudocyperus*, słuszne wydaje się ujęcie de Boera (1942), który traktuje zbiorowisko utworzone przez te trzy gatunki jako jeden zespół. Takie samo stanowisko zajmują Müller-Stoll i Neubauer (1965) oraz Gołdyn (1975) i Michna (1976).

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia przynależności syntaksonomicznej *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*. Część badaczy (Jeschke 1963; Oberdorfer i in. 1967; Hilbig 1971b) jest zdania, że należy zaliczyć go do związku *Phragmition*, biorąc pod uwagę jego miejsce w strefowym układzie roślinności. Inni z kolei (Krausch 1964b; Denisiuk 1967a, 1980; Nowiński 1967; Matuszkiewicz 1967) zaliczają go w tradycyjnym ujęciu do *Magnocaricion*. Obie strony przytaczają liczne argumenty na poparcie swego stanowiska, a wynika to z faktu, że *Cicuto-Caricetum pseudocyperi* ma charakter zespołu przejściowego, łączącego w sobie cechy zbiorowisk ze związków *Phragmition* i *Magnocaricion*.

Ryc. 12. *Sphagnetum magellanici pinetosum* w centralnej części mszaru wysokotorfowiskowego w lejku krasowym nr 101 w Woli Wiśniowskiej

Fig. 12. Stands of *Sphagnetum magellanici pinetosum* in central part of a raised moss bog in the karst sink-hole no. 101 in Wola Wiśniowska

Fitocenozy z *Thelypteris palustris* są dość częstym składnikiem szaty roślinnej lejków krasowych. Mają one postać silnie uginającego się pła, które nasuwa się na taflę wody od strony brzegów lub wysp. Na splątanych kłaczach i korzeniach *Thelypteris palustris* rosną różne rośliny błotne i torfowiskowe, a także krzewy i siewki drzew. W miarę rozwoju roślinności pło grubieje, odkłada coraz więcej humusu, co w efekcie prowadzi do wypełniania znajdującej się pod nim wolnej przestrzeni i utworzenia zabagnionych, podmokłych części brzegów. Zbiorowiska te traktuje się jako osobny zespół *Thelypteridi-Phragmitetum* Kuiper 1957. W terenie jego płaty odróżniają się osobliwą fizjonomią, jaką nadaje im *Thelypteris palustris* (ryc. 11).

W zależności od troficzności siedliska rozwój *Thelypteridi-Phragmitetum* przebiega w różnych kierunkach. W zeutrofizowanych akwenach przekształca się ono w zbiorowiska szuwarów wysokoturzycowych lub też opanowują je płaty zbiorowisk leśnych i zaroślowych z klasy *Alnetea glutinosae*. W dystroficznych, bezodpływowych lejkach rozwój postępuje w kierunku ombrotroficznych zespołów z klasy *Oxycocco-Sphagnetum* (Tomaszewicz 1977c). Podobne tendencje rozwojowe wykazuje *Thelypteridi-Phragmitetum* w badanym terenie. Najwyraźniej odzwierciedla się to w bardzo zróżnicowanym składzie florystycznym, który stał się podstawą do wyróżnienia dwóch wariantów:

a. Wariant typowy charakteryzuje się dużym udziałem gatunków z klasy *Phragmitetea*. Pozostaje to w ścisłym związku z tendencjami rozwojowymi tego wariantu w kierunku szuwarów wysokoturzycowych, np. *Caricetum paniculatae* (tab. 26: zdj. 1). Bardzo podobne zbiorowisko opisali u nas Dąmbaska (1961), Podbielkowski (1968), Gołdyn (1975) i Tomaszewicz (1977c).

b. Wariant mszarny wyróżnia się wielkim bogactwem elementów mszarów minerotroficznych, przede wszystkim *Sphagnum recurvum*, *S. teres*, *S. platyphyllum*, *Calliergon stramineum*. Pokrewieństwo z mszarami minerotroficznymi jest tak duże, że Boiński i in. (1974) zaliczyli podobne fitocenozy do *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* ze związku *Rhynchosporo-Sphagnion*. Obecność w niektórych płatach zespołu takich gatunków, jak *Drosera rotundifolia* i *Vaccinium oxycoccos* nasuwa przypuszczenie, że rozwój tych fitocenoz pójdzie w kierunku mszarów ombrotroficznych.

Pozycja *Thelypteridi-Phragmitetum* w syntaksonomii nie została dotąd definitywnie ustalona. Krausch (1965b) traktuje fitocenozy z *Thelypteris palustris* jako wariant szeroko pojętego *Scirpo-Phragmitetum*. Kuiper (1958) i van Donselaar (1961) są skłonni zaliczyć ten zespół do *Magnocaricion*. Podobnego zdania są Podbielkowski (1968) i Gołdyn (1975). Tomaszewicz (1977c), biorąc pod uwagę miejsce i rolę fitocenoz *Thelypteridi-Phragmitetum* w sukcesji roślinności szuwarowej, opowiada się za zaliczeniem go do *Phragmition*.

Fizjonomią, ekologią i składem florystycznym omawiany zespół przypomina *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*. *Cicuta virosa* i *Carex pseudocyperus* również

PHRYPTERIDI-PHRAGMITETUM Kulper 1957

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLINOWYCH W POLSCE

nr zdj. w tabeli (table number of record) ..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Średnia (constancy)	Średnia (constancy)	Średnia (constancy)
nr zdj. w terenie (field number of record) ..	438	439	53	365	368	171	164	410	373	372	408			
nr leśki krasowego (number of karst sink-hole)	44	44	55	101	104	104	101	39	125	124	41			
Data (date) ..	13.8	13.8	23.7	9.8	9.8	17.8	16.8	10.8	10.8	10.8	16.8			
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	12	9	20	20	15	20	20	25	25	30	20			
Pokrycie roślinności (total plant cover) % ..	100	95	85	100	100	90	100	100	100	100	100			
Liczba gatunków (total number of species) ..	9	11	13	15	14	12	18	14	18	24	15			
I. D. Thelypterid-Phragmitetum:	4.4	3.4	4.3	5.5	5.5	2.2	5.5	3.3	3.3	3.3	3.3	100	V	5641
Thelypteris palustris														
II. Ch. Magnocaricion, Phragmitetum (+):														
Carex pseudocyperus	1.2		2.2									90	V	212
Cicuta viresca												45	III	5
Sagittaria arifolia	1.1											36	II	182
Galium palustre			1.1									36	II	93
Fenestella palustris												36	II	48
Carex rostrata												27	II	48
+ Iris pseudacorus	1.1											27	II	48
+ Oenanthe aquatica												27	II	48
+ Lycopodium europaeum												27	II	3
III. Ch. Scheuchzerio-Caricetum fuscae:														
Sphagnum recurvum				2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	1.3	1.2	3.3	73	IV	909
Potentilla palustris			1.1	2.1	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	704	IV	704
Calliergon stramineum				2.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	35	III	439
Menyanthes trifoliata			1.1	2.2	1.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	32	III	264
Sphagnum teres					3.3	2.2			4.2	2.2	2.1	27	II	363
Viola palustris									1.1	2.1	2.1	27	II	205
Carex lasiocarpa									1.1	1.1	1.1	27	II	205
Agrostis omnia									1.1	1.1	1.1	27	II	92
Carex diandra				1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	27	II	92
Erigeron angustifolius				1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	27	II	92
IV. Inne (other spp.):														
Lythrum salicaria	+								2.2	+	+	45	III	163
Alnus glutinosa b					1.1				1.1	+	1.1	45	III	228
Alnus glutinosa c					1.1				1.1	+	1.1	64	III	229
Proserpinaca rotundifolia			1.1		1.1				1.1	+	1.1	45	III	94
Calliergon giganteum									1.1	+	1.1	36	II	325
Vaccinium oxycoccos			2.3		+				1.2	+	2.2	36	II	206
Aulacomnium palustre									+	+	+	36	II	4
Calla palustris									+	+	+	27	II	3
Variant (variant)	Typowy (typical)											Masarny (mossy)		
Gatunki eporadyczne (sporadic species): II. Carex paniculata 3; 2.3; Ranunculus lingua 3; 1.1; Equisetum fluviatile 3; Typha latifolia 8; 1.1; Polygonum amphibium for. terrestris 9; 1.1; Schoenoplectus lacustris 9; Carex elata 10, 11; Typha angustifolia 11; Lysimachia thyrisiflora 11; Sparganium erectum 10.														
IV. Solanum thuylovaria 1; 1.1; Epilobium hirsutum 2; Callamagrostis canescens 9; 2.1; Salix cinerea 9; 1.2; Calliergonella cuspidata 3; 3.3; Camphylis elodes 6; Sphagnum palustre 6; 1.2; Sphagnum cuspidatum 7; Plagiothecium ruthen 2, 9;														

w *Thelypteridi-Phragmitetum* osiągają wysoką stałość. Nie pozbawiona sensu jest więc koncepcja Jeschkego (1963) i Krauscha (1964b), którzy fitocenozy z *Thelypteris palustris* włączają do *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*.

Caricetum elatae W. Koch 1926 — szuwar turzycy sztywnej (tab. 27)

Caricetum elatae jest w badanym terenie dość pospolitym zespołem torfowiskowym. Jego fitocenozy tworzą zwykle pas większej lub mniejszej szerokości, rozwijający się w bezpośrednim sąsiedztwie szuwarów ze związku *Phragmition*. W kilkunastu przypadkach występują także na okrajkach mszarów minerotroficzných. Rozwija się na siedliskach silnie podtopionych, podlegających znacznej oscylacji poziomu wód gruntowych. Podłoże stanowią najczęściej płytkie, silnie zamulone torfy turzycowe, rzadziej jest ono mineralne. Typowy profil glebowy w płacie *Caricetum elatae* przedstawia się następująco:

Profil nr 197 (tab. 27: zdj. 2). Lejek krasowy nr 2, 8.10.1975

T_n 0-12 cm — torf barwy jasnoszarej, dość wilgotny, z bardzo słabo rozłożonymi szczątkami roślin;

Mł 12-38 cm — il brązowy, dość zbity, silnie ukorzeniony, z widocznymi zaciekami oglejenia;

D od 38 cm — piasek pylasty, zbity, w górnej części z licznymi korzeniami.

Diagnoza typologiczna: gleba torfowo-mułowa.

Płaty *Caricetum elatae* mają typową kępowo-dolinkową strukturę. *Carex elata*, która jest głównym składnikiem zespołu, tworzy kępy o trzonach wznoszących się na wysokość 20-50 cm. Dolinki między kępami są przez większą część roku podtopione. Zajmują je masowo rosnące w zespole mchy wodne, zwłaszcza *Drepanocladus aduncus*, *D. exannulatus*, *Calliergon giganteum*, *Calliergonella cuspidata* oraz liczne rośliny szuwarowe z *Magnocaricion*. W warunkach panujących w lejkach krasowych rozwija się acidofilny wariant zespołu, przywiązany do siedlisk mezotroficzných. Wyróżniają go gatunki roślin emersyjnych z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*. Podobnie wykształcony szuwar turzycy sztywnej opisali u nas Jasnowski (1962), Solińska (1963), Denisiuk (1967a, 1980) oraz Jasnowski i in. (1972). Elementy imersyjne, reprezentujące klasę *Phragmitetea*, są również bogato reprezentowane.

W zarastaniu lejków krasowych *Caricetum elatae* odgrywa bardzo istotną rolę. Rozwijając się na bardzo silnie nawodnionych siedliskach, wchodzi w bezpośredni kontakt z zespołami ze związku *Phragmition*. W miarę rozwoju jest opanowywany przez zbiorowiska turzycowe siedlisk mniej wilgotnych, głównie przez *Caricetum gracilis* i *Caricetum rostratae*.

Caricetum elatae należy do szeroko rozpowszechnionych i najczęściej opisywanych zespołów torfowisk niskich ze związku *Magnocaricion*, wykazując przy tym dużą zmienność pod względem chorologicznym (Koch 1926; Gams 1927; Tüxen 1937; Passarge 1955; Kovacs 1957; Jasnowski 1962).

Caricetum paniculatae jest wykształcone w postaci niewielkich płatów na obrzeżach kilku lejków krasowych. Opanowują one gleby utworzone z torfów niskich, wykazujące spore wahania poziomu wód gruntowych. *Carex paniculata*, jedyny gatunek charakterystyczny zespołu, tworzy duże kępy, których podstawy zalane są wodą. W miarę zbliżania się do brzegów zbiornika i zmniejszania się głębokości wody, kępy *Carex paniculata* osiągają większe zwarcie, w wyniku czego zespół przyjmuje postać zbiorowiska pozornie łąkowego.

Siedliska zajęte przez szuwar turzycy prosowej z biegiem czasu opanowują fitocenozy *Salicetum pentandro-cinereae* oraz *Carici elongatae-Alnetum*. W zarastających zbiornikach wodnych *Caricetum paniculatae* stanowi zatem pośrednie ogniwo w szeregu sukcesyjnym między zbiorowiskami szuwarowymi a leśnymi i zaroślowymi. Podobne tendencje rozwojowe tego zespołu opisali w Polsce Fijałkowski (1959), Jasnowski (1962), Kępczyński (1965), Denisiuk (1967a, 1980), Kraska (1971), Hereźniak (1972), Olkowski (1972), Krzywański (1974) oraz Gołdyn (1975).

Jest to stosunkowo rzadki zespół torfowiskowy w środkowej i zachodniej Europie. Z opisów podanych przez różnych autorów (Oberdorfer 1957; Müller-Stoll i Gruhl 1959; Ellenberg 1963; Tüxen 1962) wynika, że ma w całej Europie podobny skład florystyczny i podobne miejsce w szeregu sukcesyjnym.

Caricetum rostratae Rübel 1912 — szuwar turzycy dzióbkwatej (tab. 27)

Caricetum rostratae jest najpospolitszym w okolicach Staszowa zespołem szuwarowym. Mniej lub bardziej zwarte łąny *Carex rostrata* rozwijają się w większości przebadanych lejków krasowych. Najczęściej tworzą one dość szeroki pas porastający ich części przybrzeżne. Szeroka amplituda ekologiczna zespołu sprawia, że występuje on zarówno na glebach bagiennych wytworzonych z torfów niskich i przejściowych, jak i na oglejonych glebach mineralnych. Przykładowa odkrywka glebowa w płacie *Caricetum rostratae* przedstawia się następująco:

Profil nr 116 (tab. 27: zdj. 23). Lejek krasowy nr 133, 7.05.1975

A₀ 0-3 cm — poziom organiczny z licznymi, słabo rozłożonymi szczątkami roślin;

T_n 3-33 cm — torf ciemnoszary, słabo rozłożony; silnie ukorzeniony;

Mł₁ 33-56 cm — piasek luźny, różnoziarnisty, jasnobrązowy, słabiej przerośnięty korzeniami;

Mł₂ 56-63 cm — il jasnoszary, bez korzeni, z poziomem wody gruntowej na głębokości 60 cm.

Diagnoza typologiczna: gleba torfowo-mułowa.

Duże zróżnicowanie florystyczne, które odzwierciedla odmienne warunki siedliskowe, stało się podstawą do wyróżnienia w obrębie zespołu dwóch podzespołów:

a. *Caricetum rostratae typicum* — na dość zasobnych glebach bagiennych

i mineralnych, w miejscach stale zalanych przez wodę. Obok *Carex rostrata* dominują w nim helofity ze związku *Magnocaricion*. W strefowym układzie roślinności podzespół ten zajmuje miejsce za pasem szuwarów ze związku *Phragmition* i za *Caricetum elatae*. Bardzo często jednak odgrywa rolę zbiorowiska pionierskiego, wkraczającego bezpośrednio w wodę. W tym przypadku *Carex rostrata* nie osiąga jednak większego zwarcia.

b. *Caricetum rostratae sphagnetosum recurvi* Krausch 1964 stanowi przejście od zbiorowisk szuwarowych do mszarów minerotroficznych ze związku *Rhynchosporo-Sphagnion*. Gatunkami wyróżniającymi ten podzespół są *Sphagnum recurvum*, *S. teres*, *S. subsecundum*, *Potentilla palustris*, *Agrostis canina*, *Eriophorum angustifolium* i *Carex lasiocarpa*. Gatunki szuwarowe są skąpo reprezentowane i nie odgrywają większej roli. W miarę rozwoju dywanu torfowców, zbiorowisko przyjmuje postać uginającego się płą, które nasuwa się na lustro wody, a fitocenozy *Caricetum rostratae* przekształcają się w wariant z *Carex rostrata* zespołu *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*.

Niemal identyczne zbiorowisko opisali z okolic Poczdamu Müller-Stoll i Neubauer (1965) i Krausch (1964b) z jeziora Stechlin w Brandenburgii.

Caricetum vesicariae Br.-Bl. i Denis 1926 – szuwar turzycy pęcherzykowej (tab. 27)

Fitocenozy tego zespołu wykształcają się na niewielkich powierzchniach w kilku zaledwie lejkach krasowych. Związane jest to ściśle z wymaganiami ekologicznymi tego zbiorowiska. Optimum swego występowania i rozwoju osiąga ono na żyznych glebach torfowych i madach (Denisiuk 1967a, 1980; Nowiński 1967), które w badanym terenie prawie nie występują. Wiosną i wczesnym latem płaty zespołu są stale podtopione. Latem i jesienią podtopienie ustępuje.

Występujące w lejkach krasowych płaty *Caricetum vesicariae* charakteryzują się masowym występowaniem *Carex vesicaria* i *Glyceria fluitans*. Ten drugi gatunek w wielu płatach osiąga zdecydowaną przewagę i jest uważany za wyróżniający w stosunku do pozostałych zbiorowisk wysokoturzycowych. Solińska (1963), opisując analogiczne zbiorowisko z okolic Mikołajek, określiła je jako *Caricetum vesicariae glycerietosum fluitantis*. Szuwar turzycy pęcherzykowej z lejków krasowych można z całą pewnością zaliczyć do tego podzespołu.

Obficie występujące gatunki minerotroficzne, jak *Agrostis canina*, *Potentilla palustris*, *Sphagnum recurvum*, określają dynamikę rozwojową zespołu w kierunku zbiorowisk mszarów minerotroficznych z rzędu *Scheuchzerietalia palustris*, z którymi fitocenozy *Caricetum vesicariae* pozostają najczęściej w przestrzennym kontakcie. W kilku przypadkach płaty tego zespołu wykształcają się w postaci zwartego pasa szuwarów za strefą fragmentarycznie wykształconych zbiorowisk ze związku *Phragmition*.

Caricetum vesicariae jest zespołem o szerokim zasięgu w Europie. Wielokrotnie też był opisywany jako samodzielny zespół (np. Nowiński 1928,

1930; Zolyomi 1931; Krausch 1964b; Hereźniak 1972; Dubiel 1973) lub jako podzespół *Caricetum inflato-vesicariae* (np. Tüxen 1937; Soó 1955; Oberdorfer 1957; Eicke-Jenne 1960; Jasnowski 1962).

Caricetum gracilis (Graebn. i Hueck 1931) R. Tx. 1937 – szuwar turzycy zaostroznej (tab. 27)

Caricetum gracilis jest rzadkim zespołem bagiennym w badanym terenie. Płaty jego rozwijają się w kilku płytkich lejkach krasowych położonych wśród wilgotnych łąk trzęślicowych (*Molinietalia*). Podłoże stanowią mokre, lekko kwaśne torfy niskie. Zalew wodny występuje tylko przez krótki okres na wiosnę. Szuwar turzycy zaostroznej wykształca się najczęściej za pasem szuwarów wysokich lub wysokoturzycowych. W jednym tylko przypadku rozwija się bezpośrednio w wodzie przy brzegu jeziora krasowego. Dominują wysokie turzycy: *Carex gracilis* i *C. acutiformis*. Towarzyszą im najczęściej *Galium palustre* i *Lysimachia thyrsiflora*. Inne gatunki szuwarowe występują tylko sporadycznie. Pod względem składu florystycznego i ekologii *Caricetum gracilis* w lejkach krasowych przypomina bardzo *Caricetum gracilis equisetosum limosi* (Denisiuk 1967a). Skąpy materiał zdjęciowy uniemożliwia jednak dokładną charakterystykę tego zespołu.

4.5. ZBIOROWISKA ROŚLINNE TORFOWISK PRZEJŚCIOWYCH I WYSOKICH

4.5.1. MSZARNE TORFOWISKA PRZEJŚCIOWE (*SCHEUCHZERIETALIA PALUSTRIS*)

Torfowiska przejściowe to najczęściej spotykany i najbardziej rzucający się w oczy element szaty roślinnej lejków krasowych w okolicach Staszowa. Wykształcone są w formie mszarów dywanowych, tworzących silnie uginające się pło, które nasuwa się na lustro wody od strony brzegów i wysp.

Pod względem florystycznym zbiorowiska roślinne torfowisk przejściowych odznaczają się udziałem grupy gatunków minerotroficznych, określonych przez wielu badaczy (Du Rietz 1954; Görs 1961; Jeschke 1961; von Müller 1973) terminem „Mineralbodenwasserzeiger”. Należą do niej liczne rośliny naczyniowe, takie jak: *Eriophorum angustifolium*, *Menyanthes trifoliata*, *Potentilla palustris*, *Carex nigra*, *C. canescens* oraz mszaki: *Calliergon stramineum*, *Sphagnum palustre*, *S. riparium*, *Polytrichum commune*, *Chiloscyphus polyanthos* i wiele innych.

Klasyfikacja fitosocjologiczna fitocenoz mszarów minerotroficznych nie została dotąd ujednolicona i jest przedmiotem licznych dyskusji. Na podstawie istotnych, wspólnych cech, mszarne zespoły torfowisk niskich i przejściowych zalicza się do jednej klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Nordh. 1936 (Passarge 1964a; Oberdorfer i in. 1967; Nowiński 1967). Nazwa klasy zaproponowana przez Nordhagena (1936), pomimo że jest w powszechnym użyciu, wzbudza poważne zastrzeżenia. Proponuje się zastąpić ją nazwami: *Sphagno-Drepanocladetea* (Du Rietz 1954; Succow 1974) lub *Carici-Drepano-*

cladetea (Pałczyński 1975), które w pełni oddają istotną rolę mszaków w zbiorowiskach torfowiskowych.

Występujące w lejkach zbiorowiska mszarów minerotroficznych należą do jednego zespołu *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* w obrębie związku *Rhynchosporo-Sphagnion*. Nazwa związku jest synonimem dawnej nazwy *Rhynchosporion albae* Nordh. 1936, a drugi człon, „*Sphagnion*”, został tu celowo użyty dla podkreślenia istotnego znaczenia torfowców w budowie fitocenozy tych mszarów (Jasnowski i in. 1968).

Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi M. Jasn., J. Jasn. i Mark. 1968 — pło mszarne
(tab. 28-30)

Jest on bardzo pospolitym zespołem w badanym terenie. W niezarośniętych lejkach krasowych fitocenozy jego tworzą wielometrowej nieraz szerokości, silnie uginający się „kożuch”, który nasuwa się na powierzchnię wody od strony brzegów lub wysp. Tworzą one także mniejsze lub większe wyspy pływające, które są małymi fragmentami pomostu torfowcowego, powstałymi najczęściej w sposób naturalny przez jego rozerwanie. W zupełnie zarośniętych lejkach płaty omawianego zespołu występują na okrajkach torfowisk wysokich.

Gatunkami charakterystycznymi zespołu są *Sphagnum recurvum* i *Eriophorum angustifolium*, a wyróżniają go grzyby: *Galerina paludosa* i *G. sphagnetorum*. Charakterystyczną kombinację gatunków *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* uzupełnia spora grupa roślin minerotroficznych oraz grupa typowych elementów mszarów ombrotroficznych z klasy *Oxycocco-Sphagnetetea*.

Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi jest najpospolitszym i najbardziej rozprzestrzenionym zespołem torfowisk przejściowych w Europie środkowej. Poszczególne jego odmiany były opisywane pod różnymi nazwami i rozdzielane między różne zespoły, nieraz odległe systematycznie (Hueck 1925; Steffen 1931; Müller-Stoll i Grühl 1959; Jeschke 1961, 1963; Passarge 1961a; Jahns 1962; Scheel 1962 i inni). Podobnie jak i w innych regionach kraju, w okolicach Staszowa zespół wykazuje znaczne zróżnicowanie florystyczne i ekologiczne, które dało podstawę do wyróżnienia w jego obrębie dwóch podzespołów z wieloma wariantami ekologicznymi:

a. *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi typicum* — pło mszarowo-wielnankowe (tab. 28: zdj. 1-5). Typowa odmiana zespołu występuje dość rzadko. Jej fitocenozy mają postać płaskiego, dywanowego mszaru z dużym udziałem *Eriophorum angustifolium*. Rozwijają się one w dalszej odległości od lustra wody i stanowią wyjściowe zbiorowisko poprzedzające sukcesję kęp mszarów ombrotroficznych. Wyrazem tego jest bardzo duży udział gatunków z klasy *Oxycocco-Sphagnetetea*. Gatunki minerotroficzne schodzą na dalszy plan. Opisywane zbiorowisko jest bardzo pospolite na torfo-

wiskach przejściowych pojeziornych. Z Polski zostało podane z Pomorza Zachodniego (Pacowski 1967; Jasnowski i in. 1968; Boiński i in. 1974) i z Polski środkowej (Urbanek 1969).

b. Wariant z *Carex rostrata* — pło mszarne z turzycą dzióbkowatą (tab. 28: zdj. 6-19). Najpospolitsza odmiana bezleśnych torfowisk przejściowych, rozwijająca się przeważnie w środowisku bardzo silnie uwodnionym, w bezpośrednim sąsiedztwie lustra wody. Darń jest dość zwarta, lecz przy stąpaniu silnie się ugina. Początkowe stadia tego wariantu (zdj. 6-9) odznaczają się dużym udziałem *Sphagnum cuspidatum*, dzięki czemu wyraźnie nawiązują do *Sphagnetum cuspidato-obesi*. Podobne stadia inicjalne opisał Podbielkowski (1960) z dołów potorfowych. W miarę oddalania się od lustra wody, kobierzec *Sphagnum recurvi* staje się coraz bardziej zwarty. Fitocenozy tego zbiorowiska mogą rozwijać się również, w wyniku masowej inwazji *Sphagnum recurvum*, w płaty *Caricetum rostratae*.

Z roślin naczyniowych dominuje *Carex rostrata*, która pokrywa co najmniej 50% powierzchni. Z dużą stałością występują również *Eriophorum angustifolium* i *Calla palustris*. Ten ostatni gatunek wyróżnia subborealną odmianę tego zbiorowiska (Passarge 1964a). Gatunki z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* i *Oxycocco-Sphagnetea* znajdują się w wyraźnej równowadze. Ich udział zależy w mniejszej lub większej mierze od stopnia uwodnienia i troficzności siedliska. Podobne stosunki w analogicznych zbiorowiskach obserwowali Pacowski (1967) na torfowisku Wieliszewo, i Urbanek (1969) w dołach potorfowych w regionie łódzkim. Pło mszarne z turzycą dzióbkowatą jest bardzo pospolitym zbiorowiskiem torfowisk przejściowych w całej środkowej Europie, opisywanym pod różnymi nazwami (Osvald 1923; Steffen 1931; Jonas 1935; Grosser 1955; Müller-Stoll i Gruhl 1959; Passarge 1961a; 1964a; Sofron i Šandová 1972) i w zależności od punktu widzenia autora wyznaczano mu całkiem odległe pozycje systematyczne.

c. Wariant z *Phragmites australis* — pło mszarne z trzciną (tab. 29: zdj. 1-5). Jest to rzadka postać mszaru, rozwijająca się najczęściej na okrajkach torfowisk wysokich. Niekiedy może też powstać w wyniku inwazji torfowców do szuwaru trzcinowego (por. 4.4.1.). Mszar porastają wysokie, zwarte łany *Phragmites australis*. Pomędzy gatunkami minerotroficznymi i ombrotroficznymi zachowuje się wyraźna równowaga. Pło mszarne z trzciną, występujące na okrajkach torfowisk wysokich, zostaje z biegiem czasu opanowane przez kępy mszarów ombrotroficznych.

Podobną postać mszaru opisali Jasnowski i in. (1968) z torfowisk Pomorza Zachodniego. Z Węgier podobne zbiorowisko *Phragmites-Sphagnum recurvum* opisał Zolyomi (1931).

d. Wariant z *Carex lasiocarpa* — pło mszarne z turzycą nitkowatą (tab. 29: zdj. 6-12). Łany *Carex lasiocarpa* na kobiercu torfowcowym często występują w miejscach silnie uwilgotnionych. Charakterystyczne są zwłaszcza wąskie, nadwodne pasy fitocenoz tego wariantu rozwijające się na brzegach

pomostów torfowcowych. W poszczególnych płatach zbiorowisk dominuje *Carex lasiocarpa*, której towarzyszą liczne rośliny minerotroficzne. Z roślin wysokotorfowiskowych częste są *Drosera rotundifolia* i *Vaccinium oxycoccos*.

Carex lasiocarpa jest gatunkiem o bardzo szerokiej skali ekologicznej (por. Kotilainen 1927; Gorham 1950). W zależności od trofizmu siedliska wytwarza różne zbiorowiska, od skrajnie oligotroficznych (mszarnych) do eutroficznych (łąkowych). Według dawniejszych ujęć wszystkie fitocenozy z *Carex lasiocarpa* zaliczano do *Caricetum lasiocarpae* W. Koch 1926 ze związku *Eriophorion gracilis* Oberd. 1957 (Paasio 1933; Jonas 1935; Schwickerath 1942; Waldheim i Weimarck 1943; Soó 1954; Neuhausl i Neuhauslova 1965; Denisiuk 1967b; Popiołek 1972, 1974).

Zaliczenie mszarnych fitocenoz z *Carex lasiocarpa* do *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* jest florystycznie i ekologicznie w pełni uzasadnione. Niektórzy autorzy zbiorowisko to traktują jako osobny zespół *Sphagno-Caricetum lasiocarpae* Steffen 1931 (Passarge 1964a; Rybnicek 1974) lub *Carici lasiocarpae-Sphagnetum recurvi* (Soó 1954; Simon 1960).

e. Wariant z *Rhynchospora alba* — pło mszarne z przygielką białą (tab. 29: zdj. 13-14). Stwierdzony tylko w dwóch lejkach krasowych, w strefie okrajkowej torfowisk wysokich. Płaty jego wyraźnie wyodrębniają się od fitocenoz sąsiednich zbiorowisk, szczególnie w okresie kwitnienia *Rhynchospora alba*. Znaczny udział gatunków wysokotorfowiskowych świadczy o tendencjach rozwojowych tego zbiorowiska w kierunku zespołów torfowisk wysokich. Podobne fitocenozy z przygielką białą opisali Steffen (1931), Fischer (1960), Podbielkowski (1960), Jasnowski (1962), Pacowski (1967), Boiński i in. (1974).

f. Wariant z *Carex canescens* — pło mszarne z turzycą siwą (tab. 29: zdj. 15-17). Fitocenozy ze *Sphagnum recurvum* i *Carex canescens* rozwijają się w lokalnych zagłębieniach, w bezpośrednim sąsiedztwie mszarów ombrotroficznych (zdj. 15-16) lub płatów *Salicetum pentandro-cinereae* (zdj. 17). Mają one postać silnie uginającego się pła, na którym rosną liczne rośliny minerotroficzne. W płatach kontaktujących się z torfowiskami wysokimi częste są *Vaccinium oxycoccos*, *Drosera rotundifolia* i *Aulacomnium palustre*.

Jest to dość pospolite w środkowej i zachodniej Europie zbiorowisko torfowisk przejściowych. Zaliczano je zwykle do *Carici canescentis-Agrostietum caninae* (Tüxen 1937; Sukopp 1950/60; Fischer 1960). Passarge (1964a) natomiast traktuje podobne fitocenozy jako odrębny zespół *Sphagno-Caricetum canescentis*.

g. Wariant z *Juncus effusus* — pło mszarne z sitem rozpięchłym (tab. 29: zdj. 18-24). Pospolite zbiorowisko rozwijające się w strefie brzeżnej lejków krasowych, często w kontakcie z fitocenozami wariantu z *Carex rostrata*. Panujące w jego płatach duże kępy *Juncus effusus* nadają zbiorowisku osobliwą fizjonomię. Towarzyszą mu liczne gatunki z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*. Gatunki klasy *Oxycocco-Sphagnetea* są reprezentowane sporadycznie. Pod względem florystycznym i siedliskowym wariant ten

Klasa (Class): Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Rząd (Order): Scheuchzerietalia palustris
Związek (Alliance): Rhynchosporo-Sphagnion

Tabela 28
Table 28

ERIOPHORO ANGUSTIFOLII-SPHAGNETUM RECURVI M. Jasn., J. Jasn. et Mark. 1968

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Stalność (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)	
Nr zdj. w terenie (field number of record) . . .	166	301	18	302	70	35	17	33	257	60	65	120	285	173	114	121	145	20	250			
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	101	173	93	174	153	132	93	132	33	151	156	138	4	103	147	142	73	93	3			
Data (dtae)	16.8 1973	4.8 1974	20.7 1973	4.8 1974	24.7 1973	21.7 1973	20.7 1973	21.7 1973	10.7 1974	23.7 1973	24.7 1973	10.8 1973	27.7 1974	17.8 1973	10.8 1973	10.8 1973	14.8 1973	20.7 1973	28.7 1974			
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	30	30	20	20	20	20	40	10	60	30	15	25	40	30	40	40	60	40	25			
Pokrycie warstwy zielnej (cover of herbs layer)%	90	80	100	80	90	80	85	75	95	85	90	90	100	75	95	90	85	85	10			
Pokrycie warstwy mszaków (cover of moss layer) %	100	100	100	100	100	90	95	80	95	100	100	100	100	100	100	85	100	100	100			
Liczba gatunków (total number of species) . . .	18	21	20	17	17	13	10	12	13	18	17	18	17	20	19	20	16	18	14			
Wariant z (variant with)	Typowy (typical)					Carex rostrata																
I. Ch. Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi:																						
Sphagnetum recurvum	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	1.2	1.2	1.3	2.2	4.4	4.4	4.4	5.5	5.5	5.5	3.3	4.4	5.5	2.2	100	V	5921
Eriophorum angustifolium	3.2	4.3	4.3	3.3	2.2	1.1	1.1	2.1	1.1	2.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.1	.	2.1	1.1	.	89	V	1724
II. Ch. Rhynchosporo-Sphagnion:																						
Calliergon stramineum	1.2	+2	+2	+2	.	.	1.2	.	.	+2	.	1.2	+2	+2	+2	.	1.2	+	.	63	IV	109
Rhynchospora alba	1.1	.	.	.	.	1.1	.	1.1	+	.	+	+	.	.	.	+	1.1	1.1	+	42	III	81
Carex limosa	.	.	.	.	.	1.1	.	1.1	+	.	1.1	.	.	.	1.1	+	.	+	.	37	II	107
III. Ch. Scheuchzerio-Caricetea fuscae:																						
Potentilla palustris	+	+	2.1	.	.	2.2	4.3	1.1	.	.	1.2	.	2.1	2.1	2.2	1.1	.	2.2	1.1	68	IV	1619
Agrostis canina	.	.	.	.	+	.	1.1	.	.	1.1	.	1.1	2.1	+	.	1.1	+	1.1	.	47	III	225
Viola palustris	1.1	.	1.1	1.1	.	+	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	+	.	+	.	37	II	107
Carex nigra	+	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1.1	.	+	1.1	.	.	+	.	37	II	81
Epilobium palustre	.	.	.	1.1	+	.	.	.	.	.	1.1	1.1	+	.	.	+	.	.	.	32	II	80
Carex canescens	.	+	.	+	.	.	.	.	.	1.1	+	.	.	.	1.1	+	.	.	.	32	II	55
Carex lasiocarpa	.	.	1.1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	1.1	.	.	26	II	55
Menyanthes trifoliata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	2.1	.	1.1	.	.	.	1.1	21	II	145
IV. Ch. Oxyococco-Sphagnetes:																						
Drosera rotundifolia	1.1	1.1	1.1	+	1.1	.	+	.	.	+	+	+	1.1	1.1	+	1.1	+	1.1	1.1	84	V	241
Vaccinium oxycoccos	4.3	2.2	2.2	2.2	2.2	.	.	.	.	2.2	.	1.2	2.2	2.2	1.2	1.4	.	1.2	5.4	67	IV	1539
Aulacomnium palustre	+	1.2	1.2	.	+3	+	.	.	.	.	+	.	.	.	1.2	.	.	+	2.2	47	III	173
Polytrichum alpestre	2.2	1.2	1.2	+3	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	1.2	42	III	199
Eriophorum vaginatum	1.2	1.2	1.2	+2	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	1.2	.	+	.	.	.	32	II	106
Andromeda polifolia	1.1	1.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	+	+	.	.	.	.	.	32	II	106
Ledum palustre	1.1	1.1	1.1	+	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	32	II	73
V. Inne (other spp.):																						
Carex rostrata	+	1.1	1.1	2.1	2.2	1.1	2.2	4.4	5.4	3.2	3.3	4.4	5.5	3.3	4.3	4.4	3.3	3.2	3.2	100	V	3750
Calla palustris	.	.	+	1.1	3.3	1.1	+	1.1	.	2.2	3.2	.	+	2.1	2.2	2.2	2.1	+	.	74	IV	936
Lysimachia vulgaris	+	1.1	.	.	1.1	1.1	.	.	1.1	2.2	+	+	+	+	.	+	+	2.1	+	68	IV	267
Juncus effusus	.	+	.	1.1	.	1.1	+	.	.	1.2	.	1.2	.	1.2	+	+	.	1.1	.	58	III	134
Salix cinerea b	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	37	II	96
" " o	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	
Pinus sylvestris b	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	37	II	65
" " o	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	37	II	65
Polytrichum commune	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1.2	.	.	1.2	1.2	2.3	1.2	.	.	32	II	198
Molinia coerulea	.	.	1.1	.	+	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	32	II	3
Betula pubescens b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	26	II	29
" " o	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.	
Sphagnetum cuspidatum	.	.	.	.	.	4.4	5.5	3.3	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	II	1184
Drepanocladus fluitans	.	.	.	.	.	2.2	.	2.3	2.2	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	21	II	368
Galium palustre	.	.	.	1.1	2.1	.	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	21	II	145
Lysimachia thyrsoiflora	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	1.1	.	.	.	.	.	2.1	.	+	21	II	145
Peucedanum palustre	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	2.1	.	21	II	94

Gatunki sporadyczne (sporadic species): II. Scheuchzeria palustris 1; Sphagnetum obtusum 8: 2.2. III. Veronica scutellata 8 1.1. V. Ciota virosa 5: 2.1, 10, 14; Carex elata 4; Utricularia vulgaris 6: 1.1, 9: 2.2; Calamagrostis canescens 3: 1.1, 16: 1.1; Potentilla erecta 2: 1.1, 18; Calamagrostis epigeios 11, 12; Lythrum salicaria 4, 15; Sphagnetum palustre 18: 1.2, 19: 5.5; Juncus bulbosus for. fluitans 1; Sparganium minimum 4; Carex stellulata 6; Quercus robur o 6; Frangula alnus o 6; Calluna vulgaris 7; Populus tremula o 9; Scirpus sylvaticus 10.

Klasa (Class): Scheuchzerio-Caricetea fuscae
 Rząd (Order): Scheuchzerietalia palustris
 Związek (Alliance): Rhynchosporo-Sphagnion

Tabla 29
 Table 29

BRIOPHORO ANGUSTIFOLII-SPHAGNETUM RECURVI M. Jasn., J. Jasn. et Mark. 1968

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Stałość (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)	
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	15	246	136	390	48	43	31	375	388	138	27	32	137	284	283	85	147	258	386	56	28	318	320	3	122	125	126	253a			
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	90	33	51	21	54	60	132	179	21	51	130	132	51	4	4	160	57	7	23	152	130	178	131	172	142	144	145	32			
Data (date)	20.7 1973	29.8 1973	12.8 1973	11.8 1974	23.7 1973	22.7 1973	21.7 1973	10.8 1974	11.8 1974	12.8 1973	21.7 1973	21.7 1973	12.8 1973	27.7 1974	27.7 1974	26.7 1973	14.8 1973	10.7 1974	11.8 1974	23.7 1973	21.7 1973	5.8 1974	5.8 1974	17.7 1973	10.8 1973	11.8 1973	11.8 1973	10.7 1973			
Powierzchnia zdj. (area of sample plot) m ²	30	40	15	20	20	10	20	30	30	30	25	25	9	16	40	25	30	15	25	30	25	15	20	10	20	15	35	20			
Pokrycie warst. zielnej (cover of herb layer)%	65	95	75	100	60	85	100	85	100	95	60	70	75	85	90	100	85	90	80	85	85	95	90	100	80	80	75	100			
Pokrycie warst. mszystej (cover of moss layer)%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	85	100	100	85	90	90	100	100	100	95	100	100			
Liczba gatunków (total number of species) . .	19	17	22	19	15	18	22	13	9	22	19	16	20	15	19	18	16	19	18	16	21	14	10	12	11	12	14	14			
Wariant z (variant with)	Phragmites australis					Carex lasiocarpa							Rhynchospora alba		Carex canescens			Juncus effusus						Calamagrostis canescens							
I. Ch. Briophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi:																															
Sphagnum recurvum	5.5	5.5	3.3	4.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.3	5.5	5.5	3.3	5.5	5.5	5.5	3.3	4.4	5.5	4.4	5.5	5.5	5.5	4.5	3.3	3.3	4.5	5.5	100	V	7232
Eriophorum angustifolium	1.1	.	.	+	2.1	1.1	+	1.1	2.2	.	.	1.1	.	1.1	2.1	2.1	+	1.1	1.1	.	.	2.1	1.1	.	1.1	+	.	.	64	IV	475
II. Ch. Rhynchosporo-Sphagnion:																															
Calliergon stramineum	1.2	.	1.2	1.2	.	1.3	1.2	.	.	.	+	1.2	.	1.2	+	.	.	.	+	.	.	.	+	1.2	.	.	.	.	47	III	145
Rhynchospora alba	+	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	+	3.3	3.2	1.1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	2.2	.	.	27	II	288
Sphagnum platyphyllum	.	.	2.2	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	I	205
Carex limosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	1.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	I	54
Sphagnum teres	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	2.2	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	I	54
III. Ch. Scheuchzerio-Caricetea fuscae:																															
Agrostis canina	.	+	1.1	1.1	1.1	1.1	+	2.1	1.1	.	1.1	.	.	+	1.1	1.1	.	2.1	1.1	.	+	+	1.1	1.1	1.1	2.1	.	.	71	IV	403
Potentilla palustris	+	2.2	2.1	2.2	1.1	2.2	.	1.1	1.1	+	1.1	1.1	2.2	.	+	.	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1	.	1.1	.	.	1.1	2.1	.	68	IV	520
Carex lasiocarpa	1.1	.	.	.	.	3.3	4.3	4.3	4.4	4.4	3.2	3.2	1.1	.	1.1	+	.	2.2	+	1.1	1.1	.	1.1	.	1.1	1.1	2.2	.	64	IV	1510
Menyanthes trifoliata	1.1	+	.	2.2	.	1.1	+	.	.	1.1	.	.	1.1	.	1.1	+	1.1	2.2	1.1	+	.	.	.	.	1.1	.	.	.	50	III	280
Carex canescens	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	5.5	3.2	3.2	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	II	600
Viola palustris	.	+	.	.	.	.	.	1.1	.	.	+	.	1.1	.	1.1	.	.	1.1	.	.	.	1.1	+	.	.	.	.	+	29	II	73
Epilobium palustre	.	+	+	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	II	20
Calamagrostis stricta	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	I	1
Carex nigra	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	I	18
IV. Ch. Oxycocco-Sphagnetum:																															
Drosera rotundifolia	2.1	.	1.1	1.1	.	1.1	+	.	+	1.1	+	+	1.1	1.1	1.1	+	+	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	57	III	190
Vaccinium oxycoccos	.	3.3	3.2	1.2	.	3.3	1.2	2.2	.	2.2	2.2	2.2	+	2.2	3.2	2.2	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	III	831
Aulacomnium palustre	1.2	.	1.2	.	.	+	1.3	.	.	+	.	.	+	.	+	+	.	.	2.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	26	II	55
Eriophorum vaginatum	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	2.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	14	I	205
V. Ch. Phragmitetum:																															
Carex rostrata	1.1	2.2	.	+	.	.	+	1.1	.	.	1.1	+	+	1.1	1.1	+	.	+	1.1	.	+	.	1.1	2.2	1.1	.	.	.	57	III	252
Lysimachia thyrsiflora	.	1.1	+	1.1	.	.	+	.	.	+	1.1	+	.	.	+	+	.	1.1	1.1	.	+	.	1.1	.	.	.	.	.	46	III	90
Peucedanum palustre	+	.	.	1.1	1.1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	1.1	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	36	II	56
Phragmites australis	4.4	4.4	4.3	5.5	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	25	II	1045
Galium palustre	.	1.1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	+	1.1	.	1.1	.	1.1	.	.	.	.	.	.	25	II	117
Typha latifolia	+	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	25	II	65
Cicuta virosa	.	.	.	1.1	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	14	I	153
Scutellaria galericulata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	14	I	19
Equisetum fluviatile	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	14	I	1
Lycopus europaeus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	11	I	18
VI. Inne (other spp.):																															
Lysimachia vulgaris	+	+	+	.	+	1.1	.	1.1	1.1	+	.	+	.	.	+	2.1	+	1.1	+	1.1	2.1										

Gatunki sporadyczne (sporadic species): III. Sphagnum riparium 3; 1.2; Carex flava 10; Sphagnum warnstorffii 10; 1.2; Triglochin palustre 13; Juncus articulatus 13; Stellaria palustris 18, 28; 1.1.

IV. Polytrichum alpestre 1; 2.2; Andromeda polifolia 2; 1.1; Sphagnum magellanicum 13; Vaccinium uliginosum 1; 1.1.

V. Oenanthe aquatica 12, 28; Iris pseudacorus 23, 25; Carex paniculata 5; Glycyrrhiza fluitans 25, 27; 1.1; Carex vesicaria 25.

VI. Sphagnum palustre 3; 2.2, 27; 1.3; Cirsium palustre 3; Sorbus aucuparia o 3; Thelypteris palustris 4; 1.1; Philonotis fontana 5; Scorpidium scorpioides 10; Eupatorium cannabinum 10, 13; Utricularia minor 17; Drepanocladus fluitans 17, 24; Vaccinium myrtillus 25; Ranunculus flammula 26; Sphagnum fimbriatum 27; Lythrum salicaria 25; Deschampsia cespitosa 27; Quercus robur o 27; Calliergon giganteum 28.

jest zbliżony do zbiorowiska *Sphagnum apiculatum*-*Juncus effusus* opisanego z dołów potorfowych przez Pacowskiego (1967) i Urbanek (1969). Z Europy zachodniej podobne zbiorowisko wymieniają Jonas (1935), Grosser (1955) i Passarge (1964a). W obszarze atlantyckim Europy zachodniej występuje zastępcze zbiorowisko z *Juncus acutiflorus* (Schwickerath 1944).

h. Wariant z *Calamagrostis canescens* – pło mszarne z trzcinnikiem (tab. 29: zdj. 25-28). Płaty reprezentujące ten wariant rozwijają się w kilku lejkach krasowych w miejscach suchszych, wyniesionych nad poziom wody. Na jednym tylko stanowisku tworzą silnie uginające się, podtopione pło na wyspie torfowcowej położonej w centralnej części lejka krasowego.

W warstwie zielnej poza *Calamagrostis canescens* dominują gatunki minerotroficzne. Gatunki klasy *Oxycocco-Sphagnetea* nie występują prawie w ogóle. W bezpośrednim sąsiedztwie płatów tego zbiorowiska występują zarośla wierzbowe (*Salicetum pentandro-cinereae*), które zwolna je opanowują. Sam trzcinnik lancetowaty jest gatunkiem charakterystycznym dla *Alnion glutinosae*. O podobnym zbiorowisku z *Calamagrostis canescens* w dołach potorfowych pisze Podbielkowski (1960).

i. *Eriophoro angustifolii*-*Sphagnetum recurvi betuletosum* – pło mszarne brzozowo-sosnowe (tab. 30: zdj. 1-8). Pło mszarne brzozowo-sosnowe występuje na obrzeżach wielu śródleśnych lejków krasowych. W porównaniu z mszarami bezleśnymi, siedliska na których rozwijają się płaty tego zbiorowiska odznaczają się znacznym podsuszeniem. Zbiorowisko ma charakter zarośli, w których formy drzewiaste osiągają 2-4 m wysokości. Dominują *Betula pubescens* i *Pinus sylvestris*. W warstwie zielnej przeważają gatunki *Oxycocco-Sphagnetea*. Gatunki minerotroficzne odgrywają mniejszą rolę, a warstwę mszystą tworzą masowo rosnące *Sphagnum palustre*, *S. recurvum* i *Polytrichum commune*. Mszar minerotroficzny brzozowo-sosnowy występuje pospolicie na torfowiskach przejściowych w pasie nadbałtyckim Polski (Jasnowski i in. 1968). Podobne zbiorowisko opisał również Passarge (1964b).

k. Wariant z *Polytrichum commune* – pło mszarne płonnikowe (tab. 30: zdj. 9-13). Rozwija się ono na zatorfionych brzegach lejków krasowych, gdzie pod płytką warstwą torfu zalega podłoże mineralne. Siedlisko odznacza się znacznym podsuszeniem. Od typowej postaci podzespołu, fitocenozy omawianego wariantu różni się obecnością potężnych kęp *Polytrichum commune* for. *uliginosum*. Pojedyncze osobniki tej modyfikacji siedliskowej płonnika pospolitego mogą osiągać długość do 50 cm. *Sphagnum recurvum* odgrywa mniejszą rolę, ustępując miejsca *S. palustre*. W warstwie zielnej zaznacza się równowaga między gatunkami minerotroficznymi i ombrotroficznymi. Interesujący jest udział *Lycopodium annotinum*, gatunku charakterystycznego dla *Betuletum pubescentis* R. Tx. 1937.

Obydwa wyżej opisane warianty mszaru sosnowo-brzozowego stanowią fazę poprzedzającą rozwój bagiennego lasu brzozowego (*Betuletum pubescentis*), który występuje pospolicie na torfowiskach przejściowych (Passarge i Hofmann 1968).

Klasa (Class): Scheuchzerio-Carioetea fuscae
 Rząd (Order): Scheuchzerietalia palustris
 Związek (Alliance): Rhynchosporo-Sphagnion

Tabela 30
 Table 30

ERIOPHORO ANGUSTIFOLII-SPHAGNETUM RECURVI BETULetosum M. Jasn., J. Jasn. et Mark. 1968

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Stałość (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	38	146	13	42	394	389	207	226	102	344	345	62	349		
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	80	70	176	60	27	21	112	24	157	138	144	151	139		
Data (date)	22-7 1973	14-8 1973	19-7 1973	22-7 1973	11-8 1974	11-8 1974	21-8 1973	25-8 1973	9-8 1973	7-8 1974	7-8 1974	23-7 1974	7-8 1974		
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	100	80	100	100	40	60	60	100	50	50	80	80	50		
Pokrycie warstwy b (cover of b.) %	70	50	60	60	55	50	75	50	75	60	60	80	60		
Pokrycie warstwy s (cover of s.) %	70	90	40	70	100	100	85	90	60	50	70	75	60		
Pokrycie warstwy d (cover of d.) %	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100		
Liczba gatunków (total number of species) . .	23	16	25	15	18	16	21	24	28	21	27	23	23		
Wariant z (variant with)	Typowy (typical)													Polytrichum commune	
I. Ch. Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi:															
Sphagnetum recurvum	5.5	5.5	5.5	4.4	5.5	5.5	5.5	5.5	3.3	2.2	2.2	1.2	3.3	100 V	6077
Eriophorum angustifolium	.	.	1.1	.	1.1	1.1	.	.	+	1.1	+	.	+	62 IV	156
II. D. Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi betuletosum:															
Betula pubescens b	3.2	3.2	2.2	3.2	3.3	2.2	3.2	2.2	2.2	3.3	3.2	3.2	3.3	100 V	3291
" o	1.1	.	+	1.1	2.2	1.1	1.1	1.1	+	1.1	+	+	1.1	100 V	1256
Pinus sylvestris b	2.2	+	+	1.1	2.2	2.2	2.2	3.2	2.2	2.2	1.2	+	+	100 V	2442
" o	1.1	.	+	.	1.1	1.1	.	.	+	+	+	+	+	85 V	636
Polytrichum commune	1.2	2.2	1.2	.	2.2	.	1.2	1.2	3.3	4.4	4.4	3.3	4.4	54 III	2442
Sphagnetum palustre	2.2	.	.	.	.	.	+	1.2	+	2.2	1.2	3.3	.	23 II	636
III. Ch. Scheuchzerio-Carioetea fuscae:															
Potentilla palustris	1.1	.	+	+	1.1	2.1	+	2.2	+	+	+	1.1	1.1	77 IV	217
Carex lasiocarpa	.	+	1.1	.	1.1	1.1	1.1	2.2	+	1.1	1.1	1.1	.	69 IV	291
Agrostis canina	.	+	1.1	.	1.1	1.2	1.1	1.1	+	1.1	1.1	1.1	.	62 IV	270
Calliergon stramineum	.	+	+	1.1	1.2	1.2	.	.	+	+	1.2	+	.	54 III	119
Carex nigra	+	.	+	1.1	.	.	3.2	+	+	+	+	2.1	+	38 III	177
Menyanthes trifoliata	.	.	1.1	.	.	.	+	+	1.1	.	.	+	+	38 III	367
Rhynchospora alba	.	.	1.1	1.1	1.1	+	+	+	1.1	.	.	.	+	31 II	117
Carex canescens	.	1.1	+	1.2	1.1	.	.	.	1.2	.	.	.	+	31 II	117
Sphagnetum teres	.	.	+	1.2	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	23 II	77

IV. Ch. Oxyococco-Sphagnetes:																
<i>Vaccinium oxyococco</i>	2.2	+	2.3	3.3	2.2	2.2	1.1	3.2	1.1	+	2.2	+	77	IV	1404	
<i>Brodiaea rotundifolia</i>	1.1	+	1.1		2.1		+	+	+	+	+		77	IV	217	
<i>Eriophorum vaginatum</i>	2.2	1.2	2.2	2.2	4.2		3.2	1.2	+	1.2	1.2	+2	62	IV	1288	
<i>Anacamptis palustre</i>					1.3		1.2		+				54	III	118	
<i>Ledum palustre</i>	+		1.1			3.2		1.1	+				46	III	405	
<i>Polytrichum alpestre</i>	1.2		2.3		1.2				+	1.2		1.2	46	III	289	
<i>Androseda polifolia</i>		+		1.1			2.1					+	23	II	173	
V. Imne (other spp.):																
<i>Carex rostrata</i>	3.2	3.2		1.1	1.1			+	+	+	+	+	77	IV	658	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+	+	2.2	2.2			1.1	1.1	1.2	+	1.1	+	69	IV	82	
<i>Juncus effusus</i>			1.2			1.1	+	1.2	+	+			54	III	348	
<i>Frangula alnus</i> b										+		+	54	III	156	
o										+		+				
<i>Calla palustris</i>		3.2	1.1	1.1				+		+	+	+	46	III	367	
<i>Vaccinium myrtillus</i>			1.1					1.1	1.1	+		1.1	46	III	155	
<i>Quercus robur</i> b	+	+	1.1					+	+	+		+	46	III	6	
<i>Salix cinerea</i> b	+	+						+	+	+		+	38	II	175	
<i>Alnus glutinosa</i> b		+	1.2					1.1	+	+	2.2		31	II	242	
<i>Lycopodium annotinum</i>			1.1	+	2.1			1.1		2.2	1.1	2.2	23	II	307	
<i>Pleurozium schreberi</i>	+										1.2	+	23	II	40	
<i>Molinia caerulea</i>											1.1	+	23	II	40	
<i>Pseudoanum palustre</i>			1.1									+	23	II	40	
<i>Sorbus aucuparia</i> b		+	+					+	+	+		+	23	II	2	

Gatunki sporedyosne (apordic species): III. Pohlia nutans var. sphagnetorum 1, 10; IV. Epilobium palustre 2; Sphagnum magellanicum 1: 1.2; Cephalosia connivens 11; Gymnocoles inflata 11.
V. Betula pendula b 7: 2.1, 12; Calamagrostis canescens 10: 1.1, 11; Picea abies b 1; Calluna vulgaris 1, 5; Lycopodium europaeum 1; Thelypteris palustris 5, 8; Populus tremula o 3, 12; Potentilla erecta 7, 8; Dryopteris carthusiana 7, 13; Salix aurita b 8; Lysimachia thyriflora 9: 1.1; Melampyrum pratense 13; Sphagnum centrale 7: 1.2; Lepidoxia reptans 13.

Torfowiska wysokie, stanowiące końcowe stadia zarastania lejków krasowych, są dość pospolite w badanym terenie. Największe z nich, położone między Pociuszką a Golejowem, ma powierzchnię ponad 1 ha. W przeszłości było ich tu znacznie więcej. Eksploatacja torfu na skalę przemysłową w końcu XIX i na początku XX wieku spowodowała jednak zupełne zniszczenie mszarów ombrotroficznych w licznych lejkach krasowych. Olbrzymie doły po wybranym torfie wypełniły wody gruntowe i opadowe. W ten sposób powstały mniejsze lub większe jeziora, które z powrotem zarastają.

Sphagnetum magellanici boreale M. Jasn., J. Jasn. i Mark. 1968 — mszar kępowo-dolinkowy (tab. 31)

Wszystkie mszary ombrotroficzne w okolicach Staszowa, pomimo swego znacznego zróżnicowania florystycznego i ekologicznego, należą do jednego zespołu *Sphagnetum magellanici boreale*.

Pozycja systematyczna mszarów kępowo-dolinkowych była i jest nadal przedmiotem licznych dyskusji. W dawniejszych pracach ujmowano je jako jeden zespół *Sphagnetum medii et rubelli*, o szerokim zasięgu geograficznym obejmującym całą Europę. Schwickerath (1940, 1954) w obrębie tak szeroko pojętego zespołu wyróżnia odmiany geograficzne: atlantycką, północno-atlantycką i borealno-alpejską. R. Tüxen (1962) i J. Tüxen (1969) ujmują mszar kępowo-dolinkowy w rzędzie *Erico-Sphagnetalia*, Oberdorfer (1957) w *Ledetalia palustris*, a Moore (1968) w rzędzie *Sphagnetalia magellanici*. Najbardziej odpowiednią dla polskich warunków klasyfikację przyjmują Jasnowski i in. (1968). Dzielią oni szeroko pojmowany zespół *Sphagnetum medii et rubelli* na *Sphagnetum magellanici subatlanticum* i *Sphagnetum magellanici boreale*, które zaliczają do *Sphagnetalia fusci* R. Tx. 1955.

Sphagnetum magellanici boreale jest zespołem szeroko u nas rozprzestrzenionym i wielokrotnie opisywanym pod nazwą *Sphagnetum medii et rubelli*. Szczególnie często występuje w Polsce północnej (Jasnowski 1962; Pacowski 1967; Sobotka 1967; Olkowski 1972; Boiński i in. 1974). Ze środkowej i południowej Polski podali go m. in. Kleist (1929), Fijałkowski (1959, 1960), Kozak (1968), Fijałkowski i Kozak (1970).

W badanym terenie *Sphagnetum magellanici boreale* wykazuje znaczne zróżnicowanie, zarówno florystyczne, jak i ekologiczne. Dało to podstawę do wyróżnienia w jego obrębie dwóch podzespółów i kilku wariantów.

a. *Sphagnetum magellanici sphagnetosum recurvi* — mszar kępowo-dywanowy (tab. 31: zdj. 1-8). Podzespół ten jest najpospolitszą i główną aktualnie odmianą *Sphagnetum magellanici boreale*, zarówno w badanym terenie, jak i w całej Polsce. Jest to płaski, dywanowy mszar, zbudowany głównie ze *Sphagnum recurvum*, z rzadko rozrzuconymi, słabo wypiętrzonymi kępami *Sphagnum magellanicum*. Jego płyty rozwijają się w warunkach silnego uwodnienia. Poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości 1-25 cm. Rozwija

Klasa (Class): Oxycocco-Sphagnetes
Rząd (Order): Sphagnetales fusc
Związek (Alliance): Sphagnion fusc

SPHAGNETUM MAGELLANICI BOREALE M. Jasn., J. Jasn. et Mark. 1968

Tabela 31
Table 31

Nr zdj. w tabeli (table number of record)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Stałość (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)	
Nr zdj. w terenie (field number of record)	228	75	78a	188	317	190	203	140	202	113	396	186	76	191	165	201	233	98	179a	77	204	210	231			
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole) . .	21	168	168	120	84	119	114	51	114	147	20	128	168	115	101	116	105	149	122	168	114	113	106			
Data (date)	25.8 1973	25.7 1973	25.7 1973	19.8 1973	21.8 1974	20.8 1973	21.8 1973	12.8 1973	21.8 1973	10.8 1973	11.8 1974	18.8 1973	25.7 1973	19.8 1973	16.8 1973	20.8 1973	26.8 1973	9.8 1973	18.8 1973	25.7 1973	21.8 1973	23.8 1973	26.8 1973			
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot):m ² . .	30	10	25	30	20	20	30	35	30	40	25	20	20	30	10	20	40	40	80	20	40	25	20			
Pokrycie warstwy krzewów (cover of shrubs layer) %	10	0	0	0	5	20	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	40	50	50	40	45	80	40			
Pokrycie warstwy zielnej (cover of herbs layer) %	50	70	80	90	30	90	90	40	80	75	80	90	85	90	80	100	100	85	80	60	95	75	80			
Pokrycie warstwy mszystej (cover of moss layer) %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95			
Liczba gatunków (total number of species)	14	13	10	17	16	21	18	14	14	17	12	20	14	15	13	11	23	22	29	17	18	22	23			
Podzespół (subassociation)	sphagnetosum recurvi																pinetosum									
Wariant z (variant with)	typowy (typical)								Eriophorum vaginatum								Ledum palustre									
I. Ch. Sphagnetum magellanicum boreale: Sphagnetum magellanicum	4.4	4.3	4.4	4.4	2.2	4.4	3.3	3.3	3.4	2.2	2.2	.	+2	1.2	.	1.2	5.5	2.2	3.3	2.2	3.3	3.3	4.4	91	V	3250
II. D. Sphagnetum magellanicum sphagnetosum recurvi (+), S. magellanicum pinetosum:																										
+ Sphagnetum recurvum	1.2	2.2	1.2	2.2	4.4	3.3	2.2	3.3	3.3	4.4	2.2	4.4	5.5	4.4	4.4	1.2	4.4	3.2	3.3	2.2	3.3	2.2	.	96	V	3620
+ Eriophorum angustifolium	1.1	+	+	1.1	2.2	.	.	1.1	.	+	.	.	1.1	.	.	+	.	3.2	2.2	3.2	4.3	3.2	2.2	44	III	165
Pinus sylvestris b	1.1	.	.	.	+	+	.	.	.	1.1	+	.	.	.	1.1	.	3.3	3.2	2.2	3.2	4.3	3.2	2.2	65	IV	1188
" c	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	3.2	2.2	3.2	4.3	3.2	2.2	48	III	687
Ledum palustre	1.1	.	.	.	+	+	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	2.2	3.2	2.2	3.2	4.3	3.2	2.2	22	II	120
Pleurozium schreberi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	3.2	2.2	3.2	4.3	3.2	2.2	22	II	66
Vaccinium uliginosum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1.2	1.2	.	1.2	+			
III. Ch. Sphagnetalia fusci:																										
Eriophorum vaginatum	.	1.2	1.2	.	.	1.3	2.2	1.2	3.3	3.2	3.3	2.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	2.2	1.2	2.2	2.2	.	.	78	IV	1794
Dicranum affine	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	13	I	23
Cephalozia connivens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	9	I	1
IV. Ch. Oxycocco-Sphagnetes:																										
Vaccinium oxycoccos	3.2	3.2	4.3	4.3	2.2	3.3	3.3	2.2	2.2	2.2	3.2	3.3	2.2	3.3	3.2	.	2.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	.	96	V	3120
Drosera rotundifolia	+	2.2	+	1.1	1.1	+	+	1.1	+	+	.	1.1	2.1	.	1.1	+	+	1.1	1.1	2.1	1.1	1.1	1.1	91	V	449
Polytrichum alpestre	1.2	2.2	2.2	1.2	1.2	.	1.2	1.2	2.2	1.2	1.2	2.2	+	.	1.2	.	1.2	2.2	1.2	2.2	1.2	3.2	.	83	V	783
Aulacomnium palustre	.	1.2	1.2	+	+	+	2.2	+	1.2	+	1.2	1.2	.	.	+	.	+	1.2	1.2	1.2	1.2	2.2	+	83	V	276
Andromeda polifolia	2.1	1.1	+	2.2	1.1	+	+	+	+	+	1.1	.	.	.	+	.	.	1.1	1.1	2.1	.	2.2	.	70	IV	416
Sphagnetum nemoreum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	2.2	1.2	1.3	22	II	45
V. Ch. Scheuchzeria-Caricetea fuscae:																										
Agrostis canina	.	.	.	1.1	+	1.1	.	.	.	.	.	2.1	.	1.1	2.1	.	.	1.1	.	.	.	1.1	.	35	II	261
Calliergon stramineum	.	.	.	1.3	1.2	.	1.2	.	.	.	.	.	+	1.2	1.2	.	.	.	1.2	.	.	.	.	35	II	152
Menyanthes trifoliata	+	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	.	1.1	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	II	121
Potentilla palustris	.	.	.	+	.	.	1.1	.	.	.	.	1.1	1.1	1.1	.	+	.	1.1	.	.	.	.	.	30	II	110
Carex lasiocarpa	2.2	.	.	+	.	.	.	+	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	2.2	2.2	.	26	II	251
Carex nigra	.	.	.	2.1	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	2.1	.	.	+	+	26	II	197
Rhynchospora alba	1.1	.	.	+	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	26	II	142
Carex canescens	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	26	II	3
VI. Inne (other spp.):																										
Carex rostrata	1.1	.	.	2.2	1.1	1.1	+	.	2.1	1.1	.	1.1	+	.	+	2.2	+	2.2	2.2	2.1	+	1.1	.	74	IV	535
Betula pubescens b	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	+	.	+	2.2	.	1.1	1.1	.	+	39	II	123
" o	.	+	.	.	.	.	+	.	+	.	1.1	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	39	II	26
Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	1.1	.	.	+	1.1	30	II	67
Alnus glutinosa b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Betula pendula b	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	+	.	+	22	II	78
" o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Frangula alnus o	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	17	I	2
Sphagnetum palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	1.2	.	1.2	.	.	17	I	228
Calla palustris	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	+	2.1	.	.	.	.	.	17	I	99
Polytrichum commune	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	1.2	.	.	.	1.2	.	.	1.2	.	.	.	.	17	I	87
Peucedanum palustre	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	I	23
Typha latifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	17	I	2
Gatunki sporadyczne (sporadic species): IV. Mylia anomala 17, 21, 22; Sphagnetum papillosum 6, 9; V. Viola palustris 6: 1.1, 12, 23; Carex limosa 1: 1.1, 8; Carex diandra 13; Epilobium palustre 14; Pohlia nutans var. sphagnetorum 17, 22; Triglochin palustre 2; Sphagnetum subsecundum 23: 1.2; Juncus effusus 14, 17, 23: 1.2; Vaccinium myrtillus 10, 17, 18; Calluna vulgaris 6, 18, 19; Potentilla erecta 6, 23; Salix cinerea o 10, 18; Molinia caerulea 13, 23; Carex pseudocyperus 2; Lysimachia thyrsoiflora 4, 13; Phragmites australis 7: 3.3; Salix alba o 12; Deschampsia caespitosa 12; Carex elata 14; Vaccinium vitis-idaea 8; Salix aurita c 17; Quercus robur o 18; Populus tremula c 18; Dicranum polysetum 18, 20; Drepanocladus exannulatus 14; Plagiothecium laetum 22; Sphagnetum centrale 23; Cladonia sylvatica 17: 1.2, 23.																										

Gatunki sporadyczne (sporadic species): IV. Mylia anomala 17, 21, 22; Sphagnetum papillosum 6, 9; V. Viola palustris 6: 1.1, 12, 23; Carex limosa 1: 1.1, 8; Carex diandra 13; Epilobium palustre 14; Pohlia nutans var. sphagnetorum 17, 22; Triglochin palustre 2; Sphagnetum subsecundum 23: 1.2; Juncus effusus 14, 17, 23: 1.2; Vaccinium myrtillus 10, 17, 18; Calluna vulgaris 6, 18, 19; Potentilla erecta 6, 23; Salix cinerea c 10, 18; Molinia caerulea 13, 23; Carex pseudocyperus 2; Lysimachia thyrsiflora 4, 13; Phragmites australis 7: 3.3; Salix alba o 12; Deschampsia caespitosa 12; Carex elata 14; Vaccinium vitis-idaea 8; Salix aurita c 17; Quercus robur o 18; Populus tremula c 18; Dicranum polysetum 18, 20; Drepanocladus exannulatus 14; Plagiothecium laetum 22; Sphagnetum centrale 23; Cladonia sylvatica 17: 1.2, 23.

się za pasem minerotroficznych mszarów przejściowych z rzędu *Scheuchzerietalia palustris*. Stanowi on naturalne stadium sukcesyjne mszarów ombrotroficznych, tworzące się na miejscu mszarów minerotroficznych. Świadczy o tym zarówno ich przestrzenne rozmieszczenie, jak też obecność płatów przejściowych. Gatunkami wyróżniającymi podzespół są *Sphagnum recurvum* i *Eriophorum angustifolium*. Inne rośliny minerotroficzne odgrywają niewielką rolę. Główny udział w tworzeniu płatów tego mszaru przypada gatunkom klasy *Oxycocco-Sphagnetea*.

W wyniku zaburzeń hydrologicznych siedliska, mszar kępowo-dywanowy może przekształcić się w inne warianty, a w przypadku masowej ekspansji form drzewiastych przekształca się w podzespół *Sphagnetum magellanici pinetosum*.

Sphagnetum magellanici sphagnetosum recurvi często opisywano jako osobny zespół *Eriophoro (vaginati)-Sphagnetum recurvi* (Hueck 1938; Fischer 1960; Görs 1961, 1968; Müller-Stoll i Neubauer 1965; Tomaszewicz 1977a) lub jako „Recurvum-Moor”. (Hueck 1925).

b. Wariant z *Eriophorum vaginatum* — mszar wełniankowy (tab. 31: zdj. 9-16). Jest to pospolita odmiana mszaru kępowo-dywanowego, odróżniająca się od postaci typowej masowym panowaniem dużych kęp wełnianki pochwowatej (*Eriophorum vaginatum*). W niektórych lejkach krasowych mszar wełniankowy zajmuje całą ich powierzchnię. Do jego powstania dochodzi najczęściej w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych, co jest przeważnie związane z letnim osuszaniem siedlisk. Podobną postać mszaru wełniankowego opisali u nas między innymi Fijałkowski (1959), Jasnowski (1962), Urbanek (1969), Popiołek (1974), Pałczyński (1975).

c. *Sphagnetum magellanici pinetosum* wariant z *Ledum palustre* — mszar bagnowy (tab. 31: 17-23). Jest to dość częsty w badanym terenie mszar, zajmujący niekiedy znaczne powierzchnie w centralnych partiach torfowisk (ryc. 12). Rozwija się w wyniku naturalnego osuszenia mszaru kępowo-dywanowego i masowej inwazji sosny. Jest to sosna karłowata, rzadko przekraczająca 4 m wysokości i 10 cm średnicy pnia u nasady. Forma sosny stanowi podstawowe kryterium pozwalające na poprawne odróżnienie mszaru sosnowego lub jego wariantów od boru bagiennego (*Vaccinio uliginosio-Pinetum*). W tym ostatnim panuje sosna wysoka, określana jako *Pinus sylvestris* for. *uliginosa* (Müller-Stoll i Neubauer 1965).

Mszar sosnowy wyróżniają: *Ledum palustre*, *Vaccinium uliginosum*, *Pleurozium schreberi*. Pojawiają się również porosty: *Cladonia sylvatica*, *C. rangiferina*, a także mech *Dicranum polysetum*. Brak jest prawie zupełnie roślin charakterystycznych dla torfowisk przejściowych, co wiąże się z większym osuszeniem siedliska.

W badanym terenie mszar sosnowy występuje w odmianie z *Ledum palustre*. Charakteryzuje się ona masowym występowaniem bagna zwyczajnego, tworzącego gęste, trudne do przebycia zarośla pomiędzy karłowatymi sosnami. Mszar bagnowy jest dojrzałym stadium procesu obsychania torfowiska.

Mszary ze stałą obecnością sosny i dużym jej zwarciem opisywali między innymi Steffen (1931), Kulczyński (1939/40), Matuszkiewicz (1952), Sokołowski (1963, 1969), Pacowski (1967), Jasnowski i in. (1968), Boiński i in. (1974).

4.6. ZBIOROWISKA ROŚLINNE OBRZEŻEŃ LEJKÓW KRASOWYCH

Na obrzeżach niektórych lejków krasowych o płaskich brzegach, położonych wśród pól i w lasach, rozwijają się niekiedy wąskim pasem płaty zbiorowisk roślinnych związanych ekologicznie ze zbiorowiskami biorącymi bezpośredni udział w procesie zarastania. Są to antropogeniczne zbiorowiska łąkowe ze związku *Calthion*, powstałe w wyniku destrukcyjnego wpływu człowieka na zbiorowiska szuwarowe oraz na wpół naturalne zbiorowiska murawowe z rzędu *Nardetalia*, rosnące na podsychających brzegach torfowisk wysokich.

4.6.1. ANTROPOGENICZNE ZBIOROWISKA ŁAKOWE (*CALTHION PALUSTRIS*)

Zbiorowisko *Scirpus sylvaticus* – zbiorowisko sitowia leśnego (tab. 32)

W dwóch śródpolnych lejkach krasowych w Maleńcu i w Czajkowie, na siedliskach silnie podmokłych, występują niewielkie skupienia *Scirpus sylvaticus*. Zajmują one płytkie, lekko kwaśne gleby mułowo-torfowe. Woda znajduje się tuż pod powierzchnią.

Bardzo szczupły materiał zdjęciowy nie pozwala na ściśle zaklasyfikowanie omawianego zbiorowiska do któregoś z zespołów ze związku *Calthion palustris*. Swym składem florystycznym najbardziej zbliża się ono do *Scirpetum sylvatici* Schwick 1944 (= *Polygono-Scirpetum sylvatici* Oberd. 1957), wielokrotnie opisywanego z Polski (Jasnowski 1962; Kępczyński 1965; Fałiński 1966; Urbanek 1969; Hereźniak 1972). Podobne zbiorowisko *Scirpus sylvaticus* opisali także Ralski (1931) z Babiej Góry, Kornaś i Medwecka-Kornaś (1967) z Gorców, Görs (1968) z Badenii i Wirtembergii.

Epilobio-Juncetum effusi Oberd. 1957 – sitowisko (tab. 32)

Zbiorowisko roślinne, w którym gatunkiem panującym i wyciskającym charakterystyczne piętno na fizjonomii jest *Juncus effusus*, należy do rzadkich w badanym terenie. Jego fitocenozy zostały stwierdzone tylko w kilku śródpolnych lejkach, w Woli Wiśniowskiej i w Maleńcu. Rozwój ich jest ściśle uzależniony od wypasu bydła na okrajach torfowisk niskich. Pasące się bydło niszczy strukturę gleby i pogarsza jej aerację. W takich warunkach, dzięki szczególnym cechom budowy anatomicznej, sit rozpieczęły znajduje dogodne warunki dla swej egzystencji.

Płaty zespołu wykształcają się na eutroficznych glebach bagiennych, wytworzonych z torfu turzycowego. Są one podmokłe i nieco zakwaszone.

Klasa (Class): Molinio-Arrhenatheretea
 Rząd (Order): Molinietales
 Związek (Alliance): Calthion palustris

Tabela 32
 Table 32

A. EPILOBIO-JUNCETUM EFFUSI Oberd. 1957

B. Zbirowisko (Community) SCIRPUS SYLVATICUS

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	6
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	366	198	286	193	189	227
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	4	116	4	115	119	10
Data (date)	9.8 1974	20.8 1973	27.7 1974	20.8 1973	19.8 1973	25.8 1973
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	30	100	40	25	25	20
Pokrycie roślinności (total plant cover) % . .	100	100	100	100	100	100
pH gleby (pH of soil)	6,0	6,0	6,5	6,0	6,5	6,5
Liczba gatunków (total number of species) . .	37	26	29	38	29	31
Zespół (association)	A				B	
I. Ch. D. Epilobio-Juncetum effusi:						
Juncus effusus	3.3	5.5	4.4	4.3	+	+
Epilobium palustre	1.1	1.1	1.1	+	.	.
Juncus articulatus	1.1	.	1.1	1.1	+	+
II. Ch. Calthion palustris:						
Myosotis scorpioides	+	1.1	+	.	.	+
Lotus uliginosus	+	1.1	+	.	.	.
Scirpus sylvaticus	.	+	+	+	5.5	4.4
Caltha palustris	+	.	.	.	1.1	+
Trifolium hybridum	.	+	.	.	.	+
III. Ch. Molinio-Arrhenatheretea:						
Climacium dendroides	1.2	+2	1.2	1.1	+	.
Lythrum salicaria	.	1.1	+	.	.	.
Lysimachia vulgaris	+	1.1	+	.	+	2.1
Ranunculus acris	.	+	1.1	+	+	1.1
Holcus lanatus	.	+	+	.	.	1.1
Rumex acetosa	.	.	.	.	+	+
Achillea ptarmica	.	.	.	.	+	+
Equisetum palustre	.	.	.	.	+	+
Centaurea jacea	.	.	.	.	+	+
IV. Inne (other spp.):						
Galium palustre	1.1	1.1	2.2	1.1	1.1	+
Ranunculus flammula	1.1	+	+	2.1	.	+
Potentilla palustris	+	.	2.1	+	+	+
Viola palustris	1.1	.	1.1	+	.	+
Carex rostrata	.	+	1.1	+	.	+
Iris pseudacorus	+	+	.	+	+	+
Potentilla erecta	1.1	.	+	.	+	+
Lycopus europaeus	.	+	.	.	.	+
Agrostis canina	.	.	+	.	1.1	1.1
Mentha arvensis	.	.	.	.	1.1	1.1
Drepanocladus aduncus	2.2	.	1.2	.	.	.
Carex canescens	2.1	+	.	.	.	.
Carex stellulata	.	.	1.1	.	.	.
Carex flava	1.1	.	+	.	.	.
Lysimachia thyrsiflora	.	1.1	.	+	.	.
Sphagnum recurvum	+2	.	.	+2	.	.
Parnassia palustris	.	+	+	.	.	.
Ranunculus repens	.	+	+	.	.	.
Veronica scutellata	+	.	.	+	.	.
Stellaria palustris	+	.	.	+	.	+
Bidens tripartita	.	+	.	+	.	.
Equisetum fluviatile	.	.	+	.	.	.
Rumex crispus	.	.	.	.	+	+
Anthoxanthum odoratum	2.1	.	.	.	.	+
Polygonum lapathifolium ssp. incanum	.	.	.	+	+	.
Gatunki stwierdzone tylko w jednym zdjęciu (species noted only in one record):						
III. Frunella vulgaris 3; 1.1; Cardamine pratensis 1; Carex panicea 1; Lychnis flos-						
-osculi 3; Rhytidadelphus squarrosus 2; IV. Carex nigra 1; Alnus glutinosa o 1;						
Potentilla anserina 1; Eriophorum angustifolium 1; Carex demissa 1; Juncus alpino-						
-articulatus 1; Juncus inflexus 1; Agrostis tenuis 2; Alisma plantago-aquatica 4;						
Salix cinerea o 3; Nardus stricta 3; Menyanthes trifoliata 4; Ceanothus aquatica 4;						
Bidens cernua 4; Trifolium repens 4; Trifolium fragiferum 4; Leontodon autumnalis 4;						
Cerastium vulgatum 4; Plantago maior 4; Hottonia palustris 4; Glycyrrhiza fluitans 4;						
Trifolium palustre 4; Deschampsia caespitosa 5; Alopecurus pratensis 5; Poa pratensis						
6; Poa trivialis 6; Leontodon hispidus 5; Peucedanum palustre 5; Ranunculus repens						
6; Hypochaeris radiata 5; Chenopodium album 5; Briza media 6; Carex leporina 6;						
Sphagnum contortum 1; Drepanocladus vernicosus 1; Plagiomnium elatum 1; Polytrichum						
longisetum 1; Leptodictyum riparium 1; Fossombronina foveolata 2; Drepanocladus exan-						
nulatus 4; 2.2; Chiloscyphos polyanthos 4; Calliergonella cuspidata 4; Sphagnum pa-						
lustre 4.						

Zbiorowisko (Community) MARDUS STRICTA - CALLUNA VULGARIS

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Stażec (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	397	298	387	289	371	319	395	287	290	291	100 V	3236
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	19	21	23	21	127	178	20	4	21	21	40 II	401
Data (date)	11.8	28.7	11.8	28.7	9.8	5.8	11.8	27.7	28.7	28.7	40 II	287
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	40 II	103
Pokrycie roślinności (total plant cover) %	25	10	25	12	20	25	50	20	15	40	30 II	101
pH gleby (pH of soil)	4,5	5,0	5,9	5,5	5,0	-	5-0	4,5	5,0	5,0		
Liczba gatunków (total number of species) . .	31	26	31	25	30	25	37	22	31	29		
I. Ch. Mardetalia:												
Mardus stricta	3.2	3.3	3.3	3.3	2.2	2.2	4.4	+2	2.2	3.3	100 V	1650
Juncus squarrosus	2.2	2.1	1.1	+	2.1	1.1	+	+	+	+	40 II	537
Polygala vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40 II	476
Pimpinella saxifraga	.	.	1.1	.	+	.	1.1	+	+	1.1	40 II	326
Viola canina	.	.	1.1	.	.	.	.	+	+	.	30 II	102
II. Ch. Hordo-Callunetea:												
Calluna vulgaris	1.2	2.2	1.2	2.2	2.2	1.2	2.3	2.3	4.4	2.2	100 V	1650
Danthonia decumbens	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.1	+	+	1.1	100 V	537
Potentilla erecta	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	+	2.1	80 IV	476
Luella campestris	1.1	.	.	+	2.1	2.1	1.1	1.1	1.1	+	50 III	326
Hieracium pilosella	.	.	1.1	.	2.1	1.1	1.1	.	+	1.1	50 III	326
Carex pilulifera	+	.	1.1	.	.	.	.	.	+	1.1	40 II	102
Carex palleseens	+	.	+	.	.	.	+	.	+	.	40 II	4
III. Inne (other spp.):												
Anthoxanthum odoratum	1.1	1.1	.	+	1.1	.	+	+	+	1.1	80 IV	155
Juncus effusus	1.1	1.1	2.1	1.1	.	.	+	1.1	+	1.1	60 III	153
Vaccinium vitis-idaea	1.1	1.1	.	1.1	.	.	+	1.1	+	1.1	50 III	386
Vaccinium myrtillus	1.1	1.1	+	1.1	.	.	+	2.1	+	+	50 III	287
Agrostis tenuis	1.1	.	+	+	.	.	+	+	+	+	50 III	103
Carex nigra	1.1	.	+	+	+	.	+	+	+	+	50 III	5
Pastinaca	1.1	.	.	.	+	1.1	1.1	.	.	.	40 II	151
Molinia caerulea	1.1	.	.	.	+	.	1.1	.	1.1	.	40 II	102
Briza media	+	.	.	1.1	1.1	.	.	.	.	+	40 II	53
Pinus sylvestris b	+	.	.	1.1	.	.	.	.	.	+	30 (II)	3
Juniperus communis b	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	40 II	4
Betula pubescens o	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	30 II	177
Leontodon hispidus	+	.	.	+	2.1	.	+	+	+	+	30 II	177
Gaoumum vulgare	1.1	.	.	.	1.1	.	+	.	.	+	30 II	101
Pteridium aquilinum	1.1	.	.	.	1.1	.	1.1	.	.	+	30 II	101
Deschampsia cespitosa	1.1	.	1.2	.	+	+	+	+	+	+	30 II	52
Calamagrostis epigeios	+	.	+	.	+	1.1	.	.	+	+	30 II	3
Carex panicea	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	30 II	3
Hypochaeris radicata	+	.	+	.	.	.	+	.	+	+	30 II	3

<i>Pleurozium schreberi</i>	1.2	2.3	2.3	2.2	1.2	.	3.2	2.2	1.2	90	V	1226
<i>Polytrichum juniperinum</i>	.	.	.	1.2	1.2	.	+	1.2	1.2	60	VII	227
<i>Ptilidium ciliare</i>	.	.	.	.	1.2	.	+	1.2	1.2	60	VII	267
<i>Cladonia pyxidata</i>	.	1.2	1.2	1.2	1.2	.	1.2	.	1.2	50	VII	240
<i>Polytrichum piliferum</i>	+	1.2	1.2	1.2	1.2	.	.	.	1.2	50	VII	152
<i>Sphagnum compactum</i>	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	.	.	3.3	.	50	VII	900
<i>Polytrichum commune</i>	1.2	2.2	1.2	1.2	1.2	.	.	.	.	40	VII	450
<i>Dicranum scoparium</i>	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	40	VII	102
<i>Hypnum cupressiforme</i>	.	.	.	.	1.2	+	+	1.2	1.2	40	VII	102
<i>Recomitrium canescens</i>	.	.	.	.	.	.	+	+	1.2	40	VII	53
<i>Pohlia caespitetrachela</i>	.	.	.	.	.	.	+	1.1	1.1	40	VII	53
<i>Cladonia furcata</i>	.	.	.	.	.	.	.	1.2	2.2	30	VII	226
<i>Hylacomium splendens</i>	.	+	2.2	.	.	.	.	+	.	30	VII	177
<i>Thuidium deltoideum</i>	.	.	.	.	1.2	+	1.2	.	1.2	30	VII	101
<i>Carotodon purpureus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	VII	101
<i>Brachythecium albicans</i>	1.2	.	.	.	.	.	.	+	1.2	30	VII	101
<i>Abletiella abietina</i>	.	.	.	.	+	.	.	+	1.2	30	VII	52
<i>Cladonia rangiferina</i>	.	.	.	.	1.2	.	.	.	+	30	VII	52
<i>Pseudoclaropodium purum</i>	.	.	.	1.2	1.2	.	.	.	.	30	VII	52

Gatunki sporodyczne (sporadic species): I. *Thymus pulegioides* 5; 2.2, 7; II. *Lycopodium clavatum* 3; 2.1, 7; *Lasula multi-*
flora 8, 10; *Cytisus scoparius* 7; III. *Lycopodiella inundata* 3; 2.2, 9; 1.1; *Rubus plicatus* 3; 2.2, 6; *Abutilon millefor-*
litum 5; 1.1, 7; *Parnassia palustris* 1; 1.1; *Holcus lanatus* 1; 3; *Scorpius oxycochos* 2; 2; *Ledum palustre* 2; *Quercus robur*
c 3, 4; *Rumex acetosa* 5; *Carex vulpina* 6; 1.1; *Polygonum mite* 6; 8; *Senecio sylvaticus* 6; *Poa pratensis* 6; *Carex tetralix*
c 6; *Lysimachia vulgaris* 6; *Vaccinium uliginosum* 8; 1.1; *Potentilla palustris* 8; *Galium palustre* 8; *Betula pendula* 9; *Sphag-*
num subsecundum 1, 3; 2.2; *Pohlia nutans* 1, 4; *Polytrichum formosum* 1, 6; *Sphagnum recurvum* 1.2; *Corsetia ruralis* 2; 3; *Hypnum*
caespiticium 4, 9; *Leucobryum glaucum* 3; 2.2, 6; 1.2; *Lophocolea bidentata* 6, 8; *Hypnum lindbergii* 8, 9; *Cetraria islandica*
 7, 9; *Cladonia sylvatica* 7, 10.

Roślinność tworzy układ mozaikowy. Kępy porośnięte są przez *Juncus effusus*. W dolinkach, gdzie przez cały okres wegetacyjny zaznacza się uwilgotnienie, a czasowo utrzymuje się nawet woda, grupuje się roślinność higrofilna. Warstwa mszysta jest dość dobrze rozwinięta, a na uwagę zasługuje rzadki gatunek wątrobowca, *Fossombronia foveolata*, znaleziony w płacie tego zespołu w Woli Wiśniowskiej. Pod względem florystycznym jest to zespół bogaty; w poszczególnych płatach może występować do 40 gatunków roślin.

W badanym terenie *Epilobio-Juncetum effusi* występuje w bliskim sąsiedztwie *Caricetum elatae*, z czego można wnosić, że ten typowo antropogeniczny zespół pastwiskowy rozwinął się na siedliskach pierwotnie zajętych przez fitocenozy ze związku *Magnocaricion*. Świadczy o tym również charakter podłoża, w którym dominuje torf turzycowy.

Epilobio-Juncetum effusi jest szeroko rozprzestrzenionym w Polsce zespołem ubogich, bagnistych pastwisk. Opisany został przez Fijałkowskiego (1959), Jasnowskiego (1962), Kępczyńskiego (1965), Falińskiego (1966), Izdebską (1969), Popiołka (1972, 1974), Hereźniaka (1972). Pod nazwą *Juncetum effusi* opisali go z Polski północno-zachodniej Denisiuk i Grynia (1965) i Denisiuk (1967c).

4.6.2. ZBIOROWISKA ROŚLINNE ACIDOFILNYCH MURAW BLIŹNICZKOWYCH (*NARDETALIA*)

Zbiorowisko *Nardus stricta*-*Calluna vulgaris* – zbiorowisko psiej trawki i wrzосу (tab. 33)

Na obrzeżach kilku lejków krasowych, położonych w widnych lasach sosnowych w okolicach Pocioski i Małenka, rozwija się zbiorowisko, w którym dominują wrzos i psia trawka. Płaty jego tworzą na stosunkowo słabo nachylonych brzegach pas kilkumetrowej szerokości otaczający torfowiska wysokie. Podłoże jest bardzo jałowe, gleba kwaśna. Wody gruntowe w niektórych płatach podchodzą okresowo aż do powierzchni gruntu tak, że darń bywa nią niekiedy wyraźnie przesiąknięta. Siedliska tego zbiorowiska, ze względu na jałowość i zakwaszenie podłoża, zbliżone są do siedlisk zbiorowisk z *Scheuchzeria-Caricetea fuscae*, ale są znacznie mniej wilgotne, a przepływ wody zaznacza się na nich tylko okresami. Przypuszczalnie w pewnych fragmentach jest to zbiorowisko naturalne. Zapewne duży wpływ na jego rozwój miało karczowanie lasów w sąsiedztwie lejków krasowych.

Pod względem florystycznym jest to zbiorowisko bogate. W jego płatach zanotowano 56 gatunków roślin naczyniowych i 30 gatunków mszaków i porostów. Dominującą rolę odgrywają *Nardus stricta* i *Calluna vulgaris*, przy czym w niektórych płatach jeden lub drugi gatunek zdecydowanie przeważa. Dominują, zarówno ilościowo jak i pod względem stałości, gatunki z *Nardetalia* i *Nardo-Callunetea*. Dość wybitną rolę odgrywają gatunki charakterystyczne dla *Molinio-Arrhenatheretea* i *Oxycocco-Sphagnetes*. Większy lub mniejszy udział tych grup gatunków idzie w parze z większą lub mniejszą wilgotnością podłoża.

Wilgotniejsze płaty tego zbiorowiska (tab. 33: zdj. 1-4) zbliżają się swym składem florystycznym i warunkami występowania do *Nardo-Juncetum squarrosi* (Nordh. 1920) Bük. 1942 (Preisling 1953; Zarzycki 1958; Pawłowski i in. 1960; Kępczyński 1965). Suchsze płaty (tab. 33: zdj. 5-10) nawiązują do *Polygalo-Nardetum* Prsg. 1953 (Preisling 1953; Faliński 1966; Hereźniak 1972). Zbyt ubogi materiał zdjęciowy i brak wielu gatunków charakterystycznych uniemożliwia ściśle zaliczenie poszczególnych płatów tego zbiorowiska do znanych zespołów ubogich muraw bliźniczkowych.

Zbiorowiska roślinne z *Nardetalia* są u nas, a szczególnie na niżu, słabo poznane. Opisywane są zwykle jako *Nardetum strictae* (Fijałkowski 1959), *Calluno-Nardetum* (Hryniewicz 1959; Kornaś i Medwecka-Kornaś 1967; Grodzińska 1975) lub jako zbiorowisko wydmowe z *Calluna vulgaris* (Kobendza 1930; Kępczyński 1965). Z tego powodu trudno obecnie nadać opisanemu wyżej zbiorowisku rangę systematyczną.

4.7. ZBIOROWISKA LEŚNE I ZAROŚLOWE

4.7.1. OLSY (*ALNETALIA GLUTINOSAE*)

Olsy należą do pospolitych zbiorowisk roślinnych w badanym terenie. Reprezentowane są przez typowo leśny zespół *Carici elongatae-Alnetum* oraz zespół zaroślowy *Salicetum pentandro-cinereae*. Pomimo bardzo dużych różnic w fizjonomii, oba wyżej wymienione zespoły wykazują znaczne podobieństwo co do składu florystycznego i ekologii.

Salicetum pentandro-cinereae Pass. 1961 — zarośla łozowe (tab. 34)

Zarośla łozowe są bardzo częstym i wyraźnie wyodrębniającym się elementem szaty roślinnej lejków krasowych. W dużych jeziorach występują na wyspach oraz przy brzegach, gdzie tworzą kilku- lub kilkunastometrowej szerokości pas, nierzadko wokół całego zbiornika. Poza tym opanowują one mniejsze, śródleśne lejki krasowe, zajmując nieraz całą ich powierzchnię.

W okolicach Staszowa zarośla łozowe rozwijają się w miejscach silnie podtopionych i niekiedy mocno zamulonych. Płaty rosnące nad brzegami jezior są z reguły podtopione przez cały rok. Natomiast te, które występują w mniejszych lejkach czy na obrzeżach szuwarów, wykształcają się w warunkach wysokiego poziomu wody gruntowej, jednak z długotrwałymi okresami jej stagnowania. Podłoże stanowią najczęściej torfy przejściowe, rzadziej niskie, osiągające przeważnie grubość 20 do 100 cm, dość silnie zakwaszone. Obrazują to odkrywki glebowe:

Profil nr 305 (tab. 34: zdj. 19). Lejek krasowy nr 94, 7.10.1975

T_{pr1} 0-40 cm — torf barwy jasnobrunatnej, słabo rozłożony;

T_{pr2} od 40 cm — torf barwy ciemnobrunatnej, średnio rozłożony.

Diagnoza typologiczna: gleba torfowa torfowisk przejściowych.

A₀ 0-5 cm — poziom organiczny z licznymi, częściowo rozłożonymi szczątkami roślin;

T_n 5-40 cm — torf brunatny, słabo rozłożony, silnie ukorzeniony i zamulony;

Mł 40-65 cm — il brunatny, dość zbity, ukorzeniony;

D od 65 cm — piasek luźny, średnioziarnisty, jasnoszary z poziomem wody gruntowej na głębokości 70 cm.

Diagnoza typologiczna: gleba torfowo-mułowa.

Warunki występowania *Salicetum pentandro-cinereae* w okolicach Staszowa nie odbiegają zasadniczo od podanych przez Kulczyńskiego (1939/40) przy opisie torfowisk Polesia.

Jest to typowy zespół zaroślowy, w którym drzewa występują bardzo rzadko (*Alnus glutinosa*, *Betula pubescens*). Bardzo dobrze natomiast rozwija się warstwa krzewów. Warstwa ziół wykazuje duże zwarcie tylko w niektórych płatach. Warstwa mszysta jest bogata (36 gatunków), ale w wielu płatach nie osiąga dużego zwarcia na skutek występowania licznych dolinek zalanych przez długi czas wodą. Pod względem fizjonomicznym fitocenozy omawianego zespołu są podobne do zbiorowisk opisanych wcześniej pod nazwą *Salici-Franguletum* (Malc. 1929) R. Tx. 1937 (Matuszkiewicz 1952; Jasnowski 1962; Denisiuk 1963 i in.).

W składzie florystycznym zaznacza się duży udział gatunków z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, co jest wynikiem bezpośredniego kontaktowania się fitocenozy tego zespołu ze zbiorowiskami torfowisk przejściowych. Passarge (1961b) zalicza takie płaty do osobnego podzespołu *Salicetum pentandro-cinereae comaretosum*. Gatunkami wyróżniającymi tego syntaksonu są: *Agrostis canina*, *Potentilla palustris*, *Carex canescens*, *C. lasiocarpa*, *Menyanthes trifoliata*, *Viola palustris*, *Sphagnum recurvum*, *S. teres*, *S. nemoreum*, *S. palustre*, *S. squarrosum*. Wszystkie te gatunki występują z dużą stałością w płatach zespołu w lejkach. Niewielką rolę natomiast odgrywają gatunki klasy *Phragmitetea*, dominujące w typowych płatach zespołu (por. Matuszkiewicz 1952; Passarge 1956, 1957b; Denisiuk 1963; Kępczyński 1965; Urbanek 1969).

Salicetum pentandro-cinereae comaretosum jest rzadsze od podzespołu typowego. Bardzo zbliżone florystycznie i ekologicznie zbiorowiska opisali u nas dotąd Jasnowski (1962), Sobotka (1967), Kozak (1968) i Sokołowski (1969). Podzespół ten reprezentuje odrębny kierunek rozwojowy, prowadzący od torfowisk przejściowych z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* do *Carici elongatae-Alnetum sphagnetosum* lub prawdopodobnie do bagiennych lasów sosnowo-brzozowych i brzozowych.

Carici elongatae-Alnetum W. Koch 1926 — olszyna bagienna (tab. 35)

Zbiorowiska bagiennych lasów olszowych, zwanych olsami, występują stosunkowo rzadko i na niewielkich przestrzeniach w badanym terenie. Wykształcają się najczęściej w postaci wąskiego pasa na podmokłych terasach

SALICETUM PENTANDRO-CINEREAE (Almq. 1929) Passarge 1961

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Stałość (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	139	115	312	276	404	314	326	315	336	209	112	251	398	407	303	299	351	333	305	409	420	37		
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	51	147	88	6	81	92	80	34	160	53	148	3	129	43	174	175	76	155	94	37	6	79	Stałość (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Data (date)	12.8 1973	10.8 1973	5.8 1974	26.7 1974	12.8 1974	5.8 1974	6.8 1974	5.8 1974	6.8 1974	25.8 1973	10.8 1973	8.7 1974	12.8 1974	16.8 1974	4.8 1974	4.8 1974	8.8 1974	6.8 1974	4.8 1974	16.8 1973	18.8 1974	22.7 1973		
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	100	25	20	60	25	100	15	18	20	40	30	40	40	50	20	25	20	50	40	50	60	30	Stałość (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Pokrycie warst. krzewów (cover of shrubs lay.)%	90	80	90	40	85	75	74	75	65	80	60	80	80	95	60	80	80	80	80	100	100	50		
Pokrycie warstwy runa (cover of herb layer) %	80	60	50	70	60	50	40	50	40	90	30	30	50	60	50	40	60	75	75	65	75	30	Stałość (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Pokrycie warstwy mchów (cover of moss layer) %	70	75	95	100	40	100	20	80	100	60	40	80	15	40	40	20	10	30	50	50	60	10		
pH gleby (pH of soil)	6,0	-	6,0	5,5	6,0	5,5	5,5	5,5	5,0	6,0	-	-	6,0	6,0	6,0	6,5	6,5	6,0	-	6,5	6,0	6,0	Stałość (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
Liczba gatunków (total number of species) . .	18	15	20	18	29	18	21	21	17	36	15	20	18	23	25	25	22	29	29	30	20	12		
I. Ch. Salicetum pentandro-cinereae:																								
Salix cinerea b	4.4	3.3	5.5	1.2	4.4	3.3	3.3	3.3	4.4	3.3	3.3	1.2	3.3	4.4	3.3	4.4	4.4	3.3	5.5	4.4	3.3	.	95	V
" " o	1.1	+	.	+	1.1	+	1.1	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	1.1	45	III
" aurita b	.	.	.	.	+	.	.	1.1	.	.	.	3.3	.	+	.	.	1.1	1.2	+	+	+	3.3	45	III
" pentandra b	.	.	.	.	1.2	.	1.2	.	1.2	.	.	2.2	.	2.2	+	1.2	.	.	+	.	.	.	36	II
" repens ssp. rosmarinifolia b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	I
II. Ch. Alnetalia glutinosae:																								
Frangula alnus b	1.2	1.2	1.2	+	+	1.2	2.2	1.2	.	2.2	+	.	1.2	+	1.2	+	1.2	1.3	.	1.1	3.2	.	82	V
" " c	+	.	.	.	1.1	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	18	I
Sphagnum squarrosum	2.2	.	.	.	+	.	1.2	3.3	.	.	.	.	2.2	.	2.3	2.3	1.2	2.2	+	3.3	3.2	1.2	55	III
Calla palustris	.	2.2	.	+	.	.	2.2	1.1	1.1	.	.	3.3	.	2.2	.	1.1	1.1	+	+	.	1.1	.	55	III
Thelypteris palustris	+	1.1	2.2	2.1	.	.	.	.	+	.	.	1.1	+	.	.	.	+	+	+	.	.	.	41	III
Solanum dulcamara	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	1.1	.	.	.	1.1	1.1	.	.	+	.	2.1	.	.	27	II
Carex elongata	.	1.1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	I
Dryopteris carthusiana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	1.1	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	16	I
Calamagrostis canescens	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	9	I
III. Ch. Phragmitetia:																								
Carex rostrata	2.2	3.2	2.2	3.2	3.3	1.1	.	1.1	2.1	.	.	.	.	1.1	1.1	1.1	3.2	1.1	.	2.1	3.2	.	68	IV
Galium palustre	.	.	1.1	2.1	1.1	.	1.1	+	.	2.1	1.1	.	1.1	1.1	1.1	+	.	.	.	2.1	.	.	50	III
Lycopus europaeus	.	+	.	.	.	.	+	.	+	2.1	+	.	.	1.1	.	.	.	.	1.1	.	.	1.1	41	III
Peucedanum palustre	.	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.	27	II
Equisetum fluviatile	2.2	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1.1	.	18	I
Iris pseudacorus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	1.1	1.1	+	.	.	18	I
IV. Ch. Scheuchzeria-Caricetea fuscae:																								
Agrostis canina	.	.	+	1.1	1.1	.	.	1.1	1.1	.	.	.	1.1	.	1.1	+	1.1	1.1	1.1	1.1	.	+	59	III
Sphagnum recurvum	3.3	4.4	3.3	5.5	2.2	4.4	1.2	2.2	5.5	2.3	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	III
Potentilla palustris	.	.	+	2.1	.	+	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	II
Carex nigra	.	.	.	.	1.1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	+	+	1.1	.	36	II
Sphagnum teres	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	1.2	.	.	.	+	+	+	.	.	18	I
Carex canescens	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	2.2	1.1	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	18	I
Menyanthes trifoliata	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	1.1	1.1	.	.	.	18	I
Carex lasiocarpa	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	I
Viola palustris	.	.	.	2.1	1.1	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1.1	.	18	I
V. Inne (other spp.):																								
Lysimachia vulgaris	+	.	2.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	.	+	+	1.1	1.1	2.1	.	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	.	82	V
Betula pubescens b	1.1	1.2	1.1	1.1	.	2.2	+	1.1	.	+	+	.	2.2	+	.	.	.	+	.	+	1.1	.	68	IV
" " o	+	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	I
Alnus glutinosa b	1.1	.	.	3.2	.	.	.	1.1	.	.	.	1.1	.	1.1	.	.	.	+	+	+	1.1	+	50	III
Quercus robur b	.	.	.	.	+	.	+	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	45	III
Potentilla erecta	+	.	1.1	.	2.1	1.1	.	2.1	.	.	.	.	+	+	+	.	.	1.1	+	+	+	.	41	III
Gymnocarpium dryopteris	.	.	+	.	2.1	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	1.1	.	1.1	1.1	.	.	41	III
Juncus effusus	.	.	+	.	1.1	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.1	1.1	.	.	41	III
Lythrum salicaria	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	+	+	.	+	+	.	1.1	.	41	III
Populus tremula b	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	36	II
Calliergonella cuspidata	.	1.2	2.2	.	+	.	1.2	.	.	.	.	2.2	2.2	1.2	1.2	1.2	.	2.2	1.2	+	2.2	1.2	18	I
Plagiommium affine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	+	+	+	.	.	32	II
Sphagnum palustre	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	+	.	1.1	+	.	.	27	II
Aulacomnium palustre	1.2	+	.	.	.	+	.	1.2	+	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	II
Sphagnum fimbriatum	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	II
Calliergon cordifolium	.	.	+	.	1.1	.	+	.	.	.	.	2.2	.	.	+	1.2	.	.	.	.	1.2	.	27	II
Plagiommium elatum	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	23	II

Gatunki sporadyczne (sporadic species): II. Trichocoles tomentella 22: 1.2. III. Scutellaria galericulata 11, 15, 17; Carex acutiformis 5: 1.1, 18; Carex paniculata 10, 21; Carex pseudoxyperus 7; Lysimachia thyrsoflora 9: 1.1, 20; Phragmites australis 8, 21; Ranunculus lingua 10, 15; Ciota virosa 9; Glycyrrhiza fluitans 10; Sium latifolium 10; Polygonum amphibium for. terrestre 12; Glycyrrhiza plicata 19: 1.1; Oenanthe aquatica 20; Carex vesicaria 14;

IV. Epilobium palustre 8: 1.1, 12, 20; Ranunculus flammula 8, 15; Stellaria palustris 5; Drepanocladus exannulatus 5, 17; Drepanocladus vernicosus 5; Calliergon stramineum 2: 1.2, 3: 1.2, 9.

V. Scirpus sylvaticus 1, 10, 11: 1.1; Cardamine pratensis 10: 1.1, 15: 1.1, 16; Myosotis scorpioides 10: 1.1; Athyrium filix-femina 7, 10, 20; Vaccinium oxycoccos 6: 3.3, 12: 2.2; Lemna minor 10, 22; Pinus sylvestris b 1: 1.1, 12; Ranunculus repens 13, 16; Equisetum palustre 4, 21; Eupatorium cannabinum 3, 17; Picea abies b 1; Acer pseudoplatanus o 2; Salix fragilis b 5; Drosera rotundifolia 6: 1.1; Rumex obtusifolius 10: 1.1; Equisetum sylvaticum 19: 1.1; Pulmonaria obscura 10: 1.1; Oxalis acetosella 10; Polygonum hydropiper 10; Malianthemum bifolium 10; Mentha arvensis 13; Salix alba b 14; Bidens cernua 14; Utricularia minor 15; Sphagnum nemoreum 15, 16, 20: 1.2; Brachythecium rutabulum 10, 15, 17; Mnium hornum 5, 17, 19; Tomentypnum nitens 3, 12: 2.2; Helodium blandowii 1, 12: 1.2; Marchantia aquatica 10: 2.2; Polytrichum commune 1, 6; Drepanocladus aduncus 5; Rhytidiadelphus squarrosus 5; Rhytidiadelphus triquetrus 17; Sphagnum girgensohnii 18; Dicranum bidentata 14; Fissidens adianthoides 15; Plagiochila porelloides 16, 17; Marchantia polymorpha 16; Lophocolea heterophylla 17, 19; Rhytidiadelphus triquetrus 17; Sphagnum girgensohnii 18; Dicranum bonjeani 18; Plagiomnium undulatum 19; Plagiomnium rostratum 20; Chiloscopus polyanthes 22.

dużych lejków krasowych. W kilku śródpolnych lejkach w Woli Wiśniowskiej i w Czajkowie olsy zajmują całe ich powierzchnie. Specyficzne położenie w bezodpływowych zagłębieniach krasowych, wśród gliniastych lub piaszczystych wzgórz, warunkuje stan uwodnienia tych zbiorowisk. Olsy w lejkach krasowych korzystają z wód spływowych, podsięgowych oraz opadowych. Ten typ uwodnienia został stwierdzony na wszystkich torfowiskach olszynowych w Polsce, rozwijających się w podobnych warunkach hydrograficznych, jak w okolicach Staszowa (Marek 1965).

Platy *Carici elongatae-Alnetum* rozwijają się na glebach mułowych lub na torfach niskich, o miąższości 25-80 cm. Poziom wody gruntowej jest wysoki i znajduje się przeważnie na głębokości 40-50 cm. Stosunki glebowe w olsie obrazują poniższe odkrywki glebowe:

Profil nr 277 (tab. 35: zdj. 10). Lejek krasowy 6, 8.10.1975

A₀ 0-25 cm — poziom organiczny, ciemnobrunatny, z dość dobrze rozłożonymi szczątkami roślin, silnie zamulony, wydzielający silny zapach gnilny;

Mł₁ 25-50 cm — piasek luźny, jasnoszary, z licznymi szczątkami szkieletowymi i widocznymi śladami oglejenia;

CG od 50 cm — poziom skały macierzystej z cechami gruntowo-glejowymi.

Diagnoza typologiczna: gleba mułowa właściwa pochodzenia limnetycznego.

Profil nr 381 (tab. 35: zdj. 8). Lejek krasowy nr 117, 7.10.1975

A₀ 0-5 cm — poziom organiczny, bardzo wilgotny, ze słabo rozłożonymi częściami roślin, nieco zamulony;

T_w 5-100 cm — torf sfagnowy, jasnobrunatny, słabo zmineralizowany, niezamulony.

Diagnoza typologiczna: gleba torfowa torfowisk wysokich.

Opis profilu nr 381 przedstawia pozornie paradoksalny przykład rozwoju olsu na torfach sfagnowych. Jedynym logicznym wytłumaczeniem tego zjawiska jest przyjęcie tezy, że inwazja olszy czarnej nastąpiła w wyniku zwiększenia się zawartości składników mineralnych w górnych warstwach złoża torfu sfagnowego. Spowodowane to zostało nie na drodze ich akumulacji w tkankach roślin, lecz w wyniku zamulenia, które było następstwem powtórnego załamania się dna lejków krasowych pod wpływem erozyjnej działalności wód wgłębnych i ciężaru nadkładu. Bardzo podobne schematy sukcesji zbiorowisk torfotwórczych podaje Kulczyński (1939/40) z krasowych obszarów Polesia. Również Jasnowski (1960) opisuje analogiczny przykład rozwoju olsu na złożach torfu sfagnowego z okolic Zatoki Szczecińskiej.

Fizjonomicznie olsy z lejków krasowych nie różnią się od opisanych z innych regionów kraju (np. Kobendza 1930; Krotoska 1953; Piotrowska 1960; Wojterski 1960; Sokołowski 1963, 1969).

Z roślin zielnych najważniejszą rolę odgrywają gatunki charakterystyczne *Alnetalia*. Liczną grupę stanowią gatunki szuwarowe z *Phragmitetalia*. Zajmują one miejsce w najbardziej podtopionych partiach dolinek.

Specyficzny aspekt zespołu olszyny bagiennej tworzy bogata w gatunki warstwa mszysty. Szczególnie obficie są tu reprezentowane torfowce. Osiągają

CARIOI ELONGATAE-ALNETUM W. Koch 1926

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .										Stażek (constancy)	Współczynnik pokrycia (index of coverage)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .											
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)											
Data (date)											
20.7	9.8	13.8	9.8	12.8	9.8	12.8	10.8	16.8	26.7		
1973	1973	1973	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974		
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²											
100	60	60	120	100	80	70	80	60	150		
Pokrycie warstwy drzew (cover of trees layer) %											
50	70	60	70	50	70	50	40	80	80		
Pokrycie warstw. krzewów (cov. of shrubs layer) %											
75	80	65	30	30	45	55	75	60	90		
Pokrycie runa (cover of herb layer) %											
80	45	90	80	80	80	80	50	60	75		
Pokr. warst. masyści (cover of moss layer) %											
90	80	40	30	40	40	30	30	45	40		
pH gleby (pH of soil)											
-	5,0	6,5	6,0	6,0	6,0	6,5	-	6,5	6,5		
Liczba gatunków (total number of species) . .											
35	26	38	42	42	33	35	30	26	33		

I. Drzewa i krzewy (trees and shrubs):												100 V	4600	
Alnus glutinosa a	2.2	2.2	4.3	4.3	3.3	4.3	3.2	4.3	4.3			100 V	4600	
" b	2.2	2.1	4.3	2.1	2.1	1.1	2.2	2.2	2.2			100 V	1225	
" o	+	+	+	+	+	+	+	+	1.1			80 IV	57	
Betula pubescens a	2.2	+	+	+	+	+	+	+	1.1			90 V	330	
" b	2.2	+	+	1.1	+	1.1	+	+	+					
" pendula	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Pinus sylvestris a	+	+	+	+	+	+	2.1	+	+			70 IV	230	
" b	+	1.1	+	+	+	+	+	+	+			30 II	52	
Prunus padus	+	+	+	+	+	+	+	+	+			30 II	3	
II. Ch. Carioi elongatae-Alnetum (+), Alnetalia glutinosae:														
Phlypterus palustris	+	+	3.2	2.1	2.1	1.1	1.1	1.1	2.2			70 IV	826	
Sphagnum squarrosum	+3	+	1.1	1.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2			70 IV	732	
Salix cinerea b	+	2.1	+	+	1.1	1.1	+	+	+			70 IV	732	
Solanum dulcamara	+	+	2.1	2.1	1.1	1.1	+	+	+			60 III	453	
Frangula alnus b	1.2	+2	+	2.2	1.2	2.2	+	+	+			60 III	453	
Calla palustris	1.1	1.1	1.1	+	1.1	2.2	3.2	2.2	1.1			60 III	875	
+ Carex elongata	1.1	+	+	+	1.1	+	+	+	+			30 II	101	
Trichoclea tomentella	+2	+	+3	+	+	+	+	+	+2			30 II	3	
Galamagrostis canescens	+	+	+	+	+	+	+	+	1.1			20 I	52	
III. Ch. Phragmitetia:														
Lycopus europaeus	+	+	1.1	+	1.1	1.1	2.1	+	1.1			90 V	379	
Carex vesicaria	+	+	2.1	1.1	1.1	2.1	1.1	1.1	1.1			70 IV	377	
Puccinellum palustre	+	+	1.1	+	+	+	1.1	+	1.1			60 III	276	
Galium palustre	+	+	1.1	1.1	1.1	2.1	2.1	1.1	1.1			50 III	251	
Centellaia galericulata	+	+	+	+	1.1	2.1	2.1	+	+			40 III	451	
Urtica dioica	+	+	+	+	+	+	+	+	+			40 III	451	
Urtica dioica	+	+	+	+	1.1	+	+	+	+			30 II	52	
Alisma plantago-aquatica	+	+	+	+	+	+	+	+	+			30 II	3	

IV. Inne (other spp.):

<i>Lysimachia vulgaris</i>	2.1	1.1	+	2.1	1.1	1.1	1.1	1.1	80	IV	601
<i>Menyanthes trifoliata</i>	2.2	2.2	+	1.1	2.1	1.1	1.1	1.1	80	III	501
<i>Potentilla palustris</i>	+	2.2	+	1.1	1.1	+	+	+	50	III	528
<i>Agrostis omnia</i>	+	+	+	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	50	III	152
<i>Dryopteris carthusiana</i>	3.2	+	+	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	40	II	525
<i>Lythrum salicaria</i>	+	+	1.1	1.1	1.1	+	+	+	40	II	451
<i>Viola palustris</i>	+	+	1.1	1.1	1.1	+	+	+	40	II	102
<i>Caltha palustris</i>	+	+	1.1	1.1	1.1	+	+	+	40	II	102
<i>Cirsium palustre</i>	+	+	1.1	1.1	1.1	+	+	+	30	II	286
<i>Hottonia palustris</i>	+	+	1.1	1.1	1.1	+	+	+	30	II	52
<i>Calliergonella cuspidata</i>	+	+	2.2	1.2	1.2	1.3	2.2	1.2	90	V	727
<i>Menium hornum</i>	+	+	2.2	2.2	2.2	1.2	2.2	1.2	70	IV	279
<i>Brachythecium rutabulum</i>	+	+	2.2	2.2	2.2	1.2	2.2	1.2	70	IV	279
<i>Plagiommium affine</i>	+	+	2.2	2.2	2.2	1.2	2.2	1.2	70	IV	279
<i>Plagiommium laetum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	60	III	6
<i>Calliergon cordifolium</i>	+	+	1.2	1.2	1.2	+	1.2	1.2	60	III	323
<i>Sphagnum recurvum</i>	+	+	1.2	1.2	1.2	+	+	+	50	III	54
<i>Climacium dendroideum</i>	3.3	3.3	1.2	1.2	1.2	+	+	+	50	III	850
<i>Caspyllum elodes</i>	+	+	1.2	1.2	1.2	+	+	+	40	II	200
<i>Cephalosia bicuspidata</i>	+	+	+	+	+	1.1	1.1	1.1	40	II	4
<i>Sphagnum fimbritum</i>	+	+	3.2	3.2	3.2	+	+	+	40	II	377
<i>Polytrichum commune</i>	+	+	2.2	2.2	2.2	+	+	+	30	II	256
<i>Sphagnum palustre</i>	+	+	+	+	+	1.2	1.2	1.2	30	II	177
<i>Plagiommium undulatum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	30	II	101
<i>Plagioteichium denticulatum</i>	+	+	1.2	1.2	1.2	+	1.2	1.2	30	II	90
<i>Plagiommium cuspidatum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	30	II	50
<i>Dryanocoladus exannulatus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	30	II	3
<i>Chiloscyphus polyanthos</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	30	II	3
<i>Eryum pseudotriquetrum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	30	II	3
<i>Plagiommium ellipticum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	30	II	3

Gatunki sporadyczne (spore species): I. *Populus tremula* b 2. II. *Salix aurita* b 1: 2.2, 5: 1.2. III. *Glyceria fluitans* 5, 8: 1.1; *Oenanthe aquatica* 5, 8: 1.1; *Carex acutiformis* 6: 1.1, 9: 2.1; *Iris pseudacorus* 5, 7; *Equisetum fluviale* 1, 4; *Acorus calamus* 5; *Rumex hydroslapsum* 8; *Phragmites australis* 9.

IV. *Lychnis flos cuculi* 2, 3; *Scirpus sylvaticus* 2, 9; *Carex stellulata* 6: 1.1, 9: 1.1; *Carex nigra* 1: 1.1, 2: 1.1; *Carex canescens* 1, 4; *Ranunculus flammula* 5: 1.1, 7: 1.1; *Epilobium palustre* 5: 1.1, 6: 1.1; *Bidens cernua* 5, 6; *Bidens tripartita* 6, 8; *Cirsium oleraceum* 3; *Lemna minor* 4; *Meianthemum bifolium* 4; *Juncus articulatus* 5; *Gemma rivale* 7; *Poa trivialis* 7; *Rumex crispus* 8; *Alpeocurus geniculatus* 8; *Carex lasiocarpa* 9; *Ranunculus repens* 9; *Deschampsia caespitosa* 10; *Oxalis acetosella* 10; *Marchantia polymorpha* 6, 10: 1.2; *Brachythecium velutinum* 4, 7; *Thuidium tamariscolifolium* 4, 6; *Calypogeia muellerana* 3, 6; *Sphagnum recurvum* var. *sublyphyllum* 5: 2.2, 6: 2.2; *Sphagnum contortum* 3: 1.2, 4; *Sphagnum warnstorffii* 3: 2.2; *Sphagnum girgensohnii* 6; *Calliergon stramineum* 1, 2; *Aulacomnium palustre* 2; *Pellia epiphylla* 3, 8; *Rhizomnium punctatum* 3; *Fissidens adianthoides* 3, 7; *Plagiotheicum cavifolium* 4, 6; *Eucobryum glaucum* 4; *Lophocolea heterophylla* 7; *Rhytidadelphus triquetrus* 7; *Thuidium philiberti* 7; *Ptilidium pulcherrimum* 8.

one niejednokrotnie znaczny stopień pokrycia, zwłaszcza *Sphagnum recurvum*, będący wskaźnikiem mezotroficznego podłoża, na którym rozwija się zespół. Olsy, w których torfowce odgrywają wybitną rolę, były wielokrotnie opisywane w literaturze (Kleist 1929; Steffen 1931; Bodeaux 1955; Passarge 1959b; Sobotka 1967).

4.7.2. ZBIOROWISKA BOROWE (*VACCINIO-PICEETEA*)

Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929 – bór bagienny (tab. 36)

Bór bagienny wykształcił się tylko w trzech lejkach krasowych na nie-wielkim obszarze. Dogodne warunki rozwoju znajduje na wilgotnych, płaskich brzegach, stanowiących okrajki torfowisk przejściowych z *Rhynchosporo-Sphagnion*. Fitocenozy zespołu wykształcają się na płytkich glebach torfowych, wytworzonych na silnie oglejonym podłożu mineralnym. Sytuację tę obrazuje poniższa odkrywka glebowa:

Profil nr 23 (tab. 36; zdj. 2). Lejek krasowy nr 131, 7.05.1975

A₀ 0-2 cm — poziom organiczny, mokry, słabo rozłożone części roślin;

T_{pr} 2-13 cm — torf jasnobrunatny, słabo rozłożony, silnie uwilgotniony, o luźnym układzie;

Mł 13-23 cm — il ciemnobrązowy z silnie zmineralizowanymi szczątkami roślin.

Diagnoza typologiczna: gleba torfowa torfowisk przejściowych.

Bór bagienny jest zbiorowiskiem, które kończy szereg sukcesyjny w dy-stroficznych lejkach krasowych. Wykazuje on daleko idące podobieństwo do borów bagiennych opisanych przez Kleist (1929), Kobendzę (1930), Sobotkę (1967), Króla (1968) i wielu innych autorów.

5. ROZWÓJ SZATY ROŚLINNEJ LEJKÓW KRASOWYCH

5.1. STREFOWY UKŁAD ROŚLINNOŚCI

Najbardziej rzucającym się w oczy zjawiskiem w szacie roślinnej zbior-ników wodnych jest strefowy układ zbiorowisk roślinnych. Tworzą one zwykle wyraźnie zaznaczone pasy, w których panuje określony typ roślinności. Podobne zjawisko można obserwować również w lejkach krasowych. Roz-mieszczenie zbiorowisk jest tu jednak nierównomierne i zależy od wielu czynników, z których najważniejszymi są: wielkość lejka krasowego, jego głębokość, charakter dna i stoku misy jeziornej, morfologia i roślinność terenów otaczających oraz wiążące się z tym czynniki mikroklimatyczne.

Najpełniej rozwinięte pasy roślinności występują w dużych i płytkich zarazem lejkach, o łagodnie opadającym stoku misy jeziornej. Duże znaczenie ma również typ roślinności zasiedlającej lejki. W lejkach zajętych wyłącznie przez zbiorowiska roślinne torfowisk niskich można zaobserwować szereg następujących po sobie pasów (ryc. 13-17). W miejscach najgłębszych wy-stępują fitocenozy zbiorowisk roślin całkowicie lub częściowo zanurzonych w wodzie z rzędów *Charetales*, *Potamogetonetales* i *Hydrocharitetales*.

Klasa (Class): Vaccinio-Piceetea
 Rząd (Order): Vaccinio-Piceetelia
 Związek (Alliance): Dierano-Pinion

Tabela 36
 Table 36

VACCINIO ULIGINOSI-PINETUM Kleist 1929

Nr zdj. w tabeli (table number of record) . .	1	2	3
Nr zdj. w terenie (field number of record) . .	405	23	354
Nr lejka krasowego (number of karst sink-hole)	49	131	77
Data (date)	16.8 1974	21.7 1973	8.8 1974
Powierzchnia zdjęcia (area of sample plot) m ²	60	100	30
Pokrycie warstwy a (cover of a.) %	50	50	20
Pokrycie warstwy b (cover of b.) %	35	50	40
Pokrycie warstwy c (cover of c.) %	75	80	60
Pokrycie warstwy d (cover of d.) %	80	90	60
pH gleby (pH of soil)	4,0	4,5	4,5
Liczba gatunków (total number of species) . .	27	24	25
I. Drzewa i krzewy (trees and scrubs):			
Pinus sylvestris a	3.3	3.3	2.1
" b/o	1.1	+	1.1
Betula pubescens a	2.2	1.1	2.1
" b/o	2.2	1.1	2.1
Frangula alnus b	+	.	+
Picea abies b	+	.	+
Betula pendula a	.	.	+
Quercus robur b	.	.	+
II. Ch. Vaccinio uliginosi-Pinetum:			
Vaccinium uliginosum	2.2	3.3	1.2
Ledum palustre	1.2	2.2	2.2
III. Ch. Dierano-Pinion:			
Vaccinium myrtillus	1.1	+	+
Dicranum polysetum d	+2	1.2	+2
Vaccinium vitis-idaea	+	+	+
Trientalis europaea	+	.	.
IV. Ch. Vaccinio-Piceetea:			
Pleurozium schreberi d	2.2	2.2	2.2
Leucobryum glaucum d	1.2	.	1.2
Hylocomium splendens d	+2	.	1.2
Dicranum scoparium d	+2	+2	.
Pteridium aquilinum	+	.	.
V. Ch. Oxycocco-Sphagnetes:			
Eriophorum vaginatum	2.3	3.2	1.2
Vaccinium oxycoccos	1.2	2.3	2.2
Andromeda polifolia	+	.	1.1
Drosera rotundifolia	+	+	+
Polytrichum alpestre	.	+2	+2
Sphagnum nemoreum	.	2.2	.
VI. Inne (other spp.):			
Sphagnum recurvum d	2.2	4.3	2.2
Polytrichum commune d	+2	1.2	1.2
Molinia caerulea	+	+	+
Sphagnum palustre d	+2	.	+2
Carex rostrata	.	1.1	+
Carex nigra	.	+	+
Aulacomnium palustre d	+2	+2	.
Calluna vulgaris	+	+	.
Festuca rubra	.	+	.
Juncus effusus	.	+	.
Calla palustris	.	+	.
Cylophogon neesiana	.	+	.
Odontoschisma denudatum	.	+	.
Pohlia nutans	.	.	+
Aulacomnium androgynum	.	.	+

Ryc. 13. Profil roślinności w lejku krasowym nr 171 w Golejowie

Fig. 13. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 171 in Golejów
 1 – *Phragmitetum*, 2 – *Charetum rudis*, 3 – *Myriophylletum spicati*, 4 – *Typhetum latifoliae*,
 5 – *Carici elongatae-Alnetum*

Ryc. 14. Profil roślinności w lejku krasowym nr 123 w Czajkowie

Fig. 14. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 123 in Czajków
 1 – *Typhetum latifoliae*, 2 – *Charetum vulgaris*, 3 – *Scirpetum lacustris*

Najgłębiej w wodę wchodzi fitocenozy zespołów ramienic (*Charetum rudis*, *Ch. aculeolatae* i *Ch. vulgaris*), *Ceratophylletum demersi* oraz zbiorowiska *Potamogeton alpinus*. Na zewnątrz od nich wykształcają się płaty *Myriophylletum spicati*, *Nuphareto-Nymphaeetum albae*, *Myriophylletum verticillati* i *Elodeetum canadensis* (ryc. 13, 18). Przeważnie jednak kontaktują się one bezpośrednio z szuwarami wysokimi ze związku *Phragmition* (ryc. 14, 15) lub szuwarami wysokoturzycowymi ze związku *Magnocaricion* (ryc. 19).

Najbardziej rzucający się w oczy pas szuwarów jest różnie wykształcony. Tam, gdzie ławica przybrzeżna jest szeroka (ryc. 16), strefa szuwarów osiąga szerokość do kilkudziesięciu metrów. Natomiast w lejkach o bardzo wąskiej ławicy przybrzeżnej i stromym stoku niecki jeziornej ma ona szerokość kilku zaledwie metrów lub nie wykształca się zupełnie. Za pasem szuwarów wysokich i niskich wykształca się pas szuwarów wysokoturzycowych (ryc. 15, 16) lub zbiorowiska olsowe (ryc. 13). Niekiedy zbiorowiska wysokich turzyc wchodzi w bezpośredni kontakt z płatami zbiorowisk wod-

Ryc. 15. Profil roślinności w lejku nr 2 w Żabnej Wólce

Fig. 15. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 2 in Żabna Wólka

1 – *Caricetum elatae*, 2 – *Phragmitetum*, 3 – *Charetum aculeolatae*

Ryc. 16. Profil roślinności w lejku krasowym nr 7 w Malenicy

Fig. 16. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 7 in Malenica

1 – *Caricetum rostratae*, 2 – *Sparganietum erecti*, 3 – community of *Potamogeton alpinus*, 4 – *Phragmitetum*, 5 – *Salicetum pentandro-cinereae*

Ryc. 17. Profil roślinności w lejku krasowym nr 12 w Staszowie

Fig. 17. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 12 in Staszów

1 – *Phragmitetum*, 2 – *Sparganietum erecti*, 3 – *Ceratophylletum demersi*, 4 – *Scirpetum lacustris*

Ryc. 18. Profil roślinności w lejku krasowym nr 175 w Woli Wiśniowskiej

Fig. 18. Transect through plant associations in the sink-hole no. 175 in Wola Wiśniowska
1 – *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*, 2 – *Myriophylletum spicati*, 3 – *Ceratophylletum demersi*

nych. Najczęściej jest to *Caricetum rostratae* (ryc. 21), *Cicuto-Caricetum pseudocyperi* lub *Thelypteridi-Phragmitetum* (ryc. 19).

W licznych mniejszych i większych lejках krasowych przy brzegach rozwijają się fitocenozy *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*, tworzące silnie uginające się pło torfowcowe, które nasuwa się na lustro wody. Jego szerokość uzależniona jest od stopnia nachylenia stoku misy jeziornej. W przypadku łagodnego stoku osiąga ono dużą szerokość, a w bezpośrednim jego sąsiedztwie występuje niekiedy pas roślin o liściach pływających (ryc. 18, 20). W większości wypadków stok misy jeziornej jest stromy, co utrudnia osiedlanie się roślinności wodnej. Bardzo często natomiast przed płem torfowcowym rozwija się pas roślinności z klasy *Utricularietea intermedio-minoris*, zwłaszcza płaty *Sphagnetum cuspidato-obesi* (ryc. 22, 23).

W obrębie pomostu torfowcowego można wyróżnić kilka dalszych pasów roślinnych (ryc. 21, 24). Pierwszy, zewnętrzny pas tuż przy otwartym lustrze wody, o szerokości 1-3 m, tworzy *Sphagnum recurvum* często z dużą domieszką

Ryc. 19. Profil roślinności w lejku krasowym nr 104 w Woli Wiśniowskiej

Fig. 19. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 104 in Wola Wiśniowska
1 – *Thelypteridi-Phragmitetum*, 2 – *Charetum vulgaris*

Ryc. 20. Profil roślinności w lejku krasowym nr 93 w Woli Wiśniowskiej

Fig. 20. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 93 in Wola Wiśniowska

1 – *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi typicum*, 2 – *Nuphareto-Nymphaeetum albae*

Ryc. 21. Profil roślinności w lejku krasowym nr 101 w Woli Wiśniowskiej

Fig. 21. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 101 in Wola Wiśniowska

1 – *Caricetum rostratae*, 2 – *Nuphareto-Nymphaeetum albae*, 3 – *Thelypteridi-Phragmitetum*,
4 – *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi typicum*, 5 – *Sphagnetum magellanici sphagnetosum recurvi*, 6 – *Sphagnetum magellanici pinetosum*

Ryc. 22. Profil roślinności w lejku krasowym nr 131 w Woli Wiśniowskiej

Fig. 22. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 131 in Wola Wiśniowska

1 – *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, 2 – *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*, 3 – *Sphagnetum cuspidato-obesi*

Ryc. 23. Profil roślinności w lejku krasowym nr 172 w Golejowie

Fig. 23. Transect through plant associations in the karst sink-hole no. 172 in Golejów
 1 – *Pino-Quercetum*, 2 – *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* var. with *Juncus effusus*,
 3 – *Phragmitetum*, 4 – *Sparganietum minimi* var. with *Nymphaea alba*, 5 – *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* var. with *Phragmites australis*

Ryc. 24. Rozmieszczenie pasów roślinnych na pomoście torfowcowym w lejku krasowym nr 101 w Woli Wiśniowskiej

Fig. 24. Distribution of vegetation belts on a floating moss lawn in the karst sink-hole no. 101 in Wola Wiśniowska

I – *Thelypteridi-Phragmitetum sphagnetosum recurvi*, II – *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* typicum, III – *Sphagnetum magellanicum sphagnetosum recurvi*, IV – *Sphagnetum magellanicum pinetosum*

S. cuspidatum i *S. obtusum*. Wchodzą one w skład mszarnej odmiany *Thelypteridi-Phragmitetum* lub różnych wariantów *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*. Drugi pas, o bardzo różnej szerokości, tworzą różne warianty *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* z wyłącznym udziałem *Sphagnum recurvum*. Trzeci pas, który nie zawsze jest wykształcony, stanowi mszar ombrotroficzny ze *Sphagnum magellanicum* i *S. recurvum* oraz z dużym

udziałem gatunków z *Oxycocco-Sphagnetum*. Ostatni wreszcie pas, nie zawsze wykształcony, tworzą *Sphagnetum magellanicum pinetosum* lub *Vaccinio uliginosi-Pinetum*. Granice pomiędzy poszczególnymi pasami roślinności na pomoście torfowcowym są trudne do ustalenia. Odbywa się zazwyczaj wzajemne przenikanie gatunków w strefach kontaktowych. Szczególnie trudno jest wyznaczyć granicę między mszarem ombrotroficznym a jego odmianą z sosną bagienną.

5.2. TENDENCJE ROZWOJOWE ZBIOROWISK ROŚLINNYCH

Wśród badanych lejków krasowych znajdują się zbiorniki o bardzo zróżnicowanej szacie roślinnej, będącej odzwierciedleniem odmiennych warunków siedliskowych panujących w każdym z nich. Zróżnicowanie warunków środowiska wodnego ma niemały wpływ na tempo ładowania jezior oraz do pewnego stopnia wpływa na przebieg zatorfienia i sukcesję roślinności torfotwórczej. We wszystkich basenach bezodpływowych roślinność skazana jest na rozwój w nieruchomej wodzie. Sprawia to, że po pewnym czasie zasoby nawet najżyźniejszych wód wyczerpują się i fitocenozy torfotwórcze muszą nabrać cech właściwych torfowiskom wysokim. Dlatego też w bezodpływowych lejkach krasowych naturalna seria torfowa wykształca zawsze w końcu torfy sfagnowe.

Złoża torfowe w lejkach krasowych, jak wykazały badania stratygraficzne Szczepanka (1968, 1971), składają się z trzech części: w spągu na gytii zalega najczęściej cienka warstwa torfów niskich mszystych, na niej odkładają się torfy przejściowe, a górne poziomy do stropu budują torfy wysokie.

Torfy niskie na dnie są wyrazem eutroficznej fazy rozwojowej, poprzedzającej późniejszą oligotrofizację wód jeziora. W wielu przypadkach ładowanie dystroficznych jezior krasowych cechuje się brakiem fazy torfowiska niskiego. Jeziora te, po wypłynięciu się osadami gytii jeziornej, opanowuje mszar przejściowy i następujący po nim mszar ombrotroficzny. Układ stratygraficzny powstających tutaj złóż obejmuje cieńszy lub grubszy poziom torfów przejściowych i znajdujący się nad nim poziom torfów wysokich.

Obserwując współczesne zbiorowiska roślinne można z dużą dokładnością określić poszczególne etapy sukcesji roślinnej i jej kierunki w związku z wypływaniem się lejków krasowych. Proces zarastania można również przeanalizować w oparciu o naturalne tendencje rozwojowe wyróżnionych syntaksonów, wynikające ze zmian florystycznych fitocenoz.

Podany ogólny schemat sukcesji zbiorowisk roślinnych w lejkach krasowych (ryc. 25) opracowano głównie na podstawie przestrzennego układu zbiorowisk roślinnych w terenie oraz udziału poszczególnych grup gatunków w tabelach wyróżnionych zespołów. Jest to zbliżony do naturalnego schemat sukcesji roślinności, charakterystyczny dla małych, bezodpływowych zbiorników wodnych.

W badanych obiektach człowiek tylko w niewielkim stopniu wpływa na

Ryc. 25. Schemat sukcesji zbiorowisk roślinnych w lejkach krasowych
 Fig. 25. Diagram of the succession course of plant communities in karst sink-holes

przebieg sukcesji. Hamująco i opóźniająco na rozwój roślinności działają przede wszystkim: koszenie szuwarów, wypas i mechaniczne niszczenie płat torfowcowego przez rybaków. Odbywa się to jednak na stosunkowo małą skalę.

Czynnikiem przyspieszającym procesy sukcesyjne jest niewątpliwie intensywne nawożenie upraw sąsiadujących z wieloma lejkami. Część składników mineralnych jest wypłukiwana z gleby i wraz z wodą spływa do jezior, przyczyniając się tym samym do ich eutrofizacji. Do stopniowego zamulania i spływania lejków przyczynia się niewątpliwie, w pewnych wypadkach, postępująca erozja stromych brzegów.

Wszystkie omawiane zbiorowiska roślinne, zarastające lejki krasowe, można podzielić na trzy grupy, z których każda obejmuje fitocenozy będące mniej więcej na tym samym stopniu wiekowego rozwoju.

5.2.1. STADIA INICJALNE

W mniej lub bardziej zeutrofizowanych lejkach krasowych są one reprezentowane przez zbiorowiska klas *Lemnetea* i *Potamogetonetea*. Zbiorowiska pleustonowe zasiedlają przeważnie jako pierwsze nowo powstałe zbiorniki wodne. Trudno jednak uważać je za zbiorowiska inicjujące proces zarastania, gdyż w niewielkim tylko stopniu przyczyniają się do lądowacenia akwenów. Pewien wyjątek stanowią tu płaty zespołów z rzędu *Hydrocharitetalia*, odznaczające się mniejszą ruchliwością i większą produktywnością biomasy. W lejkach krasowych fitocenozy *Lemno-Utricularietum vulgaris* wykazują

tendencje rozwojowe w kierunku zbiorowisk klas *Potamogetonetea* i *Phragmitetea*.

Właściwy proces zarastania zaczyna się w momencie pojawienia się w zbiorniku roślin wodnych zakorzenionych na dnie. W lejkach krasowych reprezentują je zespoły ramienic oraz fitocenozy zespołów ze związków *Potamogetonion* i *Nymphaeion*. W słabo zeutrofizowanych lejkach krasowych zbiorowiska roślinne z klasy *Potamogetonetea* są bardzo zubożałe, wykształcone facjalnie i z tego powodu nie spełniają tu takiej dużej roli, jak we właściwych zbiornikach eutroficznych.

W dystroficznych zbiornikach wodnych rolę zbiorowisk inicjujących proces zarastania przejmują zespoły klasy *Utricularietea intermedio-minoris*. Szczególnie ważną rolę odgrywa tu *Sphagnetum cuspidato-obesi*, którego fitocenozy tworzą mniej lub bardziej zwarte darnie, stanowiące początkowe stadium rozwoju płą torfowcowego. W licznych lejkach krasowych podobną rolę spełniają fitocenozy *Sparganietum minimi*, utworzone z roślin zakorzenionych na dnie (głównie *Sparganium minimum*) i wolno pływających (*Drepanocladus fluitans*). W kilku wypadkach w inicjalnych stadiach zarastania pewną rolę odgrywają zbiorowiska roślinne z rzędu *Eleocharition acicularis* jak *Juncus bulbosus fluitans* i *Eleocharis acicularis*.

5.2.2. STADIA PRZEJŚCIOWE

Na tym etapie zarastania zaznacza się bardzo wyraźna różnica pomiędzy lejkami zeutrofizowanymi a dystroficznymi. W lejkach zeutrofizowanych stadia przejściowe są reprezentowane przez różnorodne zbiorowiska szuwarowe z klasy *Phragmitetea*. Największą ekspansywnością odznaczają się zwłaszcza fitocenozy *Scirpetum lacustris*, *Typhetum angustifoliae*, *Cicuto-Caricetum pseudocyperii*, a w lejkach bardziej mezotroficznych — *Caricetum rostratae* i *Thelypteridi-Phragmitetum*. Fitocenozy wyżej wymienionych zespołów zajmują najgłębsze miejsca w akwenach i wypierają fitocenozy zbiorowisk ze związków *Potamogetonion* i *Nymphaeion*. Dalsza sukcesja zbiorowisk szuwarowych biegnie w kierunku fitocenoz *Sparganietum erecti*, *Typhetum latifoliae*, *Phragmitetum*, *Acoretum calami*, *Oenanthro-Rorippetum* lub *Caricetum elatae*. Na siedliskach zaburzonych, zbiorowiska szuwarów wysokoturzycowych ze związku *Magnocaricion* ulegają przekształceniu w zbiorowiska ze związku *Calthion palustris*.

W lejkach dystroficznych stadia przejściowe, najbardziej ekspansywne, są reprezentowane przez różne warianty *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*. Fitocenozy tego zespołu mają najczęściej formę pomostu torfowcowego, nasuwającego się na lustro wody od strony brzegów. Pło torfowcowe jest jednym z najważniejszych ośrodków ekspansji roślin w badanych lejkach krasowych. Jego dynamiczny rozwój jest decydującym czynnikiem w procesie opanowywania wolnej przestrzeni wodnej. Szczególnie duże znaczenie mają tu rośliny o długich pełzających rozłogach i kłaczach, jak *Calla palustris*, *Menyanthes trifoliata* czy *Potentilla palustris* (ryc. 26), rozwijające się

Ryc. 26. *Potentilla palustris* na brzegu płą mszarnego (lejek krasowy nr 104 w Woli Wiśniowskiej). Inicjalne stadium rozwoju *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*.

Fig. 26. *Potentilla palustris* at the edge of a floating moss lawn (the karst sink-hole no. 104 in Wola Wiśniowska). Initial developmental stage of *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*.

na krawędzi płą. Przerastają one i utrwalają pływające darnie fitocenoz *Sphagnetum cuspidato-obesi*, przez co umożliwiają ekspansję mniej hydrofilnym torfowcom, przede wszystkim *Sphagnum recurvum*. Niekiedy od płą odrywają się małe jego fragmenty i tworzą pływające wyspy, które stają się nowymi ośrodkami ekspansji.

5.2.3. STADIA KOŃCOWE

Końcowe stadia zarastania lejków krasowych odznaczają się rozwojem zbiorowisk zaroślowych i leśnych (*Alnetea glutinosae*, *Vaccinio-Piceetea*) oraz mszarów ombrotroficznych (*Oxycocco-Sphagnetea*). *Salicetum pentandro-cinereae* i *Carici elongatae-Alnetum* są naturalnymi, końcowymi ogniwami szeregu sukcesyjnego w zbiornikach eutroficznych. W specyficznych warunkach lejków krasowych siedliska tych zespołów cechuje daleko idące zubożenie, co objawia się sporym udziałem gatunków klas *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* i *Vaccinio-Piceetea*. Dlatego sądzić należy, że ich dalszy rozwój odbywać się będzie w kierunku *Betuletum pubescentis* lub innych zespołów leśnych z klasy *Vaccinio-Piceetea*. W nietypowych przypadkach obserwowano rozwój olsów na silnie zamulonych torfach sfagnowych.

W dystroficznych lejkach krasowych naturalna seria sukcesyjna kończy się wykształceniem płatów mszaru ombrotroficznego (*Sphagnetum magellanici boreale*). W początkowych fazach rozwija się typowa, bezleśna forma mszaru, którą z biegiem czasu opanowuje torfowiskowa forma sosny. W kilku przypadkach ostatnie stadium sukcesyjne stanowi bór bagienny (*Vaccinio uliginosio-Pinetum*), który z powodu stromych brzegów większości lejków nie znajduje dogodnych warunków rozwoju.

5.3. TORFOWCE JAKO WSKAŹNIKI TENDENCJI ROZWOJOWYCH ZBIOROWISK ROŚLINNYCH

Spośród wszystkich mszaków, torfowce odgrywają najważniejszą rolę w sukcesji badanych zbiorowisk roślinnych. Pojawienie się ich w płatach zespołów jest zjawiskiem o dużym znaczeniu biocenotycznym. Z chwilą osiedlenia się torfowców rozpoczyna się nowa seria sukcesyjna i daleko idące zmiany florystyczno-socjologiczne fitocenozy. Są one bowiem bardzo czułym wskaźnikiem pogarszających się warunków troficznych siedliska. Każdy kobierzec *Sphagnum* pojawiający się w płatach zbiorowisk niskotorfowiskowych jest inicjalną fazą torfowiska przejściowego. Z tego powodu lejki krasowe są niezmiernie interesującym i rzadkim obecnie w przyrodzie miejscem, gdzie można obserwować przekształcanie się torfowisk niskich w przejściowe. Jak wynika z badań stratygraficznych, w przeszłości tego typu przemiany nie należały do rzadkości. Mechanizm tych przekształceń, zwłaszcza w stadiach początkowych, jest niestety bardzo słabo poznany od strony ekologicznej.

W badanych zbiorowiskach roślinnych przenikanie torfowców do zbiorowisk torfowisk niskich może odbywać się już w stadiach inicjalnych, a najlepszym tego przykładem są fitocenozy *Sphagnetum cuspidato-obesi nupharetosum* oraz niektóre płaty *Hottonietum palustris*. W zbiorowiskach wodnych najważniejsza rola w ukierunkowaniu sukcesji przypada *Sphagnum cuspidatum*, nieco zaś mniejsza — *S. obtusum*.

Na wielką skalę ekspansja torfowców odbywa się do zbiorowisk szuwarowych, w szczególności zaś do płatów *Caricetum rostratae*. Zespół ten tworzy odrębny podzespół mszarny, który w wielu przypadkach trudno odróżnić od wariantu z *Carex rostrata* zespołu *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*. Często obserwowano również mszarne odmiany *Phragmitetum*, *Typhetum latifoliae*, *Thelypteridi-Phragmitetum*, *Caricetum elatae* i *Caricetum paniculatae*. Najbardziej ekspansywnym torfowcem jest tu *Sphagnum recurvum*.

Masowy rozwój synuzji torfowców odbywa się również w fitocenozach *Salicetum pentandro-cinereae* i *Carici elongatae-Alnetum*. Gatunkiem ekspansywnym jest tu również *Sphagnum recurvum*, którego masowe pojawienie się świadczy o kierunku sukcesji tych zespołów w stronę bagiennych lasów brzozowych i brzozowo-sosnowych.

Bardzo podobny łańcuch sukcesyjny zbiorowisk roślinnych w bezodpływowych jeziorach, zwanych sucharami na Pojezierzu Suwalskim, przedstawiła

Sobotka (1967). Różnica dotyczy głównie roli boru bagiennego, który w sucharach suwalskich jest bardzo pospolity, podczas gdy w lejkach krasowych odgrywa rolę drugorzędną. Jest to z całą pewnością wynik stosunków przestrzennych. Pod ten sam schemat sukcesji można podciągnąć rozwój roślinności w dołach potorfowych, szczegółowo przeanalizowany przez Podbielkowskiego (1960, 1970).

6. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań fitosocjologicznych, przeprowadzonych w latach 1973-1975 nad roślinnością strefy zarastania w lejkach krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej. Celem tego opracowania była identyfikacja i opis zbiorowisk roślinnych oraz analiza procesu zarastania w bezodpływowych zbiornikach wodnych na tle warunków siedliskowych. Ogółem przebadano 179 lejków krasowych, które w zależności od typu zasiedlającej je roślinności podzielono na trzy grupy:

- a. lejki krasowe z wyłącznym udziałem roślinności torfowisk niskich,
- b. lejki krasowe z udziałem roślinności torfowisk przejściowych,
- c. lejki krasowe z udziałem roślinności torfowisk wysokich.

Analizy hydrochemiczne próbek wody pobranych w najważniejszych zbiorowiskach roślinności wodnej wykazały, że większość lejków ma charakter dystroficzny.

Zbiorowiska lądowe, występujące w strefie zarastania, rozwijają się wyłącznie na glebach bagiennych. W lejkach krasowych o dość daleko posuniętym procesie zarastania występują powszechnie gleby torfowe utworzone z torfów niskich, przejściowych i wysokich. W lejkach znajdujących się w początkowych stadiach zarastania, zbiorowiska szuwarowe i zaroślowe rozwijają się na glebach mułowo-torfowych.

Na podstawie 440 zdjęć fitosocjologicznych zidentyfikowano 52 zespoły i zbiorowiska roślinne należące do 14 klas oraz szereg podzespołów, wariantów i facji.

Spśród roślinności wodnej najważniejszą rolę odgrywają zespoły klas *Potamogetonetea* i *Utricularietea intermedio-minoris*. Zespoły klasy *Potamogetonetea* są w lejkach krasowych bardzo zubożałe, wykształcone facjalnie i nie odgrywają tak wielkiej roli jak w zbiornikach wód eutroficznych. Optimum swego występowania w dystroficznych wodach lejków krasowych uzyskują zespoły klasy *Utricularietea intermedio-minoris*: *Sphagnetum cuspidato-obesi*, *Scorpidio-Utricularietum* i *Sparganietum minimi*. Omawiana klasa nie była dotychczas wyróżniana w polskich opracowaniach fitosocjologicznych, a same zespoły do niej należące są bardzo słabo poznane, pomimo swej pospolitości w bezodpływowych zbiornikach wodnych. Zespoły klasy *Utricularietea intermedio-minoris* są pionierskimi zbiorowiskami w akwenach dystroficznych, rozpoczynającymi sukcesję roślinności w kierunku zbiorowisk mszarów minerotroficznych.

Grupę zbiorowisk wodnych uzupełniają zespoły klas *Lemnetea* i *Litoretetea*. W obrębie klasy *Lemnetea* przyjęto wyróżnienie rzędu *Hydrocharitetalia* z dwoma zespołami: *Lemno-Utricularietum* i *Utricularietum australis*. Pierwszy z nich był dotychczas podany tylko dwa razy z Polski, natomiast drugi został stwierdzony u nas po raz pierwszy. Klasę *Litoretetea* reprezentują fragmentarycznie wykształcone zbiorowiska z *Eleocharis acicularis* i *Juncus bulbosus* for. *fluitans*.

Spośród 19 zbiorowisk szuwarowych z klasy *Phragmitetea* największe znaczenie mają szuvary ze związku *Phragmition*, stanowiące w wielu lejkach krasowych następne po roślinności wodnej stadium sukcesyjne. W pracy scharakteryzowano również zespoły szuwarów wysokoturzycowych ze związku *Magnocaricion*. Najczęściej w badanym terenie występują: *Caricetum rostratae*, *C. elatae*, *Cicuto-Caricetum pseudocyperi* oraz *Thelypteridi-Phragmitetum*. Te dwa ostatnie zespoły są bardzo ekspansywne, wykształcone najczęściej w formie pła, które nasuwa się na lustro wody. *Caricetum rostratae* obok typowego podzespołu, tworzy osobny podzespół mszarny ze *Sphagnum recurvum*, stanowiący bezpośrednie przejście od zbiorowisk szuwarowych do zbiorowisk mszarów minerotroficznych ze związku *Rhynchosporo-Sphagnion*.

Torfowiska przejściowe, będące najczęstszym elementem szaty roślinnej lejków krasowych, reprezentuje jeden zespół *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*. Wykształcony jest on w formie silnie uginającego się pła torfowcowego. Pod względem ekologicznym i florystycznym zespół ten wykazuje duże zróżnicowanie, co stało się podstawą do wyróżnienia w jego obrębie dwóch podzespołów, z których każdy obejmuje liczne warianty. Mszary minerotroficzne są pionierskimi zbiorowiskami roślinnymi, stanowiącymi zwykle wstępną fazę, poprzedzającą rozwój mszarów ombrotroficznych.

Torfowiska wysokie porasta mszar kępowo-dywanowy – *Sphagnetum magellanici sphagnetosum recurvi* oraz mszar bagnowy *Sphagnetum magellanici pinetosum* wariant z *Ledum palustre*. Mszary ombrotroficzne stanowią końcowe stadia zarastania bezodpływowych zbiorników wodnych.

Charakterystyczną cechą zbiorowisk olsowych (*Salicetum pentandro-cinereae* i *Carici elongatae-Alnetum*) jest bardzo duży udział roślin minerotroficznych, zwłaszcza zaś *Sphagnum recurvum*. Są one wskaźnikami niskiego trofizmu siedlisk, co jest wynikiem bliskich powiązań z zespołami torfowisk przejściowych, z którymi pozostają najczęściej w przestrzennym kontakcie.

W pracy poświęcono również nieco miejsca zbiorowiskom roślinnym, nie biorącym co prawda bezpośredniego udziału w zarastaniu lejków krasowych, ale pozostającym w przestrzennym kontakcie z wodami (zbiorowiska klas *Isoëto-Nanofuncetetea*, *Bidentetetea tripartiti*, *Plantaginetea maioris*) i torfowiskami (zbiorowisko *Nardus stricta-Calluna vulgaris*). Scharakteryzowano również typowo antropogeniczne zbiorowiska ze związku *Calthion palustris*, powstałe w wyniku niszczenia szuwarów przez wypas.

Na podstawie kilkuletnich obserwacji roślinności lejków krasowych, danych stratygraficznych, układu przestrzennego zbiorowisk roślinnych oraz dokładnej

analizy tabel poszczególnych zespołów odtworzono ogólny schemat sukcesji w bezodpływowych zbiornikach wodnych. Jego cechą charakterystyczną jest rozwój roślinności w kierunku zbiorowisk torfowisk przejściowych i wysokich, niezależnie od początkowych stadiów zarastania, w których w wielu przypadkach mogą brać udział zbiorowiska roślinne właściwe torfowiskom niskim.

Stopień zbadania bezodpływowych zbiorników wodnych w Polsce jest bardzo niezadowalający, stąd też trudno przeprowadzić wnikliwe porównania. Najwięcej wspólnych cech mają lejki krasowe z suwalskimi „sucharami” (Sobotka 1967) i dolami potorfowymi (Podbielkowski 1960).

Dr. Ryszard Ochyra
Instytut Botaniki
Polska Akademia Nauk
ul. Lubicz 46
31-512 Kraków

7. SUMMARY

7.1. INTRODUCTION

7.1.1. SCOPE AND AREA OF INVESTIGATIONS

The paper presents the results of phytosociological studies on the aquatic, swamp, peat bog, forest and brushwood vegetation in karst sink-holes in the environs of Staszów on the Małopolska Upland. The investigations were undertaken in order to identify and describe the plant communities and analyse the process of vegetation overgrowth on small endorrheic water bodies against the habitat conditions.

This study is a further step in the monographic elaboration of the karst sink-hole vegetation in the neighbourhood of Staszów. So far the results of palaeobotanical studies on the sediments filling the sink-holes (Szczepanek 1968, 1971) and papers devoted to the stonewort flora (Karczmarz et al. 1976), vascular plants (Ochyra 1979) and bryophytes (Ochyra 1981) have been published.

The area under investigation lies in the eastern part of the Nida Basin — a wide depression between the Świętokrzyskie Mountains and the Cracow-Częstochowa Upland (Fig. 1). The karst sink-holes occupy the territory situated in the wide depression, the main features of which may be referred to the Alpine orogenesis (Flis 1956; Jońca 1963; Walczowski 1965). Characteristic for the lithology of this terrain is the occurrence of karsting Tertiary rocks (Miocene marls, lithotome limestones and gypsum beds) on a non-karsting and unpermeable pre-Cambrian substrate, covered on the surface with Quaternary sediments (Fig. 2).

The origin of the karst sink-holes is connected in this area with the occurrence of several ground water levels. The highest one lies just under the surface in Quaternary formations. The lower levels are situated in the Tertiary gypsum beds on an impermeable Paleozoic substrate. These waters dissolve the gypsum rock so that empty spaces form in it. The loamy weathered crust above them breaks and falls to the bottom. In this way sink-holes arise modelled in the surface formations. That is why this type of karst is called covered karst.

The karst sink-holes belong to several types: dry ones with alluvia at the bottom, periodically inundated and those filled with water (karst lakes). They represent various development stages. The vigorous vegetation development causes gradual overgrowing of vegetation and filling of the holes with organogenic sediment.

The palaeobotanical investigations of Szczepanek (1968, 1971) proved that the development of karst sink-holes in the environs of Staszów took place in two phases: in the Allerød and Younger Dryas and towards the end of the Atlantic period.

As regards climate the area of Staszów has moderately severe winters, warm summers and a long warm autumn. The mean temperature of January (the coldest winter month) is around -3°C . Mean temperature in July (the warmest month) varies between $+17^{\circ}\text{C}$ and $+18^{\circ}\text{C}$. Mean annual temperature ranges from $+7$ to $+9^{\circ}\text{C}$. The annual sum of precipitation is as low as about 500 mm. The microclimate in the karst sink-holes exerts an important influence on the development of vegetation.

Geobotanically the environs of Staszów are classified to a separate district within the

Loess Uplands region (Szafer 1972) differing from the neighbouring ones by the almost complete absence of a loess cover.

In the landscape pine forests (*Vaccinio myrtilli-Pinetum*) prevail or pine-oak forests (*Pino-Quercetum*). Oak-linden-hornbeam forests with beach and riverside carrs and wet alderwoods occupy only small areas. In river and torrent valleys large surfaces are covered with damp and wet meadows of the *Molinio-Arrhenatheretea* class and fens of the *Scheuchzeria-Caricetea fuscae* class. The latter are at present mostly drained.

7.1.2. METHODS

The paper is based on 440 phytosociological records from all the plant communities participating in the overgrowth of karst sink-holes. In making these records, preparation of phytosociological tables and identification of plant communities the Braun-Blaquet (1964) method was applied. The records were made in the optimal phase of phenological vegetation development, that is from mid June to the end of August.

The systematic system and phytosociological nomenclature were adopted after Oberdorfer et al. (1967). Identification of the communities was based on characteristic and dominant species, less frequently on the characteristic combination of species.

In order to establish the chemical relations prevailing in the waters of the karst sink-holes, hydrochemical analyses were performed of 12 water samples taken from sink-holes representing various types of overgrowth, plant communities and environmental conditions (Tables 4, 5). Beside laboratory analyses, direct observations were performed in the field on the amount of suspension in the water, its clearness and colour. With almost every phytosociological record the water pH was measured.

The characterisation of the soil in the most important swamp, forest and brushwood communities was based on examination of 11 test pits. The results of chemical analyses are given in Table 6. The soil systematics is based on genetic criteria, and the layers and horizons are denoted after Kuźnicki et al. (1974).

7.2. CHARACTERISTIC OF KARST SINK-HOLES

The observations on the vegetation were performed in 179 karst sink-holes situated in forests and among fields and meadows (Fig. 4). All the sink-holes differ widely in shape, degree of sloping of walls, depth, surface area and vegetal cover. Mostly they are round or oval, less frequently irregular. The slopes are as a rule steep with an angle of 20-50°. The surface area of the sink-holes ranges from 0.01 to about 3.5 ha (Tables 1, 2, 3). The depth measured from the water surface or overgrowing vegetation surface to the bottom of the organogenic sediment is from a dozen centimetres or so to 18 m.

All the examined karst sink-holes also show rather wide differences in the vegetation cover. Three groups may be distinguished here:

a. Karst sink-holes with fen vegetation exclusively – this is the most numerous group (Table 1). They often occur in the form of lakes with a distinctly zonal vegetation arrangement. Communities of plants rooted in the bottom prevail (*Potamogetonetea*) or freely floating ones (*Lemnetea*), on the edges a belt of rushes develops more or less abundantly (*Phragmitetea*). In small water bodies there usually is no open water, the whole surface is occupied by rush or brushwood communities. Karst sink-holes belonging to this group exhibit in general stronger eutrophisation, so that plant communities specific to fens are the first to develop in them, and only later a change occurs in succession towards transition peat bogs proper.

b. Sink-holes with vegetation of transition peat bogs are characterised by the occurrence in them of patches of the *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* association. They usually form a quaking bog which slips over the open water. Some smaller sink-holes may be

completely covered by such a peatmoss carpet. The vegetation cover of sink-holes of this group is highly varied. Greatly reduced communities of the class *Potamogetonetea* prevail in the water, but most common are communities of the *Utricularietea intermedio-minoris* class. At the edges a wider or narrower belt of peatmoss develops or else the edges are overgrown with forest or brushwood communities. The frequency of sink-holes of this type equals that of the preceding one (Table 2) and they mostly are found in forests.

c. Karst sink-holes with raised bog vegetation are the least numerous group (Table 3). They are completely filled with organogenic sediment and the overgrowing vegetation forms typical raised bogs with dominance of the association *Sphagnetum magellanicum boreale*. On the edge usually a wider or narrower band is occupied by rush communities or by moss transitional bogs.

The character of the aquatic environment exerts no doubt the greatest influence on the development of vegetation in the karst sink-holes, particularly on its supply of mineral components. The waters of the sink-holes are mostly of dystrophic or weakly eutrophic character. The results of physico-chemical analyses of these waters (Tables 4, 5) agree well with the data of Podbielkowski (1960) for the waters of peat bogs. They usually have a low content of mineral compounds, an acid pH, they are brown in colour and contain a large amount of suspension. The pH ranges within wide limits from 3.5 to 7.5, most of the waters of the sink-holes giving an acid reaction. There is a rather distinct relation between the pH value of the water and the plant communities developing in it. In water with pH (4.5) 5.0-6.0 (6.5) aquatic communities of the classes *Utricularietea intermedio-minoris* and *Littorelletea* reach optimal development, whereas in water with pH (6.0) 6.5-7.5 those of the class *Lemnetea* and *Potamogetonetea* develop best. Highly acid waters with pH 4.5 or less are found in transition and raised peat bogs.

The soils of the karst sink-holes belong almost exclusively to bog soils. They are excessively wet, owing to the usually high ground water level. They are of two types:

a. Alluvial muck soils on which numerous rush, brushwood and forest communities develop. They form under variable water conditions: in the period of intensive action of running off waters organic and mineral sediments settle, on which, in the period when water ceases of flow and stagnates, peat-forming vegetation of various types develops. The pH of these soils is distinctly acid and the content of organic substance high (Table 6).

b. Peat soils occurring in sink-holes with advanced overgrowth processes. The peat-forming processes occur under conditions of permanent excessive soil moisture and anaerobiosis. This type of soils comprises three subtypes. Fen peat soils arise as the result of peat-forming processes when the water medium is rich in mineral components. In karst sink-holes they are very rare. Soils of transition bogs have features intermediate between fens and raised bogs they are habitats of pinewood bogs. The soils of raised bogs form from the soils of transition bogs owing to the layering of new peat layers and loss of contact with the ground water.

7.3. REVIEW OF PLANT COMMUNITIES

7.3.1. AQUATIC VEGETATION

a. Pleuston communities. Typically developed patches of these communities are generally found in small, heavily shaded sink holes in the forest, in which the process of plant succession is less intensive. The waters are in general poor in nutrient substances and their depth and the character of the bottom have no major influence on the plants. The sink holes produce a rather large amount of vegetal mass which, however, undergoes rapid decomposition so that these communities contribute but little to the filling of the water bodies occupied.

Of great importance in the development of the pleuston communities is the force and direction of winds, undulation and flow of waters. On the studied area these communities

are represented by five associations belonging to two orders. To the order *Lemnetalia* belong: *Ricciotum fluitantis* (Table 7), *Spirodelo-Lemnetum minoris* and *Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae* (Table 8). All these associations are characterised by the mass presence of minute aquatic plants: *Lemna minor*, *L. trisulca*, *Spirodela polyrrhiza*, *Riccia fluitans*, *Ricciocarpos natans*, *Salvinia natans*. Patches of these associations frequently develop in gaps between rush vegetation.

Two associations of the order *Hydrocharitetalia* (Table 9) occur on the examined area: *Utricularietum australis* and *Lemno-Utricularietum vulgaris*. These phytocenoses develop most frequently in contact with patches of rush communities (*Cicuto-Caricetum pseudocyperii*, *Phragmitetum*, *Typhetum latifoliae*, *Scirpetum lacustris*). They have a double-layer structure, *Utricularia australis* or *U. vulgaris* dominating in the subaqueous layer. *Utricularietum australis* has not been reported from Poland to date.

b. Stonewort (*Charetalia*) communities. Typically developed underwater stonewort meadows occur only in several karst sink-holes in water up to 140 cm deep. Their occurrence is strictly dependent on physical factors (character of bottom, water movement, its transparency, periodical drying up) and chemical ones (hardness of water, acidification, chemical composition of the substrate) of the environment.

In the waters of karst sink-holes with higher pH values and richer in nutrient components phytocenoses of *Charetum aculeolatae* (Table 10) and *Ch. rudis* (Table 11) dominate. On the other hand, in acidic shallow waters of sink-holes among fields and in pine forests patches of *Charetum vulgaris* dominate (Table 11).

Stonewort associations are floristically very poor. Usually one species prevails in them in masses reaching a maximal coverage. In the succession series stonewort phytocenoses are substituted by rush communities of the alliance *Phragmition*, mostly *Phragmitetum*. Moreover they remain in spatial contact with patches of communities of the order *Potamogetonetalia*.

c. Communities of plants rooted in the bottom (*Potamogetonetalia*). In the here discussed water bodies with distinct dystrophic tendencies plant communities of the *Potamogetonetalia* order, specific for eutrophic waters do not find favourable conditions for development. Therefore, they in general play no major role in reducing the depth of the sink-holes and the process of overgrowth of karst lakes.

In the order *Potamogetonetalia* seven associations were identified: *Myriophylletum verticillati*, *M. spicati*, *Elodeetum canadensis*, *Ceratophylletum demersi*, *Nuphareto-Nymphaetum albae*, *Potamogetonetum natantis*, *Hottonietum palustris* (Tables 12-14) and one community with *Potamogeton alpinus*. Most of these associations were until lately included into one extensive association — *Myriophyllo-Nupharetum*.

The above mentioned plant communities are characteristic by their poor floristic composition and dominance in the particular patches of usually only one species. In the zonal arrangement of vegetation in lakes the particular communities usually have a strictly defined place. Patches of *Ceratophylletum demersi* penetrate deepest into the water, they have been found as deep as 7 m together with *Myriophylletum spicati*. Phytocenoses of the latter association are characteristic by the mass presence of the aquatic moss *Fontinalis antipyretica* which reaches a high degree of constancy and coverage. The phytocenoses of the remaining associations usually develop in shallower places.

On the side facing the banks the here described associations come into direct contact with patches of rush communities of the class *Phragmitetea*.

d. Communities of dystrophic waters (*Utricularietea intermedio-minoris*). A dominant role in the phytocenoses of this class is played by unrooted plants floating in the water, mainly *Utricularia minor* and *U. intermedia* as well as aquatic mosses: *Sphagnum cuspidatum*, *S. obtusum*, *Drepanocladus fluitans*, *Calliergonella cuspidata* and *Calliergon giganteum*. Their occurrence is optimal in dystrophic waters in which they initiate vegetation development. Thus, they play here such a role as do phytocenoses of the class *Potamogetonetea* in eutrophic waters. They produce a great deal of vegetal mass which contributes to the rapid filling of water bodies occupied by these plants.

On the territory under study phytocenoses of two associations of this class are frequent: *Sphagnetum cuspidato-obesi* (Table 15) and *Sparganietum minimi* (Table 17). The third association *Scorpidio-Utricularietum* (Table 16) is extremely rare.

Within *Sphagnetum cuspidato-obesi*, beside the typical subassociation, a new one has been distinguished with *Nuphar luteum*. To this patches have been classified in which, beside aquatic mosses (*Sphagnum cuspidatum*, *Drepanocladus fluitans*), *Nuphar luteum* or *Nymphaea candida* occur in masses. Such phytocenoses have been earlier described as a separate association *Sphagno-Nupharetum* and classified to the *Nymphaeion* alliance associated with eutrophic waters (Oberdorfer 1957, Jasnowski 1967).

Sparganietum minimi (Table 17) is one of the most frequent associations of this class found in karst sink-holes. Its phytocenoses developing in water 10 to 110 cm deep exhibit wide ecological and floristic differences, what led to the distinction, beside the typical variety of the association, of variants with *Drepanocladus fluitans* and *Nymphaea alba*. Particularly interesting is the mossy variant with *Drepanocladus fluitans* which should be considered as the initial stage of the association. *Sparganietum minimi* initiates the process of overgrowth of small water bodies in forest karst sink-holes. Patches of this association are frequently dominated by *Caricetum rostratae* or *C. vesicariae*.

Phytocenoses of the third association of this class — *Scorpidio-Utricularietum* play no major role in the process of overgrowth of the sink-holes. In the particular patches of this association *Scorpidium scorpioides* dominates, reaching to a depth of 150 cm.

e. Plant communities of oligotrophic waters (*Litoretetea*). Patches of these communities are very rare in karst sink-holes and play no greater role in the process of their overgrowth. Two communities have been distinguished here with *Eleocharis acicularis* and with *Juncus bulbosus* for. *fluitans* (Table 18). Their patches occur sometimes in water as deep as 100 cm. They usually grow, however, on shallower places, where the water even periodically dries up. In the vegetation succession development they are eliminated by rush communities of the *Phragmitetea* class.

7.3.2. NATURAL COMMUNITIES ON ALLUVIAL MUCK SOILS OF THE BANKS AND PERIODICALLY INUNDATED DEPRESSIONS

Here belong several plant associations and communities spatially linked with waters. Their common feature is that they develop on sites periodically inundated. These communities are mostly of nitrophilous character and consist prevailingly of annual plants.

On alluvial muck soils communities with *Riccia huebenerana* (Table 19) develop in several karst sink-holes and *Cyperetum flavescens* (phytosociological record 256 p.58). They are of distinctly ephemeral character. More durable seem to be *Polygono-Bidentetum* (Table 20) and *Rumici-Alopecuretum* (Table 21) phytocenoses developing on alluvial muck soils frequently enriched in nitrogen.

Patches of *Polygono-Bidentetum* develop usually in late summer or in autumn on the edge of small karst sink-holes in which the water dries up completely or drops to a low level. A dominant role is played here by annual therophytes from the genera *Polygonum*, *Bidens* and *Rumex*. Beside them rush plants are frequent, particularly *Oenanthe aquatica*, *Alisma plantago-aquatica* and *Galium palustre*.

Phytocenoses of *Rumici-Alopecuretum* develop in similar conditions in the form of a low compact sward. Beside species characteristic for the association and alliance, species of the order *Bidentetalia* and *Phragmitetalia* are numerously represented in the particular patches. This is due to the fact that these communities remain in spatial contact.

7.3.3. RUSH COMMUNITIES

a. Tall rush communities (*Phragmition*). Swamp associations develop at the edge of karst lakes, frequently in water 1.5 m deep. In some shallower karst sink-holes they overgrow

their whole surface. The patches of rush associations are facially developed and characterised by the dominance of a single species showing a high degree of constancy.

On the studied area eight tall rush associations have been identified and described: *Scirpetum lacustris* (Table 22), *Typhetum angustifoliae* (Table 22), *T. latifoliae* (Table 23), *Sparganietum erecti* (Table 22), *Glycerietum maximae* (Table 22), *Acoretum calami* (Table 23) and the community with *Iris pseudoacorus* (Table 23).

These associations are of a typical shape described many times in the phytosociological literature (Tomaszewicz 1979). Some *Phragmitetum* and *Typhetum latifoliae* patches, however, developing on a peat substrate are characterised by a very high proportion of species of the class *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, particularly of *Sphagnum recurvum*, *Potentilla palustris* and *Epilobium palustre*. Characteristic is particularly the mass occurrence of *Sphagnum recurvum* which forms a rather compact quaking carpet. These phytocenoses are initial stages of development of transitional moss bogs of the *Rhynchosporo-Sphagnion* alliance. This is a very important moment when the fen transforms to a transitional peat bog, thus changes towards natural succession.

b. Low rush communities (*Eleocharito-Sagittarion*). In the karst sink-holes they are extremely rare. In the zonal vegetation arrangement in lakes they occupy a similar place as do communities of the *Phragmition* alliance. They differ from them, however, by their physiognomy, a weaker expansiveness and lower biomass production.

On the studied territory three associations of this alliance are found: *Oenanthro-Rorippetum*, *Sagittario-Sparganietum* and *Eleocharitetum palustris* (Table 24). From among these only the first one is frequent. Its patches develop in shallow eutrophised waters of small karst sink-holes with dominating *Oenanthe aquatica*. The remaining associations are extremely rare on this territory.

c. Tall sedges communities (*Magnocaricion*). Associations of tall sedges are common in numerous karst sink-holes where the process of vegetation overgrowth is advanced. In the zonal arrangement of vegetation they are situated beyond the band of tall rushes on shallow sites. In the process of overgrowth of water bodies they play a very important role since the enormous quantity of organic mass produced by them leads to the deposition of sedge peat layers.

In karst sink-holes the seven following associations of tall rushes have been identified: *Cicuto-Caricetum pseudocyperi* (Table 25), *Thelypteridi-Phragmitetum* (Table 26), *Caricetum elatae* (Table 27), *Caricetum paniculatae* (Table 27), *Caricetum rostratae* (Table 27), *Caricetum vesicariae* (Table 27) and *Caricetum gracilis* (Table 27). The enumerated associations exhibit a typical, frequently described structure of the phytocenoses. Noteworthy are only *Caricetum rostratae sphagentosum recurvi* patches common on this area. They are characterised by a mass contribution of *Sphagnum recurvum* and constitute a transition from rush communities to minerotrophic moss bogs of the *Rhynchosporo-Sphagnion* alliance. With time these patches transform to the variant with *Carex rostrata* of the association *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*. Similar moss bog variants have been observed in some patches of *Thelypteridi-Phragmitetum*.

7.3.4. PEAT BOG COMMUNITIES

a. Transition moss peat bogs (*Scheuchzerietalia palustris*). They are the most frequent element of the vegetal cover of the karst sink-holes in the environs of Staszów. They are represented by only one association — *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi*. The latter may be divided into a number of lower order units (subassociations, variants) differing by their floristic composition, ecological requirements and development dynamics.

The association has the form of a quaking moss bog slipping onto the water surface from the banks and islets and very quaky. Dominant here is *Sphagnum recurvum* and in the herb layer numerous minerotrophic species such as *Eriophorum angustifolium*, *Potentilla palustris*, *Menyanthes trifoliata*, *Carex nigra*. Within the typical subassociation (Tables 28, 29)

a number of variants have been distinguished in dependence on the dominance of a given species: typical, with *Carex rostrata*, *Phragmites australis*, *Carex lasiocarpa*, *Rhynchospora alba*, *Carex canescens*, *Juncus effusus* and *Calamagrostis canescens*. *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi typicum* is a treeless community. In the successive development of vegetation it transforms to an ombrotrophic moss bog representing a raised peat bog.

Patches of *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi betuletosum* (Table 30) are rather frequent on the studied area. They develop on drier sites and are of brushwood character with dominance of woody forms of *Betula pubescens* and *Pinus sylvestris* reaching a height of 2-4 m. In the herb layer *Eriophorum vaginatum*, *Ledum palustre* and *Vaccinium uliginosum* are frequent. In this subassociation, beside the typical variant, another with *Polytrichum commune* has been distinguished which sometimes prevails at the cost of *Sphagnum recurvum*. This subassociation is the phase preceding the development of bog birch forest (*Betuletum pubescentis*).

b. Mossy raised peat bogs (*Sphagnetalia fusci*). All ombrotrophic moss bogs in the neighbourhood of Staszów, in spite of wide floristic and ecological differences belong to one association — *Sphagnetum-magellanici boreale*. The commonest variety of this association is *Sphagnetum magellanici sphagnetosum recurvi* (Table 31). It is a flat quaking moss bog consisting mainly of *Sphagnum recurvum* with here and there dispersed slightly elevated hummocks of *Sphagnum magellanicum*. In the particular patches of this association, beside *Sphagnum recurvum*, ombrotrophic plants dominate of the class *Oxyocco-Sphagnetea* (*Vaccinium oxycoccos*, *Drosera rotundifolia*, *Andromeda polifolia*, *Polytrichum alpestre*, *Aulacomnium palustre*). It is a natural developmental stage of transition moss bogs.

As the result of hydrological disturbances this moss bog may transform to the variant with *Eriophorum vaginatum*, and in the case of mass invasion of trees — to *Sphagnetum magellanici pinetosum*. Patches of this subassociation are rather frequent on this territory, occupying sometimes extensive surfaces in the central part of the peat bog. Dwarf pine (*Pinus sylvestris* for. *uliginosa*) and *Ledum palustre*, *Vaccinium uliginosum* and *Pteridium schreberi* are dominant here. Plants characteristic for transition moss bogs are completely absent. In the karst sink-holes there is only a variety of the subassociation with *Ledum palustre*.

Raised peat bogs are the end stage of overgrowing with vegetation of karst sink-holes.

7.3.5. PLANT COMMUNITIES OF THE EDGES OF KARST SINK-HOLES

On the edges of some of the sink-holes with flat banks sometimes patches of plant communities develop, ecologically linked with communities participating directly in the process of overgrowth.

a. The community with *Scirpus sylvaticus* (Table 32) occurs in only two of the karst sink-holes. Its patches develop on shallow alluvial muck soils with the dominance of *Scirpus sylvaticus*. Frequent are also rush species such as *Galium palustre*, *Lacopus europaeus*, *Peucedanum palustre*.

b. *Epilobio-Juncetum effusi* (Table 32) develops on the edges of several karst sink-holes on habitats primarily occupied by communities of tall sedges, mainly *Caricetum elatae*. Its formation is due to trampling by grazing cattle. The great hummocks of *Juncus effusus* give a peculiar physiognomy of hummocks and holes to this phytocenosis. The moss layer is rather well developed with dominance of such species as *Drepanocladus exannuatus*, *D. aduncus*, *Climacium dendroides*.

c. The community *Nardus stricta-Calluna vulgaris* (Table 33) develops on the flat edges of the karst sink-holes, forming a band several metres wide around the raised peat bogs. The habitats of this community are arid and highly acidified, where water flow occurs only periodically. This community is rather heterogeneous, comprising fragments of various associations. In part at least it seems to be natural. Floristically these communities are rather rich with *Nardus stricta* and *Calluna vulgaris* playing a dominant role. The moister

patches of this community (Table 33, records 1-4) are similar in composition and ecology to *Nardo-Juncetum squarrosi*, the drier ones (Table 33, records 5-10) are related to *Polygalo-Nardetum*.

7.3.6. BRUSHWOOD AND FOREST COMMUNITIES

a. Wet alderwoods (*Alnetalia glutinosae*) are common plant communities on this territory. They are represented by the forest association *Carici elongatae-Alnetum* and the brushwood association *Salicetum pentandro-cinereae*. In spite of marked differences in their physiognomy, both associations are very similar as regards their floristic composition and ecology. They develop on swamp and peat soils under conditions of heavy inundation. The ground water level is very high here, and in certain periods the water rises to the surface, inundating local depressions. Wet alderwoods are spatially linked with fens and constitute the end stage of overgrowth of eutrophic lakes. In the karst sink-holes, the proportion of minerotrophic species is high in connection with the loss of trophic components in the habitats.

Willow brushwood (*Salicetum pentandro-cinereae*) (Table 34) is frequent on the edges of karst lakes, forming a band of a dozen metres or so around them. Some smaller sink-holes are completely invaded by it. In this brushwood willows dominate (*Salix cinerea*, *S. aurita*, *S. rosmarinifolia*, *S. pentandra*) and *Frangula alnus*. *Betula pubescens* and *Alnus glutinosa* are also common in shrub form. The moss layer is strongly developed with dominance of peat moss (*Sphagnum recurvum*, *S. teres*, *S. squarrosum*, *S. palustre*). In the herb layer minerotrophic plants are present in masses (*Agrostis canina*, *Potentilla palustris*, *Carex canescens*, *C. lasiocarpa*, *Menyanthes trifoliata*). Some investigators classify this form of association to *Salicetum pentandro-cinereae comaretosum*. It represents a separate trend of development leading to pine-birch or birch bog forests.

Wet alderwoods (*Carici elongatae-Alnetum*, Table 35) are rare on this territory. They develop most frequently on sodden edges of large karst lakes, and in several karst sink-holes among fields in Czajków and Wola Wiśniowska they occupy the whole surface. This phytocenosis consists as everywhere of hummocks and holes. In the latter there may be stagnant water for the greater part of the season.

A specific feature of the wet alderwood in karst sink-holes is the moss layer particularly abundant in peat mosses, and among them mostly *Sphagnum recurvum*. This proves that these habitats are very poor in mineral components.

b. Bog pinewood (*Vaccinio uliginosi-Pinetum*, Table 36) is fragmentarily developed in karst sink-holes and occupies very small areas in several sink-holes on shallow peat soil. The dominant component in this community is *Pinus sylvestris*, accompanied frequently by *Betula pubescens*. In the herb layer undershrubs develop in masses such as *Ericaceae* (*Ledum palustre*, *Vaccinium uliginosum*, *V. myrtillus*, *Calluna vulgaris*) and species characteristic for raised peat bogs (*Vaccinium oxycoccus*, *Drosera rotundifolia*, *Eriophorum vaginatum*). In the moss layer *Sphagnum recurvum*, *S. palustre*, *Leucobryum glaucum*, *Hylocomium splendens* and *Dicranum polysetum* dominate. Bog pinewood is a community which ends the natural succession series in dystrophic karst sink-holes.

7.4. DEVELOPMENT OF THE VEGETATION OF KARST SINK-HOLES

The most striking phenomenon in the vegetal cover on the sink-holes is the zonal arrangement of the vegetation. Its distribution depends on many factors, the most important of which is the size of the sink-hole, its depth, the character of the bottom and of the slope of the lake basin. The plants are most fully developed in large shallow karst sink-holes with a mild slope of the lake basin. In Figs. 13-24 cross sections of a number of karst sink-holes are shown on which examples of the zonation of the vegetation are illustrated.

The examined karst sink-holes have a highly differentiated vegetal cover which is the reflection of different habitat conditions prevailing in each of them. This has a strong influence on the course of succession processes. The peat deposits in the sink-holes consist according to Szczepanek (1968, 1971) of three parts: 1) in the underlay on gyttia there is a thin layer of mossy fen; 2) on it transitional bog peat is deposited; 3) and the upper horizons to the top are built of raised bog peat.

The fen peats at the bottom are a residue of the eutrophic phase of lake development preceding the later oligotrophisation of the waters. In many cases, however, the phase of fen is missing in dystrophic water bodies. These lakes after being filled with gyttia sediments are invaded by transition moss bog, and raised moss bog follows it.

Fig. 25 shows a generalised scheme of plant community succession in karst sink-holes. It was elaborated mainly on the basis of the spatial arrangement of the plant communities in this area and the analysis of the contribution of the particular groups of species in the tables of identified associations and communities. This scheme is very close to that of natural succession characteristic for small endorrheic water bodies.

All the previously discussed plant communities are divided into three groups, each of which includes the phytocenoses which are more or less in the same stage of successional development.

a. Initial stages in karst sink-holes — more or less eutrophic, represented by patches of communities of the classes *Lemnetea* and *Potamogetonetea*. In dystrophic sink-holes, on the other hand, this role is played by communities of the class *Utricularietea intermedio-minoris*, particularly by *Sphagnetum cuspidato-obesi*.

b. Transitional stages — here there is a marked difference between eutrophic and dystrophic water bodies. In the former transitional stages are represented by rush communities of the *Phragmitetea* class among which most expansive are the phytocenoses of *Scirpetum lacustris*, *Typhetum angustifoliae*, *Cicuto-Caricetum pseudocyperi*, and in more mesotrophic waters, *Caricetum rostratae* and *Thelyperidi-Phragmitetum*.

In dystrophic sink-holes the transitional stages are represented by *Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* phytocenoses. Quaking moss bog is here the most important means of expansion of plants over the water surface. Of particular significance are here plants with long rhizomes and offsets such as *Calla palustris*, *Potentilla palustris* (Fig. 26) or *Menyanthes trifoliata* growing at the edge of the quaking bog.

c. The end stage exhibits a development of forest and brushwood communities of the classes *Alnetea glutinosae* and *Vaccinio-Piceetea* and moss bogs of raised peat of the *Oxycocco-Sphagnetea* class.

Salicetum pentandro-cinereae and *Carici elongatae-Alnetum* are natural end links in the succession series in eutrophic water bodies. Under the specific conditions of the karst sink-holes these associations comprise a large proportion of minerotrophic species as the result of oligotrophisation of the habitats occupied by them. It may, therefore, be presumed that their further development will run towards *Betuletum pubescentis* or other forest associations of the class *Vaccinio-Piceetea*.

In dystrophic karst sink-holes the natural succession series ends in the development of a raised moss bog (*Sphagnetum magellanici boreale*). In the initial phases a typical forestless form of moss bog develops which with time is invaded by pine and birch. In this way the raised moss bog transform to a bog pinewood.

A very similar course of succession processes in small endorrheic water bodies has been described in Poland by Podbielkowski (1960) and Sobotka (1967).

8. LITERATURA

- Aichinger E., 1933. Vegetationskunde der Karawanken. Pflanzensoziologie 2: 1-329.
- Alekin O. A., 1956. Podstawy hydrochemii. 311 s. Warszawa, wyd. Geolog.
- Almestrand A., Lundh A., 1951. Studies on the vegetation and hydrochemistry of Scanian lakes. Bot. Not. Suppl. 2/3: 1-174.
- Ant H., Diekjøbst H., 1967. Zum räumlichen und zeitlichen Gefüge der Vegetation trockenengefallener Talssperenböden. Arch. Hydrob. 62: 439-452.
- Baumann E., 1911. Die Vegetation des Untersees Bodensee. Eine floristisch-kritische und biologische Studie. Arch. Hydrob. Suppl. 1: V + 1-554.
- Bodeaux A., 1955. *Alnetum glutinosae*. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 5: 114-137.
- Boer A. C. de, 1952. Plantensociologische beschrijving van de orde der *Phragmitetalia*. Nederl. Kruidk. Archief 52: 238-302.
- Boiński M., Boińska U., Ceynowa-Giełdon M., 1974. Roślinność jezior Zdręczno i Koźnie na obszarze Borów Tucholskich. Stud. Soc. Sci. Tor. Sect. D 10(1): 1-33.
- Braun W., 1968. Die Kalkflachmoore und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften im bayerischen Alpenvorland. Diss. Bot. 1: 1-134.
- Braun W., 1970. Bestimmungsübersicht für die Kalkflachmoore und deren wichtigsten Kontaktgesellschaften im bayerischen Alpenvorland. Ber. Bayer. Bot. Gesel. 42: 109-138.
- Braun-Blanquet J., 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3 Aufl. 865 s. Wien-New York. Springer.
- Braun-Blanquet J., Tüxen R., 1952. Irische Pflanzengesellschaften. Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 25: 224-415.
- Brehm K., 1968. Die Bedeutung des Kationenaustausches für den Kationengehalt lebender Sphagnen. Planta (Berlin) 79: 324-345.
- Brehm K., 1970. Kationenaustausch bei Hochmoorsphagnen: Die Wirkung von den Austauscher gebunden Kationen in Kulturversuchen. Beitr. Biol. Pflanzen 47: 91-116.
- Brehm K., 1971. Ein *Sphagnum*-Bult als Beispiel einer natürlichen Ionenaustauschersäule. Beitr. Biol. Pflanzen 47: 287-312.
- Bróz E., 1977. Zapiski florystyczne z lasów Okręgu Staszowskiego. Fragm. Flor. Geobot. 23(2): 121-123.
- Carstensen U., 1955. Laichkrautgesellschaften an Kleingewässern Schleswig-Holsteins. Schr. Naturw. Ver. Schlesw.-Holst. 27: 144-170.
- Ceynowa-Giełdon M., Rejowski M., 1969. Roślinność jeziora Nawionek. Stud. Soc. Sci. Tor. Sect. D 9: 1-16.
- Ceynowa-Giełdon M., Boińska U., Boiński M., 1972. Roślinność jeziora Sztuczne na obszarze Borów Tucholskich. Zesz. Nauk. UMK. Nauki mat.-przr. 30: 19-32.
- Corillion R., 1957. Les Charophycées de France et d'Europe Occidentale. Bull. Soc. Sci. Bretagne 32: 1-499.
- Dąbska I., 1961. Roślinne zbiorowiska jeziorne okolic Sierakowa i Międzychodu. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 23(4): 1-120.
- Dąbska I., 1964. *Charophyta* – Ramienice. Flora Ślaskowodna Polski 13: 1-126. Warszawa, PWN.

- Dąbska I., 1965. Roślinność litoralu jezior lobeliowych Pojezierza Kartuskiego. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 30: 1-55.
- Dąbska I., 1966. Zbiorowiska ramienic Polski. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 31: 1-75.
- Denisiuk Z., 1963. Roślinność lasów liściastych w okolicach Leśnej Podlaskiej. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 27: 1-132.
- Denisiuk Z., 1967a. Roślinność łąk turzycowych w dolinie Warty (klasa *Phragmitetea*). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 32: 1-95.
- Denisiuk Z., 1967b. Roślinność łąk turzycowych w dolinie Warty (klasa *Scheuchzeria-Caricetea fuscae*). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. 23: 355-415.
- Denisiuk Z., 1967c. Pastwisko z sitem rozpierzchłym jako przykład zbiorowiska o małej wartości gospodarczej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 74: 39-48.
- Denisiuk Z., 1980. Łąki turzycowe Wielkopolski (klasa *Phragmitetea*). Stud. Natur. Ser. A 20: 1-140.
- Denisiuk Z., Grynia M., 1965. Zbiorowisko situ rozpierzchłego na Pobrzeżu Słowińskim. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Nauk. Rol. i Kom. Nauk Leśn. 19: 29-58.
- Dierschke H., 1969. Natürlichen und naturnahe Vegetation in den Tälern der Böhme und Fintau in der Lüneburger Heide. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 14: 377-397.
- Donselaar J. van, 1961. On the vegetation of former river bogs in the Netherlands. Wentia 5: 1-85.
- Donselaar J. van, 1973. *Phragmitetalia* – gemeenschappen in de niterwaarden. 2. *Thyphetum angustifoliae*, *Thyphetum latifoliae*, *Rorippo-Oenanthetum* en *Sparganio-Sagittarietum*. Gorteria 6(7): 109-117.
- Drabowicz-Piekarska W., Szlązak-Dorenda M., Wrzyszczy J., 1959. Zbiorowiska roślinne aluwii nadwarciańskich w okolicach Poznania. Spr. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 1: 48-54.
- Dubiel E., 1973. Zespoły roślinne starorzeczy Wisły w Puszczy Niepołomickiej i jej otoczeniu. Stud. Natur. Ser. A 7: 67-124.
- Du Rietz E., 1954. Die Mineralbodenwasserzeigergränze als Grundlage einer natürlichen Zweigliederung der Nord- und Mitteleuropäischen Moore. Vegetatio 5/6: 571-585.
- Dynowski J., Gołdyn J., 1973. Analiza chemiczna wód. Skrypt dla geografów. 158 s. Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
- Dziedzic J., Asztemborski J., 1969. Roślinność jezior okolic Śmłowa i Piły. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 34(1): 1-56.
- Dziubaltowski S., 1915. Etude phytogéographique de la région de la Nida inférieure. 169 s. Neuchâtel.
- Dziubaltowski S., 1916. Stosunki geobotaniczne nad dolną Nidą. Pam. Fizjogr. 23: 107-202.
- Dziubaltowski S., 1922. O zbiorowiskach roślinnych godnych ochrony w Sandomierskiem i Opatowskiem. Kosmos 47: 30-38.
- Ehrendorfer F., 1973. Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2 Aufl., 318 s. Stuttgart, G. Fischer Verl.
- Eicke-Jenne J., 1960. Sukzessionsstudien in der Vegetation des Ammersees in Oberbayern. Bot. Jahrb. 79: 447-520.
- Ellenberg H., 1963. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in kausaler, dynamischer und historischer Sicht. Einführung in die Phytologie IV. 2. 945 s. Stuttgart, E. Ulmer.
- Fabiszewski J., Faliński J., 1967. O roślinności okolic Przemętu. Przr. Polski Zach. 8: 23-45.
- Faliński J., 1966. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. Rozpr. Uniw. Warsz. 13: 1-256.
- Fijałkowski D., 1959. Szata roślinna jezior Łęczyńsko-Włodawskich i przylegających do nich torfowisk. Ann. UMCS Sect. B 14: 131-206.
- Fijałkowski D., 1960. Stosunki geobotaniczne torfowiska „Dubeczno” koło Włodawy. Roczn. Nauk Rol. Ser. A 80(3): 449-494.

- Fijałkowski D., 1963. Zbiorowiska roślin synantropijnych miasta Chełm. Ann. UMCS Sect. C 18: 291-325.
- Fijałkowski D., 1967. Zbiorowiska roślin synantropijnych miasta Lublina. Ann. UMCS Sect. C 22: 195-233.
- Fijałkowski D., Kozak K., 1970. Roślinność rezerwatu „Torfowisko nad Jeziolem Czarnym Sosnowieckim”. Ann. UMCS Sect. C 25: 213-241.
- Fischer W., 1960. Pflanzengesellschaften der Heiden und oligotropher Moore der Prignitz. Wiss. Zeitschr. Päd. Hochsch. Potsdam, Mat.-Nat. Reihe 6: 83-106.
- Flis J., 1956. Szkic fizyczno-geograficzny Niecki Nidziańskiej. Czas. Geogr. 27(2): 123-159.
- Freitag H., Markus C., Schwippel J., 1958. Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Magdeburger Urstromtal südlich des Fläming. Wiss. Zeitschr. Päd. Hochsch. Potsdam, Mat.-Nat. Reihe 4(1): 65-92.
- Gams H., Ruoff S., 1929. Geschichte, Aufbau und Pflanzendecke des Zehlaubruckes. Schr. Phys.-Oek. Ges. Königsberg 66(1): 1-193.
- Gehu J.-M., 1961. Les groupements végétaux de bassin de la Sambre française. Vegetatio 10: 69-208, 257-372.
- Gilewska S., 1972. Wyżyny Śląsko-Małopolskie. [W:] Geomorfologia Polski 1: 232-339. Warszawa, PWN.
- Gołdyn R., 1975. Zbiorowiska roślinne J. Raczyńskiego pod Zaniemyślem. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B 28: 49-87.
- Gorham E., 1950. Variation in some chemical conditions along borders of a *Carex lasiocarpa* fen community. Oikos 2: 217-240.
- Görs S., 1961. Das Pfrunger Ried. Die Pflanzengesellschaften eines oberschwäbischen Moorgebietes. Veröff. landesst. Naturschutz u. Landsch. Bad.-Württ. 27/28: 5-45.
- Görs S., 1968. Der Wandel der Vegetation im Naturschutzgebiet Schwenniger Moos unter dem Einfluss des Menschen in zwei Jahrhunderten. W: Das Schwenniger Moos – Der Neckarursprung – Die Natur- und Landschaftsgebiete Baden-Württemberg 5: 190-284.
- Görs S., 1969. Die Vegetation des Landschaftsschutzgebietes Kreuzweiher im württembergischen Allgäu. Veröff. landesst. Naturschutz u. Landsch. Baden-Württ. 37: 7-61.
- Grodzińska K., 1975. Flora i roślinność Skalic Spiskich i Nowotarskich. Fragm. Flor. Geobot. 21(2): 149-246.
- Grolle R., 1976. Verzeichnis der Lebermoose Europas und benachbarter Gebiete. Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. 87(3-4): 171-279.
- Grosser K. H., 1955. Vegetationsuntersuchungen an Heidemooren und Heidesümpfen in der Oberförsterei Weisswasser (Oberlausitz). Wiss. Zeitschr. Humboldt-Univ. Berlin, Mat.-Nat. Reihe 4/5: 401-415.
- Grosser K. H., 1956. Landschaftsbild und Heidevegetation in der Lineburger Heide und der Lausitzer Heide. Abh. u. Ber. Naturkundemus. Görlitz 35(1): 77-109.
- Grosser K. H., 1964. Vegetationskomplexe und Komplexgesellschaften in Mooren und Sümpfen. Rep. Spec. Nov. Reg. Veget. Beih. 141: 208-216.
- Grosser K. H., 1967. Studien zur Vegetations- und Landschaftskunde als Grundlage für die Territorialplanung. Abh. u. Ber. Naturkundemus. Görlitz 42(1): 1-95.
- Hartog C. den, Segal S., 1964. A new classification of the water-plant communities. Acta Bot. Neerl. 13: 367-393.
- Hejný S., 1960. Ökologische Charakteristik der Wasser- und Sumpfpflanzen in den slovakischen Tiefebene (Donau- und Theissgebiet). 491 s. Bratislava.
- Hereźniak J., 1972. Zbiorowiska roślinne doliny Widawki. Monogr. Bot. 35: 1-160.
- Hilbig W., 1971a. Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. I. Die Wasserpflanzengesellschaften. Hercynia N. F. 8(1): 4-33.
- Hilbig W., 1971b. Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. II. Die Röhrichtgesellschaften. Hercynia N. F. 8(4): 256-285.
- Hilbig W., Reichhoff L., 1974. Zur Vegetation und Flora des Naturschutzgebietes „Schollener See”, Kreis Havelberg. Hercynia N. F. 11(2/3): 215-232.

- Hild H. J., 1964a. Die Vegetationsverhältnisse im Naturschutzgebiet Xantener Altrhein/Niederrhein. Ber. deutsch. bot. Ges. 76: 375-383.
- Hild H. J., 1964b. Vegetationskundliche Untersuchungen an einigen niederrheinischen Meeren. Ber. deutsch. bot. Ges. 77: 301-312.
- Horst K., Krausch H.-D., Müller-Stoll W. R., 1966. Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Elb-Havel-Winkel. Limnologica 4: 101-163.
- Hrynciewicz Z., 1959. Łąki i pastwiska Beskidu Niskiego pod względem geobotanicznym i gospodarczym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 19: 137-218.
- Hueck K., 1925. Vegetationsstudien auf brandenburgischen Hochmooren. Beitr. Naturdenkmalpfl. 10(5): 313-408.
- Hueck K., 1931. Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte des Endmoränengebietes von Chorin (Uckermark). Beitr. Naturdenkmalpfl. 14: 105-214.
- Hueck K., 1938. Die Vegetation der Grunewaldmoore. Arb. Berl. Prov. St. Natursch. 1: 1-256.
- Ionescu-Tuculescu V., 1967. Characee din Nord-Vestul Dobrogei si Balta Brailei. Acta Bot. Horti Bucurest. 1966: 253-268.
- Ionescu-Tuculescu V., 1968. Characeen aus dem Donaudelta. Limnol. Ber. der X Jubiläumst. Donauforsch. Sofia: 191-197.
- Izdebska M., 1969. Zbiorowiska roślinne górnego odcinka doliny Wieprza ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk łąkowych. Fragm. Flor. Geobot. 15(3): 283-332.
- Jahns W., 1962. Zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften den Grossen und Weissen Moores bei Kirchwaldsede (Kreis Rotenburg/Hannover). Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 9: 88-94.
- Jasnowski M., 1960. Torfowisko wysokie w dolinie Odry u jej ujścia do Zalewu Szczecińskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 25: 99-124.
- Jasnowski M., 1962. Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego. Szczec. Tow. Nauk., Wyd. Nauk Przyr.-Rol. 10: 1-339.
- Jasnowski M., 1967. Stan badań geobotanicznych torfowisk w Polsce. Międzynar. Symp. Torf. 12-16. IX. 1967 Warszawa: 9-42.
- Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S., 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. Ochr. Przyr. 33: 69-124.
- Jasnowski M., Jasnowska J., Kowalski W., Markowski S., Radomski J., 1972. Warunki siedliskowe i szata roślinna torfowiska nadkredowego w rezerwacie Tchórzyno na Pojezierzu Myśliborskim. Ochr. Przyr. 40: 157-232.
- Jeschke L., 1959. Pflanzengesellschaften einiger Seen bei Feldberg in Mecklenburg. Repert. Spec. nov. Regn. veget. Beih. 138: 161-214.
- Jeschke L., 1961. Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Mümmelken-Moor“ auf der Insel Usedom. Arch. Natursch. Landschaftsforsch. 1: 54-84.
- Jeschke L., 1963. Die Wasser- und Sumpfvegetation im Naturschutzgebiet „Ostufer der Müritz“. Limnologica 1: 475-545.
- Jonas F., 1935. Die Vegetation der Hochmoore am Nordhümling. Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. Beih. 78: 1-142.
- Jońca E., 1963. Z geomorfologii wschodniej części Niecki Nidziańskiej. Czas. Geogr. 34(3): 271-284.
- Just J., Hermanowicz W., 1964. Fizyczne i chemiczne badanie wody do picia i potrzeb gospodarczych. Wyd. 2, 310 s. Warszawa, PZW.
- Karczmarsz K., 1973. On the ecological requirements of *Chara delicatula* Agardh. Ann. UMCS Sect. C 28: 117-123.
- Karczmarsz K., Malicki J., 1972. Zespoły i ekologia ramienic Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Ann. UMCS Sect. C 27: 297-327.
- Karczmarsz K., Łuczycka A., Ochrya R., 1976. Materiały do flory ramienic środkowej i południowej Polski. 2. Acta Hydrobiol. 18(2): 193-200.
- Karczmarsz K., Szczepanek K., 1984. Sukcesje mchów na torfowiskowych obniżeniach lejków krasowych Regionu Staszowskiego. Folia Soc. Sci. Lubl. 24, Biol. 2: 135-144.

- Karpati V., 1963. Die zöonologischen und ökologischen Verhältnisse der Vegetation des Donauüberschwemmungsraumes in Ungarn. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 9(3/4): 323-385.
- Kästner M., Flössner W., 1933. Die Pflanzengesellschaften erzgebirgischer Moore. Veröff. Landesver. sächs. Heimatschutz 4: 1-206.
- Kępczyński K., 1960. Zespoły roślinne Jezior Skępskich i otaczających je łąk. Stud. Soc. Sci. Tor. Suppl. 6: 1-231.
- Kępczyński K., 1965. Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej. 325 s. Toruń, Univ. M. Kopernika.
- Kępczyński K., Ceynowa-Giełdon M., 1972. Obserwacje nad roślinnością Zalewu Korońskiego. Stud. Soc. Sci. Tor. Sect. D 9(4): 197-264.
- Kępczyński K., Fabiszak S., 1972. *Salvinia natans* (L.) All. i zespół *Spirodela-Salvinietum* Slavnič 1956 na terenie województwa bydgoskiego. Zesz. Nauk. UMK, Nauki Mat.-Przyr. 30, Biologia 15: 33-40.
- Kępczyński K., Zielski A., 1974. Zespoły roślinne Jeziora Mielwi i torfowiska do niego przyległego w powiecie brodnickim. Acta Univ. Nicol. Copernici, Biologia 16: 125-167.
- Kleist K., 1929. Badania nad zespołami roślinnymi torfowisk obszaru wydmowego prawego brzegu Wisły pod Warszawą. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU 69(5): 1-46.
- Klemm G., 1970. Die Pflanzengesellschaften der nordöstlichen Unterspreewald-Randgebietes. Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 107: 3-28.
- Klimaszewski M., 1958. Rozwój geomorfologiczny terytorium Polski w okresie przedczwartorzędowym. Prz. Geogr. 30(1): 3-43.
- Knapp R., Stoffers A. L., 1962. Über die Vegetation von Gewässern und Ufern im Mittleren Hessen und Untersuchungen über den Einfluss von Pflanzen auf Sauerstoffgehalt, Wasserstoff-Ionen-Konzentration und die Lebensmöglichkeit anderer Gewächse. Ber. oberhess. Ges. Naturh. u. Heilk. Gießen N. F. 32: 90-141.
- Kobendza R., 1930. Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. Planta Polon. 2: 1-200.
- Koch W., 1926. Die Vegetationseinheiten der Linthebene unter Berücksichtigung der Verhältnisse in der Nordostschweiz. Jahresber. St. Gall. Naturw. Ges. 61(2): 1-134.
- Koch W., 1934. Pflanzensoziologischen Skizzen aus den Reisfeldgebieten des Piemont (Po-Ebene). Vegetatio 5/6: 487-493.
- Konczak P., 1968. Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Havelssen um Potsdam. Limnologica 6: 147-201.
- Kornaś J., 1952. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. II. Zespoły ruderalne. Acta Soc. Bot. Pol. 21(4): 701-718.
- Kornaś J., 1968. Zespoły roślinne Gorców. II. Zespoły synantropijne. Fragm. flor. Geobot. 14(1): 83-125.
- Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne. Fragm. Flor. Geobot. 13(2): 167-316.
- Korniak T., 1966. Zawartość azotu, potasu i fosforu w glebie zespołów roślin ruderalnych. Zesz. Nauk. WSR Olszt. 22: 281-300.
- Kotilainen M., 1927. Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Pflanzendecke der Moore und der Beschaffenheit, besonde der Reaktion des Torfbodens. Eine pflanzensoziologische Studie mit Rücksicht auf die praktische Bewertung der Ergebnis. Wiss. Veröff. finn. Moorkulturver. 7: 1-219.
- Kovacs M., 1957. Die *Magnocaricion* – Zörnosen des Nógráder Florendistrikts. Bot. Közlem. 47(1/2): 135-155.
- Kozak K., 1968. Zbiorowiska roślinne torfowisk przejściowych i wysokich oraz ich powiązania z lasami Nadleśnictwa Parczew. Ann. UMCS Sect. C 23: 215-237.
- Kozłowska A., 1923. Stosunki geobotaniczne Ziemi Miechowskiej. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 57: 1-68.
- Kozłowska A., 1931. The genetic element and the origin of the steppe flora in Poland. Mém. Acad. Pol. Sci. Cl. Math.-Nat. Se. B 4: 1-110.
- Krach W., 1967. Miocen okolic Grzybowia. Acta Geol. Pol. 17(1): 175-218.

- Kraska M., 1969. Zbiorowiska oczeretowe okolic Pyzdr w pradolinie Warszawsko-Berlińskiej. *Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B* 23: 205-221.
- Kraska M., 1971. Zbiorowiska roślin wodnych i błotnych okolic Pyzdr w pradolinie Warszawsko-Berlińskiej. *Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B* 24: 181-202.
- Krausch H.-D., 1964a. Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes. I. Die Gesellschaften des offenen Wassers. *Limnologia* 2: 145-203.
- Krausch H.-D., 1964b. Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes. II. Die Röhrichte und Grossseggengesellschaften. *Limnologia* 2: 423-482.
- Krausch H.-D., 1965a. Zur Gliederung des *Scirpo-Phragmitetum medioeuropaeum* W. Koch 1926. *Limnologia* 3: 17-22.
- Krausch H.-D., 1965b. Vegetationskundliche Beobachtungen im Donaudelta. *Limnologia* 3: 271-313.
- Krausch H.-D., 1968. Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes. IV. Die Moore. *Limnologia* 6: 321-380.
- Krause W., 1952. Das Mosaik der Pflanzengesellschaften. *Planta* (Berlin) 41: 240-289.
- Krause W., 1969. Zur Characeenvegetation der Oberrheinebene. *Arch. Hydrobiol. Suppl.* 35(2): 202-253.
- Krotoska T., 1953. Zespoły leśne Parku Natury w Promnie pod Poznaniem. *Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol.* 14(3): 1-51.
- Król S., 1968. Zespoły leśne i warunki siedliskowe rezerwatu Janiewickie Bagno koło Ślawna na Pomorzu Zachodnim. *Ochr. Przyr.* 33: 139-165.
- Krzaczek T., 1967. Materiały briologiczne z południowo-zachodniej Lubelszczyzny. *Kotlina Sandomierska. Fragm. Flor. Geobot.* 13(4): 517-523.
- Krzywańska J., Krzywański D., 1972. Zarastanie dolów potorfowych i rowów melioracyjnych w dolinie Warty pod Markowem i Bartochowem. I. Zbiorowiska roślin wodnych pleustonowych i zakorzenionych oraz zbiorowiska oczeretowe. *Zesz. nauk. UŁ Ser. Mat.-Przyr.* 51: 127-144.
- Krzywański D., 1969. Zespół *Hydrocharo-Stratiotetum* Krus. et Vlieger 1937 w starorzeczach górnej Warty. *Zesz. nauk. UŁ Ser. Mat.-Przyr.* 31: 117-121.
- Krzywański D., 1974. Zbiorowiska roślinne starorzeczy środkowej Warty. *Monogr. Bot.* 43: 1-80.
- Kuc M., 1959a. Mchy Wyżyny Sandomiersko-Opatowskiej (Okręg Sandomierski). *Fragm. Flor. Geobot.* 5(1): 129-150.
- Kuc M., 1959b. Zapiski bryologiczne z Okręgu Staszowskiego. *Fragm. Flor. Geobot.* 5(2): 287-297.
- Kuc M., 1964. Briogeografia Wyżyn Południowych Polski. *Monogr. Bot.* 17: 1-212.
- Kuiper P. J. C., 1958. Verlandingsvegetaties in N. W. Overijssel. *Kruipnieuws* 20(1): 1-19.
- Kulczyński S., 1939/40. Torfowiska Polesia. I, II. 776 s. Kraków.
- Kutschera L., 1966. Neufunde und neue Standorte seltener Pflanzen in Kärnten. *Carinthia* II 156(76): 51-59.
- Kuźnicki F., Konecka-Betley K., Kowalkowski A., Białousz S., 1974. Systematyka gleb Polski. *Rocz. Glebozn.* 25(1): 1-148.
- Lang G., 1967. Die Ufervegetation des westlichen Bodensee. *Arch. Hydrobiol. Suppl.* 32(4): 437-574.
- Lang G., 1973. Die Vegetation des westlichen Bodenseegebietes. *Pflanzensoziologie* 17: 1-451.
- Lebrun L., Noirfalise A., Heinemann P., Vanden Berghen C., 1949. Les associations végétales de Belgique. *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 82(1): 105-207.
- Lohammar G., 1940. *Ricciocarpos natans* (L.) Corda nuvarande nordeuropeiska utbredning. *Svensk Bot. Tidsskr.* 34: 464-475.
- Lohmeyer W., 1950. *Oenanthe aquatica-Rorippa amphibia*-Ass. *Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F.* 2: 20.
- Lohmeyer W., 1953. Beitrag zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften in der Umgebung vom Höxter a. d. Weser. *Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F.* 4: 59-76.

- Luther H., 1951. Verbreitung und Ökologie der höheren Wasserpflanzen im Brackwasser der Ekenäs-Gegend in Südfinnland. I, II. Acta Bot. Fenn. 49/50: 1-232, 1-370.
- Łapczyński K., 1882. Ze Strzemieszyc do Solca. Pam. Fizjogr. 2: 351-357.
- Łapczyński K., 1887. Roślinność Sandomierza i Gór Pieprzowych. Pam. Fizjogr. 7: 44-59.
- Marek S., 1965. Biologia i stratygrafia torfowisk olszynowych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 57: 5-303.
- Mattick F., 1929. Das Moritzburger Teichgebiet und seine Pflanzenwelt. Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. Beih. 56: 125-166.
- Matuszkiewicz W., 1952. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Ann. UMCS Sect. C Suppl. 6: 1-218.
- Matuszkiewicz W., 1967. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski. [W:] Scamoni A. Wstęp do fitosocjologii praktycznej: 175-229. Warszawa, PWN.
- Medwecka-Kornaś A., 1952. Rezerваты stepowe nad doliną Nidą. Chrońmy Przyr. Ojcz. 8(6): 3-20.
- Medwecka-Kornaś A., 1959. Roślinność rezerwatu stepowego „Skorocice” koło Buska. Ochr. Przyr. 26: 172-260.
- Michna J., 1976. Roślinne zbiorowiska jeziorne Pojezierzy: Drawskiego i Bytowskiego. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 43: 1-75.
- Mitosek H., 1957. Zarys klimatu województwa kieleckiego w świetle potrzeb rolnictwa. 86 s. Kielce, PWRN.
- Miyawaki A., Tüxen J., 1960. Über *Lemnetea*-Gesellschaften in Europa und Japan. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 8: 127-135.
- Moor M., 1936. Zur Soziologie der *Isoëta*lia. Beitr. Geobot. Landesauf. Schweiz 20: 1-148.
- Moor M., 1958. Pflanzengesellschaften schweizerischen Flussauen. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Versuchswesen 34(4): 221-360.
- Moore J., 1968. A classification of the bogs and wet heaths of northern Europe. W: Tüxen R. (red.), Pflanzensoziologische Systematik, Ber. Int. Symp. Stolzenau 1964: 306-320. Den Haag.
- Müller K. von, 1973. Ökologische und vegetationsgeschichtliche Untersuchungen an Niedermoorpflanzen-Standorten des ombrotrophen Moores unter besonderer Berücksichtigung seiner Kolke und Seen in NW-Deutschland. Beitr. Biol. Pflanzen 49: 147-235.
- Müller Th., Görs S., 1960. Pflanzengesellschaften stehender Gewässer in Baden-Württemberg. Beitr. naturkundl. Forsch. SW-Deutschland 19: 60-100.
- Müller-Stoll W. R., Gruhl K., 1959. Vegetationsmonographie eines märkischen Naturschutzgebietes. Wiss. Zeitschr. Päd. Hochsch. Potsdam, Mat.-Nat. Reihe 4: 151-180.
- Müller-Stoll W. R., Neubauer M., 1965. Die Pflanzengesellschaften auf Grundwasser-Standorten im Bereich der Fercher Berge südwestlich von Potsdam. Wiss. Zeitschr. Päd. Hochsch. Potsdam, Mat.-Nat. Reihe 9: 313-367.
- Nedelcu G. A., 1967a. Vegetacia acvatica si palustra a lacului Comana. Acta Bot. Horti Bucurest. 1966: 385-408.
- Nedelcu G. A. 1967b. Beiträge zum phytosoziologischen Studien des Cernica-Sees. Vegetatio 15: 33-50.
- Neuhäusl R., 1959. Die Pflanzengesellschaften südöstlichen Teiles des Wittingauer Beckens. Preslia 31: 115-147.
- Neuhäusl R., Neuhäuslova Z., 1965. Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes „Břežný rybník” bei Doksy. Preslia 37: 170-199.
- Nordhagen R., 1936. Versuch einer neuen Einteilung der subalpinen-alpinen Vegetation Norwegens. Bergens Mus. Arb. 1936, Nat. Rekke 7: 1-88.
- Nowiński M., 1928. Zespoły roślinne Puszczy Sandomierskiej. II. Zespoły roślinne torfowisk niskich pomiędzy Chodaczowem a Grodziskiem. Kosmos, Ser. A 52: 457-546.
- Nowiński M., 1930. Roślinność i znaczenie dla rolnictwa torfowisk niskich z okolic ujścia Wisłoka do Sanu. w południowo-wschodniej części dawnej Puszczy Sandomierskiej. Prace Rol.-Leśne 3: 1-90.

- Nowiński M., 1967. Polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowe. Szkic fitosocjologiczny. 284 s. Warszawa. PWRiL.
- Oberdorfer E., 1954. Über Unkrautgesellschaften der Balkanhalbinsel. Vegetatio 4: 379-411.
- Oberdorfer E., 1957. Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie 10: 1-564.
- Oberdorfer E., 1970. Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und angrenzenden Gebiete. 3 Aufl., 987 s. Stuttgart, E. Ulmer.
- Oberdorfer E., Görs S., Korneck D., Lohmeyer W. i in., 1967. Systematische Übersicht der westdeutschen Phanerogamen- und Gefäßkryptogamen-Gesellschaften. Schr. Vegetationsk. 2: 7-62.
- Ochyra R., 1979. Flora lejków krasowych okolic Staszowa. I. Rośliny naczyniowe. Fragm. Flor. Geobot. 25(2): 209-236.
- Ochyra R., 1981. Flora lejków krasowych okolic Staszowa. II. Mszaki. Fragm. Flor. Geobot. 26(2): 321-340.
- Ochyra R., Szmaida P., 1978. An annotated list of Polish mosses. Fragm. Flor. Geobot. 24(1): 93-145.
- Ochyra R., Tomaszewicz H., 1979. Nowe stanowiska *Ricciocarpos natans* (L.) Corda (*Ricciaceae*, *Hepaticopsida*) i przegląd jego rozmieszczenia w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 25(3): 429-438.
- Olczek R., 1967. Zespoły szuwarowe i turzycowe doliny Bzury i Zianu. Zesz. Nauk. UŁ Ser. 2, 23: 75-99.
- Olkowski M., 1972. Budowa i roślinność torfowisk Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Nauk. AR-T Olszt. Ser. A, Suppl. 13: 3-79.
- Olsen S., 1944. Danish *Charophyta*, chorological, ecological and biological investigations. Det Kong. Danske Vidensk. Selskab. Biol. Skrifter 3(1): 1-240.
- Olsen S., 1950. Aquatic plants and hydrospheric factors. I, II. Svensk bot. Tidskr. 44: 1-34, 332-373.
- Oswald H., 1923. Die Vegetation des Hochmoores Komosse. Svensk. Växtsoc. Sälls. Handl. 1: 1-436.
- Overbeck F., Happach H., 1957. Über das Wachstum und den Wassergehalt einiger Hochmoorsphagen. Flora 144: 335-402.
- Paasio I., 1933. Über die Vegetation der Hochmoore Finnlands. Acta Forest. Fenn. 39(3): 1-210.
- Pacowski R., 1967. Biologia i stratygrafia torfowiska wysokiego Wieliszewo na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 76: 101-196.
- Pałczyński A., 1975. Bagna Jaćwieskie (Pradolina Biebrzy). Roczn. Nauk Rol. Ser. D 145: 1-233.
- Panknin W., 1945. Zur Ökologie und Soziologie der *Lemnetea*-Standorte. Arch. Hydrobiol. 41: 225-232.
- Passarge H., 1955. Die Pflanzengesellschaften der Wiesenlandschaft des Lübbenauer Spreewaldes. Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. Beih. 135: 194-231.
- Passarge H., 1956. Die Wälder des Oberspreewaldes. Arch. Forstwes. 5: 46-95.
- Passarge H., 1957a. Über Wasserpflanzengesellschaften und Kleinröhrichtgesellschaften des Oberspreewaldes. Abh. u. Ber. Naturkundemus. Görlitz 35(2): 143-152.
- Passarge H., 1957b. Vegetationskundliche Untersuchungen in der Wiesenlandschaft des nördlichen Havellandes. Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. Beih. 137: 5-55.
- Passarge H., 1959a. Pflanzengesellschaften zwischen Trebel, Grenz-Bach und Peene (O-Mecklenburg). Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. Beih. 138: 1-56.
- Passarge H., 1959b. Vegetationskundliche Untersuchungen in den Wäldern der Jungmoränenlandschaft um Dargun (Ostmecklenburg). Arch. Forestwes. 8: 1-74.
- Passarge H., 1961a. Beobachtungen über Pflanzengesellschaften der Moore im Bezirk Gdańsk (Danzig). Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. Beih. 139: 233-250.
- Passarge H., 1961b. Zur Soziologischen Gliederung der *Salix cinerea*-Gebüsche Norddeutschlands. Vegetatio 10: 209-228.

- Passarge H., 1964a. Pflanzengesellschaften des norddeutschen Flachlandes I. Pflanzensoziologie 13: 1-324.
- Passarge H., 1964b. Über Pflanzengesellschaften der Moore im Lübecker Endmoränengebiet. Abh. u. Ber. Naturkundemus. Görlitz 39: 1-26.
- Passarge H., 1964c. Zur Frage der Probeflächenwahl bei Gesellschaftskomplexen im Bereich der Wasser- und Verlandungsvegetation. Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. Beih. 141: 203-208.
- Passarge H., Hofmann G., 1968. Pflanzengesellschaften des norddeutschen Flachlandes. II. Pflanzensoziologie 16: 1-298.
- Pawłowski B., 1959. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. Systematyka polskich zbiorowisk roślinnych. [W:] Szata roślinna Polski 1: 229-274. Warszawa, PWN.
- Pawłowski B., Pawłowska S., Zarzycki K., 1960. Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza. Fragm. Flor. Geobot. 6(2): 95-223.
- Penzes A., 1960. Über die Morphologie, Dynamik und zöologische Rolle der Sprosskolonienbildenden Pflanzen (Polycormone). Fragm. Flor. Geobot. 6(4): 501-516.
- Pfeiffer H., 1951. Über die Pflanzengesellschaften des kleinsten Igelkolbens in Wassergefüllten Torfstichen. Phytos 3: 112-120.
- Philippi G., 1969. Laichkraut- und Wasserlinsengesellschaften des Oberrheingebietes zwischen Strassburg und Mannheim. Veröff. landesst. Natursch. Landschaftspfl. Bad.-Württ. 37: 102-172.
- Pietsch W., 1963. Vegetationskundlichen Studien über die Zwergbinsen- und Strandlingsgesellschaften in der Nieder- und Oberlausitz. Abh. u. Ber. Naturkundemus. Görlitz 38(2): 1-80.
- Pietsch W., 1963/64. *Utricularietea intermedio-minoris* class. nov. — ein Beitrag zur Klassifizierung der europäischen Wasserschlauch-Gesellschaften. Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot. N. F. 5/6: 227-231.
- Pietsch W., 1965. Die Erstbesiedlungs-Vegetation eines Tagebau-Sees, Synökologische Untersuchungen im Lausitzer Braunkohlen-Revier. Limnologica 3: 177-222.
- Pietsch W., 1965/66. Bemerkungen zur Gliederung der *Littorelletea*-Gesellschaften Mitteleuropas. Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot. N. F. 7: 239-245.
- Pietsch W., 1968. Die Verlandungsvegetation des Sorgenteiches bei Ruhland in der Oberlausitzer Niederung und ihre pflanzengeographische Bedeutung. Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot. N. F. 8: 55-91.
- Pietsch W., 1977. Beitrag zur Soziologie und Ökologie der europäischen *Littorelletea*- und *Utricularietea*-Gesellschaften. Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. 88(3): 141-245.
- Pietsch W., Müller-Stoll W. R., 1968. Die Zwergbinsen-Gesellschaften der nackten Teichboden im östlichen Mitteleuropa, *Eleocharito-Caricetum bohemicae*. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 13: 14-47.
- Piotrowska H., 1960. Lasy południowo-wschodniego Uznamu. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. 6: 69-158.
- Piórecki J., 1975. *Trapa natans* L. w Kotlinie Sandomierskiej (ekologia, rozmieszczenie i ochrona). Roczn. przem. 15/16: 347-400.
- Podbielkowski Z., 1960. Zarastanie dolów potorfowych. Monogr. Bot. 10: 1-144.
- Podbielkowski Z., 1967. Zarastanie rowów melioracyjnych na torfowiskach okolic Warszawy. Monogr. Bot. 23: 1-170.
- Podbielkowski Z., 1968. Roślinność stawów rybnych województwa warszawskiego. Monogr. Bot. 27: 1-123.
- Podbielkowski Z., 1969. Roślinność glinianek województwa warszawskiego. Monogr. Bot. 30: 119-156.
- Podbielkowski Z., 1970. Die Vegetation und der Verlauf des Verwachsungsprozesses der künstlichen Wasserbecken und Wasserläufe der Mazowsze-Niederung. Acta Soc. Bot. Pol. 39(1): 63-114.

- Podbielkowski Z., Tomaszewicz H., 1974. Syntaxonomic position of *Hydrocharitetum morsus-ranae* van Langendonck 1935. Acta Soc. Bot. Pol. 43(3): 377-380.
- Podbielkowski Z., Tomaszewicz H., 1979. Zarys hydrobotaniki. 531 s. Warszawa, PWN.
- Polakowski B., Dziedzic J., 1972. Zespół *Hydrocharitetum morsus-ranae* van Langendonck 1935 w północno-wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 18(3/4): 353-358.
- Polakowski B., Dziedzic J., Polakowska E., 1973. Roślinność rezerwatu „Jezioro Łukiany” na Pojezierzu Mazurskim. Ochr. Przyr. 37: 85-114.
- Poli E., Tüxen J., 1960. Über *Bidentetalia*-Gesellschaften Europas. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 8: 136-145.
- Popiołek Z., 1971. Roślinność wodna i przybrzeżna jezior okolic Ostrowa Lubelskiego na tle warunków siedliskowych. I. Jezioro Kleszczów. Ann. UMCS Sect. C 26: 387-408.
- Popiołek Z., 1972. Roślinność wodna i przybrzeżna jezior okolic Ostrowa Lubelskiego na tle warunków siedliskowych. II. Jezioro Kleszczów. Ann. UMCS Sect. C 27: 247-270.
- Popiołek Z., 1973. Roślinność wodna i przybrzeżna jezior okolic Ostrowa Lubelskiego na tle warunków siedliskowych. III. Jezioro Miejskie. Ann. UMCS Sect. C 28: 191-213.
- Popiołek Z., 1974. Roślinność wodna i przybrzeżna jezior okolic Ostrowa Lubelskiego na tle warunków siedliskowych. IV. Jezioro Gościńskie. Ann. UMCS Sect. C 29: 333-353.
- Preisig E., 1953. Süddeutsche Borstgras- und Zwergstrauchheiden (*Nardo-Callunetea*). Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 4: 112-123.
- Ralski E., 1931. Hale i łąki Pilska w Beskidzie Zachodnim. Prace Rol.-Leśne 1: 1-157.
- Reimers H., Hueck K., 1929. Vegetationsstudien auf litauischen und ostpreussischen Hochmooren. Abh. Math.-Naturw. Abteil. Bayer. Akad. Wiss. Suppl. 10: 409-494.
- Rewska H., 1967. Opracowanie fizjograficzne szczegółowe dla potrzeb szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka wypoczynkowego w Golejowie. Warszawa, Geoprojekt.
- Rodi D., 1963. Die Streuwiesen- und Verlandungsgesellschaften des Welzheimer Waldes. Veröff. landesst. Natursch. Landschaftspf. Bad.-Württ. 31: 31-67.
- Roll H., 1938. Neue Pflanzengesellschaften aus ostholsteinischer Fließgewässern. Beih. Bot. Centralbl. 58: 466-475.
- Romer E., 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocł. Tow. Nauk. Ser. B 16: 1-28.
- Rübel E., 1933. Versuch einer Übersicht über die Pflanzengesellschaften der Schweiz. Ber. Geobot. Forsch. Zürich 1932: 19-32.
- Rusińska A., 1974. Zespoły szuwarowe i oczeretowe południowej części Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B 26: 165-194.
- Rybniček K., 1970. *Rhynchospora alba* (L.) Vahl. its distribution, communities and habitat in Czechoslovakia. I. II. Folia Geobot. Phytotax. 5: 145-162, 221-263.
- Rybniček K., 1974. Die Vegetation der Moore, im südlichen Teil der Böhmischem-Mährischen Höhe. Vegetace ČSSR A 6: 1-243. Praha.
- Sauer F., 1937. Die Makrophytenvegetation ostholsteinischer Seen und Teiche. Soziologisch-limnologische Untersuchungen. Arch. Hydrobiol. Suppl. 6: 431-592.
- Scheel H., 1962. Moor- und Grundlandgesellschaften im oberen Briesetal nördlich von Berlin. Wiss. Zeitschr. Päd. Hochsch. Potsdam, Mat.-Nat. Reihe 7: 201-230.
- Schmuck A., 1959. Zarys klimatologii Polski. 160 s. Warszawa, PWN.
- Schwickerath M., 1940. Aufbau und Gliederung der europäischen Hochmoorgesellschaften. Bot. Jahrb. 71(2): 249-266.
- Schwickerath M., 1942. Bedeutung und Gliederung des Differenzialbegriffes in der Pflanzengesellschaftslehre. Beih. Bot. Centralbl. Abt. B 61: 351-383.
- Schwickerath M., 1944. Das Hohe Venn und seine Randgebiete. Pflanzensoziologie 6: 1-278.
- Schwickerath M., 1954. Die geographischen Rassen des *Sphagnetum medii et rubelli* im linksrheinischen Bergland. Vegetatio 5/6: 399-410.
- Segal S., 1965. Een vegetatieonderzoek van hogere waterplanten in Nederland. Wetensch. Meded. Kon. Ned. Natuurhist. Ver. 57: 1-80.

- Segal S., 1968. Ein Einteilungsversuch der Wasserpflanzengesellschaften W: Tüxen R. (ed.) Pflanzensoziologische Systematik. Ber. Intern. Symp. Stolzenau/Weser 1964: 191-219. Den Haag. W. Junk N. V.
- Simon T., 1960. Die Vegetation der Moore in den Naturschutzgebieten des nördlichen Alföld. Acta Bot. Hung. 6: 107-137.
- Sinicyńówna Z., 1936. Zespoły roślinne torfowisk pod Nieświeżem. Pr. Tow. Przyj. Nauk Wilno 10: 115-174.
- Slavik B., 1969. Ein bemerkungswerter Fundort der boreal-subatlantischen Pflanzengesellschaft *Sparganietum minimi* Schaaf 1925 im Gebiet Český Ráj (Nordböhmen). Preslia 41: 191-199.
- Slavnić Z., 1951. Prodrome de la groupments végétaux nitrophiles de la Voivodine Yugoslavie. Arch. Sci. Mat. srpska 1: 84-169.
- Slavnić Z., 1956. Die Wasser- und Sumpfvegetation der Vojvodina. Sborn. Mat. Srpske. Ser. Priir. Nauka 10: 1-72.
- Sobotka D., 1967. Roślinność strefy zarastania bezodpływowych jezior Suwalszczyzny. Monogr. Bot. 23: 175-258.
- Sofron J., Šandova M., 1972. Pflanzengesellschaften des Hochmoores Rokytka slat (Weitfäler Filz) im Šumava-Gebirge (Böhmerwald). Folia Mus. Rer. Nat. Bohem. Occident., Botanika 1: 1-27.
- Sokołowski A. W., 1963. Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. Monogr. Bot. 16: 1-176.
- Sokołowski A. W., 1969. Zespoły leśne Nadleśnictwa Balinka w Puszczy Augustowskiej. Monogr. Bot. 28: 1-80.
- Solińska B., 1963. Die Dynamik der Vegetation in Kleingewässern als Grundlage deren Klassifikation (Als Beispiel – Umgebung von Mikołajki). Ekol. Pol. Ser. A 11: 369-419.
- Soó R., 1954. Die Torfmoore Ungarns in dem pflanzensoziologischen System. Vegetatio 5/6: 411-420.
- Soó R., 1955. La végétation de bátorliget. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 1: 301-334.
- Soó R., 1957. Systematische Übersicht der pannonischen Pflanzengesellschaften. I. Acta Bot. Hung. 3: 317-373.
- Steffen H., 1931. Vegetationskunde von Ostpreussen. Pflanzensoziologie 1: 1-406.
- Stroede W., 1931. Ökologie der Characeen. 119 s. Berlin.
- Stroede W., 1933. Über die Beziehungen der Characeen zu den chemischen Faktoren der Wohngewässer und Schlammes. Arch. Hydrobiol. 25: 192-229.
- Succow M., 1974. Vorschlag einer systematischen Neugliederung der mineralbodenwasserbeeinflussten wachsenden Moorvegetation Mitteleuropas unter Ausklammerung des Gebirgsraumes. Repert. Spec. Nov. Reg. Veget. 85(1/2): 57-113.
- Sukopp H., 1959/60. Vergleichende Untersuchungen der Vegetation der Berliner Moore unter besonderer Berücksichtigung der antropogenen Veränderungen. Bot. Jahrb. 79: 36-126.
- Szafer W., 1918. Uwagi o florze stepowej okolic Buska. Pam. Fizjogr. 25: 1-10.
- Szafer W., 1972. Szata roślinna Polski niżowej. [W:] Szata roślinna Polski 2: 17-188. Warszawa, PWN.
- Szafran B., 1948. Przeżytki z epok ubiegłych we florze mchów Polski i wschodnich krain sąsiednich. Ochr. Przyr. 16: 41-65.
- Szafran B., 1950. Mszaki rezerwatów stepowych nad Nidą. Ochr. Przyr. 19: 151-162.
- Szczepanek K., 1968. Kras staszowski w świetle wyników wstępnych badań paleobotanicznych. Folia Quatern. 29: 49-57.
- Szczepanek K., 1971. Kras staszowski w świetle badań paleobotanicznych Acta Palaeobot. 12(2): 61-140.
- Szozskiewicz J., 1967. Zbiorowiska roślinne łąk łęgowych w dolinie Warty. A. Zbiorowiska klasy *Phragmitetea* i *Plantaginetea*. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. 23(2): 465-501.

- Śliwińska S., 1961. Zbiorowiska roślinne Jezior Firlej i Kunów w województwie lubelskim. Ann. UMCS Sec. C 16: 119-128.
- Timar L., 1947. Les associations végétales du lit de la Tisza de Szolnok à Szeged. Acta Geobot. Hung. 6: 70-83.
- Timar L., 1954. A Tisza hullámtérének növényzete Szolnok és Szeged között. Bot. Közlem. 45: 85-98.
- Tołpa S., 1932. Krasowe torfowiska koło Różany na Polesiu. Acta Soc. Bot. Pol. Suppl. 9: 289-316.
- Tomaszewicz H., 1969a. Roślinność wodna i szuwarowa starorzeczy Bugu na obszarze województwa warszawskiego. Acta Soc. Bot. Pol. 38(2): 217-245.
- Tomaszewicz H., 1969b. Roślinność wodna Jeziora Zegrzyńskiego. Acta Soc. Bot. Pol. 38(3): 401-424.
- Tomaszewicz H., 1973. The position of *Scirpo-Phragmitetum* W. Koch 1926 in systematics. Acta Soc. Bot. Pol. 42(3): 379-390.
- Tomaszewicz H., 1977a. Roślinność wodno-bagienna w akwenach zlewni Skrwy i Ciecho-mickiej na Pojezierzu Gostynińskim. Monogr. Bot. 52: 1-144.
- Tomaszewicz H., 1977b. Proposal of a new syntaxonomic classification of *Myriophyllo-Nupharetum* W. Koch 1926 phytocenoses and their distribution in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 46(3): 423-436.
- Tomaszewicz H., 1977c. Dynamics and systematic position of *Thelypteridi-Phragmitetum* Kuiper 1957. Acta Soc. Bot. Pol. 46(2): 331-338.
- Tomaszewicz H., 1979. Roślinność wodna i szuwarowa Polski (klasy: *Lemnetea*, *Charetea*, *Potamogetonetea*, *Phragmitetea*) wg stanu zbadania na rok 1975. Rozpr. Uniw. Warsz. 160: 1-325.
- Tomaszewski J., 1969. Gleby łkowe. 180 s. Warszawa, PWRiL.
- Tüxen J., 1969. Gedanken über ein System *Oxycocco-Sphagnetea* Br.-Bl. et R. Tx. 1943. Vegetatio 19: 181-191.
- Tüxen R., 1937. Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. Niedersachsen 3: 1-170.
- Tüxen R., 1953. *Sagittaria sagittifolia-Sparganium simplex*-Ass. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 4: 14.
- Tüxen R., 1958. Pflanzengesellschaften oligotropher Heidetümpel Nordwestdeutschlands. Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 33: 207-231.
- Tüxen R., 1962. Der Maujahn. Skizze der Pflanzengesellschaften eines wendlandischen Moores. Veröff. geobot. Inst. Rübel Zürich 37: 267-302.
- Tüxen R., 1974. Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. 2 Aufl Lfg 1, 207 s. Lehre, J. Cramer.
- Tüxen R., Dierschke H., 1974a. Das Lahrer Moor. Pflanzensoziologische Beschreibung eines emsländischen Naturschutzgebietes. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 17: 39-68.
- Tüxen R., Dierschke H., 1974b. Die Haselünner Kuhweide. Die Pflanzengesellschaften einer mittelalterlichen Gemeiweide. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. 17: 69-102.
- Tymrakiewicz W., 1935. Stratygrafia torfowisk krasowych południowego Polesia i północnego Wołynia. Kosmos, Ser. A 60: 173-251.
- Uotila P., 1971. Distribution and ecological features of hydrophytes in the polluted Lake Vanajavesi, S-Finland. Ann. Bot. Fenn. 8: 257-295.
- Urbanek H., 1969. Udział i rola diagnostyczna mszaków oraz stosunki florystyczno-fito-socjologiczne w przewodnich zespołach roślinnych regionu łódzkiego i jego pobrzeży. 244 s. Łódź, Uniwersytet Łódzki.
- Vaarama A., 1938. Wasservegetationsstudien am Grossee Kallavesi. Ann. Bot. Soc. „Vanamo” 13: 1-318.
- Vollmar F., 1947. Die Pflanzengesellschaften des Murnauer Moores. I. Ber. Bayer. Bot. Ges. 27: 13-97.

- Wacławski Z., 1959. Mchy Ziemi Miechowskiej. *Fragm. Flor. Geobot.* 5(2): 319-343.
- Wacławski Z., 1964. Mchy południowej części Niecki Nidziańskiej. *Fragm. Flor. Geobot.* 10(3): 357-397.
- Walczowski A., 1964. Zjawiska krasowe południowo-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. *Ann. UMCS Sect. B* 19: 29-62.
- Walczowski A., 1965. Kras zakryty w okolicy Staszowa. *Kwart. Geol.* 9(2): 458-459.
- Waldheim S., Weimarck H., 1943. Scanian mire-types. *Bot. Not.* 95: 1-40.
- Weber C. A., 1902. Über die Vegetation und Entstehung des Hochmoores von Angstumal im Memeldelta, mit vergleichenden Ausblicken auf andere Hochmoore der Erde. 252 s. Berlin.
- Weber-Oldecop D. W., 1970/71. Wasserpflanzengesellschaften im östlichen Niedersachsen. I, II. *Intern. Rev. Ges. Hydrobiol.* 55: 913-967; 56: 79-122.
- Wojterski T., 1960. Lasy liściaste dorzecza Mogielnicy w zachodniej Wielkopolsce. *Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Prace Kom. Biol.* 23(3): 1-231.
- Wołek J., 1974. Kritische Übersicht der Pleustongesellschaften Polens (Klasse *Lemnetea*). *Fragm. Flor. Geobot.* 20(3): 365-379.
- Zarzycki K., 1958. Ważniejsze zespoły łąkowe górnej Wisły a pomy wód gruntowych. *Acta Soc. Bot. Pol.* 27(3): 383-428.
- Zolyomi B., 1931. Vegetationsstudien an den Sphagnummooren um das Bükkgebirge im Mittelungarn. *Bot. Közlem.* 28: 89-121.
- Żukowski W., 1974. Rozmieszczenie gatunków rodzaju *Utricularia* w Polsce. *Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B* 27: 189-217.