MONOGRAPHIAE BOTANICAE

Vol. 74, 1992

KRYSTYNA CZYŻEWSKA

**SYNTAKSONOMIA ŚRÓDLĄDOWYCH,
PIONIERSKICH MURAW NAPIASKOWYCH**

SYNTAXONOMY OF INLAND AND PIONEER
PSAMMOPHILOUS GRASSLANDS

Redaktor: *S. Cieśliński*

Warszawa

Wydano z pomocą finansową
Komitetu Badań Naukowych

RADA REDAKCYJNA

W. Matuszkiewicz (Warszawa), Z. Podbielkowski (Warszawa), R. Olaczek (Łódź)
Hanna Piotrowska (Gdańsk), K. Rostański (Katowice), W. Żukowski (Poznań)

Adres redakcji: Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992

ISBN 83-7016-663-6
ISSN 0077-0655

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.		5
-------------------	--	---

Część I

Pionierskie murawy napiaskowe jako typ roślinności

2. Murawy szczotlichowe w Polsce i w Europie.		9
3. Rozwój poglądów na stanowisko systematyczne pionierskich muraw napiaskowych.		13
4. Stopień zbadania pionierskich muraw napiaskowych w Polsce.		18
4.1. Dokumentacja florystyczno-fitosocjologiczna.		19
4.2. Dokumentacja ekologiczna.		28

Część II

Badania własne

5. Materiały.		29
6. Metody badawcze.		34
7. Wyniki.		37
7.1. Syntaksonomiczny system pionierskich muraw napiaskowych Polski.		39
7.2. Charakterystyka syntaksonów.		42

Część III

Analiza *Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis* na obszarze Polski

8. Dyskusja wyników.		120
8.1. Charakterystyka zespołu roślinnego.		120
8.2. Klasyfikacja.		133
8.3. Zmienność geograficzna.		138
8.4. Ocena wartości diagnostycznej niektórych taksonów.		150
8.5. Znaczenie <i>Spergulo morisonii-Corynephorum</i> w przyrodzie i gospodarce człowieka.		154
8.6. Wskazówki praktyczne.		157
9. Wyniki i wnioski.		158
10. Literatura.		162
11. Syntaxonomy of inland and pioneer psammophilous grasslands (summary).		171

ABSTRACT

Krystyna Czyżewska. *Syntaxonomy of inland and pioneer psammophilous grasslands*. Monogr. Bot. vol. 74, 1992.

A regional description of the pioneer psammophilous grasslands in Poland is given. As a consequence of the syntaxonomic revision of 1055 phytosociological records (numerical classification according to the TWINSpan programme) the occurrence of a single association *Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis* R. Tx. ex K. Czyżewska hoc loco is stated in Poland, and — within that association — the following syntaxa: subass. *typicum* subass. nova (var. *typicum* var. nova, var. with *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. nova, var. with *Hypochoeris radicata* var. nova, and intermediate form), subass. *thymetosum serpyll* subass. nova (var. *typicum* var. nova, var. with *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. nova, var. with *Festuca ovina* var. nova, and var. with *F. psammophila*), subass. *cladinetosum mitis* R. Tx. (1928) 1937 em. K. Czyżewska (var. *typicum* var. nova, var. with *Thymus serpyllum* var. nova, and var. with *Polytrichum piliferum* var. nova — the later and earlier phases), as well as subatlantic and subcontinental races. Nomenclatoric types are given for all the units concerned.

Key words: Poland, *Spergulo morisonii-Corynephoretum*, syntaxonomy, new syntaxa, TWINSpan

Półnaturalne murawy napiaskowe, czyli psammofilne, ze związku *Corynephorion* (murawy szczotlichowe; niem.: Silbergras-Fluren; ang.: short dry grassland vegetation, psammophilous grassland) inicjują procesy utrwalania i zarastania piasków śródlądowych w obszarze wpływu klimatu atlantycko-subatlantyckiego.

Tüxen (1962) zalicza takie murawy do grupy zbiorowisk wyspecjalizowanych (Spezialisten-Gesellschaften), czyli pionierskich zbiorowisk jednorocznych lub wieloletnich, ubogich w gatunki, związanych z siedliskami ekstremalnymi, utrzymujących swą ciągłość w sposób migracyjny, łatwo przenikających do fitocenoz kontaktowych i zwykle tworzących monotypowe związki, rzędy i klasy.

Pionierskie fitocenozy psammofilne wyróżniają się wśród innych muraw prostą strukturą poziomą i pionową, szybko zachodzącymi zmianami składu gatunkowego oraz obecnością gatunków, które — dzięki niezwykle efektywnym mechanizmom rozprzestrzeniania — łatwo kolonizują tereny otwarte i wolne od konkurencji (Collier et al. 1978, Kornaś i Medwecka-Kornaś 1986). Znamienny jest duży udział kserofitów i sukulentów (Kornaś 1977, Matuszkiewicz 1982 i in.); często terofity dominują nad roślinami wieloletnimi (Kornaś 1957, 1977, Hohenester 1967, Tüxen 1967), a rośliny zarodnikowe nad nasiennymi (Nowiński 1967, Zielińska 1967, Cieśliński 1979, Krotoska i Tobolewski 1979/1980, Czyżewska 1986), co dobrze oddaje mozaikowata struktura przestrzenna i zawsze niepełne zwarcie roślin nasiennych.

Spośród różnorodnych form przystosowań psammofitów do życia w skrajnie suchych i jałowych siedliskach, uwagę zwracają umiejętność pomnażania i dominacja strategii życia typu „r”, tj. zdolność do wczesnego podejmowania wysiłku reprodukcyjnego, ekspansji oraz produkcji dużej liczby lekkich, łatwo przenoszących się nasion. Jednocześnie mogą występować gatunki silniejsze konkurencyjnie, o dużej powierzchni asymilacyjnej (biomasie), rozbudowanych częściach podziemnych i nadziemnych, długim, np. u *Corynephorus canescens*, lub krótkim, ale dwufazowym (jesiennie-wiosennym) cyklu życiowym, np. u *Spergula morisonii* i specyficznej gospodarce wodnej (Rychnovská-Soudková 1961, Marshal 1965, 1967, Symonides 1974a, b, c, d, 1977, 1978a, b, c, 1979a, b, c, 1987, Wilkoń-Michalska i Symonides 1974, Falińska i Żyromska-Rudzka 1986, Kornaś i Medwecka-Kornaś 1986).

Przyjęto, że wszystkie fitocenozy muraw pionierskich, występujące w Polsce na śródlądowych, oligotroficznym, w różnym stopniu kwaśnych piaskach wydmych oraz piaskach akumulacji lodowcowej i rzecznej, należą do jednego zespołu *Spergulo morisonii-Corynephoretum*. Ze względu na atlantycko-subatlantycki zasięg gatunków charakterystycznych zespołu i wyższych jednostek syntaksonomicznych (Meusel 1940a, Kornaś 1977, Matuszkiewicz 1982, Jalas i Suominen 1983) założono, że na ziemiach Polski, w odpowiednich siedliskach, realizuje się wschodnia część zasięgu zespołu. Zatem, ku wschodowi na skład florystyczny suboceanicznych fitocenoz będzie oddziaływał klimat subkontynentalny, co ujawni obniżanie się siły fitocenotwórczej oraz ustępowanie ilościowe i jakościowe gatunków atlantycko-

-subatlantyckich z klasy *Sedo-Scleranthetea* (rzędu *Corynephoretalia*). Ustępujące gatunki powinny być zastępowane taksonami subkontynentalno-kontynentalnymi z klas *Sedo-Scleranthetea* (rzędu *Festuco-Sedetalia*) i *Festuco-Brometea*.

W świetle dotychczasowych, bardzo zróżnicowanych poglądów badaczy europejskich (także polskich, por. 3, 4.1) na syntaksonomię pionierskich muraw, nadal kwestią dyskusyjną pozostaje zarówno ich miejsce w systemie syntaksonomicznym, jak i ujęcie (zakres) samych jednostek syntaksonomicznych. Daje o sobie znać tendencja do przeprowadzenia zmian w systemie oraz do wyróżniania nowych zespołów na podstawie badań lokalnych (warunkowanych przez zmienność lokalno-siedliskową). Specyfika regionalnych stosunków geobotanicznych przesłania najczęściej badaczom obraz ogólnej zmienności zbiorowisk, powodując wąskie i w konsekwencji ageograficzne ujęcia zespołów. Powiększaniu liczby zespołów psamofilnych, poza „lokalnym” widzeniem syntaksonów, sprzyja również wydzielanie faz sukcesji jako samodzielnych zespołów oraz antropopresja (za sugestią Olaczka npbl.). Dalsze wyróżnianie i opisywanie nowych zespołów, zwłaszcza w obrębie mezo- czy nawet makroregionów, daje jedynie efekt syntaksonomicznego chaosu i od dawna nie wydaje się celowe. Obecnie należy zmierzać do ogólnoeuropejskiej syntezy, która pozwoliłaby ustalić zasięg przestrzenny zespołu (zespołów), jego charakterystyczną kombinację gatunków i zmienność geograficzną. Synteza fitosocjologiczna muraw europejskich może składać się z syntez cząstkowych dużych regionów, w których zostaną wykonane badania poprawne pod względem metody i reprezentatywności. Dokumentacja wyników badań w niniejszej pracy była tworzona i gromadzona z myślą o takiej syntezie regionalnej jako części przyszłej syntezy europejskiej.

Nie rozwiązane jest także zagadnienie udziału i roli diagnostycznej istotnych tutaj, „drobnych” taksonów nasiennych i roślin zarodnikowych — wymagających wzorcowego opracowania specjalistycznego.

Odnosnie obszaru Polski, pomimo bogatej literatury przedmiotu i prób syntez (Kornaś 1957, Głowacki 1975, 1988, Endler i Polakowski 1978, Cieśliński 1979, Głazek 1986; por. także 4.1) publikowane materiały lokalne nie reprezentują całego, nizinno-wyżynnego zasięgu muraw, a przy tym, nie wszystkie kwalifikują się, aby włączyć je do syntezy (por. 4.1).

Inspiracją do podjęcia badań nad pionierskimi murawami napiaskowymi Polski były wyżej wzmiankowane luki i niejasności w wiedzy o tym interesującym składniku szaty roślinnej naszego kraju, obecnie ginącym z powodu zalesiania tzw. nieużytków oraz innych przyczyn. Dlatego analityczno-syntetyczne opracowanie muraw szczotlichowych uznano jako zadanie pilne. Może ono: (1) przyczynić się do wyjaśnienia zawikłanej problematyki syntaksonomicznej przez skorygowanie polskich typów fitocenoz w odniesieniu do typów nomenklatorycznych, opisanych z innych regionów Europy; (2) przyczynić się do dokładniejszego poznania wczesnych, inicjalnych stadiów sukcesji pierwotnej i wtórnej na obszarach śródlądowych, których różne fazy rozwojowe często były uznawane za samodzielne zespoły; (3) rzucić nowe światło na wiele interesujących zagadnień geograficzno-roślinnych, np. na granicę pomiędzy subatlantyckimi i subkontynentalnymi typami zbiorowisk napiaskowych,

na stosunek roślinności psammofilnej do kserotermicznej (por. Kornaś 1957); (4) wyjaśnić zagadnienie, czy murawy pionierskie mogą być także zbiorowiskami zastępczymi dla trwałych zbiorowisk leśnych.

Celem pracy było wyróżnienie, charakterystyka i klasyfikacja polskich, pionierskich fitocenozy psammofilnych, należących do związku *Corynephorion*; podstawą pracy była krytyczna analiza porównawcza, z zastosowaniem metody numerycznej, wszystkich dotychczas opublikowanych danych fitosocjologicznych oraz własnych materiałów, reprezentatywnych dla obszaru Polski i opracowanych jednolitymi metodami badawczymi.

W szczególności celem pracy było:

- wykazanie zmienności geograficzno-ekologicznej pionierskich fitocenozy inicjalnych,
- wykazanie rzeczywistego udziału roślin zarodnikowych w tych fitocenozach,
- wykazanie znaczenia „drobnych” taksonów roślin naczyniowych oraz porostów i mszaków dla ustalenia typów fitocenozy,
- weryfikacja syntaksonomiczna pionierskich muraw napiaskowych w świetle nowych materiałów oraz konfrontacja wyników ze znanymi wcześniej sugestiami odmiennych rozwiązań syntaksonomicznych.

Wykaz skrótów Index of abbreviations

acc. to	according to	l.c.	loco citato
all. nova	alliancia nova	m	metr (-ów)
ang.	angielski	max.	maksymalnie
ap.	apud	m.in.	między innymi
art.	artykuł	min.	minimalnie
ass. Ass.	associatio	mscr.	manuskrypt
auct.	auctores	N	północ, północny
bad.	badania	NE	północno-wschodni
C	Central	NW	północno-zachodni
cf.	confer	n	nad
Ch	gatunki charakterystyczne	np.	na przykład
cl. nova	classis nova	n.p.m.	nad poziomem morza
comb. nov.	combinatio nova	niem.	niemiecki
cyt.	cytat	npbl.	niepublikowane
D	gatunki wyróżniające	nom. nud.	nomen nudum
E	wschód, wschodni	nom. prov.	nomen provisorium
em.	emendavit	nr	numer
et al.	et alli	ok.	okolice
fig. Fig.	figura	podwar.	podwariant
f.	forma	podzesp.	podzespół
geogr.	geograficznie	por.	porównaj
gm.	gmina	p.p.	pro parte
incl.	inclusive	prov.	provisorius
in.	inne (-i, -y)	r	rare
itp.	i tym podobne	r.	rok
j.w.	jak wyżej	red.	redaktor (-rzy)
k.	koło	rozdz.	rozdział

ryc. Ryc.	rycina	syn. Syn.	synonim (-y)
s.l.	sensu lato	tab. Tab.	tabela
st. stał.	stopień stałości	tw.	tak zwany (-e)
s. str.	sensu stricto	var.	varietas, variant
sp. div.	species diversae	war.	wariant
s. ss.	strona (-y)	wg	według
subass.	subassociatio	woj.	województwo
subsp.	subspecies	zdj. fs.	zdjęcie (-a) fitosocjologiczne
subvar.	subvarietas, subvariant	zn	znikomo

[] uwagi autorskie

Podziękowania — Acknowledgements

Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność prof. dr. hab. R. Olackowi, Kierownikowi Zakładu Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego, za ocenę rękopisu pracy, cenne rady i wskazówki, które umożliwiły mi głębsze zrozumienie wielu rozpatrywanych kwestii.

Prof. dr. hab. J. Kornasiowi (UJ, Kraków), prof. dr. hab. W. Matuszkiewiczowi i dr. Anieli Matuszkiewicz (PAN, Warszawa) gorąco dziękuję za analizę i dyskusję nad tabelami fitosocjologicznymi oraz za pomoc we właściwej interpretacji i w zastosowaniu prawideł oraz zaleceń „Kodeksu Nomenklatury Fitosocjologicznej”.

Wyrazy prawdziwej wdzięczności składam prof. dr. hab. Jadwidze Wilkoń-Michalskiej i doc. dr. hab. L. Michalskiemu (UMK, Toruń), prof. dr. hab. S. Cieślińskiemu (WSP, Kielce), doc. dr. hab. Z. Dzwonko (UJ, Kraków), prof. dr. hab. J. Fabiszewskiemu (AR, Wrocław), prof. dr. hab. J. B. Falińskiemu (UW, Białowieża), prof. Teresie Krippelowej (UK, Bratislava), prof. dr. hab. R. Sowie (UŁ, Łódź) oraz nieżyjącemu już, prof. dr. hab. Z. Tobolewskiemu (UAM, Poznań) za konsultacje i dyskusje merytoryczne nad pracą, umożliwienie korzystania z trudno dostępnych pozycji literatury oraz ułatwianie badań terenowych w wielu regionach Polski.

Szczególnie serdecznie dziękuję dr. Andrzejowi Nienartowiczowi (UMK, Toruń) za opracowanie ordynacji i klasyfikacji numerycznej dużego zbioru danych oraz wykonanie obliczeń w Ośrodku Obliczeniowym UMK w Toruniu.

Dziękuję RNDr. I. Pišútovi, CSc., RNDr. Annie Lackovičovej, CSc., RNDr. Evie Lisickej, CSc. i RNDr. Jance Zlinskej, CSc. (SAV, UK, Bratislava) za organizację badań terenowych nad murawami Słowacji oraz studia w herbarium porostów (Slovenske národné múzeum, Bratislava), prof. dr. hab. Marii Ławrynówicz (UŁ, Łódź) — za koleżeńską pomoc, która umożliwiła mi przeprowadzenie badań muraw w Berlinie Zach. i wykorzystanie oryginałów prac w Bibliothek des Botanischen Gartens und Museums (Berlin-Dahlem), a dr. Jurdze Motiejūnaitė (LAN, Vilnius) — za uzupełnienie danych o murawach Litwy i Białorusi.

Serdecznie dziękuję prof. dr. hab. S. Balcerkiewiczowi (UAM, Poznań), dr. T. Załuskiemu (UMK, Toruń) i dr. L. Lipnickiemu (AWF, Gorzów Wlk.) za udostępnienie nie publikowanych materiałów zdjęciowych, zaś dr. Beacie Babczyńskiej-Sendek (UŚL, Katowice) — za udostępnienie zbiorów porostów ze swoich publikowanych prac o *Spergulo-Corynephorum*.

Gorąco dziękuję prof. dr. hab. K. Rostańskiemu (UŚL, Katowice) — za oznaczenie gatunków z rodzaju *Oenothera* i udostępnienie nie publikowanych zdjęć fitosocjologicznych muraw psammofilnych z Polski i Niemiec, dr. Marii Pawłus (PAN, Kraków) — za oznaczenie i sprawdzenie gatunków z grupy *Festuca ovina*, a dr. Małgorzacie Guzikowej (PAN, Kraków) — gatunków z grupy *Scleranthus annuus*, prof. dr. hab. Mirosławie Ceynowej-Giełdon (UMK, Toruń) — za sprawdzenie materiałów z grupy *Carex arenaria*, dr. Lucynie Fagasiewicz (UŁ, Łódź) — za wspólne studia nad roślinami naczyniowymi, prof. dr. hab. Z. Tobolewskiemu (UAM, Poznań) — za dyskusję nad odmianami gatunków z rodzaju *Cladonia* i *Cetraria* oraz dr. Ewie Filipiak (UŁ, Łódź) — za oznaczenie mszaków.

Dziękuję dr. Brygidzie Butrymowicz (UŁ, Łódź) za różnorodną pomoc, a dr. Grażynie Bez-kowskiej i mgr. S. Krysiakowi (UŁ, Łódź) za konsultacje geologiczno-glebowe.

Dziękuję mgr. Joannie Sowie (UŁ, Łódź) za konsultacje z zakresu języka łacińskiego.

Paniom Elżbiecie Frączak, Aldonie Nastalek i mgr. Dorocie Woźniak z Zakładu Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego dziękuję za pomoc techniczną.

Panu Rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego dziękuję za przyznanie mi 6-miesięcznego urlopu naukowego.

PIONIERSKIE MURAWY NAPIASKOWE JAKO TYP ROŚLINNOŚCI

2. MURAWY SZCZOTLICHOWE W POLSCE I W EUROPIE

Pionierskie murawy szczotlichowe związane są przede wszystkim z zespołem *Spergulo morisonii-Corynephorretum* (sensu Tüxen, 1928, 1937) — typem roślinności piaszkolubnej, charakterystycznej dla leśnej strefy nemoralnej europejskiego niżu, od Francji po Rosję, pozostającej pod wpływem klimatu umiarkowanego morskiego i przejściowego (ryc. 1), z kompleksem gleb brunatnych, płowych, bielcowych, bielich i rdzawych (por. Czyżewska 1988). Rosną one na śródlądowych, przeważnie kwaśnych piaskach (por. tab. I) różnego składu i pochodzenia (Kornaś 1957, Tüxen 1967, Krausch 1968, Matuszkiewicz 1982). Jest to jednocześnie jedyny znany z Europy Środkowej zespół śródlądowy związku *Corynephorion*, zaliczanego do rzędu *Corynephorretalia* i klasy *Corynephoretea* lub *Sedo-Sclerant-hetea* (por. 3).

Tabela I — Table I

Odczyn europejskich piasków śródlądowych — siedlisk muraw napiaskowych z *Corynephorus canescens*
pH conditions of European inland sands with *Corynephorus* habitats (według — after Marshall 1967, Vicherek 1972, Olsson 1974 and Czyżewska, badania własne — according to author's data)

Kraj — Country	pH	Kraj — Country	pH
Francja Północna	4.7 — 7.5	Niemcy	3.7 — 8.2
Holandia	4.6 — 5.6	Polska	3.5 — 7.8
Anglia	4.1 — 7.4	Czechy i Słowacja	4.2 — 6.8
Dania	5.0 — 5.4	Węgry	5.5. — 5.6
Szwecja	3.8 — 5.1	Ukraina	5.1 — 5.2

We Francji granicę zachodnią zwartego zasięgu stanowią obszary Szampanii i Burgundii po Sewenny na południu (por. Braun-Blanquet 1915, Bidault 1961, Ligér 1975, Royer 1978). Dla zachodniej i południowo-zachodniej Francji, od środkowej Loary po Gaskonię, w strefie oddziaływania klimatu umiarkowanego wybitnie morskiego, wikariantem geograficznym *Spergulo-Corynephorretum* jest *Astrocarmo-Corynephorretum canescentis* Br.-Bl. 1967¹ (Géhu 1974, Royer 1978, Wattez, Géhu i de Foucault 1978). Zespół ten jest bogaty w atlantycko-medyterrańskie terofity.

¹ Nomenklaturę wzmiankowanych zespołów roślinnych i innych syntaksonów podano za cytowanymi autorami.

We Francji Południowo-Wschodniej wikariantem geograficznym *Astrocaryo-Corynephorum* i *Spergulo-Corynephorum* jest *Narduro-Corynephorum* (Géhu l.c., Wattez, Géhu i de Foucault l.c.).

W medyterrańskich obszarach Hiszpanii, Francji i Italii znane są zbiorowiska pionierskich terofitów i efemerofitów należące do klasy *Tuberarietea* (*Helianthemetea*) *guttatae*, np. *Corynephoru articulati-Tuberarietum* (*Helianthemetum*) *guttatae* Br.-Bl. 1931 (Rivas-Martinez 1978, Tüxen 1967, por. także Tüxen i Schwabe 1972 oraz Dierschke i Sasse 1968). W zachodniej Francji, począwszy od Normandii, atlantyckim wikariantem tych zbiorowisk jest *Tuberario-Corynephorum maritimi*, z *Corynephorus canescens* var. *maritimus*, *Carex arenaria* i terofitami: *Tuberaria guttata*, *Aira praecox*, *Ornithopus perpusillus* i in. (Géhu 1974, Frileux 1978).

W kierunku północy zasięg *Spergulo-Corynephorum* obejmuje tereny Belgii (Traets 1956, 1960, Depasse, Duvigneaud i Zuttere 1970 — cyt. wg Tüxena i Schwabe 1972 oraz Dierschke i Sasse 1986) i Holandii (Meltzer 1940, Stafleu i Westhoff 1940b — cyt. wg Tüxena i Schwabe l.c. oraz Dierschke i Sasse l.c.).

Najrozleglejszym terytorium występowania *Spergulo-Corynephorum* jest dorzecze Renu oraz Niziny Niemiecka i Polska. Obszar Niemiec, zwłaszcza Brandenburgię i Meklemburgię, wyróżnia najwyższy stopień zbadania pionierskich fitocenoz (por. Tüxen i Schwabe 1972 oraz Dierschke i Sasse 1986). Stąd pochodzą pierwsze opublikowane materiały dla Europy Środkowej i pierwsze opisy syntaksonów (Tüxen 1928, 1937, Hueck 1931, Volk 1931, Krieger 1937), a także późniejsze propozycje ujęć syntaksonomicznych (por. Passarge 1960, 1964, Krausch 1962, 1968, Oberdorfer 1962, 1983, Hohenster 1967, Korneck 1974, in Oberdorfer 1978, Jeckel 1984).

W sekwencjach przestrzennych zbiorowiskom szczotliczy siwej często towarzyszą murawy bardziej zwarte, ze związków *Armerion* i *Koelerion glaucae*.

Najdalej na wschód wysuniętą placówką takich muraw jest *Veronico dillenii-Corynephorum* Passarge 1960 em. Hohenster 1967 *typicum* i *V.-C polytrichetosum piliferi*, opisane z doliny Dniepru koło Kijowa przez Vicherka (1972). Te pionierskie fitocenozy z Europy Wschodniej (także z jednostkowym udziałem *Spergula morisonii*) autor traktuje jako subkontynentalny wikariant (sub)atlantyckiego *Spergulo-Corynephorum*. Znana jest także „Asocjacja *Corynephorus canescens*” z Polesia (Kulczyński 1939). Nowsze badania geobotaniczne doliny Dniepru i ukraińskiego Polesia nie przynoszą danych o pionierskich murawach psammofilnych (np. Šeljag-Sosonko et al. 1981, Sipajlova, Šeljag-Sosonko i Solomacha 1982). Nie ma, jak dotychczas, pewnych wiadomości o występowaniu muraw szczotlichowych na Białorusi, choć obecność wszystkich gatunków charakterystycznych ze związku *Corynephorion* (Šiškina, Tomina i Gončarika 1967, Kozlovskaja i Parfenov 1972, Jalas i Suominen 1983, por. także Faliński 1966) sugeruje, iż mogą tworzyć się jeszcze takie fitocenozy, zwłaszcza w części zachodniej. Brakuje nowych informacji o roślinności śródlądowych terenów piaszczystych Estonii i Łotwy, poza danymi z Litwy i okolic Królewca (Steffen

Ryc. 1. Diagramy klimatyczne wybranych stacji meteorologicznych, charakteryzujące klimat niżu europejskiego (wg Waltera i Lietha 1967)

Fig. 1. Climatic diagrams of some meteorological stations on European lowland (acc. to Walter and Lieth 1967)

1931, Mowszowicz 1938, Regel 1944, Matveeva 1967, Bandžiulienė i Rudzinskaitė 1972).

Południowa Szwecja, położona w obrębie strefy nemoralnej i piasków śródlądowych, stanowi północny kraniec zasięgu muraw odpowiadających *Spergulo-Corynephorum*. Olsson (1974, 1975) zalicza je do wyróżnionego przez siebie zespołu *Teesdalia-Corynephorum* i sugeruje, że w obszarze przybałtyckim w ogóle jest to północny wikariant subatlantyckiego *Ornithopodo-Corynephorum* i subkontynentalnego *Veronico-Corynephorum* (w sensie Passarge 1960, 1964), który jednocześnie koresponduje ze *Spergulo-Corynephorum festucetosum ovinae* (w sensie Krauscha 1968). Natomiast dla *Spergulo-Corynephorum* substytutem w Szwecji i Danii, a także i wokół Bałtyku, jest — zdaniem Olssona (1974) — *Cladonio (destrictae)-Corynephorum* Krieger 1937 em. Böcher 1941, prov. Najdalej na północ wysunięte stanowiska *Spergula morisonii* stwierdzono w południowej Finlandii (Oksanen 1981, także Jalas i Suominen 1983).

W południowej części arealu zbiorowiska ze związku *Corynephorion* występują zarówno w Czechach (Moravec et al. 1983), jak i w Słowacji (Mucina i Maglocký 1985). W północnych Czechach Toman (1973) stwierdził *Corynephorum canescentis* Tx. 1928 na Nizinie Połabskiej, nad Łabą i Ochrzą (por. także Klika 1931), zaś Moravec (1967) — *Corynephorum canescentis* Tx. (1928) 1937 *typicum*, *C. agrostidetosum caninae* i *C. cladonietosum* — w części południowo-zachodniej, nad Otawą, dopływem Wełtawy. Murawy szczotlichowe, w sensie *Spergulo-Corynephorum typicum* i *S.-C. cladonietosum*, występują jeszcze na Nizinie Zahorskiej w Słowacji (Šmarda 1953 i badania własne). W zubożałej postaci można spotkać je na Nizinie Naddunajskiej (Šmarda l.c.). Dla Nizin Zahorskiej i Naddunajskiej znamienne są dwa zbiorowiska ciepłolubne związane z piaskami eolicznymi, położone w obszarze oddziaływania klimatu umiarkowanego ciepłego, z przewagą wpływów kontynentalnych (ryc. 1): *Corynephorus canescens-Thymus angustifolius* ass. Krippel 1954 i *Festuca vaginata-Dianthus serotinus* ass. Klika 1935 (Krippel 1954, Krippelová i Krippel 1956). Soó (1957) włączył je w 1955 r. do zespołu *Festuco (vaginatae)-Corynephorum* Soó (ap. Aszód 1936) 1939 i podzespołu *moravicum*. Inne podzespoły tego zespołu występują na terenie Węgier.

Obok pionierskich muraw ze związku *Corynephorion*, w Europie Zachodniej i Południowej oraz zachodniej części Europy Środkowej rosną atlantycko-subatlantycko-śródziemnomorskie murawy napiaskowe należące do związku *Thero-Airion* i rzędu *Corynephoretalia* lub *Tuberarietalia (Helianthemalia) guttatae*, np. *Airetum praecocis* (Schwick. 1944) Krausch 1967 i *Filagini-Vulpietum* Oberd. 1938 (por. Krausch 1968, Géhu 1973, Géhu i de Foucault 1978a, Rivas-Martinez 1978, Royer 1978, Wattez, Géhu i de Foucault 1978, Matuszkiewicz 1982 i in.). Przez obszary Polski Zachodniej przebiega wschodnia granica ich zasięgu (por. Głowacki 1975, 1984, 1988, także tabele fitosocjologiczne obu zespołów ze Wzgórz Trzebnickich i Wzniesień Żarskich; Balcerkiewicz 1976). W naszym kraju takie murawy pojawiają się jednak efemerycznie, w okresie przewagi wpływów klimatu morskiego w cyklu rocznym (Matuszkiewicz 1982, obserwacje własne).

Wzdłuż wybrzeży północnoatlantyckich oraz mórz Północnego i Bałtyckiego, na kwaśnych piaskach wydmy akumulacji morskiej (wydmy szare występują pionierskie murawy należące do związku *Koelerion albescentis* [= *Galio-Koelerion*] i rzędu *Corynephoretalia*, substytuty muraw śródlądowych (Westhoff i Den Held 1969, Géhu 1973, Olsson 1974, Westhoff 1975, Kornaś 1977, Géhu i de Foucault 1978a, b, Matuszkiewicz 1982). W północnej Francji (Flandrii), Belgii, Holandii (także Fryzji), Danii i południowej Szwecji po Flandrię występuje *Violo-Corynephoretum* Westh. (1943) 1947. Fitocenozy te są traktowane jako nadmorski wikariant *Spergulo-Corynephoretum* (np. Tüxen 1967, Westhoff 1975), zaś w południowej Szwecji rolę tę pełni *Teesdalia-Corynephoretum* (Olsson 1974). W południowo-zachodniej części Bałtyku *Violo-Corynephoretum* zastępuje *Helichryso-Jasionetum* Libb. 1940 (Fukarek 1961, Wojterski 1964, Piotrowska i Celiński 1965, Olsson 1974), a w części południowo-wschodniej: *Helichryso-Artemisietum balticum* (Steffen 1931, Paul 1953). W świetle badań Piotrowskiej i Celińskiego (1965) oraz Piotrowskiej i Stasiak (1982/1984) na całym polskim wybrzeżu Bałtyku występuje *Helichryso-Jasionetum*, a na wybrzeżu zachodnim jeszcze *Trifolio-Anthyllidetum maritimae* Cel. et Piotr. 1965. Według Fukarka (1961) zachodnim wikariantem *Helichryso-Jasionetum* i *Helichryso-Artemisietum* są *Festuco-Galietum maritimi* (Onno 1933) Br.-Bl. et De Leeuw 1936 lub *Tortulo-Phleetum* (Br.-Bl. et De Leeuw 1936) Tx. 1937, a nie *Violo-Corynephoretum*. Jednak zespoły te, rozmieszczone wzdłuż brzegów południowego Atlantyku i wokół wysp brytyjskich po zachodnie wybrzeże Jutlandii, południową Norwegię i Szwecję, traktowane są najczęściej jako wikarianty *Violo-Corynephoretum* (za Olssonem 1974).

3. ROZWÓJ POGLĄDÓW NA STANOWISKO SYSTEMATYCZNE PIONIERSKICH MURAW NAPIASKOWYCH

Historyczne ujęcia podziałów systematycznych zawarte są w pracach: Kornasia (1957), Müllera (1961), Krauscha (1962) i Moravca (1967). Syntetyczne spojrzenie na systematykę muraw psammofilnych ujawnia wiele rozbieżności w poglądach badaczy. Propozycje ujęć syntaksonomicznych z końca lat 60. oraz z lat 70. i 80. również nie przyczyniły się do ujednolicenia poglądów w odniesieniu do tej grupy zbiorowisk.

W Europie Środkowej pierwszą próbę syntezy muraw szczotlichowych z rzędu *Corynephoretalia* podjął Meusel (1940a, b) wykazując ich atlantycko-subatlantycki charakter geograficzny. Autor ten wyróżnił następujące facje geograficzne (tab. 1, ss. 368, 369 i 501): submedyterrańsko-atlantyczną i północnoatlantycką (związek *Corynephorion*), sarmacką (*Koelerion glaucae* — mieszanina gatunków muraw szczotlichowych i stepowych) oraz pontyjsko-pannońską (*Festucion vaginatae* — murawy stepowe z elementami gatunków psammofilnych).

Wszystkie murawy napiaskowe zaliczano najpierw tylko do rzędu *Corynephoretalia* (Tüxen 1937, ss. 55–59):

Corynephorotalia canescentis Tx. 1933

Corynephorion canescentis Klika 1931 (murawy śródlądowe)

**Corynephorum canescentis typicum* Tx. (1928) 1937; *C. agrostidetosum caninae* Tx. 1937; *C. cladonietosum* Tx. (1928) 1937; **Festuca ovina-Thymus angustifolius*-Ass. Tx. (1928) 1937;

**Festuca capillata-Galium litorale*-Ass. Br.-Bl. et De Leeuw 1936

Koelerion albescentis Tx. 1937 (murawy nadmorskie)

Później murawy te zostały włączone do klasy *Corynephoretea* Br.-Bl. et Tx. 1943 (por. także Tüxen 1962, s. 59):

Corynephoretea canescentis Br.-Bl. et Tx. 1943 em. Tx. 1962

Corynephorotalia canescentis Klika 1934 em. Tx. 1962

Corynephorion canescentis Klika 1931 em. Tx. 1962

**Spergulo vernalis-Corynephorum* (Tx. 1928) Tx. 1955; * *Corynephorum maritimum* Tx. 1962 (non *Violeto-Corynephorum* Westhoff)

W miarę powiększania się materiałów Tüxen (1951) utworzył nowy rząd *Festuco-Sedetalia acris* Tx. 1951, który włączył do klasy *Festuco-Brometea* Br.-Bl. et Tüxen 1943. Murawy szczotlichowe pozostały we własnej, monotypowej klasie *Corynephoretea*. W przeciwieństwie do Tüxena, Klika (Klika i Novák 1941) wcześniej zaproponował, aby wszystkie murawy szczotlichowe, rosnące na suchych i kwaśnych piaskach utrzymać w jednej, wspólnej klasie *Koelerio-Corynephoretea* Klika in Klika et Novák 1941. Gdyby przyjąć taki punkt widzenia, zgodnie z zasadą pierwszeństwa (Barkman, Moravec i Rauschert 1986) priorytet uzyskuje nazwa *Koelerio-Corynephoretea* przed *Corynephoretea*.

Oberdorfer (1957) analizując murawy południowych Niemiec nie potwierdził samodzielnego stanowiska muraw szczotlichowych i podporządkował je jako związek *Corynephorion* innemu rzęadowi i klasie (ss. 245, 247, 252, 253):

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43

Festuco-Sedetalia Tx. 51 (*Corynephorotalia* Tx. 33 p.p.)

Sedo-Scleranthion Br.-Bl. 49

Thero-Airion Tx. 51

Corynephorion Klika 31

Koelerion glaucae Volk 30 (sic) (*Helichrysion* Tx. 51)

Jednocześnie proponował (s. 246, tamże) wyróżnienie oddzielnej klasy *Festuco-Sedetea* z rzędami: *Sedo-Scleranthetalia* Br.-Bl. 55, *Thero-Airetalia* prov. i *Koelerietalia* prov.

Ostatecznie Oberdorfer (1962, ss. 31–32) przyjął za Braun-Blanquetem (1955) nazwę klasy *Sedo-Scleranthetalia*, łączącą trzy rzędy roślinności – napiaskową subatlantycką i subkontynentalną oraz naskalną:

Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 55 em. [Oberd. 1962]

Corynephorotalia Tx. 37 (sic)

Corynephorion Klika 31

Festuco-Sedetalia Tx. 51

Thero-Airion Tx. 51

Armerion elongatae Krausch 61

Phleo-Sedion (Korneck prov.)

Alysso-Sedion Oberd. et Th. Müller 61

Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 55

Dalsze prace przyniosły modyfikację tego systemu, co przedstawił Korneck (in Oberdorfer 1978, ss. 13, 21, 22; por. także Oberdorfer 1983, ss. 39, 49):

Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 55 em. Th. Müller 61 (Syn. *Festuco-Sedetee* Oberd. 57, incl. *Koelerio-Corynephoretea* Klika apud Klika et Novák 41 p.p. i *Corynephoretea canescentis* Br.-Bl. et Tx. 43).

Thero-Airetalia Oberd. in Oberd. et al. 67

Thero-Airion Tx. 51 (murawy śródziemnomorsko-subatlantyckie)

Corynephorotalia canescentis Klika 34

Corynephorion canescentis Klika 31 (murawy (sub)atlantyckie)

* *Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis* Tx. (28)55

Koelerion albescentis Tx. 37 (murawy nadmorskie)

Sileno conicae-Cerastion semidecandri Korneck 74

Koelerion glaucae Volk 31 (murawy (sub)kserotermiczne)

Inne podejście syntaksonomiczne prezentuje Passarge (1960, ss. 122, 123), który zrezygnował ze związku *Corynephorion*:

Koelerio-Corynephoretea Klika 41 (Syn. *Festuco-Sedetee* Oberd. 57)

Corynephorotalia Tx. 33 em. [Pass. 1960]

Spergulo-Corynephorion all. nov[a]

* *Spergulo-Corynephorum* Tx. (28)55; * *Spergulo-Festucetum psammophilae* ass. nov[a] (prov.)

Filagini-Corynephorion all. nov[a]

* *Ornithopodo-Corynephorum* ass. nov[a]; * *Veronico-Corynephorum* ass. nov[a]; * *Violo-*

-Corynephorum Westhoff 43

W pracach późniejszych Passarge (1964, ss. 238, 241, 244, 245, 249, 255) modyfikował system suchych muraw, by wreszcie dla muraw Europy Środkowej zaproponować następujący podział (Passarge 1978, ss. 158, 159):

Caespitosa (Brockm.-J. Rübel 12) Pass. 66

Koelerio-Corynephoretea Klika 41

Corynephorotalia canescentis Tx. 33

Spergulo-Corynephorion Pass. 60

* *Spergulo-Corynephorum* Tx. (28)55; * *Corynephorum maritimum* Tx. 62; * *Teesdalia-Sperguletum morisonii* Pass. 64 em. Schub. 74

Filagini-Corynephorion Pass. 60

* *Ornithopodo-Corynephorum* Pass. 60; * *Veronico-Corynephorum* Pass. 60; * *Thymo-Corynephorum* Krippel 54; * *Artemisio-Corynephorum* K.-Kucer. 64; * *Festuco cinerea-Corynephorum* Schubert 74; * *Agrostietum coarctate* Kobendza 30; * *Sileno tatarici-Corynephorum* Libb. 31 [recte 33] (czy tutaj?); * *Violo-Corynephorum* (Böcher 41) Westh. 47 (czy tutaj?)

Galio-Koelerion (Tx. 37) Den Held et Westh. 69

Trifolio-Festucetalia (Tx. 51) Moravec 65 [recte 67] (Syn. *Festuco-Sedetalia* Tx. 51 p.p.)

Plantagini-Festucion Pass. 64

Thero-Airion Tx. 51

Armerion elongatae Krausch 61

Hyperico-Scleranthion perennis Moravec 67

Festuco-Astragalealia arenariae Vich. 72 [Vicherek (1972) zalicza do klasy *Festucetea vaginatae* Soó 68]

Koelerion glaucae (Volk 31) Klika 35

Festucetalia vaginatae Soó 57

Krausch (1962, 1968) dokonując oceny dotychczasowego stanu badań niemieckich zespołów psammofilnych i ich pozycji systematycznej oparł się na koncepcji Oberdorfera (1962), mianowicie utrzymał nazwę *Sedo-Scleranthetea* dla klasy suchych muraw, ale poprawił ją, podobnie jak zrobił to wcześniej Müller (1961, ss. 115, 116) i później — Moravec (1967, s. 173). Jednocześnie Krausch (1962) sugerował czy nie należałoby przedłożyć na podstawie pierwszeństwa nazwy stare: *Corynephoretea* Br.-Bl. et Tx. 1943 lub *Koelerio-Corynephoretea* Klika in Klika et Novák 1941.

Według Krauscha (1962, s. 268) należy przyjąć następujący podział dla europejskiego kręgu roślinności suchych muraw napiaskowych i krzemianowych:

Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 em. [Krausch 1962]

Corynephoralia Tx. 1933 (śródlądowe i nadmorskie murawy pionierskie)

Corynephorion Klika 1931

Thero-Airion Tx. 1951

Koelerion albescentis Tx. 1937

Festuco-Sedetalia s. str. (śródlądowe murawy zwarte)

(?) *Violion calaminariae* Schwickerath 1933

Armerion elongatae all. nov[a]

Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935

Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955 (murawy naskalne)

W syntetycznej pracy dotyczącej muraw Brandenburgii, Krausch (1968, ss. 76, 77) podtrzymał swą koncepcję w odniesieniu do wyższych jednostek (uściślając ją) i ustosunkował się do muraw szcztlichowych, mianowicie w odróżnieniu od Passarge (1960, 1964), wszystkie murawy z *Corynephorus canescens* zaliczył do jednego zespołu *Spergulo-Corynephorum* z pdzespołami i do jednego związku *Corynephorion*:

Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 em. Th. Müller 1961

Corynephoralia canescens Tx. 1937 em. Krausch 1962

Corynephorion canescens Klika 1931

* *Spergulo vernalis-Corynephorum* (Tx. 1928) Libb. 1933 *typicum*; *S.-C. festucetosum ovinae*;

S.-C. festucetosum psammophilae

Thero-Airion Tx. 1951

Koelerion albescentis Tx. 1937

Festuco-Sedetalia Tx. 1951 em. Krausch 1962

Armerion elongatae Krausch 1959

Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935

Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955

Hohenester (1967, s. 20) w pracy o murawach Bawarii postawił odmienną propozycję połączenia w jednej klasie muraw południowo-zachodnio- i środkowo-europejskich:

Tuberario (guttatae)—*Corynephoretea* cl. nov[a]

Tuberietalia guttatae Br.-Bl. 1940

Tuberarion guttatae Br.-Bl. 1931 (*Ormenieto-Malcolmion* Br.-Bl. 1940)

Corynephoretalia Tx. 1933

Thero-Airion Tx. 1951

Koelerion albescentis Tx. 1937

Corynephorion Klika 1931

* *Corynephorum maritimum* Tx. 1962; * *Spergulo (vernalis)-Corynephorum* Tx. (1928)1955;

* *Veronico (dillenii)-Corynephorum* ass. nova; * *Androsaco (septentrionalis)-Corynephorum* ass. nova

Jedna z najnowszych propozycji klasyfikacji suchych muraw pochodzi z Niemiec Północno-Zachodnich (Jeckel 1984, s. 60):

Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1958 [recte 1955] em. Th. Müller 1961 (*Koelerio-Corynephoretea* Klika 1941 p.p.)

Thero-Airetalia Oberd. in Oberd. et al. 1967 (*Corynephoralia* Klika 1931)

Corynephorion Klika 1931

* *Spergulo-Corynephorum*

Thero-Airion Tx. 1951

[umieszczone w tym związku zespoły *Agrostietum coarctatae* i *Carex arenaria*-Gesellschaft odpowiadają *Spergulo-Corynephoretum* — patrz także tab. IX]

Festuco-Sedetalia Tx. 1951

Sedo-Scleranthetalia

Dla Europy Zachodniej znana jest klasyfikacja muraw Rivas-Martíneza (np. 1978, s. 59):

Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955 em. Oberd. 1962 (incl. *Festuco-Sedetalia* Oberd. 1957; *Koelerio-Corynephoretea* Klika 1941 p.p.)

Corynephoretalia R. Tx. (1937)1962 (incl. *Festuco-Sedetalia acris* R. Tx. 1951 p.p.)

Corynephorion canescentis (Klika 1931) R. Tx. 1962 (incl. *Spergulo-Corynephorion* Passarge 1960)

Koelerion albescentis R. Tx. 1932 em. (incl. *Galio-Koelerion* Den Held et Westhoff 1969,

Helichrysion arenarii R. Tx. 1951)

Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955

W Polsce przyjmowano system syntaksonomiczny proponowany przez badaczy niemieckich, co znalazło odzwierciedlenie w pracach lokalnych, np. Kornasia (1957, ss. 465, 471, 474):

Corynephoretea Br.-Bl. et Tx. 1943

Corynephoretalia Tx. 1933

Corynephorion Klika 1931

* *Corynephoretum canescentis* Klika 1931; * *Festuco-Thymetum serpylli* nom. prov.

i Głowackiego (1988, s. 22):

Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 55 em. Müller 61

Corynephoretalia canescentis R. Tx. 37 em. Krausch 62

Corynephorion canescentis Klika 31

* *Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis* R. Tx. (28)37; * *Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati* (Zielińska 68) [recte 67] ass. nova; * *Corniculario aculeatae-Cladonietum mitis* Krieger 37

Thero-Airetalia Oberd. (57)67

Thero-Airion R. Tx. 51

Cerastietalia semidecandri ordo novus prov.

Androsaco septentrionalis-Cerastion semidecandri all. nova

Festuco-Sedetalia R. Tx. 51 em. Krausch 62

Krippelová i Krippel (1956), badacze muraw psammoofilnych Słowacji, położonych przy południowej granicy zasięgu, klasyfikowali zbiorowiska siedlisk piaszczystych Europy zgodnie z koncepcją Kliki (1931 i in. prace):

Corynephoretalia Klika 1934

Corynephorion canescentis Klika 1931

* *Corynephoretum typicum* Tüxen 1928; * *Corynephorus canescens-Koeleria albens* Hacquette 1927; * *Corynephorus canescens-Koeleria cristata* Alorge 1922; * *Corynephorus canescens-Koeleria gracilis* Libbert 1931; * *Corynephorus canescens-Festuca glauca* (Juraszek) Kobendza 1930; * *Corynephorus canescens-Thymus angustifolius* Krippel 1954

Koelerion glaucae Klika 1935

Festucion vaginatae (Soó) Klika 1944

Ze Słowacji znana jest syntaksonomia roślinności murawowej prezentowana przez Mucinę i Maglockego (1985):

Koelerio-Corynephoretea Klika et Novák 1941

Corynephoretalia Klika 1934 em. R. Tx. 1962

Corynephorion Klika em. R. Tx. 1962

* *Corynephorus canescens-Thymus angustifolius* Assoziation Krippel 1954

Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955

Thero-Airetalia Oberd. in Oberd. et al. 1967

Thero-Airion Oberd. 1959

Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955

Sedo albi-Veronicion dillenii (Oberd. 1957) Korneck 1974

Natomiast dla całego obszaru Czech, Moravec et al. (1983, s. 58) klasyfikują jednostki roślinności murawowej następująco:

Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák 1941

Zbiorowiska muraw psammofilnych o rozmieszczeniu (sub)atlantyckim

Corynephorretalia canescentis Klika 1934 em. Tüxen 1962

Zbiorowiska kwaśnych rozwiewanych piasków

Corynephorion canescentis Klika 1931 em. Tüxen 1962

Zbiorowiska inicjalne kwaśnych, rozwiewanych piasków

* *Corynephorum canescentis* [jak u Tüxena 1937]

Festucetea vaginatae Soó 1968 em. Vicherek 1972

Kontynentalne zbiorowiska muraw psammofilnych

Festuco-Astragalealia arenarii Vicherek 1972

Zbiorowiska neutro- i bazyfilnych rozwiewanych piasków

Koelerion glaucae Volk 1931

Zbiorowiska neutrofilnych, ustabilizowanych piasków na obszarze sarmackim

Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 em. Moravec 1967

Zbiorowiska pionierskich bylin gleb prymitywnych

Dla południowej Szwecji Olsson (1974 s. 23) proponuje jeszcze inne podejście syntaksonomiczne:

Koelerio-Corynephoretea

Corynephorretalia

Spergulo-Corynephorion

* *Cladonio (dstrictae)-Corynephorum* Krieger 1937 em. Böcher 1941 prov.

Festuco-Sedetalia

Galio-Koelerion (Koelerion albescentis)

* *Violo-Corynephorum* Westhoff (1934) 1947

Thero-Airion

* *Teesdalia-Corynephorum* ass. nov[a] [zespół ten odpowiada *Spergulo-Corynephorum* na północnej granicy zasięgu].

Na taką wielość ujęć systematycznych, zwłaszcza w Niemczech (najwięcej propozycji), Czechach i Słowacji, może wpływać także znaczne zróżnicowanie wewnętrzne, wynikające z faktu, iż murawy te jako typ roślinności poddawane są oddziaływaniom zarówno klimatu morskiego, jak też — na znacznym obszarze — kontynentalnego (por. ryc. 1). Jak widać, niejednolite, czasami kontrowersyjne, sądy o systematycznej klasyfikacji omawianych muraw dotyczą różnego ujmowania zakresu syntaksonów i wymagają dalszych, krytycznych badań.

4. STOPIEŃ ZBADANIA PIONIERSKICH MURAW NAPIASKOWYCH W POLSCE

Od czasu opublikowania pierwszych wzmianek o florze i fitocenozach odpowiadających *Spergulo-Corynephorum* oraz zbiorowiskom do niego zbliżonym z Polski Północnej, Północno-Wschodniej i Zachodniej (Scholz 1896, 1905, Abromeit et

al. 1898, 1934, Preuss 1912, Graebner 1918; por. także Tüxen i Schwabe 1972 oraz Dierschke i Sasse 1986) nagromadziło się wiele danych odnoszących się do ich syntaksonomii, wymagań ekologicznych, biologii i rozmieszczenia przestrzennego.

4.1. DOKUMENTACJA FLORYSTYCZNO-FITOSOCJOLOGICZNA

Liczne publikowane flory lokalne (por. Głowacki i Stańczuk 1984, Krzywańska 1984, Fagasiewicz, Czyżewska i Olaczek 1986), flory i zbiorowiska ruderalne miast, np. Zielonej Góry (Ćwikliński 1971), Torunia (Kępczyński i Zienkiwicz 1974), Wyszkowa (Ciosek 1984) bądź zbiorowiska segetalne (por. Warcholińska 1990) stanowią jednocześnie precyzyjną dokumentację obecności pionierskich fitocenoz z grupy *Spergulo-Corynephoretum*.

Balcerkiewicz i Brag (1978) przedstawili wstępne rezultaty badań nad roślinnością dróg w borach sosnowych Polski, uwzględniając w niej udział *Spergulo-Corynephoretum typicum* i *S.-C. cladonietosum*, *Corniculario-Cladonietum mitis* i *Airetum praecocis*, a także stopień przywiązania tych fitocenoz do siedlisk antropogenicznych.

Wartość diagnostyczną porostów psammofilnych w syntaksonomii borów chrobotkowych i nadmorskich omówili Tobolewski (1963) i Cieśliński (1979), a w pionierskich murawach — Cieśliński (l.c.). Ostatni autor przedstawił również zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe porostów piaszkoлюбnych i ich wierność fitosocjologiczną (m.in. *Cladonia furcata* i *Cetraria islandica*).

Raczej tylko okazjonalnie wskazywano na przynależność *Spergulo-Corynephoretum* do dynamicznych kręgów zbiorowisk roślinnych, co ma znaczenie m.in. w kartografii roślinności. Jako zbiorowiska zastępcze trwałych lasów, fitocenozy te najczęściej łączono z siedliskami borów (Filipek 1955, Kornaś 1957, Piotrowska i Celiński 1965, Faliński 1966, 1971, Celiński i Balcerkiewicz 1973, Głowacki 1975, 1988, Balcerkiewicz 1976, Cieśliński 1979, Matuszkiewicz 1978/1979, Herbich 1982, Głazek 1986 i in.), natomiast rzadziej — z siedliskami lasów liściastych (Czyżewska 1986). Zwrócono także uwagę na poszerzoną skalę zastępczości pionierskiego *Spergulo-Corynephoretum*, od siedlisk borowych po siedliska dąbrów i buczyn (Czyżewska l.c.), co wyjaśnia teoria konwergencji antropogenicznej (por. Olaczek 1986a).

Jankowski (1977) podjął próbę określenia faz degeneracji fitocenoz pionierskich muraw wydmowych rejonu Torunia, rozwijających się pod wpływem oddziaływania gazów (głównie SO₂) i pyłów przemysłowych, deptania, śmiecenia oraz wypasu. Autor zestawiał listę psamofitów odpornych — jego zdaniem — na działania czynników zniekształcających.

Do roku 1991 powstały 53 prace publikowane i maszynopisy zawierające 1114 zdjęć fitosocjologicznych, dokumentujących skład florystyczny i struktury muraw psammofilnych Polski. Wśród tych prac znajdują się trzy z Wybrzeża Słowińskiego (Krotoska i Tobolewski 1978, 1979/1980) oraz Mierzei Wiślanej (Fałtynowicz i Budzbon 1983/1986) zaliczone przez autorów do śródlądowego

zespołu *Corniculario-Cladonietum mitis* Krieger 1937, a faktycznie należące do muraw nadmorskich.

Walory poznawcze i merytoryczne fitosocjologicznych materiałów publikowanych oceniono następująco:

1. Dają obraz podjęcia syntaksonomicznego, odzwierciedlającego europejski rozwój wiedzy o tym typie roślinności.

2. Wskazują na nierównomierny stopień przestrzennego zbadania kraju. Pierwsze badania fitosocjologiczne skupiały się w pięciu regionach: na Pojezierzu Myśliborskim (Libbert 1933), Wybrzeżu Słowińskim i w Kotlinie Gorzowskiej (Krieger 1937), Pojezierzu Mazurskim (Steffen 1931) oraz w Kotlinie Warszawskiej i w okolicach Warszawy (Juraszek 1928, Kobendza 1930). Dalsze badania były jak gdyby terytorialną kontynuacją tych prac. Najwięcej danych publikowanych odnotowano na Pojezierzach Południowo- i Wschodniobałtyckich (23 publikacje), Nizinach Środkowopolskich (13) oraz Wyżynach Śląsko-Krakowskiej i Środkowomazowieckiej (12). Z tego, bogatszą dokumentację fitosocjologiczną posiadają jedynie: Pojezierza Wielkopolskie i Mazurskie, Wał Trzebnicki, Niziny Środkowomazowiecka i Południowopodlaska oraz Wyżyny Woźnicko-Wieluńska, Krakowsko-Częstochowska, Przedborska i Kielecko-Sandomierska. Dokumentacja pozostałych badanych obszarów ograniczona jest do kilku zdjęć fitosocjologicznych (od 2 do 5).

3. Wskazują na rozmiar zainteresowania tą swoistą i trudną grupą roślinności. Chronologia prac przedstawia się następująco: w latach 1928–1937 ukazało się 5 publikacji, w 1949–1957 – 3, w 1965–1970 – 11, w 1971–1979 – 22 (najwięcej w 1978 r. – 7), w 1981–1991 – 12. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wzrost zainteresowania murawami psammofilnymi, który zaowocował publikacjami w latach 60. i 70., zawdzięczamy inspirującym myślom zawartym w pracy Kornasia (1957), choć sama praca odnosi się do małego obiektu badawczego.

4. W świetle współczesnej wiedzy o tych zbiorowiskach wartość poznawcza i merytoryczna publikowanych prac jest w dużej mierze ograniczona ze względu na niedociągnięcia metodyczne, do których zaliczono:

- zbyt duże powierzchnie zdjęć fitosocjologicznych (56% publikowanych tabel): od 10 do 50 m² – w 12. pracach, do 100 m² – w 13., do 200 m² – w 1., do 400 m² – w 2. i do 1000 m² – w 2.; zbyt małe: 1 m² – w 3.: w części publikacji brak danych;

- zbyt późne (od końca sierpnia do grudnia włącznie) lub zbyt wczesne (od lutego do połowy kwietnia) terminy wykonywania zdjęć fitosocjologicznych: 29% tabel fitosocjologicznych zawiera częściowo takie zdjęcia, a około 5% – wszystkie zdjęcia;

- zastosowanie 10-stopniowej skali oceny pokrycia roślin w zdjęciu (w około 11% tabel), co utrudnia porównywanie ich z innymi tabelami;

- pominięcie roślin naczyniowych w zdjęciach fitosocjologicznych – 1 praca;

- niedokładności wynikające z niewłaściwego rozpoznawania lub pomijania roślin zarodnikowych, zwłaszcza porostów oraz tzw. drobnych taksonów nasennych.

Omówione wyżej niedostatki metodyczne występują pojedynczo, często także nakładają się; są też prace, gdzie pominięto wiele istotnych danych. Braki te w sposób zasadniczy ograniczają możliwość całkowitego wykorzystania bogatego materiału, zwłaszcza w odniesieniu do opracowań syntetycznych. Materiały takie, choć mają obecnie znaczenie dokumentu historycznego, mogą jednocześnie być pomocne w rozwiązywaniu innych zagadnień, np. zmienności geograficznej.

Źródła fitosocjologiczne posiadają podstawowe znaczenie poznawcze. Przedstawiono je poniżej, uwzględniając jednocześnie lokalizację fizycznogeograficzną (Kondracki 1978) oraz przynależność syntaksonomiczną, w takim ujęciu jakie nadali jej autorzy publikacji. Tylko niektóre tabele lub pojedyncze zdjęcia fitosocjologiczne wzmiankowane w tej dokumentacji zostały wykorzystane przez autorkę.

Pobrzeża Południowobałtyckie

Pobrzeże Szczecińskie — Wyspy Uznam i Wolin:

Piotrowska i Celiński (1965): **tab. 10.** *Corynephoretum canescentis* Klika 1931 — 20 zdj. fs.

Pobrzeże Koszalińskie — Wybrzeże Słowińskie:

Krieger (1937): **tab. 5.** *Cladonia mitis*—Assoziation (von den Dünen der pommerschen Ostseeküste), z okolic Rowów i terenów obecnego Słowińskiego Parku Narodowego — 5 zdj. fs.

Krotoska i Tobolewski (1978): **tab. 1.** Zbiorowisko psammofilnych porostów naziemnych z *Cladonia mitis* i *Cornicularia aculeata* z Gardna — 4 zdj. fs. W **tab. 2.** porównano *Cladonia mitis*—Assoziation z Brandenburgii (tab. 4, Krieger 1937) — 17 zdj. fs. ze zbiorowiskiem *Cladonia mitis* i *Cornicularia aculeata* ze Słowińskiego Parku Narodowego (materiały własne autorów) — 24 zdj. fs.

Krotoska i Tobolewski (1979/1980): **tab. 1.** Zbiorowisko psammofilnych porostów naziemnych z *Cladonia mitis* i *Cornicularia aculeata* — 29 zdj. fs. **Tab. 3.** Zbiorowisko z *Polytrichum piliferum* — 19 zdj. fs.

Pobrzeże Gdańskie — Mierzeja Wiślana:

Fałtynowicz i Budzbon (1983/1986): **tab. 1.** *Corniculario-Cladonietum* Kieger 1937 z *Cetraria nivalis* na Mierzei Wiślanej — 4 zdj. fs.

Pojezierza Południowobałtyckie

Pojezierze Zachodniopomorskie — Pojezierze Myśliborskie:

Libbert (1933): **tab. 21.** *Corynephoretum typicum* — 15 zdj. fs. Zdjęcia 1-5 faza inicjalna, 6-13 optymalna, 14, 15 — postać degeneracyjna.

Pojezierze Wschodniopomorskie — Pojezierze Kaszubskie:

Herbich (1982): **tab. 20.** Zbiorowisko z *Corynephorus canescens* — 3 zdj. fs. Patrz także: Endler i Polakowski (1978).

Pojezierze Południowopomorskie — Bory Tucholskie:

Fałtynowicz (1986): **tab. 6.** *Corniculario-Cladonietum mitis* Krieger 1937 — 5 zdj. fs. **Tab. 7.** *Spergulo-Corynephoretum* (Tx. 1928) Libb. 1933 — 5 zdj. fs. Lipnicki (1990/1991): **tab. 5.** *Spergulo-Corynephoretum* (Tx. 1928) Libb. 1933 — 7 zdj. fs.

Dolina Dolnej Wisły — Dolina Kwidzyńska, Kotlina Grudziądzka, Dolina Fordońska:

Kępczyński i Rutkowski (1988): **tab. 1.** *Spergulo vernalis-Corynephoretum* (R. Tx. 1928) Libb. 1933 — 11 zdj. fs. **Tab. 2.** *Caricetum arenariae* Steffen 1931 — 25 zdj. fs.

Pojezierze Chelmińsko-Dobrzyńskie — Pojezierze Chelmińskie:

Ceynowa (1968): **tab. 39.** Inicjalne płyty zespołu *Corynephoretum canescentis* Klika 1931 ustępujące w toku sukcesji zespołowi *Festuco-Kelerietum* — 4 zdj. fs. (zdj. fs. nr 3 z Kotliny Toruńskiej).

— Garb Lubawski:

Załuski (1987): **tab. 6.** *Spergulo vernalis-Corynephoretum* (R. Tx. 1928) Libb. 1933 — 10 zdj. fs.

Patrz także: Endler i Polakowski (1978).

— Pojezierze Dobrzyńskie:

Kępczyński (1965): **tab. 64.** *Corynephoretum canescentis* (Klika 1931) Tx. 1937 — 15 zdj. fs.

Patrz także: Załuski (1987)

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka — Kotlina Gorzowska:

Krieger (1937): **tab. 1.** Flechtenreiche Stadien der *Corynephorus canescens* — Assoziation — 1 zdj. fs. (nr 4 z okolic Skwierzyny nad Wartą). **Tab. 4.** *Cladonia mitis*-Assoziation — 1 zdj. fs. (nr 9, z Santoku koło Gorzowa Wielkopolskiego).

— Kotlina Toruńska:

Anikiejówna i Gorska (1949): lista gatunków ze stopniami pokrycia odpowiadająca *Spergulo-Corynephoretum cladonietosum*.

Kępczyński i Zienkiewicz (1974): **tab. 39.** Zbiorowiska z rzędu *Corynephoretalia* — 3 zdj. fs. odpowiadające zbiorowisku z *Corynephorus canescens*.

Janowski (1977 maszynopis): **tab. 4.** *Spergulo-Corynephoretum* (Tx. 1928) Libb. 1933 — 18 zdj. fs. Zdjęcia — 1–7 subass. *typicum*, 8–18 subass. *festucetosum psammophilae*. **Tab. 6.** Zbiorowisko z *Corynephorus canescens* — 11 zdj. fs.

Syminides (1978b): **tab. 1.** Liczba, rozmieszczenie i specyficzna kompozycja diaspor w glebie zespołu *Spergulo-Corynephoretum* — 1 zdj. fs.

Patrz także: Ceynowa (1968), Kępczyński i Rutkowski (1988)

Pojezierza Wielkopolskie — Pojezierze Poznańskie:

Wika (1975): **tab. 5.** *Spergulo-Corynephoretum* Tx. 1928) Libb. 1933 — 27 zdj. fs. Zdjęcia 1–8 subass. *typicum* (1–5 var. typowy, 6–8 var. chrobotkowy), 9–27 subass. z *Festuca ovina* (9–11 var. typowy, 12–27 var. z *Cladonia* — subvar. z *Cladonia verticillata*, 18–21 subvar. typowy, 22–27 subvar. z *Helichrysum arenarium*).

— Poznański Przełom Warty:

Filipek (1955): **tab. 1.** *Corynephorum agrosti detosum caninae* Tüxen 1937 (*Corynephorum boreo-atlanticum typicum*, *Agrostis-Variante* Knapp 1944) — 6 zdj. fs. (zdjęcie nr 6 nawiązuje do subass. *cladonietosum*).

Celiński i Balcerkiewicz (1973): **tab. 1.** *Spergulo-Corynephorum* R. Tx. (1937) 1955 — 12 zdj. fs. Zdjęcia 1–6 subass. *typicum*, 7–12 subass. z *Festuca psammophila*.

Wzniesienia Zielonogórskie — Wzniesienia Gubińskie:

Krieger (1937): **tab. 4.** *Cladonia mitis*-Assoziation — 1 zdj. fs. (nr 17, Strużka nad jeziorem, okolice Bobrowic).

Pojezierza Wschodniobałtyckie

Pojezierze Mazurskie — Pojezierze Olsztyńskie, Mrągowskie i Elckie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Równina Mazurska:

Pojezierze Litewskie — Pojezierze Wschodniosuwalskie:
oraz Pojezierze Iławskie z Pojezierza Wschodniopomorskiego (Pojezierza Południowobałtyckie):

Endler i Polakowski (1978): **tab. 1.** *Spergulo-Corynephorum typicum* Tx. (1928) 1937 Libb. 1933 — 23 zdj. fs. **Tab. 2.** *Spergulo-Corynephorum typicum* Tx. (1928) 1937 Libb. 1933 — 28 zdj. fs.

Uwaga 1! Z treści tabeli 2. i tekstu wynika, że odpowiada ona subass. *cladonietosum*. Część zdjęć fitosocjologicznych jest zlokalizowana w obrębie mezoregionu Garbu Lubawskiego (Pojezierze Chelmińsko-Dobrzyńskie) i Równiny Kurpiowskiej (Nizina Północnomazowiecka).

Uwaga 2! Nie dla wszystkich zdjęć fitosocjologicznych udało się ustalić stanowiska.

Tab. 4. dotyczy zróżnicowania florystycznego *Spergulo-Corynephorum* w Polsce. Porównano szesnaście tabel fitosocjologicznych (Juraszek 1928, Kobendza 1930, Steffen 1931, Libbert 1933, Filipek 1955, Kornaś 1957, Kępczyński 1965, Piotrowska i Celiński 1965, Faliński 1966, Fijałkowski 1966, Zielińska 1967, Fijałkowski i Górski 1968, Urbanek-Rutowicz 1969, Celiński i Balcerkiewicz 1973, Endler i Polakowski hoc loco).

Steffen (1931): **tab. 44.** *Corynephorus-Cornicularia*-Assoziation — 30 zdj. fs.

Niziny Środkowopolskie

Nizina Południowowielkopolska — Kotlina Sieradzka:

Załuski (1976): **tab. 1.** *Spergulo-Corynephorum* R. Tx. (1937) 1955 — 5 zdj. fs.

Krzywańska (1981 maszynopis): **tab. 9.** Zbiorowisko z klasy *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955. Zdj. fs. nr 1–6 odpowiadają bardzo ubogiemu *Spergulo-Corynephorum*.

— Kotlina Szczercowska:

Hereźniak (1972): **tab. 22.** *Spergulo-Corynephorum* R. Tx. (1937) 1955 — 3 zdj. fs.

Sobańska (1978 maszynopis): **tab. 1.** *Spergulo-Corynephorum* (Tx. 1928) Libb. 1933 — 23 zdj. fs. Zdjęcia 1—18 subass. *typicum* (1—8 var. typowy, 9—18 var. chrobotkowy); 19—23 subass. *festucetosum psammophilae* (19—20 var. typowy, 21—23 var. chrobotkowy).

— Wzniesienia Żarskie:

Głowacki (1984): **tab. 4.** *Spergulo-Corynephorum* (R. Tx. 1928) Libb. 1933 — 5 zdj. fs.

— Wał Trzebnicki:

Głowacki (1975): **tab. 1.** *Spergulo-Corynephorum* (Tx. 1928) Libb. 1933 (*Corynephorum canescentis* Klika 1931) — 35 zdj. fs. Zdjęcia 1—14 subass. *typicum* (1—4 var. typowy, 5—14 var. chrobotkowy *Cladonia*); 15—24 subass. *festucetosum psammophilae* (15—21 var. typowy, 22—24 var. chrobotkowy); 25—35 subass. *filaginetosum minimae* (25—31 var. typowy, 32—35 var. z *Erophila verna*). **Tab. 4.** Zestawienie zespołów z rzędu *Corynephoralia canescentis*. Część pierwsza tabeli (nr 1—7) dotyczy związku *Corynephorion* i zespołu *Spergulo-Corynephorum*. Porównano siedem tabel fitosocjologicznych (Libbert 1933, Filipek 1955, Kornaś 1957, Oberdorfer 1957, Piotrowska i Celiński 1965, Krausch 1968, Głowacki hoc loco).

— Wzgórza Ostrzeszowskie:

Paleska (1976 maszynopis) **tab. 3.** *Spergulo-Corynephorum* R. Tx. (1937)1955 *cladonietosum* Volk 1930 — 40 zdj. fs. Zdjęcia 1—31 war. typowy, 32—40 war. z *Cornicularia muricata*.

Nizina Północnomazowiecka — Równina Kurpiowska:

Halicz i Godlewski (1968): **tab. 1.** *Corynephorum canescentis* Tx. (28)37 *cladonietosum* Volk 30 — 12 zdj. fs. **Tab. 2.** Seria z *Cladonia mitis* i *Cl. rangiferina* — 34 zdj. fs. **Tab. 4.** Seria z *Peltigera malacea* — 10 zdj. fs. Tabele 2. i 4. odpowiadają fitocenozom przejściowym do boru chrobotkowego.

Patrz także: Endler i Polakowski (1978)

Nizina Środkowomazowiecka — Kotlina Warszawska:

Kobendza (1930): **tab. 7.** *Corynephorum* — 27 zdj. fs. Zdjęcia 1—20 facja *typicum*, 21—27 facja *Koeleria glauca*. **Tab. 8.** *Agrostidetum caninae* — 6 zdj. fs.

Zielińska (1967): **tab. 10.** *Corynephorum canescentis cladonietosum* var. *Stereocaulon condensatum* — 6 zdj. fs. **Tab. 11.** Zbiorowisko *Diploschistes bryophilus* — 3 zdj. fs. **Tab. 12.** *Corynephorum canescentis cladonietosum* var. *Stereocaulon incrustatum* — 6 zdj. fs. **Tab. 13.** *Corynephorum canescentis* subass. *cladonietosum* — 22 zdj. fs. **Tab. 14.** *Corynephorum canescentis cladonietosum* var. *Cladonia rangiformis* — 5 zdj. fs. **Tab. 15.** Zbiorowisko *Lecidea* sp. div. — 8 zdj. fs. **Tab. 16.** Zbiorowisko *Cladonia mitis-Cladonia rangiferina* — 6 zdj. fs. **Tab. 17.** Zbiorowisko *Cladonia cornutoradiata-Cladonia bacillaris* — 5 zdj. fs.

— Równiny Wołomińska i Garwolińska oraz Kotlina Warszawaska:

Juraszek (1928): **tab. 7.** *Corynephorus canescens* Assoz. (*Corynephorum canescentis*) — 10 zdj. fs. **Tab. 9.** *Procorynephorum* Gesellsch. — 12 zdj. fs.

Patrz także: Cieśliński (1979)

Wzniesienia Południowomazowieckie — Równina Piotrkowska:

Stachurski (1978): **tab. 1.** *Spergulo-Corynephorum* R. Tx. (1939) 1955 10 — zdj. fs.

Patrz także: Urbanek-Rutowicz (1969), Czyżewska (1973) i Cieśliński (1979)

Nizina Południowopodlaska — Podlaski Przełom Bugu, Wysoczyzna Siedlecka:

Głowacki (1988): **tab. 4.** *Spergulo morisonii-Corynephorum* R. Tx. 28(37) *typicum* — 25 zdj. fs. **Tab. 5.** *Spergulo-Corynephorum canescentis* R. Tx. (27)35 *cladonietosum mitis* — 19 zdj. fs. **Tab. 8.** *Polytricho-Stereocaulum condensati* (Zielińska 67) ass. nova — 17 zdj. fs. **Tab. 9.** *Corniculario aculeatae-Cladonietosum mitis* Krieger 37 — 16 zdj. fs. W **tab. 7.** porównano dwadzieścia siedem tabel fitosocjologicznych *Spergulo-Corynephorum* w różnych podzespołach z Niemiec (Tüxen 1937, Krausch 1968, Klemm 1970, Oberdorfer 1978) oraz z Polski (Libbert 1933, Filipek 1955, Kornaś 1957, Piotrowska i Celiński 1965, Faliński 1966, Zielińska 1967, Balcerkiewicz i Celiński 1973, Wika 1975, Głowacki 1975, 1984 i hoc loco oraz trzy tabele niepublikowane: z części wschodniej Wzgórz Trzebnickich, Pojezierza Leszczyńskiego i okolic Świebodzina w woj. zielonogórskim, Endler i Polakowski 1978, Cieśliński 1979). **Tab. 10.** dotyczy udziału ważniejszych gatunków porostów w zbiorowiskach roślin wyższych (wg Cieślińskiego 1979, uzupełnione przez autora). W kolumnach 1–10 porównano: *Polytricho-Stereocaulum condensati* (Głowacki hoc loco), *Spergulo-Corynephorum* (Zielińska 1967, Cieśliński 1979, Głowacki hoc loco), *Corniculario-Cladonietum mitis* (Cieśliński 1979, Krotoska i Tobolewski 1980, Głowacki hoc loco). W **tab. 40.** zestawiono zbiorowiska roślinne południowego Podlasia. Kolumny 1–4 zawierają zespoły związku *Corynephorion*.

Wyżyna Śląsko-Krakowska

Wyżyna Woźnicko-Wieluńska — Wyżyna Wieluńska:

Smus (1977 maszynopis): **tab. 1.** *Spergulo-Corynephorum* — 14 zdj. fs. **Tab. 3.** Mozaika muraw piaszkowych z zaroślami sosnowo-jałowcowymi — 23 zdj. fs.

Babczyńska (1978): **tab. 9.** *Spergulo-Corynephorum* (Tx. 1928) Libb. 1933 — 14 zdj. fs.

Czyżewska (1986): **tab. 2.** *Spergulo-Corynephorum* (R. Tx. 1928) Libb. 1933 *typicum* — 35 zdj. fs. Zdjęcia 1–10 var. typowy, 11–35 var. z *Thymus serpyllum*. **Tab. 3.** *Spergulo-Corynephorum* (R. Tx. 1928) Libb. 1933 *cladonietosum* — 15 zdj. fs. **Tab. 4.** *Spergulo-Corynephorum* (R. Tx. 1928) Libb. 1933 *festucetosum ovinae* — 6 zdj. fs. (nr 1–6) i *festucetosum psammophilae* — 6 zdj. fs. (nr 7–12).

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska — Wyżyna Częstochowska:

Ławrynowicz (1973): **tab. 4.** *Spergulo-Corynephorum* Tx. 54 — 6 zdj. fs.

Celiński i Wika (1978): **tab. 11.** *Spergulo-Corynephorum typicum* (Tx. 1928) Libb. 1933 var. chrobotkowy — 2 zdj. fs.

Babczyńska-Sendek (1984): **tab. 50.** *Spergulo vernalis-Corynephorum* (R. Tx. 1928) Libb. 1933 — 20 zdj. fs. Zdjęcia 1–3 var. typowy, 4–20 var. chrobotkowy (4–13 subvar. typowy, 14–20 subvar. z *Thymus serpyllum*).

— Wyżyna Olkuska, Rów Krzeszowski i Grzbiet Tenczyński:

Kornaś (1957): **tab. 1.** *Corynephorum* Klika 1931 — 12 zdj. fs. Zdjęcia 1–4 stadium inicjalne, 5–12 optymalne, 13 przejściowe. Zdjęcie fitosocjologiczne nr 12 pochodzi z Niecki Połanieckiej (Niecka Nidziańska, Wyżyna Środkowomazowiecka). **Tab. 2.** dotyczy stałości ważniejszych gatunków charakterystycznych w zespołach klasy *Corynephoretea* w Polsce i krajach sąsiednich. W części pierwszej (nr 1–6) porównano tabele *Corynephorum canescentis* (Libbert 1933, Tüxen 1937, Filipek 1955 i Kornaś hoc loco).

Wyżyna Środkowomazowiecka

Wyżyna Przedborska — Wzgórza Opoczyńskie, Niecka Włoszczowska, Wzgórza Łopuszańskie:

Wyżyna Kielecko-Sandomierska — Płaskowyż Suchedniowski, Garb Gielniowski, Przedgórze Ilżeckie:

Cieśliński (1979): **tab. 2.** *Corniculario-Cladonietum mitis* Krieger 1937 — 27 zdj. fs. **Tab. 3.** *Spergulo-Corynephorum* (Tx. 1928) Libb. 1933 — 40 zdj. fs. Zdjęcia 1–16 var. typowy, 17–40 var. z *Rhacomitrium canescens* i *Thymus serpyllum*. **Tab. 5.** Zbiorowisko z *Polytrichum piliferum* — 14 zdj. fs. **Tab. 7.** Zbiorowisko ze *Stereocaulon condensatum* — 12 zdj. fs. **Tab. 26.** Zbiorowisko z *Cladonia mitis-Cladonia rangiferina* — 37 zdj. fs. (= zbiorowisko antropogeniczne — na murawie nasadzenia sosny, o zwarcu od 25 do 100%).

W wyżej wymienionych tabelach fitosocjologicznych około 40. zdjęć jest zlokalizowana w mezo-regionach: Dolinie Środkowej Wisły i Równinie Kozienickiej (Nizina Środkowomazowiecka) oraz na Równinie Radomskiej (Wzniesienia Południowomazowieckie).

Tab. 32. dotyczy występowania porostów w zbiorowiskach roślin naczyniowych badanego terenu; umieszczono w niej również cztery wyróżnione zbiorowiska muraw pasmofilnych. **Tab. 33.** przedstawia udział porostów naziemnych w zbiorowiskach roślin naczyniowych Polski. W części czwartej porównano siedemnaście tabel fitosocjologicznych należących do rzędu *Corynephoretalia* (Kępczyński 1965, Piotrowska i Celiński 1965, Fijałkowski 1966, Zielińska 1967, Halicz i Godlewski 1968, Krausch 1968, Urbanek-Rutowicz 1969, Cieśliński i Halicz 1971, Głowacki 1975, Wika 1975, Krotoska i Toboński — materiały odpowiadające publikacji z roku 1979/1980).

— Przedgórze Ilżeckie:

Głazek (1986): **tab. 1.** *Spergulo-Corynephorum* (R. Tx. 1928) Libb. 1933 — 17 zdj. fs. **Tab. 2.** Zróżnicowanie florystyczne *Spergulo-Corynephorum* na terenie Polski. Porównano dwadzieścia tabel fitosocjologicznych (wg kolejności: Pio-

trowska i Celiński 1965, Libbert 1933, Wika 1975, Celiński i Balcerkiewicz 1973, Filipek 1955, Głowacki 1975, Urbanek [-Rutowicz] 1969, Cieśliński 1979, Głazek hoc loco, Kornaś 1957, Fijałkowski i Górski 1968, Fijałkowski 1967 [recte 1966], Kobendza 1930, Zielińska 1967, Juraszek 1928; Kępczyński 1965; Faliński 1966; Endler i Polakowski 1978; Steffen 1931; dla kolumny 20. brak cytatu).

Patrz także: Cieśliński (1979)

— Góry Świętokrzyskie:

Cieśliński i Halicz (1971): **tab. 15.** *Corynephorum canescentis* R. Tx. (1928) 1937 subass. *cladonietosum* Volk 1930 [recte 1931] — 20 zdj. fs. Zdjęcia 1–12 var. typowy, 13–18 var. z *Thymus serpyllum*, 19–20 var. z *Cladonia sylvatica*.

Wyżyna Przedborska — Wzgórza Radomszczańskie, Niecka Włoszczowska:

Urbanek-Rutowicz (1969): **tab. 6.** *Spergulo-Corynephorum* R. Tx. (1937) 1955 — 28 zdj. fs.

Część zdjęć fitosocjologicznych jest zlokalizowana m.in. na Wysoczyźnie Bełchatowskiej (Wzniesienia Południomazowieckie).

— Wzgórza Radomszczańskie:

Czyżewska (1973): **tab. 34.** *Spergulo-Corynephorum* R. Tx. (1937) 1955 subass. *cladonietosum* Volk 1930 [recte 1931] — 17 zdj. fs.

Znaczna część zdjęć fitosocjologicznych zlokalizowana jest także na Wysoczyźnie Bełchatowskiej i Równinie Piotrkowskiej (Wzniesienia Południowomazowieckie).

Północne Podkarpacie

Kotlina Sandomierska — Równina Biłgorajska:

Fijałkowski i Górski (1968): **tab. 2.** Skład florystyczny zdjęć fitosocjologicznych z *Arctostaphylos uva-ursi* — *Corynephorum canescentis* — 12 zdj. fs. (nr 29–40).

Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie

Nizina Północnopolaska — Równina Bielska:

Faliński (1966): **tab. 36.** *Spergulo-Corynephorum* R. Tx. (1928) 1955 — 3 zdj. fs. (nr 1–3).

Polesie

Polesie Podlaskie — Równina Łeczyńsko-Włodawska:

Fijałkowski i Kozak (1970): **tab. 3.** Skład florystyczny gleb mineralno-torfowych i mineralnych — *Corynephorum* — 2 zdj. fs. (nr 83 i 84).

Paszewski i Fijałkowski (1970): **tab. 2.** Skład florystyczny gleb mineralno-torfowych i mineralnych Durnego Bagna — *Corynephorum* — 2 zdj. fs. (nr 49 i 50).

Polesie Wołyńskie — Obniżenie Dubienki (oraz Równina Łęczyńsko-Włodawska):

Fijałkowski (1966): **tab. 5.** Zespoły roślin klas: *Festuco-Brometea*, *Nardo-Callunetea*, *Isoëto-Nanojuncetea*, *Chenopodietea* i *Plantaginetea* — 9 zdj. fs. z *Corynephorum* (nr 141 — 149).

4.2. DOKUMENTACJA EKOLOGICZNA

Niektóre badania ekologiczne nad gatunkami i zbiorowiskami psammoofilnymi, prowadzone na wydmach śródlądowych w Kotlinie Toruńskiej (Symonides 1974a, b, c, d, e oraz inne prace, Wilkoń-Michalska i Symonides 1974) i na piaszczystych nieużytkach porolnych w Polsce Północno-Wschodniej (Faliński 1980a, b, Symonides 1985a, b, c i in.), mają obecnie walor badań modelowych, umożliwiających poznanie struktury, procesów i prawidłowości funkcjonowania pionierskich muraw siedlisk piaszczystych, zwłaszcza *Spergulo-Corynephorum*. Badania te wniosły jednocześnie nowe dane do ekologii organizmów, populacji i biocenoz piaskolubnych (por. Faliński 1980a, b, Symonides 1985a, b, 1987, 1989, Andrzejewski i Falińska (red.) 1986, Falińska 1990).

Pierwsze eksperymenty nad ewaporacją roślin wydmowych w Kotlinie Toruńskiej przeprowadziły Anikiejówna i Gorska (1949). Systematyczne badania ekologiczne na wydmach toruńskich prowadzono w latach 60., m. in. nad strukturą i dynamiką populacji *Spergula morisonii* (gatunku charakterystycznego *Spergulo-Corynephorum*), jak również organizacją społeczną tych populacji, występowaniem i kondycją, zmiennością morfologiczną i fenologią, gospodarką wodną oraz zawartością chlorofilu „a” i „b” na tle abiotycznych i biotycznych warunków siedliskowych (Symonides 1974a, b, c, d, e). Zbadano wpływ czynników abiotycznych na dynamikę liczebności populacji gatunków jednorocznych, np. *Spergula morisonii*, *Cerastium semidecandrum*, *Trifolium arvense*, dwuletnich, np. *Jasione montana* i wieloletnich, np. *Corynephorus canescens*, *Scleranthus perennis* (Symonides 1977). Poznano również wiele procesów populacyjnych, np. wpływu liczebności i zagęszczenia (także przegęszczenia) populacji terofitów na rozwój fenologiczny, liczebność, skład gatunkowy oraz rozmieszczenie diaspor w glebach pod *Spergulo-Corynephorum* i w warunkach laboratoryjnych; jednocześnie wykazano oddziaływanie czynnika konkurencji na tym wczesnym etapie rozwoju roślinności (Symonides 1978a, b, c).

Niektóre zjawiska biocenotyczne wyjaśniono dzięki szerszym studiom, analizującym procesy populacyjne u wybranych gatunków psammofitów w warunkach sukcesji pierwotnej *Spergulo-Corynephorum* na wydmach śródlądowych. Badania te dotyczyły przemian roślinności psammofilnej fazy inicjalnej i optymalnej *Spergulo-Corynephorum* oraz populacyjnych właściwości wybranych gatunków piaskolubnych, w tym struktury i dynamiki *Corynephorus canescens*, pionierskiej rośliny nagich piasków (Symonides 1979a, b, c).

Rozpatrywano także wpływ roślinności *Spergulo-Corynephorum* na dynamikę wilgotności gleby i inne składniki biotopu oraz wpływ biocenozy na dynamikę liczebności populacji (Wilkoń-Michalska i Symonides 1974, Symonides 1979a, Faliński 1980a).

Zagadnieniami sukcesji pionierskich muraw psammofilnych interesowano się już od przeszło 60. lat (Juraszek 1928, Sokołowski 1929, Szafer 1930). Dopiero jednak w ostatnim dziesięcioleciu wyjaśniono wiele zagadnień dotyczących rozwoju muraw w toku wtórnej sukcesji ekosystemów na piaszczystych gruntach porolnych, m.in. zostały zbadane i opisane fazy sukcesji oraz oddziaływanie pionierskich populacji drzew i krzewów, dynamika struktury fitocenozy, populacji roślinnych oraz właściwości biotopu (Faliński 1980a, b, Symonides 1985b, c, 1986, Symonides i Borowiecka 1985).

Część II

BADANIA WŁASNE

5. MATERIAŁY

Pierwotnym źródłem informacji są tutaj zdjęcia fitosocjologiczne. Pochodzą one z obszaru całej Polski, z piaszczysk śródlądowych zasiedlanych przez fitocenozy pionierskie, odpowiadające stadium inicjalnemu rozwoju roślinności nieleśnej.

Wykorzystano 1648 zdjęć fitosocjologicznych. Materiał zdjęciowy został krytycznie przeanalizowany pod kątem reprezentatywności i przydatności do celów typologiczno-systematycznych (por. 4.1).

Do bezpośredniej analizy wzięto 64% ogólnej liczby zdjęć. Materiały te są dwojakiego pochodzenia — publikowane (różnych autorów i własne) oraz niepublikowane (własne i innych autorów).

Zbiór materiałów publikowanych obejmuje 444 zdjęcia, w tym 62 własne. Z tego źródła wykorzystywano całe tabele analityczne (jeśli odpowiadały przyjętym kryteriom wielkości powierzchni badanych płatów i terminu ich wykonywania) lub tylko pojedyncze zdjęcia (jeśli nie odpowiadały przyjętym kryteriom). W kilku wypadkach nie trzymano się rygorystycznie przyjętych założeń odnośnie wielkości powierzchni zdjęcia.

Materiały niepublikowane obejmują 611 zdjęć, w tym: 535 zdjęć własnych, Paleskiej — 34, Balcerkiewicz i Celińskiego — 22, Sobańskiej — 10, Jankowskiego — 7 i Lipnickiego — 3.

Łącznie badany zbiór liczył 1055 zdjęć. Z tego, przy sporządzaniu tabel analitycznych wykorzystano 1021, z których 58,4% to materiały własne. Odrzucono 34 zdjęcia stanowiące zbyt małe, odrębne grupy, należące m.in. do innych syntaksonów. Obszary i miejsca, z których pochodzą uwzględnione zdjęcia wymieniono niżej.

Terenowe badania własne prowadzono w całej Polsce, w latach 1973–1987, ze szczególną ich intensyfikacją w latach 1984–1986.

Do porównania fitocenoz pionierskich muraw napiaskowych wykorzystano także materiały własne ze Słowacji (15 zdjęć fitosocjologicznych) oraz publikowane z Niemiec (423), Szwecji (13) i Ukrainy (15).

Wykaz wykorzystanych zdjęć fitosocjologicznych **Index of phytosociological records used**

W wykazie podano: numer kolejny, region fizycznogeograficzny (Kondracki 1978), nazwisko autora, datę publikacji w nawiasach okrągłych, numer tabeli w cytowanej publikacji, numery zdjęć fitosocjologicznych w nawiasach okrągłych. W przypadku zdjęć niepublikowanych podano datę ich wykonania i numery zdjęć w nawiasach okrągłych. Wykrzyknikiem (!) zaznaczono zdjęcia fitosocjologiczne włączone do opracowania warunkowo (powierzchnia zdjęcia powyżej 10–15 m², zbyt wczesny termin wykonania zdjęcia, dyskusyjna przynależność taksonomiczna roślin itp.). W nawiasach kwadratowych podano symbole zdjęć zakodowanych w pamięci komputera. Identyfikatory kodowe zdjęć znajdują się na wydrukach komputerowych wyników.

Pobrzeża Południowobałtyckie

Pobrzeże Szczecińskie — Wyspy Uznam i Wolin:

1. Piotrowska i Celiński (1965): ! **10** (1–20). [HPFC]

— Puszcza Bukowa:

2. Balcerkiewicz i Celiński (npbl.): ! (1–22). [SBFC]

Pobrzeże Koszańskie — Wybrzeże Słowińskie:

3. Krotoska i Tobolewski (1979/1980): ! **1** (1, 2, 5–8, 10, 11, 14–18, 20, 22, 24–29); **3** (4, 8–12, 14–17, 19). [TKZTA, TKZTB]

Pojezierza Południowobałtyckie

Pojezierze Zachodniopomorskie — Pojezierze Myśliborskie:

4. Libbert (1933): ! **21** (1–14). [WL]

Pojezierze Południowopomorskie — Bory Tucholskie:

5. Czyżewska (1973, npbl.): ! (13–16, 23–27, 32, 33, 35, 40, 63, 66). [KC]

6. Lipnicki (1984, npbl.): (890, 891, 908). [LL]

Pojezierze Chelmińsko-Dobrzyńskie — Pojezierze Dobrzyńskie:

7. Kępczyński (1965): ! **64** (1–15). [KK]

Patrz także: Endler i Polakowski (1978).

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka — Kotlina Gorzowska:

8. Czyżewska (1984, npbl.): (542–559). [KC]

— Kotlina Toruńska:

9. Jankowski (1977): ! **4** (12, 16, 20–22, 28, 29). [WJ]

10. Czyżewska (1984, npbl.): (522–541). [KC]

– Kotlina Płocka:

11. Czyżewska (1983, 1984, npbl.): (279–283, 502–511). [KC]

Pojezierze Lubuskie – Pojezierze Łagowskie:

12. Czyżewska (1986, npbl.): (577–582, 584, 585). [KC]

Pojezierze Wielkopolskie – Pojezierze Poznańskie:

13. Wika (1975): ! 5 (1–23, 25–27). [SW]

– Poznański Przełom Warty:

14. Celiński i Balcerkiewicz (1973): ! 1 (1–12). [FCSB]

– Pojezierze Kujawskie:

15. Czyżewska (1983, npbl.): (361–364). [KC]

Wzniesienia Zielonogórskie – Wzniesienia Gubińskie:

16. Czyżewska (1984, npbl.): (436–442). [KC]

Pojezierze Wschodniobałtyckie

Pojezierze Litewskie – Równina Augustowska:

17. Czyżewska (1983, npbl.): (365, 366). [KC]

Pojezierze Mazurskie – Pojezierze Olszyńskie, Mrągowskie i Elckie,
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Równina Mazurska:

18. Endler i Polakowski (1978): ! 1 (1–3, 5, 7–13, 16–18); 2 (1–22). [ZEBPA, ZEBPB]

Uwaga! Część zdjęć pochodzi z Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego (Pojezierze Południowobałtyckie) oraz Równiny Kurpiowskiej (Nizina Północnomazowiecka).

– Równina Mazurska:

19. Czyżewska (1978, npbl.): (313, 316, 320). [KC]

Niziny Śląsko-Łużyckie

Nizina Śląsko-Łużycka – Bory Dolnośląskie:

20. Czyżewska (1984, npbl.): (412–423). [KC]

Niziny Środkowopolskie

Nizina Południowowielkopolska – Wysoczyzna Kaliska:

21. Czyżewska (1984, npbl.): (443–452). [KC]

– Kotlina Kolska:

22. Czyżewska (1984, npbl.): (512–521). [KC]

– Wysoczyzna Kłodawska:

23. Czyżewska (1983, npbl.): (323, 325, 326). [KC]

– Kotlina Sieradzka:

24. Czyżewska (1983, 1984, npbl.): (209, 453, 454). [KC]

– Wysoczyzna Łaska:

25. Czyżewska (1983, 1984, npbl.): (211, 212, 327–331, 455, 457–463). [KC]

– Kotlina Grabowska:

26. Czyżewska (1983, npbl.): (353–359). [KC]

– Kotlina Szczercowska:

27. Sobańska (1978): **1** (2, 3, 5–7, 17, 23, 29, 36, 37). [ES]

28. Czyżewska (1978, 1979, 1983, npbl.): (z serii BOP: 1097, 1103, 1106, 1112, 1115, 1119, 1122, 1125, 1126, 1129, 1130, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1185, 1189–1191, 1661, 1662, 1721, 1860, 1862–1865, 1868–1873, 1880–1890, 1901, 1902, 1905, 1907, 1910, 1912, 1916, 1917, 1920, 1926, 1939, 1940, 2002, 2007, 2010, 2022, 2027–2029, 2037–2040, 2043–2045, 2048, 2049, 2060, 2252, 2255–2257, 2274–2276, 2280, 2281). [KC]

Wał Trzebnicki – Wzniesienia Żarskie:

29. Czyżewska (1984, npbl.): (424–435). [KC]

– Wzgórza Trzebnickie:

30. Głowacki (1975): **! 1** (1–35). [ZG]

– Wzgórza Ostrzeszowskie:

31. Paleska (1976): **! 3** (1–26, 28, 29, 31, 32, 35–37, 40). [BP]

Nizina Śląska – Równina Opolska:

32. Czyżewska (1984, npbl.): (487–501). [KC]

Nizina Północnomazowiecka – Równina Kurpiowska:

33. Czyżewska (1985, npbl.): (567–576). [KC]

Patrz także: Endler i Polakowski (1978)

– Dolina Dolnej Narwi:

34. Czyżewska (1984, 1985, npbl.): (402–409, 560, 561, 563–566). [KC]

– Międzyrzecze Łomżyńskie:

35. Czyżewska (1984, npbl.): (377, 378). [KC]

Nizina Środkowomazowiecka – Równina Łowicko-Błońska:

36. Czyżewska (1983, npbl.): (208, 230–234, 236–239, 295, 332, 334–337, 341, 345, 346). [KC]

– Kotlina Warszawska;

37. Kobendza (1930): **! 7** (1–27); **8** (3–5). (Odrzucone) [RKA, RKB]

38. Zielińska (1967): **! 10** (1); **12(4)**; **14(1–3)**. [JZA, JZB, JZC]

– Równiny Wołomińska i Garwolińska oraz

Kotlina Warszawska:

39. Juraszek (1928): **! 7** (1–10); **9** (1–9, 11). (Odrzucone) [HJA, HJB]

Patrz także: Cieśliński (1979)

Wzniesienia Południowomazowieckie – Wysoczyzna Bełchatowska:

40. Czyżewska (1976–1979, 1983, npbl.): (z serii BOP: 1–4, 7, 13, 14, 295, 296, 298, 653, 654, 658, 692, 695–697, 700, 701, 704, 706–709, 761–764, 1093, 1168, 1193, 1195, 1196, 1198, 1200, 1202–1205, 1207, 1647, 1648, 1652, 1653, 1858, 1932, 1933, 1935, 2004, 2006, 2031, 2032, 2034, 2052, 2055, 2056, 2058, 2259, 2260, 2262–2265, 2267, 2270, 2271; z innej serii: 347–352). [KC]

– Wzniesienia Łódzkie:

41. Czyżewska (1983, npbl.): (241, 243, 244, 290–292, 303–308). [KC]

– Równina Piotrkowska:

42. Czyżewska (1983, npbl.): (254, 256, 257, 259, 260, 262, 264–267, 269, 297, 298, 301, 302). [KC]

– Równina Radomska:

43. Czyżewska (1983, npbl.): (270–275, 277). [KC]

Patrz także: Cieśliński (1979)

Nizina Południowopodlaska – Podlaski Przełom Bugu:

44. Czyżewska (1986, npbl.): (600, 602–610). [KC]

– Wysoczyzna Siedlecka:

45. Czyżewska (1987, npbl.): (642–644, 650–656). [KC]

Wyżyna Śląsko-Krakowska

Wyżyna Woźnicko-Wieluńska – Wyżyna Wieluńska:

46. Babczyńska (1978): ! 9 (1–14). [BB]

47. Czyżewska (1986): 2 (1–35); 3 (1–15); 4 (1–12). [KCA, KCB, KCC]

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska – Wyżyna Częstochowska:

48. Babczyńska-Sendek (1984): ! 50 (1–20). [BBS]

– Wyżyna Olkuska, Rów Krzeszowski, Grzbiet Tenczyński:

49. Kornaś (1957): ! 1 (2–5, 9, 13). [JK]

Wyżyna Środkowomazowiecka

Wyżyna Przedborska – Wzgórza Opoczyńskie i Łopuszańskie, Niecka Włoszczowska:

Wyżyna Kielecko-Sandomierska – Płaskowyż Suchedniowski, Garb Gielniowski, Przedgórze Ilżeckie:

50. Cieśliński (1979): ! 2 (1–21, 23–25); 3 (1–12, 14, 16–23, 25–40); 5 (2, 6, 7, 13, 14); 7 (4, 5, 7–12); 10 (1, 2, 4, 10, 17–20). (Niektóre zdjęcia odrzucone) [SCA, SCB, SCD, SCE, SCC]

Uwaga! W tym są również zdjęcia fitosocjologiczne z Doliny Środkowej Wisły i Równin Kozienickiej (Nizina Środkowomazowiecka) oraz Radomskiej (Wzniesienia Południowomazowieckie).

– Góry Świętokrzyskie:

51. Cieśliński i Halicz (1971): 15 (1–4, 7–10, 2–16, 18, 20). [SCBH]

Północne Podkarpacie

Kotlina Sandomierska – Nizina Nadwiślańska:

52. Czyżewska (1984, npbl.): (375). [KC]

– Równina Biłgorajska:

53. Czyżewska (1984, npbl.): (464–472, 474–479, 482–484). [KC]

Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie

Nizina Północnopodlaska — Kotlina Biebrzańska:

54. Czyżewska (1984, npbl.): (379—382, 384—401). [KC]
— Wysoczyzna Białostocka, Wzgórza Sokólskie:
55. Czyżewska (1983, 1987, npbl.): (216—219, 221, 223—225, 228, 229, 367—372, 374, 617—619, 645—649). [KC]
— Dolina Górnej Narwi:
56. Czyżewska (1987, npbl.): (611—616). [KC]
— Równina Bielska:
57. Czyżewska (1987, npbl.): (620—627, 630—632, 634) [KC]
— Wysoczyzna Drohicka:
58. Czyżewska (1987, npbl.): (635—640). [KC]

Polesie

Polesie Podlaskie — Równina Łęczyńsko-Włodawska:

59. Czyżewska (1986, npbl.): (586—596). [KC]

6. METODY BADAWCZE

W badaniach terenowych przyjęto metodę zdjęcia fitosocjologicznego wg Braun-Blanqueta (1964), z zastosowaniem 6-stopniowej skali ilościowości i skali towarzyskości.

Kryterium wyboru badanych płatów to: jednorodność florystyczna, odpowiednia powierzchnia i właściwa pora roku wykonywania zdjęć. I tak: powierzchnie badawcze nie przekraczały 10—12(15) m², a zdjęcia fitosocjologiczne były wykonywane od maja do lipca, ze względu na dwuaspektowość wiosenno-letnią tych muraw. Jedynie w 1984 r. bardzo chłodne i deszczowe miesiące wiosenne spowodowały przesunięcie w czasie sezonu wegetacyjnego w murawach napiaskowych i badania terenowe można było kontynuować prawie do końca sierpnia.

We wstępnej fazie opracowania i analizy materiałów własnych korzystano z metod konwencjonalnych (Pawłowski 1977). Mianowicie, materiał zdjęciowy zestawiono w tabele analityczne odpowiadające mezoregionom fizycznogeograficznym (Kondracki 1978). Tabele te składały się od (2—8)10 do 66 zdjęć fitosocjologicznych i miały odzwierciedlać zmienność lokalnosiedliskową. Następnie tabele lokalne własne oraz wszystkie znane wówczas analityczne tabele publikowane zestawiono w tabelę synoptyczną, z uwzględnieniem stopni stałości (Pawłowski l.c.). Tabela synoptyczna składała się z 58 tabel odpowiadających 60. mezoregionom fizycznogeograficznym, zlokalizowanym na obszarze Polski od Północnego Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Mazurskiego po Nizinę Śląsko-Łużycką, Kotlinę Sandomierską i Polesie Podlaskie.

Interpretując dane zbiorcze (i później — numeryczne) w aparacie pojęciowym wykorzystano terminy: zespół, podzespół, odmiana (wariant), odmiana (rasa) geograficzna, stadia i fazy rozwojowe.

Oczekiwano, że z opracowanej tabeli synoptycznej można będzie uzyskać informacje dotyczące jednostek syntaksonomicznych odpowiadających zmienności lokalnosiedliskowej, regionalnej i dynamicznej oraz charakterystykę florystyczno-ekologiczną na podstawie grup gatunków charakterystycznych i wyróżniających.

Dane zawarte w tabeli potwierdzały, że analizowany zbiór odpowiada jednemu zespołowi i przyniosły wstępne dane o zmienności geograficznej. Natomiast poziomy klasyfikacji hierarchicznej poniżej zespołu były całkowicie zatarte. Jednocześnie okazało się, iż wiele tabel lub pojedynczych zdjęć publikowanych należy wykluczyć ze względów metodycznych, a sama tabela zbiorcza, z powodu znacznych rozmiarów, nie nadaje się do druku.

Po selekcji dostępnego materiału utworzono zbiór składający się z pojedynczych zdjęć fitosocjologicznych (łącznie 1055) i poddano go klasyfikacji numerycznej. Spodziewano się, że klasyfikacja numeryczna, polegająca na obliczaniu podobieństwa fenetycznego pomiędzy zdjęciami fitosocjologicznymi, czyli badanymi obiektami (Nienartowicz, Barcikowski i Wieczorkowski 1988), pomoże zobiektywizować wyniki, zwłaszcza dotyczące zależności między badanymi obiektami (zdjęciami), ułatwi interpretację modeli porządkowanych obiektów, pozwoli wyraźniej uchwycić poziomy klasyfikacji hierarchicznej.

Ze względu na użycie metody numerycznej rozpatrywano wyłącznie zdjęcia fitosocjologiczne wykonane metodą Braun-Blanqueta, z zastosowaniem 6-stopniowej skali ilościowości (Braun-Blanquet 1964).

Dane do analizy numerycznej przygotowano w sposób odpowiadający programom opracowanym w Uniwersytecie Cornella, w USA (Nienartowicz, Barcikowski i Wieczorkowski 1988, Nienartowicz, Warachowska i Wojdyło 1990). Zdjęcia były klasyfikowane na podstawie podobieństw obliczonych z uwzględnieniem obecności gatunków i ich ilościowości. W ten sposób przypisano gatunkom następujące odpowiedniki liczbowe, w zależności od stopnia ilościowości Braun-Blanqueta: $+^2-1$, $1-2$, $2-$, $3-6$, $4-8$, $5-9$. W obliczeniach numerycznych wzięto pod uwagę 367 taksonów roślin: 277 taksonów naczyniowych, 58 taksonów porostów, 28 taksonów mszaków oraz 4 taksony glonów i grzybów. Jednoczesne wystąpienie gatunku w warstwach „b” i „c” traktowano oddzielnie. Po uwzględnieniu tej zasady liczba wszystkich cech florystycznych, ze względu na które porównywano zdjęcia, wynosiła 376.

Wykorzystując oprogramowanie bazy danych i biblioteki FITOTAX Instytutu Biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przeprowadzono ordynację i klasyfikację numeryczną badanego zbioru. Użyto programy DECORANA (Hill 1979a) i TWINSpan (Hill 1979b), napisane w języku FORTRAN. Wyniki ordynacji, uzyskane po zastosowaniu metod RA (Reciprocal Averaging) i DCA (Detrended Correspondence Analysis) z programu DECORANA będą przedmiotem analizy w innej pracy. W niniejszym opracowaniu wykorzystano przede wszystkim program TWINSpan, który umożliwił klasyfikację hierarchiczną badanego zbioru

² Stopień „+” obejmuje także ilościowość znikomą „zn”, „r”, która w badanym zbiorze występuje rzadko.

oraz jego florystyczno-ekologiczną charakterystykę na podstawie grup gatunków charakterystycznych i wyróżniających. I tak: randze zespołu odpowiada poziom pierwszy, podzespołom (zmienność dynamiczno-siedliskowa i geograficzna) — poziomy drugi i trzeci, a wariantom — poziom szósty. Program ten posłużył również do ułożenia analitycznych tabel fitosocjologicznych. Ze względów wydawniczych zamieszczono tabelę synoptyczną (tab. II), t.j. wyciąg z dwunastu tabel analitycznych, zawierający stopnie stałości i współczynniki pokrycia (Braun-Blanquet 1964, Pawłowski 1977). Natomiast tabele analityczne (tab. IV, VI—VIII) są załącznikami wynikającymi z wymogów „Kodeksu Nomenklatury Fitosocjologicznej” (Rozdz. 2, art. 7, Barkman, Moravec i Rauschert 1986). Obliczenia wykonano na maszynie cyfrowej RIAD-32 w Ogólnouczelnianym Ośrodku Obliczeniowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wszystkie etapy ordynacji i klasyfikacji numerycznej zostały wykonane w ramach podprogramu badawczego CPBP 04.10.01.

Warunki siedliskowe dla poszczególnych syntaksonów scharakteryzowano na podstawie literatury (Kępczyński 1965, Piotrowska i Celiński 1965, Celiński i Balcerkiewicz 1973, Głowacki 1975, Wika 1975, Babczyńska 1978, Endler i Polakowski 1978, Cieśliński 1979, Czyżewska 1986; por. także tab. III, V) oraz przy pomocy 106 prób glebowych, pobranych w miejscach wykonywania własnych zdjęć fitosocjologicznych. W przypadku wykształconego profilu glebowego próbę do analizy pobierano z poziomu próchniczno-akumulacyjnego (A_1), po usunięciu poziomu A_0 . Jeśli nie stwierdzono wykształconego profilu glebowego próbę pobierano z głębokości 0–10 cm. Analizy prób glebowych zostały wykonane w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi. Skład chemiczny oznaczono metodą areometryczną w modyfikacji Prószyńskiego; zawartość procentową C organicznego — metodą miareczkową Schallenbergera w modyfikacji Tiurina; odczyn gleby (w H_2O i KCl) mierzono metodą elektrometryczną za pomocą pehametru lampowego N 5123; kwasowość wymienną — metodą Daikuhary, a hydrolityczną — metodą Kappena w modyfikacji Adriana; zawartość procentową $CaCO_3$ — metodą Scheiblera; K_2O i P_2O_5 — metodą Egnera w modyfikacji Rhema, zaś zawartość przyswajalnego Mg — metodą Schachtschabela (por. Chodań, Grzesiuk i Mirowski 1980; Strzemski, Siuta i Witek 1983; Dzieciołowski 1985).

Natężenie światła mierzono luksometrem Ju16 produkcji ZSRR.

Temperaturę i opady dla obszarów niżowych Europy zestawiono metodą Gausena-Waltera (ryc. 1; Walter i Lieth 1967).

Dla uzyskania informacji o liczebności niektórych roślin zarodnikowych zakładano poletka o powierzchni $1m^2$. Podcja (trzoneczki) *Cladina mitis* lub osobniki *Polytrichum piliferum* liczono dokładnie w kwadracie 10×10 cm i przez wielokrotność powierzchni takiego kwadratu w obrębie poletka uzyskiwano przybliżoną liczebność tych roślin.

Nomenklaturę roślin naczyniowych przyjęto wg Flora Europaea (1964, 1968, 1972, 1976, 1980), porostów — wg Wirtha (1980), Santessona (1984) i in. opracowań, mszaków — wg Ochry i Szmajdys (1978) oraz Rejment-Grochowskiej (1950, 1966).

Dokumentację zielnikową złożono w Herbarium Zakładu Geobotaniki i Ochrony Przyrody (LOD), Katedry Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego. Dokumentację fitosocjologiczną (oryginały zdjęć) zdeponowano w Archiwum Fitosocjologicznym porostów i muraw Zakładu Geobotaniki i Ochrony Przyrody UŁ w Łodzi. Natomiast w Instytucie Biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w bazie danych systemu FITOTAX, znajduje się zakodowany zbiór 1055 zdjęć fitosocjologicznych niepublikowanych i publikowanych, który może być wykorzystany w dowolnym czasie do analizy lub syntezy śródlądowych muraw napiaskowych Polski bądź Europy. Identyfikatory kodowe gatunków (kodowanie ad hoc) to przyporządkowane gatunkom kolejne liczby, od 1 do 376. Identyfikatory zdjęć fitosocjologicznych — patrz 5, wydruk komputerowy BTWIN (Zakład Geobotaniki i Ochrony Przyrody w Łodzi) oraz baza danych FITOTAX.

Dokumentację fotograficzną zdeponowano w Zakładzie Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego.

Rysunki kreślono wykorzystując program AUTOCAD na komputerze IBM, w Międzywydziałowym Zakładzie Technicznych Środków Nauczania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

7. WYNIKI

Na oligotroficznych, suchych piaskach śródlądowych Polski występuje jeden pionierski zespół *Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis* R. Tx. ex K. Czyżewska (por. ryc. 2), reprezentujący na tym obszarze związek *Corynephorion*, rząd *Corynephoretalia* i klasę *Sedo-Scleranthetea*.

Zespół wykazuje zmienność lokalnosiedliskową, dynamiczną, antropogeniczną i regionalną, co warunkuje możliwość wyodrębnienia niższych jednostek syntaksonomicznych oraz odmian geograficznych i będzie przedmiotem rozważań w dalszej części pracy.

Ryc. 2. Model syntaksonomiczny *Spergulo-Corynephorum* w Polsce (uporządkowany metodą numeryczną wg programu TWINSpan)

Fig. 2. Syntaxonomical model of *Spergulo-Corynephorum* in Poland (acc. to TWINSpan programme)
 Numery tabel na poziomie szóstym odpowiadają numerom tabel analitycznych w tab. II:

Number of tables on the sixth level as in Tab. II:

Spergulo-Corynephorum thymetosum serpylli: 1 – var. z (with) *Festuca psammophila*; 2 – var. z (with) *F. ovina*; 3 – var. *typicum*; 4 – var. z (with) *Artemisia campestris* subsp. *campestris*; *S.-C. typicum*; 5 – postać przejściowa (intermediate form); 6 – var. z (with) *Hypochoeris radicata*; 7 – var. z (with) *Artemisia campestris* subsp. *campestris*; 8 – var. *typicum*; *S.-C. cladinetosum mitis*; 9 – var. z (with) *Thymus serpyllum*; 10 – var *typicum*; var. z (with) *Polytrichum piliferum*; 11 – postać późniejsza (later phase); 12 – postać wcześniejsza (earlier phase).

W niniejszej pracy przyjęto system syntaksonomiczny proponowany przez Krauscha (1968). System ten jest najbardziej zbliżony do obrazu takiej roślinności w Polsce i już wcześniej był wybierany spośród kilku znanych klasyfikacji suchych muraw (por. Medwecka-Kornaś, Kornaś, Pawłowski i Zarzycki 1977, Matuszkiewicz 1982).

Zestaw gatunków charakterystycznych opiera się na propozycjach Müllera (1961) i Krauscha (1962, 1968), ale jednocześnie jest weryfikowany na podstawie obserwacji i wyników własnych badań. Niżej przedstawiono podział syntaksonomiczny przyjęty w tej pracy:

Klasa: *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955 em. Th. Müller 1961

(Syn. *Festuco-Sedetetea* Oberd. 1957, incl. *Koelerio-Corynephoretea* Klika in Klika et Novák 1941 p.p. i *Corynephoretea canescentis* Br.-Bl. et Tx. 1943)

Typ nomenklatoryczny: *Sedo-Scleranthetalia* (*biennis*) Braun-Blanquet 1955 (Öster. Bot. Zeitschr., Wien, 102: 484) lectotypus hoc loco (Müller 1961 (Beitr. Naturk. Forsch. SW-Deutschl., 20, 2: 115, 116) lectotypus hoc loco)

Ch: *Arenaria serpyllifolia*³, *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *Brachythecium albicans*, *Cerastium semidecandrum*, *Ceratodon purpureus*, *Cladonia furcata* var. *palamaea*, *Festuca guestphalica* [= *F. ovina* var. *firmula*], *F. ovina*, *Hieracium pilosella*, *Jasione montana*, *Jovibarba sobolifera* subsp. *sobolifera*, *Myosotis stricta*, *Potentilla argentea*, *P. neglecta* [= *P. impolita*], *Rhacomitrium canescens*, *Rumex acetosella*, *R. tenuifolius*, *Scleranthus perennis*, *Sedum acre*, *S. sexangulare*, *Trifolium arvense*, *Veronica dillenii*, *V. praecox*, *V. verna* i in.

Rząd: *Corynephoretalia canescentis* Klika 1934 em. Krausch 1962

(incl. *Corynephoretalia* R. Tx. 1937)

Typ nomenklatoryczny: *Corynephorion* Klika 1931 (Sbornik Českosl. Akad. Zeměd., Praha, 6(A): 278) lectotypus hoc loco

Ch, D: *Carex arenaria*, *C. ligetica*, *Corynephorus canescens*, *Cladina mitis* [= *Cladonia mitis*], *Cladonia cervicornis* subsp. *verticillata* [= *Cl. verticillata*], *Cl. uncialis*, *Coelocaulon aculeatum* [= *Cornicularia aculeata*], *Logfia minima*, *Ornithopus perpusillus*, *Polytrichum piliferum*
D *Hypochoeris glabra*

Związek: *Corynephorion canescentis* Klika 1931

(incl. *Spergulo-Corynephorion* Pass. 1960)

Typ nomenklatoryczny: *Weingaertnerietum* Tüxen 1928 (Jahrb. Geograph. Gesellsch., Hannover, 50: 77) lectotypus hoc loco

³Nazwy gatunków podano wg Flora Europaea (1964, 1968, 1972, 1976, 1980) i Oberdorfera (1983), Wirtha (1980) i Santessona (1984) oraz Ochry i Szmajdę (1978).

Ch: *Agrostis vinealis* [= *A. coarctata*, *A. canina* var. *arida*], *Coelocaulon muricatum* [= *Cornicularia muricata*], *Spergula morisonii*, *Teesdalia nudicaulis*

Zespół: *Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis* R. Tx. ex K. Czyżewska
hoc loco

(Syn. *Procorynephoretum* Gesellsch. Juraszek (1928, Tab. 9), *Weingaertnerietum* Tüxen (1928, Tab.: 77), *Weingaertnerietum* Hueck (1931, Tab.: 181), *Weingaertnerietum*-Assoziation Volk (1931), Tab. 9: 98), *Corynephoretum canescentis* Tüxen (1928) 1937 (1937, Tab.: 55), *Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis* Tüxen (1928) 1955 nom. nud. (1955: 164), incl. *Veronica dillenii-Corynephoretum* Passarge (1960, Tab. 3: 119), Hohenester (1967, Tab., zdj. 14-27), w obszarze Europy Środkowej, *Ornithopodo-Corynephoretum* Passarge (1960, Tab. 2: 116, 117), *Spergulo-Festucetum psammophilae* Passarge (1960, Tab. 1: 115), *Teesdalia-Corynephoretum* Olsson (1974, Tab. 6, zdj. 1-13), *Teesdalia-Sperguletum* Schubert (1974, Tab.: 295).

Typ nomenklatoryczny (pierwotny): *Weingaertnerietum* (typicum) Tüxen 1928: zdj. fs. 8 w Tab. (załącznik) — lectotypus hoc loco (lektotypizacja: Moravec 1967: 173).

Typ nomenklatoryczny (anulujący nomen nudum): *Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis* (typicum): zdj. fs. 5 (1863) w Tab. IV — holotypus hoc loco

Ch: *Spergula morisonii*, *Teesdalia nudicaulis*

D geogr: *Carex arenaria*, *Veronica dillenii*

subass. *typicum* subass. nova

var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. nova

D: *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *Cladonia subulata*

var. z *Hypochoeris radicata* var. nova

D: *Hypochoeris radicata*, *Agrostis capillaris* [= *A. tenuis*], *Jasione montana*, *Helichrysum arenarium*, *Polytrichum juniperinum*

subass. *thymetosum serpylli* subass. nova

D: *Thymus serpyllum*, *Arenaria serpyllifolia*, *Rhacomitrium canescens*

var. *typicum* var. nova

var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. nova

D: *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *Brachythecium albicans*

var. z *Festuca ovina* var. nova

D: *Festuca ovina*, *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*

var. z *Festuca psammophila* var. nova

D: *Festuca psammophila*, *Cladonia foliacea*

subass. *cladinetosum mitis* R. Tx. (1928) 1937 em. K. Czyżewska

D: *Cladina mitis*, *Coelocaulon aculeatum*, *Cladonia uncialis*, *Cl. cervicornis* subsp. *verticillata*

var. *typicum* var. *nova*

var. z *Thymus serpyllum* var. *nova*

D: *Thymus serpyllum*, *Rhacomitrium canescens*

var. z *Polytrichum piliferum* var. *nova*

D: *Polytrichum piliferum*, *Cladonia furcata* var. *palamaea*

Związek: *Thero-Airion* R. Tx. 1951

Typ nomenklatoryczny: *Aira praecox-Sedum rupestre*-Ass. Tüxen 1951: 3 zdj. w Tab. synopt. (Vegetatio, 3: 163, 164) lectotypus hoc loco

Ch: *Aira caryophyllea*, *A. c.* subsp. *multiculmis* [= *A. multiculmis*], *A. praecox*, *Filago pyramidata*, *F. vulgaris*, *Logfia arvensis*, *L. gallica*, *Moenchia erecta*, *Myosotis discolor*, *Scleranthus annuus* subsp. *polycarpus* [= *S. polycarpus*], *Sedum anglicum*, *Tuberaria guttata*, *Vulpia bromoides*, *V. myuros*

Związek: *Koelerion albescentis* R. Tx. 1937

Typ nomenklatoryczny: *Tortuleto-Phleetum* (Br.-Bl. et De Leeuw 1936) Tüxen 1937 (Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., 3: 58) lectotypus hoc loco (Typ nomenklatoryczny *Tortuleto-Phleetum* (Br.-Bl. et De Leeuw 1936) R. Tx. 1937: zdj. A in Braun-Blanquet et De Leeuw 1963 (Nedderland. Kruidk. Archief, 46: 366) lectotypus hoc loco)

Ch: *Cerastium diffusum*, *Festuca rubra* var. *arenaria*, *Jasione montana* var. *litoralis*, *Koeleria albescens* [= *K. arenaria*], *Lotus corniculatus* var. *crassifolius*, *Phleum arenarium*, *Viola tricolor* subsp. *curtisii*, *Tortula ruraliformis* i in.

Rząd: *Festuco-Sedetalia acris* R. Tx. 1951 em. Krausch 1962

Lektotypizacja w związku *Helichryson arenarii* R. Tx. in Moravec 1967 (Folia Geobot., Phytotax., 2: 163). Typ nomenklatoryczny *Helichryson arenarii* R. Tx. 1951: *Festuca polesica-Dianthus arenarius*-Ass. R. Tx. 1951 lectotypus hoc loco (Typus *Festuca polesica-Dianthus arenarius*-Ass. Tx. 1951 (Syn.: *Koelerietum* Anderson 1950 (Botan. notiser.: zdj. 14 w Tab. 3: 160, typus ass.) lectotypus hoc loco); em. Krausch 1962 (Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F., 9: 268) lectotypus hoc loco

Ch: *Calamintha acinos*, *Festuca trachyphylla*, *Helichrysum arenarium*, *Petrohragia prolifera*, *Sedum reflexum*, *S. telephium* subsp. *maximum*, *Thymus serpyllum*, *Trifolium campestre*

Związek: *Armerion elongatae* Krausch 1962

Typ nomenklatoryczny: *Diantho (deltoidi)-Armerietum* Pötsch 1962 [non Krausch 1959]: zdj. 5 w Tab. 12 (Wiss. Zeitschr. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Nat. Aeihe, 7: 199); lektotypizacja — Moravec 1967: 166; Krausch 1962 (Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F., 9: 268) Ch, D hoc loco

Ch: *Armeria maritima* subsp. *elongata*, *Cerastium arvense*, *Dianthus deltoides*, *Herniaria glabra*, *Silene conica*, *S. tatarica*, *Vicia lathyroides*

Typ nomenklatoryczny: *Koeleria glauca*-*Jurinea cyanoides*-Ass. Volk 1931 (Zeitschr. Bot., 24, 1: 105) lectotypus hoc loco (Typ nomenklatoryczny *Koeleria glauca*-*Jurinea cyanoides*-Ass. Volk 1931: zdj. 10 (l.c.: 102-105) lectotypus hoc loco

Ch: *Alyssum montanum* subsp. *gmelinii*, *Androsace septentrionalis*, *Astragalus arenarius*, *Dianthus arenarius* subsp. *borussicus*, *Festuca polesica*, *F. psammophila*, *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*, *Hieracium echiioides*, *Jurinea cyanoides*. *Kochia laniflora*, *Koeleria glauca*, *Plantago arenaria*, *Silene chlorantha*, *S. lituanica*, *S. otites*, *Tragopogon floccosus* i in.

7.2. CHARAKTERYSTYKA SYNTAKSONÓW

Klasa *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955 em. Th. Müller 1961

Do klasy *Sedo-Scleranthetea* należą zbiorowiska europejskich muraw napiaskowych i bezwapiennych skał. Są to ciepło-, sucho- i wybitnie światłolubne murawy rosnące na przepuszczalnych piaskach i żwirach oraz na skałach (zwłaszcza piaskowcowych) w umiarkowanych obszarach Europy. Najczęściej są to dwuwarstwowe fitocenozy niskorosnących ziół: wąskolistnych traw, licznych kserofitów i sukulentów, w tym psammofilnych porostów i mchów.

W ujętej przez Braun-Blanqueta (1955) i Müllera (1961) klasie *Sedo-Scleranthetea* znajdowała się grupa gatunków, którą przeniesiono do rzędów *Corynephoralia* (po jego włączeniu do klasy) i *Festuco-Sedetalia*, co udowodniono już wcześniej (Krausch 1962). Müller (1961) włączył do klasy *Sedo-Scleranthetea* również grupę gatunków powszechnie uznawanych za ruderalne lub segetalne: *Echium vulgare*, *Erophila verna*, *Holosteum umbellatum*, *Erodium cicutarium*, *Veronica arvensis* i in., uzasadniając, że murawy są ich siedliskiem pierwotnym, zaś siedliska synantropijne — wtórnymi. Z tym poglądem nie można zgodzić się w świetle materiałów pochodzących z obszaru Polski, gdzie gatunki te jedynie przenikają do omawianych muraw z kontaktowych siedlisk ruderalnych bądź segetalnych lub wówczas, gdy w fitocenozach murawowych są pozostałością po poprzedniej roślinności, np. segetalnej (por. tab. II). Natomiast *Phleum phleoides* ma swój punkt ciężkości w klasie *Festuco-Brometea*, co wykazał Krausch (1962). Dlatego gatunki te pominięto jako charakterystyczne klasy.

Z grupy gatunków charakterystycznych klasy wyłączono porost *Coelocaulon aculeatum* i mech *Polytrichum piliferum*, przenosząc je do rzędu *Corynephoralia*, ponieważ — jako gatunki wybitnie pionierskie (inicjalne) — swoje optimum ekologiczno-socjologiczne znajdują w zespołach tego rzędu.

⁴Uwaga! nie mylić z odmianami leśnymi (por. 8.4)

Po sprawdzeniu terenowym (oraz materiałów zielnikowych) w Polsce i krajach sąsiednich uściślono zakres *Cladonia furcata* do odmiany *palamaea* jako taksonu charakterystycznego klasy⁴). W niniejszej pracy wystąpienia *Cladonia furcata* s.l. w wykorzystanych zdjęciach fitosocjologicznych, publikowanych przez innych autorów (jeśli nie udało się sprawdzić materiału zielnikowego), włączono do *Cl. furcata* var. *palamaea*, za sugestią prof. Z. Tobolewskiego z 1987 r., który uważał, że nie zostanie popełniony rażący błąd wobec pospolitości tego taksonu w omawianych fitocenozach.

Sprecyzowano również zakres występowania innych „drobnych” taksonów w obrębie grup *Rumex acetosella*, *Festuca ovina* i *Potentilla argentea* (potwierdzony materiałami zielnikowymi). W obrębie klasy znalazła się ponownie *Artemisia campestris* subsp. *campestris* oraz *Jovibarba sobolifera* subsp. *sobolifera*. Wszystkie wyżej wymienione taksony są psammofitami murawowymi dlatego zostały utrzymane lub wprowadzone jako gatunki charakterystyczne klasy.

Rząd *Corynephoretalia canescentis* Klika 1934 em. Krausch 1962

Do rzędu zaliczane są kwasolubne zbiorowiska napiaskowe w różnym stopniu pionierskie (inicjujące sukcesję pierwotną i wtórną), w których dużą rolę odgrywają: szczotlicha siwa, liczne terofity i porosty. Należą tutaj zbiorowiska zdecydowanie wyspecjalizowane w sensie Tüxena (1967).

Zakres rzędu był ujmowany bardzo różnie (patrz). Najbardziej przekonująca wydaje się koncepcja Krauscha (1962, 1968), z zastrzeżeniem, że nazwa rzędu została ważnie opublikowana przez Klikę (1934, s. 15) przed Tüxenem (1937, s. 55, 56) i dlatego uzyskuje priorytet. Według tej koncepcji wszystkie pionierskie zbiorowiska napiaskowe Europy Zachodniej i Środkowej należą do trzech związków:

Corynephorion — śródlądowe, atlantycko-subatlantyckie murawy szczotlichowe,
Thero-Airion — śródziemnomorsko-atlantycko-subatlantyckie murawy ze śmiałkami; przez Polskę Zachodnią przechodzi wschodnia granica zasięgu zespołów z tego związku (zubożałych),

Koelerion albescentis — atlantyckie murawy napiaskowe (na szarych wydmach nadmorskich).

Za takim ujęciem przemawiają ściśle stosunki florystyczne, które według dotychczas znanych materiałów istnieją pomiędzy śródlądowymi zespołami z *Corynephorion* i *Thero-Airion*, co dostatecznie udowodnił Krausch (1962). *Koelerion albescentis* łączy grupa roślin zarodnikowych oraz nadmorskie podgatunki lub odmiany gatunków śródlądowych, np. *Corynephorus canescens* var. *maritimus* (śródlądowy wikariant to *C. c.* var. *genuinus* (por. Schulz 1949) i in.; patrz Ch *Koelerion albescentis*). Dlatego nie można zgodzić się ani z koncepcją Müllera (1961, s. 116), który (sub)oceaniczne związki *Koelerion albescentis* i *Thero-Airion* włączył do środkowoeuropejsko-subkontynentalnego rzędu *Festuco-Sedetalia*, ani

też z koncepcją Kornecka (in Oberdorfer 1978, s. 21), który dla muraw z jednorocznymi lub dwuletnimi niskimi trawami *Aira* i *Vulpia* utworzył oddzielny rząd *Thero-Airetalia* Oberd. in Oberd. et al. 1967.

Rząd w obecnej postaci diagnozuje psammofty kwiatowe i zarodnikowe (patrz s. 56), zwłaszcza te ostatnie — *Cladina mitis*, *Cladonia uncialis*, *Cl. cervicornis* subsp. *verticillata*, *Coelocaulon aculeatum* i *Polytrichum piliferum* — bardzo dobrze charakteryzują i przejawiają silne właściwości fitocenotwórcze (por. także Krieger 1937 i Tüxen 1937; patrz także 8.4).

Związek *Corynephorion canescentis* Klika 1931

Związek obejmuje pionierskie, śródlądowe (sub)atlantyckie murawy szczotlichowe. Murawy te inicjują sukcesję pierwotną i wtórną na bezwodnych, kwaśnych piaskach wydmych lub polodowcowych.

Gatunkami charakterystycznymi związku są typowe psammofty subatlantyckie: *Spergula morsonii* (bardzo częsta), *Teesdalia nudicaulis* (częsta, zwłaszcza w Polsce Środkowej i Zachodniej), *Agrostis vinealis* (prawie w całej Polsce, ale tylko miejscami dość częsty), *Coelocaulon muricatum* (prawie w całej Polsce, ale dość rzadki; w Polsce Zachodniej dość częsty). W obrębie *Corynephorion* optymalne warunki rozwojowe osiąga *Corynephorus canescens*.

Do związku *Corynephorion* należy jeden zespół: *Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis* R. ex Tx. K. Czyżewska hoc loco.

Na terenie Polski pionierskie murawy ze związku *Corynephorion* przejawiają silne powiązania z roślinnością rzędu *Festuco-Sedetalia*, mianowicie wiele gatunków z tego rzędu bardzo wcześnie migruje do muraw szczotlichowych, co w obszarze badań uwarunkowane jest klimatycznie.

Do rzędu *Festuco-Sedetalia* zaliczane są bardziej zwarte murawy napiaskowe, a sam rząd stoi już na przejściu do muraw kserotermicznych z klasy *Festuco-Brometea*. Rząd jest reprezentowany przez związek *Armerion elongatae*, skupiający środkowoeuropejskie zwarte murawy napiaskowe, rozpowszechnione w przejściowym obszarze wpływów klimatu oceanicznego i kontynentalnego. Drugi związek, *Koelerion glaucae*, obejmuje śródlądowe murawy napiaskowe o wyraźnie kontynentalnym charakterze, zbliżające się do kserotermicznych muraw stepowych (Kornaś 1977, Matuszkiewicz 1982).

**Zespół *Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis* R. Tx. ex K. Czyżewska⁵
hoc loco**

**Zespół sporka wiosennego i szczotliczy siwej, murawa szczotlichowa ze sporkiem
wiosennym**

Tabela synoptyczna II(tab. 1-12); tabele analityczne IV, VI-VIII

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 5(1863) w Tab. IV (typus ass.)

Ch. ass.: *Spergula morisonii*, *Teesdalia nudicaulis*

D geogr. *Carex arenaria*, *Veronica dillenii*

Najwcześniej używaną nazwą syntaksonu była *Weingaertnerietum* (Tüxen 1928)⁶, a następnie — *Corynephorum canescentis* (Tüxen 1937). Później nastąpiła prawdziwa eksplozja nazewnicza. Historyczny przegląd nomenklatury zespołu(ów) i kombinacji cytatów autorskich znajduje się w pracach Tüxena i Schwabe (1972) oraz Dierschke i Sasse (1986) (por. także 3 i 4.1).

Przyjęta dla zespołu nazwa *Spergulo morisonii* [*vernalis*]-*Corynephorum canescentis* została użyta po raz pierwszy przez Tüxena (1955), ale jako *nomen nudum*. Nazwa ta jest utworzona zgodnie z zaleceniami 10B-D art. 10 „Kodeksu Nomenklatury Fitosocjologicznej” (Barkman, Moravec i Rauschert 1986) i dokładnie oddaje charakter tego zespołu. Dlatego zostaje utrzymana przez wskazanie diagnozy nazewnicznej (patrz wyżej).

Charakterystyka ogólna. Pionierska murawa z *Corynephorus canescens*, *Spergula morisonii*, *Teesdalia nudicaulis* i innymi psammofilno-kserofilnymi roślinami kwiatowymi, porostami i mszakami, związana z klimatem subatlantyckim, obszarami płaskimi lub lekko falistymi, silnie nasłonecznionymi, suchymi piaskami luźnymi, silnie kwaśnymi i kwaśnymi (do obojętnych), znaczną ruchomością podłoża (do piasków lotnych włącznie), glebami o niskiej zasobności w składniki pokarmowe i niekorzystnych stosunkach wodnych. Występuje w całej Polsce niżowej. Fitocenozy z części Polski Zachodniej, Północno-Zachodniej i Północnej odpowiadają odmianie geograficznej subatlantyckiej (z *Carex arenaria*), pozostałe odpowiadają kresowym postaciom zespołu, odmianie geograficznej subkontynentalnej, z *Veronica dillenii*.

Typowa struktura. W budowie warstwowej zasadniczą rolę odgrywają warstwy zielna i porostowo-mszysta, co pokazują diagramy Hulta (ryc. 3).

Średni procent zwarcia w poszczególnych warstwach kształtuje się następująco:
b) — od 0 do 3,9%, c — od 30,9% do 64,8%, d — od 13,6 do 75,6%.

⁵ W dalszym tekście nazwa tego zespołu będzie pisana w skróconej formie: *Spergulo-Corynephorum* lub *Spergulo morisonii-Corynephorum*.

⁶ W tym samym roku Juraszek (1928) opublikowała materiały z wyd. okolic Warszawy, z tabelami muraw, które określiła jako *Procorynephorum* Gesellsch. i *Corynephorus canescens* Assoziation (*Corynephorum canescentis*).

Syntaksony Syntaxa	subass. <i>thymetosum serpylli</i> K. Czyżewska subass. nova				postać przejściowa (intermediate form)
	var. z (with) <i>Festuca psammophila</i>	var. z (with) <i>Festuca ovina</i>	var. <i>typicum</i>	var. z (with) <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	
Numer tabeli analitycznej Number of analytical table	tab. 1	tab. 2	tab. 3	tab. 4	tab. 5
Liczba zdjęć w tabeli Number of records in table	26	19	75	76	49
Ogólna liczba gatunków w tabeli Total number of species in table	90	104	163	188	140
w tym: kwiatowych (incl.): (phanerogams)	66	67	110	130	101
zarodnikowych (cryptogams)	24	37	53	58	39
Średnia liczba gatunków w 1. zdję- ciu Mean number of species in 1 record	17,9	18,1	19,5	24,6	18,4
w tym: kwiatowych (incl.): (phanerogams)	12,6	11,9	13,2	16,6	15,0
zarodnikowych (cryptogams)	5,3	6,2	6,3	8,0	3,4
Średnie pokrycie warstw (%) b Mean cover of plant layers (%) c d	0,6 58,6 30,8	0,2 64,2 21,6	0,3 59,8 40,8	0,4 64,8 31,3	0,0 62,2 14,7
1	2	3	4	5	6
Ch, D ass. <i>Spergula morisonii</i> <i>Teesdalia nudicaulis</i> C <i>Carex arenaria</i> D geogr. SS <i>Veronica dillenii</i> D geogr. D subass. <i>thymetosum serpylli</i> FS <i>Thymus serpyllum</i> SS <i>Rhacomitrium canescens</i> SS <i>Arenaria serpyllifolia</i>	D S 905 V 58 I — 501 V 463 III 1548 III 202 II	D S 185 III 0,5 I — 80 II 842 IV 78 I 53 I	D S 398 IV 355 III — 384 IV 2040 V 2153 V 41 II	D S 188 III 33 I — 780 V 1520 IV 619 III 156 III	D S 69 III 185 III — 53 II 282 II 267 III 0,6 I

canescentis R. Tx. ex K. Czyżewska w Polsce
canescentis R. Tx. ex K. Czyżewska in Poland

canescentis R. Tx. ex K. Czyżewska

subass. <i>typicum</i>			subass. <i>cladinetosum mitis</i> R. Tx. (1928) 1937 em. K. Czyżewska			
var. z (with) <i>Hypochoeris</i> <i>radicata</i>	var. z (with) <i>Artemisia</i> <i>campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	var. <i>typicum</i>	var. z (with) <i>Thymus</i> <i>serpyllum</i>	var. <i>typicum</i>	var. z (with) <i>Polytrichum piliferum</i> postać późniejsza (later phase) postać wcześniejsza (earlier phase)	
tab. 6	tab. 7	tab. 8	tab. 9	tab. 10	tab. 11	tab. 12
56	100	96	164	120	82	70
157	177	136	207	122	126	114
119	126	101	131	66	73	61
38	51	35	76	56	53	53
18,8	19,6	13,3	24,7	19,0	19,0	13,1
14,7	13,2	10,1	12,3	6,4	6,1	5,7
4,1	6,4	3,2	12,4	12,6	12,9	7,4
0,0 61,4 21,5	0,4 63,7 27,7	0,1 59,2 13,6	2,2 47,1 58,6	3,9 27,3 75,6	1,4 35,0 68,9	0,7 30,9 46,1
7	8	9	10	11	12	13
D S	D S	D S	D S	D S	D S	D S
248 III	686 IV	1219 V	566 IV	662 V	1153 V	908 V
476 IV	328 II	927 IV	235 III	185 II	216 II	205 II
165 I	17 I	—	10 I	—	27 I	164 I
0,5 I	430 IV	283 III	216 IV	66 II	40 I	14 I
0,3 I	85 I	0,7 I	718 IV	40 I	82 I	7 I
—	45 I	70 I	577 III	326 III	33 I	14 I
0,1 I	33 I	5 I	6 I	0,1 I	—	—

1	2		3		4		5		6	
D subass. <i>cladinetosum mitis</i>										
C <i>Cladina mitis</i>	40	II	2	II	180	III	111	II	57	I
C <i>Coelocaulon aculeatum</i>	135	II	79	II	205	III	155	II	252	III
C <i>Cladonia uncialis</i>	39	I	0,5	I	9	II	6	I	—	
C <i>Cl. cervicornis</i> subsp. <i>verticillata</i>	0,3	I	0,5	I	14	I	13	I	45	I
Ch <i>Corynephorion</i> (Cn)										
<i>Agrostis vinealis</i>	—		—		0,1	I	6	I	10	I
<i>Coelocaulon muricatum</i>	—		—		13	I	—		—	
Ch <i>Thero-Airion</i> (Th)										
<i>Logfia arvensis</i>	—		—		0,2	I	—		10	I
<i>Aira caryophyllea</i>	—		—		0,1	I	—		—	
<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i>	—		—		—		0,2	I	—	
<i>Filago vulgaris</i>	—		—		—		—		—	
Ch, D <i>Corynephoretalia</i> (C)										
<i>Corynephorus canescens</i>	502	V	567	IV	1334	V	1700	V	5291	V
<i>Logfia minima</i>	1	I	—		91	II	70	II	99	III
<i>Ornithopus perpusillus</i>	—		—		0,1	I	23	I	35	I
<i>Carex ligerica</i>	—		—		—		—		—	
D <i>Hypochoeris glabra</i>	—		—		—		—		0,6	I
<i>Polytrichum piliferum</i>	396	IV	357	IV	638	IV	750	IV	400	IV
Ch <i>Armerion</i> (A)										
<i>Herniaria glabra</i>	0,3	I	0,5	I	0,5	I	14	I	0,6	I
<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i>	0,3	I	—		7	I	7	I	0,8	I
<i>Cerastium arvense</i>	—		—		0,4	I	6	I	0,2	I
<i>Silene tatarica</i>	20	I	—		—		13	I	—	
<i>Dianthus deltoides</i>	—		0,5	I	—		—		—	
<i>Vicia lathyroides</i>	—		—		—		—		—	
Ch <i>Koelerion</i> (K)										
<i>Festuca psammophila</i>	2423	V	0,5	I	30	I	0,2	I	—	
<i>Astragalus arenarius</i>	0,7	I	—		14	I	54	I	87	II
<i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>fastigiata</i>	0,7	I	895	III	30	I	6	I	—	
<i>Plantago arenaria</i>	40	II	—		0,5	I	13	I	31	I
<i>Koeleria glauca</i>	—		0,5	I	0,2	I	37	I	41	I
<i>Silene otites</i>	—		—		0,1	I	0,1	I	—	
<i>Tragopogon floccosus</i>	—		—		—		—		—	
<i>Silene lituanica</i>	—		—		—		—		—	
<i>Festuca polesica</i>	—		—		—		—		—	
<i>Silene chlorantha</i>	—		—		—		—		—	
<i>Androsace septentrionalis</i>	—		—		—		—		—	
<i>Dianthus arenarius</i> subsp. <i>borussicus</i>	—		—		—		—		—	

7		8		9		10		11		12		13	
0,1	I	6	I	6	I	1977	V	3700	V	1325	V	410	IV
49	I	103	II	71	II	440	V	638	V	435	V	1429	V
0,1	I	0,2	I	0,1	I	201	IV	988	V	697	V	85	III
31	I	39	II	0,3	I	139	IV	405	V	294	IV	103	III
0,1	I	26	I	5	I	3	I	0,0	I	0,1	I	0,1	I
—		—		0,1	I	10	I	23	I	52	I	7	I
0,1	I	0,2	I	5	I	—		14	I	—		—	
0,1	I	0,1	I	5	I	—		—		—		—	
—		0,3	I	21	I	—		—		—		0,2	I
—		0,1	I	—		—		—		—		—	
4544	V	3117	V	2880	V	2000	V	1846	V	1973	V	2275	V
91	III	96	II	306	III	65	II	42	I	0,4	I	7	I
67	I	—		0,2	I	—		—		—		—	
—		—		—		0,0	I	—		—		—	
—		0,1	I	0,2	I	0,0	I	—		0,1	I	—	
979	IV	1231	V	623	IV	1607	V	1487	V	2436	V	2007	V
0,3	I	0,5	I	0,2	I	0,1	I	—		0,1	I	—	
9	I	0,2	I	—		3	I	—		0,1	I	0,2	I
0,3	I	17	I	—		0,0	I	—		—		—	
—		—		—		0,0	I	—		—		—	
—		—		—		—		—		—		—	
8	I	—		—		—		—		—		—	
0,7	I	5	I	78	I	144	I	0,1	I	0,2	I	32	I
—		18	I	18	I	10	I	0,2	I	0,2	I	—	
—		22	I	0,1	I	48	I	0,0	I	—		—	
—		5	I	0,1	I	3	I	—		0,1	I	—	
—		5	I	0,2	I	20	I	—		0,3	I	—	
—		—		0,1	I	0,1	I	—		—		—	
—		0,4	I	—		0,1	I	—		0,3	I	0,4	I
—		—		—		6	I	0,0	I	—		—	
—		—		—		13	I	—		0,3	I	—	
0,1	I	—		—		—		—		—		—	
—		—		—		0,1	I	—		—		—	
—		—		—		0,0	I	—		—		—	

1	2	3	4	5	6
Ch Festuco-Sedetalia (FS)					
<i>Helichrysum arenarium</i>	0,3 I	—	257 I	211 II	98 II
<i>Festuca trachyphylla</i>	298 I	—	46 I	421 I	—
<i>Acinos arvensis</i>	—	0,5 I	0,1 I	0,1 I	0,4 I
<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>maximum</i>	—	—	0,1 I	0,5 I	0,4 I
<i>S. reflexum</i>	0,3 I	—	—	—	—
<i>Petrorhagia prolifera</i>	—	—	—	0,1 I	—
<i>Trifolium campestre</i>	—	—	—	—	—
Ch Sedo-Scleranthetea (SS)					
<i>Hieracium pilosella</i>	60 III	763 IV	483 IV	393 IV	798 IV
<i>Scleranthus perennis</i>	78 II	30 III	190 III	116 IV	411 IV
<i>Rumex acetosella</i>	81 III	29 II	190 IV	45 IV	278 IV
<i>Jasione montana</i>	21 I	54 II	62 II	121 III	171 III
<i>Cerastium semidecandrum</i>	146 II	237 II	55 II	186 III	0,6 I
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	107 II	1 I	51 II	298 IV	136 III
<i>Festuca ovina</i>	—	3000 V	228 II	119 II	68 II
<i>Rumex tenuifolius</i>	61 III	0,5 I	0,4 I	80 II	—
<i>Myosotis stricta</i>	20 I	—	13 I	27 II	0,2 I
<i>Trifolium arvense</i>	68 I	0,5 I	37 I	61 II	36 I
<i>Sedum sexangulare</i>	1 I	0,5 I	114 I	13 I	0,8 I
<i>S. acre</i>	39 I	1 I	105 II	115 III	38 II
<i>Potentilla argentea</i>	—	1 I	0,8 I	28 II	0,8 I
<i>Veronica verna</i>	—	0,5 I	0,1 I	0,2 I	10 I
<i>Rumex acetosella</i> et <i>tenuifolius</i>	—	—	0,1 I	—	10 I
<i>Jovibarba sobolifera</i> subsp. <i>sobolifera</i>	—	92 I	150 I	0,2 I	—
<i>Festuca guestphalica</i>	—	—	—	23 I	—
<i>Potentilla neglecta</i>	—	—	—	0,1 I	—
<i>Ceratodon purpureus</i>	607 IV	910 V	491 IV	548 V	105 III
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>palamaea</i>	60 II	185 III	103 III	327 III	87 I
<i>Brachythecium albicans</i>	87 I	290 II	27 I	370 III	10 I
Towarzyszące (Accompanying)					
Drzewa i krzewy (Trees and shrubs)					
<i>Pinus sylvestris</i>	b 19 I	1 I	8 I	14 I	1 I
	c 1 I	—	0,5 I	1 I	0,6 I
<i>Quercus robur</i>	b 19 I	0,5 I	0,1 I	—	—
	c —	1 I	0,2 I	0,1 I	0,2 I
<i>Q. petraea</i>	b 0,3 I	—	6 I	0,1 I	—
	c —	—	0,2 I	0,1 I	—
<i>Betula pendula</i>	b —	—	—	0,2 I	—
	c —	—	—	0,1 I	0,4 I
<i>Populus tremula</i>	b 0,3 I	0,5 I	—	6 I	—
	c —	—	0,1 I	0,2 I	—
<i>Pyrus communis</i>	b —	0,5 I	—	—	—
	c 0,3 I	0,5 I	—	—	—

7	8	9	10	11	12	13
615 IV	197 II	5 I	36 II	31 I	0,1 I	8 I
31 I	50 I	5 I	9 I	—	27 I	0,5 I
—	0,1 I	—	0,0 I	—	—	—
0,1 I	0,4 I	—	0,1 I	—	—	—
0,1 I	0,1 I	0,1 I	3 I	—	—	—
0,1 I	—	—	—	—	—	—
0,3 I	—	—	—	—	—	—
922 IV	604 IV	188 III	436 V	32 II	63 II	37 I
136 II	19 III	70 III	101 III	9 I	13 I	8 I
0,3 I	116 IV	148 III	117 IV	36 II	46 III	9 II
222 III	127 III	18 II	72 III	4 I	1 I	1 I
9 I	91 II	37 I	17 I	0,0 I	0,3 I	0,1 I
133 III	200 IV	24 I	81 II	—	12 I	7 I
51 II	33 I	60 I	310 II	55 I	117 II	54 I
—	58 II	232 II	12 I	0,1 I	12 I	22 I
0,1 I	30 I	18 I	0,4 I	0,0 I	0,1 I	—
9 I	18 I	0,2 I	0,3 I	—	—	—
0,5 I	10 I	—	0,5 I	0,0 I	—	—
—	0,8 I	18 I	9 I	—	—	0,1 I
0,8 I	0,5 I	0,2 I	0,2 I	—	—	—
—	0,2 I	5 I	—	—	—	0,2 I
539 IV	5 I	34 I	0,2 I	—	—	103 I
—	—	—	13 I	0,0 I	—	53 I
—	5 I	—	—	—	—	—
—	—	—	0,0 I	—	—	—
253 III	579 IV	543 IV	221 III	46 II	248 III	48 II
76 II	201 II	1 I	216 IV	31 II	244 IV	8 I
31 I	81 II	5 I	4 I	—	0,1 I	0,1 I
0,1 I	31 II	0,9 I	64 II	283 III	97 III	68 I
47 II	6 I	17 I	22 II	14 II	8 II	2 I
—	—	—	0,3 I	0,1 I	0,1 I	—
9 I	0,3 I	0,4 I	0,4 I	0,4 I	0,2 I	0,2 I
0,1 I	—	—	0,0 I	—	0,2 I	—
0,3 I	0,3 I	0,1 I	0,1 I	0,1 I	0,3 I	—
—	0,1 I	—	0,0 I	4 I	0,4 I	7 I
0,3 I	0,1 I	0,3 I	3 I	0,0 I	0,3 I	—
—	0,1 I	—	9 I	—	—	—
—	0,1 I	0,1 I	0,1 I	—	—	—
—	0,1 I	—	—	—	—	—
—	0,1 I	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
<i>Juniperus communis</i>	b —	—	0,8 I	6 I	—
	c —	—	0,5 I	0,2 I	0,6 I
<i>Cytisus scoparius</i>	b —	—	—	0,1 I	—
	c 0,3 I	26 I	0,6 I	0,2 I	—
<i>Chamaecytisus ratisbonensis</i>	b —	26 I	0,2 I	—	—
	c —	—	—	—	—
<i>Rubus sp. div.</i>	c —	—	13 I	—	—

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Quercus rubra* b 1 (0,7 I), 11 (0,2 I); *Picea abies* b 9(0,1 I); *Acer* 8(0,1 I); *Prunus sp. div.* 6(8 I); *P. cerasus* 6(0,1 I); *Frangula alnus* b 1 (0,3 I) *Sambucus racemosa* b 12 (0,1 I);

Ch Festuco-Brometea et Trifolio-Geranietea *

<i>Euphorbia cyparissias</i>	60 III	80 II	38 I	20 I	11 I
<i>Centaurea rhenana</i>	1 I	0,5 I	1 I	1 I	—
<i>Achillea collina</i>	0,3 I	0,5 I	0,1 I	—	0,6 I
<i>Potentilla cinerea</i>	—	1 I	7 I	13 I	0,6 I
* <i>Anthericum ramosum</i>	0,3 I	0,5 I	0,2 I	—	—
<i>Carex caryophylla</i>	0,3 I	—	0,2 I	6 I	—
<i>Poa compressa</i>	—	0,5 I	41 II	20 I	—
<i>Veronica spicata</i>	—	—	0,4 I	0,2 I	0,6 I

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Carlina vulgaris* 2 (0,5 I), 6 (0,3 I); *Scabiosa ochroleuca* 3 (0,1 I), 4 (0,1 I), 6 (0,3 I); *Asparagus officinalis* 4 (0,1 I), 11 (0,2 I); *Phleum phleoides* 5 (0,2 I), 9 (0,1 I); *Ranunculus carthusianorum* 9 (0,0 I).

Ch Molinio-Arrhenatheretea

<i>Achillea millefolium</i>	1 I	—	0,9 I	8 I	58 II
<i>Plantago lanceolata</i>	—	1 I	7 I	0,6 I	0,6 I
<i>Poa pratensis</i>	20 I	1 I	0,4 I	7 I	—
<i>Bromus hordaceus</i>	0,7 I	—	0,1 I	13 I	0,2 I
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. triviale	—	—	0,1 I	0,2 I	—
<i>Leontodon autumnalis</i>	—	—	—	0,1 I	—
<i>Holcus lanatus</i>	—	—	—	—	—
<i>Trifolium repens</i>	—	—	0,4 I	0,2 I	—

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Rumex acetosa* 6 (0, I), 7 (0,2 I); *Lotus corniculatus* 4 (0,1 I);

Ch Nardo-Callunetea

<i>Calluna vulgaris</i>	—	2 II	0,1 I	0,3 I	0,2 I
<i>Luzula campestris</i>	—	1 I	7 I	0,3 I	0,8 I
<i>Danthonia decumbens</i>	—	0,5 I	7 I	0,1 I	—
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	—	—	—	0,1 I	—
<i>Nardus stricta</i>	—	—	—	—	—

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Carex pilulifera* 1 (0,3 I), 9 (0,0 I); *Potentilla erecta* 4 (0,2 I);

Inne (Others)

<i>Agrostis capillaris</i>	38 I	106 II	37 III	137 III	64 III
<i>Hypochoeris radicata</i>	39 I	82 III	45 II	8 I	21 I
<i>Solidago virgaurea</i>	212 II	54 II	0,8 I	0,9 I	0,6 I

7	8	9	10	11	12	13
—	0,1 I	0,1 I	97 II	124 III	31 II	0,4 I
0,1 I	0,1 I	0,1 I	7 I	1 I	0,3 I	0,1 I
—	—	—	0,0 I	—	0,1 I	—
—	0,1 I	0,3 I	0,2 I	—	0,1 I	0,1 I
—	—	—	0,0 I	—	—	—
—	—	—	0,0 I	—	—	—
—	0,3 I	0,4 I	3 I	8 I	—	—

platanoides c 4 (0,1 I), 6 (0,1 I); *Salix* sp. 5 (9 I), 6 (8 I); *Prunus serotina* 6 (0,1 I), 7 (0,1 I); *Larix* sp. 6 (0,1 I), *Rosa rugosa* c 12 (0,1 I).

9 I	0,6 I	0,4 I	4 I	0,0 I	—	0,4 I
40 I	0,5 I	0,2 I	0,4 I	0,0 I	—	0,1 I
—	—	—	0,0 I	—	—	—
—	—	—	0,1 I	—	—	—
—	—	—	0,0 I	0,0 I	—	—
—	—	—	0,0 I	—	—	—
—	0,1 I	—	—	—	—	—
—	—	—	0,0 I	—	—	—

4 (0,1 I); *Anthyllis vulneraria* 4 (0,1 I), 5 (0,2 I); *Verbascum lychnitis* * 4 (0,1 I), 5 (0,6 I); *Centaurea scabiosa bulbosus* 4 (0,1 I); *Sanguisorba minor* 4 (0,1 I); *Viola rupestris* 4 (0,1 I); *Fragaria viridis* * 4 (0,1 I); *Dianthus*

11 II	6 I	7 I	0,9 I	—	0,1 I	7 I
0,8 I	0,1 I	0,2 I	0,0 I	—	—	0,1 I
18 I	0,3 I	5 I	0,1 I	—	—	—
0,1 I	0,2 I	—	—	—	—	—
0,3 I	—	—	0,1 I	0,0 I	—	—
0,1 I	—	—	0,1 I	0,1 I	0,1 I	—
40 I	0,1 I	5 I	—	—	0,1 I	—
0,3 I	—	—	—	—	—	—

Saxifraga granulosa 6 (0,1 I); *Arrhenatherum elatius* 6 (5 I).

0,1 I	0,2 I	0,1 I	0,4 I	4 I	0,7 I	7 I
0,7 I	0,6 I	—	0,9 I	0,1 I	0,2 I	0,1 I
0,1 I	—	0,1 I	3 I	4 I	—	—
—	—	—	3 I	4 I	6 I	—
—	—	—	0,1 I	4 I	0,1 I	—

Luzula multiflora 6 (0,3 I); *Polygala vulgaris* 7 (0,1 I).

800 IV	50 II	141 III	33 II	1 I	1 I	1 I
156 IV	22 II	47 II	13 II	0,5 I	0,7 I	23 II
10 I	10 I	0,2 I	97 I	40 I	0,3 I	0,4 I

1	2		3		4		5		6	
<i>Conyza canadensis</i>	1	I	0,5	I	7	I	15	II	99	II
<i>Carex hirta</i>	0,7	I	52	I	44	I	2	II	31	I
<i>Peucedanum oreoselinum</i>	20	I	92	I	0,4	I	7	I	20	I
<i>Convolvulus arvensis</i>	0,7	I	—	—	0,2	I	7	I	22	II
<i>Festuca rubra</i>	—	—	92	I	8	I	23	I	12	II
<i>Carex ericetorum</i>	—	—	4	III	27	I	0,6	I	11	I
<i>Erophila verna</i>	—	—	1	I	7	I	46	I	21	I
<i>Calamagrostis epigejos</i>	0,3	I	0,5	I	0,2	I	0,1	I	—	—
<i>Viola arvensis</i>	0,7	I	—	—	0,2	I	0,6	I	0,4	I
<i>Hypericum perforatum</i>	1	I	—	—	7	I	7	I	0,6	I
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	—	—	—	—	7	I	0,3	I	11	I
<i>Knautia arvensis</i>	0,3	I	1	I	0,2	I	7	I	2	I
<i>Oenothera biennis</i>	3	II	—	—	—	—	8	I	11	I
<i>Digitaria ischaemum</i>	—	—	—	—	0,1	I	—	—	0,8	I
<i>Equisetum arvense</i>	—	—	—	—	—	—	0,5	I	36	I
<i>Senecio vernalis</i>	—	—	—	—	—	—	0,3	I	1	I
<i>Chondrilla juncea</i>	0,3	I	—	—	0,1	I	—	—	—	—
<i>Agrostis gigantea</i>	—	—	0,5	I	7	I	0,1	I	1	I
<i>Linaria vulgaris</i>	—	—	1	I	0,1	I	0,3	I	10	I
<i>Poa angustifolia</i>	—	—	—	—	23	I	40	I	20	I
<i>Arnoseris minima</i>	—	—	—	—	0,1	I	—	—	—	—
<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	—	—	—	—	—	—	6	I	0,4	I
<i>Bromus tectorum</i>	0,7	I	—	—	0,2	I	0,7	I	0,2	I
<i>Elymus repens</i>	—	—	—	—	0,1	I	0,3	I	56	I
<i>Spergula arvensis</i>	—	—	—	—	0,4	I	0,3	I	36	I
<i>Erigeron acer</i>	—	—	—	—	0,4	I	7	I	1	I
<i>Holcus mollis</i>	—	—	—	—	0,1	I	0,3	I	—	—
<i>Hieracium umbellatum</i>	—	—	—	—	0,1	I	—	—	—	—
<i>Apera spica-venti</i>	—	—	—	—	—	—	0,2	I	0,4	I
<i>Echium vulgare</i>	0,3	I	—	—	—	—	0,1	I	0,2	I
<i>Holosteum umbellatum</i>	—	—	0,5	I	0,1	I	—	—	0,2	I
<i>Viola tricolor</i>	—	—	—	—	0,1	I	—	—	—	—
<i>Erodium cicutarium</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	I
<i>Berteroa incana</i>	0,3	I	—	—	—	—	1	I	—	—
<i>Oenothera rubricaulis</i>	—	—	—	—	0,2	I	0,2	I	0,2	I
<i>Spergularia rubra</i>	—	—	—	—	0,1	I	0,1	I	—	—
<i>Lupinus luteus</i>	—	—	—	—	0,1	I	—	—	0,4	I
<i>Setaria viridis</i>	—	—	—	—	0,1	I	—	—	0,2	I
<i>Digitaria sanguinalis</i>	—	—	—	—	—	—	0,2	I	—	—
<i>Cardaminopsis arenosa</i>	—	—	—	—	—	—	0,3	I	—	—
<i>Deschampsia flexuosa</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	I
<i>Anthoxanthum aristatum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Senecio viscosus</i>	0,7	I	0,5	I	—	—	—	—	—	—
<i>Alyssum alyssoides</i>	0,3	I	—	—	—	—	6	I	—	—
<i>Corispermum hyssopifolium</i>	0,7	I	—	—	—	—	0,1	I	—	—
<i>Viola canina</i>	—	—	1	I	—	—	0,2	I	—	—
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	—	—	52	I	—	—	—	—	—	—
<i>Anthemis arvensis</i>	—	—	—	—	0,1	I	—	—	—	—

7		8		9		10		11		12		13	
11	II	17	II	22	I	13	I	0,4	I	6	I	—	
0,1	I	0,6	I	0,4	I	26	I	0,0	I	—		0,4	I
—		0,5	I	0,1	I	12	I	0,0	I	0,1	I	0,1	I
29	II	7	II	0,3	I	6	I	0,1	I	0,2	I	0,4	I
82	II	1	I	0,8	I	4	I	4	I	—		0,2	I
—		0,3	I	0,1	I	20	II	10	I	6	I	0,5	I
—		100	I	26	I	0,3	I	0,2	I	—		7	I
—		0,3	I	0,2	I	0,1	I	0,0	I	0,1	I	—	
1	I	6	I	5	I	0,4	I	—		—		0,1	I
—		0,9	I	0,3	I	1	I	4	I	—		0,4	I
60	II	6	I	0,6	I	0,2	I	—		0,2	I	7	I
—		0,7	I	0,1	I	0,2	I	—		—		—	
0,3	I	19	I	0,3	I	1	I	—		0,1	I	—	
0,5	I	—		10	I	6	I	0,1	I	0,1	I	0,1	I
1	I	5	I	0,2	I	0,1	I	—		0,2	I	7	I
0,3	I	0,2	I	0,4	I	0,4	I	0,0	I	—		0,1	I
—		0,4	I	—		0,3	I	0,0	I	0,1	I	0,2	I
41	I	5	I	0,1	I	—		—		—		—	
—		0,4	I	0,1	I	9	I	—		—		—	
—		5	I	0,2	I	6	I	—		0,1	I	—	
0,1	I	0,4	I	10	I	0,0	I	—		0,1	I	0,1	I
50	II	5	I	6	I	0,0	I	—		0,1	I	—	
—		—		0,1	I	0,0	I	—		—		—	
0,5	I	0,9	I	0,2	I	—		—		—		—	
10	II	0,2	I	0,2	I	—		—		—		—	
1	I	0,5	I	—		0,2	I	—		—		—	
81	II	—		0,3	I	0,0	I	—		0,1	I	—	
8	I	0,1	I	—		3	I	0,0	I	0,2	I	—	
0,1	I	0,1	I	5	I	0,0	I	—		—		—	
—		0,1	I	—		—		—		0,1	I	—	
—		0,1	I	—		0,0	I	—		—		—	
0,1	I	5	I	—		0,1	I	0,0	I	—		—	
0,1	I	0,2	I	1	I	0,1	I	—		—		—	
—		17	I	—		0,1	I	—		—		—	
—		—		—		—		0,0	I	—		—	
0,3	I	—		0,8	I	—		—		—		—	
1	I	0,2	I	—		—		—		—		—	
31	I	—		—		0,0	I	—		—		—	
18	I	0,1	I	0,1	I	—		—		—		—	
—		—		0,1	I	0,1	I	—		0,3	I	—	
49	I	—		0,2	I	—		—		0,1	I	—	
—		0,1	I	—		—		4	I	0,1	I	0,1	I
—		—		0,2	I	—		—		—		—	
—		—		—		0,1	I	—		—		—	
—		—		—		—		—		0,1	I	—	
—		0,1	I	—		—		—		—		—	
—		—		—		—		0,0	I	0,3	I	—	
0,1	I	—		0,1	I	—		—		—		—	

1	2	3	4	5	6
<i>Pulsatilla pratensis</i>	—	—	0,1 I	—	—
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i>	—	—	—	0,1 I	—
<i>Crepis tectorum</i>	—	—	—	0,5 I	—
<i>Verbascum thapsus</i>	—	—	—	0,1 I	—
<i>Veronica arvensis</i>	—	—	—	—	0,2 I
<i>Chenopodium album</i>	—	—	—	—	0,2 I
<i>Silene vulgaris</i>	—	—	—	—	35 I
<i>Allium vineale</i>	—	—	—	—	—

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Vincetoxicum hirundinaria* 2 (0,5 I), 7 (0,1 I); *Trifolium lupinaster officinalis* 3 (0,1 I), 4 (0,1 I); *Thymus pulegioides* 3 (7 I), 5 (0,2 I); *Galium mollugo* 3 (0,1 I), 9 (0,0 I); *Vicia tetrasperma* 4 (0,6 I), 7 (0,1 I); *Polygonum aviculare* 4 (0,2 I), 8 (0,1 I); *Bilderdykia convolvulus arenarius* 7 (0,1 I), 9 (0,0 I); *Rumex crispus* 8 (0,1 I), 9 (0,0 I); *Verbascum phlomoides* 8 (0,1 I), 9 (0,0 I); *Pteridium aquilinum* 3 (0,1 I); *Arabidopsis thaliana* 3 (0,0 I); *Gypsophila muralis* 3 (0,1 I); *Polycnemum Pimpinella saxifraga* 4 (0,1 I); *Camelina microcarpa* 4 (0,1 I); *Lychnis viscaria* 4 (0,1 I); *Veronica Vicia* sp. 5 (0,2 I); *Salsola kali* subsp. *ruthenica* 5 (10 I); *Veronica chamaedrys* 5 (0,4 I); *Senecio vulgaris Cruciata glabra* 6 (0,1 I); *Potentilla inclinata* 6 (0,1 I); *Senecio jacobaea* 6 (0,1 I); *S. sylvaticus* 6 (0,1 I); *Poa subcrustacea* 6 (0,5 I); *Arabis glabra* 7 (0,2 I); *Verbascum* sp. 7 (0,1 I); *Solidago canadensis* 7 (0,2 I); *Fragaria vesca* 7 (0,1 I); *Antennaria dioica* 8 (0,1 I); *Centaurea cyanus* 8 (0,1 I); *Secale cereale* 8 (0,1 I); *Rhinanthus angustifolius* 9 (0,0 I); *Carex ovalis* 10 (0,1 I); *Saponaria officinalis* 11 (0,1 I); *Epilobium*

<i>Cladonia foliacea</i>	157	III	225	II	75	II	20	I	30	I
<i>Cl. fimbriata</i>	0,3	I	31	III	1	I	34	III	82	I
<i>Cl. glauca</i>	1	I	53	I	7	I	48	II	0,2	I
<i>Cetraria islandica</i>	1	I	28	II	91	II	27	I	41	I
<i>Cladonia phyllophora</i>	0,3	I	79	II	97	I	21	II	—	
<i>Cl. rangiformis</i>	19	I	0,5	I	107	I	92	I	10	I
<i>Cl. subulata</i>	—		27	II	7	I	55	II	31	I
<i>Cl. coniocraea</i>	—		0,5	I	0,2	I	0,2	I	0,2	I
<i>Placynthiella oligotropha</i>	—		0,5	I	7	I	20	I	56	I
<i>P. uliginosa</i>	20	I	—		40	I	142	II	—	
<i>Cladonia pleurota</i>	—		1	I	0,1	I	0,3	I	0,2	I
<i>Cl. chlorophaea</i>	—		0,5	I	6	I	1	I	30	I
<i>Cl. cornuta</i>	—		—		0,1	I	0,2	I	57	I
<i>Trapeliopsis granulosa</i>	0,7	I	92	I	6	I	13	I	—	
<i>Cladonia squamosa</i>	0,3	I	—		0,1	I	0,1	I	11	I
<i>Stereocaulon condensatum</i>	19	I	—		0,1	I	0,2	I	—	
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>pinnata</i>	—		26	I	7	I	8	I	10	I
<i>Cl. pyxidata</i>	—		—		0,1	I	0,1	I	20	I
<i>Cl. bacillaris</i>	—		0,5	I	0,1	I	0,3	I	—	
<i>Cl. sp.</i> , <i>plecha pierwotna</i>	—		0,5	I	—		0,5	I	0,2	I
<i>Cl. gracilis</i>	—		—		0,1	I	0,2	I	—	
<i>Cl. floerkeana</i>	—		—		0,1	I	—		0,2	I
<i>Cladina rangiferina</i>	—		—		—		0,1	I	10	I
<i>Peltigera rufescens</i>	58	I	0,5	I	0,6	I	26	I	—	
<i>Cladonia cariosa</i>	58	II	—		0,2	I	14	I	—	
<i>Cl. furcata</i> var. <i>furcata</i> f. <i>fissa</i>	—		—		0,2	I	30	I	—	
<i>Cetraria ericetorum</i>	—		—		—		19	I	0,2	I
<i>Cladonia coccifera</i>	—		—		—		—		—	
<i>Peltigera spuria</i>	—		26	I	0,2	I	0,6	I	—	

7		8		9		10		11		12		13	
—		—		—		3	I	0,0	I	—		—	
—		0,1	I	0,2	I	—		—		—		—	
—		0,3	I	—		0,1	I	—		—		—	
—		0,1	I	—		0,0	I	—		—		—	
0,3	I	—		—		—		—		—		0,1	I
0,3	I	—		—		—		—		—		0,1	I
—		0,4	I	—		—		—		0,1	I	—	
—		0,2	I	0,1	I	—		—		0,1	I	—	

2 (0,5 I), 9 (0,0 I); *Hieracium lachenalii* 2 (0,5 I), 11 (0,1 I); *Potentilla collina* 3 (0,1 I), 4 (0,1 I); *Veronica Lepidium ruderalis* 4 (0,1 I), 7 (5 I); *Artemisia absinthium* 4 (0,1 I), 7 (0,1 I); *Silene alba* 4 (0,1 I), 7 (0,1 I); 5 (0,2 I), 6 (1 I); *Lepidium densiflorum* 5 (10 I), 6 (0,1 I); *Omalotheca sylvatica* 7 (0,2 I), 8 (0,2 I); *Leymus Melampyrum pratense* 10 (0,0 I), 11 (0,1 I); *Vaccaria pyramidata* 1 (0,3 I); *Scorzonera humilis* 2 (0,5 I); *arvensis* 3 (0,1 I); *Medicago lupulina* 4 (6 I); *Dianthus serotina* 4 (6 I); *Oenothera ammophila* 4 (0,2 I); *triphyllos* 4 (0,1 I); *Allium oleraceum* 5 (0,2 I); *Anchusa officinalis* 5 (0,2 I); *Buglossoides arvensis* 5 (0,2 I); 6 (0,5 I); *Lupinus sp.* 6 (0,1 I); *Aphanes arvensis* 6 (0,1 I); *Centaurea phrygia* subsp. *phrygia* 6 (0,1 I); *Sinapis arvensis* 6 (0,1 I); *Stellaria graminea* 6 (1 I); *Echinochloa crus-galli* 6 (9 I); *Lolium perenne* 6 (0,1 I); *Vicia villosa* 7 (0,2 I); *Euphrasia stricta* 7 (0,1 I); *Vicia hirsuta* 7 (0,1 I); *Polygonum persicaria* 7 (5 I); *Stellaria media* 8 (0,1 I); *Galeopsis sp.* 8 (0,2 I); *Viola riviniana* 9 (0,1 I); *Polygonatum odoratum* 9 (3 I); *angustifolium* 12 (0,1 I).

62	I	15	I	5	I	52	II	42	I	117	II	129	I
0,3	I	54	III	5	I	18	II	2	II	2	II	1	I
71	I	109	II	16	I	70	II	31	II	50	II	23	II
0,1	I	0,3	I	0,2	I	255	III	109	III	40	I	22	I
161	I	29	II	0,1	I	244	IV	211	IV	163	IV	15	II
8	I	0,1	I	—		46	I	0,3	I	27	I	7	I
402	II	410	III	34	I	205	III	150	IV	454	IV	69	II
18	I	17	I	0,1	I	4	I	6	II	6	I	33	I
0,1	I	23	I	5	I	20	I	25	I	19	I	40	I
0,1	I	208	II	151	II	67	II	35	II	115	III	162	II
—		0,7	I	0,3	I	4	I	10	I	55	III	1	I
286	I	0,7	I	—		11	II	10	II	13	I	100	I
0,1	I	10	I	0,3	I	51	I	9	I	35	I	0,2	I
0,1	I	—		—		24	II	67	III	172	IV	16	II
—		0,4	I	—		14	I	0,4	I	41	II	0,4	I
—		0,1	I	0,2	I	52	I	267	II	89	I	271	I
—		0,1	I	0,1	I	0,7	I	0,0	I	21	I	—	
0,1	I	0,3	I	—		12	I	9	I	0,3	I	0,1	I
—		5	I	—		7	I	17	III	34	III	0,8	I
31	I	0,1	I	0,2	I	10	I	—		—		0,1	I
9	I	0,2	I	—		63	II	80	II	82	III	25	I
84	I	5	I	—		10	I	27	II	59	II	158	II
0,1	I	0,1	I	—		17	I	13	I	12	I	0,2	I
—		22	I	—		3	I	0,0	I	—		—	
—		5	I	—		6	I	0,0	I	0,1	I	—	
0,1	I	0,1	I	—		3	I	0,0	I	—		0,1	I
0,1	I	—		—		19	I	9	I	6	I	0,1	I
174	II	0,2	I	0,2	I	3	I	8	I	6	I	14	I
—		5	I	0,1	I	0,0	I	—		—		—	

1	2	3	4	5	6
<i>Cetraria islandica</i> var. <i>sorediata</i>	—	—	30 I	7 I	0,2 I
<i>Diploschistes muscorum</i>	—	—	0,1 I	6 I	—
<i>Cladonia deformis</i>	—	—	0,2 I	0,1 I	—
<i>Cladina arbuscula</i>	—	—	—	—	21 I
<i>Stereocaulon incrustatum</i>	—	—	0,1 I	6 I	—
<i>Peltigera polydactyla</i>	—	0,5 I	—	—	0,2 I
<i>Cladonia scabriuscula</i>	—	—	0,1 I	—	—
<i>Pycnothelia papillaria</i>	—	—	—	—	—
<i>Cladina ciliata</i>	—	—	—	0,1 I	0,2 I
<i>Cetraria ericetorum</i> var. <i>prorumpens</i>	—	—	—	0,1 I	—
<i>Hypogymnia physodes</i>	—	—	—	—	—

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Cladonia cenotea* 2 (0,5 I), 9 (0,1 I); *Cl. pocillum* 3 (0,1 I), 4 (0,1 I); *Peltigera canina* 3 (0,1 I); *Cladonia polycarpoides* 5 (0,4 I); *Buellia punctata* 9 (0,0 I); *Cladonia crispata rufescens* f. *incusa* 9 (0,0 I); *Pseudevernia furfuracea* 9 (0,0 I); *Cladonia grayi* 10 (0,0 I).

<i>Cephaloziella starkei</i>	57 I	0,5 I	0,6 I	43 I	0,6 I
<i>Tortula ruralis</i>	163 I	0,5 I	87 I	158 I	0,8 I
<i>Polytrichum juniperinum</i>	—	1 I	23 I	6 I	—
<i>Bryum argenteum</i>	0,3 I	—	0,1 I	23 I	10 I
<i>Pohlia nutans</i>	—	26 I	0,1 I	0,1 I	—
<i>Bryum caespitium</i>	—	—	0,2 I	13 I	0,6 I
<i>Hypnum cupressiforme</i>	0,3 I	92 I	30 I	14 I	—
<i>Dicranum scoparium</i>	—	304 II	0,1 I	0,2 I	—
<i>Pleurozium schreberi</i>	—	237 II	0,1 I	0,2 I	—
<i>Ptilidium ciliare</i>	—	26 I	—	—	—
<i>Abietinella abietina</i>	—	—	0,1 I	30 I	0,2 I
<i>Dicranum polysetum</i>	—	—	—	0,2 I	—
<i>Barbula</i> sp.	—	—	—	—	10 I

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Brachythecium velutinum* 2 (0,5 I), 9 (0,0 I); *B. curtum* 4 (0,1 I); *Pseudoscleropodium purum* 4 (0,1 I); *Atrichum undulatum* 6 (0,3 I); *Bryum capillare* 9 (0,1 I); *Polytrichum squarrosus* 9 (0,1 I); *Polytrichum commune* 12 (0,1 I).

<i>Algae</i>	—	—	—	—	—
<i>Telephora terrestris</i>	—	—	—	0,1 I	—
<i>Psilocybe montana</i>	—	—	—	—	—

D — Współczynnik pokrycia (Coefficient of cover); S — Stałość (Constancy)

7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	23 I	0,2 I	—	14 I
—	5 I	—	3 I	0,2 I	0,1 I	—
—	—	—	0,4 I	1 I	0,4 I	7 I
—	0,3 I	—	20 I	0,8 I	6 I	7 I
—	—	—	9 I	50 I	0,2 I	—
—	0,1 I	—	0,6 I	—	—	—
—	—	—	—	0,1 I	0,1 I	0,2 I
—	—	—	0,1 I	23 I	0,1 I	0,1 I
—	—	—	—	—	—	0,1 I
—	—	—	0,0 I	4 I	—	—
0,1 I	—	—	0,0 I	0,0 I	—	—

Baeomyces roseus 5 (0,2 I), 9 (0,1 I); *Cladonia macilenta* 8 (0,2 I), 12 (0,5 I); *Cl. digitata* 10 (0,0 I), 11 (0,1 I) 9 (0,2 I); *Cl. turgida* 9 (3 I); *Stereocaulon tomentosum* 9 (3 I); *Cladonia subrangiformis* 9 (0,0 I); *Peltigera*

8 I	32 I	10 I	23 II	13 I	95 II	0,8 I
—	5 I	0,1 I	6 I	0,0 I	0,1 I	0,1 I
350 II	10 I	39 I	3 I	0,1 I	6 I	79 I
—	0,1 I	18 I	6 I	—	0,1 I	0,1 I
18 I	—	5 I	11 I	8 I	13 I	7 I
—	5 I	—	0,6 I	0,0 I	0,2 I	0,1 I
—	5 I	0,1 I	6 I	—	—	—
0,5 I	—	—	9 I	4 I	6 I	—
0,3 I	—	—	11 I	0,2 I	0,3 I	—
—	—	—	3 I	4 I	18 I	—
—	—	—	0,0 I	—	—	—
—	0,1 I	—	0,1 I	—	—	—
—	—	—	10 I	—	—	0,1 I

7 (0,1 I); *Buxbaumia aphylla* 4 (0,1 I), 7 (0,2 I); *Schistidium apocarpum* 5 (0,2 I), 9 (0,0 I); *Bryum sp.* 3 (0,1 I); *formosum* 9 (3 I); *Dicranum spurium* 9 (0,0 I); *Bryum funckii* 9 (3 I); *B. pallens* 9 (0,1 I); *Rhytidiadelphus*

—	32 I	36 I	0,0 I	0,0 I	0,4 I	50 I
—	0,2 I	—	3 I	—	0,1 I	25 I
0,3 I	—	—	—	—	—	0,1 I

Ryc. 3. Porównanie struktury warstwowej, pokrycia oraz średniej liczby gatunków w jednym zdjęciu fitosocjologicznym w syntaksonach *Spargulo-Corynephoretum*

Fig. 3. Comparison of layer structure, coverage and mean numbers of species in a single phytosociological record in *Spargulo-Corynephoretum* syntaxa

A – *Spargulo-Corynephoretum typicum*: 1 – var. *typicum*; 2 – var. z (with) *Artemisia campestris* subsp. *campestris*; 3 – var. z (with) *Hypochoeris radicata*; 4 – postać przejściowa (intermediate form);
 B – *S.-C. thymetosum serpylli*: 1 – var. *typicum*; 2 – var. z (with) *Artemisia campestris* subsp. *campestris*; 3 – var. z (with) *Festuca ovina*; 4 – var. z (with) *F. psammophila*;
 C – *S.-C. cladinetosum mitis*: 1 – var. *typicum*; 2 – var. z (with) *Thymus serpyllum*; var. z (with) *Polytrichum piliferum*; 3 – postać późniejsza (later phase); 4 – postać wcześniejsza (earlier phase)

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna. *Spergulo-Corynephoretum* jest swoistą kombinacją pionierskich terofitów, hemikryptofitów i chamefitów, z których najbardziej znamienne są porosty i mszaki (ryc. 4). Fitocenozy te na znacznych przestrzeniach wykazują dużą jednolitość w swym składzie florystycznym, którą na terenie Polski zapewniają: terofity — *Spergula morisonii*, *Teesdalia nudicaulis* (gatunki charakterystyczne) i *Veronica dillenii* (gatunek wyróżniający odmianę geograficzną subkontynentalną), hemikryptofit — *Corynephorus canescens* oraz chamefity — *Polytrichum piliferum* i *Coelocaulon aculeatum* (ryc. 5). Wymienione gatunki jednocześnie stanowią o specyficznej fizjonomii tych muraw i są dobrym kryterium rozpoznawczym w terenie, zwłaszcza trawa szczotlicza siwa.

Lista gatunkowa zespołu waha się średnio od 13,1 do 24,7 taksonów, w tym na naczyniowe przypada od 5,7 do 16,6 taksonów, a na zarodnikowe — od 3,2 do 12,9 taksonów.

Rozmieszczenie i charakterystyka siedliskowa. *Spergulo-Corynephoretum* jest murawą rozpowszechnioną w całej Polsce niżowej po pogórze, optymalnie rozwijającą się w morskim typie klimatu. Koncentruje się w piaszczytych krajobrazach wydym, pól wydmych, wysoczyzn polodowcowych (sandrów, moren czołowych i dennych), krawędzi i stoków teras wysokich dolin rzecznych, lokalnych wzniesień teras nadzalewowych i in., a ustępuje na gliniastych utworach morenowych, podłożu wapiennym oraz w obniżeniach o wysokim poziomie wody gruntowej. Formy te zbudowane są z luźnych piasków kwarcowych (nigdy z produktów wietrzenia piaskowców, granitów i innych skał krzemianowych) lub rzadziej — słabogliniastych (tab. III). Dominują gleby inicjalne typu A₁/C (ranker) oraz rdzawe (skrytobielicowe) i bielicowe (często jako gleby porolne lub poleśne); mogą to być także gleby brunatne kwaśne wytworzone z piasków luźnych lub słabogliniastych (por. Filipek 1955, Piotrowska i Celiński 1965, Fijałkowski i Górski 1968, Celiński i Balcerkiewicz 1973, Głowacki 1975, Wika 1975, Babczyńska 1978, Endler i Polakowski 1978, Babczyńska-Sendek 1984 i in.).

Zmienność zespołu. Zespół *Spergulo-Corynephoretum* wykazuje w Polsce wyraźną zmienność lokalnosiedliskową i dynamiczną oraz nieco mniej wyraźną zmienność regionalną. Zmienności lokalnosiedliskowej odpowiadają wyróżnione w obrębie trzy podzespoły: *S.-C. typicum*, *S.-C. thymetosum serpyllii* i *S.-C. cladinetosum mitis* z odpowiednimi wariantami (tab. II, IV, VI-VIII). Zróznicowanie wiekowe podzespołów obrazuje zmienność dynamiczną, zaś regionalne — odmiany geograficzne subatlantycka i subkontynentalna (por. tab. IX), co będzie omówione oddzielnie.

Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis typicum subass. nova hoc loco podzespół typowy

Syn. *Weingaertnerietum typicum* Tüxen (1928, Tab. — Załącznik), *Corynephoretum canescentis typicum* Tüxen (1928) 1937 (1937: 55)

Charakterystyka ogólna. Jest to inicjalne stadium murawy szczotlichowej, zawsze luźnej lub bardzo luźnej. Optimum rozwojowe osiągają pionierskie psammofity — terofity, zwłaszcza gatunki charakterystyczne zespołu oraz trawa *Corynephorus canescens*. Żyje relatywnie krótko. Zasiedla nieutrwalone piaski plejstoceny, wydmy i dolinne, zazwyczaj bardzo silnie kwaśne, o niskiej zasobności pokarmowej i niemal wyłącznym pionowym komponencie wymiany. Występuje w całej Polsce, gdzie wykazuje dalszą zmienność lokalnosiedliskową i regionalną.

Typowa struktura i fizjonomia. Podzespół posiada wybitnie dwuwarstwową strukturę pionową (ryc. 3, tab. II, IV), przy czym warstwa zielna kilkakrotnie dominuje nad warstwą porostowo-mszystą. Siewki drzew i krzewów są przeważnie składnikiem warstwy zielnej i w warstwie wyższej rzadko przekraczają 5% pokrycia.

W okresie wegetacyjnym występują aspekty sezonowe — wiosenny i letni. Pierwszy z nich rozpoczyna się masowym kwitnieniem terofitów, zwłaszcza *Spergula morisonii*, a kończy zakwitaniem *Teesdalia nudicaulis*, *Ornithopus perpusillus* oraz bylin, m.in. *Hieracium pilosella*, *Carex arenaria* i *Festuca ovina*. Aspekt letni inicjuje kwitnienie dalszych terofitów i bylin: *Jasione montana*, *Hypochoeris radicata*, *Agrostis capillaris* i in., zaś kończy, w lipcu, kwitnienie *Logfia minima* (najpóźniej rozwijający się i kwitnący terofit), *Corynephorus canescens*, *Artemisia campestris* subsp. *campestris* i *Helichrysum arenarium* (por. Symonides 1974 c, Jankowski 1977, Jackel 1984).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna. W podzespole typowym kwiatowe gatunki charakterystyczne i wyróżniające zespół, związek *Corynephorion* i rząd *Corynephoretalia* osiągają swoje optimum rozwojowe. W poszczególnych fitocenozach zwraca uwagę liczba gatunków tylko nieco mniejsza niż w pozostałych podzespółach. Przeważają taksony naczyniowe nad zarodnikowymi, a wśród roślin zarodnikowych — porosty nad mszakami (tab. II i IV, ryc. 3).

Podzespół typowy pozytywnie charakteryzuje najwyższa frekwencja terofitów (ryc. 4) oraz wyższa niż w innych podzespółach ilościowość pionierskich kserofitów, zwłaszcza *Corynephorus canescens*, *Spergula morisonii* i *Teesdalia nudicaulis* (ryc. 5) — najefektywniej kolonizujących ruchome piaski. Właściwości fitocenotwórcze wykazują także niektóre porosty (*Placynthiella uliginosa*, *Coelocaulon aculeatum*) i mchy (*Polytrichum piliferum*, *Ceratodon purpureus*).

Fitocenozy *Spergulo-Corynephoretum typicum* żyją zwykle dość krótko i są małopowierzchniowe. Najczęściej można je spotkać w sekwencjach przestrzennych z innymi postaciami *Spergulo-Corynephoretum*, z *Diantho-Armerietum*, roślinnością segetalną, borami i uprawami sosnowymi.

Charakterystyka siedliskowa. Występowanie fitocenoz ograniczone jest do stanowisk z nie w pełni utrwalonymi piaskami, suchych i słonecznych, położonych

Ryc. 4. Udział form życiowych Raunkiaera w *Spergulo-Corynephoretum*

Fig. 4. Participation of Raunkiaer's living forms of plants in *Spergulo-Corynephoretum*

T – terofity (terophytes); H – hemikryptofity (hemicryptophytes); G – geofity (geophytes); chamefity (chamaephytes)*; C – zielne (herbaceous chamaephytes); Ch – zdrewniałe (dwarfshrub chamaephytes); L – porosty (lichens chamaephytes); B – mszaki (bryophyta chamaephytes); F – grzyby (fungi chamaephytes); A – glony (algae chamaephytes); M – megafanerofity (megaphanerophytes); N – nanofanerofity (nanophanerophytes)

1–12 – Objasnienia patrz Ryc. 2

1–12 – Explanations see Fig. 2

*Podział chamefitów wg Zarzyckiego (1984)

*Division of chamaephytes according to Zarzycki (1984)

Skład mechaniczny i niektóre właściwości chemiczne gleb w
Mechanical composition and some chemical properties of

Jednostka syntaksonomiczna Syntaxonomic unit	<i>S.-C. thymetosum serpyllii</i>				postać przejściowa (intermediate form)
	var. z (with) <i>Festuca psammophila</i>	var. z (with) <i>Festuca ovina</i>	var. <i>typicum</i>	var. z (with) <i>Artemisia campestris</i>	
Numer tabeli Number of table	tab. 1	tab. 2	tab. 3	tab. 4	tab. 5
Liczba prób glebowych Number of soil samples	2	1	8	8	2
Części szkieletowe (%) Skeleton parts	min. max. 0,0–1,6	0,3	min. max. 0,1–4,2	min. max. 0,0–13,2	min. max. —
Procentowa zawartość części ziemnistych o średnicy w mm — Percentage of earth parts in diameter					
od (from) 1,0 do (to) 0,1	94	91	83–94	71–92	85–91
0,1–0,02	3–5	5	1–12	3–21	3–8
< 0,02	1–3	4	2–5	3–9	5–7
Skład mechaniczny Mechanical composition	pl	pl	pl	psg (pl)	psg
Odczyn powierzchniowej warstwy gleby — pH values of upper horizon of soil					
pH w (in) H ₂ O	5,3–5,5	6,2	4,8–7,7	4,9–6,9	4,5–5,4
KCl	4,6	5,1	3,8–6,7	4,1–6,1	4,6
Kwasowość wymienna Acidity exchange	—	1,80	0,30–2,02	0,52	—
hydrolytyczna hydrolytic	—	0,07	0,00–0,17	0,02	—
Al wymienny exchange	—	0,05	0,00–0,15	0,01	—
Próchnica (%) Humus	0,8	1,0	0,85–2,45	0,55–3,42	—
C org. (%)	0,45	0,57	0,43–1,42	0,31–1,97	—
CaCO ₃ (%)	0,08	0,08	0,00–0,15	0,00–0,12	—
P ₂ O ₅ mg/100 g	0,6	1,5	2,5–6,2	0,4–4,5	—
K ₂ O mg/100 g	2,0	3,5	1,0–4,0	1,7–7,5	—
Mg przyswajalny mg/g available	0,5	2,0	0,5–3,0	0,5–5,5	—
N	—	—	—	—	—
C/N	—	—	—	—	—

pl — piasek luźny (loose sand); psg — piasek słabogliniasty (coarse sandy soil)

polskich fitocenozach *Spergulo morisonii-Corynephorum*
the soil with *Spergulo morisonii-Corynephorum* in Poland

<i>S.-C. typicum</i>			<i>S.-C. cladinetosum mitis</i>			
var. z (with) <i>Hypochoeris</i> <i>radicata</i>	var. z (with) <i>Artemisia</i> <i>campestris</i>	var. <i>typicum</i>	var. z (with) <i>Thymus</i> <i>serpyllum</i>	var. <i>typicum</i>	var. z (with) <i>Polytrichum piliferum</i>	
tab. 6	tab. 7	tab. 8	tab. 9	tab. 10	tab. 11	tab. 12
5	10	13	25	22	4	6
min. max. 1,5—14,5	min. max. 0,0—11,7	min. max. 0,3—19,5	min. max. 0,0—13,0	min. max. 0,0—2,5	min. max. 0,0—3,1	min. max. 0,2—14,9
— mm						
63—91	77—94	83—94	75—95	84—96	85—96	90—95
5—28	2—32	3—14	2—28	1—14	2—10	2—9
8	1—7	1—5	1—7	1—7	1—5	0—4
pl (psg)	pl (psg)	pl (psg)	pl (psg)	pl (psg)	pl	pl
4,9—5,6 4,2—5,1	4,3—5,4 3,9—4,3	4,1—5,6 3,9—4,7	4,5—7,1 3,6—6,4	4,3—6,5 3,5—5,8	4,4—5,0 3,7—4,2	4,3—6,6 3,7—5,6
—	—	1,65—2,17	0,60—3,67	0,75—4,80	—	0,60—1,20
—	—	0,52—0,63	0,04—1,25	0,09—1,28	—	0,07—0,46
—	—	0,50—0,59	0,03—1,21	0,03—1,21	—	0,05—0,44
1,66—5,41	1,0—2,0	0,6—2,6	0,1—2,85	0,45—3,9	0,7—1,75	0,1—1,7
0,52	0,58—1,14	0,34—0,82	0,05—1,65	0,25—2,25	0,39—1,01	0,05—0,98
0,00	0,00	0,00—0,08	0,00—0,14	0,00—0,1	0,00	0,00—0,12
—	3,4—7,0	1,2—5,1	1,1—6,0	0,8—6,7	1,7—4,0	1,1—5,8
—	1,5—5,5	1,0—7,0	1,0—11,0	1,0—9,5	1,0—2,5	1,0—10,5
—	0,5—3,0	0,5—1,5	0,5—2,5	0,5—1,0	0,5—1,0	0,5
0,06	—	0,04	0,05—0,07	0,02—0,09	—	0,008
8,7	—	11,2	10,0	—	—	—

w obrębie wydmy i pól wydmy, wysoczyń polodowcowych i dolin rzecznych, płaskich lub sfalowanych. Płaty podzespołu zajmują przede wszystkim gleby inicjalne o niewykształconym profilu (ranker właściwy), a także rdzawe właściwe lub porolne, wytworzone z piasków luźnych i częściowo słabogliniastych o bardzo małej zawartości części spławialnych (poniżej 6%) oraz częściami ziemistymi ograniczonymi prawie wyłącznie do frakcji piasku (nawet do 94%), co wpływa zarówno na wzrost przepuszczalności gleby, jak też na jej niską zasobność w składniki pokarmowe (por. tab. III, V). Kwasowość wymienna wskazuje na bardzo silnie kwaśny odczyn powierzchniowej warstwy gleby (pH w KCl 4,5), obniżający jeszcze bardziej jej pojemność sorbcyjną.

Użytkowanie typowej murawy szczotlichowej ograniczone jest do zalesienia sosną zwyczajną, choć mogą pozostawać tzw. nieużytkami, na których rozwijają się jałowczyska.

Rozmieszczenie w Polsce. Inicjalne stadium murawy szczotlichowej występuje w całej Polsce (ryc. 6), w odpowiednich siedliskach.

Zmienność podzespołu. W obrębie podzespołu wyróżniono trzy warianty: *S.-C. typicum* var. *typicum*, *S.-C. typicum* var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *S.-C. typicum* var. z *Hypochoeris radicata* oraz postać przejściową między podzespołami *typicum* i *thymetosum serpylli*, która w klasyfikacji numerycznej uzyskuje położenie skrajne (tab. 5) w obrębie podzespołu typowego (patrz ryc. 2, tab. II).

var. *typicum* var. *nova* hoc loco
wariant typowy

Tabela synoptyczna II (tab. 8); tabela analityczna IV, zdj. 1-15; Ryc. 2 (tab. 8), 3 (A1), 4(8), 5(8), 6(1)

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 5(1863) w tab. IV (identyczny z typem podzespołu)

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*, *Spergula morisonii*.

IV st. stał.: *Teesdalia nudicaulis*, *Polytrichum piliferum*, *Ceratodon purpureus*.

Veronica dillenii (III), *Placynthiella uliginosa* (II).

Fitocenozy odmiany typowej inicjują proces zarastania i utrwalania nagich piasków śródlądowych, w których zawsze występują przestrzenie pozbawione roślinności (nawet do 70-80%), a piasek może być łatwo wywiewany. Dobrze wykształcona jest tylko warstwa zielna (ryc. 3), którą cechuje najwyższy udział terofitów (ryc. 4). Znamienna jest także najniższa liczba taksonów w jednym zdjęciu (tab. II, ryc. 3).

Gatunkami budującymi syntakson są *Corynephorus canescens*, *Spergula morisonii* i *Teesdalia nudicaulis*, a także lokalnie *Veronica dillenii*. Gatunki te osiągają najwyższą ilościowość i ekspansywność. W warstwie przyziemnej znaczenie fitocenotwórcze i ilościowe mają trzy gatunki: *Ceratodon purpureus*, *Polytrichum piliferum* i *Placynthiella uliginosa*.

Ryc. 5. Histogramy frekwencji gatunków charakterystycznych i wyróżniających syntaksy *Spergulo-Corynephoretum*

Fig. 5. Histograms of frequencies of characteristic and differentiating species in syntaxa of *Spergulo-Corynephoretum*

Jednostka skali pionowej oznacza 25% frekwencji. Jednostka skali poziomej oznacza stopień ilościowości (wg Braun-Blanquet 1964). 1–12 – Objaśnienia patrz Ryc. 2

The unit of vertical scale denotes 25% of the frequency. The unit of horizontal scale denotes the abundance degree (acc. to Braun-Blanquet 1964). 1–12 – Explanations see Fig. 2

Numer kolejny Successive number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numer zdjęcia * Number of record *	445	341	272	634	1863	211	493	257	642	465	228
Numer kodu komputerowego Number of computer code	218	444	572	878	913	256	398	627	651	791	845
Data Date	1984 07 09	'83 06 30	'83 06 08	'87 06 26	'79 06 21	'83 05 22	'84 07 27	'83 06 07	'87 06 28	'84 07 18	'83 05 25
Ekspozycja Exposure	W	—	SW	S	—	SW	S	S	—	SE	SE
Nachylenie w stopniach Inclination in degrees	6	0	12	0	0	2	6	8	0	0	15
Powierzchnia zdjęcia (m ²) Area of record (m ²)	12	8	12	10	8	14	10	10	5	8	10
Pokrycie warstw (%) Cover of plant layers (%)	b 80 15	+ 60 10	— 70 10	— 70 5	— 50 15	+ 50 20	— 70 10	— 40 20	— 70 30	— 70 25	+ 50 15
Ogólna liczba gatunków w 1. zdjęciu Total number of species in 1. record	17	13	13	20	17	15	17	14	16	12	10
w tym: kwiatowych (incl.): (phanerogams)	13	11	12	17	13	8	12	8	12	9	8
zarodnikowych (cryptogams)	14	2	1	3	4	7	5	6	4	3	2
Ch, D Ass.											
<i>Spergula morisonii</i> Boreau in Duchartre	2.1	1.2	3.2	1.1	1.1	3.3	2.1	2.1	2.1	+2	2.1
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. in Aiton	2.2	1.2	1.2	·	2.2	1.1	2.2	1.2	·	2.2	·
<i>Veronica dillenii</i> Crantz D geogr.	·	2.2	2.2	2.1	1.1	·	·	1.2	+2	+2	1.1
Ch <i>Corynephorion canescentis</i> Klika 1931											
<i>Agrostis vinealis</i> Schreber	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Coelocaulon muricatum</i> (Ach.) Kärnefelt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Ch <i>Thero-Airion</i> R. Tx. 1951 *, <i>Corynephoretalia canescentis</i> Klika 1934 em. Krausch 1962											
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv.	3.2	2.2	2.2	3.3	3.3	2.2	3.2	2.2	3.2	4.4	1.2
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.	1.1	1.2	1.2	2.1	1.1	·	·	·	1.1	+2	2.1
* <i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>polycarpus</i> (L.) Thell. in Schinz et R. Keller	·	·	·	1.2	·	·	1.2	·	·	·	·
<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.	+2	1.2	·	·	1.2	1.2	1.2	+2	2.2	1.2	·
<i>Coelocaulon aculeatum</i> (Schreber) Link	·	·	·	+2	1.2	1.2	·	1.2	+2	·	·
<i>Cladina mitis</i> (Sandst.) Hale et Culb.	·	·	·	·	·	+2	·	·	·	·	·
<i>Cladonia cervicornis</i> Ach.) Flotow subsp. <i>verticillata</i> (Hoffm.) Flotow	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

R. Tx. ex K. Czyżewska subass. *typicum*

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	S t a ł o ś ć
439	421	209	585	13	580	422	244	510	463	567	216	620	384	587	361	550	532	483	
199	208	249	153	74	148	209	621	138	255	422	847	876	773	894	194	95	119	790	
'84 07 06	'84 07 04	'83 05 13	'86 07 31	'73 07 25	'86 07 30	'84 07 04	'83 06 05	'84 07 30	'84 07 13	'85 05 14	'83 05 24	'87 06 26	'84 06 20	'86 08 07	'83 07 29	'84 08 09	'84 08 05	'84 07 21	
—	S	—	W	W	S	—	—	E	S	SW	—	S	SE	S	—	—	SE	S	C o n s t a n c y
0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	4	0	4	10	0	0	0	6	0	
10	12	10	10	25	12	12	12	12	10	10	12	8	8	10	6	8	12	12	
— 80 15	— 60 15	— 50 10	— 80 15	5 70 60	— 50 50	— 70 40	— 80 15	5 60 15	— 80 25	— 60 40	— 60 40	— 70 20	— 50 30	— 75 20	— 70 5	— 70 5	— 50 15	— 70 5	
16	15	14	18	27	18	21	27	15	26	22	15	29	24	22	11	20	24	14	V III IV
10	8	12	13	18	13	11	19	9	16	11	11	17	12	14	10	17	17	11	
6	7	2	5	9	5	10	8	6	10	11	4	12	12	8	1	3	7	3	
1.2 3.2 .	1.2 2.2 .	+	2.1 2.2 .	1.2 .	.	1.2 2.2 .	+	3.3 .	1.2 2.2 .	3.2 .	2.1 .	2.1 2.2 .	.	.	+2 .	+2 2.2 .	1.1 .	2.2 .	
.	1.2 +2	.	.	.	+2 .	.	.	+2 .	.	.	.	.	.	.	.	1.2 .	.	.	I I
2.2 .	3.2 .	2.2 1.1	3.2 .	3.2 .	3.2 .	3.2 .	2.2 1.1	3.2 .	2.2 .	2.2 .	3.2 2.1	3.2 .	3.2 .	3.2 .	3.2 .	2.2 .	3.2 .	3.2 .	
+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	
2.2 .	2.2 +2	.	2.2 .	2.3 .	3.3 .	2.2 .	1.2 +2	1.2 .	2.2 1.2 +2	2.2 1.2 .	3.3 +2	2.2 .	2.2 +2	.	.	1.2 .	1.2 .	1.2 .	
.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	.	.	.	.	.	IV II I I
.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	+2	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ch <i>Armerion elongatae</i> Krausch 1962 *, <i>Koelerion glaucae</i> Volk 1931 **, <i>Festuco-Sedetalia</i> R. Tx. 1951											
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
** <i>Astragalus arenarius</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Thymus serpyllum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hackel) Krajina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
* <i>Herniaria glabra</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
** <i>Festuca psammophila</i> (Hackel ex Čelak.) Fritsch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
** <i>Tragopogon floccosus</i> Waldst. et Kit.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
** <i>Koeleria glauca</i> (Schrader) DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ch *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955 em. Th. Müller 1961

<i>Rumex acetosella</i> L.	1.2	+2	1.2	1.1	+	+	+2	+2	+2	1.2	.
<i>Hieracium pilosella</i> L.	.	.	+2	+2	1.2	.	1.2	.	1.2	+2	+2
<i>Scleranthus perennis</i> L.	+2	1.2	1.2	1.2	1.2	.	.	.	.	.	+2
<i>Jasione montana</i> L.	+2	.	.	+	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	+2
<i>Rumex tenuifolius</i> (Wallr.) A. Löve	1.2	.	.	+	.	.	.	.	.	+2	.
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Festuca ovina</i> L.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.
<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roemer et Schultes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.
<i>Sedum acre</i> L.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Potentilla argentea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Veronica verna</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Trifolium arvense</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Sedum sexangulare</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	2.2	1.2	2.2	+2	2.2	2.3	1.2	2.3	1.2	.	1.2
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrader var. <i>palamaea</i> (Ach.) Nyl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) B.S.G.	.	.	.	+2	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid.	.	.	.	.	.	1.2	.	+2	.	.	.

Towarzyszające (Accompanying)

Drzewa i krzewy (Trees and shrubs)

<i>Pinus sylvestris</i> L.	b	.	+2	.	.	.	+2	.	.	.	.	+2
	c	.	.	.	.	.	.	+3	+2	.	.	.
<i>Quercus robur</i> L.	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Rubus</i> sp. div.	c	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Inne (Others)

<i>Agrostis capillaris</i> L.	+2	.	.	1.2	.	+2	.	.	1.2	.	.
<i>Hypochoeris radicata</i> L.	+2	.	+2	.	+2	+	.	+2	+2	.	.
<i>Oenothera biennis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Hypericum perforatum</i> L.	+2	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	.	+2	+	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Carex hirta</i> L.	.	.	.	+2	.	.	.	.	+2	.	.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

em. Krausch 1962

+2	•	•	+2	2.2	•	•	•	•	•	•	•	+2	+2	2.2	•	1.2	+2	•	II
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	•	+	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	•	•	•	•	•	•	1.2	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	2.2	•	•	•	•	•	•	•	•	1.2	+2	•	I
•	•	•	•	+2	•	•	+2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	I
1.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	•	I

+2	+2	•	1.2	+2	+2	1.1	1.2	+2	1.2	1.2	•	+	+2	1.2	•	•	+2	•	IV
•	+2	+2	2.2	1.3	+2	2.2	1.2	•	1.2	1.2	1.2	1.2	+2	•	•	•	1.2	+2	IV
•	•	+2	•	+2	•	•	•	+2	+2	•	+2	+2	+2	1.2	•	+2	+2	+2	III
•	•	+2	+2	1.2	+	+2	+	•	+2	+2	+	+	•	2.2	+2	•	•	•	III
•	•	•	•	+2	+2	•	+2	+2	1.2	1.2	1.2	•	1.2	1.2	2.2	1.2	+2	+2	III
•	•	•	1.1	•	1.2	+2	+2	+2	•	•	•	•	•	1.2	•	1.2	•	•	II
1.2	•	•	•	1.2	+2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.1	1.2	•	I
•	•	•	2.2	•	•	•	+2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	+2	•	•	+2	•	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	•	I
•	•	•	•	+2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	•	•	•	•	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.2	•	•	•	•	I
+2	•	1.2	1.2	•	•	1.2	2.2	+2	•	1.2	•	+2	+2	2.2	+2	+2	1.2	+2	IV
+2	+2	•	•	1.2	2.2	•	1.2	•	1.2	+2	•	•	•	1.2	•	•	•	•	II
•	•	•	•	1.2	•	•	1.2	•	•	+2	•	•	•	+2	•	•	+2	•	II
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	I

•	•	•	•	1.2	•	+2	•	•	+2	•	+2	•	•	•	•	•	•	•	III
+2	+2	•	•	•	•	•	+2	•	•	•	+2	+2	•	•	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	+2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	I

1.2	+2	1.2	+2	•	+2	+2	•	1.2	+2	•	+2	1.2	•	•	+2	+2	+2	•	III
•	•	+2	1.2	•	+2	+2	+2	+2	+2	•	+2	+2	•	•	•	•	•	•	III
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	•	•	+2	+2	+2	•	+2	+2	I
•	•	•	•	+2	•	•	•	•	•	•	•	+	•	•	•	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	•	•	+2	I
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+2	•	•	•	•	•	•	•	•	I
•	•	•	•	+2	•	•	+	•	•	•	•	+2	•	•	+2	•	•	•	I
•	•	•	•	•	•	•	+2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	I

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Elymus repens</i> (L.) Gouldx	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.
<i>Festuca rubra</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.
<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Scleranthus annuus* L. subsp. *annuus* 1,9; *Agrostis gigantea* Roth 16, 18; *Solidago virgaurea* L. 21, 24; *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench 24 (1.2), 25; *Achillea Anthemidis arvensis* L. 4; *Secale cereale* L. 4; *Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek 7; *Spergularia rubra* (L.) L. 16; *Anthoxanthum odoratum* L. 17; *Euphrasia stricta* D. Wolff ex J. F. Lehm 21; *Calluna vulgaris* (L.)

<i>Placynthiella uliginosa</i> (Schrad.) Coppins et P. James	1.2	.	.	.	.	.	1.2	+2	1.2	2.2	2.2
<i>Cladonia subulata</i> (L.) Wigg.	.	.	.	.	.	+2	.	+2	.	+2	.
<i>Cl. fimbriata</i> (L.) Fr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cl. glauca</i> Flk.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cl. phyllophora</i> Ehrh. ex Hoffm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cl. pleurota</i> (Flk.) Schaerer	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Trapeliopsis granulosa</i> (Hoffm.) Lumbsch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Cephaloziella starkei* (Funck ex Nees) Schiffn. 1 (1.2), 22; *Stereocaulon condensatum* Hoffm. 13, 24; *Algae* 13 (1.2), 24 (1.2); *Cladonia furcata* Huds.) Schrader var. Hedw.) Lindb. 12 (1.2); *Peltigera rufescens* (Weis) Humb. 16; *Buxbaumia aphylla* Hedw. 17; *Cladonia Sprengel* 22; *Cl. cornuta* (L.) Hoffm. 24; *Telephora terrestris* Ehrh. ex Fr. 24; *Diploschistes muscorum*

* Na podstawie badań własnych.

* According to author's data.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych List of localities of phytosociological records

- (445). Wysoczyzna Kaliska. Kalisz – Winiary, woj. kaliskie. Między rekreacyjnym zbiornikiem wodnym a stacją kolejową. Piaski luźne średnioziarniste, szczyt wyniesienia. Nieużytek poleśny ze skupieniami samosiewnej sosny do 15 lat.
- (341). Równina Łowicko – Błońska. Okolice Jamna, gm. Łowicz, woj. skierniewickie. Piaski glacyfluwialne. Szczyt zwirowego pagórka w pobliżu stacji benzynowej. Nieużytek porolny zalesiony 5-letnią sosną i sąsiadujący z 10-letnią monokulturą sosnową.
- (272). Równina Radomska. Między Odrzywółem a Klwowem, gm. Odrzywół, woj. radomskie. Glacyfluwialne piaski zwirowe luźne z wkładkami wapieni. Nieużytek porolny (3-letni) między uprawą żyta, 15-letnią monokulturą sosnową a szosą do Klwowa.
- (634). Równina Bielska. Jelonka, gm. Dubicze Cerkiewne, woj. białostockie. Piaski glacyfluwialne; 2-letni nieużytek porolny.
- (1863). Kotlina Szczercowska. Między wsiami Górka a Opalańka, gm. Kluki, woj. piotrkowskie. Lokalne wzniesienie rozwiewanych piasków luźnych drobnoziarnistych. Skraj 10 – 15-letniej monokultury sosnowej otoczony uprawą żyta. Typ nomenklatoryczny.
- (211). Wysoczyzna Łaska. Między Aleksandrowem a Rąbieniem, gm. Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie. Piaski cieliczne. Nasada wału wydymowego przy ogrodzeniu stadionu. Teren poleśny ze zdartą pokrywą roślinną.
- (493). Równina Opolska. Mańczok, gm. Murów, woj. opolskie. Rozkopane piaski zwirowe. Skraj 9-letniej monokultury sosnowej z modrzewiem i samosiewnymi dębami.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	I
.	.	.	+2	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	I

5,28; *Poa angustifolia* L. 10, 16; *Viola arvensis* Murray 14, 25; *Arnoseris minima* (L.) Schweigger et Koerte *millefolium* L. 26, 27; *Lepidium ruderalis* L. 29, 30 (1.2); *Holcus lanatus* L. 1; *Centaurea cyanus* L. 3; J. et C. Presl 9; *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton 14 (1.2); *Allium vineale* L. 14; *Verbascum thapsus* Hull 28; *Linaria vulgaris* Miller 28; *Berteroa incana* (L.) DC. 29; *Euphorbia cyparissias* L. 30.

1.2	1.2	1.2	.	+2	.	+2	.	2.2	.	+2	1.2	1.2	1.2	.	.	.	.	.	III
.	.	.	.	3.3	1.2	+2	+2	+2	+2	2.2	.	+2	+2	+2	.	.	.	.	III
.	.	.	+2	1.2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	.	+2	.	+2	.	.	.	.	II
+2	.	.	.	.	.	1.2	.	.	1.2	+2	.	+2	+2	2.2	.	.	+2	.	II
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	+2	.	+2	.	.	.	+2	.	I
.	.	.	.	.	.	+2	.	+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	.	.	.	+2	.	I

Peltigera spuria (Ach.) DC. 5, 25; *Cladonia furcata* (Huds.) Schrader var. *pinnata* (Flk.) Vain. 6, 26; *furcata* 15, 19; *Polytrichum juniperinum* 16 (+3), 18; *Hypnum cupressiforme* Hedw. 7; *Pohlia nutans bacillaris* auct. 18; *Cl. floerkeana* (Fr.) Flk. 18; *Cladonia rangiformis* Hoffm. 21; *Cl. cariosa* (Ach.) (Scop.) R. Sant. 25; *Tortula ruralis* (Hedw.) Gaertn. 26.

- 8 (257). Równina Piotrkowska. Teofilów k. Spały, gm. Inowłódz, woj. piotrkowskie. Skraj terasy nadzalewowej doliny Pilicy. Rozwiewane piaski luźne aluwialne sąsiadujące z łąkami i *Dianthus-Armerietum*.
- 9 (642). Wysoczyzna Siedlecka. Okolice wsi Krzymosze, blisko stacji kolejowej, gm. Mordy, woj. siedleckie. Piaski eoliczne między uprawą żyta a 10-letnią monokulturą sosnową.
- 10 (465). Równina Biłgorajska. Porytowe Wzgórze koło Flisów, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie. Piaski eoliczne w sąsiedztwie Partyzanckiego Parku Pamięci Narodowej.
- 11 (228). Wysoczyzna Białostocka. Okolice NE Bagnówki koło Białegostoku, woj. białostockie. Piaski żwirowe. Pagór morenowy ze śladami erozji wodnej. Nieużytek porolny zalesiony 8-letnią sosną.
- 12 (439). Wzniesienia Gubińskie. Okolice Gębic, gm. Gubin, woj. zielonogórskie. Piaski żwirowe w pobliżu rzeki Lubszy. Brzeg 5-letniej monokultury sosnowej. Pojedyncze 4-letnie samosiewne sosny.
- 13 (421). Bory Dolnośląskie. Około 7 km na S od Żagania, gm. Żagań, woj. zielonogórskie. Piaski żwirowe. Szczyt wzniesienia. W pobliżu 27-letniej monokultury sosnowej z *Calluna vulgaris*.
- 14 (209). Kotlina Sieradzka. Na S od Kolonii Borzewisko w kierunku Bobrownik, gm. Sieradz, woj. sieradzkie. Piaski aluwialne. Nieużytek porolny na terasie nadzalewowej w dolinie Warty. Porzucona bardzo płytka piaszczysta między wałem przeciwpowodziowym a polami żyta.
- 15 (585). Pojezierze Łagowskie. Między Sieniawą a Żelechowem, gm. Łągów Lubuski, woj. zielonogórskie. Nadleśnictwo Żelechów, oddział 61. Glacifluwalne piaski żwirowe z glazkami. Pagór morenowy. Skraj 70-letniej monokultury sosnowej sąsiadujący z uprawą rzepaku.
- 16 (13). Bory Tucholskie. Mrowiniec, gm. Tuchola, woj. bydgoskie. Nieużytek porolny zarastający 6-letnią samosiewną sosną. Między drogą a lasem w pobliżu Brdy.

- 17 (580). Pojezierze Łagowskie. Między stacją kolejową Gronów a rezerwatem „Pawski Ług”, gm. Łagów Lubuski, woj. zielonogórskie. Piaski aluwialne na terasie wysokiej rzeczki Łagowa, w pobliżu leśniczówki.
- 18 (422). Bory Dolnośląskie. Około 2,5 km na S od Żagania, gm. Żagań, woj. zielonogórskie. Piaski aluwialne w dolinie rzeki Bóbr. Nieużytek porolny koło przejazdu kolejowego linii Szprotawa-Żagań.
- 19 (244). Wzniesienia Łódzkie. Łódź-Rogi, woj. łódzkie. Piaski glacyfluwialne. 20-letni nieużytek porolny wykorzystywany jako miejsce rekreacyjne, zarastający żarnowcami, brzozą, sosną, dębem i robinią.
- 20 (510). Kotlina Płocka. Między Janteklą a Włocławkiem, woj. włocławskie. Piaski luźne. Nieużytek porolny zarastający 3–4-letnią spontaniczną sosną; otoczony 20–25-letnią monokulturą sosnową.
- 21 (463). Wysoczyzna Łaska. Kolumna, gm. Łask, woj. sieradzkie. Piaski luźne gruboziarniste między torami kolejowymi a 10-letnią monokulturą sosnową. Pojedyncze 5–10-letnią samosiewne sosny i żarnowce.
- 22 (567). Równina Kurpiowska. Na NE od Dębnik, gm. Zbójna, woj. łomżyńskie. Piaski luźne drobnoziarniste. Wyniesienie między polem a lasem. Nieużytek porolny zarastający 1–10-letnimi sosnami. Typ nomenklatoryczny.
- 23 (216). Wysoczyzna Białostocka. Na E od Białegostoku i wsi Bagnówka, woj. białostockie. Glacyfluwialne piaski żwirowe z gładzikami. Nieużytek porolny zarastający spontaniczną 2–18-letnią sosną sąsiadujący z uprawą żyta.
- 24 (620). Równina Bielska. Kleszczele – Piaski, gm. Kleszczele, woj. białostockie. Piaski eoliczne luźne, zarastające samosiewną brzozą, jałowcami i 3–7-letnią sosną.
- 25 (384). Kotlina Biebrzańska. Rezerwat „Grzędy”, nadleśnictwo Rajgród, gm. Rajgród, woj. łomżyńskie. Piaski eoliczne. Stok wału wydмовego nieużytkowanego od 50 lat, bez siewek oraz podrostów drzew i krzewów; ślady rowów wojennych.
- 26 (587). Równina Łęczyńsko-Włodawska. Włodawa – stacja kolejowa, gm. Włodawa, woj. chełmskie. Piaski luźne drobnoziarniste bez warstwy próchnicznej, rozwiewane. Nieużytek porolny.
- 27 (361). Pojezierze Kujawskie. Okolice Przydatków Gołaszewskich w kierunku Kowala, gm. Kowal, woj. włocławskie. Piaski eoliczne. Piaszkownia w pobliżu dużego kompleksu leśnego. Między żytem a 15-letnią monokulturą sosnową.
- 28 (550). Kotlina Gorzowska. Okolice Miałów, gm. Wieleń, woj. pilskie. Na N w kierunku Krzyża. Przeorane piaski glacyfluwialne gruboziarniste. Między 25-letnią monokulturą sosnową z *Calluna vulgaris* a linią kolejową. Fragmenty murawy z *Dianthus carthusianorum*.
- 29 (532). Kotlina Toruńska. Otłoczyn – stacja kolejowa, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie. Piaski eoliczne drobnoziarniste, gleba inicjalna o niewykształconym profilu. Brzeg wydmy z pojedynczymi samosiewnymi 7–10-letnimi sosnami. W kompleksie z *Festuco-Koelerietum glaucae*.
- 30 (483). Równina Biłgorajska. Zaklików, tuż przed osadą, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Rozwiane piaski eoliczne średnio- i gruboziarniste. W kompleksie z inicjalnymi fazami *Festuco-Koelerietum glaucae*.

Ryc. 6. Rozmieszczenie *Spergulo-Corynephorum typicum* w Polsce

Fig. 6. Distribution of *Spergulo-Corynephorum typicum* in Poland

1 — var. *typicum*; 2 — var. z (with) *Artemisia campestris* subsp. *campestris*; 3 — var. z (with) *Hypochoeris radicata*; 4 — postać przejściowa (intermediate form)

Fitocenozy odmiany typowej tylko wyjątkowo zajmują duże powierzchnie, jak pod Zaklikowem na Równinie Biłgorajskiej; są zwykle małopowierzchniowe i przeważnie rozwijają się w wyniku sukcesji wtórnej, na siedliskach porolnych i poleśnych. Są również krótkotrwałe. Stanowiska te są zawsze otwarte, silnie nasłonecznione, płaskie lub sfalowane, o różnym nachyleniu (od 0 do 28°) i wystawie południowej, zachodniej, południowo-zachodniej lub południowo-wschodniej.

Gleby zajmowane przez płaty odmiany typowej zaliczane są prawie w całości do gleb inicjalnych (ranker), czasami do rdzawych porolnych wytworzonych z piasków luźnych (rzadko z piasków słabogliniastych) eolicznych, plejstocénskich piasków zwirowych lub żwirów oraz piasków rzecznych. Są one ubogie w składniki pokarmowe, prawie bez części splawialnych i frakcji pyłu w częściach ziemistych (por. tab. III, V). Dominuje frakcja piasku średniego i drobnego, często z domieszką części szkieletowych. Kwasowość wymienna wskazuje, że są to gleby o odczynie bardzo silnie kwaśnym w warstwie powierzchniowej, mianowicie pH w KCl wynosi poniżej 4,5 i tylko nieco podwyższa się w głębszych warstwach profilu glebowego (por. Endler i Polakowski 1978, profil 32; Głowacki 1975, profile II, IV), choć może też nieco spadać (por. Wika 1975, profil III). Niska jest także kwasowość czynna, pH w H₂O < 5,0. Piaski te są bezwapienne, czasami tylko ze śladową zawartością CaCO₃ (poniżej 0,1%). Zawartość próchnicy waha się od 0,6 do 2,6% a jej warstwa jest płytka. Niska jest także zasobność, zwłaszcza w przyswajalny Mg, P, K i N, gromadzące się zwykle w najdrobniejszych frakcjach części splawialnych, których prawie brak.

Rozmieszczenie w Polsce. Wariant typowy występuje w całej Polsce (ryc. 6). Częściej spotykano go w Polsce Środkowej, zwłaszcza w obszarze Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, na pojezierzach, w Borach Dolnośląskich, na Równinie Opolskiej.

Powiązania fitosocjologiczne. Na podstawie klasyfikacji numerycznej do wariantu typowego zostały wcielone niektóre materiały publikowane Endlera i Polakowskiego (1978): zdj. 22, 32, 45, 48 (z tab. 1 określonej przez autorów jako *Spergulo-Coryneporetum typicum*), zdj. 3 (z tab. 2 S.-C. [*cladonietosum*]); Głowackiego (1975): zdj. 1-3 (z tab. 1. S.-C. *typicum* var. typowy, a zdj. 4-7 var. chrobotkowy), zdj. 16, 20, 21 (z tab. 1 S.-C. *festucetosum psammophilae* var. typowy, a zdj. 22 var. chrobotkowy), zdj. 25-31 (z tab. 1 S.-C. *filaginetosum minimae* var. typowy, a zdj. 32 var. z *Erophila verna*); Kobendzy (1930): zdj. 16 (z tab. 7 *Coryneporetum typicum*); Kornasia (1957): zdj. 4 (z tab. 1 *Coryneporetum*, stadium początkowe); Libberta (1933): zdj. 1, 2, 5 (z tab. 21 *Coryneporetum typicum*, faza inicjalna), zdj. 6 — (faza optymalna); Wiki (1975): zdj. 19, 20 (z tab. 5 *Spergulo-Coryneporetum typicum* var. typowy, a zdj. 63 var. chrobotkowy), zdj. 64 (z tab. 5 S.-C. *festucetosum ovinae* var. typowy, a zdj. 33 var. chrobotkowy podwar. z *Cladonia cervicornis* subsp. *verticillata*, zaś zdj. 7 podwar. typowy). Maszynopisy — Babczyńskiej-Sendek (1984): zdj. 127, 218 (z tab. 50 S.-C. var. typowy); Jankowskiego (1977): zdj. 29 (z tab. 4 S.-C. *festucetosum psammophilae*).

var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. *nova* hoc loco
wariant z bylicą pełną

Tabela synoptyczna II (tab. 7); tabela analityczna IV, zdj. 16-30; Ryc. 2 (tab. 7), 3(A2), 4(7), 5(7), 6(2)

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*, *Polytrichum piliferum*.

IV st. stał.: *Spergula morisonii*, *Veronica dillenii*, *Hieracium pilosella*, *Rumex acetosella*, *Ceratodon purpureus*, *Artemisia campestris* subsp. *campestris*.

Cladonia subulata (III), *Teesdalia nudicaulis* (II), *Carex arenaria* (I).

Wariant z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* rozwija się natychmiast po krótkotrwałym wariacie typowym, ale w określonych warunkach siedliskowych. Jest to już zbiorowisko wyraźnie dwuwarstwowe, bardziej zwarte (ryc. 3), gdzie warstwa zielna dominuje nad warstwą porostowo-mszystą; również częściej mogą pojawiać się spontaniczne siewki oraz podrosty drzew i krzewów, zwłaszcza sosen (od 2 do 8(12)-letnich). Wzrasta liczba gatunków w jednym zdjęciu.

Ogólnemu wzrostowi liczby taksonów towarzyszy minimalne obniżenie udziału terofitów (do 24%) i hemikryptofitów (do 27,9%) przy jednoczesnym wzroście chamefitów-porostów (do 20,1%), które są tutaj wyraźnymi edyfikatorami (por. ryc. 4). Obniża się nieznacznie frekwencja (ale nie ilościowość) *Spergula morisonii* (do 73%), natomiast w Polsce Środkowej oraz Wschodniej wyraźniej spada frekwencja *Teesdalia nudicaulis* (do 36%) (ryc. 5). Znamienny jest wzrost frekwencji *Veronica dillenii* (do 79%), która w tym wariacie może nierzadko dominować nad gatunkami charakterystycznym (por. ryc. 5).

Gatunkami wyróżniającymi wariant jest chamefit *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, której często towarzyszy *Helichrysum arenarium*, co rzutuje na swoistą fizjonomię płatów. Gatunkiem wyróżniającym jest także *Cladonia subulata*, której towarzyszą *Cl. glauca* (mogą wymieniać się) i *Cl. fimbriata* oraz inne porosty wytwarzające obficie soredia, głównie na plechach wtórnych, podecjach. Częste i obfite występowanie *Cl. subulata* i *Cl. glauca* jest najbardziej charakterystyczne dla fitocenoz powstających na siedliskach porolnych, które w tym wariacie przeważają, co podkreśla również wyjątkowo liczna grupa chwastów segetalnych — pozostałość po poprzednim użytkowaniu. W warstwie przyziemnej jako edyfikatory w dalszym ciągu utrzymują się *Polytrichum piliferum* i *Ceratodon purpureus*.

Zbiorowisko wykształca się przeważnie w wyniku sukcesji wtórnej, na glebach porolnych (najczęściej) lub poleśnych, w obszarach płaskich lub pagórkowatych (do 40° nachylenia zboczy) i bardzo różnej wystawie. Gleby powstają z piasków gruboziarnistych, piasków żwirowych i żwirów glacifluwalnych, raczej grubo- i średnioziarnistych piasków wydmowych oraz rzecznych i są to rankery lub rdzawe właściwe i porolne (por. Endler i Polakowski 1978, profile 2, 12, 27), wytworzone z piasków luźnych, luźnych pylastych, czasami z piasków słabogliniastych, bezwapiennych (tab. III, V). Cechą charakterystyczną zasiedlanych gleb jest wyższa niż w innych wariantach zawartość frakcji pyłu, zwłaszcza grubego (nawet do 30%), ale przy powtarzającej się obniżonej zawartości części spławialnych. Są to przy tym gleby o odczynie silnie kwaśnym w warstwie powierzchniowej (pH w KCl do 4,3, pH w H₂O do 4,9), z nieco korzystniejszą wykształconą warstwą humusową i zasobnością składników pokarmowych.

Skład mechaniczny i niektóre właściwości chemiczne gleb w
Mechanical composition and some chemical properties of the soil

Numer tabeli Number of table Jednostka syntaksonomiczna Syntaxonomic unit	Nr zdj. fs. No phyt. record	Głębokość Depth cm	Części szkieletowe Skeleton parts %	Procentowa zawartość części ziemistych o średnicy w mm Percentage of earth parts in diameter — mm		
				1,0—0,1	0,1—0,02	< 0,02
Tab. II (8.7) <i>S.-C. typicum</i>	341	0—10	6,0	86	8	6
var. <i>typicum</i>	1863	0—10	0,1	94	3	3
	211	1—10	0,3	94	3	3
	465	0—10	0,2	90	5	5
	228	0—10	0,6	89	7	4
	209	0—10	0,6	94	4	2
var. z (with)	244	0—10	1,1	83	12	5
<i>Artemisia campestris</i>	567	0—10	0,0	84	13	3
subsp. <i>campestris</i>	216	0—10	0,4	82	13	5
	361	0—10	0,0	79	18	3
Tab. II (3, 4)	301	0—10	3,8	88	8	4
<i>S.-C. thymetosum</i>	2029	5—0	0,1	91	5	4
var. <i>typicum</i>	709	1—10	0,2	92	4	4
var. z (with)	604	0—10	0,0	90	7	3
	297	0—10	6,6	85	9	6
<i>Artemisia campestris</i>						
subsp. <i>campestris</i>						
Tab. II (10, 11)	354	0—10	0,5	91	6	3
<i>S.-C. cladinetosum</i>	1901	0—5	0,4	91	4	5
var. <i>typicum</i>	238	0—10	1,0	84	9	7
	273	0—10	2,5	90	6	4
	2056	0—10	0,3	90	6	4
	2257	0—10	0,5	91	5	4
	595	0—10	1,0	90	6	4
var. z (with)	349	0—10	0,2	96	2	2
<i>Polytrichum piliferum</i>						

wybranych płatach *Spergulo morisonii-Corynephorum*
 on chosen of patches *Spergulo morisonii-Corynephorum*

Skład mechaniczny Mechanical composition	pH		Próchnica Humus	C org.	CaCO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg przyswajalny Available
	H ₂ O	KCl	%			mg/100 g		
piasek słabogliniasty coarse sandy soil	4,4	4,1	1,42	0,82	0,0	3,4	3,5	1,0
piasek luźny loose sand	5,0	4,2	1,05	0,60	0,08	4,0	1,2	0,5
„	4,9	4,3	0,6	0,34	0,0	2,6	1,0	0,5
„	5,1	4,0	2,6	1,51	0,0	2,1	7,0	1,5
„	4,8	4,1	0,9	0,52	0,0	4,1	2,0	0,5
„	4,9	3,9	0,95	0,55	0,0	1,7	1,5	0,5
„	4,9	4,1	2,0	1,16	0,0	3,4	2,0	1,0
„	4,6	4,0	1,95	1,14	0,0	4,2	3,0	0,5
„	4,7	4,1	1,0	0,58	0,0	4,5	1,5	0,5
„	5,2	4,1	1,15	0,67	0,0	7,0	5,5	1,0
„	6,1	5,3	0,77	0,43	0,12	2,8	2,0	0,5
„	5,7	4,6	1,05	0,60	0,10	4,6	2,5	1,0
„	5,3	4,1	0,75	0,43	0,08	6,0	1,0	0,5
„	5,2	4,3	1,6	0,92	0,0	0,4	4,0	4,0
piasek słabogliniasty coarse sandy soil	5,7	4,9	1,05	0,61	0,12	1,1	2,5	1,0
piasek luźny loose sand	4,6	4,1	0,7	0,39	0,0	2,7	1,5	0,5
„	5,3	4,4	0,75	0,43	0,08	3,6	1,5	1,0
piasek słabogliniasty coarse sandy soil	4,3	3,5	3,9	2,25	0,0	1,5	4,5	1,0
piasek luźny	4,5	3,8	1,7	0,98	0,0	2,7	2,5	0,5
„	4,6	3,9	1,55	0,89	0,0	4,1	5,0	0,5
„	4,7	3,9	1,35	0,78	0,0	4,3	9,5	0,5
„	4,7	3,8	1,4	0,81	0,0	3,1	4,5	0,5
„	4,5	4,2	0,85	0,48	0,0	1,7	1,0	1,0

Rozmieszczenie w Polsce. Występuje w całej Polsce (ryc. 6). Jest częsty w obszarach młodoglacjalnych, w pozostałych bardziej preferuje piaski żwirowe, gruboziarniste piaski wydmore i rzeczne lub zwiększony wpływ klimatu subkontynentalnego.

Powiązania fitosocjologiczne. Do wariantu z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* zostały włączone niektóre materiały publikowane z Polski, np. Babczyńskiej (1978): zdj. 106, 108 (z tab. 9 zaliczonej do *Spergulo-Corynephoretum*); Celińskiego i Balcerkiewicza (1973): zdj. 22 (z tab. 1 S.-C. *festucetosum psammophilae*); Cieślińskiego (1979): zdj. 207 (z tab. 3 S.-C. var. typowy); Endlera i Polakowskiego (1978): zdj. 1, 2, 17, 18, 31, 44, 47 (z tab. 1 S.-C. *typicum*), zdj. 12, 15, 27, 28 (z tab. 2 S.-C. [cladonietosum]); Głowackiego (1975): zdj. 8 (z tab. 1 S.-C. *typicum* var. chrobotkowy), zdj. 33-35 (z tab. 1 S.-C. *filaginetosum minimae* var. z *Erophila*); Juraszek (1928): zdj. 5 (z tab. 9 *Procorynephoretum*); Piotrowskiej i Celińskiego (1965): zdj. 18 (z tab. 10 *Corynephoretum*). Maszynopisy — Babczyńskiej-Sendek (1984): zdj. 670 (z tab. 50 S.-C. var. chrobotkowy podwar. typowy); Jankowskiego (1977): zdj. 28 (z tab. 4 S.-C. *festucetosum psammophilae*).

var. z *Hypochoeris radicata* K. Czyżewska in Wika 1975 var. nova
wariant z prosienicznikiem szorstkim

Tabela synoptyczna II (tab. 6); Ryc. 2 (tab. 6), 3(A3), 4(6), 5(6), 6(3).

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 26(4) w Tab. 5 in Wika (1975, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wyd. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol., 40) lectotypus hoc loco

D: *Hypochoeris radicata*, *Agrostis capillaris*, *Jasione montana*, *Helichrysum arenarium*, *Polytrichum juniperinum*

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*.

IV st. stał.: *Teesdalia nudicaulis*, *Polytrichum piliferum*, *Helichrysum arenarium*, *Hieracium pilosella*, *Agrostis capillaris*, *Hypochoeris radicata*, *Rumex acetosella* et *tenuifolius*.

Spergula morisonii (III), *Jasione montana* (III), *Artemisia campestris* subsp. *campestris* (III), *Polytrichum juniperinum* (II), *Cladonia subulata* (II), *Carex arenaria* (I), *Veronica dillenii* (I).

Omawiany wariant jest starszy od wariantu typowego, o czym świadczy dobrze rozwinięta struktura przestrzenna, choć wypełnienie przestrzeni nigdy nie jest całkowite. Struktura pionowa jest bardzo wyraźnie dwuwarstwowa, z przewagą przestrzenną warstwy zielnej nad porostowo-mszystą (por. ryc. 3). Pionierski charakter syntaksonu podkreśla wysoki udział terofitów (25,5%) przy jednoczesnym najwyższym udziale hemikryptofitów (32,9%), zwłaszcza traw (obok *Corynephorus canescens*: *Agrostis* sp. div., *Festuca* sp. div., *Aira*, *Holcus* i in.) (tab. II, ryc. 4). Z gatunków charakterystycznych częściej i obficie może występować *Teesdalia nudicaulis* niż *Spergula morisonii* (por. ryc. 5). Znamienna jest częstsza obecność *Carex arenaria* (z pokryciem do 50% powierzchni) i innych gatunków wyraźnie subatlantyckich ze związku *Corynephorion* i rzędu *Corynephoretalia*, zaś sporadyczne uczestnictwo subkontynentalnej *Veronica dillenii* i innych taksonów o podobnych właściwościach.

Specyficzną fizjonomię nadają gatunki wyróżniające wariant, które osiągają tutaj swoje optimum fitosocjologiczno-ekologiczne i czasami mogą występować facjalnie (por. tab. II, także ryc. 5). W warstwie przyziemnej charakterystyczne jest występowanie *Polytrichum juniperinum*, który ilościowo może być uzupełniany lub wymieniany przez *P. piliferum* (wówczas osiągającego do 75% pokrycia). Występowanie tych gatunków, nierzadko facjalnie, zwłaszcza *P. juniperinum*, jest możliwe dzięki mniejszej przepuszczalności podłoża i uwarunkowaniom klimatycznym. Syntakson wyróżnia także zwiększony udział porostów *Cladonia coccifera* i *Cl. floerkeana* z grupy *cocciferae* (z czerwonymi owocnikami), preferujących obszary o wyraźniejszych cechach subatlantyckich. W części fitocenoz, zwłaszcza z Wolina i Puszczy Bukowej pod Szczecinem, znaczący jest udział *Cl. subulata* (?).

Fitocenozy porastają obszary płaskie lub sfalowane (o nachyleniu do 10°), o różnej wystawie. Są to głównie zwałowe piaski żwirowe i żwiry z zawartością części szkieletowych do 15%. Często są to gleby typu bielcowego i brunatne (kwaśne), rzadko rankery (por. Piotrowska i Celiński 1965, profile glebowe 7, 12, 16, Celiński i Balcerkiewicz 1973, profil 8, Wika 1975, profile I, IX). Gleby te są wytworzone z bezwęglanowych piasków słabogliniastych (także pylastych) oraz piasków luźnych, które nierzadko zalegają na piaskach słabogliniastych, a nawet glinie pylastej. Zawierają one dobrze wykształconą frakcję pyłów (do 29%) i wyższą niż w omówionych wyżej wariantach, zawartość ilów w częściach spławialnych (do 8%). Taki skład podłoża wskazuje na nieco korzystniejsze warunki wilgotnościowe i zasobność pokarmową. Powierzchniowe warstwy gleby mają odczyn kwaśny pH w KCl (4,2) 4,5-5,1, a w niższych warstwach dochodzący do lekko kwaśnego, do pH 6,2. Kwasowość czynna gleb jest także wyższa i osiąga odczyn pH w H₂O do 5,6, zaś w niższych warstwach do pH 7,1. Poziom próchniczny posiada różną miąższość (20-50 cm) i wykazuje znaczne wahania w zawartości substancji organicznej (do 5,5%). Zajmowane gleby są często pochodzenia porolnego. Na porolne pochodzenie gleb wskazuje ich niski odczyn, brak poziomu bielcowego oraz poziom próchniczny dość wyraźnie oddzielony od piaszczystego podłoża (Piotrowska i Celiński 1965).

Rozmieszczenie w Polsce. Wariant został rozpoznany na Pobrzeżu Szczecińskim (Wyspy Uznam i Wolin, Puszcza Bukowa), na Pojezierzu Poznańskim, w Poznańskim Przełomie Warty i w Kotlinie Gorzowskiej oraz jednostkowo na Pojezierzu Kujawskim i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (ryc. 6).

Powiązania fitosocjologiczne. Na podstawie klasyfikacji numerycznej do wariantu z *Hypochoeris radicata* zostały zaliczone publikowane materiały Celińskiego i Balcerkiewicza (1973): zdj. 26, 32, 34 (z tab. 1 określonej jako *Spergulo-Corynephorum typicum*), zdj. 20, 21, 27, 31, 35 (z tab. 1 S.-C. *festucetosum psammophilae*); Kornasia (1957): zdj. 9 (z tab. 1 *Corynephorum*, stadium optymalne); Piotrowskiej i Celińskiego (1965): zdj. 4, 5, 7-9, 12-17, 19, 21, 24-26, 40, 42 (z tab. 10 *Corynephorum*); Wiki (1975): zdj. 36, 44 (z tab. 5 *Spergulo-Corynephorum typicum* war. typowy i zdj. 1, 34 — war. chrobotkowy), zdj. 5, 45, 64 (z tab. 5 S.-C. podzesp. z *Festuca ovina* war. typowy, zdj. 6, 7 war. chrobotkowy w podwar. typowym i zdj. 2, 3, 4 (typus var.), 21, 75 w podwar. z *Helichrysum arenarium*). Maszynopisy — Babczyńskiej-Sendek (1984): zdj. 232 (z tab. 50 S.-C. war. chrobotkowy, podwar. typowy). Niepublikowane — Balcerkiewicza i Celińskiego z Puszczy Bukowej pod Szczecinem: zdj. 7-9, 42-45, 50, 56-60.

Postać przejściowa między *S.-C. typicum* a *S.-C. thymetosum serpylli*

Tabela synoptyczna II (tab. 5); Ryc. 2 (tab. 5), 3(A4), 4(5), 5(5) 6(4)

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*.

IV st. stał.: *Polytrichum piliferum*, *Hieracium pilosella*, *Rumex acetosella*, *Scleranthus perennis*.

Spergula morisonii (III), *Teesdalia nudicaulis* (III), *Rhacomitrium canescens* (III), *Artemisia campestris* subsp. *campestris* (III), *Coelocaulon aculeatum* (III), *Veronica dillenii* (II), *Thymus serpyllum* (II).

Część materiałów, zwłaszcza z obszarów młodoglacjalnych i z wyżyn, przedstawia fitocenozy pośrednie między podzespołami typowym i macierzankowym. Pod względem genetycznym jest to zbiór heterogeniczny.

Omawiana postać powstaje głównie w wyniku sukcesji wtórnej, na glebach porolnych, rzadziej — na poleśnych, na wydmach, sandrach i innych utworach glacifluwalnych; w miejscach ciepłych, dość suchych i otwartych. Mogą to być zdegradowane gleby brunatne kwaśne, jak też rdzawe (por. Babczyńska 1978, profil 2), wytworzone z piasków słabogliniastych, z dominacją piasku prawie bezpyłowego, ale z udziałem części spławialnych do 10%. Piaski te są bezwzględnie, o odczynie kwaśnym (pH w KCl > 4,6, pH w H₂O > 5,4), a w niższych warstwach profilu — lekko kwaśnych (pH w KCl > 5,6).

Powiązania fitosocjologiczne. Fitocenozy przejściowe zostały stwierdzone w publikowanych materiałach Babczyńskiej (1978): zdj. 7, 51, 99, 101, 104, 105, 107, 159 (z tab. 9 określonej przez autorkę jako *Spergulo-Corynephorum*); Celińskiego i Balcerkiewicza (1973): zdj. 28 (z tab. 1. *S.-C. typicum*); Cieślńskiego (1979): zdj. 3 (z tab. 3 *S.-C. var. z Rhacomitrium canescens*); Endlera i Polakowskiego (1978): zdj. 16, 33 (z tab. 1 *S.-C. typicum*), zdj. 4, 5, 7, 10, 13, 14, 20, 39, 40, 42, 43 (z tab. 2 *S.-C. [cladonietosum]*); Juraszek (1928): zdj. 2, 4, 8, 11 (z tab. 9 *Procorynephorum*); Kępczyńskiego (1965): zdj. 97, 178, 476, 979, 1008, 1080, 1480, 1493, 1548 (z tab. 64 *Corynephorum*); Kobendzy (1930): zdj. 2 (z tab. 7 *Corynephorum typicum*); Kornasia (1957): zdj. 23 (z tab. 1 *Corynephorum*, stadium początkowe); Libberta (1933): zdj. 3, 4 (z tab. 21 *Corynephorum typicum*, faza inicjalna i zdj. 9, 11-13 — faza optymalna). Maszynopisy — Babczyńskiej-Sendek (1984): zdj. 12 (z tab. 50 *S.-C. var. chrobotkowy podwar. typowy* i zdj. 231 podwar. *Thymus serpyllum*).

***Spergulo morisonii-Corynephorum canescens thymetosum serpylli* subass. nova
hoc loco
podzespół macierzankowy**

incl. *Thymus angustifolius* Assoz. (*Thymetosum angustifolii*) Juraszek (1928, Tab. 6) p.p., *Corynephorus canescens-Thymus angustifolius* Assoz. Krippel (1954, Tab. 2: 642) p.p.

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 15 (709) w Tab. VI (typus subass.).

D: *Thymus serpyllum*, *Arenaria serpyllifolia*, *Rhacomitrium canescens*

Tabela synoptyczna II (tab. 1-4); tabela analityczna VI; Ryc. 2 (1-4), 3(B1-4), 4(1-4), 5(1-4), 7

Charakterystyka ogólna. Podzespół macierzankowy w porównaniu z podzespołem typowym jest murawą bardziej zaawansowaną w rozwoju, bardziej zwartą i bogatszą florystycznie, zwłaszcza w gatunki subkontynentalne i subkserotermiczne z rzędu *Festuco-Sedetalia* i klasy *Festuco-Brometea*. Występuje na ciepłych i bardziej zasobnych w składniki pokarmowe piaskach słabogliniastych lub luźnych. Jest to typ murawy psammofilnej charakterystycznej dla wschodniej części zasięgu *Spergulo-Corynephoretum*, optymalnie rozwijający się w Polsce Środkowej i Wschodniej. Wykazuje wewnętrzną zmienność lokalnosiedliskową i dynamiczną.

Typowa struktura i fizjonomia. Struktura pionowa jest wyraźnie dwuwarstwowa (por. ryc. 3), ale spontaniczne siewki i podrosty drzew oraz krzewów, zwłaszcza liściastych są obecne; mogą też występować jeżyny *Rubus* sp. div. lub żarnowiec *Cytisus scoparius*. Strukturę poziomą charakteryzuje bogactwo gatunkowe, ale nigdy nie dochodzi do całkowitego utrwalenia piasków. Zdecydowanie przeważają rośliny zielne nad zarodnikowymi. Znamienny jest obniżony udział terofitów, zaś podwyższony — hemikryptofitów i chamefitów (por. ryc. 4). Dwie ostatnie grupy nadają fitocenozy specyficzną fizjonomię i jednocześnie swoim barwnym kwitnieniem bardzo mocno akcentują aspekt letni. Częściej i obficiej występują wąskolistne, kseromorficzne trawy, zwłaszcza *Festuca*, sp. div. oraz chamefity zielne: *Thymus serpyllum* i sukulent *Sedum* sp. div. (por. tab. II, ryc. 5).

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna. Syntakson stanowi swoistą kombinację gatunków typowo pionierskich i subatlantyckich ze związku *Corynephoroion* oraz rzędu *Corynephoretalia*, subkontynentalnych lub ciepłolubnych z rzędu *Festuco-Sedetalia* (w tym związku *Koelerion*) i klasy *Festuco-Brometea* oraz zwiększony udział jakościowy i ilościowy gatunków z klasy *Sedo-Scleranthetea* (tab. II, ryc. 5).

Gatunki charakterystyczne zespołu, zwłaszcza *Teesdalia nudicaulis* oraz *Corynephorus canescens*, wykazują obniżoną frekwencję i ilościowość. Ich miejsce zajmują subkontynentalna *Veronica dillenii*, która osiąga tutaj swoje optimum fitosocjologiczno-ekologiczne, oraz gatunki wyróżniające podzespół, które często przybierają postać facji. Optimum rozwojowe osiągają kępkowe, kseromorficzne trawy: *Festuca trachyphylla*, *F. psammophila*, *F. ovina* i *F. guestphalica* oraz sukulent *Sedum acre*, *S. sexangulare*, *Jovibarba sobolifera* subsp. *sobolifera*.

W warstwie przyziemnej, obok *Rhacomitrium canescens* optimum rozwojowe osiąga *Ceratodon purpureus* oraz ciepłolubny *Brachythecium albicans* zaś lokalnie *Tortula ruralis* i *Abietinella abietina*. Częściej niż w innych podzespołach skupiają się tutaj porosty ciepłolubne: *Cladonia foliacea*, *Cl. rangiformis*, *Cl. cariosa*, *Diploschistes muscorum* oraz listkowate, np. *Peltigera rufescens* i *P. spuria*.

Fitocenozy *S.-C. thymetosum* żyją dłużej niż podzespołu typowego, do 15 (20) lat, mogą zajmować czasami znaczne powierzchnie i najczęściej widoczne są w kompleksie przestrzennym z *Diantho-Armerietum* lub *Festuco-Koelerietum*, a na wyżynach lub podłożu z zawartością CaCO_3 — z murawami (sub)kserotermicznymi. Syntakson przywiązany jest głównie do siedlisk boru mieszanego i świetlistej dąbrowy.

Numer kolejny Successive number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numer zdjęcia * Number of record *	474	551	419	460	496	298	301	482	409	2055	2029
Numer kodu komputerowego Number of computer code	798	98	214	261	410	630	635	796	429	963	288
Data Date	1984 07 19	'84 08 09	'84 07 04	'84 07 03	'84 07 27	'83 06 23	'83 06 23	'84 07 21	'84 06 29	'83 07 11	'79 08 16
Ekspozycja Exposure	S	—	—	NW	S	W	SW	SW	SW	—	S
Nachylenie w stopniach Inclination in degrees	0	0	0	0	0	8	0	10	0	0	6
Powierzchnia zdjęcia (m ²) Area of record (m ²)	8	10	9	12	10	10	10	12	10	12	6
Pokrycie warstw (%) Cover of plant layers (%)	b 70 15	5 60 80	— 70 60	+ 70 35	5 50 70	— 70 20	— 50 60	+ 60 50	+ 60 40	— 60 70	— 60 40
Ogólna liczba gatunków w 1. zdjęciu Total number of species in 1. record	21	38	33	29	23	17	18	27	27	21	15
w tym: kwiatowych (incl.): (phanerogams)	15	20	21	21	16	11	9	15	15	13	10
zarodnikowych (cryptogams)	6	18	12	8	7	6	9	12	12	8	5
Ch, D Ass. <i>Spergula morisonii</i> Boreau in Duchartre <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. in Aiton <i>Veronica dillenii</i> Crantz D geogr.	1.2 · 1.1	+ .2 3.3 ·	1.1 2.2 ·	+ .2 · 2.1	· · 2.2	· · 1.1	· · 2.1	1.2 2.2 1.1	2.2 · +	1.2 2.2 1.2	· 1.2 1.1
D subass. <i>Thymus serpyllum</i> L. <i>Rhacomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid. <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	2.2 + .2 + .2	+ .2 4.4 ·	· 3.3 + .2	2.2 2.2 ·	2.2 4.4 ·	3.3 2.2 1.2	1.2 4.4 +	+ .2 3.3 ·	3.3 · ·	2.2 4.4 ·	4.4 3.3 ·
Ch <i>Corynephorion canescentis</i> Klika 1931 <i>Coelocaulon muricatum</i> (Ach.) Kärnefelt <i>Agrostis vinealis</i> Schreber	· ·	1.2 + .2	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	+ .2 ·	· ·
Ch <i>Corynephorotalia canescentis</i> Klika 1934 em. Krausch 1962 <i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv. <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort. <i>Ornithopus perpusillus</i> L. <i>Polytrichum piliferum</i> Hedw. <i>Cladina mitis</i> (Sandst.) Hale et Culb. <i>Coelocaulon aculeatum</i> (Schreber) Link	2.2 2.1 · 2.2 · ·	1.2 · · 1.2 + .2 1.2	2.2 1.1 + .2 1.2 + .2 1.2	3.2 · · 2.2 + .2 ·	2.2 · · · · ·	2.2 1.1 · · · ·	1.2 · · 1.2 · · ·	2.2 1.1 · 1.2 + .2 ·	1.2 · · 2.2 + .2 ·	2.2 · · 1.2 1.2 ·	1.2 + · 1.2 + .2 1.2

K. Czyżewska subass. *thymetosum serpylli* subass. nova

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	S t a ł o ś ć
336	307	638	709	491	619	604	655	388	427	616	640	369	365	330	297	1093	528	345	
447	620	890	956	400	862	645	657	780	799	870	892	856	1011	259	631	965	118	450	
'83 06 30	'83 06 25	'87 06 28	'77 06 24	'84 07 27	'87 06 25	'86 08 09	'87 08 21	'84 06 20	'84 07 19	'87 06 25	'87 06 28	'83 08 05	'83 08 04	'83 06 29	'83 06 23	'77 08 15	'84 08 04	'83 06 30	C o n s t a n c y
W	W	S	—	S	—	S	S	SE	NW	—	SE	S	S	W	W	W	SW	—	
24	0	6	0	18	0	0	0	10	0	0	15	8	0	14	35	0	0	0	
10	12	6	8	10	10	12	9	10	12	8	4	8	12	10	9	6	10	8	III II V
— 50 40	+ 80 15	— 60 20	— 80 35	— 60 30	+ 50 70	— 80 40	— 50 75	— 50 10	+ 60 30	+ 60 50	— 60 20	5 50 40	— 50 60	— 60 40	— 70 25	— 85 40	— 70 15	5 70 20	
20	17	25	19	31	28	29	28	21	23	34	28	30	30	22	21	23	23	20	
14	8	16	14	17	15	17	18	15	12	22	18	23	19	16	15	20	19	14	V V III
6	9	9	5	14	13	12	10	6	11	12	10	7	11	6	6	3	4	6	
2.2 2.2 1.2	1.1 · ·	2.2 1.2 2.1	1.1 +.2 2.1	1.1 +.2 +	· · 1.1	· · 1.1	· · 1.1	· · 1.2	2.2 · 1.2	· · 2.1	1.1 · 1.1	· · ·	· · 2.2	+.2 · 1.1	· · 1.1	· · +	1.2 · 2.1	· · 2.1	
+.2 2.2 ·	4.4 · ·	2.2 1.2 +	4.4 2.2 1.2	· 2.2 1.2	1.2 3.3 ·	3.3 1.2 1.2	2.2 3.3 +.2	2.2 · +.2	2.2 +.2 +.2	2.2 2.2 +.2	2.2 2.2 +.2	2.2 · 1.2	1.2 3.3 2.2	3.3 +.2 +.2	3.3 · 1.1	3.3 3.3 1.1	2.2 1.2 ·	3.3 +.2 ·	I I
· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · 1.2	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	
1.2 +.2 ·	1.2 · ·	1.2 · ·	1.2 + ·	2.2 · ·	2.2 · ·	2.2 · ·	2.2 · ·	2.2 · ·	2.2 · ·	2.2 · ·	2.2 · ·	2.2 +.2 ·	2.2 · ·	2.2 · ·	2.2 · ·	+.2 · ·	2.2 1.1 ·	1.2 · ·	V II I
2.2 +.2 1.2	+.2 +.2 ·	+.2 +.2 1.2	2.2 1.2 1.2	1.2 +.2 ·	+.2 1.2 ·	2.2 +.2 ·	2.2 · ·	+.2 · ·	2.2 · ·	1.2 +.2 +.2	1.2 · ·	3.3 · ·	+.2 2.2 ·	2.2 · +.2	· · +.2	· · ·	1.2 · 1.2	1.2 · ·	
· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cladonia uncialis</i> (L.) Wigg.	·	+2	·	·	·	·	·	·	·	+2	·
<i>Cl. cervicornis</i> (Ach.) Flotow subsp. <i>verticillata</i> (Hoffm.) Flotow	·	+2	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Ch <i>Armerion elongatae</i> Krausch 1962											
<i>Armeria maritima</i> (Miller) Willd. subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bronnier	·	+2	·	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Herniaria glabra</i> L.	+2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Ch <i>Koelerion glaucae</i> Volk 1931											
<i>Koeleria glauca</i> (Schrader) DC.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Astragalus arenarius</i> L.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Festuca psammophila</i> (Hackel ex Čelak.) Fritsch	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Gypsophila fastigiata</i> L. subsp. <i>fastigiata</i>	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Ch *Festuco-Sedetalia* R. Tx. 1951 em. Krausch 1962

<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	·	+2	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hackel) Krajina	·	2.2	+2	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>maximum</i> (L.) Krocker	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Ch *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955 em. Th. Müller 1961

<i>Hieracium pilosella</i> L.	2.2	+2	1.2	+2	·	+2	+2	+2	+2	+2	+2
<i>Rumex acetosella</i> L.	·	1.2	2.2	1.2	1.2	1.1	·	·	+2	·	·
<i>Scleranthus perennis</i> L.	1.2	+2	+2	·	+2	+2	·	1.2	·	·	·
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	·	·	1.2	·	+2	·	·	+2	+2	+2	·
<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	·	+2	+2	1.2	·	·	·	+2	·	·	·
<i>Sedum acre</i> L.	·	·	·	1.2	·	+2	1.2	·	·	·	·
<i>Jasione montana</i> L.	·	1.2	+2	+2	1.2	·	·	·	·	+2	·
<i>Festuca ovina</i> L.	·	·	+2	+2	1.2	·	2.2	·	1.2	+2	+2
<i>Trifolium arvense</i> L.	·	+2	·	·	+2	·	·	·	·	·	·
<i>Potentilla argentea</i> L.	+2	·	·	·	·	·	·	+2	·	·	·
<i>Rumex tenuifolius</i> (Wallr.) A. Löve	·	·	+2	+2	·	·	·	·	·	·	·
<i>Sedum sexangulare</i> L.	·	·	+2	·	·	·	·	·	·	+2	·
<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roemer et Schultes	·	·	·	·	+2	·	·	·	·	·	·
<i>Jovibarba sobolifera</i> (J. Sims) Opiz subsp. <i>sobolifera</i>	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Veronica verna</i> L.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	·	1.2	2.2	+2	·
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrader var. <i>palamaea</i> (Ach.) Nyl.	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	·	1.2	+2	·
<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) B.S.G.	·	+2	·	·	+2	1.2	·	+2	·	·	·

Towarzyszące (Accompanying)

Drzewa i krzewy (Trees and shrubs)

<i>Pinus sylvestris</i> L.	b	·	1.2	·	+2	+2	·	·	+2	+2	·	·
	c	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
<i>Quercus robur</i> L.	b	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·
	c	·	·	+2	·	·	·	·	·	·	·	·

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
.	+2	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	I
.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	+2	+2	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	+2	.	I
.	.	.	.	.	.	.	+	+2	.	+	.	+2	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	+2	1.2	.	.	+2	.	II
.	.	.	.	3.2	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
+2	1.2	.	.	1.2	.	2.2	1.2	.	1.2	1.2	.	2.2	2.2	.	.	1.2	1.2	.	IV
.	.	1.2	+2	+2	+	+2	+	+2	+2	+2	+2	+2	+2	.	1.2	+2	+2	.	IV
+2	.	+2	.	+	+	+	+2	1.2	+2	+2	+2	+	+	.	+2	+2	1.2	+2	IV
+2	.	1.1	.	.	.	.	+	+2	1.2	1.1	1.2	.	.	+2	1.2	+2	+2	1.2	III
+2	.	.	.	+2	1.2	+2	+2	+2	.	1.2	1.2	+2	1.2	+2	.	1.2	.	1.2	III
+2	.	+2	1.2	.	.	.	+2	+2	+2	.	+2	.	+2	+2	+2	+2	.	+2	III
+2	.	1.2	.	+2	+	.	.	.	.	.	1.1	+2	.	+2	.	.	+2	.	III
.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	1.2	1.2	+2	.	1.2	.	.	II
.	.	.	+	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	1.2	1.2	.	+2	II
.	.	.	+2	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	+2	+2	II
.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	I
.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	+2	I
.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
+2	2.2	.	.	1.2	1.2	.	+2	.	2.2	3.3	1.2	1.2	+2	+2	1.2	1.2	.	1.2	IV
.	1.2	2.2	.	1.2	1.2	2.2	1.2	.	+2	.	1.2	.	+2	1.2	2.2	.	.	+2	IV
.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	1.2	+2	2.2	II
.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Betula pendula</i> Roth	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Populus tremula</i> L.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Juniperus communis</i> L.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	c	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	c	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	.
<i>Rubus</i> sp. div.	c	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.

Ch *Festuco-Brometea* Br.-Bl. et R. Tx. 1943

<i>Centaurea rhenana</i> Boreau	.	+2	+2	.	.	+2	.	.	.	.	.	.
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	.	+2	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	1.2
<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.
<i>Poa compressa</i> L.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ch *Molinio-Arrhenatheretea* R. Tx. 1937

<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.
<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	+2	.	.
<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Bromus hordaceus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Inne (Others)

<i>Agrostis capillaris</i> L.	.	.	+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	+2
<i>Hypochoeris radicata</i> L.	.	.	+2	+2	1.2	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Carex ericetorum</i> Pollich	.	.	.	+2	.	.	+3	+2	.	.	.	.
<i>Poa angustifolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Erigeron acer</i> L.	.	.	.	+2	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Solidago virgaurea</i> L.	.	.	.	+2	.	.	.	.	+2	.	.	+2
<i>Carex hirta</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oenothera biennis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Danthonia decumbens* (L.) DC. in Lam. et DC. 1, 2; *Oenothera* Hayek 16, 20; *Knautia arvensis* (L.) Coulter 17, 25; *Berteroa incana* (L.) DC. 20, 25; *Bromus tectorum* L. *Agrostis gigantea* Roth; *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth 5; *Arnoseris minima* (L.) Schweigger et Koerte *mollis* L. 22; *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Sprengel. 24; *Calluna vulgaris* (L.) Hull 24; *Conyza canadensis*

<i>Cladonia glauca</i> Flk.	.	.	+2	.	+2	.	.	+2	+2	.	.	.
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	.	.	1.2	.	.	.	+2	.	+2	1.2	+2	.
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.
<i>Placynthiella uliginosa</i> (Schr.) Coppins et P. James	+2	.	+2	1.2	.	.	.	1.2	.	.	.	.
<i>Cladonia phyllophora</i> Ehrh. ex Hoffm.	.	+2	+2	.	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Cephaloziella starkei</i> (Funck ex Nees) Schiffn.	.	.	.	+2	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Cladonia subulata</i> (L.) Wigg.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.
<i>Peltigera rufescens</i> (Weis.) Humb.	.	+2	.	.	.	.	+2	+2	.	.	.	.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrader var. <i>pinnata</i> (Flk.) Vain.	.	+2	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.
<i>Cl. foliacea</i> (Huds.) Willd.	.	.	+2	1.2	.	.	+2	+2	.	.	.
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	.	+2	.	.	.	1.2	+2	.	.	.	.
<i>Cladonia rangiformis</i> Hoffm.	.	+2	.	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Placynthiella oligotropha</i> (Vain.) Coppins et. P. James	.	.	+2	.	.	.	.	.	1.2	.	.
<i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) Fleisch.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.
<i>Cladonia cariosa</i> (Ach.) Sprengel	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Bryum caespitium</i> Hedw.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrader var. <i>furcata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Cladonia cornuta* (L.) Hoffm. 9, 21; *Cetraria islandica* (L.) Ach. (1.2); 25; *Cladonia coniocraea* auct. 1; *Cl. deformis* (L.) Hoffm. 2; *Cl. floerkeana* 2; *Cl. scabriuscula* *Trapeliopsis granulosa* (Hoffm.) Lumbsch 8 (1.2); *Dicranum scoparium* Hedw. 9; *Cladonia pleurota* 17; *Polytrichum juniperinum* Hedw. 18; *Diploschistes muscorum* (Scop.) R. Sant. 20 (1.2); *Cladonia condensatum* Hoffm. 25.

* Na podstawie badań własnych.

* According to author's data.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych List of localities of phytosociological records

- (474). Równina Biłgorajska. Na N od wsi Bukownica, gm. Biłgoraj, woj. zamojskie. Piaski eoliczne. Nasada wydmy z samosiewnymi 7–8-letnimi sosnami. Między 60-letnią monokulturą sosnową a torami kolejowymi.
- (551). Kotlina Gorzowska. Między Miałami a Drawskim Mostem, gm. Wieleń, woj. pilskie. Pole wydmore, eoliczne piaski luźne. Samosiewna sosna do 5 lat.
- (419). Bory Dolnośląskie. Trzebów, gm. Żagań, woj. zielonogórskie. Piaski gruboziarniste próchniczne. Między linią kolejową a 80-letnią monokulturą sosnową (cf. bór mieszany).
- (460). Wysoczyzna Łaska. Okolice Kolumny, gm. Łask, woj. sieradzkie. Głacifluwalne piaski żwirowe w pobliżu żwirowni. Pojedyncze samosiewne 6-letnie sosny i żarnowiec; w sąsiedztwie z 60-letnią monokulturą sosnową z *Festuca ovina*.
- (496). Równina Opolska. Okolice Szczedrzyka, gm. Ozimek, woj. opolskie. Koło jeziora Średniego. Piaski eoliczne gruboziarniste. Polana w 70-letniej monokulturze sosnowej.
- (298). Równina Piotrkowska. Sulejów – w kierunku Podklasztorza, gm. Sulejów, woj. piotrkowskie. Piaski żwirowe z gładzikami w pobliżu żwirowni. Pod szczytem wzniesienia. Wypas owiec.
- (301). Równina Piotrkowska. Okolice Kurnędza, gm. Sulejów, woj. piotrkowskie. Wysoczyzna w pobliżu doliny Pilicy. Piaski na wapieniach. W 20-letniej monokulturze sosnowej, między drogą leśną a chojniakiem sosnowym.
- (482). Równina Biłgorajska. Koło Zaklikowa, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Luźne piaski wydmore z pojedynczymi samosiewnymi 3–10-letnimi sosnami, w sąsiedztwie monokultury sosnowej z *Calluna vulgaris*.
- (409). Dolina Dolnej Narwi. Zatory (na S od Pułtusza), gm. Zatory, woj. ostrołęckie. Piaski eoliczne. Wydma między szosą a 5-letnią monokulturą sosnową. Nieużytek poleśny.
- (2055). Wysoczyzna Bełchatowska. Kalisko, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie. Piaski głacifluwalne. Skraj 17-letniej monokultury sosnowej. Nieużytek zarastający sosną i jałowcem.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	+2	.	+2	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	
.	.	.	.	+2	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	+2	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	1.2	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	I
.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	I
.	+2	.	.	.	+2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I

var. *sorediata* (Schaer.) Arnold 17, 18; *C. ericetorum* Opiz 18 (1.2), 22; *Stereocaulon incrustatum* Flk. 19 (Delise) Leighton 2; *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt. 5; *Cladonia squamosa* (Scop.) Hoffm. 8; (Flk.) Schaerer 16; *Cladonia rangiferina* (L.) Harm. 17; *Cladonia chlorophaea* (Flk. ex Sommerf.) Sprengel *bacillaris* auct. 21; *Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb. 22; *Peltigera spuria* (Ach.) DC. 23; *Stereocaulon*

- 11 (2029). Kotlina Szczercowska. Kolonia Broszcin, gm. Rząśnia, woj. piotrkowskie. Piaski drobnoziarniste. Lokalne wzniesienie. Między jałowcami i 10–15-letnimi sosnami.
- 12 (336). Równina Łowicko–Błońska. Krępa, gm. Domaniewice, woj. skierniewickie. Piaski luźne z domieszką żwirów. Skarpa między 30-letnią monokulturą sosnową a torami kolejowymi. Pojedyncze jałowce i 4–5-letnie sosny.
- 13 (307). Wzniesienia Łódzkie. Rosanów, rezerwat „Ciosny”, gm. Zgierz, woj. łódzkie. Piaski eoliczne w obniżeniu między wałami piasku, ze starą brzozą.
- 14 (638). Wysoczyzna Drohicza. Sycze–stacja kolejowa, gm. Nurzec – Stacja, woj. białostockie. Glacifluwalne piaski żwirowe. Pojedyncze grusze, jałowce i 3-letnie sosny.
- 15 (709). Wysoczyzna Bełchatowska. Rząsawa, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie. Piaski drobnoziarniste. W pobliżu szosy, 50 m od przystanku PKS. Typ nomenklatoryczny.
- 16 (491). Równina Opolska. Między Murowem a Mańczokiem, gm. Murów, woj. opolskie. Stok świętego żwirowego pagóra w pobliżu linii kolejowej do Namysłowa. W pobliżu monokultury sosnowej i świerkowej.
- 17 (619). Wysoczyzna Białostocka. Okolice Żywkowa, gm. Zabłudów, woj. białostockie. Glacifluwalne piaski luźne drobnoziarniste. Między 20-letnią monokulturą sosnową a szosą.
- 18 (604). Podlaski Przełom Bugu. Wólka n. Bugiem, gm. Siemiatycze, woj. białostockie. Krawędź wysoczyzny przy dolinie Bugu, między kempingiem a rzeką. Kępy samosiewnych sosn do 15 lat. Typ nomenklatoryczny.
- 19 (655). Wysoczyzna Siedlecka. Okolice Platerowa, gm. Platerów, woj. białkopodlaskie. Piaski drobnoziarniste między polem żyta a linią kolejową.
- 20 (388). Kotlina Biebrzańska. Nadleśnictwo Rajgród, rezerwat „Grzędy”, gm. Rajgród, woj. łomżyńskie. Piaski eoliczne. Stok wału wydymowego.
- 21 (472). Równina Biłgorajska. Bukownica, gm. Biłgoraj, woj. zamojskie. Piaski luźne eoliczne, nasada wydmy porośnięta samosiewną sosną do 12 lat. Między lasem a wsią i łąkami.

- 22 (616). Dolina Górnej Narwi. Okolice Narwi, gm. Narew, woj. białostockie. Piaski żwirowe między szosą do Juszkowego Grodu a 30-letnią monokulturą sosnową. Pojedyncze brzozy, 6-letnie sosny i jałowce.
- 23 (640). Wysoczyzna Drohicka. Sycze — stacja kolejowa, gm. Nurzec—Stacja, woj. białostockie. Podcięty stok wydmy blisko linii kolejowej.
- 24 (369). Wzgórza Sokólskie. Okolice Gliniszcz, gm. Sokółka, woj. białostockie. Glacifluwialny piasek luźny żwirowy. W pobliżu monokultury sosnowej z *Trifolium lupinaster*.
- 25 (365). Równina Augustowska. Okolice Lipowca, gm. Augustów, woj. suwalskie. Na skrzyżowaniu szosy do Sejna i linii kolejowej do Suwałk. Sandrowe piaski luźne deptane (obok boisko sportowe) i rozwiewane. Pojedyncze, samosiewne 4—20-letnie sosny.
- 26 (330). Wysoczyzna Łaska. Okolice Grotnik, gm. Zgierz, woj. łódzkie. Piaski żwirowe. W pobliżu 6—10-letniej monokultury sosnowej.
- 27 (297). Równina Piotrkowska. Sulejów, gm. Sulejów, woj. piotrkowskie. Piasek żwirowy z gładzikami. Wysoczyzna w pobliżu prawobrzeżnej części doliny Pilicy. Nieużytkowana żwirownia.
- 28 (1093). Wysoczyzna Bełchatowska. Rząsawa — W stronę wsi, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie. Piaski eoliczne luźne przy drodze do Wawrzkowizny.
- 29 (528). Kotlina Toruńska. Cierpisz, gm. Wielka Nieszawka, woj. toruńskie. Piaski wydymowe gruboziarniste. Pradolina Wisły. Nieużytek poleśny na skrzyżowaniu drogi śródlęśnej z linią wysokiego napięcia. Między zabudowaniami a 23-letnią monokulturą sosnową bez runa.
- 30 (345). Równina Łowicko-Błońska. Okolice Jamna, gm. Łowicz, woj. skierniewickie. Płytką żwirownia obsadzona brzozą. Między stacją benzynową przy szosie do Łowicza a drogą do Dąbkowic Górnych.

Ryc. 7. Rozmieszczenie *Spargulo-Corynephoretum* subassm. *thymetosum serpylli* w Polsce

Fig. 7. Distribution of *Spargulo-Corynephoretum* subassm *thymetosum serpylli* in Poland

1 — var. *typicum*; 2 — var. z (with) *Artemisia campestris* subsp. *campestris*; 3 — var. z (with) *Festuca ovina*; 4 — var. z (with) *F. psammophila*

Charakterystyka siedliskowa. Podzespół zajmuje częściej siedliska poleśne niż porolne na wydmach i żwirowych pagórkach o nachyleniu do 40°; jeśli są to tereny płaskie to wówczas preferuje piaski żwirowe lub żwiry z głazikami. Występuje także na piaskach aluwialnych w dolinach większych rzek, np. Warty, Pilicy, Narwi, Bugu. Zwraca uwagę wybór miejsc najcieplejszych, o wystawie południowej i o wiele rzadziej innej, o cechach nawiązujących do klimatu subkontynentalnego.

Gleby — inicjalne, rdzawe właściwe, rdzawo-brunatne, brunatne kwaśne — powstają z piasków luźnych zalegających na piaskach słabogliniastych lub wapieniach i często — z piasków słabogliniastych (por. tab. III, V; Głowacki 1975, Babczyńska-Sendek 1984). Piaski te charakteryzują się na ogół zawartością części szkieletowych (do 13,2%). Przeważa frakcja piasków średnich (od 15 do 65%) i drobnych (od 15 do 64%). Zaznacza się wyraźniej obecność frakcji pyłowej, w której dominuje pył gruby (od 2 do 13%) nad drobnym (od 1 do 8%). Również korzystniejszy jest udział części spławialnych w piaskach słabogliniastych i słabogliniastych pylistych (od 5 do 18%), obniżający się w piaskach luźnych poniżej 5%. W piaskach tych bardzo często występują ślady CaCO_3 (do 0,15%). Taki skład podwyższa nieco pojemność sorpcyjną gleby, co oddaje odczyn jej. Mianowicie, odczyn powierzchniowej warstwy może być kwaśny, lekko kwaśny lub obojętny (pH w KCl od 4,5 do 6,7, rzadko poniżej tych wartości; pH w H_2O od 4,5 do 7,7) i podwyższa się w głąb profilu glebowego do obojętnego lub zasadowego. Zawartość próchnicy może osiągać ponad 3%, zwłaszcza gdy są to gleby poleśne lub porolne, nie rozwiewane.

Rozmieszczenie w Polsce. Fitocenozy omawianego syntaksonu bardzo rzadko występują w Polsce Zachodniej i Północnej (ryc. 7). Główny obszar występowania to Polska Środkowa, Wschodnia, Północno- i Południowo-Wschodnia.

Zmienność podzespołu. W obrębie *S.-C. thymetosum serpylli* wyróżniono cztery warianty: typowy, z *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, z *Festuca ovina* i *F. psammophila*.

var. *typicum* var. *nova* hoc loco
wariant typowy

Tabela synoptyczna II (tab. 3); tabela analityczna VI, zdj. 1-15; Ryc. 2. (tab. 3), 3(B1), 4(3), 5(3), 7(1)

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 15(709) w tab. VI (identyczny z typem podzespołu)

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*, *Thymus serpyllum*, *Rhacomitrium canescens*.

IV st. stał.: *Spergula morisonii*, *Veronica dillenii*, *Polytrichum piliferum*, *Ceratodon purpureus*, *Hieracium pilosella*, *Rumex acetosella*.

Teesdalia nudicaulis (III), *Arenaria serpyllifolia* (II).

Najwyraźniej wykształca się warstwa zielna (por. ryc. 3), której średnie pokrycie nie przekracza jednak 60%, a trawy górują w niej nad terofitami i chamefitami,

zwłaszcza nad macierzanką piaskową. W warstwie przyziemnej mchy dominują pod względem ilościowym. Podrostry drzew i krzewów są już stale, zwłaszcza dęby, osiki, sosny, żarnowce i jeżyny.

Jest to najwcześniejsza faza rozwojowa podzespołu macierzankowego. Z roślin jednorocznych dość wysoką frekwencję osiągają w dalszym ciągu oba gatunki charakterystyczne zespołu (por. ryc. 5). Optymalne warunki rozwoju osiąga *Rhacomitrium canescens*. Jest to dobry edyfikator, który wraz z *Polytrichum piliferum* i *Ceratodon purpureus* przyczynia się do tworzenia bardziej mezofilnych warunków siedliskowych. Spośród porostów większe znaczenie ma jedynie inicjalny *Coelocaulon aculeatum* i *Cladonia furcata* var. *palamaea*. Liczną grupę stanowią już gatunki z klasy *Sedo-Scleranthetea*. Syntakson wyróżnia także grupa gatunków subkontynentalnych i ciepłolubnych ze związku *Koelerion* oraz rzędu *Festuco-Sedetalia*, jak też z klasy *Festuco-Brometea* oraz ciepłolubnych porostów i mchów.

Takie fitocenozy spotykane są zarówno na wydmach, żwirowych pagórkach (o nachyleniu do 30°), jak i w miejscach płaskich. Bardzo często są to siedliska poleśne, choć także i porolne, zwydmione; skraje dróg lub lasów, polany śródlęsne, jałowczyska, wylesione i osuszone dna dolin rzecznych, skraje pól, porzucone pola, pastwiska, piaszownie, żwirownie itp.

Wariant typowy wykazuje przywiązanie do miejsc bardzo ciepłych, zwłaszcza do wystawy południowej i południowo-zachodniej. Gleby, często inicjalne, wytworzone są z piasków luźnych. Mogą to być piaski eoliczne średnio- i drobnoziarniste, z dość niską zawartością frakcji pyłowej i części spławialnych, z częstym udziałem CaCO_3 (tab. III, V). Mogą to być również piaski gruboziarniste lub żwiry z glazikami, z częściami szkieletowymi do 5% oraz bogatsze we frakcję pyłu (do 12%), ale na ogół o niskiej zawartości części spławialnych (do 5%). Są to piaski glacifluwalne, choć także i piaski rzeczne. Często zawierają ślady CaCO_3 (do 0,15%). Czasami piaski zalegają na wapieniach (Wyżyna Wieluńska, ok. Sulejowa). Odczyn powierzchniowej warstwy gleby rzadko jest bardzo silnie kwaśny (pH w KCl od 3,8 do 4,3), z reguły jest kwaśny do obojętnego (pH w KCl od 4,6 do 6,7). Kwasowość czynna jest także wyższa, pH w H_2O wynosi od 4,8 do 7,7. W zależności od pochodzenia gleby zawartość próchnicy może być niska, do 1% lub wyższa, do 2,5%. Mogą być także już uruchomiane procesy próchnicotwórcze, zwłaszcza w fitocenozach bogatych w rośliny kwiatowe.

Rozmieszczenie w Polsce. Wariant typowy jest rzadki w Polsce Zachodniej i Północnej (Wyspa Wolin, Kotlina Gorzowska, Bory Dolnośląskie). Jego stanowiska stają się częstsze w Polsce Środkowej po Wschodnią (por. ryc. 7).

Powiązania fitosocjologiczne. Analiza numeryczna wykazała, że do wariantu typowego powinny być zaliczone niektóre materiały publikowane Babczyńskiej (1978): zdj. 67, 98, 158 (z tab. 9 określonej przez autorkę jako *Spergulo-Corynephorum*); Cieślińskiego (1979): zdj. 128 (z tab. 3 S.-C. var. *Rhacomitrium canescens-Thymus serpyllum*); Cieślińskiego i Halicza (1971): zdj. 15, 18 (z tab. 15 *Corynephorum cladonietosum* var. z *Thymus*); Czyżewskiej (1986): zdj. 15, 189, 190 (z tab. 2 S.-C. *typicum* var. *typicum*, zdj. 49, 52, 77, 129, 161, 192 var. z *Thymus serpyllum* subvar. typowy, zdj. 33, 58, 206 — subvar. z *Helichrysum arenarium*, zdj. 66, 165, 207 — subvar. z *Jovibarba sobolifera*); Kępczyńskiego (1965): zdj. 457, 1501, 1502 (z tab. 64 *Corynephorum*); Piotrowskiej i Celińskiego

(1965): zdj. 41 (z tab. 10 *Corynephorum*). Maszynopis — Babczyńskiej-Sendek (1984): zdj. 220 (z tab. 50 S.-C. war. chrobotkowy podwar. typowy, zdj. 270, 278, 280 — podwar. z *Thymus serpyllum*).

var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. *nova* hoc loco
wariant z bylicą polną

Tabela synoptyczna II (tab. 4); tabela analityczna VI, zdj. 16-30; Ryc. 2 (tab. 4), 3(B2), 4(4), 5(4), 7(2)

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 18(604) w Tab. VI (typus var.)

D: *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *Brachythecium albicans*

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*, *Veronica dillenii*, *Ceratodon purpureus*.

IV st. stał.: *Thymus serpyllum*, *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *Polytrichum piliferum*, *Hieracium pilosella*, *Rumex acetosella*, *Scleranthus perennis*.

Spergula morisonii (III), *Rhacomitrium canescens* (III), *Arenaria serpyllifolia* (III), *Brachythecium albicans* (III), *Cladonia furcata* var. *palamaea* (III), *Jasione montana* (III), *Teesdalia nudicaulis* (I).

Wariant z *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, w odpowiednich siedliskach powstaje najczęściej po krótkotrwałej fazie wariantu typowego. W obrębie podzespołu macierzankowego jest to najbogatsza florystycznie jego postać (por. ryc. 3), w jednym zdjęciu występuje prawie 25 taksonów.

W wielowarstwowym zbiorowisku najbujniej rozwija się warstwa zielna, w której wysokie byliny, np. *A. campestris* subsp. *campestris*, *Helichrysum arenarium*, liczne trawy, kontrastują z niższą podwarstwą, zwłaszcza z gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi zespół oraz podzespół, sukulentami i in. W warstwie przyziemnej ilościowo przeważają mszaki, choć jakościowo dominują porosty. Zaznacza się również warstwa krzewiasta.

Syntakson charakteryzuje najniższy udział *Spergula morisonii* i bardzo niski — *Teesdalia nudicaulis*, zaś najwyższy — *Veronica dillenii*, *Arenaria serpyllifolia* oraz *Artemisia campestris* subsp. *campestris* (por. ryc. 5). Syntakson wyróżnia także *Brachythecium albicans*, mech, który znajduje tutaj swoje optimum rozwojowe, zwłaszcza w obrębie cieplejszych piasków żwirowych, zaś *Tortula ruralis* można spotkać na piaskach zalegających na wapieniach. Wśród licznych porostów znaczenie edyfikacyjne posiada przede wszystkim *Cladonia furcata* var. *palamaea*. Należy także zwrócić uwagę na *Cladonia glauca*, która często pełni rolę gatunku kolonizującego w fitocenozach rosnących na glebach porolnych.

Zgodnie z heterogenicznym charakterem podzespołu i w tym wariantcie uczestniczą grupy gatunków subkontynentalnych, ciepłolubnych i łąkowych ze związku *Koelerion* i rzędu *Festuco-Sedetalia* oraz klas *Festuco-Brometea* i *Molinio-Arrhenatheretea*. Często i obficie występują również gatunki charakterystyczne klasy *Sedo-Scleranthetea*.

Fizjonomiczną cechą wyróżniającą syntakson jest współudział zróżnicowanych gatunkowo traw, mianowicie obok *Corynephorus*, często licznie występują *Festuca trachyphylla*, *F. ovina*, *F. gaussoi*, *Agrostis capillaris* i in. oraz sukulentów.

Fitocenozy omawianego wariantu występują na siedliskach wtórnych, porolnych i poleśnych, na porzuconych polach, skrajach pól, lasów i monokultur, dróg, linii kolejowych i in. Są to zarówno tereny równinne, jak też pagóry morenowe i inne wyniesienia, w tym wydmy, o nachyleniu do 35°, sandry, piaski w dolinach rzek, np. Narwi, Bugu, Biebrzy. Preferowane są siedliska bardzo ciepłe, najczęściej o wystawie południowej, oraz piaski słabogliniaste. Są to piaski żwirowe żwiry z głazikami, z zawartością części szkieletowych do 14-20%. Piaski te wyróżnia frakcja pyłu dochodząca do 21% oraz części spławialne powyżej 5% (por. tab. III, V). Rzadszym siedliskiem są piaski luźne, ale i w nich zaznacza się wyraźniej frakcja pyłu lub podwyższona zawartość piasku drobnego. Może występować także CaCO_3 (do 0,12%). Odczyn powierzchniowej warstwy gleby osiąga w KCl (4,1) 4,7-6,1 i pH w H_2O (4,9) 5,2-6,9. W glebach porolnych występuje wyższy poziom próchnicy, do 3,42%.

Wariant z *A. campestris* subsp. *campestris* występuje najczęściej na siedliskach świetlistej dąbrowy i w kontakcie z *Festuco-Koelerietum*.

Rozmieszczenie w Polsce. Jest znamieny dla Polski Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (por. ryc. 7). Dość częsty.

Powiązania fitosocjologiczne. Wśród materiałów publikowanych do wariantu z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* zostały zaliczone dane Czyżewskiej (1986): zdj. 82, 171, 173 (z tab. 2 określonej przez autorkę jako *Spergulo-Corynephorum typicum* var. z *Thymus serpyllum* subvar. typowy, zdj. 53, 54, 172 — subvar. z *Helichrysum arenarium*); Juraszek (1928): zdj. 3 (z tab. 9 *Procorynephorum*); i Kępczyńskiego (1965): zdj. 231, 302, 998 (z tab. 64 *Corynephorum*).

var. z *Festuca ovina* var. nova hoc loco
wariant z kostrzewą owczą

Tabela synoptyczna II (tab. 2), tabela analityczna VII; Rec. 2 (tab. 2), 3(B3), 4(2), 5(2), 7(3)

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 6 (1940) w Tab. VII (typus var.)

D: *Festuca ovina*, *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Festuca ovina*, *Ceratodon purpureus*.

IV st. stał.: *Corynephorus canescens*, *Thymus serpyllum*, *Polytrichum piliferum*, *Hieracium pilosella*.

Spergula morisonii (III), *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata* (III), *Veronica dillenii* (II), *Teesdalia nudicaulis* (I), *Rhacomitrium canescens* (I), *Arenaria serpyllifolia* (I).

W strukturze przestrzennej widoczna jest przewaga roślin kwiatowych nad zarodnikowymi, a podrosty drzew i krzewów nie przekraczają średnio 0,2% pokrycia (ryc. 3).

W obrębie podzespołu syntakson określa najniższy udział terofitów (11,9%; ryc. 4). Daje się zauważyć zanikanie gatunków charakterystycznych zespołu, związku i rzędu *Corynephoralia* (ryc. 5). Ich miejsce zajmują rośliny z rzędu *Festuco-Sedetalia* — w tym *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*, wyróżniająca wariant

Spergulo morisonii-Corynephoretum canescens R. Tx. ex K. Czyżewska
subass. *thymetosum serpylli* var. z (with) *Festuca ovina* K. Czyżewska var. nova

Numer kolejny Successive number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Numer zdjęcia * Number of record *	302	1880	44	27	2034	1940	404	352	1647	368	1910	1912	1168	316	313
Numer kodu komputerowego Number of computer code	636	294	693	718	961	293	428	593	595	855	295	917	962	1013	1014
Data	1983	'79	'76	'76	'79	'79	'84	'83	'79	'83	'79	'79	'78	'78	'78
Date	06 23	06 21	07 23	07 10	08 03	07 07	06 29	07 07	06 15	08 05	06 23	06 22	06 15	07 24	07 24
Ekspozycja Exposure	S	—	—	SW	—	S	SW	NE	—	—	—	SW	—	—	—
Nachylenie w stopniach Inclination in degrees	0	0	—	30	0	0	0	0	8	—	0	6	0	0	0
Powierzchnia zdjęcia (m ²) Area of record (m ²)	10	6	2	8	9	10	10	8	6	10	3	4	2	6	10
Pokrycie warstw (%) Cover of plant layers (%)	— 70 30	— 60 40	— 90 20	— 40 30	— 80 15	— 85 20	— 80 15	— 60 15	— 75 10	— 60 40	— 85 10	— 70 30	— 40 15	— 50 40	— 85 40
Ogólna liczba gatunków w l. zdjęciu Total number of species in l. record w tym: kwiatowych (incl.): (phanerogams)	31	21	17	12	25	21	24	17	15	27	16	15	9	15	16
zarodnikowych (cryptogams)	17	17	14	9	12	12	17	12	7	18	10	10	6	8	11
	14	4	3	3	13	9	7	5	8	9	6	5	3	7	5

Ch, D Ass.

Spergulo morisonii Boreau in Duchartre
Veronica dillenii Crantz D geogr.

III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
II	.	.	.	.	.	.	+	+2	.	+	.	1	.	.	.

Thymus serpyllum L.
Arenaria serpyllifolia L.
Rhacomitrium canescens (Hedw.) Brid.

Festuca ovina L.
Gypsophila fastigiata L. subsp.
fastigiata

Agrostis vinealis Schreber

Corynephorus canescens (L.) Beauv.

Polytrichum piliferum Hedw.
Cladina mitis (Sandst.) Hale et Culb.
Coelocaulon aculeatum (Schreber) Link
Cladonia uncialis (L.) Wigg.
Cl. cervicornis (Ach.) Flotow subsp.
verticillata (Hoffm.) Flotow

**** *Festuca psammophila* (Hackel ex Čelak) |**

Fritsch
 ** *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy
Dianthus deltoides L.
 * *Koeleria glauca* (Schrader) DC.
Herniaria glabra L.

Hieracium pilosella L.
Scleranthus perennis L.
Rumex acetosella L.
Cerastium semidecandrum L.
Jasione montana L.
Artemisia campestris L. subsp.
campestris

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Sedum acre</i> L.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Potentilla argentea</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Trifolium arvense</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Sedum sexangulare</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Jovibarba sobolifera</i> (J. Sims) Opiz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
subsp. <i>sobolifera</i>	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Veronica verna</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	I
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	1.2	.	.	.	+	2.2	+2	1.2	2	1.2	+	2	2	2	IV
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrader var.	1.2	1	.	.	1	1.2	1.2	.	+	.	1	1	.	.	III
<i>palmaea</i> (Ach.) Nyl.	1.2	.	.	.	.	1.2	2.2	.	+	1.2	.	.	.	2	II
<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) B.S.G.	1.2	.	.	.	.	1.2	.	.	+	.	.	.	.	.	

Towarzyszące (Accompanying)

Drzewa i krzewy (Trees and shrubs)

<i>Pinus sylvestris</i> L.	b	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	+	.	.	I
<i>Chamaecytisus ratisbonensis</i>	b	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
(Schaffer) Rothm.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	I
<i>Populus tremula</i> L.	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Quercus robur</i> L.	c	+2	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Juniperus communis</i> L.	c	+2	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	I
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	c	.	+	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	I

Ch *Festuco-Brometea* Br.-Bl. et R. Tx. 1943, *Trifolio-Geranietea sanguinei* Th. Müller 1962*

<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	.	1	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	I
<i>Poa compressa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	1	I
<i>Carlina vulgaris</i> L.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Achillea collina</i> J. Becker ex Reichenb.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Centaurea rhenana</i> Boreau	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
* <i>Anthericum ramosum</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I

Ch *Molinio-Arrhenatheretea* R. Tx. 1937

<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	+	+	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	I

Ch *Nardo-Callunetea* Preising 1949*Luzula campestris* (L.) DC. in Lam.

et DC.

Calluna vulgaris (L.) Hull*Danthonia decumbens* (L.) DC. Lam.

et DC.

Inne (Others)

Hypochoeris radicata L.*Agrostis capillaris* L.*Carex ericetorum* Pollich*Solidago virgaurea* L.*Knautia arvensis* (L.) Coulter*Carex hirta* L.*Viola canina* L.*Erophila verna* (L.) Chevall.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Coryza canadensis* (L.) Cronq. 1; *Agrostis gigantea* Roth 2; *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth 7; *Linaria vulgaris* Miller 7; *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench 10; *Scorzonera humilis* L. 10; *Trifolium lupinaster* L. 10; *Vaccinium vitis-idaeus* L. 11 (1); *Vincetoxicum hirundinaria* Medicus 14; *Festuca rubra* 15 (2);

Cladonia fimbriata (L.) Fr.*Dicranum scoparium* Hedw.*Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt.*Cladonia foliacea* (Huds.) Willd.*Cl. subulata* (L.) Wigg.*Cl. phyllophora* Ehrh. ex Hoffm.*Cetraria islandica* L.) Ach.*Cladonia pleurota* (Flk.) Schaerer*Polytrichum juniperinum* Hedw.*Cladonia glauca* Flk.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Cladonia rangiformis* Hoffm. 1; *Cl. coniocraea* acut. 1; *Peltigera spuria* (Ach.) DC. 1 (1.2); *Hypnum cupressiforme* Hedw. 1 (2.2); *Brachythecium velutinum* (Hedw.) B.S.G. 1; *Platidium ciliare* (L.) Hampe 1; *Tortula ruralis* (Hedw.) Gaertn., Meyer et Schreb. 2; *Cladonia bacillaris* auct. 5; *Placynthiella oligotropha* (Vain.) Coppins et P. James 5; *Cladonia chlorophaea* (Flk. ex Sommerf.) Sprengel 6; *Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb. 8 (1.2); *Cladonia furcata* (Huds.) Schrader var. *pinnata* (Flk.) Vain 10 (1.2); *Peltigera polydactyla* (Necker) Hoffm. 10; *P. rufescens* (Weis) Humb. 10; *Cladonia* sp. pl. pierw. 13; *Trapeliopsis granulosa* (Hoffm.) Lumbsch 14 (2); *Cladonia cenotea* (Ach.) Schaerer 14.

* Na podstawie badań własnych. * According to author's data.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych
List of localities of phytosociological records

- 1 (302). Równina Piotrkowska. Między Sulejowem a Kurnędzem, gm. Sulejów, woj. piotrkowskie. Dolina Pilicy. Nieużytek poleśny między 20-letnią monokulturą sosnową a 70-letnią z *Festuca ovina*. Spontaniczne 8–9-letnie sosny i jałowce.
- 2 (1880). Kotlina Szczercowska. Faustynów, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie. Teren falisty. Piaski żwirowe drobnodziarniste; przy skrzyżowaniu dróg, na skraju monokultury sosnowej z udziałem jałowców, dębów i żarnowców.
- 3 (44). Wyżyna Wieluńska. Kamion, gm. Wierzchlas, woj. sieradzkie. Przy piaszczystej drodze z Kamiona na G. Kulową. Zdjęcie publikowane przez C z y ż e w s k ą (1986, Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 2).
- 4 (27). Wyżyna Wieluńska. Między Działoszynem a Sensowem, gm. Działoszyn, woj. sieradzkie. Na skraju wysoczyzny i doliny Warty, w pobliżu drogi do Bobrownik. Nachylenie 30°, SW. Między młodymi sosnami. Publikowane j.w.
- 5 (2034). Wysoczyzna Bełchatowska. Ok. Kurnosa II, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie. Płaska polana między 10-letnim młodnikiem sosnowym a 50-letnim borem sosnowym z *Festuca ovina*, *Cytisus scoparius*, podrostami dębów.
- 6 (1940). Kotlina Szczercowska. Ścichawa, gm. Kluki, woj. piotrkowskie. Piaski drobnodziarniste. Lokalne wzniesienie, koło szosy, S. Liczna samosiewna 5–7-letnia sosna. Typ nomenklatoryczny.
- 7 (404). Dolina Dolnej Narwi. Borsuki, gm. Zatory, woj. ostrołęckie. Piaski eoliczne. Skraj monokultury sosnowej, między lasem a drogą, SW.
- 8 (352). Wysoczyzna Bełchatowska. Tuszyn-Las, gm. Tuszyn, woj. piotrkowskie. Nadleśnictwo Kolumna, oddział 35 t. Piaski eoliczne. NE stok wału wydmy. Między rozwianymi piaskami a 11-letnią monokulturą sosnową.
- 9 (1647). Wysoczyzna Bełchatowska. Ok. Bukowej, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie. Piaski drobnodziarniste. Nieużytek porolny w pobliżu 10-letniej sośniny.
- 10 (368). Wzgórza Sokólskie. Ok. Gliniszcz, gm. Sokółka, woj. białostockie. Piaski żwirowe między kolejną a 25–30-letnią monokulturą sosnową. Odnawia się osika. Stanowisko *Trifolium lupinaster*, *Rubus saxatilis* i *Anthericum ramosum*.
- 11 (1910). Kotlina Szczercowska. Folwark, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie. Piaski żwirowe. Lokalne wzniesienie. Skraj starej monokultury sosnowej z *Calluna vulgaris* i *Festuca ovina*, blisko Czubatej Góry.
- 12 (1912). Jak wyżej. Piaski żwirowe. Lokalne wzniesienie (SW, nachylenie 6°). Między drogą leśną a skrajem 10–15-letniej monokultury sosnowej z *Calluna*.
- 13 (1168). Kotlina Szczercowska. Ok. Janówki, gm. Szczerców, woj. piotrkowskie. Odlesiona polana w starym borze sosnowym.
- 14 (316). Równina Mazurska. Ok. Karwicy, gm. Ruciane-Nida, woj. olsztyńskie. Puszcza Piska, oddział 169. Piaski żwirowe między drogą a starym borem sosnowym.
- 15 (313). Jak wyżej. Między Karwicą a Ośrodkiem Wypoczynkowym „Fasty”, w pobliżu rezerwatu przyrody. Skraj skrzyżowania dróg.

— i klasy *Festuco-Brometea*. Optimum rozwojowe osiąga *Festuca ovina*, silnie rzutująca na fizjonomię fitocenoz. Może także wyraźniej zaznaczyć swój udział *Solidago virgaurea*, która zastępuje czasami *Gypsophila fastigiata*.

Występują na luźnych piaskach żwirowych drobnoziarnistych, eolicznych i rzecznych lub piaskach słabogliniastych, kwaśnych i lekko kwaśnych, w obszarach płaskich lub na lokalnych wzniesieniach, również na stokach dolin rzecznych, o nachyleniu do 30° i ekspozycji południowej, południowo-zachodniej lub południowo-wschodniej. W podłożu mogą występować ślady CaCO_3 (ok. 0,1%).

Omawiane fitocenozy występują najczęściej w obrębie siedlisk kwaśnej i świetlonej dąbrowy oraz boru mieszanego i mogą przechodzić w *Diantho-Armerietum* lub *Sileno otitis-Festucetum*.

W syntaksonie znajduje się grupa fitocenoz powstałych w wyniku sukcesji wtórnej rekreatywnej na zrębach po monokulturach sosnowych. Obecne są wówczas pozostałości lasu, zwłaszcza mchy: *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Hypnum cupressiforme* i in. (por. tab. VII).

Rozmieszczenie w Polsce. Są to postaci dość rzadkie (por. ryc. 7). Spotykano je głównie na Nizinach Środkowopolskich, Wyżynie Wieluńskiej, Pojezierzu Mazurskim i Wysoczyznach Podlasko-Białoruskich.

Powiązania fitosocjologiczne. Do wariantu z *Festuca ovina* należą niektóre zdjęcia Czyżewskiej (1986): zdj. 44 (z tab. 4 określonej przez autorkę jako *Spergulo-Corynephorretum festucetosum ovinae*) i zdj. 27 (z tab. 2 *S.-C. typicum* var. z *Thymus serpyllum* subvar. z *Jovibarba sobolifera*) oraz Juraszek (1928): zdj. 5 (z tab. 7 *Corynephorretum*). Zdjęcia Wiki (1975), określone przez autora jako *S.-C. festucetosum ovinae* nie zostały zaliczone do tego syntaksonu.

var. z *Festuca psammophila* K. Czyżewska in K. Czyżewska 1986 var. nova **wariant z kostrzewą piaskową**

Tabela synoptyczna II (tab. 1); Ryc. 2 (tab. 1), 3(B4), 4(1), 5(1), 7(1)

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 12(226) w Tab. 4 in Czyżewska (1986, Acta Univ. Lodz., Folia Soz., 2) lectotypus hoc loco

D: *Festuca psammophila*, *Cladonia foliacea*

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*, *Spergula morisonii*, *Veronica dillenii*, *Festuca psammophila*.

IV st stał.: *Polytrichum piliferum*, *Ceratodon purpureus*.

Thymus serpyllum (III), *Rhacomitrium canescens* (III), *Cladonia foliacea* (III), *Arenaria serpyllifolia* (II), *Teesdalia nudicaulis* (I).

Jest to zbiorowisko kilkuwarstwowe z przewagą warstwy zielnej. Są także obecne spontaniczne siewki i podrosty drzew lub krzewów ok. 20-letnie (por. ryc. 3).

Dość wysoki udział mają terofity, prawie 20% wszystkich taksonów (por. ryc. 4). Widoczny jest ilościowy i jakościowy spadek gatunków charakterystycznych i wy-

różniających (poza *Spergula morisonii*) oraz wyróżniających podzespół (por. ryc. 5). Dominuje *Festuca psammophila*, której może towarzyszyć *F. trachyphylla*. Rosną tutaj rośliny ze związku *Koelerion* i rzędu *Festuco-Sedetalia*, jak też subserotermiczne gatunki z klasy *Festuco-Brometea*, zwłaszcza *Euphorbia cyparissias*. Występuje także grupa ciepłolubnych porostów: *Cladonia foliacea*, którą można uznać za gatunek wyróżniający wariant, *Cl. cariosa*, *Cl. rangiformis*. Lokalnie, np. w Kotlinie Kolskiej, znaczenie edyfikacyjne może mieć *Solidago virgaurea* i *Oenothera biennis*.

Jest to najbardziej ciepłolubna postać murawy szczotlichowej, wyraźnie przejściowa do subserotermicznego, subkontynentalnego związku *Koelerion* z rzędu *Festuco-Sedetalia*. Rozwija się na siedliskach świetlistej dąbrowy, ciepłolubnego boru mieszanego, kwaśnej buczyny i często są to siedliska polesne.

Fitocenozy wariantu rosną na piaskach luźnych lub słabogliniastych. Są to drobnoziarniste piaski wydmowe z nieznaczną domieszką CaCO_3 lub piaski żwirowe, żwiry z głazikami — z wyraźną zawartością części spławialnych. Zajmują bardzo ciepłe i słoneczne, prawie wyłącznie południowe zbocza wydm, pagórków morenowych, teras wysokich dolin rzecznych, o nachyleniu 45° . Powierzchniowe warstwy gleby są kwaśne lub lekko kwaśne, a w głębszych warstwach profilu glebowego są obojętne lub lekko zasadowe (por. Głowacki 1975; tab. III).

Rozmieszczenie w Polsce. Wariant z *Festuca psammophila* ma w Polsce zasięg ograniczony (ryc. 7), co pozostaje w związku z zasięgiem geograficznym gatunku wyróżniającego wariant i jego zdolności fitocenotycznych na północno-wschodniej granicy zasięgu (por. Pawlus 1983/1985). Z tego względu fitocenozy w pełni rozwinięte spotykano na Nizinie Południowowielkopolskiej, zwłaszcza w Kotlinach Kolskiej, Sieradzkiej i Szczercowskiej oraz na Wysoczyźnie Kaliskiej, jak również na Wyżynie Wieluńskiej, Wzgórzach Trzebnickich i Równinie Opolskiej.

Powiązania fitosocjologiczne. Wśród materiałów opublikowanych z Poski do wariantu z *Festuca psammophila* należą dane: Głowackiego (1975): zdj. 15, 17-19 (z tab. 1 określonej przez autora jako *S.-C. festucetosum psammophilae* var. typowy), Czyżewskiej (1986): zdj. 6, 70, 166, 226 (z tab. 4 *S.-C. festucetosum psammophilae*). Do tego syntaksonu należą niektóre zdjęcia zaliczone przez Cieślińskiego (1979) do zbiorowisk ze związku *Koelerion*. Maszynopisy — Sobańskiej (1978): zdj. 7 (z tab. 1 *S.-C. festucetosum psammophilae* var. typowy subvar. z *Thymus serpyllum*).

***Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis cladinetosum mitis* R. Tx. (1928)
1937 em. K. Czyżewska hoc loco
podzespół chrobotkowy**

Syn. *Cladonia impexa*-*Cornicularia tenuissima*-Assoziation Tüxen (1928. Tab. 89), *Corynephoretum cladinetosum* Tüxen (1928) 1937 (1937, Tab.: 56), *Cladonia mitis*-Assoziation Krieger (1937, Tab. 4), *Corynephorus-Cornicularia*-Assoziation Steffen (1931, Tab. 44) p.p.

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 13 (2257) w Tab. VIII (typus subass.)

D: *Cladina mitis*, *Coelocaulon aculeatum*, *Cladonia uncialis*, *Cl. cervicornis* subsp. *verticillata*

Tabela synoptyczna II (tab. 9-12); tabela analityczna VIII; Ryc. 2, 3(C 1-4), 4(9-12), 5(9-12), 8

Charakterystyka ogólna. Optymalne stadium murawy szczotlichowej rozwijające się w obrębie najsuchszych, najuboższych, silnie kwaśnych i kwaśnych, przeważnie luźnych i pofałdowanych piasków eolicznych, glaciów lub rzecznych. Jest to typ murawy zwartej, jednorodnej, długotrwałej i wielkopowierzchniowej, o charakterystycznej przewadze warstwy porostowo-mszystej nad zielną oraz stałym udziałem spontanicznych podrostów drzew i krzewów, zwłaszcza sosen i jałowców. Optimum fitosocjologiczno-ekologiczne osiągają porosty wyróżniające podzespół oraz mech *Polytrichum piliferum*. Występuje często w całej Polsce jako kontynuacja zasięgu zachodnio-środkowoeuropejskiego. Wykazuje zmienność lokalnosiedliskową i regionalną.

Typowa struktura i fizjonomia. Istotną właściwością podzespołu jest trójwarstwowa struktura z przewagą warstwy porostowo-mszystej nad zielną, warstwa krzewiasta osiąga przeciętnie około 4% pokrycia (por. ryc. 3). Wypełnienie przestrzeni wielokrotnie zbliża się do całkowitego. Struktura pozioma jest skupiskowo-synuzjalna. Fizjonomiczną dominantą są synuzje porostów, zwłaszcza jasnoszare podcja *Cladina mitis* z akcentami żółto-zielonkawych plech *Cladonia uncialis* oraz brązowych *Coelocaulon aculeatum* et *muricatum*, *Cetraria* sp. div. lub *Cl. furcata* var. *palamaea*. W części fitocenoz fizjonomiczną przewagę ma ciemnobrązowy mech *Polytrichum piliferum*, którego synuzje wielkością mogą dorównywać synuzjom *Cladina mitis*.

W podzespole słabo zaznaczają się aspekty sezonowe. Wczesnowiosenne, subtelne kwitnienie terofitów — w tym gatunków charakterystycznych i wyróżniających zespół — czy letnie kwitnienie traw oraz innych bylin, jest tutaj maskowane przez obficie występujące porosty. Jedynie w wariancie z *Thymus serpyllum* żywiej zaznacza się aspekt letni, gdy kwitnie macierzanka, kocanki, jastrzębiec lub rozchodniki.

Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna. W poszczególnych fitocenozach występuje średnio od 13 do 19 (24,7) taksonów. Roślin zarodnikowych, zwłaszcza porostów, jest zazwyczaj dwukrotnie więcej niż roślin kwiatowych. Znamienny jest spadek udziału terofitów, nawet do 10,2% (por. ryc. 4) i hemikryptofitów oraz wzrost udziału chamefitów-porostów. Wysoką frekwencję i ilościowość zachowują *Corynephorus canescens* i *Spergula morisonii* (por. ryc. 5), natomiast *Teesdalia nudicaulis* i *Veronica dillenii* (poza var. z *Thymus serpyllum*) nie przekraczają 50% frekwencji. Znamienna jest słabsza niż w innych syntaksonach reprezentacja gatunków charakterystycznych klasy *Sedo-Scleranthetea* i zielnych gatunków towarzyszących, poza podrostami drzew oraz krzewów, zwłaszcza *Pinus sylvestris* i *Juniperus communis*. Optimum fitosocjologiczno-ekologiczne osiągają gatunki wyróżniające podzespół (ryc. 5) oraz *Cladonia furcata* var. *palamaea*. Pod względem ilościowym dominuje *Cladina mitis*. Do podzespołu chrobotkowego należy grupa porostów towarzyszących, z których większość osiąga także swoje optimum rozwojowe, np. *Cladonia phyllophora*, *Cl. gracilis*, *Cl. bacillaris*, *Cetraria islandica*, *Trapeliopsis granulosa*. Wśród mszaków optimum rozwojowe wykazuje *Polytrichum*

Numer kolejny Successive number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numer zdjęcia * Number of record *	354	479	1901	1890	552	566	238	273	2056	267	25
Numer kodu komputerowego Number of computer code	245	804	928	929	103	436	452	573	604	639	67
Data Date	1983 07 28	'84 07 21	'79 06 22	'79 06 22	'84 08 09	'85 05 13	'83 05 31	'83 06 08	'83 07 11	'83 06 07	'73 07 26
Ekspozycja Exposure	S	—	S	—	NE	NW	—	NW	S	S	W
Nachylenie w stopniach Inclination in degrees	10	0	10	0	2	4	0	6	4	6	0
Powierzchnia zdjęcia (m ²) Area of record (m ²)	10	12	10	8	12	15	10	12	12	12	25
Pokrycie warstw (%) Cover of plant layers (%)	b 20 80	1 15 80	— 15 80	5 25 80	+	5 25 80	— 30 80	— 50 90	5 30 90	+	5 40 95
Ogólna liczba gatunków w 1. zdjęciu Total number of species in 1. record	11	20	14	15	24	17	19	24	23	19	19
w tym: kwiatowych (incl.): (phanerogams)	3	9	5	8	6	9	3	10	8	7	6
zarodnikowych (cryptogams)	8	11	9	7	18	8	16	14	15	12	13
Ch, D Ass. <i>Spergula morisonii</i> Boreau in Duchartre <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. in Aiton <i>Veronica dillenii</i> Crantz D geogr.	· · 2.2	1.2 · +2	2.1 + +	2.2 +2 2.2	+2 2.2 ·	2.1 · ·	2.1 · ·	2.2 2.2 ·	2.2 · ·	2.1 +2 +	· +2 ·
D subass. <i>Coelocaulon aculeatum</i> (Schreber) Link <i>Cladina mitis</i> (Sandst.) Hale et Culb. <i>Cladonia cervicornis</i> (Ach.) Flotow subsp. <i>verticillata</i> (Hoffm.) Flotow <i>Cl. uncialis</i> (L.) Wigg.	4.4 1.2 1.2 ·	4.4 2.2 1.2 +2	4.4 2.2 1.2 1.2	3.3 1.2 1.2 ·	4.4 +2 +2 1.2	4.4 1.2 · 2.2	4.4 1.2 +2 1.2	3.3 1.2 1.2 2.2	3.3 +2 1.2 1.2	3.3 1.2 +2 1.2	4.4 1.2 1.2 2.2
Ch <i>Corynephorion canescentis</i> Klika 1931 <i>Coelocaulon muricatum</i> (Ach.) Kärnefelt	· ·	· ·	· ·	· ·	1.2 ·	· ·	· ·	· ·	1.2 ·	· ·	· ·
Ch <i>Corynephorotalia canescentis</i> Klika 1934 em. Krausch 1962 <i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv. <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort. <i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.	1.2 · 2.2	2.2 · 1.2	2.2 1.1 2.2	1.2 1.2 2.2	1.2 · 2.2	2.2 · 1.2	1.2 · 1.2	2.2 · 2.2	1.2 · 2.2	2.2 · 2.2	3.2 · 1.2
Ch <i>Koelerion glaucae</i> Volk 1931 *, <i>Festuco-Sedetalia</i> R. Tx. 1951 em. Krausch 1962 <i>Thymus serpyllum</i> L. * <i>Astragalus arenarius</i> L.	· ·	+2 ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· +2	· ·	· ·	· ·

subass. *cladinetosum mitis* R. Tx. (1928) 1937 em. K. Czyżewska

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	S t a ł o ś ć
511	2257	600	595	529	282	424	407	239	277	349	306	397	469	546	418	534	436	305	
147	305	650	898	128	144	323	435	455	576	606	624	783	807	106	215	127	200	625	
'84 07 30	'83 07 15	'86 08 09	'86 08 07	'84 08 04	'83 06 10	'84 07 05	'84 06 29	'83 05 31	'83 06 08	'83 07 07	'83 06 25	'84 06 21	'84 07 19	'84 08 08	'84 07 04	'84 08 05	'84 07 06	'83 06 25	
SW	NW	W	W	S	SE	SE	—	—	SW	S	W	NW	SW	S	—	SE	NW	W	C o n s t a n c y
20	0	0	0	18	0	20	0	0	0	0	4	2	8	0	0	8	0	6	
12	12	12	12	12	12	12	12	10	12	10	12	12	10	12	12	12	8	12	
— 30 70	5 40 80	+	+	—	+	+	+	5	5	5	+	—	—	5	—	5	—	5	
		40 90	60 80	30 80	10 90	20 80	40 70	40 50	30 90	30 80	30 90	50 70	35 70	30 80	40 70	30 80	50 60	40 80	V II III
23	25	29	26	15	13	15	19	17	20	17	19	23	16	31	27	28	23	29	
8	6	12	13	2	5	3	7	8	7	4	5	8	3	7	7	13	10	10	
15	19	17	13	13	8	12	12	9	13	13	14	15	13	24	20	15	13	19	
1.2 · ·	1.2 +2 +2	1.1 · 1.1	+	1.2 · ·	1.1 · ·	2.2 · ·	3.2 · +	2.1 1.2 ·	1.1 · ·	2.2 · ·	2.2 +2 +	2.1 · +	2.2 · ·	1.2 · +	1.2 · ·	1.1 · 2.1	2.1 3.3 ·	3.3 1.2 +2	V V IV I
2.2 +2	3.3 1.2	3.3 1.2	3.3 1.2	1.2 2.2	1.2 ·	3.3 1.2	3.3 2.2	2.2 1.2	2.2 1.2	2.2 1.2	2.2 +2	3.3 1.2	1.2 ·	2.2 +2	+2 2.2	2.2 2.2	+2 2.2	3.3 1.2	
3.3 ·	1.2 2.3	· 2.2	1.2 2.2	+2 3.3	3.3 1.2	+2 1.2	1.2 ·	+2 1.2	1.2 2.2	+2 2.2	1.2 ·	+2 ·	1.2 ·	1.2 2.2	+2 +2	· 3.3	· 1.2	1.2 +2	
·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.2	·	·	·	
2.2 ·	3.2 ·	2.2 1.1	3.2 ·	2.2 ·	1.2 ·	1.2 ·	2.2 ·	3.2 ·	2.2 ·	1.2 ·	1.2 ·	3.2 ·	1.2 ·	2.2 ·	2.2 ·	2.2 ·	1.2 ·	1.2 ·	V I V
2.2	2.2	2.2	·	3.3	3.3	3.3	2.2	3.3	3.3	3.3	4.4	2.2	3.3	2.2	3.3	2.2	2.2	2.2	
+2 ·	· ·	· ·	1.2 ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· +2	· ·	· ·	I I
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
* <i>Gypsophila fastigiata</i> L. subsp. <i>fastigiata</i>	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
* <i>Silene lituanica</i> Zapal.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
* <i>Festuca psammophila</i> (Hackel ex Čelak) Fritsch	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>F. trachyphylla</i> (Hackel) Krajina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
* <i>Koeleria gluca</i> (Schrader) DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
* <i>Tragopogon floccosus</i> Waldst. et Kit.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
* <i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
* <i>Festuca polesica</i> Zapal.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ch *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955 em. Th. Müller 1961

<i>Hieracium pilosella</i> L.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	+2	.
<i>Rumex acetosella</i> L.	.	.	.	.	1.2	+2	.	.	.	.	.
<i>Jasione montana</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Scleranthus perennis</i> L.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.
<i>Festuca ovina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Rumex tenuifolius</i> (Wallr.) A. Löve	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrader	.	.	.	.	+2	1.2	+2	.	.	.	+2
var. <i>palamaea</i> (Ach.) Nyl.	.	.	1.2	.	+2	.	+2	.	.	.	.
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Rhacomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid.	.	1.2	.	.	+2	.	+2	.	.	1.2	.

Towarzyszące (Accompanying)

Drzewa i krzewy (Trees and shrubs)

<i>Pinus sylvestris</i> L.	b	1.2	1.2	.	1.2	+2	1.2	.	.	1.2	+2	1.2
	c	.	.	.	.	1.2	.	.	+2	.	.	.
<i>Quercus robur</i> L.	c	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.
<i>Betula pendula</i> Roth	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2
<i>Quercus rubra</i> L.	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Q. petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Juniperus communis</i> L.	b	.	.	.	.	.	+2	.	+2	+2	+2	.
	c	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.
<i>Rubus</i> sp. div.	b	.	.	.	.	.	.	.	+2	1.2	.	.

Inne (Others)

<i>Carex ericetorum</i> Pollich	.	.	.	.	.	1.2	+2	.	+2	.	.	.
<i>Solidago virgaurea</i> L.	.	.	.	+2	.	.	.	.	+2	.	.	.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Sprengel	.	+2	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Conyza canadensis* (L.) Cronq. 4, 14; *Hypochoeris radicata* L. 8; *Euphorbia cyparissias* L. 5; *Nardus stricta* L. 11; *Anthoxanthum aristatum* Boiss. 11 (1.2); *Pulsatilla* *Convolvulus arvensis* L. 24; *Equisetum arvense* L. 24; *Silene vulgaris* (Moench) Garcke 24; *Corispermum*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cladonia phyllophora</i> Ehrh. ex Hoffm.	+2	+2	.	+2	1.2	.	+2	1.2	2.2	+2	1.2
<i>Cl. subulata</i> (L.) Wigg.	1.2	.	+2	.	.	+2	+2	1.2	+2	1.2	1.2
<i>Trapeliopsis granulosa</i> (Hoffm.) Lumbsch	+2	.	.	+2	.	.	.	1.2	.	+2	.
<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd.	.	.	.	.	1.2	.	.	+2	2.2	.	+2
<i>Cl. bacillaris</i> auct.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	.	.	.	.	.	+2	1.2	+2	.	+2	.
<i>Cladonia glauca</i> Flk.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Cl. cornuta</i> (L.) Hoffm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Placynthiella uliginosa</i> (Schrader)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Coppins et P. James	.	1.2	.	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Cladonia floerkeana</i> (Fr.) Flk.	.	.	.	.	+2	.	.	+2	+2	+2	.
<i>Cl. fimbriata</i> (L.) Fr.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.
<i>Stereocaulon condensatum</i> Hoffm.	.	+2	2.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladina rangiferina</i> (L.) Harm.	.	+2	.	.	+2	.	.	+2	+2	.	.
<i>Cephaloziella starkei</i> (Funck ex Nees)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Schiffn.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.
<i>Cladonia pleurota</i> (Flk.) Schaerer	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2
<i>Stereocaulon incrustatum</i> Flk.	.	1.2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladonia deformis</i> (L.) Hoffm.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	+2
<i>Cl. squamosa</i> (Scop.) Hoffm.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.
<i>Cladina arbuscula</i> (Wallr.) Hale et Culb.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.
<i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cetraria ericetorum</i> Opiz	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladonia chlorophaea</i> (Flk. ex Sommerf.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sprengel	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.
<i>Cladonia coccifera</i> (L.) Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.

Gatunki sporadyczne (Sporadic species): *Cladonia furcata* (Huds.) Schrader var. *pinnata* (Flk.) Vain. 5, 25; 25, 28; *Ptilidium ciliare* (L.) Hampe 5; *Cetraria ericetorum* Opiz var. *prorumpens* Hillm. 6 (1.2); *Cladonia Cetraria islandica* (L.) Ach. var. *sorediata* (Schaer.) Arnold 10; *Cladonia rangiformis* Hoffm. 11 (+3); *Dicranum scoparium* Hedw. 30.

* Na podstawie badań własnych.

* According to author's data.

Wykaz stanowisk zdjęć fitosocjologicznych List of localities of phytosociological records

- (354) . Kotlina Grabowska. Pałaty, gm. Grabów n. Prosną, woj. kaliskie. Luźne piaski eoliczne. Zbocze wydmy obsadzone 9-letnią sosną.
- (479). Równina Biłgorajska. Między Lipą a Zaklikowem, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Piaski eoliczne. Między samosiewną 20-letnią sosną.
- (1901). Kotlina Szczercowska. Stanisławów I, gm. Szczerców, woj. piotrkowskie. Piaski eoliczne. Stok wydmy między łąką a 25-letnią monokulturą sosnową; pojedyncze jałowce.
- (1890). Kotlina Szczercowska. j.w. Szczyt wydmy z pojedynczymi jałowcami oraz 10–15-letnią sosną.
- (552). Kotlina Gorzowska. Między Miałami a Drawskim Młynem, gm. Wieleń, woj. pilskie. Piaski eoliczne z cienką warstwą próchnicy. Nieużytek poleśny na piaskach wydmowych z samosiewną 3-letnią sosną, otoczony 18-letnią monokulturą sosnową.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
+2	1.2	·	1.2	+2	+2	+2	+2	·	1.2	+2	1.2	1.2	1.2	+2	+2	+2	·	1.2	V
1.2	2.2	1.2	1.2	·	1.2	+2	·	+2	1.2	+2	1.2	+2	2.2	1.2	·	·	+2	2.2	IV
·	+2	+2	1.2	1.2	+2	+2	+2	·	+2	·	·	·	1.2	+2	+2	+2	+2	+2	III
·	+2	+2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	+2	1.2	·	+2	+2	·	·	+2	II
+2	+2	+2	+2	·	·	·	·	·	·	+2	+2	+2	+2	+2	·	·	+2	+2	II
·	+2	+2	·	+2	·	·	·	·	+2	1.2	·	·	1.2	·	·	+2	·	·	II
·	+2	+2	·	+2	·	·	+2	·	+2	·	·	+2	·	1.2	1.2	1.2	·	·	II
+2	·	+2	+2	·	·	·	+2	+2	·	·	+2	+2	·	+2	+2	·	·	1.2	II
·	·	+2	+2	·	·	·	1.2	+2	1.2	·	·	·	+2	+2	·	·	·	·	II
+2	+2	·	·	+2	·	·	·	·	+2	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	II
·	·	+2	+2	+2	·	·	·	·	·	·	·	·	+2	+2	+2	·	+2	+2	II
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	+2	+2	+2	·	·	II
·	+2	·	+2	·	·	·	·	·	·	·	·	+2	·	·	·	·	·	·	II
·	·	·	·	+2	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	+2	1.2	·	1.2	·	I
·	·	·	·	·	·	+2	·	·	·	·	+2	·	·	+2	+2	·	·	+2	I
+2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+2	·	·	+2	·	·	·	·	I
·	·	+2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+2	·	+2	·	·	·	I
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+2	+2	+2	·	+2	I
·	+2	·	·	·	·	·	+2	·	·	·	·	+2	·	·	·	+2	·	·	I
·	·	+2	·	+2	+2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+2	1.2	·	·	I
·	+2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+2	·	I
·	·	·	+2	·	·	·	+2	·	·	·	+2	·	·	·	·	·	·	·	I
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	+2	·	I
·	+2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+2	·	·	·	·	I

Cl. pyxidata (L.) Hoffm. 9, 30; *Placynthiella oligotropha* (Vain.) Coppins et P. James 24 (1.2), 29 (1.2); *Algae furcata* (Huds.) Schrader var. *furcata* 7; *Cl. scabriuscula* (Delise) Leighton 8; *Pycnothelia papillaria* 9 (2.2); *Diploschistes muscorum* (Scop.) R. Sant. 12; *Bryum caespitium* Hedw. 12; *Cladonia coniocraea* auct. 30;

- 6 (566). Dolina Dolnej Narwi. Między Jankowem a Nowogrodem, gm. Nowogród, woj. łomżyńskie. Nasada terasy wysokiej doliny Narwi. Nieużytek poleśny sąsiadujący z 20-letnią monokulturą sosnową i łąką.
- 7 (238). Równina Łowicko-Błońska Okolice Bełchowa, gm. Nieborów, woj. skierniewickie. Piaski luźne eoliczne. Wał wydymowy otoczony bardzo zwartą 20-letnią monokulturą sosnową.
- 8 (273). Równina Radomska. Między Odrzywołem a Kłwowem, gm. Odrzywół, woj. radomskie. Piaski glacyfluwialne. Nieużytek porolny zarastający bardzo rzadką samosiewną, 16–19-letnią sosną, jałowcem i dębem szypułkowym, otoczony 10–12-letnią monokulturą sosnową z pojedynczymi osikami.
- 9 (2056). Wysoczyzna Bełchatowska. Okolice Kaliska, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie. Piaski glacyfluwialne. Nieużytek poleśny z pojedynczymi 10-letnimi sosnami i jałowcami.
- 10 (267). Równina Piotrkowska. Inowłódz, gm. Inowłódz, woj. piotrkowskie. W pobliżu ul. Brzustowskiej. Wysoczyzna od strony prawobrzeżnej części doliny Pilicy. Nieużytek porolny około 10-letni z pojedynczymi 7–8-letnimi sosnami i jałowcem; otoczony 20-letnią monokulturą sosnową.
- 11 (25). Bory Tucholskie. Grunty wsi Szperewnik, blisko jeziora Szperewnik, gm. Tuchola, woj. bydgoskie. Szczyt wzniesienia. Skraj 10-letniej monokultury sosnowej.

- 12 (511). Kotlina Płocka. Okolice Włocławka, woj. włocławskie. Piaski eoliczne. Zbocze wydmy porośniętej samosiewną 3–5-letnią sosną. Między linią kolejową Kutno–Włocławek a 30-letnią monokulturą sosnową. Ślady erozji wodnej.
- 13 (2257). Kotlina Szczercowska. Okolice Żaru, gm. Kluki, woj. piotrkowskie. Piasek eoliczny. Nasada wydmy. Odlesiony nieużytek zarastający samosiewnymi 3–11-letnimi sosnami i jałowcami, sąsiadującymi z 30-letnią monokulturą sosnową z *Calluna vulgaris*. Typ nomenklatoryczny.
- 14 (600). Podlaski Przełom Bugu. Turna Mała, gm. Siemiatycze, woj. białostockie. W pobliżu krawędzi doliny Bugu. Piaski eoliczne. Duża polana pośród 70-letniej monokultury sosnowej. Pojedyncze jałowce i 1–3-letnie siewki sosnowe.
- 15 (595). Równina Łęczynsko-Włodawska. Sobiborski Park Krajobrazowy. Okolice stacji kolejowej Sobibór, gm. Włodawa, woj. chełmskie. Piaski eoliczne. Wydma między 30-letnią monokulturą sosnową a torami kolejowymi. Spontaniczne 4–10-letnie sosny.
- 16 (529). Kotlina Toruńska. Nieszawka Mała, woj. włocławskie. Piaski eoliczne drobnoziarniste na terenie wydmy doliny Wisły; gleba inicjalna o niewykształconym profilu. Zbocze wydmy między drogą do wsi a 50-letnią monokulturą sosnową, porośnięte pojedynczymi 15-letnimi spontanicznymi sosnami.
- 17 (282). Kotlina Płocka. Między Łąckiem a Lucieniem, gm. Gostynin, woj. płockie. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Piaski soliczne. Wydma zarastająca 15-letnią samosiewną sosną i jałowcem. Użytek poleśny otoczony monokulturą sosnową.
- 18 (424). Wzniesienia Żarskie. Grabówek, gm. Lubsko, woj. zielonogórskie. Na E od przystanu PKP. Piaski eoliczne średnioziarniste, gleba inicjalna o niewykształconym profilu. Zbocze wydmy z 6–15-letnią sosną.
- 19 (407). Dolina Dolnej Narwi. Między Borsukami a Zatorami, gm. Zatory, woj. częstochowskie. Piasek luźny, gleba poleśna. Między drogą oddziałową, a odlesieniem w oddziale 225. Pojedyncze 10-letnie sosny i jałowce.
- 20 (239). Równina Łowicko-Błońska. Okolice Bełchowa, gm. Nieborów, woj. skierniewickie. Na NW w kierunku Nieborowa. Piaski eoliczne. Wał wydmy skierowany w stronę rzeki Skierniewki. Rozwiewane pola wydmy zarastające 1–20-letnimi sosnami, jałowcami, brzoza i dębami.
- 21 (277). Równina Radomska. Między Odrzywółem a Klwówem, po prawej stronie szosy do Klwowa, gm. Odrzywół, woj. radomskie. Piasek żwirowy słabogliniasty. Użytek poleśny zalesiony 10-letnią sosną i dębem czerwonym niskiej bonitacji.
- 22 (349). Wysoczyzna Bełchatowska. Tuszyn-Las, gm. Tuszyn, woj. piotrkowskie. Nadleśnictwo Kolumna, uroczysko Molenda, oddział 35s. Piaski eoliczne. Odlesiony wał wydmy zarastający 10-letnią sosną; otoczony 90-letnią monokulturą sosnową z *Festuca ovina*.
- 23 (306). Wzniesienia Łódzkie. Rosanów, rezerwat „Ciosny”, gm. Zgierz, woj. łódzkie. Piaski eoliczne; wśród 25–30-letnich jałowców.
- 24 (397). Kotlina Biebrzańska. Nadleśnictwo Rajgród, leśnictwo Grzędy, oddział 233f, rezerwat „Grzędy”, gm. Rajgród, woj. łomżyńskie. Wydma. Gleba inicjalna o niewykształconym profilu, nieużytkowana od 50 lat; pozbawiona siewek i podrostów drzew.
- 25 (469). Równina Biłgorajska. Na S od Tereszpolu, gm. Zwierzyniec, woj. zamojskie. Piaski eoliczne, gleba inicjalna o niewykształconym profilu. Teren poleśny z pojedynczymi, samosiewnymi sosnami 1–20-letnimi, otoczony 60–80-letnimi monokulturami sosnowymi z *Calluna vulgaris* i *Vaccinium vitis-idaea*.
- 26 (546). Kotlina Gorzowska. Bielice Stare, w pobliżu stacji kolejowej, gm. Drezdenko, woj. gorzowskie. Piaski gruboziarniste sandrowe; gleba inicjalna o niewykształconym profilu. Między 13–18-letnimi samosiewnymi sosnami.
- 27 (418). Bory Dolnośląskie. Trzebów koło Rudawicy, gm. Żagań, woj. zielonogórskie. Piaski gruboziarniste próchniczne, w pobliżu toru kolejowego. Typ nomenklatoryczny.
- 28 (534). Kotlina Toruńska. W pobliżu stacji kolejowej Brzoza, gm. Wielka Nieszawka, woj. toruńskie. Wydma. Piaski eoliczne na terasie wydmy Wisły. Skraj poligonu wojskowego. Użytek poleśny z pojedynczymi samosiewnymi sosnami do 15 lat. Otoczony 70–80-letnimi monokulturami sosnowymi.
- 29 (436). Wzniesienia Gubińskie. Na SE od wsi Chociejęw koło Stargardu Gubińskiego, gm. Gubin, woj. zielonogórskie. Piaski żwirowe (S skraj zlodowacenia bałtyckiego). Brzeg 20-letniej, zwartej monokultury sosnowej między drogą polną a polem owsa.
- 30 (305). Wzniesienia Łódzkie. Rosanów, rezerwat „Ciosny”, gm. Zgierz, woj. łódzkie. Piaski luźne eoliczne na stoku wydmy. Między 25-letnimi jałowcami.

piliferum (ryc. 5). Z gatunków towarzyszących należy wspomnieć o *Cephaloziella starkei* i glonach, roślinach rzadziej dostrzeganych przez badaczy. *S.-C. cladinetosum* jest syntaksonem o znacznej stabilności, rozwijającym się między (6) 10 a 20. rokiem rozwoju muraw. Fitocenozy starsze, do 25 lat, to już schyłkowa faza rozwojowa murawy. Murawa chrobotkowa jest powiązana przede wszystkim z siedliskami borowymi, zwłaszcza z *Cladonio-Pinetum* i kwaśnej dąbrowy.

Charakterystyka siedliskowa. *S.-C. cladinetosum* występuje na najuboższych, najbardziej przemitych lub zdegradowanych piaskach eolicznych, glacifluwalnych, glacialnych i aluwialnych w obrębie wydmy, wysoczyń morenowych i sandrowych, na terasach nadzalewowych i wysokich teras dolin większych i mniejszych rzek. Występują w miejscach płaskich i na wyniesieniach, na zboczach o nachyleniu do 30° i wierzchowinach, suchych, widnych, o różnej wystawie. Częściej są to siedliska poleśne niż porolne: polany lub większe luki w luźnych nasadzeniach sosnowych, 3-18 (20)-letnie nasadzenia sosnowe bardzo niskiej bonitacji, poręby po sztucznych borach sosnowych, jałowczyska na porzuconych polach.

Fitocenozy często spotykane są na glebach inicjalnych o niewykształconym profilu, wytworzonych z głębokich piasków luźnych o niskiej zawartości próchnicy i niewielkich ilościach CaCO_3 (tab. III, V). O wiele rzadziej tworzy się na piaskach słabogliniastych (głównie w wariantach z *Thymus serpyllum*). Odczyn powierzchniowej warstwy gleby waha się od bardzo silnie kwaśnego do lekko kwaśnego i nieco wzrasta w głębszych warstwach profilu glebowego. Rozpoczynają się tutaj procesy glebotwórcze, a chrobotki są głównymi „producentami” próchnicy.

Rozmieszczenie w Polsce. Występuje w całej Polsce (ryc. 8). Jest obecnie najczęściej spotykanym syntaksonem w obrębie *Spergulo-Corynephorum*, a jego charakterystyczne wielkopowierzchniowe fitocenozy można z łatwością zlokalizować o każdej porze roku.

Zmienność podzespołu. *S.-C. cladinetosum mitis* ze względu na swój szeroki zasięg występowania, obejmujący całą Europę Środkową (por. tab. IX), wykazuje w Polsce różnicowanie lokalnosiedliskowe i częściowo regionalne.

var. *typicum* var. nova hoc loco
wariant typowy

Tabela synoptyczna II (tab. 10); tabela analityczna VIII, zdj. 1-15; Ryc. 2, 3(C1), 4(10), 5(10), 8(1)

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 13 (2257) w Tab. VIII (identyczny z typem podzespołu)

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*, *Spergula morisonii*, *Cladina mitis*, *Coelocaulon aculeatum*, *Cladonia uncialis*, *Cl. cervicornis* subsp. *verticillata*, *Polytrichum piliferum*.

IV st. stał.: *Cladonia phyllophora*, *Cl. subulata*

Teesdalia nudicaulis (II), *Veronica dillenii* (II), *Pinus sylvestris* (b-III, c-II), *Juniperus communis* (b-III, c-I).

Fitocenozy wariantu typowego są zwykle wielkopowierzchniowe, zwarte i kilkuwarstwowe (ryc. 3). Dominuje warstwa przyziemna, porostowo-mszysta, której średnie pokrycie dochodzi do 76% (min. 25%, max. 98%). Warstwa zielna nie przekracza średnio 28% pokrycia. Stałym elementem są już spontaniczne siewki i podrosty drzew osiągające wiek do 22 lat.

Śród opisanych jednostek syntakson wyróżnia najniższy udział terofitów (10,2%; por. ryc. 4) i najwyższy — chamefitów-porostów (38,3%). W obrębie gatunków charakterystycznych i wyróżniających zespół oraz związek *Corynephorion*, obniżoną frekwencję wykazuje *Teesdalia nudicaulis* oraz *Veronica dillenii*, natomiast taksony wyróżniające podzespół chrobotkowy znajdują tutaj swoje optimum fitosocjologiczno-ekologiczne (ryc. 5). Facjalnie występuje zwłaszcza *Cladina mitis* i *Cladonia uncialis*. Omawiany wariant skupia liczną grupę porostów towarzyszących, której trzon stanowią: *Cetraria islandica*, *Cladonia phyllophora*, *Cl. subulata*, *Trapeliopsis granulosa*, *Cl. bacillaris*, *Cl. gracilis* i *Cl. glauca*. Fitocenozy z dominacją *Stereocaulon condensatum* (do 75% powierzchni płatów) są postaciami inicjalnymi wariantu typowego.

Murawa chrobotkowa w wariantie typowym rośnie na piaskach eolicznych i aluwialnych — w dolinach większych i średnich rzek, rzadziej na innym podłożu. Są to piaski luźne średnio- i drobnoziarniste, z minimalną zawartością pyłu (do 6%) i części spławialnych; części szkieletowe nie przekraczają 2,5%. Sporadycznie tylko są to piaski słabogliniaste i wówczas części spławialne wzrastają do 7%. Piaski te cechuje bardzo silnie kwaśny odczyn powierzchniowej warstwy gleby, mianowicie kwasowość wymienna wynosi pH w KCl 3,8-4,4, a kwasowość czynna pH w H₂O poniżej 5,4. Jedynie w obszarach piasków zalegających na wapieniach (np. na Wyżynach Wieluńskiej, Kielecko-Sandomierskiej), odczyn może być lekko kwaśny, pH w KCl do 6,0 i wówczas stwierdza się także ślady CaCO₃ (do 0,1%). Zawartość próchnicy waha się od 0,4 do 3,9%.

Fitocenozy wariantu typowego zajmują stanowiska bardzo suche i widne, o wystawie południowej, południowo-zachodniej i zachodniej, rzadko innej; obszary płaskie lub zbocza o nachyleniu do 25°. Są to siedliska wtórne, najczęściej poleśne: skraje monokultur sosnowych i borów, polany śródleśne, zalesione 3-18-letnimi sosnami, jałowczyska. Dość rzadko spotykano stanowiska porolne, 10-20-letnie. Murawa preferuje siedliska boru sosnowego i ubogiego boru mieszanego.

Rozmieszczenie w Polsce. Występuje w całej Polsce, a jej fitocenozy są częste i mogą zajmować znaczne powierzchnie (ryc. 8).

Powiązania fitosocjologiczne. Śród materiałów opublikowanych do wariantu typowego podzespołu chrobotkowego zostały zaliczone dane Cieślińskiego (1979): zdj. 12, 25, 45, 49, 60, 69, 77, 101, 104, 108, 109, 120, 221, 231, 250, 293, 306, 409, 438, 460 (z tab. 2, określonej przez autora jako *Corniculario-Cladonietum*); zdj. 70, 72, 124, 206, 255, 290 (z tab. 3 S.-C. var. typowy i zdj. 7, 12 — var. z *Rhacomitrium canescens*); zdj. 220, 507 (z tab. 5 zbiorowiko z *Polytrichum piliferum*); zdj. 229, 232A, 252, 254, 308, 386, 489 (z tab. 7 Zbiorowisko z *Stereocaulon condensatum*); Cieślińskiego i Halicza (1971): zdj. 7-10 (z tab. 15 *Corynephorretum cladonietosum* var. typowy, zdj. 14 var. z *Thymus*);

Ryc. 8. Rozmieszczenie *Spergulo-Corynephorum* subass. *cladinetosum mitis* w Polsce

Fig. 8. Distribution of *Spergulo-Corynephorum* subass. *cladinetosum mitis* in Poland

1 — var. *typicum*; var. *z* (with) *Polytrichum piliferum*; 2 — postać późniejsza (later phase); 3 — postać wcześniejsza (earlier phase); 4 — var. *z* (with) *Thymus serpyllum*

Czyżewskiej (1986): zdj. 18, 25, 30, 120, 134, 153-156, 186, 188 (z tab. S.-C. *cladonietosum*); Zielińskiej (1967): zdj. 4 (z tab. 12 *Corynephoretum cladonietosum* var. *Stereocaulon incrustatum*). Maszynopisy — Paleskiej (1976): zdj. 3, 5, 11, 16, 22, 34 (z tab. 3 S.-C. *cladonietosum* var. typowy, zdj. 16 var. z *Cornicularia muricata*); Sobańskiej (1978): zdj. 2, 36 (z tab. 1 S.-C. *typicum* var. chrobotkowy).

var. z *Thymus serpyllum* K. Czyżewska in Cieśliński 1979 var. nova
wariant chrobotkowo-macierzankowy

Tabela synoptyczna II (tab. 9); Ryc. 2, 3(C2), 4(9), 5(9), 8(4)

incl. *Corynephoretum cladonietosum* var. z *Thymus serpyllum* Cieśliński i Halicz (1971, tab. 15) p.p., *Spergulo-Corynephoretum* var. *Rhacomitrium canescens-Thymus serpyllum* Cieśliński (1979, tab. 3) p.p., S.-C. *typicum* var. *Thymus serpyllum* Czyżewska (1986, tab. 3) p.p.

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 37 (239) w Tab. 3 in Cieśliński (1979, Wyd. Wyższa Szkoła Pedag., Kielce, Tab. 3) lectotypus hoc loco

D: *Thymus serpyllum*, *Rhacomitrium canescens*

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*, *Cladina mitis*, *Coelocaulon aculeatum*, *Polytrichum piliferum*, *Hieracium pilosella*;

IV st. stał.: *Spergula morisonii*, *Veronica dillenii*, *Cladonia uncialis*, *Cl. cervicornis* subsp. *verticillata*, *Thymus serpyllum*, *Rumex acetosella*, *Cladonia furcata* var. *palamaea*, *Cl. phyllophora*.

Teesdalia nudicaulis (III), *Rhacomitrium canescens* (III), *Carex arenaria* (I).

W Polsce jest to częsty typ fitocenoz, które swym składem florystycznym nawiązują z jednej strony do wariantu typowego podzespołu chrobotkowego, z drugiej zaś — do wariantu typowego podzespołu macierzankowego, co przejawia się najwyższą ogólną liczbą gatunków w jednym zdjęciu (tab. II, ryc. 3), przy wyrównanym udziale taksonów naczyniowych ($\bar{x}$ = 12,3; min. 4, max. 26) i zarodnikowych ($\bar{x}$ = 12,4; min. 2, max. 25). Ogólnie zwiększa się udział terofitów i hemikryptefotów (ryc. 4) oraz gatunków subkontynentalnych i subkserotermicznych. Stale jest obecna *Veronica dillenii*.

Wariant występuje na piaskach eolicznych, zwirowych i rzecznych. Są to zasobniejsze w składniki odżywcze piaski luźne i słabogliniaste. Wyróżnia je zawartość części szkieletowych do 2,3%, części ziemistych z piaskami średnio- i drobnoziarnistymi z domieszką pyłu maksymalnie do 28% i części spławialnych do 10%. Często można stwierdzić ślady CaCO_3 wzrastające w głąb profilu glebowego. Zwiększa się także zawartość fosforu, potasu i innych pierwiastków, a zawartość próchnicy dochodzi do około 3%.

Płaty wariantu chrobotkowo-macierzankowego spotykane są często na południowych i zachodnich zboczach wydm, pagórków morenowych lub wyższych teras rzecznych, o nachyleniu do 28°, na stanowiskach poleśnych i porolnych,

w miejscach odlesionych, rozwiewanych, rozjeżdżonych. Charakterystyczny jest udział spontanicznej sosny i jałowców od 2 do 20-letnich (ryc. 3).

Platy wariantu są przestrzennie powiązane ze zbiorowiskami ze związku *Armerion* i *Koelerion*, a sam wariant preferuje siedliska boru mieszanego, świetlistej i kwaśnej dąbrowy oraz subkontynentalnych borów sosnowych. Jest to typ murawy charakterystyczny dla polskiej części *Spergulo-Corynephorum*. Choć występuje w całej Polsce (ryc. 8), to jednak najbardziej znamieny jest dla Nizin Środkowopolskich, Wyżyn Śląsko-Krakowskiej i Środkowomłopolskiej, Wysoczyń Podlasko-Białoruskich i Pojezierzy Wschodniobałtyckich.

Powiązania fitosocjologiczne. Do omawiano wariantu włączone niektóre materiały publikowane Babczyńskiej (1978): zdj. 157 (z tab. 9 określonej jako *Spergulo-Corynephorum*); Cieślińskiego (1979): zdj. 92, 242, 318, 323 (z tab. 3. S.-C. var. typowy, zdj. 11, 30, 37, 43, 113, 201, 202, 208, 224, 230, 238, 239 (typ nomenklatoryczny), 244, 246, 248, 253, 268, 286 — var. *Rhacomitrium-Thymus*), zdj. 504, 509 (z tab. 10 *Festuco-Koelerietum*); Cieślińskiego i Halicza (1971): zdj. 13, 16 (z tab. 15 *Corynephorum cladonietosum* var. z *Thymus*); Czyżewskiej (1986): zdj. 39, 162 (z tab. 2. S.-C. *typicum* var. *typicum*, zdj. 41, 118, 122, 125, 175 — var. z *Thymus*), zdj. 117, 158, 185 (z tab. 3 S.-C. *cladonietosum*), zdj. 19 (z tab. 4 S.-C. *festucetosum ovinae*), zdj. 32A, 174 (z tab. 4 S.-C. *festucetosum psammophilae*); Endlera i Polakowskiego (1978): zdj. 19, 29, 30, 34 (z tab. 2. S.-C. [*cladonietosum*]); Głowackiego (1975): zdj. 23 (z tab. 1 S.-C. *festucetosum psammophile* var. chrobotkowy); Kornasia (1957): zdj. 5, 13 (z tab. 1 *Corynephorum*, stadia optymalne i terminalne); Libberta (1933): zdj. 10, 14 (z tab. 21 *Corynephorum typicum*, faza optymalna); Wiki (1975): zdj. 42, 43 (z tab. 5 S.-C. *festucetosum ovinae* var. chrobotkowy subvar. z *Cladonia verticillata*); Zielińskiej (1967): zdj. 3 (z tab. 14 *Corynephorum cladonietosum* var. *Cladonia rangiformis*). Maszynopisy — Babczyńskiej-Sendek (1984): zdj. 14, 221, 273, 627 (z tab. 50 S.-C. var. *Cladonia* subvar. typowy, zdj. 230, 276, 279 — subvar. z *Thymus*); Jankowskiego (1977): zdj. 22 (z tab. 4 S.-C. *festucetosum psammophilae*); Paleskiej (1976): zdj. 13 (z tab. 3 S.-C. *cladonietosum* var. typowy); Sobańskiej (1978): zdj. 6 (z tab. 1. S.-C. *festucetosum psammophilae* var. chrobotkowy subvar. z *Thymus*).

var. z *Polytrichum piliferum* var. nova hoc loco wariant z płonikiem włosistym

Tabela synoptyczna II (tab. 11, 12), tabela analityczna VIII, zdj. 16-30; Ryc. 2, 3 (C3, 4), 4 (11, 12), 5 (11, 12), 8 (2, 3)

incl. Zbiorowisko z *Polytrichum piliferum* Cieśliński (1979, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagog., Kielce, tab. 5) p.p.

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 27(418) w Tab. VIII (typus var.)

D: *Polytrichum piliferum*, *Cladonia furcata* var. *palamaea*

Edyfikacyjna kombinacja gatunków:

V st. stał.: *Corynephorus canescens*, *Spergula morisonii*, *Cladonia mitis*, *Coelocaulon aculeatum*, *Cladonia uncialis*, *Polytrichum piliferum*.

IV st. stał.: *Cladonia cervicornis* subsp. *verticillata*, *Cl. furcata* var. *palamaea*, *Cl. phyllophora*, *Cl. subulata*, *Trapeliopsis granulosa*.

Teesdalia nudicaulis (II), *Veronica dillenii* (I), *Carex arenaria* (I).

Jest to postać fitocenozy, gdzie *Polytrichum piliferum* osiąga swoje optimum fitosocjologiczno-ekologiczne (por. ryc. 5) Płonnikowi towarzyszy bardzo liczna grupa mszaków i porostów (tab. II), co powoduje utrzymanie charakterystycznej dla podzespołu chrobotkowego dwukrotnej przewagi roślin zarodnikowych (od (5) 8 do 24 gatunków) nad naczyniowymi (od 2 do 13 gatunków) w jednym zdjęciu. Zachowana jest także charakterystyczna trójwarstwowość fitocenoz (ryc. 3).

Polytrichum piliferum rośnie facjalnie, co — biorąc pod uwagę jego brunatne zabarwienie — z łatwością pozwala lokalizować takie płaty. Często towarzyszą mu inne taksony o podobnym zbarwieniu, m.in. *Cladonia furcata* var. *palamaea*, *Coeloculon aculeatum*, *Placynthiella uliginosa*, *Cephaloziella starkei* (przeoczany wątrobowiec), *Polytrichum juniperinum* i in. Stałym składnikiem są także inne porosty: *Cladonia phylophora*, *Cl. subulata*, *Cl. pleurota*, *Cl. bacillaris*, *Trapeliopsis granulosa*.

Cechą szczególną jest lokalizacja tych fitocenoz, mianowicie zajmują one wszelkie lokalne zagłębienia terenu, naturalne i antropogeniczne, nasady wydym blisko torfowisk lub oczek wodnych, skraje monokultur sosnowych, zwłaszcza starszych, polany i luki w monokulturach sosnowych 20-40-letnich, nasadzenia sosnowe, odlesienia otoczone wysokimi drzewami itp. Być może ważny jest tutaj zwiększony wpływ klimatu subatlantyckiego.

Wariant występuje głównie na piaskach eolicznych, na wydymach o nachyleniu zboczy do 25° i o różnej ekspozycji (rzadko południowej). Spotykany jest także na piaskach rzecznych w dolinach większych rzek (Wisły, Narwi, Warty) i mniejszych (Bóbr, Lubsza, Skierniewka) oraz na piaskach żwirowych sandrów i pagórów morenowych. Preferuje piaski luźne średnio- i drobnoziarniste, z minimalną domieszką pyłów i ilów, czasami ze śladami CaCO_3 i zawartością próchnicy od 0,3 do 1,7%. Odczyn powierzchniowych warstw podłoża jest silnie kwaśny do kwaśnego, tylko na wapiennych wyżynach — słabo kwaśny, tj. pH w KCl od 3,7 do 5,6, a pH w H_2O od 4,4 do 6,6. Gleby mają najczęściej charakter inicjalny, zwłaszcza gdy następuje częste wymywanie, rozwiewanie lub przekopywanie piasków.

Fitocenozy płonnikowe zajmują stanowiska przeważnie wtórne, poleśne i czasami porolne. Są to siedliska boru mieszanego i borów sosnowych lub kwaśnych dąbrów i buczyn.

W Polsce, poza postacią opisaną (tab. 11 w tab. II, nazwana postacią późniejszą), występują także postaci wcześniejsze wariantu (tab. 12 w tab. II). Postaci wcześniejsze cechuje najniższa liczba gatunków spośród wyróżnionych syntaksonów ($\bar{x} = 13,1$), w tym roślin naczyniowych ($\bar{x} = 5,7$) i ogólnie hemikryptofitów (ryc. 3, 4). Optimum rozwojowe osiąga tutaj *Coelocaulon aculeatum*. Spontaniczne sosny i brzozy mają tutaj od 3 do 10 (12) lat, a w postaci późniejszej — od 6 do 18 (20) lat.

Rozmieszczenie w Polsce. Wariant z *Polytrichum piliferum* występuje w całej Polsce (ryc. 8), ale częściej jest spotykany w Polsce Zachodniej i Środkowej niż Wschodniej.

Powiązania fitosocjologiczne. Do wariantu z *Polytrichum*, postaci wcześniejszej, zostały włączone publikowane materiały Cieślińskiego (1979): zdj. 23, 414, 421 (z tab. 2 określone przez autora jako *Corniculario-Cladonietum*), zdj. 110, 147 (z tab. 5 zbiorowisko z *Polytrichum piliferum*), zdj. 350 (z tab.

7 zbiorowisko z *Stereocaulon condensatum*); Cieślińskiego i Halicza (1971): zdj. 1-4 (z tab. 15 *Corynephoretum cladonietosum* var. *typicum*); Czyżewskiej (1986): zdj. 81, 130, 163, 181 (z tab. 2 *S.-C. typicum* var. *typowy*, zdj. 124 — var. z *Thymus*); Głowackiego (1975): zdj. 9-14 (z tab. 1 *S.-C. typicum* var. *chrobotkowy*, zdj. 24 — *festucetosum psammophilae* var. *chrobotkowy*); Libberta (1933): zdj. 7, 8 (z tab. 21 *Corynephoretum typicum* faza optymalna); Wiki (1975): zdj. 61 (z tab. 5 *S.-C. typicum* var. *chrobotkowy*, zdj. 70 — *S.-C. festucetosum ovinae* var. *chrobotkowy* subvar. *typowy*, zdj. 55, 56, 58 — subvar. *Cladonia verticillata*); Zielińskiej (1967): zdj. 506 (z tab. 10 *Corynephoretum cladonietosum* var. *Stereocaulon condensatum*), zdj. 2 (z tab. 14 *Corynephoretum cladonietosum* var. *Cl. rangiformis*). Maszynopisy — Babczyńskiej-Sendek (1984): zdj. 138 (z tab. 50 *S.-C.* var. *chrobotkowy*, podwar. *typowy*); Jankowskiego (1977): zdj. 12, 16, 20, 21 (z tab. 4 *S.-C. festucetosum psammophilae*); Paleskiej (1976): zdj. 4 (z tab. 3 *S.-C. cladonietosum* var. *typicum*); Sobańskiej (1978): zdj. 29 (z tab. 1 *S.-C. typicum* var. *chrobotkowy*). Niepublikowane — Balcerkiewicz i Celińskiego z Puszczy Bukowej pod Szczecinem: zdj. 22, 39, 46, 48, 52.

Do postaci późniejszej zaliczono materiały Cieślińskiego (1979): zdj. 151, 317, 319, 320 (z tab. 3 *S.-C.* var. *typowy*); Czyżewskiej (1986): zdj. 10 (z tab. 3 *S.-C. cladonietosum*), zdj. 182 (z tab. 4 *S.-C. festucetosum ovinae*); Endlera i Polakowskiego (1978): zdj. 8, 46 (z tab. 2 *S.-C. [cladonietosum]*). Maszynopisy — Paleskiej (1976): zdj. 1, 2, 6, 9, 10, 12, 14, 19, 27-29, 31, 32, 38, 39 (z tab. 3 *S.-C. cladonietosum* var. *typowy*, zdj. 2, 12 — var. z *Cornicularia muricata*); Sobańskiej (1978): zdj. 17 (z tab. 1. *S.-C. typicum* var. *chrobotkowy*).

ANALIZA *SPERGULO MORISONII-CORYNEPHORETUM CANESCENTIS* NA OBSZARZE POLSKI

8. Dyskusja wyników

8.1. Charakterystyka zespołu roślinnego

Spergulo-Corynephorum należy do typu roślinności pionierskiej, a w fitocenozach tego zespołu całkowicie realizują się wszystkie cechy pionierskich układów roślinnych (Rychnovská-Soudková 1961, Tüxen 1962, Marshall 1965, 1967, Symonides 1974a, b, c, d, 1977, 1978a, b, c, 1979a, b, c, 1985a, 1987, Wilkoń-Michalska i Symonides 1974, Collier et al. 1978, Falińska i Żyromska-Rudzka 1986, Kornaś i Medwecka-Kornaś 1986, Falińska 1990; patrz 1. Wstęp).

Roślinność taka może zaistnieć tylko w obrębie nieutrwalonych (sypkich), bezwodnych, bardzo kwaśnych i kwaśnych oligotroficznych piasków śródlądowych. Kwaśność i skąpożywność piasków jest uwarunkowana przemysłowym typem gospodarki wodnej w klimacie oceanicznym oraz czynnikami antropogenicznymi, głównie gospodarką leśną monokulturami sosnowymi, ale także „kwaśnymi” deszczami. W przejściowym klimacie Polski zaznacza się jednak nieciągły wpływ klimatu subkontynentalnego i związana z tym wyższa zasobność piasków w składniki pokarmowe, co wpływa na pewną odmienność fitocenoz z polskiego zasięgu *Spergulo-Corynephorum*.

Wszystkie fitocenozy silnie łączy szczotlicza siwa *Corynephorus canescens*, która ma tutaj optymalne warunki rozwoju oraz *Spergula morisonii*, *Teesdalia nudicaulis* i inne terofity, jak również kserofilne taksony roślin zarodnikowych (ryc. 4, 5).

Corynephorus canescens, jako (sub)atlantycki gatunek wieloletni, bardzo wyraźnie reaguje na kaprysy klimatu przejściowego Polski. Po ostrych zimach można obserwować obumieranie trawy, np. pod Zaklinowem, na Nizinie Białgorajskiej, w latach 1984-1985 obumarła populacja szczotliczy występowała na przestrzeni kilkuset hektarów. Krausch (1968), opisując podobne zjawisko z Brandenburgii, sugeruje, iż w takich wypadkach w mniejszym stopniu działa przemrożenie, a bardziej wysuszenie przez wiatr. Żywotność szczotliczy i całego *Spergulo-Corynephorum* osłabiają także ciepłe i suche lata. Natomiast po łagodnych zimach oraz w czasie chłodnego i wilgotnego lata zespół odznacza się bardzo dobrą kondycją i rozprzestrzenią się.

Jako zjawisko naturalne należy traktować obecność siewek i podrostów drzew lub krzewów. Są to zaczątki warstwy krzewiastej (i przyszłego lasu), widoczne od około 5. roku rozwoju muraw, zwłaszcza w serii sukcesji wtórnej, na siedliskach poleśnych i w kontakcie z monokulturami lub borami sosnowymi (por. ryc. 3, 9).

Gałkowice St.k. Bełchatowa (Polska Środkowa)
(near Bełchatów, Central Poland)
Lipiec (July) 1980

○ ○ - <i>Corynephorus canescens</i>	+ - <i>Calluna vulgaris</i>
▲ - <i>Spergula morisonii</i>	↑ - <i>Pinus sylvestris</i>
■ - <i>Agrostis capillaris</i>	✎ - <i>Juniperus communis</i>
/ - artefakty (artefacts)	

Ryc. 9. Sześcioletnia fitocenoza *Spergulo-Corynephoretum typicum* rozwijająca się na odlesionej wydmie
 Fig. 9. Phytocoenose of *Spergulo-Corynephoretum typicum* (6 years old) on unforest dune

Przestrzenna struktura pozioma jest wyraźnie skupiskowa (por. Symonides 1979b, 1985a, Andrzejewski i Symonides 1986, także ryc. 9), co ma tutaj podstawowe znaczenie przy utrwalaniu suchego i sypkiego piasku. Występują także fitocenozy z rozłogową *Carex arenaria* (np. w Kolinach Gorzowskiej i Toruńskiej), która reprezentuje typ równomiernego rozkładu przestrzennego, warunkowany morfologiczno-biologicznymi właściwościami gatunku (por. Symonides l.c.).

Przyjęła się opinia, iż *Spergulo-Corynephoretum* to zespół skrajnie ubogi w gatunki (por. Passarge 1960, Korneck in Oberdorfer 1978 i in.). Badania niniejsze korygują dotychczasowe poglądy (tab. II, ryc. 3). W jednym zdjęciu występuje przeciętnie od 13 do 25 taksonów, ale sumy taksonów w tabelach wynoszą od 90 do 207, z tego na kwiatowe przypada od 61 do 131 taksonów, a na zarodnikowe — od 24 do 58 taksonów. Tak wysokie liczby w tabelach wskazują na bardzo duży udział taksonów przypadkowych różnego pochodzenia (wielkość obiektu badań lub powierzchni zdjęcia, pochodzenie zasiedlonego siedliska). Jest to zjawisko naturalne dla typu biocenozy otwartej i niestabilizowanej. Faktycznie, spośród 250 taksonów naczyniowych, znaczenie fitocenotwórcze lub edyfikacyjne ma zaledwie około 30, z 61 taksonów porostów — około 12, a z 31 taksonów mszaków — 5 lub 6 (por. także Faliński 1986). W każdym badanym płacie jest przede wszystkim o wiele więcej gatunków zarodnikowych niż podaje większość badaczy takich muraw. Nerozpoznawanie roślin zarodnikowych, zwłaszcza porostów i „drobnych” taksonów naczyniowych, należy traktować jako błąd merytoryczny. Fitocenozy 1-3 gatunkowe to najwcześniejsze stany płatów inicjalnych i nie powinny być uwzględniane (jeśli autor nie zakłada badań właśnie takich przypadków).

Powierzchnia minimalna wynosi 4-10 m² dla podzespołu typowego (por. także Kornaś 1957), zaś dla fitocenz bardziej zaawansowanych w rozwoju — 8-12 (15) m² (por. także ryc. 10, 11).

Na obszarze Polski *Spergulo-Corynephoretum* jest zadomowiony na tyle, że wykazuje zróżnicowanie wewnętrzne w trójosiowym systemie zmienności: lokalnosiedliskowe, geograficzne (patrz 8.3) i dynamiczne. Wszystkie typy zmienności mogą być modyfikowane przez czynniki antropogeniczne.

Lokalna zmienność siedliskowa dzieli zespół na trzy podzespoły: *S.-C. typicum* (na piaskach od bardzo silnie kwaśnych do kwaśnych), *S.-C. cladinetosum mitis* (na piaskach od silnie kwaśnych do lekko kwaśnych) i *S.-C. thymetosum serpylli* (na piaskach od silnie kwaśnych do obojętnych) (tab. III, V). Wszystkie zespoły wykazują zmienność (warianty).

Podzespół typowy inicjuje proces zarastania i utrwalania nagich piasków śródlądowych. W tym podzespole, a zwłaszcza w jego wariancie typowym, realizują się najpełniej wszystkie cechy ekosystemu pionierskiego, a zwłaszcza wybitnie prymitywna struktura przestrzenna — z dobrze wykształconą tylko warstwą zielną (od 30 do 70% pokrycia) i skąpą warstwą mszysto-porostową, osiagającą od (+) 5 do 20% pokrycia i nigdy nie przekraczającą 45%; najwyższy udział terofitów oraz najniższa liczba taksonów w jednym zdjęciu (najmniej 5, $\bar{x}$ = 13,3), a także taksonów naczyniowych (najmniej 3, $\bar{x}$ = 10,1) i zarodnikowych (najmniej 1, $\bar{x}$ = 3,2) (por. tab. II, ryc. 3-5).

W podzespole typowym znamienne jest wybijanie się grupy gatunków kwiatowych w procesie kolonizacji i utrwalania piasków, dzięki ich specjalnym właściwościom morfologiczno-biologicznym (Andrzejewski i Symonides 1986 i in.). Taksony zarodnikowe, choć ich łączna liczba sięga 56, a w jednym zdjęciu występuje od 1 do 15, rozpoczynają osiedlanie się dopiero pod osłoną tych pierwszych. Jakościową przewagę mają porosty (łącznie 40 taksonów) nad mszakami (ryc. 4, tab. II, IV). Wśród porostów walor gatunku wybitnie inicjalnego, utrwalającego skąpo porośnięte, rozwiewane piaski, ma początkowo *Placynthiella uliginosa*. Jest to często niezauważany porost skorupiasty, który wiążąc ziarna piasku może tworzyć charakterystyczną odmianę. *P. u.* var. *chthonoblastes*, uwypukloną w części środkowej, a przez badaczy niemieckich nazywaną „Sandküchen”. Zwracają uwagę słabo zbadane plechy kserofilnych glonów, symbiontów m.in. *P. uliginosa* (por. Zielińska 1967). *P. uliginosa* rozpoczyna proces utrwalania podłoża równoległe z *Corynephorus canescens*. Dopiero po nich wkracza *Coelocaulon aculeatum* (ale jego frekwencja nie przekracza 29% badanego zbioru; por. ryc. 5). Pozostałe porosty, choć już występują w podzespole typowym, to optima socjologiczno-ekologiczne osiągają w innych syntaksonach, podobnie jak *Polytrichum piliferum* i *Ceratodon purpureus*.

Ważny jest także udział porostów wytwarzających obficie soredia, głównie na plechach wtórnych, podecjach, np. *Cladonia glauca*, *Cl. subulata*, *Cl. fimbriata* i in. Te elementy wegetatywnego rozmnażania bardzo żywo intensyfikują proces kolonizacji luźnych piasków.

Podzespoły macierzankowy i chrobotkowy są bardziej zaawansowane w rozwoju, bardziej zwarte i bogatsze w gatunki (ryc. 3, 4, tab. II). *S.-C. thymetosum* skupia równocześnie rośliny suboceaniczne, subkontynentalne oraz ciepłolubne (z dominacją chamefitów) i w obrębie *Spergulo-Corynephorum* jest murawą najbardziej mezofilną, przywiązaną do siedlisk zasobniejszych w składniki pokarmowe. Uruchamiane są już procesy próchnicotwórcze, zwłaszcza w fitocenozach bogatszych w rośliny kwiatowe. W podzespole chrobotkowym porosty przejmują rolę w kolonizowaniu piasków, a także konkurują ze szczotliwą siwą, ograniczając jej ilościowość (i biomasę, por. Symonides 1985c), ale nie frekwencję (ryc. 5). Jest to murawa prawie zwarta. Wypełnienie przestrzeni, zwłaszcza przez synuzje roślin zarodnikowych, jest na tyle duże, że utrudnia wnikanie innych roślin. Mimo dużego zwarcia roślinności murawa chrobotkowa przejawia nadal silny kseryzm, co pozostaje m.in. w związku z poikilohydryzmem porostów. Nieco dłużej wilgotność utrzymuje się w wariacie z *Polytrichum piliferum*, do czego przyczynia się m.in. specjalna lokalizacja (por. także Wilkoń-Michalska i Symonides 1974). Struktura pionowa jest już trójwarstwowa. Obecność siewek i podrostów drzew oraz krzewów jest integralną częścią fitocenozy (sprzyjającą ich rozwojowi), co udowodnił Faliński (1980a, 1986), choć sam autor nie jest zwolennikiem jedności biocenotycznej tych fitocenz.

Hohenester (1967) zwraca uwagę na powiązanie muraw chrobotkowych z takimi warunkami lokalnymi, które sprzyjają wymywaniu gleby, np. z brzegami lasów albo z miejscami, gdzie podłoże jest silniej zakwaszone przez uprzednie

Ryc. 10. Powierzchnia minimalna *Spergulo-Corynephoretum cladinetosum*

Fig. 10. Minimal Area of *Spergulo-Corynephoretum cladinetosum*

Miejscowości (localities): 1 — Toruń-Glinki (Kotlina Toruńska — Toruń Basin); 2 — Wólka Łęawska; 3 — Gałkowice Stare (Wysoczyzna Bełchatowska — High Plain, Central Poland)

Ryc. 11. Powierzchnia minimalna *Spergulo-Corynephoretum cladinetosum* — udział syntaksonów

Fig. 11. Minimal Area of *Spergulo-Corynephoretum cladinetosum* — participation of syntaxa

zalesienie sosną (nierzadko częstsze niż jednokrotne), z czym należy się zgodzić. Zaczynają się procesy glebotwórcze, a chrobotki są głównymi „producentami” próchnicy.

Spergulo-Corynephorum rozpoczyna na piaskach śródlądowych sukcesję roślinności zmierzającą ku trwałym lasom. Jednakże jego rozwój w wyniku sukcesji pierwotnej jest dzisiaj w Polsce zjawiskiem dość rzadkim, choć spotykanym, m.in. w Kotlinach Toruńskiej i Biebrzańskiej, na odsłoniętych piaskach w piaskowniach, w kopalnictwie odkrywkowym, przy zdejmowaniu nadkładu piaszczystego itp. Najczęściej uczestniczy w sukcesji wtórnej i wówczas może być traktowany jako półnaturalne zbiorowisko zastępcze.

Wszystkie typy murawy psammofilnej wykształcone w wyniku sukcesji wtórnej rekreatywnej (w sensie Falińskiego 1986) są efektem przemian środowiska przyrodniczego pod wpływem długotrwałej działalności człowieka. Zajmowane wówczas przez *Spergulo-Corynephorum* siedliska są wybitnie oligotroficzne. Degradacja siedlisk może być wynikiem wielokrotnego nakładania się różnych czynników antropogenicznych na siedliska z natury ubogie: porolne, poleśne, po kilku zrębach zupełnych i zalesionych sosną oraz użytkowanych w inny, czasami nieznany sposób. Każdy typ użytkowania obniżał wartość potencjału produkcyjnego siedlisk, zwłaszcza zalesienie sosną, co zwiększało możliwości spontanicznego rozprzestrzeniania się tych muraw.

Spergulo-Corynephorum trwa jako murawa około 25 lat, co wykazał Faliński (1980a, b, 1986) i potwierdziły badania własne. W tym czasie zespół szybko ulega sukcesyjnym przeobrażeniom, które Faliński (1980a) — datując spontaniczne rozwijającymi się jałowcami w sukcesji muraw na tzw. nieużytkach porolnych — wydzielił w sześć faz (por. ryc. 12). Wydzielone fazy sukcesji w Polsce Północno-Wschodniej na siedliskach porolnych były w dużym przybliżeniu powtarzalne w Polsce Środkowej, w murawach rozwijających się na siedliskach poleśnych i datowanych rocznymi przyrostami okółków *Pinus sylvestris* (Czyżewska npl.).

Fazy 1-4 (od 1 do 15 lat rozwoju murawy) odpowiadają stadium inicjalnemu. W tym czasie całkowicie realizuje się *S.-C. typicum*, od (5) 7. roku rozwija się *S.-C. thymetosum*, zaś od (6) 10. roku — *S.-C. cladinetosum* (por. ryc. 13, 14). Fazy 5 i 6 (od (12) 14. do 25. roku) — to stadium optymalne rozwoju podzespołów macierzankowego i chrobotkowego. Ich stadia terminalne rozpoczynają się powyżej 22. roku rozwoju murawy i zbiegają się z końcem fazy 6 i początkiem fazy 7 (zarośli, czyli młodego lasu).

Stadium inicjalnemu towarzyszy charakterystyczne wzbogacanie gatunkowe i wzrost zróżnicowania struktury przestrzennej (por. Faliński 1980a, 1986, Symonides 1985c, 1986, Symonides i Borowiecka 1985).

Fazy 1-4 to również czas inwazji i kolonizacji sosny zwyczajnej oraz innych drzew i krzewów. Sosna z samosiewu pojawia się w fazie 2, tj. między 2 a 5. rokiem rozwoju murawy i w fazach następnych osiąga już wysokość odpowiadającą warstwie podszytu. W fazie 3., tj. między 5 a 10. rokiem rozwoju murawy zjawiają się siewki jałowców i dębów szypułkowych, które między 9 a 15. rokiem mają już

Ryc. 13. Transekt poziomy. Kalisko (Wysoczyzna Bełchatowska) 1983.07.11

Fig. 13. Horizontal transect. Kalisko (High Plain Bełchatów, Central Poland). 1983.07.11

1 – *Pinus sylvestris* i jej wiek oraz zasięg gałęzi, pod którymi rozwija się roślinność (*Pinus sylvestris*, its age and the range of branches under which the other plants are growing); 2 – *Juniperus communis*; 3 – *Rubus* sp. div.; 4 – *Spergulo-Corynephorretum typicum*; 5 – *S.-C. cladinetosum*; 6 – monokultura sosnowa (*Pinus* monoculture); 7 – piasek bez roślinności lub warstwa igieł (sand without vegetation or the layer of fallen needles)

Pomiar światła (Lx): 1984.08.28, 15:57^h, niebo bezchmurne Measurement of the light (Lx): 1984.08.28, 15:57^h, the cloudless sky

Ryc. 14. Transekt poziomy. Rząsawa (Wysoczyzna Bełchatowska). 1983.07.20

Fig. 14. Horizontal transect. Rząsawa (High Plain Bełchatów, Central Poland). 1983.07.20

1 – *Pinus sylvestris* i jej wiek oraz zasięg gałęzi, pod którymi rozwija się roślinność (*Pinus sylvestris*, its age and the range of branches under which the other plants are growing); 2 – *Juniperus communis*; 3 – *Quercus robur*; 4 – *Sparganotheca thymetorum*; 5 – *S.-C. typicum*; 6 – *S.-C. cladinetosum*; 7 – monokultura sosnowa (*Pinus* monoculture); 8 – piasek bez roślinności lub warstwa opadłych igieł (sand without vegetation or the layer of fallen needles)

Pomiar światła (Lx): 1984.08.28, 14:30^h, niebo bezchmurne

Measurement of the light (Lx): 1984.08.28, 14:30^h, the cloudless sky

zróżnicowaną stratyfikację. W tym czasie kształtuje się komplet gatunków roślin kwiatowych i zarodnikowych oraz dochodzi do daleko posuniętego utrwalenia podłoża. Zatem w sukcesji wtórnej rekreatywnej zarówno sosna, jak i jałowiec, wkraczają wcześniej na siedliska poleśne niż na porolne (por. Faliński 1980a), co należy wiązać z obecnością diaspor pochodzących z otaczających monokultur i borów sosnowych. Gatunki drzewiaste i krzewiaste jako zaczątek przyszłego lasu, odgrywają ważną rolę w rozwoju *Spergulo-Corynephorum*. Ich znaczenie polega przede wszystkim na stopniowej zmianie warunków mikroklimatycznych — świetlnych i wilgotnościowych (por. ryc. 13-16, także Faliński 1986), co prowadzi do wycofywania się wybitnie światłolubnych i sucholubnych gatunków murawowych i zajmowania ich miejsca przez, w różnym stopniu mezofilne mchy i porosty.

Szczegółowe badania wykonane w Polsce Północno-Wschodniej pozwoliły skorygować przyjęte mniemanie, że w rozwoju roślinności od murawy napiaskowej do boru, mszaki borowe wnikają bardzo późno, tj. od fazy 7 (od 25. roku rozwoju), czyli w bardzo młodym lesie. Badania dowodzą, że mszaki borowe wnikają o wiele wcześniej do fitocenozy murawowych (ryc. 12) i można stwierdzić je wraz z obecnością 8-10-letnich sosen i jałowców, choć sporadycznie pojawiają się jeszcze wcześniej. Warto o tym pamiętać, gdy pionierskie murawy stają się obiektem badań fitosocjologicznych. Taki sam wczesny, jednostkowy udział wykazują borowe porosty, zwłaszcza *Cladina rangiferina* i *C. arbuscula* (wg niepublikowanych danych Cieślińskiego i badań własnych; por. tab. II). Gatunki borowe w murawach nigdy nie przekraczają 5% pokrycia. Badania te potwierdziły również, że w fazie zarośli (jałowcowo-osikowych), charakteryzujących się znamienym przegęszczeniem krzewów i podrostów drzew (por. Faliński 1980a, 1986), przejściowo pojawiają się mchy higrofilne, a nawet hydrofilne na swoich ekologicznie skrajnych stanowiskach, np. *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium undulatum*, *Climacium dendroides*, *Thuidium philibertii*, *Calliergonella cuspidata*. Prawdopodobnie są to odmiany tych gatunków, jak w przypadku *Polytrichum commune* var. *perigoniale*.

Rozwój spontanicznej sukcesji *Spergulo-Corynephorum* może być zakłócony przez różne czynniki antropogeniczne w dwojaki sposób:

(1) przez wcześniejszy wyręb sosny, wypas lub regularne przepędzanie bydła albo przejeżdżanie wozów, motocykli, rowerów, okresowe wydobywanie piasku, co prowadzi do zrywania pokrywy roślinnej, intensyfikacji erozji wietrznej i wodnej, czyli do uruchomienia piasków. Przypadki takie są przykładem zjawiska regresji, a sukcesja odtwarzająca może być wielokrotnie przerywana, co prowadzi do długotrwałego utrzymywania się najwcześniejszych faz rozwojowych *S.-C. typicum* w war. typowym lub zubożałych postaci innych syntaksonów, jak *S.-C. cladinetosum* (w tym var. z *Polytrichum piliferum* w lokalnych zagłębieniach powstających w wyniku intensywniejszego wywiewania lub przekopywania piasku), *S.-C. thymetosum* var. z *Festuca psammophila* i in. (ryc. 15, 16), a obecne pojedyncze sosny to 30-50-letnie okazy o bardzo niskiej bonitacji lub co najmniej 20-letnie jałowce.

(2) przez nasadzenia sosnowe, które prowadzą do wcześniejszego zanikania

psammofitów murawowych i szybszego wkraczania gatunków leśnych, zwłaszcza mchów (ryc. 13, 14; por. także Fałtynowicz 1980, 1986).

Obok podłoża w życiu *Spergulo-Corynephorum* ważnym czynnikiem ekologicznym jest światło. Mówią o tym także pomiary światła słonecznego, wyrażone w luksach (Lx), które wykonano 28. sierpnia 1984 r., między godzinami 11⁰⁰ a 16⁰⁰, przy bezchmurnym niebie (por. ryc. 13, 14). Natężenie światła dochodzącego do różnych fitocenoz *Spergulo-Corynephorum* waha się między 49,5 tys. Lx w płatach całkowicie odkrytych do 17 tys. Lx pod 2,5 m długości gałęziami (wokół pnia występuje już 1 m pierścień bez murawy, z opadłymi igłami sosnowymi) 22-letniej spontanicznej sosny w *S.-C. cladinetosum*, gdzie widoczne są już oznaki regresji murawy. W wystawionych na pełne oddziaływanie światła słonecznego, bardzo luźnych fitocenozach *S.-C. typicum* dochodzi światło o natężeniu od 42 tys. do 49 tys. Lx. W płatach *S.-C. thymetosum* natężenie światła wynosi od 32,5 do 37 tys. Lx. Wzrost zróżnicowania świetlnego obserwowano w *S.-C. cladinetosum*, gdzie występują duże powierzchnie szaro-zielonych chrobotków, a rozmieszczone skupiskowo spontaniczne podrosty sosen i jałowców zaczynają zwierać gałęzie oraz kumulować opadające igły (por. ryc. 13, 14). W płatach w pełni oświetlonych dochodzi do 49,5 tys. Lx, w pobliżu lub między 7-15-letnimi sosnami — do 23 tys. Lx, a gdy gałęzie są rzadsze, krótsze lub bardziej ażurowe — 22-44 tys. Lx. Mniej światła (do 26-17 tys. Lx) dochodzi do murawy rosnącej pod rzadkimi i czasami silnie wydłużonymi gałęziami sosen, ale murawa utrzymuje się, zanika zaś przy znacznym zwarciu gałęzi i opadzie igieł (poniżej 17 tys. Lx).

W nasadzeniach 10-12-letnich najbardziej zacienione miejsca są wokół pni sosen i tam dochodzi światło o natężeniu od 5 do 8 tys. Lx. Pod zwierającymi się w różnym stopniu gałęziami natężenie światła wzrasta do 20-19 tys. Lx, granicy możliwej dla psammofitów. W 22-letnich monokulturach sosnowych natężenie światła w miejscach zacienionych nie przekracza 8 tys. Lx, a w nieco jaśniejszych (z charakterystycznymi „plamkami” światła słonecznego) — 13,5 tys. Lx. W 30-40-letnich monokulturach z *Calluna vulgaris* lub *Festuca ovina*, w miejscach o najsilniej zwartych koronach, do dna lasu dochodzi 3-6,5 tys. Lx. Pod okapem koron mniej zwartych — od 9 do 22 tys. Lx, a w lukach między drzewami — do 36-45 tys. Lx. W monokulturach 60-letnich z kostrzewą owczą warunki świetlne kształtują się odpowiednio: 3 tys. Lx — 18 tys. Lx — 42,5 tys. Lx.

Spośród syntaksonów *Spergulo-Corynephorum* największą stabilność ekologiczną wykazuje podzespół chrobotkowy, którą osiąga między 10-12. a 25. rokiem rozwoju, zajmuje największy areal i ma charakter zbiorowiska wieloprzestrzennego. Podzespół ten i poprzedzający go podzespół typowy mają także największe znaczenie w utrwalaniu rozwiewanych, sypkich piasków. Produkcja biomasy osiąga prawdopodobnie swoje maksimum w fazie 4 (ale por. Symonides i Borowiecka 1985). W fazie tej zaczyna gromadzić się próchnica. W wytwarzaniu biomasy i gromadzeniu się próchnicy ważną rolę odgrywają chrobotek łagodny *Cladina mitis* i płonnik ościsty *Polytrichum piliferum* z uwagi na ich masowe występowanie. Liczebność tych gatunków na powierzchni 1 m² przedstawia się następująco: przy pokryciu powierzchni do 75% występuje od 43 do 55 tys.

Ryc. 15. Transekt pionowy przez wydmy. Żar (Kotlina Szczercowska). 1983.07.15.

Fig. 15. Vertical transect across the dune. Żar (Szczerców Basin, Central Poland). 1983.07.15

1 — *Pinus sylvestris*; 2 — *Quercus robur*; 3 — *Betula pendula*; 4 — *Juniperus communis*; 5 — *Frangula alnus*; 6 — *Rubus* sp. div.; 7 — *Carici-Agrostietum caninae*; 8 — *Spargulo-Corynephorum typicum* var. *typicum*; 9 — *S.-C. cladinetosum* var. *typicum*; 10 — monokultura sosnowa (*Pinus* monoculture)

Ryc. 16. Transekt pionowy przez wydmy. Stanisławów II (Kotlina Szczercowska). 1983.07.13.

Fig. 16. Vertical transect across the dune. Stanisławów II (Szczerców Basin, Central Poland). 1983.07.13

1 — *Pinus sylvestris*; 2 — *Betula pendula*; 3 — *Juniperus communis*; 4 — *Nardo-Juncetum*; 5 — *Cladonio-Callunetum*; 6 — *Spergulo-Corynephorretum typicum* var. *typicum*; 7 — *S.-C.thymetosum* var. z (with) *Festuca psammophila*; 8 — *Festuco-Koelerietum*; 9 — monokultura sosnowa z (*Pinus* monoculture with) *Festuca psammophila*; 10 — monokultura sosnowa z (*Pinus* monoculture with) *Calluna vulgaris*; 11 — monokultura brzoźowa z (*Betula* monoculture with) *Holcus mollis*

osobników *Polytrichum piliferum* i od 2,5 do 13,5 tys. podecjów *Cladina mitis*; przy pokryciu powierzchni do 50% występuje od 4 do 15 tys. osobników *Polytrichum* i od 2 do 8 tys. podecjów *Cladina*, zaś przy pokryciu do 25% powierzchni występuje od 5 do 6 tys. osobników mchu i do 3 tys. osobników porostu.

Spergulo-Corynephorum typicum var. *typicum* i następnie *S.-C. cladinetosum* var. *typicum* i var. z *Polytrichum piliferum* wykształcają się w obrębie siedlisk borowych (klasycznie: *Cladonio-Pinetum*), ubogich borów mieszanych, kwaśnej dąbrowy i buczyny oraz silnie kwaśnych piasków luźnych. Na nieco bogatszych piaskach luźnych i słabogliniastych tworzy się bardzo krótko *S.-C. typicum* var. *typicum*, następnie inne warianty, które przechodzą w *S.-C. thymetosum* var. *typicum* i z *Festuca ovina* na siedliskach boru mieszanego, kwaśnej i świetlistej dąbrowy oraz uboższego grądu typowego, var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* — najczęściej na siedlisku świetlistej dąbrowy, a var. z *Festuca psammophila* — na siedliskach ciepłolubnego boru mieszanego i kwaśnej buczyny, *S.-C. cladinetosum* var. z *Thymus serpyllum* — na siedliskach boru mieszanego, świetlistej dąbrowy lub subkontynentalnych borów sosnowych (por. także Czyżewska 1986). Poza przedstawionymi kierunkami sukcesji tworzą się inne jeszcze, czasami bardzo skomplikowane zależności roślinność — środowisko, trudne lub niemożliwe do interpretacji z uwagi na zbyt daleko posunięte zmiany środowiska przyrodniczego.

Na fakt, że *Spergulo-Corynephorum typicum* jest syntaksonem młodszym w stosunku do *S.-C. thymetosum* i *S.-C. cladinetosum* zwracali uwagę już Sokołowski (1929) i Szafer (1930). Obaj autorzy traktowali oczywiście murawy macierzankowe jako samodzielny zespół *Thymetum*, który, zdaniem Szafera (l.c.) formował się ze „stadiów przejściowego z *Polytrichum piliferum*”. Sokołowski (l.c.) traktował także jako samodzielne „sadium porostowe”, *Cladinetum*, rozwijające się ze *S.-Corynephorum* w innej serii sukcesyjnej.

W sekwencjach przestrzennych zbiorowiskom szczotliczy siwej często towarzyszą murawy bardziej zwarte, ze związków *Armerion* i *Koelerion* (etapy sukcesji ku trwałym lasom): *Diantho-Armerietum*, *Sileno otitis-Festucetum*, *Festuco psammophilae-Koelerietum* lub murawy subserotermiczne; w krajobrazach antropogenicznych są to także lasy naturalne i monokultury oraz różne ich stadia degeneracyjne i regeneracyjne, wrzosowiska, łąki i pastwiska z rzędu *Arrhenatheretalia* lub zbiorowiska segetalne. Podstawowe powiązania przestrzenne syntaksonów *Spergulo-Corynephorum* przedstawia ryc. 17.

Sąsiedztwo zbiorowisk nieustabilizowanych, otwartych stwarza wielką łatwość wzajemnego przemieszczania się gatunków, zwłaszcza terofitów. Jest to dobrze widoczne np. między *Spergulo-Corynephorum* a zbiorowiskiem segetalnym *Arnoserido-Scleranthetum* poprzez silne powiązania siedliskowe (ryc. 17). W Polsce Środkowej niektórzy autorzy obserwowali takie skrajne przypadki powiązań, mianowicie w uprawie żyta na wydmie dominowały psammofity murawowe na czele z gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi *Spergulo-Corynephorum*, a nawet z trawą *Corynephorus canescens*. W tak skrajnym przypadku możliwe jest oczywiście potraktowanie typowych roślin murawowych tylko jako gatunki wyróżniające wariant lub podzespół segetalny (?).

Ryc. 17. Podstawowe powiązania przestrzenne syntaksonów *Spergulo-Corynephoretum*

Fig. 17. Basic spatial relationship between the syntaxa of *Spergulo-Corynephoretum*

Pierwotne rozprzestrzenienie *Spergulo-Corynephorum* nie było tak szerokie jak obecnie, gdyż limitowały go możliwości siedliskowe. Współcześnie w Polsce, w wyniku oddziaływania różnych czynników antropogenicznych, które w pracy sygnalizowano, obserwujemy rozprzestrzenienie wtórne, kilkakrotnie powiększające areal tego półnaturalnego zbiorowiska pionierskiego.

8.2. KLASYFIKACJA

Jak wykazała analiza numeryczna, pionierska roślinność napiaskowa Polski należy do jednego zespołu *Spergulo morisonii-Corynephorum* R. Tx. ex K. Czyżewska (por. tab. II, ryc. 2).

Zarówno klasyfikacja wg programu TWINSpan i wytypowane tą drogą grupy gatunków wskaźnikowych, przyjętych jako charakterystyczne lub wyróżniające (tab. II), jak i ordynacja wg programu DECORANA — całkowicie potwierdzają obraz realnie występujących fitocenoz, znanych w Polsce z autopsji i literatury.

Przyjęta klasyfikacja zmienia w wielu przypadkach dotychczasowe ujęcia muraw szczytlichowych Polski, dlatego należy skomentować niektóre syntaksony.

S.-C. typicum* var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris — temu wariantowi daje się przyporządkować część fitocenoz z południowej Szwecji, zidentyfikowanych przez Olssona (1974) jako *Teesdalia-Corynephorum* subsp. z *Artemisia campestris* oraz *Veronico-Corynephorum* (Passarge 1960) z Meklemburgii i Brandenburgii (por. tab. IX).

S.-C. typicum* var. z *Hypochoeris radicata reprezentuje niektóre zdjęcia z południowej Szwecji, zaklasyfikowane przez Olssona (1974) jako *T.-C. typicum* i z *Artemisia campestris*, a także wyróżnione we wschodnich Niemczech przez Krauscha (1968) *Spergulo-Corynephorum festucetosum ovinae* var. typowy oraz przez Passarge (1960): *S.-C.* var. subkontynentalny z *Helichrysum arenarium*, *Ornithopodo-Corynephorum* i częściowo *Veronico-Corynephorum* (por. tab. IX). Według Olssona (l.c.) *Teesdalia-Corynephorum* koresponduje ze *S.-C. festucetosum ovinae* (Krausch l.c.) i jednocześnie w obszarze Bałtyku jest północnym wikariantem dla *Ornithopodo-* i *Veronico-Corynephorum*. Jak widać w tabeli IX wszystkie trzy syntaksony należą do *Spergulo-Corynephorum* i do związku *Corynephorion*. W świetle analizowanych materiałów zdjęciowych z Polski nie znaleziono jednak podstaw do wyróżnienia jakiegokolwiek syntaksonu wyższego od wariantu dla tej jednostki (por. tab. II, ryc. 5). Charakterystyczna kombinacja gatunków wykazuje największe podobieństwo tego syntaksonu do *S.-C. festucetosum ovinae* (w sensie Krauscha 1968), które — być może — jest możliwe do utrzymania na obszarze Niemiec, a wariant z *Hypochoeris radicata* stanowiłby postać łącznikową.

S.-C. thymetosum serpylli — w Polsce fitocenozom z *Thymus serpyllum* i *Rhacomitrium canescens* przypisywano różną rangę syntaksonomiczną, np. *Thymus augustifolius* Assoz. z okolic Warszawy (Juraszek 1928) i częściowo *Festuco-Thymetum* z Wyżyn Krakowskiej (Kornaś 1957) i Częstochowskiej (Babczyń-

ska-Sendek 1984), *Spergulo-Corynephorum* var. *chrobotkowy* subvar. z *Thymus serpyllum* z Wyżyny Częstochowskiej (Babczyńska-Sendek l.c.), *S.-C. typicum* var. *Thymus serpyllum*, *S.-C. cladinetosum* var. z *Thymus*, *S.-C.* var. *Rhacomitrium canescens-Thymus serpyllum* z Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej (Cieśliński i Halicz 1971, Cieśliński 1979), zbiorowisko z *Thymus serpyllum* z Wysoczyzny Siedleckiej (Głowacki 1988). Większość wymienionych zbiorowisk odpowiada obecnie *S.-C. thymetosum* lub *S.-C. cladinetosum* var. z *Thymus serpyllum* (por. 7.2). W obrębie tych syntaksonów mieści się również *S.-C. festucetosum psammophilae* ze Wzgórz Trzebnickich (Głowacki 1975), Wyżyny Wieluńskiej (Czyżewska 1986) i Kotliny Szczercowskiej (Sobańska 1978) oraz *S.-C. festucetosum ovinae* z Wyżyny Wieluńskiej (Czyżewska l.c.).

Opisywany przez Krippela (1954) *Corynephorus canescens-Thymus angustifolius* Assoz. z piasków eolicznych na Nizinie Zahorskiej w Słowacji nie jest w żadnym wypadku samodzielnym zespołem, lecz odpowiada podzespołowi *thymetosum serpylli* w obrębie *Spergulo-Corynephorum*. Potwierdzają to badania własne z 1989 r. Występują tam zarówno *Spergula morisonii*⁷ i *Veronica dillenii*, jak też gatunki wyróżniające podzespół, wzbogacone o grupę taksonów lokalnie wyróżniających — suboceanicznych (*Cynodon dactylon*) i kontynentalnych, np. *Euphorbia seguieriana*, *Festuca dominii*, *Kochia laniflora*, *Cladonia convoluta*. W świetle posiadanych informacji stanowiska omawianego podzespołu ze Słowacji stanowiłyby południowy kraniec jego zasięgu. Jest bardzo prawdopodobne, że takie fitocenozy występują na wschód od Bugu, zwłaszcza na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Natomiast w południowej Szwecji i w Niemczech takie postaci są znane jedynie z pojedynczych zdjęć (por. Tüxen 1937, Passarge 1960, Hohenester 1967, Krausch 1968) w syntaksonach wyróżnionych przez tych autorów.

Podzespół macierzankowy obejmuje także var. z *Festuca ovina*, który wykazuje pewne podobieństwo florystyczne do *S.-C. festucetosum ovinae* w sensie Krauscha (1968).

Jak się wydaje, w obrębie takich samych siedlisk, z podzespołem macierzankowym wikaryzuje opisany przez Krauscha (l.c.) *S.-C. festucetosum ovinae* (por. tab. IX)⁸, jeśli oczywiście takie fitocenozy są powtarzalne poza Brandenburgią.

Do tej jednostki daje się również przyporządkować *Spergulo-Festucetosum psammophilae*, *Ornithopodo-* i *Veronico-Corynephorum*, wyróżnione przez Passarge (1960) w Meklemburgii i Brandenburgii, jak też częściowo *Teesdalia-Corynephorum* ze Szwecji (Olsson 1974).

S.-C. thymetosum var. z *Festuca psammophila* wikaryzuje z *S.-C. festucetosum*

⁷ *Teesdalia nudicaulis* występuje tutaj na absolutnej południowej granicy zasięgu i w badanych fitocenozach nie została stwierdzona. Jej znane i udokumentowane stanowisko pochodzi z okolic Šturova w zachodniej Słowacji (inf. ustna prof. L. Šomšaka, Bratislava).

⁸ Taksony uznane tam za wyróżniające podzespół na terenie Polski zdecydowanie nie wydzielają się w samodzielny syntakson (por. tab. II).

psammophilae, wyróżnionym również w Brandenburgii przez Krauscha (1968). Postaci z Polski są jednak wyraźnie podporządkowane podzespołowi macierzan-kowemu (por. tab. IX). Pewne podobieństwo można odnaleźć między omawianym wariantem a *Spergulo-Festucetum psammophilae*, opisanym przez Passarge (1960) z Meklemburgii. Wyróżnienie takiego syntaksonu przez Passarge nie jest jednak zasadne, gdyż fitocenozy te w oczywisty sposób przynależą do *Spergulo-Corynephoretum* (tab. IX).

Trudno jest także utrzymać pozycję *Veronico-Corynephoretum*, wyróżnionego w Niemczech, niezależnie przez Passarge (1960) w Meklemburgii i Brandenburgii oraz Hohenestera (1967) w Bawarii, na co wcześniej zwracali uwagę Krausch (1968) i Korneck (in Oberdorfer 1978). Analizując tabelę IX dokładnie widać, że oba syntaksony należą do *Spergulo-Corynephoretum*, a florystyczne różnice między nimi uwidaczniają przynależność V.-C. z Meklemburgii do S.-C. *festucetosum ovinae* (sensu Krausch 1968), zaś V.-C. z Bawarii — do S.-C. *thymetosum serpylli* (sensu Czyżewska hoc loco).

S.-C. *cladinetosum mitis*. Śródładowe murawy chrobotkowe zostały odkryte w Niemczech przez Tüxena (1928) równocześnie z murawami szczotlichowymi s.str. Prawdopodobnie ich wyrazista fizjonomia początkowo skłoniła Tüxena do przyznania rangi samodzielnego zespołu, który nazwał *Cladonia impexa* [*Cladina portentosa*] — *Cornicularia tenuissima* [*Coelocaulon aculeatum*] - Assoz. Później odstąpił od takiej klasyfikacji i włączył w randze podzespołu *cladinetosum* (Tüxen 1937) do wyróżnionego przez siebie *Corynephoretum canescentis*, z gatunkami wyróżniającymi: *Coelocaulon aculeatum*, *Cladonia uncialis*, *Cl. gracilis*, *Cl. furcata*, *Cladina mitis* i *C. portentosa*. Dzisiaj wiemy, że ostatni gatunek jest subatlantyckim taksonem leśnym (suche bory sosnowe), a *Cladonia gracilis* i *Cl. furcata* mają spektrum ekologiczno-fitosocjologiczne szersze, murawowo-leśne, dlatego wykazują specjalizację na poziomie poniżej gatunku lub nie przejawiają wyraźnych właściwości fitocenotwórczych. Z tego względu syntakson wymagał korekty florystyczno-fitosocjologicznej, opartej na danych z szerszego zasięgu (tab. IX).

Jako samodzielny zespół *Corynephorus-Cornicularia* traktował Steffen (1931) opisaną przez siebie murawę psammofilną, m.in. z Pojezierza Mazurskiego. W świetle współczesnych danych wspomniana murawa odpowiada *Spergulo-Corynephoretum* (*Spergula morisonii*, *Teesdalia nudicaulis*, *Veronica dillenii*, *Corynephorus canescens*) i zawiera zdjęcia należące do podzespołu *typicum*, *thymetosum* i *cladinetosum*. Murawa chrobotkowa jest tutaj dobrze reprezentowana przez warianty z *Thymus serpyllum* i *Polytrichum piliferum*. Należy jednak zwrócić uwagę na niewątpliwie błędne oznaczenia „*Cladonia rangiferina*, *Cl. sylvatica*”.

Natomiast Libbert (1933) uznawał murawy chrobotkowe jako postaci degeneracyjne *Corynephoretum*, co można wiązać z opinią Kliki (1931) o zbiorowisku „*Cornicularia tenuissima*”, które określał jako „*Degradationsstadien*” *Festuco-Koelerietum glaucae*.

Również Krieger (1937) z Brandenburgii i z kilku stanowisk w Polsce Zachodniej (por. 4.1), opisał syntaksony w randze zespołów, odpowiadające śródładowym murawom chrobotkowym, mianowicie: *Cladonia mitis*-Assoz. (tab. 4 — 17

zdz.; por. tab. IX), *Cornicularia tenuissima*-Assoz. (tab. 2 — 3 zdj.), *Cladonia furcata*-Assoz. (tab. 3 — 3 zdj.) i Flechtenreiche Stadien der *Corynephorus canescens*-Assoz. (tab. 1 — 4 zdj.).

Analiza materiałów tabelarycznych Kriegera (l.c.) sugeruje krytyczne podejście do jego typologii ze względu na błędy metodyczne. Mianowicie, większość z tych zdjęć była wykonywana od września do 1. grudnia włącznie, np. w *Cladonia mitis*-Assoz. — 60% zdjęć, *Cornicularia tenuissima*-Assoz. — 100%, Flechtenreiche Stadien ... — 50% i dodatkowo jedno zdjęcie wykonano w połowie marca. Natomiast nie wzbudza zastrzeżeń przynależność taksonomiczna gatunków, zarówno roślin kwiatowych, jak i porostów, których autor był dobrym znawcą. Nie znaleziono więc argumentów uzasadniających utrzymanie takich jednostek w randze zespołu. Wszystkie wyróżnione przez Kriegera (l.c.) syntaksony całkowicie odpowiadają *Spergulo-Corynephoretum cladinetosum* i odmianie geograficznej subatlantyckiej, z *Carex arenaria*, którą dobrze charakteryzują przyjęte w niniejszej pracy gatunki wyróżniające (por. tab. IX).

W Polsce, zwłaszcza w latach 70. i 80., murawy chrobotkowe klasyfikowano co najmniej na trzy różne sposoby: jako samodzielne zespoły, podzespoły w obrębie *Spergulo-Corynephoretum* i warianty w obrębie ostatniego zespołu, ale w różnych jego podzespółach.

W randze zespołu uznawano *Cladonia mitis*-Assoz. Kriegera (1937), najczęściej opisywany jako *Corniculario-Cladonietum mitis* Krieger 1937 (por. Krotoska i Tobolewski 1978, 1979/1980, Cieśliński 1979, Fałtynowicz i Budzbon 1983/1986, Fałtynowicz 1986, Głowacki 1988). Publikowane materiały tych autorów wykazują, że część zdjęć była wykonywana zbyt późno, od końca sierpnia do grudnia włącznie, zaś pozostałe dokładnie odpowiadają *S.-C. cladinetosum mitis*, w sensie Czyżewskiej hoc loco. Ponadto większość materiałów Krotoskiej i Tobolewskiego (1979/1980) należy do murawy nadmorskiej *Helichryso-Jasionetum cladinetosum*. Podobnie należałoby zaklasyfikować materiały Fałtynowicza i Budzbon (1983/1986) z Mierzei Wiślanej.

Opisywane z Polski *Corniculario-Cladonietum* było niejednolicie diagnozowane, mianowicie wg Cieślińskiego (1979) syntakson charakteryzują następujące gatunki: *Cladonia mitis* (st. stał. $V^{+ -4}$), *Coelocaulon aculeatum* ($V^{+ -3}$), *Cladonia cervicornis* subsp. *verticillata* $V^{+ -3}$), *Cl. subulata* $IV^{+ -1}$) i *Cl. floerkeana* ($II^{+ -1}$), zaś wg Głowackiego (1988): *Cladonia mitis* $V^{2 -5}$), *Coelocaulon aculeatum* ($IV^{+ -1}$), *Cetraria islandica* f. *stygia* ($IV^{+ -1}$) i *Cl. uncialis* ($II^{+ -3}$).

Głowacki (l.c.) opublikował także jako nowy zespół *Polytricho-Stereocaulum condensati* Zielińska 1967, podnosząc w ten sposób do rangi zespołu syntakson *Corynephoretum canescens cladinetosum* var. *Stereocaulon condensatum*, wyróżniony przez Zielińską (1967) w Puszczy Kampinoskiej. Z takim ujęciem nie można zgodzić się ponieważ tabela Zielińskiej (l.c.) nie spełnia warunków formalno-merytorycznych: zawiera sześć zdjęć wykonanych na powierzchniach 1 m² we wrześniu i październiku (poza zdj. 1. i to zdjęcie zostało włączone do opracowania numerycznego). Również w tabeli Głowackiego (1988) znajdują się zdjęcia wykonane we wrześniu, listopadzie i grudniu, a sam syntakson nie został przez

autora ważnie opublikowany. Fitocenozy z facjalnym pojawem *Stereocaulon condensatum* stanowią inicjalne płaty muraw chrobotkowych (co potwierdziła analiza numeryczna) i mogą przyjmować rangę tylko podwariantu.

Badacze klasyfikujący murawy chrobotkowe jako *Spergulo-Corynephorum cladinetosm* wyróżniali zazwyczaj takie syntaksony na podstawie różnych kryteriów florystycznych. Np. Zielińska (1967) wyróżniała na podstawie następujących taksonów: *Cladina mitis* V^{1-4} , *Coelocaulon aculeatum* (V^{+-4}), *Cladonia uncialis* (IV^{+-4}), *Cl. cervicornis* subsp. *verticillata* (III^{+-2}) i *Cl. foliacea* (II^{+2}); Cieśliński i Halicz (1971): *Cladina mitis* V^{+-4} , *Coelocaulon aculeatum* (V^{+-4}), *Cladonia c.* subsp. *verticillata* (IV^{+-2}), *Cl. foliacea* (I^{+-1}) oraz *Stereocaulon tomentosum* (I^{+-1}); Endler i Polakowski (1978): *Cladina arbuscula* (IV^{+2}), *C. mitis* (III^{+3}), *Cladonia squamosa* (III^{+-2}), *Cl. c.* subsp. *verticillata* (III^{+-2}), Czyżewska (1986): *Cladina mitis* (V^{1-4}), *Cladonia uncialis* (V^{+-2}), *Cl. c.* subsp. *verticillata* (V^{+-1}), *Cl. subulata* (V^{+-3}), *Cl. phyllophora* (V^{+-2}), *Polytrichum piliferum* (V^{1-4}), a Głowacki (1988): *Cladina mitis* (V^{+-3}), *Coelocaulon aculeatum* (IV^{+-2}), *Cetraria islandica* (III^{+-2}), *Cladonia uncialis* (II^{+-1}) i *Carex ericetorum* (II^{+}).

W Polsce chętnie przyjmowano klasyfikację muraw chrobotkowych zgodną z propozycją Krauscha (1968), który przypisuje im rangę wariantu przynależnego do różnych podzespołów *Spergulo-Corynephorum*. Jednak autorzy polscy na ogół znacznie modyfikowali grupy gatunków wyróżniających wariant chrobotkowy (por. Głowacki 1975, Wika 1975 i in.), co prowadziło do dalszego zamieszania syntaksonomiczno-florystycznego w odniesieniu do wyjątkowo wyrazistego i stabilnego typu murawy szczotlichowej. Było to możliwe tylko dlatego, że za podstawę wyróżnienia syntaksonów i grup gatunków charakterystycznych lub wyróżniających badacze przyjmowali materiały lokalne, często z małych obszarów i nierzadko reprezentowane przez małą liczbę zdjęć, podobnie jak czynili to wielokrotnie badacze niemieccy (por. tab. IX).

Wszystkie wyróżnione przez różnych autorów murawy chrobotkowe w randze samodzielnych zespołów i innych syntaksonów są fitocenozy należącymi do *Spergulo-Corynephorum cladinetosum mitis* (sensu Czyżewska hoc loco).

Ostatnio zaczęto wyróżniać zespół *Agrostidetum coarctatae* i zbiorowisko z *Carex arenaria* z północno-zachodnich Niemiec i innych regionów (por. Jeckel 1984 i cytowana tam literatura). Fitocenozy z *Agrostis vinealis* (Ch *Corynephorion*) były także opisywane wcześniej, jako *Agrostidetum caninae* (Kobendza 1930) lub *Corynephorum agrostidetosum caninae* (Tüxen 1937). Syntaksony te należą do *Spergulo-Corynephorum* (tab. IX), a wyróżnia je tylko facjalny pojaw *A. vinealis*.

Również zbiorowisko z *Carex arenaria* jest zbędnie wyróżnione jako oddzielny syntakson, ponieważ także należy do *Spergulo-Corynephorum* i podobnie jak *Agrostidetum*, dobrze reprezentując geograficzną odmianę subatlantycką (por. tab. IX). Taką samą przynależność wykazuje *Caricetum arenariae* Steffen 1931, wyróżnione przez Kępczyńskiego i Rutkowskiego (1988) w dolinie Wisły, między Ciechocinkiem a Sztumem.

Zmienność regionalną określano w Polsce zwykle jako słabo uchwytną, co ma związek ze stosunkowo niewielką i ciągłą zmiennością klimatu Polski niżowej. Dopiero analiza większego obszaru, np. Polski i Niemiec (ta. IX) wykazuje takie różnicowanie.

Spergulo-Corynephoretum różnicuje się na dwie odmiany geograficzną — subatlantycką i subkontynentalną. Kryterium różnicującym jest gradient kontynentalizmu klimatu — temperatury i opadów. Odmiana subatlantycka związana jest z obszarem o średniej temperaturze rocznej powyżej 8°C oraz średniej rocznej sumie opadów powyżej 550-600 mm (ryc. 1), zaś odmiana subkontynentalna — poniżej tych wartości.

Biorąc pod uwagę stopień kontynentalizmu klimatu w Polsce, wyrażony w wartościach wskaźnika termicznego Ewerta (por. Degórski 1984) odmiana subkontynentalna obejmuje obszary położone w obrębie wartości $K_{\text{EW}} = 46-58$, zaś odmiana subatlantycka — $K_{\text{EW}} = 38-46$, tj. w obszarach o zwiększającym się stopniu oceanizmu klimatu.

Fitocenozy obu odmian są jednak podobne do siebie na tyle (tab. IX, ryc. 2), że nie znaleziono argumentów przemawiających za rozdzieleniem syntaksonu na samodzielne, wikaryzujące zespoły regionalne, jak chcą tego niektórzy autorzy (por. Passarge 1960, Hohenester 1967, Olsson 1974).

Odmiana subatlantycka jest tutaj utożsamiana z propozycją Passarge (1960, tab. 1, s. 114, 115). Typ nomenklatoryczny tej odmiany nie będzie podany z uwagi na brak tabel analitycznych (są tylko synoptyczne) w publikacjach Passarge (l.c.), Krauscha (1968, tab. 1) czy też Tüxena (1937, s. 55), którego materiały najlepiej charakteryzują odmianę. Gatunkiem wyróżniającym tę odmianę jest *Carex arenaria*. Z większą stałością lub ilościowością występują także inne gatunki subatlantyckie, zwłaszcza ze związku *Corynephorion* i rzędu *Corynephoretalia*, np. *Agrostis vinealis*, *Teesdalia nudicaulis*, *Ornithopus perpusillus*, *Hypochoeris glabra*, *Sedum reflexum*, *Coelocaulon muricatum* oraz jednostkowym udziałem *Aira* sp. div. ze związku *Thero-Airion*.

W Polsce odmiana subatlantycka występuje na Nizinach Śląsko-Łużyckich, Pobrzeżach Południowobałtyckich oraz Pojezierzach Południowo- i Wschodniobałtyckich, a więc głównie na obszarach młodoglacjalnych. Są to najbardziej wschodnie fitocenozy w obrębie tej odmiany geograficznej, w których występuje *Carex arenaria*. Analiza numeryczna nie wydzieliła wyraźnej grupy zdjęć odpowiadającej omawianej odmianie. Pojedyncze zdjęcia włączone są do kilku syntaksonów, zwłaszcza: *S.-C. typicum* var. z *Hypochoeris radicata* i var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* oraz *S.-C. cladinetosum mitis* var. z *Polytrichum piliferum*.

Wariant z *Hypochoeris radicata* uznano jednocześnie za postać lokalną dla pojezierzy zachodniopolskich (ryc. 6), której można przypisać przynależność do subatlantyckiej odmiany geograficznej *Spergulo-Corynephoretum*.

Odmiana subkontynentalna *varietas geographica nova*. Typ nomenklatoryczny jest identyczny z typem zespołu (Zdj. fs. 5 (1863) w Tab. IV), a gatunkiem wyróżniającym jest terofit *Veronica dillenii*. Florystycznie różni tę odmianę od odmiany subatlantyckiej naturalny, jednostkowy udział taksonów subkontynentalnych lub ciepłolubnych, zwłaszcza ze związku *Koelerion* i rzędu *Festuco-Sedetalia* oraz klasy *Festuco-Brometea*, np. *Astragalus arenarius*, *Festuca psammophila*, *F. trachyphylla*, *F. polesica*, *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*, *Euphorbia cyparissias*, *Carex ericetorum*. Dość szczególną rolę odgrywają *Thymus serpyllum*, *Artemisia campestris* subsp. *campestris* i *Helichrysum arenarium*, które ze względu na swoje rozmieszczenie również wokół Bałtyku (Meusel et al. 1978) na obszarze Polski można uznać za gatunki naturalne w stosunku do gradientu kontynentalizmu klimatu (por. Zarzycki 1984). Takie gatunki, a zwłaszcza *Thymus serpyllum* wykazują w zasięgu tej odmiany geograficznej stały udział, a nawet walor fitocenotwórczy, co rzutuje na pewną odmienność fitocenoz tej części arealu *Spergulo-Corynephoretum*.

Udział wszystkich gatunków stanowiących o specyfice odmiany subkontynentalnej wzrasta z zachodu na wschód stopniowo; dopiero na Polesiu Podlaskim i Wołyńskim obserwowano wnikanie nowych gatunków kontynentalnych, jak *Silene lituanica* i *Kochia laniflora* (tab. II; Fijałkowski 1966, Paszewski i Fijałkowski 1970; por. także Kulczyński 1939).

Odmianę subkontynentalną najpełniej reprezentuje podzespół *thymetosum serpylli*, który można uznać za postać najbardziej charakterystyczną dla wschodniej części środkowoeuropejskiego zasięgu *Spergulo-Corynephoretum*. Również część fitocenoz *S.-C. typicum* var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* ma walor subkontynentalny, co dobrze oddaje wzrost frekwencji *Veronica dillenii* (do 80%), która często dominuje nad gatunkami charakterystycznymi zespołu (por. tab. II, ryc. 5), choć w młodoglacjalnych obszarach Polski Zachodniej inne fitocenozy tego wariantu zdecydowanie należą do odmiany subatlantyckiej. Do tej grupy zaliczono także *S.-C. cladinetosum* var. z *Thymus serpyllum*, który dobrze oddaje specyfikę muraw chrobotkowych na granicy zasięgu zespołu.

Odmiana ta rozwija się w Polsce Środkowej, Północno-Wschodniej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W kierunku wschodnim *Veronica dillenii* ilościowo nierzadko dominuje nad *Spergula morisonii*, a zwłaszcza nad *Teesdalia nudicaulis*. Ten ostatni gatunek, począwszy od Wyżyn Przedborskiej i Kielecko-Sandomierskiej ku wschodowi zmniejsza swoją frekwencję i ilościowość. Zjawisko to lokalnie występuje także w Kotlinach Toruńskiej i Płockiej, na Nizinach Północnomazowieckiej i Północnopodlaskiej.

Na obecność subkontynentalno-kontynentalnej *Veronica dillenii* w subatlantyckim *Spergulo-Corynephoretum* po raz pierwszy w Polsce zwrócił uwagę Kornaś (1957), który gatunek ten podniósł do rangi lokalnie wyróżniającego zespół. Sugestię tę potwierdzono również w innych regionach Polski (Endler i Polakowski 1978, Cieśliński 1979, Czyżewska 1986 i Załuski 1987). Natomiast Głowacki (1988) wyróżnił wariant z *Veronica dillenii* w obrębie *S.-C. typicum*, podobnie jak uczynił to Korneck (in Oberdorfer 1978).

Veronica dillenii została również stwierdzona w fitocenozach przyśródlądowych

Zróżnicowanie geograficzne *Spergulo morisonii*-*Corynephorum*
Geographical differentiation of *Spergulo morisonii*-*Corynephorum*

Numer kolejny Successive number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Obszary Areas	Niemcy —										
Liczba zdjęć fitosocjologicznych Number of phytosociological records	12	20	20	21	27	14	9	30	18	6	33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ch Ass. <i>Spergula morisonii</i> <i>Teesdalia nudicaulis</i>	V III	V IV	III I	II III	IV III	V IV	I ·	V IV	V V	V ·	I III
odmiany geograficzne subatlantycka i subkontynentalna (subatlantic and subcontinental races)											
C <i>Carex arenaria</i>	IV	II	I	III	V	·	·	III	·	·	I
SS <i>Veronica dillenii</i>	·	·	·	·	·	·	V	·	·	·	·
Grupy klimatyczne (Climatic groups) gatunki atlantycko-subatlantyckie (atlantic-subatlantic species)											
C <i>Ornithopus perpusillus</i>	I	I	·	I	·	I	·	·	·	·	IV
C <i>Hypochoeris glabra</i>	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Th <i>Aira praecox</i>	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·
Th <i>A. caryophylla</i>	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·
FS <i>Sedum reflexum</i>	·	·	·	I	I	I	II	·	·	·	·
gatunki subkontynentalne (subcontinental species)											
<i>Carex ericetorum</i>	·	·	·	·	·	I	II	·	·	·	·
K <i>Koeleria glauca</i>	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
K <i>Astragalus arenarius</i>	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
K <i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>fastigiata</i>	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Grupy siedliskowo-dynamiczne (Habitat and dynamic groups) subass. <i>cladinetosum mitis</i> R. Tx. (1928) 1937 em. K. Czyżewska											
C <i>Coelocaulon aculeatum</i>	III	II	V	·	·	III	II	III	II	III	I
C <i>Cladina mitis</i> (et <i>arbuscula</i>)	III	·	II	·	·	II	II	(IV)	(I)	·	·
C <i>Cladonia uncialis</i>	·	·	IV	·	·	II	II	·	·	·	·
C <i>Cl. cervicornis</i> subsp. <i>verticillata</i>	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
subass. <i>festucetosum ovinae</i> Krausch 1968											
SS <i>Jasione montana</i>	II	III	·	II	I	IV	III	I	II	II	III
<i>Hypochoeris radicata</i>	·	IV	·	III	II	·	·	II	IV	I	III
SS <i>Hieracium pilosella</i>	·	IV	·	II	I	II	·	I	III	I	IV
SS <i>Festuca ovina</i>	·	III	III	·	·	·	·	I	I	·	III
SS <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	·	·	·	·	I	I	I	I	·	·	III
FS <i>Helichrysum arenarium</i>	·	·	·	·	·	·	·	·	III	I	III
subass. <i>festucetosum psammophilae</i> Krausch 1968											
K <i>Festuca psammophila</i>	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	I

R. Tx. ex K. Czyżewska w Europie Środkowej

R. Tx. ex K. Czyżewska in Central Europe

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Germany					Szwecja Sweden	Polska — Poland													Slovakia	Ukraina

15	17	68	90	23	13	56	100	96	70	82	12	164	49	76	75	26	19	15	15
----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

I	IV	V	III	IV	.	III	IV	V	V	V	V	IV	III	III	IV	V	III	IV	I
I	I	II	III	I	IV	IV	II	IV	II	II	II	III	III	I	III	I	I	.	.

II	I	II	II	II	III	I	I	.	I	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.
III	.	I	.	.	.	I	IV	III	I	I	II	IV	II	V	IV	V	II	IV	V

I	.	I	I	.	.	I	.	I	.	.	.	.	I	I	I	.	.	.	.
.	.	I	I	.	.	.	.	I	.	I	.	I	I	.	.	.	.	.	.
.	.	.	I	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	.	I	.	.	.	I	.	.	.

.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	.	III	I	.
.	I	I	.	II	.	.	I	I	.	I	.	I	I	I	I	.	I	I	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	I	I	I	II	I	I	I	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	I	I	.	I	I	I	III	I	.

.	V	IV	II	III	II	I	II	II	V	V	V	V	III	II	III	II	II	II	.
.	V	III	I	III	(IV)	I	I	I	IV	V	V	V	I	II	III	II	II	III	.
.	V	III	II	III	.	I	I	I	III	V	V	IV	.	I	I	I	I	II	.
.	IV	II	I	II	II	I	II	I	III	IV	V	IV	I	I	I	I	I	I	.

III	I	I	III	.	IV	III	III	II	I	I	I	III	III	III	II	I	II	I	.
II	I	I	III	I	IV	IV	IV	II	II	I	II	II	I	I	II	I	III	I	.
III	I	.	III	I	IV	IV	IV	III	I	II	II	V	IV	IV	IV	III	IV	.	.
III	I	.	III	.	II	II	II	I	I	II	I	II	II	II	II	.	V	.	.
IV	I	.	II	I	IV	III	IV	I	I	I	.	II	III	IV	II	II	I	.	.
V	I	I	II	I	III	IV	II	I	I	I	I	II	II	II	I	I	.	I	.

I	.	.	.	V	.	I	I	I	I	I	I	I	.	I	I	V	I	.	.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
subass. <i>thymetosum serpylli</i> K. Czyżewska												
FS	<i>Thymus serpyllum</i>	.	I	.	.	I	II	III	.	.	I	I
SS	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	.	.	.	I	.	.	I	.	.	.	.
SS	<i>Rhacomitrium canescens</i>	.	.	.	.	.	III	I	.	.	.	I
Pozostałe syntaksony (Other syntaxa)												
Ch <i>Corynephorion</i> (Cn)												
	<i>Agrostis vinealis</i>	I	IV	II	V	II	.	.	.	.	.	.
	<i>Coelocaulon muricatum</i>	.	I	II	.	.	.	.	.	.	.	.
Ch <i>Thero-Airion</i> (Th), <i>Corynephoretalia</i> (C)												
	<i>Corynephorus canescens</i>	V	V	III	IV	III	V	V	V	V	V	V
	<i>Logfia minima</i>	I	III	.	I	.	III	III	.	.	.	III
Th	<i>L. arvensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Carex ligerica</i>	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.
Th	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Polytrichum piliferum</i>	V	.	IV	IV	II	IV	II	V	V	V	IV
Ch <i>Armerion</i> (A), <i>Koelerion</i> (K), <i>Festuco-Sedetalia</i> (FS)												
A	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i>	.	I	.	.	I	.	.	.	.	.	.
	<i>Festuca trachyphylla</i>	.	.	.	I	I	.	.	.	.	.	.
A	<i>Cerastium arvense</i>	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.
K	<i>Silene otites</i>	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.
A	<i>Herniaria glabra</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
K	<i>Plantago arenaria</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
A	<i>Vicia lathyroides</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>maximum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Acinos arvensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
K	<i>Tragopogon floccosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
K	<i>Festuca polesica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
K	<i>Silene lituanica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ch <i>Sedo-Scleranthetea</i> (SS)												
	<i>Rumex acetosella</i>	IV	V	II	V	III	.	.	.	.	.	.
	<i>Scleranthus perennis</i>	.	I	.	I	I	II	.	.	.	.	V
	<i>Cerastium semidecandrum</i>	.	.	.	III	II	.	III	.	.	.	I
	<i>Trifolium arvense</i>	.	.	.	I	.	I	II	.	.	.	II
	<i>Potentilla argentea</i>	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.	I
	<i>Sedum acre</i>	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	I
	<i>Myosotis stricta</i>	.	.	.	.	I	.	III	.	.	.	.
	<i>Rumex tenuifolius</i>	.	.	.	.	.	V	IV	III	IV	IV	IV
	<i>Veronica verna</i>	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	I
	<i>Sedum sexangulare</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Jovibarba sobolifera</i> subsp. <i>sobolifera</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Cladonia furcata</i> var. <i>palamaea</i>	.	.	II	.	I	I	.	III	.	I	.
	<i>Ceratodon purpureus</i>	.	.	.	III	II	II	.	I	I	.	I
	<i>Brachythecium albicans</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Towarzyszące (Accompanying)												
Drzewa i krzewy Trees and shrubs)												
	<i>Quercus robur</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		c	.	.	.	I	I	.	.	.	.	.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
· II ·	I · I	· · ·	I · I	· · ·	II I II	I I ·	I I I	I I I	I · I	I · I	I I III	IV I III	II I III	<div>IV III III</div>	<div>V II V</div>	<div>III II III</div>	<div>IV I I</div>	II I ·	· · II

·	·	I	I	·	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	·	·	I	·
·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	I	I	·	·	I	·	·	·	·

V II · · · III	V I · · · V	V I · · · IV	V II · · · IV	V · · · IV	V I III I · V	V III I · I IV	V II I · I V	V III I · I IV	V I · · · V	V I · · · V	V I · · · V	V II I · · · V	V III I · · · IV	V II · · · IV	V II I · · · IV	V I · · · IV	IV · · · IV	V · · · III	V · · · IV
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

I · I · · I · · · ·	· · · · · · · · ·	· · · · · · · · ·	I III I · · · · · ·	I I · · · · · · ·	· · II · · · · · ·	I I · · · · · · ·	I I · · · · · · ·	· I · · · · · · · ·	I I · · · · · · ·	· · · · · · · · ·	· · · · · · · · ·	I I · · · · · · ·	I I · · · · · · ·	I I · · · · · · ·	I I · · · · · · ·	I I · · · · · · ·	I I · · · · · · ·	· · · · · · · · ·	· · · · · · · · ·
--	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

· I III II I I III V II · · · · · III	II I · · · · · · · · · · · · · · IV I	· I · · · · · · · · · · · · · · II II	· II · · · · · · · · · · · · · · II II	· · · · · · · · · · · · · · · · II II	· IV II I · · · · · · · · · · · · IV III	I II I · · · · · · · · · · · · · II III	IV II I · · · · · · · · · · · · · II IV	III III I · · · · · · · · · · · · · · IV	II I · · · · · · · · · · · · · · II II	III I · · · · · · · · · · · · · · IV III	II I · · · · · · · · · · · · · · II II	IV III I · · · · · · · · · · · · · · IV III	IV IV I I II I · · · · · · · · · IV III	IV IV III II II I · · · · · · · · · III V	IV III II II I · · · · · · · · · III IV	III II I · · · · · · · · · · · · · II IV	II II I · · · · · · · · · · · · · III V	II III I · · · · · · · · · · · · · · V II	I I · · · · · · · · · · · · · · · V I	· · · · · · · · · · · · · · · · · IV
---	--	--	---	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---

·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	·	·	I	I	·	·	·
·	I	·	·	·	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	·	I	·	·

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Pinus sylvestris</i>	b	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.
	c	.	.	.	.	.	.	.	II	I	.	.
<i>Quercus petraea</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Betula pendula</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Populus tremula</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Juniperus communis</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cytisus scoparius</i>	b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ch <i>Festuco-Brometea</i>												
<i>Euphorbia cyparissias</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Achillea collina</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Carex caryophyllea</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Centaurea rhenana</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Potentilla cinerea</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ch <i>Nardo-Callunetea</i>												
<i>Calluna vulgaris</i>		.	.	II	II	.	.	.	I	.	.	.
<i>Luzula campestris</i>		.	.	.	.	I	I	.	I	I	.	I
<i>Carex pilulifera</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ch <i>Molinio-Arrhenatheretea</i>												
<i>Achillea millefolium</i>		.	.	.	II	I	.	.	.	.	.	.
<i>Plantago lanceolata</i>		.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	I
<i>Bromus hordaceus</i>		.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.
<i>Holcus lanatus</i>		.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.
<i>Poa pratensis</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Pozostałe (Others)

<i>Agrostis capillaris</i>	.	.	.	II	.	.	.	III	IV	III	IV
<i>Conyza canadensis</i>	.	.	.	I	.	.	.	.	I	.	I
<i>Hypericum perforatum</i>	.	.	.	I	I	.	.	.	I	.	I
<i>Poa angustifolia</i>	.	.	.	I	I	.	.	.	.	.	.
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	.	.	II	I	.	.	.	I	.	.
<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	I
<i>Deschampsia flexuosa</i>	.	.	.	I	I	.	.	.	I	.	.
<i>Erophila verna</i>	.	.	.	.	II	II	II	.	.	.	I
<i>Carex hirta</i>	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.
<i>Viola tricolor</i>	.	.	.	.	I	.	.	I	.	.	I
<i>Senecio vernalis</i>	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.
<i>Linaria vulgaris</i>	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	I
<i>Erodium cicutarium</i>	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	I
<i>Hieracium umbellatum</i>	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.
<i>Holosteum umbellatum</i>	.	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.
<i>Viola arvensis</i>	.	.	.	.	.	II	II	I	.	.	.
<i>Alyssum alyssoides</i>	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
.	.	.	.	.	.	I	II	I	I	III	III	II	I	I	I	I	I	I	.
.	III	II	II	I	I	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	I	.	.	.
.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	I	.	I	I	I	.	.	.
.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	I	I	I	.	I	I	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	I	I	I	I	I	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	I	.	I	.	I	I	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	I	.	I	I	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	II	III	II	.	I	I	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	I	.	I	.	I	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	.	I	.	I	I	I	I	.	.
I	.	I	I	I	I	I	I	I	I	.	I	I	I	I	I	III	II	I	.
III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	I	I	I	.	.
I	.	.	.	I	.	I	I	I	I	.	I	I	.	I	I	I	I	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	.	I	I	.
.	I	.	.	.	II	I	I	I	I	I	I	I	I	.	I	.	II	.	.
I	I	I	I	.	II	I	.	.	.	I	I	I	I	.	I	I	I	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	.	.
.	.	.	I	.	III	II	I	I	I	I	.	I	II	I	I	I	.	.	.
.	.	.	I	.	.	I	I	I	I	.	.	I	I	I	I	I	I	I	.
.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	.	.	I	I	I	I	.	.	.
.	.	.	.	.	I	I	I	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.
I	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	.	I	.	I	I	I	I	.	.
II	I	III	IV	IV	V	IV	II	III	I	I	I	II	III	III	III	I	II	.	.
II	.	I	II	.	I	II	II	I	.	I	I	I	II	II	II	I	I	I	.
I	.	.	I	.	I	.	I	I	I	.	I	I	I	I	I	I	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	.	I	I	I	I	.	.	.	.
I	.	.	.	.	.	II	I	I	I	I	.	I	I	I	I	.	.	.	.
I	.	I	I	.	I	I	.	I	.	I	.	.	I	I	.	.	.	.	.
I	.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	.	I	I	I	I	.	I	.	III
.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	.	I	I	.	I	.	.	.	.
.	.	.	.	.	I	I	I	I	I	.	.	I	I	I	I	.	.	.	.
I	.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	I	I	.	.	.	.	.	.
.	I	.	.	.	IV	I	I	.	.	I	I	I	.	.	I	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	I	I	.	I	.	I	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	I	I	I	I	I	I	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	I	I	I	I	I	I	.	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Convolvulus arvensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Solidago virgaurea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Erigeron acer</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Spergula arvensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Viola canina</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Elymus repens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Chondrilla juncea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Knautia arvensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Festuca rubra</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oenothera biennis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Peucedanum oreoselinum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Calamagrostis epigejos</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Bromus tectorum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Corispermum hyssopifolium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladina portentosa</i>	II	.	IV	.	.	I	.	.	.	.	.
<i>Cladonia foliacea</i>	.	I	.	.	I	I	.	III	I	III	.
<i>Cl. chlorophaea</i>	.	.	I	I	.	I	.	.	.	.	.
<i>Cl. floerkeana</i>	.	.	II	.	.	II	.	II	I	III	.
<i>Cl. fimbriata</i>	.	.	IV	.	.	I	.	.	.	.	.
<i>Cl. glauca</i>	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cl. squamosa</i>	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladina arbuscula</i>	.	.	I	.	.	II	I	.	.	.	.
<i>Cladonia gracilis</i>	.	.	IV	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladina ciliata</i>	.	.	I	.	.	II	.	.	.	.	.
<i>Cladonia subulata</i>	.	.	.	I	I	I	.	.	.	.	.
<i>Cladina rangiferina</i>	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.	.
<i>Cladonia phyllophora</i>	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.
<i>Cetraria islandica</i>	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.
<i>Cladonia coccifera</i>	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.
<i>Placynthiella oligotropha</i>	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.
<i>Cladonia pyxidata</i>	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.
<i>Diploschistes muscorum</i>	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.
<i>Cladonia pleurota</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cl. cornuta (et gracilis)</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Placynthiella uliginosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladonia deformis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Hypogymnia physodes</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cl. rangiformis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cetraria ericetorum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Trapeliopsis granulosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Stereocaulon condensatum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladonia cariosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Peltigera rufescens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Stereocaulon incrustatum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cladonia pocillum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Dicranum scoparium</i>	.	.	II	I	.	.	.	I	.	.	.
<i>Hypnum cupressiforme</i>	.	.	.	I	I	I	.	.	.	.	.
<i>Tortula ruralis</i>	.	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I	.	.	.	.	I	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	.	.	.
.	I	.	.	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	.
II	.	.	.	.	II	I	I	.	.	.	.	I	I	I	I	.	.	.	.
I	.	.	.	.	I	II	I	I	.	.	.	.	I	I	I	.	I	.	.
I	.	.	.	.	II	I	I	I	.	.	.	.	I	I	I	.	.	.	.
.	.	I	.	.	.	.	I	.	I	I	I	I	.	.	I	I	.	.	.
.	.	.	I	.	I	.	I	I	.	.	.	I	I	I	I	I	I	.	.
.	.	.	.	.	II	II	I	I	I	.	I	I	II	I	I	.	I	.	.
.	.	.	.	.	I	I	I	I	.	I	.	I	I	I	.	II	.	I	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	.
.	I	.	.	.	.	.	I	I	.	I	I	I	.	I	I	I	I	II	.
.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	I	I	I	I	.	II	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	I	.	.	.
.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	II	II	I	III	.	I	I	I	I	II	I	II	I	I	II	III	II	III	IV
.	IV	II	II	II	V	I	I	.	I	I	II	II	I	I	I	.	I	II	.
.	IV	II	I	II	III	I	III	I	II	II	II	II	I	III	I	I	III	II	.
.	.	.	.	.	IV	I	II	I	I	II	II	II	I	II	I	I	I	.	.
.	III	I	I	.	.	.	I	.	I	II	I	I	I	I	I	.	.	.	II
.	III	I	I	.	.	.	I	.	I	I	I	I	.	I	.	.	.	.	.
.	IV	I	I	.	.	I	I	.	I	III	II	II	.	I	I	.	.	.	.
.	.	.	.	.	II	II	III	I	II	IV	IV	III	I	II	I	.	II	IV	.
.	I	I	II	.	I	I	I	I	I	I	I	IV	I	I	.	I	II	II	II
.	V	II	I	.	III	I	II	I	I	I	III	III	I	I	II	I	II	.	.
.	.	.	.	.	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	.	.	.	.	.
.	I	.	.	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	.	I	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.
.	V	II	I	I	III	.	I	I	I	III	I	I	I	I	I	.	I	.	.
.	I	.	.	.	(IV)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	.	.	.	.
.	I	.	.	.	.	I	II	II	II	III	II	II	.	II	I	I	.	III	.
.	II	.	.	.	II	I	.	.	I	I	I	I	.	I	I	.	.	.	.
.	I	.	.	.	II	I	I	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	.	IV
.	.	.	.	.	I	I	I	.	I	IV	I	III	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	II	I	II	I	.	I	I	I	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	I	I	.	I	I	II	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	I	.	.	.	IV
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.
.	I	.	.	.	II	I	.	.	.	I	I	I	.	I	I	.	II	.	.
.	.	.	I	.	III	.	I	I	.	.	.	I	.	I	I	I	I	I	.
.	.	I	I	.	.	.	.	I	I	.	.	I	.	I	I	I	.	I	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Bryum argenteum</i>	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.
<i>Ptilidium ciliare</i>	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.
<i>Polytrichum juniperinum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Pohlia nutans</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Cephaloziella starkei</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Pleurpizium schreberi</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Bryum caespitium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Objaśnienia (Explanation):

- 1 — *Corynephorum typicum* (Tüxen 1937), NW Niemcy (NW Germany);
- 2 — *C. agrostidetosum caninae* (Tüxen 1937), NW Niemcy;
- 3 — *C. cladonetosum* (Tüxen 1937), NW Niemcy;
- 4 — *Agrostidetosum coarctatae* (Jeckel 1984), NW Niemcy;
- 5 — *Carex arenaria*-Gess. (Jeckel 1984), NW Niemcy;
- 6 — *Spergulo-Corynephorum* (Hohenester 1967), Bawaria (Bavaria, Germany);
- 7 — *Veronico-Corynephorum* (Hohenester 1967), Bawaria;
- 8 — *Spergulo-Corynephorum*, odmiana subatlantycka z (subatlantic race with) *Carex arenaria* (Passarge 1960), Mecklemburgia, Havelland, Spreevald (Mecklemburg, Havelland and Spreevald — Germany);
- 9 — *S.-C.* odmiana kontynentalna z (continental race with) *Helichrysum arenaria* (Passarge 1960), Mecklemburgia, Brandenburg (Mecklemburg and Brandenburg — Germany);
- 10 — *Spergulo-Festucetum psammophilae* (Passarge 1960), E. C Mecklemburgia;
- 11 — *Ornithopodo-Corynephorum* (Passarge 1960), Havelland, Mecklemburgia, C Brandenburg;
- 12 — *Veronico-Corynephorum* (Passarge 1960), Mecklemburgia, C Brandenburg;
- 13 — *Cladonia mitis*-Ass. (Krieger 1937), Brandenburg;
- 14 — *Spergulo-Corynephorum typicum* (Krausch 1968), Brandenburg;
- 15 — *S.-C. festucetosum ovinae* (Krausch 1968), Brandenburg;
- 16 — *S.-C. festucetosum psammophilae* (Krausch 1968), Brandenburg;
- 17 — *Teesdalia-Corynephorum* (Olsson 1974), S Szwecja (S Sweden);
- 18 — *Spergulo-Corynephorum typicum* var. z (with) *Hypochoeris radiata*, (tab. II (6)) (Kornaś 1957; Piotrowska, Celiński 1965; Celiński, Balcerkiewicz 1973; Wika 1975; Babczyńska-Sendek 1984; Balcerkiewicz, Celiński npbl. (unpublished), Czyżewska npbl., NW, C Polska (NW, C Poland);
- 19 — *S.-C. typicum* var. z (with) *Artemisia campestris* (tab. II (7)) (Juraszek 1928; Piotrowska, Celiński 1965; Głowacki 1975; Babczyńska 1978; Endler, Polakowski 1978; Czyżewska npbl., Jankowski npbl.), Polska;
- 20 — *S.-C. typicum* var. *typicum* (tab. II (8)) (Kobendza 1930; Libbert 1933; Kornaś 1957; Głowacki 1975; Wika 1975; Endler, Polakowski 1978; Babczyńska-Sendek 1984; Czyżewska npbl., Jankowski npbl.), Polska;

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	.	I	I	I	I	I	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	.	.	I	.	.
.	.	.	.	.	IV	II	I	I	I	I	I	I	.	I	I	.	I	.	.
.	I	.	.	.	I	I	.	I	I	I	I	I	.	I	I	.	I	.	.
.	.	.	.	.	.	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	I	.
.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	I	I	.	I	I	.	II	.	.
.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	I	I	I	I	I	I	.	.	I	.

- 21 — *S.-C. cladinetosum mitis* var. z (with) *Polytrichum piliferum*, postać wcześniejsza (earlier phase) (tab. II (12)) (Libbert 1933; Zielińska 1967; Cieśliński, Halicz 1971; Głowacki 1975; Wika 1975; Cieśliński 1979; Babczyńska-Sendek 1984; Czyżewska 1986, npbl.; Balcerkiewicz, Celiński npbl.; Jankowski npbl.; Paleska npbl.; Sobańska npbl.), Polska;
- 22 — *S.-C. cladinetosum mitis* var. z (with) *Polytrichum piliferum*, postać późniejsza (later phase) (tab. II (11)) (Endler, Polakowski 1978; Cieśliński 1979; Czyżewska 1986, npbl.; Paleska npbl.; Sobańska npbl.) Polska;
- 23 — *S.-C. cladinetosum mitis* var. *typicum* (tab. II (10)) (Zielińska 1967; Cieśliński, Halicz 1971; Cieśliński 1979; Czyżewska 1986, npbl.; Paleska npbl.; Sobańska npbl.), Polska;
- 24 — *S.-C. cladinetosum mitis* var. z (with) *Thymus serpyllum* (tab. II (9)) (Libbert 1933; Kornaś 1957; Zielińska 1967; Cieśliński, Halicz 1971; Wika 1975; Babczyńska 1978; Endler, Polakowski 1978; Cieśliński 1979; Babczyńska-Sendek 1984; Czyżewska 1986, npbl.; Jankowski npbl.; Lipnicki npbl.; Sobańska npbl.), Polska;
- 25 — *S.-C. typicum*, postać przejściowa (intermediate form) (tab. II (5)) (Juraszek 1928; Kobendza 1930; Libbert 1933; Kornaś 1957; Kępczyński 1965; Celiński, Balcerkiewicz 1973; Babczyńska 1978; Endler, Polakowski 1978; Cieśliński 1979; Babczyńska-Sendek 1984; Czyżewska npbl.), Polska;
- 26 — *S.-C. thymetosum* var. z (with) *Artemisia campestris* (tab. II (4)) (Juraszek 1928; Kępczyński 1965; Czyżewska 1986, npbl.), Polska;
- 27 — *S.-C. thymetosum* var. *typicum* (tab. II (3)) (Kępczyński 1965; Piotrowska, Celińska 1965; Cieśliński, Halicz 1971; Babczyńska 1978; Cieśliński 1979; Babczyńska-Sendek 1984; Czyżewska 1986, npbl.), Polska;
- 28 — *S.-C. thymetosum* var. z (with) *Festuca psammophila* (tab. II (1)) (Głowacki 1975; Czyżewska 1986, npbl. Sobańska npbl.), Polska;
- 29 — *S.-C. thymetosum* var. z (with) *Festuca ovina* (tab. II (2)) (Juraszek 1928; Czyżewska 1986, npbl.), Polska;
- 30 — *Spergulo-Corynephorum* (Czyżewska npbl.), Słowacja (Slovakia);
- 31 — *Veronico dillenii-Corynephorum* (Vicherek 1972), Ukraina (Ukraine).

morskich *Spergulo-Corynepheretum*, np. w Cevennes [Sewenny] (Braun-Blanquet 1915, s. 73) oraz w innych zbiorowiskach subatlantyckich i submedyterrańskich.

Opisanego z Niemiec *Veronico dillenii-Corynephoretum*, najpierw przez Passarge (1960) w Brandenburgii i Meklemburgii, później przez Hohenestera (1967) w Bawarii, nie można jednak uznać za zespół wikaryzujący ze *Spergulo-Corynephoretum*, jak chcieliby cytowani autorzy. Na obszarze Niemiec *Veronica dillenii* w żadnym wypadku nie jest konkurentem gatunków subatlantyckich i ze stanowiska fitogeograficznego zespołu tego nie da się utrzymać, co potwierdza Krausch (1968) i Korneck (in Oberdorfer 1978, por. tab. IX). Znane tam stanowiska omawianego gatunku mają charakter bądź adwentywny, związany głównie z siedliskami ruderalnymi i półruderalnymi, bądź migracyjny, przeniesiony doliną Dunaju (Hohenester 1967, Korneck in Oberdorfer l.c.), zwarty zaś zasięg obejmuje wschodnie rubieże Niemiec i rozwija się w kierunku wschodnim — przez Polskę ku Rosji — i południowym — przez Czechy i Słowację ku Bałkanom i rejonom (sub)medyterrańskim (Meusel et al. 1978). Z tego też względu siła fitocenoformująca taksonu na obszarze Polski zaczyna wznosić się od Kotliny Gorzowskiej, Pojezierza Kujawskiego, Wysoczyzny Kaliskiej, Wzgórz Trzebnickich i Ostrzeszowskich oraz Równiny Opolskiej ku wschodowi. Na Nizinach Północno- i Południowopodlaskiej jej frekwencja dochodzi do 90-100%. Dopiero poza granicami kraju, zwłaszcza na Ukrainie i w Rosji — w zasięgu *Corynephorus canescens* — może on tworzyć regionalny zespół, wikaryzujący ze *Spergulo-Corynephoretum*, w kombinacji właściwej Europie Wschodniej. Przekonująco udokumentował takie fitocenozy Vicherek (1972, tab. 8; por. także tab. IX) materiałami z okolic Kijowa, skąd opisał dwa podzespoły w obrębie *Veronico-Corynephoretum* — *V.-C. typicum* i *V.-C. polytrichetosum poliferi*, z gatunkami wyróżniającymi: *Polytrichum piliferum*, *Ceratodon purpureus*, *Cladonia rangiformis*, *Cl. foliacea* i *Cl. pocillum*. Fitocenozy te uznał za pionierską murawę szczotlichową charakterystyczną dla Europy Wschodniej, wikariant geograficzny (sub)atlantyckiego *Spergulo-Corynephoretum*. Dokładne zbadanie i udokumentowanie w Europie Wschodniej tego zagadnienia byłoby bardzo pożyteczne dla ogólnej wiedzy o europejskich murawach szczotlichowych.

Być może, że niektóre płaty murawy szczotlichowej z *Veronica dillenii* z Polski Wschodniej już można byłoby uznać za wikarianty *Spergulo-Corynephoretum*, lecz nie potwierdziła takiego przypuszczenia analiza numeryczna.

8.4. OCENA WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ NIEKTÓRYCH TAKSONÓW

W fitocenozach klasy *Sedo-Scleranthetea* występują tzw. drobne taksony, wyróżnione z grup *Rumex acetosella*, *Festuca ovina* i *Potentilla argentea*. I tak, w murawach polskich występują: *Rumex acetosella* (często) i *R. tenuifolius* (dość często), *Festuca ovina* (dość często) i *F. questphalica* (rzadko), *Potentilla argentea* (dość często) i *P. neglecta* (rzadko). Przy czym *R. acetosella*, *F. ovina* i *P. argentea* (s. str.), mając swoje optima socjologiczno-ekologiczne w murawach napiaskowych, jednocześnie

mogą przechodzić do zbiorowisk z innych klas: segetalnych (i ruderalnych), wrzosowisk lub suchych łąk i borów sosnowych (zwykle pochodzenia antropogenicznego); pozostałe gatunki są wierne murawie napiaskowej. W odniesieniu do *R. acetosella* s. str. nie znalazła potwierdzenia opinia Głowackiego (1988, s. 98), iż „występowanie tego drobnego gatunku w półnaturalnych zbiorowiskach klasy *Sedo-Scleranthetea* w Polsce nie zostało stwierdzone”. Dokumentacja zielnikowa, zgromadzona do niniejszej pracy, potwierdza zarówno jego obecność w fitocenozach należących do związku *Corynephorion*, jak i obecność *R. tenuifolius*.

Artemisia campestris subsp. *campestris*, uznawany w przeszłości jako gatunek charakterystyczny klasy *Sedo-Scleranthetea* lub *Festuco-Brometea*, na obszarze Polski wykazuje wyraźne przywiązanie do zbiorowisk klasy *Sedo-Scleranthetea*, a optimum socjologiczno-ekologiczne — jak się wydaje — ma w rzędzie *Festuco-Sedetalia*, co potwierdza także Głowacki (1988). Podobne cechy wykazuje niżowa *Jovibarba sobolifera* subsp. *sobolifera*.

Obecność *Cladonia furcata* var. *palamaea* w fitocenozach psammofilnych po raz pierwszy zauważył Krieger (1937), a później potwierdzali Głowacki (1975, 1980) i Cieśliński (1979). Głowacki (1988) słusznie wprowadził ten takson do klasy, lecz nie udokumentował materiałami z całej Polski. Gatunek *Cl. furcata*, cechujący się szeroką skalą ekologiczną (por. Cieśliński 1979), wyraźne zróżnicowanie fitocenotyczne przejawia na poziomie poniżej gatunku. *Cl. furcata* var. *palamaea*⁹ jest taksonem psammofilnym i swoje optimum rozwojowe osiąga w suchych murawach napiaskowych. Taksonem leśnym jest *Cl. furcata* var. *furcata*¹⁰, której nierzadko towarzyszy *Cl. furcata* var. *pinnata*¹¹. Ostatni takson może występować sporadycznie również w murawach bardziej zaawansowanych w rozwoju (por. tab. II), *Cl. furcata* var. *furcata* jeśli występuje w murawach napiaskowych to tylko jako f. *fissa*¹²).

Na wartość diagnostyczną porostów zwracano uwagę już wcześniej, np. Cieśliński (1979) zaproponował uznać jako gatunki charakterystyczne klasy *Sedo-Scleranthetea*: *Cladonia mitis*, *Cladonia cervicornis* subsp. *verticillata*, *Cl. subulata* [= *Cl. cornutoradiata*], *Cl. floerkeana* i utrzymać *Coelocaulon aculeatum*, zaś do rzędu *Corynephorretalia*: *Stereocaulon condensatum*, *S. incrustatum*, *Trapeliopsis granulosa* [= *Lecidea granulosa*] i *Placynthiella oligotropha* [= *Lecidea uliginosa*]. Propozycja ta nie jest ważnie opublikowana (por. art. 8 „Kodeksu Nomenklatury Fitosocjologicznej”). W świetle obecnej wiedzy o pionierskich murawach, wartość diagnostyczna wielu z wyżej wymienionych gatunków nie została potwierdzona. *Cladonia subulata* występuje o wiele rzadziej w murawach psammofilnych niż *Cl. glauca*, która przez różnych badaczy jest pomijana ze względu na duże podobieństwo morfologiczne (dobrze je różnicuje chemotaksonomia). Oba taksony nie wykazują

⁹ Plecha wtórna, podecja, na całej długości, albo w dolnej części, brunatna, bez łusek, pokryta ciągłą warstwą korową (Motyka 1964, Nowak i Tobolewski 1975).

¹⁰ Podecja szare, sinawe, białawe, szarozielonkawe, gładkie, bez łusek, zwykle bez owocników (ibidem).

¹¹ Podecja zwykle prawie całe pokryte różnej wielkości łuskami (ibidem).

¹² Podecja z licznymi gronkowatymi, ciemnobrązowymi owocnikami oraz z szerokimi szczelinami z boków „gałązek” (ibidem).

właściwości fitocenotwórczych powyżej wariantu i mają walor tylko gatunków towarzyszących, co potwierdziła również analiza numeryczna zgromadzonych materiałów. Taki sam walor należy przypisać *Cl. floerkeana*, która częściej występuje jedynie w Polsce Północno-Zachodniej i tam może być brana pod uwagę jako gatunek lokalnie wyróżniający. *Stereocaulon condensatum* (dość rzadki), *S. incrustatum* (rzadki) oraz *Trapeliopsis granulosa* są gatunkami stadium inicjalnego rozwoju muraw, występującymi w bardzo określonych warunkach ekologicznych, podobnie jak *Placynthiella uliginosa* [= *Lecidea humosa*] i nie powinno się im dawać roli gatunków charakterystycznych ani rzędu, ani związku *Corynephorion*. Natomiast *P. oligotropha* częściej występuje na porębach (osiedlając się na humusie) niż w murawach psammofilnych (por. Fałtynowicz 1980).

Głowacki (1980) proponował włączyć nieformalnie jako gatunki charakterystyczne związku *Corynephorion*: *Cladina mitis*, *Cladonia cervicornis* subsp. *verticillata*, *Cl. foliacea*, *Coelocaulon aculeatum*, *Stereocaulon condensatum* i *S. incrustatum*. *Cladonia foliacea* jest dobrym gatunkiem wskaźnikowym muraw (sub)kserotermicznych z klasy *Festuco-Brometea* (por. Cieśliński 1979). Pozostałe gatunki omówiono wyżej.

W swojej późniejszej pracy Głowacki (1988, s. 96) wprowadził już formalnie do związku *Corynephorion* następujące taksony jako charakterystyczne: *Cladina mitis*, *Cladonia uncialis*, *Cl. cervicornis* subsp. *verticillata*, *Coelocaulon aculeatum*, *Stereocaulon condensatum*, *S. incrustatum* i *Cetraria islandica* f. *stygia*. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Cztery pierwsze gatunki, choć osiągają w tym związku swoje optimum rozwojowe, to jednak występują także w innych jednostkach rzędu *Corynephoretalia*, a nawet przenikają do innych rzędów. Natomiast *Cetraria islandica* (i f. *stygia*) również w obrębie związku *Corynephorion* nie wykazuje właściwości fitocenotwórczych i jest tylko taksonem towarzyszącym. Jako nieporozumienie należy potraktować przyjęcie przez Głowackiego (l.c., s. 97) *C. islandica* var. *sorediata* w roli taksonu charakterystycznego rzędu *Festuco-Sedetalia*. Takson ten jest wyraźnie związany z obszarami wpływów atropopresji, zwłaszcza gazowych zanieczyszczeń powietrza i w warunkach naturalnych występuje rzadko, np. w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym przed uruchomieniem elektrowni znano kilka stanowisk, obecnie występuje masowo.

Spotyka się również pogląd, że *Cladonia uncialis* jest porostem leśnym (por. Cieśliński 1979, Fałtynowicz 1980). Jest to wybitny psammofit śródlądowy i podobnie jak *Cladina mitis*, optymalnie rozwija się w murawie napiaskowej. Oba gatunki mogą występować w fazach zaroślowych między *S.-C. cladinetosum* a borem chrobotkowym *Cladonio-Pinetum* (por. Tobolewski 1963, Zielińska 1967), gdzie współpanują z *Cladina arbuscula* oraz *C. rangiferina* i w *Cladonio-Pinetum* osiągają swoje skrajne stanowiska ekologiczne, razem z innymi psammofitami murawowymi. Gatunki te mogą jeszcze egzystować w innych zbiorowiskach nieleśnych: wrzosowiskach, torfowiskach wysokich, a nawet zbiorowiskach naskalnych w górach. *Cladina mitis* wnika także obficie do nadmorskiego związku *Koelerion albescentis*, gdzie *Cladonia uncialis* może być zastępowana przez *Cl. destriata*. Zatem stanowiska leśne są już dla taksonu ekstremalne.

Warto w tym miejscu nadmienić również, iż podawane w niektórych publikacjach z Niemiec i Polski *Cladina arbuscula* i *C. rangiferina* z wysokimi stopniami pokrycia są ewidentną pomyłką. Te wybitnie leśne gatunki są mylone z *C. mitis*, z którą rzeczywiście mogą współwystępować w zwiększonej ilościowości w zaroślach przejściowych do *Cladonio-Pinetum*, które nie są już murawą chrobotkową. *Spergulo-Corynephoretum cladinetosum* jest jedynie miejscem inicjacji ich rozwoju, co następuje wraz z pojawianiem się podrostów drzew borowych, ale ich udział w fitocenozie nie przekracza 5% pokrycia (por. 8.1, tab. II).

Nie ma całkowitej zgodności co do składników związku *Corynephorion* pełniących rolę gatunków charakterystycznych zespołu *Spergulo-Corynephoretum*, zwłaszcza w odniesieniu do *Teesdalia nudicaulis* (por. Korneck in Oberdorfer 1978, Głowacki 1988). *Teesdalia nudicaulis* występuje na obszarze Polski w obrębie swego zasięgu i wraz ze *Spergula morisonii* tworzy charakterystyczną kombinację gatunków w obrębie *Spergulo-Corynephoretum* (tab. II). Natomiast we wschodniej części swojego zasięgu przejawia tendencje migracyjne do zbiorowisk zastępczych, zwłaszcza do nieustabilizowanych i otwartych zbiorowisk segetalnych (ryc. 17) powiązanych ze sobą przestrzennie, co może prowadzić do błędnych wniosków (por. 8.3).

Zachodzi potrzeba skomentowania roli edyfikacyjnej niektórych gatunków charakterystycznych innych syntaksonów, należących do rzędów *Corynephorotalia* i *Festuco-Sedetalia*.

Dla Thymus serpyllum zrezygnowano z epitetu *Th. s. subsp. serpyllum* (incl. *Th. s. subsp. angustifolius* (Pers.) Arcangeli i *subsp. rigidus* (Wimmer et Grab.) Lyka), ponieważ tylko ten podgatunek występuje w obrębie zasięgu *Spergulo-Corynephoretum*. Drugi podgatunek, *Th. s. subsp. tanaensis* (Hyl.) Jalas, znany jest tylko z północnej i wschodniej Fennoskandii oraz północnej Rosji (*Flora europaea* 1972).

Scleranthus annuus subsp. *polycarpus* występuje w fitocenozach związku *Corynephorion* w całej Polsce (choć niezbyt obficie) w obrębie swojego zasięgu geograficznego (Guzikowa 1964). Wiele stanowisk tego teksonu znajduje się jednocześnie poza granicą zasięgu *Thero-Airion*, którego jest gatunkiem charakterystycznym. W odróżnieniu od segetalnego *S. a. subsp. annuus* — który może także przechodzić do *Spergulo-Corynephoretum* — jest to typowy psammofit.

Większej uwagi wymaga podejście do gatunków z grupy *Festuca ovina*: *F. trachyphylla* (Ch *Festuco-Sedetalia*), *F. psammophila* i *F. polesica* (Ch *Koelerion*). *Festuca trachyphylla* występuje w całej Polsce dość często i obficie (por. Pawlus, 1983/1985). Dwa pozostałe gatunki są wikariantami geograficznymi i przez obszar Polski przechodzą granice ich zasięgów (por. Pawlus l.c.). *Festuca psammophila* rośnie w Polsce Zachodnio-Środkowo-Południowej, zaś *F. polesica* — w Polsce Północnej i Wschodniej (i tam czasami bywa mylona ze swoim wikariantem). Są także obszary, np. Kotlina Toruńska, Równina Łęczyńsko-Włodawska, gdzie występują wszystkie trzy gatunki (obserwacje własne).

Zespół sporka wiosennego i szcztolichy siwej jest przykładem pionierskiego zbiorowiska półnaturalnego lub, jak chcą inni, antropogenicznego, niżowych obszarów piaszczystych Polski. Jest to stadium inicjalne rozwoju roślinności od lotnego piasku do trwałego lasu.

Spergulo-Corynephoretum jest wprawdzie tylko najwcześniejszym etapem rozwoju roślinności, trwającym nie dłużej niż 25 lat, a poszczególne jego stadia lub fazy (podzespoły, warianty) trwają jeszcze krócej (do 10-15 lat), to spełnia ważną rolę biologiczną: uruchamia procesy ekologiczne, utrwała roślinnością luźne piaski (przeciwdziała erozji wietrznej), inicjuje procesy glebotwórcze przygotowując podłoże dla dalszych ogniów sukcesji; urozmaica krajobraz, zwłaszcza przemysłowy, kultur leśnych i polnych.

Dokładne poznanie budowy i rodzimego składu gatunkowego murawy szcztolichowej, naturalnych tendencji dynamicznych fitocenoz, wykształcających się zwłaszcza w obrębie siedlisk piaszczystych poleśnych i porolnych, powinno być przydatne do gospodarowania i urządzania środowiska przyrodniczego.

Spergulo-Corynephoretum, poprzez swój zestaw gatunków psammofilnych przystosowanych do życia w najtrudniejszych warunkach, przejawia łatwość w odnawianiu pokrywy roślinnej, może być nadzieją w obszarach najsilniejszej destrukcji krajobrazu — m.in. w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym, w Polsce Środkowej — do jego rekultywacji. Na skutek zjawiska regresji kwasolubne *Spergulo-Corynephoretum* może stać się substytutem dla borów sosnowych i mieszanych oraz roślinności nieleśnej, związanej z wyższym poziomem wód gruntowych.

Spergulo-Corynephoretum, nie tylko jako zespół pionierski w sukcesji pierwotnej, ale także jako półnaturalne zbiorowisko zastępcze dla lasów, nie ma cech zbiorowiska trwałego, choć znany jest przypadek antropoklimaksu na wydmach w rezerwacie „Grzędy” (Kotlina Biebrzańska), gdzie zaprzestano użytkowania rolniczego wydym po pacyfikacji mieszkańców wsi w czasie wojny. Murawy, *S.-C. typicum* i *S.-C. cladinetosum*, trwają tam nieprzerwanie od 50. lat. Jest to możliwe dzięki właściwościom gleb, mianowicie po wiosennym przesuszeniu gleby te są hydrofobowe; brak podsiąkania kapilarnego trwa przez cztery miesiące, stąd las nie ma warunków do wzrostu (prof. Z. Prusinkiewicz i prof. A. Kowalkowski, informacja ustna).

Tworzenie się, utrzymywanie i rozprzestrzenianie *Spergulo-Corynephoretum* jest współcześnie uwarunkowane przede wszystkim użytkowaniem środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza: daleko posuniętą degeneracją roślinności i degradacją siedlisk na skutek wielowiekowej antropopresji (por. także Czyżewska i Olaczek 1983, Olaczek 1986b), utrzymującej się także obecnie (przewaga kultur sosnowych nad lasami naturalnymi, zręby zupełne lasów, ponowne zalesienia sosną, użytkowanie rolnicze, industrializacja, turystyka, wzrost erozji wietrznej w związku z odkrywaniem gleby po wyrębie starych lasów lub po zaprzestaniu użytkowania rolnego). Natomiast zróżnicowanie fitocenotyczne i dynamiczne zależy głównie od siedliska

zdegradowanego użytkowaniem, tj. od pochodzenia piasków (wydmowe, rzeczne, akumulacji lodowcowej), składu mechanicznego, zasobności w składniki pokarmowe, odczynu, rzeźby oraz wieku murawy.

Spergulo-Corynephoterum wyróżnia się zwiększoną skalą zastępczości, od siedlisk borowych, z którymi łączą je tradycyjnie różni autorzy (por. Kornaś 1957, 1977, Tüxen 1961, Piotrowska i Celiński 1965, Faliński 1966, Krausch 1968, Celiński i Balcerkiewicz 1973, Korneck 1974, Głowacki 1975, Matuszkiewicz 1978/1979, 1982, Moravec et al. 1983), kwaśnych dąbrów i borów mieszanych (Tüxen 1937, Korneck l.c., Głowacki 1988, Moravec et al. l.c., Czyżewska 1986) po świetliste dąbrowy i kwaśne buczyny (Czyżewska l.c.)

Na obszarze Polski skala zastępczości *Spergulo-Corynephoterum* przejawia się od potencjalnych siedlisk borowych po siedliska dąbrów i buczyn (w Polsce Zachodniej i częściowo Środkowej), boru mieszanego, świetlistej dąbrowy i grądu typowego – w Polsce Środkowej i Wschodniej (por. ryc. 18). Zjawisko to jest wynikiem silnego i trwałego działania czynników antropogenicznych na roślinność, zwłaszcza nakładania się użytkowania leśnego i nieleśnego. Do takiego ujednolicenia (w sensie Tüxena 1961) lub antropogenicznej konwergencji (w sensie Olaczka 1986a) zbiorowisk zastępczych dalekiego stopnia dochodzi na poziomie zespołu. Równocześnie antropogenicznej zbieżności towarzyszy zjawisko rozbieżności. Występuje ono na poziomie jednostek syntaksonomicznych poniżej zespołu *Spergulo-Corynephoterum*, podzespołów oraz wariantów (por. Czyżewska 1986) i odpowiada zachowanej różnorodności siedliskowej mimo głębokiego nieraz wyjąłowania podłoża. Zachowanie zróżnicowania siedliskowego, zwłaszcza edaficznego jest impulsem do stosunkowo szybkiego w czasie różnicowania się wewnętrznego zespołu, co nadaje odpowiedni kierunek sukcesji i rozpoczyna długotrwały naturalny proces zmierzający do odtworzenia roślinności zgodnej z potencjalnym siedliskiem. Sukcesja taka może być przerwana i cofnięta do stanu wyjściowego lub zmieniona ponowną działalnością człowieka.

W kartowaniu roślinności sytuacja *Spergulo-Corynephoterum* jest nieco inna, niż np. zbiorowisk leśnych lub segetalnych. Jako zbiorowisko małopowierzchniowe (poza *S.-C. cladinetosum*) przy kartowaniu roślinności rzeczywistej w skalach 1:25000 (nawet 1:5000) nie mieści się w skali mapy. Jednostkami kartograficznymi mogą być układy kompleksowe, mozaikowe lub zonacyjne, złożone z różnorodnych syntaksonów pod względem hierarchicznym. Mimo to, wydzielane są rzadko. Jednak nawet wtedy, gdy ze względu na małą biochorę nie były w skali mapy kartowane, musiały być dobrze rozpoznane i sklasyfikowane z tego względu, że posiadają one duży walor edyfikacyjny, pomagający w poprawnej ocenie siedliska i klasyfikacji innych zbiorowisk, z którymi są dynamicznie powiązane. Ich znaczenie zatem polega najczęściej na pomocy przy ustalaniu dynamicznych kręgów zbiorowisk roślinnych, stanowią bowiem dobry wskaźnik edyfikacyjny, ułatwiający ocenę siedliska i powiązań zbiorowisk homologicznych. W krajobrazach bardzo silnie i trwale zmienionych antropogenicznie mogą stanowić w wielu przypadkach miarę degradacji siedlisk i degeneracji zbiorowisk leśnych, co można wykorzystać praktycznie. Taką wartość informacyjną wykazują syntaksony poniżej zespołu.

Ryc. 18. Hipotetyczna zastępczość zbiorowisk murawowych w stosunku do pierwotnych zbiorowisk leśnych w Polsce Środkowej

Fig. 18. The hypothetical replacement of psammophilous grassland communities with respect to the primary forest communities in Central Poland

Dla poprawności zbioru dokumentacji fitosocjologicznej zespołu *Spergulo-Corynephoretum* wymagane jest spełnienie kilku warunków, mianowicie:

(1) Powierzchnia zdjęcia fitosocjologicznego nie powinna być mniejsza niż 4 m² ani większa niż 9(10) m² dla fitocenoz *S.-C. typicum*; nie większa niż 15 m² ani mniejsza niż 8(9) m² dla fitocenoz *S.-C. thymetosum* i *S.-C. cladinetosum*.

(2) Prawidłowy czas wykonywania zdjęć fitosocjologicznych mieści się w przedziale od maja do połowy lipca. Zdjęcia wykonywane w marcu i kwietniu oraz od sierpnia do grudnia włącznie są metodycznie niepoprawne. Zasady tej nie może zmienić np. dobra obecnie znajomość cyklu życiowego jesienno-wiosennego *Spergula morisonii* (Symonides 1974d), której kiełkowanie i pierwszy okólek liści może być widoczny już pod koniec sierpnia. Jesienią są widoczne także siewki *Teesdalia nudicaulis*.

(3) Dokumentacje badawcze bywają obarczone błędami taksonomicznymi, zwłaszcza w odniesieniu do porostów, niektórych wątrobowców i „drobnych” gatunków naczyniowych: błędnie oznaczanych taksonów lub pomijania w spisach florystycznych całych ich grup.

Unikaniu takich błędów powinno sprzyjać specjalistyczne opracowanie *Spergulo-Corynephoretum* dla Polski. W niniejszej pracy starano się wypracować taki model podając wszystkie taksony stwierdzone w badanych fitocenozach, obejmujących całą Polskę (tab. II, IV, VI – VIII). Podano także model udziału i częstotliwości mszaków na tle dynamiki fitocenoz dla małego obiektu badawczego w Polsce Północno-Wschodniej (ryc. 12). Uściślono grupy taksonomiczne ważniejszych roślin naczyniowych, ujmowanych najczęściej szeroko.

Określanie omawianych typów fitocenoz jako ubogich florystycznie, może wynikać z jednej strony z nieznamości taksonów zarodnikowych, z drugiej zaś strony z niezbyt dokładnego zbioru tych roślin w badanych płatach.

W odniesieniu do porostów mogą być popełniane tzw. błędy zbiorowe, jak je określiła prof. Hanna Piotrowska na seminarium Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB „Rola roślin zarodnikowych w zbiorowiskach roślin wyższych, w ich genezie, strukturze, dynamice i funkcji”, w 1986 r., np. *Cladina mitis* et *arbuscula*¹³, *Cladonia cornuta* et *gracilis*, *Cl. furcata* et *gracilis*¹⁴, *Cl. cenomyce* indet.¹⁵, *Cl. chlorophaea* coll.¹⁶.

Nieodzwonne jest pobieranie z każdego badanego płatu roślinności prób roślin zarodnikowych (tak, jak robią to np. sami lichenolodzy), które można przekazać specjalistom do oznaczenia. Odnosi się to również do roślin wyższych, zwłaszcza do „drobnych” taksonów, rodzaju *Oenothera* i in.

¹³ Jest to połączenie gatunków typowo murawowego i leśnego, a przy tym różniących się chemotaksonomicznie, tj. *C. mitis* nie barwi się paraftenlenodwuaminą (P–), a *C. arbuscula* barwi się (P+ czerwono) (por. Motyka 1964, Nowak i Tobolewski 1975).

¹⁴ Patrz: Motyka, Nowak i Tobolewski (ibidem).

¹⁵ Chodzi o taksony z czerwonymi owocnikami, jak: *Cl. floerkeana*, *Cl. bacillaris*, *Cl. coccifera* i in.

¹⁶ Obejmuje co najmniej trzy taksony: *Cl. chlorophaea*, *Cl. pyxidata* i *Cl. fimbriata*.

W przypadku roślin zarodnikowych, zwłaszcza porostów, wymagane jest zastosowanie innej techniki rozpoznawania i dokonywania zbioru prób. Nasz wzrok musi być w tym przypadku jak najbliżej tych roślin, co wiąże się wielokrotnie z czołganiem, z pracą „na kolanach” i stałym używaniem lupy, noża i specjalnie przygotowanych, składanych torebek (kopert). Używanie szkła powiększającego w terenie świetnie wprawia nasze oczy do widzenia całej różnorodności tych gatunków we właściwy sposób.

Liczne gatunki porostów wymagają sprawdzenia z określonym odczynnikiem chemicznym, który można również zabrać w teren¹⁷, co ułatwia identyfikację lub potwierdzenie niektórych taksonów, ale nie wszystkich. Wiele z nich można potwierdzić lub zidentyfikować jednak dopiero w pracowni, podobnie jak niektóre rośliny naczyniowe.

9. WYNIKI I WNIOSKI

(1) Badania pionierskich muraw napiaskowych ze związku *Corynephorion* przeprowadzono na obszarze Polski w całym nizinno-wyżynnym zasięgu muraw i analizowano je na tle podobnych zbiorowisk z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Szwecji.

(2) Ze względu na duże zróżnicowanie poglądów na syntaksonomię pionierskich muraw psammofilnych i skłonność do przeprowadzania zmian w systemie oraz do wyróżniania nowych zespołów na podstawie badań lokalnych, przedstawiono rozwój poglądów na stanowisko systematyczne tych muraw (por. rozdz. 3), a także zebrano i usystematyzowano do 1991 r. polską dokumentację fitosocjologiczną i ekologiczną (por. rozdz. 4), co powinno ułatwiać badania w przyszłości.

(3) Dokumentacja materiałów terenowych w niniejszej pracy była tworzona i gromadzona z myślą o syntezie regionalnej (dotyczącej całej Polski) jako części syntezy europejskiej muraw napiaskowych.

(4) Wykorzystano 1648 zdjęć fitosocjologicznych znanych z Polski, z tego 1055 zdjęć (444 zdjęcia publikowane i 611 niepublikowanych) poddano klasyfikacji numerycznej. Liczba wszystkich cech florystycznych, ze względu na które porównywano zdjęcia, wynosiła 376. Do analizy numerycznej użyto programu TWINSPLAN. Program posłużył także do ułożenia dwunastu tabel analitycznych, których wyciągi, zawierające stopnie stałości i współczynniki pokrycia, zamieszczono w tabeli synoptycznej (tab. II). Tabele analityczne (tab. IV, VI-VIII) to załączniki do typów nomenklatorycznych.

(5) Ustalono, że mimo różnorodności podejść syntaksonomicznych na śródładowych, bezwodnych, skąpożywnych i kwaśnych piaskach różnego pochodzenia,

¹⁷ Chodzi przede wszystkim o świeży, ok. 10% roztwór paraftenylenodwuaminy [$C_6H^4(NH_2)_2$] w alkoholu etylowym (w wyjątkowych sytuacjach można użyć denaturatu) (Nowak i Tobolewski 1975).

w Polsce występuje jeden pionierski zespół *Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis* (ryc. 2) należący do związku *Corynephorion* Klika 1931, rzędu *Corynephoralia* Klika 1934 em. Krausch 1962 i klasy *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. em. Th. Müller 1961.

(6) Przyjęto system syntaksonomiczny proponowany przez K r a u s c h a (1968). Zestaw gatunków charakterystycznych wyższych jednostek oparto na propozycjach M ü l l e r a (1961) i K r a u s c h a (1968), ale jednocześnie weryfikowano na podstawie obserwacji i wyników własnych badań. Natomiast zmieniono syntaksonomię *Spergulo-Corynephorum*. Dla wszystkich syntaksonów podano typy nomenklatoryczne oraz zestawy gatunków charakterystycznych i wyróżniających (por. Część III, 7.1, 7.2).

(7) Nazwa zespołu: *Spergulo vernalis-Corynephorum canescentis* R. Tx. (1928) 1955 była używana jako *nomen nudum*. W celu nadania jej ważności podano typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 5(1863) w Tab. IV. Obecnie nazwa ta brzmi: *Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis* R. Tx. ex K. Czyżewska hoc loco. Gatunkami charakterystycznymi zespołu są *Spergula morisonii* i *Teesdalia nudicaulis*.

Zespół dzieli się na trzy podzespoły i dziesięć wariatów:

S.-C. typicum subass. nova hoc loco

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 5(1863) w Tab. IV (typus ass., subass. et var.)
var. *typicum* var. nova hoc loco

var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. nova hoc loco

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 22(567) w Tab. IV

D: *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *Cladonia subulata*

var. z *Hypochoeris radicata*. K. Czyżewska in Wika 1975 var. nova

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 26(4) w Tab. 5 in Wika (1975, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wyd. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol. 40) lectotypus hoc loco

D: *Hypochoeris radicata*, *Agrostis capillaris*, *Jasione montana*, *Helichrysum arenarium*, *Polytrichum juniperinum*

Postać przejściowa między *S.-C. typicum* a *S.-C. thymetosum serpylli* *S.-C. thymetosum serpylli* subass. nova hoc loco

S.-C. thymetosum serpylli subass. nova hoc loco

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 15 (709) w Tab. VI (typus subass. et var.)

D: *Thymus serpyllum*, *Arenaria serpyllifolia*, *Rhacomitrium canescens*

var. *typicum* var. nova hoc loco

var. z *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. nova hoc loco

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 18 (604) w Tab. VI

D: *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *Brachythecium albicans*

var. z *Festuca ovina* var. nova hoc loco

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 6 (1940) w Tab. VII

D: *Festuca ovina*, *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*

var. z *Festuca psammophila*. K. Czyżewska in K. Czyżewska 1986 var. nova

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 12 (226) w Tab. 4 in Czyżewska (1986, Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 2) lectotypus hoc loco

D: *Festuca psammophila*, *Cladonia foliacea*

S.-C. *cladinetosum mitis* R. Tx. (1928) 1937 em. K. Czyżewska hoc loco

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 13 (2257) w Tab. VIII (typus subass. et var.)

D: *Cladina mitis*, *Coelocaulon aculeatum*, *Cladonia uncialis*, *Cl. cervicornis* subsp. *verticillata*

var. *typicum* var. nova hoc loco

var. z *Thymus serpyllum* K. Czyżewska in Cieśliński 1979 var. nova

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 37 (239) w Tab. 3 in Cieśliński (1979, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagog., Kielce, Tab. 3) lectotypus hoc loco

D: *Thymus serpyllum*, *Rhacomitrium canescens*

var. z *Polytrichum piliferum* var. nova hoc loco

Typ nomenklatoryczny: Zdj. fs. 27 (418) w Tab. VIII

D: *Polytrichum piliferum*, *Cladonia furcata* var. *palamaeae*

(8) Wyróżniono dwie odmiany geograficzne zespołu: — subatlantycką (D geogr. *Carex areanaria*), obejmującą zachodnie i północno-zachodnie krańce Polski; — subkontynentalną (D geogr. *Veronica dillennii*), obejmującą pozostałe obszary Polski. Odmiana subkontynentalna jest charakterystyczna dla wschodniej części atlantycko-subatlantyckiego zasięgu zespołu. Wyróżnia ją stała obecność gatunków subkontynentalnych, ciepłolubnych i umiarkowanie kserotermicznych (określanych w pracy jako subkserotermiczne) z rzędu *Festuco-Sedetalia* i klasy *Festuco-Brometea*. Gatunki te dość wcześnie przenikają do pionierskiej murawy szczotlichowej i występują czasami z wysoką stałością, ale siłą fitocenotwórczą wykazują wyłącznie w syntaksonach niższej rangi (podzespółach lub wariantach).

(9) Zespół *Spergulo-Corynephorum* jest związany z serią piaszków eolicznych, glacyfluwialnych, glacialnych i aluwialnych. Podzespoły odzwierciedlają lokalną zmienność siedliskową: S.-C. *typicum* rozwija się na piaskach luźnych od bardzo silnie kwaśnych do kwaśnych, S.-C. *cladinetosum mitis* — na piaskach luźnych (var. z *Thymus* również na piaskach słabogliniastych) od silnie kwaśnych do lekko kwaśnych, a S.-C. *thymetosum serpylli* — na żyzniejszych piaskach luźnych i słabogliniastych, od silnie kwaśnych do obojętnych.

(10) Cykl rozwojowy zespołu wynosi około 25 lat. Podzespół typowy inicjuje proces zarastania i utrwalania piaszków śródlądowych; odpowiada stadium inicjalnemu rozwojowi murawy. Podzespoły chrobotkowy i macierzankowy to bardziej zaawansowane w rozwoju stadia optymalne, z tworzącą się warstwą podszytu, bardziej zwarte i bogatsze w gatunki. Pionierskie murawy napiaskowe zaczynają wycofywać się, gdy dochodzi do nich mniej niż 70–75% światła słonecznego (23–17 tys. Lx). Wycofywanie się murawy powodują w głównej mierze spontanicznie rozwijające się drzewa i krzewy budujące warstwę podszytu.

(11) Współcześnie zespół *Spergulo-Corynephorum* najczęściej uczestniczy w sukcesji wtórnej rekreatywnej i wówczas może być traktowany jako półnaturalne zbiorowisko zastępcze dla lasu. Nie jest zaś zbiorowiskiem zastępczym wtedy, gdy powstaje w toku sukcesji pierwotnej. Dokładne poznanie sukcesji pionierskich muraw szczotlichowych może być wykorzystane w praktyce, przy zagospodarowywaniu środowiska przyrodniczego, jako jedno z ogniw regeneracji roślinności i gleby.

(12) W pracy nie zamierzano udowadniać zgodności lub niezgodności metod konwencjonalnej (B r a u n - B l a n q u e t 1964) i numerycznej w porządkowaniu badanego zbioru. Użycie metody numerycznej było próbą wyjścia z trudności, które pokazywało m.in. doświadczenie terenowe z obszaru Polski, gdzie stwierdzano inne postaci *Spergulo-Corynephorum* niż opisywane np. z Niemiec i podobnie wyróżniane w Polsce.

Program DECORANA dał odpowiedź, że jest to jeden, zwarty zbiór. Podzbiory nie wydzielają się wyraźnie, choć z różnego ułożenia osi można było odczytać gradienty żyzności siedliska, odczynu lub kontynentalizmu klimatu. Natomiast nie udawało się jednoznacznie potwierdzić klasyfikacji hierarchicznej, co było ważne wobec bardzo zagmatwanej dotychczasowej klasyfikacji.

Warunki klasyfikacji hierarchicznej spełnił program TWINSpan. Badany zbiór był analizowany do poziomu dwunastego, czyli był maksymalnie rozdzielony. Zakończenie analizy m.in. na poziomie szóstym dało wynik mniej jasny i trudniejszy w interpretacji. Syntaksonomiczny model uzyskany z programu TWINSpan ma wprawdzie budowę dychotomiczną (ryc. 2), ale w rzeczywistości, poczynając od poziomu drugiego (*0 — *1) i trzeciego (*00 — *01) jest modelem przestrzennym, uwzględniającym ciągłość przejść między syntaksonami (wariantami) oraz gradient żyzności, odczynu podłoża i kontynentalizmu klimatu od prawej ku lewej stronie modelu.

Dzięki metodzie numerycznej, którą zastosowano, uzyskano obraz roślinności wolny od subiektywnej oceny. Z tego punktu widzenia program TWINSpan spełnił pokładane oczekiwania.

(13) Materiał użyty do badań pochodzi głównie z lat 1973 — 1987 i obejmuje całą Polskę. Najintensywniej zbadano Polskę Środkową i ta część kraju posiada najwięcej nowych danych. Niektóre regiony Polski, jak Pojezierza Bałtyckie i Polska Zachodnia (wzdłuż Odry) wymagają jeszcze specjalnych, dłużej trwających badań. Warto także zintensyfikować badania w Polsce Wschodniej, a zwłaszcza w Południowo-Wschodniej (wzdłuż Bugu), gdzie może mieć miejsce inicjacja wschodnio-europejskich muraw szczytowych wikaryzujących ze *Spergulo-Corynephorum*, np. w sensie V i c h e r k a (1972). Zachodzi również potrzeba ponownych badań i krytycznego opracowania materiałów opublikowanych przed rokiem 1980. Nie można bowiem wykluczyć zmian typów fitocenoz w czasie kilku dziesięcioleci.

(14) Po krytycznej analizie materiałów zostały wyodrębnione podstawowe jednostki typologiczne muraw napiaskowych oraz określona ich ranga.

(15) Głównym wynikiem pracy jest ustalenie istnienia jednego zespołu roślinnego *Spergulo morisonii-Corynephorum canescentis*, do którego należą wszystkie pionierskie murawy napiaskowe w Polsce i w jej bliskim sąsiedztwie.

(16) W obrębie zespołu zweryfikowano podawane wcześniej i opisano nowe jednostki syntaksonomiczne w randze podzespołów i wariantów.

(17) Jako nową jednostkę w randze podzespołu opisano *S.-C. thymetosum serpylli*. Podzespół macierzankowy najlepiej charakteryzuje wschodnią część zasięgu *Spergulo-Corynephorum* i jest łącznikiem muraw pionierskich ze zwartymi i mezo-filnymi fitocenozami z rzędu *Festuco-Sedetalia* oraz jest początkiem syntaksonomicznej granicy muraw napiaskowych i suchych łąk.

(18) Zrewidowano i poprawiono opisywane przez wielu autorów syntaksony muraw chrobotkowych, występujących w całym zasięgu *Spergulo-Corynephoretum*. Udowodniono, że postać napiaskowej murawy chrobotkowej jest podzespołem w obrębie *Spergulo-Corynephoretum*, *S.-C. cladinetosum mitis*, a nie zespołem, np. *Corniculario-Cladonietum*.

(19) W wyniku tych badań kilkanaście opisanych wcześniej jednostek syntaksonomicznych różnej rangi traci ważność bądź też staje się synonimami. Zawiła syntaksonomia pionierskich muraw szczotlichowych została w ten sposób uproszczona i wyjaśniona.

(20) Wszystkie syntaksony, z zespołem włącznie, opisano i udokumentowano przez wskazanie typów nomenklatorycznych, zgodnie z wymogami „Kodeksu Nomenklatury Fitosocjologicznej”.

(21) Opisano rolę i pozycję oraz podano rzeczywisty udział porostów we wszystkich syntaksonach *Spergulo-Corynephoretum*. Odmienne interpretacja wyróżnianych jednostek przez wielu autorów wynikała czasami z nieuwzględniania porostów, odgrywających bardzo ważną rolę w tym typie roślinności.

Wyróżniono i zinterpretowano również grupę wąsko ujmowanych taksonów roślin kwiatowych i zarodnikowych.

Listy florystyczne w tabelach (tab. II, IV, VI-VIII) mogą być traktowane jako wstępny model całościowego opisu *Spergulo-Corynephoretum* dla Polski.

(22) Wskazano na rolę *Spergulo-Corynephoretum* w silnie zdegradowanym środowisku przyrodniczym Polski, na które, jako zespół pionierski i stadium inicjalne rozwoju roślinności od murawy do lasu, reaguje poszerzoną skalą zastępczości od siedlisk borowych i borów mieszanych po świetliste dąbrowy, kwaśne buczyny i ubogi grąd typowy. Zjawisko to, określone przez Olaczka (1986a) antropogeniczną konwergencją, jest wynikiem silnego i trwałego działania czynników antropogenicznych na roślinność, zwłaszcza przemiennego użytkowania leśnego i nieleśnego, a objawia się na poziomie zespołu. Równolegle towarzyszy mu zjawisko rozbieżności, które ujawnia się na poziomie podzespołów i wariantów, i jest rezultatem odziedziczonej różnorodności siedliskowej prowadzącej do różnokierunkowej sukcesji odtwarzającej.

10. LITERATURA

- Abromeit, J., Jentzsch, A., Vogel, G. 1898. Flora von Ost- und Westpreussen. I. Samenpflanzen oder Phanerogamen. 1. Hälfte (Bogen 1—25). In Kommission bei R. Friedländer und Sohn, Berlin: 1—400.
- Abromeit, J., Jentzsch, A., Neuhoﬀ, Vogel, G. 1934. Flora von Ost- und Westpreussen. 2. Hälfte, IV. Teil (Bogen 53—55), Preussischer Botanischer Verein E. V., Königsberg Pr.: 829—1248.
- Andrzejewski, R., Falińska, K. (red.). 1986. Populacje roślin i zwierząt. Ekologiczne studium porównawcze. PWN, Warszawa.
- Andrzejewski, R., Symonides, E. 1986. Organizacja przestrzenna populacji. W: Andrzejewski, R., Falińska, K. (red.). Populacje roślin i zwierząt. Ekologiczne studium porównawcze. PWN, Warszawa: 136—165.

- Anikiejówna, Cz., Gorska, J. 1949. Stosunki florystyczne i fitosocjologiczne wydmy Zadroże. W: Prüffer, J. (red.). Z badań zespołowych wydmy Zadroże. Studia Soc. Sci. Torun., suppl. I: 1–9.
- Babczyńska, B. 1978. Zbiorowiska murawowe okolic Olsztyna koło Częstochowy. Acta Biol. 5: 169–215.
- Babczyńska-Sendek, B. 1984. Zbiorowiska łąkowe i murawowe Wyżyny Częstochowskiej. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniw. Śląski, Katowice: 1–187.
- Balcerkiewicz, S. 1976. Roślinność obszaru źródłkowego Tetyńskiej Strugi na Pojezierzu Myśliborskim. Zbiorowiska leśne i zaroślowe. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Wyd. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol. 45: 1–85.
- Balcerkiewicz, S., Brag, A. 1978. Vegetation on the forest roads in pine forest. In: Wojterski, T. W. (ed.). Guide to the Polish International Excursion, 1–20 June 1978. Internat. Soc. for Vegetation Sci. A. Mickiewicz University, Poznań, Poland: 115–117.
- Bandžiulienė, R., Rudzinskaitė, T. 1972. Augalų bendrijų sukecsijos Kuršių Nerijoje ir kerpių išplitimas jose. Lietuvos TSR aukšųjų Mokyklų Mokslo Darbai, Biologija 12: 5–23.
- Barkman, J. J., Moravec, J., Rauschert, S. 1986. Code of phytosociological nomenclature (Code der pflanzensoziologischen Nomenclatur, Code de nomenclature phytosociologique). 2nd ed. Vegetatio 67: 145–195.
- Bidauld, M. 1961. Sur l'existence du *Corynephorum canescentis* en Bourgogne. Bull. Sci. Bourgogne 20: 49–56.
- Braun-Blanquet, J. 1915. Les Cévennes méridionales (Massif de L'Aigona). Arch. Sci. Phys. Natur. Genève 48: 1–126.
- Braun-Blanquet, J. 1955. *Sedo-Scleranthion* neu für die Westalpen. Österr. Bot. Zeitschr., Wien 102: 476–485.
- Braun-Blanquet, J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Springer Verl., Wien-New York.
- Celiński, F., Balcerkiewicz, S. 1973. Zespoły muraw psammoflinych w Wielkopolskim Parku Narodowym pod Poznaniem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Wyd. Mat.-Przyr. 5, 4: 1–31.
- Celiński, F., Wika, S. 1978. Próba nowego spojrzenia na stosunki fitosocjologiczne rezerwatu „Parkowe” w Złotym Potoku koło Częstochowy. Fragm. Flor. Geobot. 24, 2: 277–307.
- Ceynowa, M. 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą. Studia Soc. Sci. Torun., Sec. D 8, 4: 1–155.
- Chodań, J., Grzesiuk, W., Mirowski, Z. 1980. Zarys gleboznawstwa i chemii rolnej. PWN, Warszawa.
- Cieśliński, S. 1979. Udział oraz rola diagnostyczna porostów naziemnych w zbiorowiskach roślin naczyniowych Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Wyd. Wyższa Szkoła Pedagog., Kielce: 1–252.
- Cieśliński, S., Halicz, B. 1971. Studia nad zespołami porostów Gór Świętokrzyskich. ŁTN, Prace Wyd. III 111: 1–60.
- Ciosek, M. T. 1984. Interesujące gatunki roślin we florze miasta Wyszkowa. Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, Ser. Przyr. 4: 7–23.
- Collier, B. D., Cox, G. W., Johnson, A. W., Miller, Ph. C. 1978. Ekologia dynamiczna. PWRiL, Warszawa.
- Czyżewska, K. 1973. Porosty (Lichenes) Wzgórz Radomszczańskich. Maszynopis pracy doktorskiej. Bibl. Uniwersytecka, Łódź: 1–208 + aneks.
- Czyżewska, K. 1986. Murawy piaskowe w Załęczańskim Parku Krajobrazowym (Wyżyna Wieluńska). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 2: 471–522.
- Czyżewska, K. 1988. 1. Strefy leśne: borealna, boreonemoralna, nemoralna i submediterranea. W: Olaczek, R. (red.), Zasoby glebowe i roślinne — użytkowanie, zagrożenie, ochrona. PWRiL, Warszawa: 16–65.
- Czyżewska, K., Olaczek, R. 1983. Bełchatowski Okręg Przemysłowy w badaniach Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego. Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 1: 89–123.
- Ćwikliński, E. 1971. Flora synantropijna Zielonej Góry i Koszalina na tle warunków przyrodniczych i rozwoju miast. Mater. Zakł. Fitosoc. Stosowanej UW. 27: 87–113.

- De g ó r s k i, M. 1984. Porównanie stopnia kontynentalizmu w Polsce określonego metodami klimatologiczną i bioindykacyjną. *Przegl. Geogr.* 41, 3–4: 55–73.
- D i e r s c h k e, H., S a s s e, H. 1986. *Sedo-Scleranthetea* (incl. *Coryneporetea* II, *Festucetea vaginatae*, *Helichryso-Crucianelletea*, *Poetea bulbosae*, *Tuberarietea guttatae*). In: Tüxen. R. (Hrg). *Bibliographia Phytosociologica Syntaxonomica*, Lief. 39: 1–277.
- D z i e c i o ł o w s k i, W. (red.). 1985. Analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR, Poznań.
- E n d l e r, Z., P o l a k o w s k i, B. 1978. Zespół *Spergulo-Coryeporetum* Tx. (1928) 1937 Libb. 1933 na Pojezierzu Mazurskim. *Fragm. Flor. Geobot.* 24, 3: 439–446.
- F a g a s i e w i c z, L., C z y ż e w s k a, K., O ł a c z e k, R. 1986. Flora naczyniowa Załącznikskiego Parku Krajobrazowego. *Acta Univ. Lodz., Folia Sozol.* 2: 225–276.
- F a l i Ń s k a, K. 1990. Osobnik, populacja, fitocenoza. PWN, Warszawa.
- F a l i Ń s k a, K., Ż y r o m s k a - R u d z k a, H. 1986. Struktura populacji. 2. Struktura wiekowa populacji. W: Andrzejewski, R., Falińska, K. (red.), *Populacje roślin i zwierząt. Ekologiczne studium porównawcze*. PWN, Warszawa: 78–110.
- F a l i Ń s k i, J. B. 1966. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako czynnik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. PWN, Warszawa: 1–256.
- F a l i Ń s k i, J. B. 1971. Methodical basis for Map of Potential Natural Vegetation of Poland. *Acta Soc. Bot. Pol.* 40, 1: 209–222+mapy.
- F a l i Ń s k i, J. B. 1980a. Changes in the sex- and age-ratio in populations of pioneer dioecious woody species (*Juniperus*, *Populus*, *Salix*) in connection with the course of vegetation succession in abandoned farmlands. *Ekol. Pol.* 28: 237–365.
- F a l i Ń s k i, J. B. 1980b. Vegetation dynamics and sex structure of the populations of pioneer dioecious woody plants. *Vegetatio* 43: 23–38.
- F a l i Ń s k i, J. B. 1986. Sukcesja roślinności na nieużytkach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu wyzwolonego spod długotrwałej presji antropogenicznej. *Wiad. Bot.* 30, 1: 25–50.
- F a ł t y n o w i c z, W. 1980. Zmiany we florze porostów naziemnych w zależności od wieku nasadzeń sosnowych na siedlisku *Cladonio-Pinetum*. *Zesz. Nauk. Wydz. Biol. i Nauk o Ziemi Uniw. Gdańskiego* 2: 81–90.
- F a ł t y n o w i c z, W. 1986. The dynamics and role of lichens in a managed *Cladonia-Scotch* Pine Forest (*Cladonio-Pinetum*) *Monogr. Bot.* 69: 1–100.
- F a ł t y n o w i c z, W., B u d z b o n, E. 1983/1986. Drugie stanowisko *Cetraria nivalis* (L.) Ach. na niżu polskim. *Fragm. Flor. Geobot.* 29, 3/4: 451–456.
- F i j a ł k o w s k i, D. 1966. Zbiorowiska roślinne lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach województwa lubelskiego. *Annales UMCS, Sec. C* 21, 17: 247–312.
- F i j a ł k o w s k i, D., G ó r s k i, J. 1968. Stosunki ekologiczne i fitosocjologiczne siedlisk mącznicy lekarskiej (*Arctostaphylos uva-ursi* L.) pod Zaklikowem w województwie lubelskim. *Fragm. Flor. Geobot.* 14, 4: 433–439.
- F i j a ł k o w s k i, D., K o z a k, K. 1970. Roślinność rezerwatu „Torfowisko nad Jeziorem Czarnym Sosnowickim”. *Annales UMCS, Sec. C* 25, 20: 213–241.
- F i l i p e k, M. 1955. Dolina Głuszynki — przyszły park zieleni Wielkiego Poznania. *Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Prace Kom. Biol.* 15, 5: 1–48.
- Flora europaea*. 1964–1980. Edited by T. G. Tutin et al. T. 1–5. University Press, Cambridge.
- F r i l e u x, P.-N. 1978. Aperçu de la végétation des pelouses sèches a therophytes de Haute-Normandie (Basses vallées de la Seine et de l'Eure). VI. Les pelouses sèches a therophytes. *Lille — 1977. Colloques Phytosoc.*: 133–145.
- F u k a r e k, F. 1961. Die Vegetation des Darss und ihre Geschichte. *Pflanzensoziologie* 12: 1–321.
- G é h u, J. -M. 1973. Unites taxonomiques et vegetation potentielle naturelle du nord de la France. *Docum. Phytosc.* 4: 1–22.
- G é h u, J. -M. 1974. *L'Astrocarmo-Coryneporetum canescens* Br.-Bl. 1967 dans les landes de Gascogne. *Docum. Phytosoc.* 6: 43–45.
- G é h u, J. -M., d e F o u c a u l t, B. 1978a. Les pelouses siliceuses a therophytes de la zone littorale du nord de la France. VI. Les pelouses sèches a therophytes. *Lille — 1977. Colloques Phytosoc.*: 319–327.

- G é h u, J.-M., de F o u c a u l t, B. 1978b. Le pelouses a *Tortula ruraliformis* des dunes du nord-ouest de la France. VI. Les pelouses sèches a therophytes. Lille — 1977. Colloques Phytosoc.: 269—273.
- G ł a z e k, T. 1986. Fragmenty muraw pasmofilnych okolic Ostrowca Św. i Biedzychowa na Przedgórzu Ilżeckim. *Studia Kieleckie* 1. 49: 5—14.
- G ł o w a c k i, Z. 1975. Zbiorowiska murawowe zachodniej części Wzgórz Trzebnickich. *Prace Opolsk. Tow. Przyj. Nauk, Wyd. III — Nauk. Przyr.*: 1—102.
- G ł o w a c k i, Z. 1980. Rola porostów w zbiorowiskach z klasy *Sedo-Scleranthetea*. W: Salata, B. (red.), *XLV Zjazd Polsk. Tow. Bot., Lublin 11—13 września 1980 r. Streszczenia wykładów i komunikatów*: 92.
- G ł o w a c k i, Z. 1984. Zbiorowiska murawowe zachodniej części Wału Trzebnickiego. *Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, Ser. Przyr.* 4: 157—176.
- G ł o w a c k i, Z. 1988. Zbiorowiska psammofilne klasy *Sedo-Scleranthetea* Wysoczyzny Siedleckiej i terenów przyległych na tle ich zasięgów. *Wyd. Uczelniane WSRP, Siedlce*: 1—122.
- G ł o w a c k i, Z., S t a n c z u k E. 1984. Rozmieszczenie elementu atlantyckiego na Nizinie Południowopodlaskiej i we wschodniej części Niziny Środkowomazowieckiej. *Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, Ser. Przyr.* 4: 121—135.
- G r a e b n e r, P. 1918. Białowies in deutscher Verwaltung. Die pflanzengeographischen Verhältnisse von Białowies. *Verlagsb. Paul Parey, Berlin* 4: 218—250.
- G u z i k o w a, M. 1964. *Scleranthus polycarpus* Torner w Polsce i na obszarach sąsiednich. *Fragm. Flor. Geobot.* 10, 4: 499—506.
- H a l i c z, B., G o d l e w s k i, M. 1968. Flora i stosunki fitosocjologiczne naziemnych porostów Zielonej Puszczy Kurpiowskiej. *ŁTN, Prace Wyd. III*: 1—50.
- H e r b i c h, J. 1982. Zróżnicowanie i antropogeniczne przemiany roślinności Wysoczyzny Stanisze-wskiej na Pojezierzu Kaszubskim, *Monogr. Bot.* 63: 1—162.
- H e r e ź n i a k, J. 1972. Zbiorowiska roślinne doliny Widawki. *Monogr. Bot.* 35: 1—160.
- H i l l, M. O. 1979a. DECORANA — A FORTRAN program for detrended correspondence analysis and reciprocal averaging. *Ecology and Systematics Cornell University, Ithaca, New York* 14850, USA: 1—52.
- H i l l, M. O. 1979b. TWINSPLAN — A FORTRAN program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of the individuals and attributes. *Ecology and systematics, Cornell University, Ithaca, New York, 14850, USA*: 1—90.
- H o h e n e s t e r, A. 1967. Silbergrasfluren in Bayern. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F.* 11/12: 11—21.
- H u e c k, K. 1931. Erläuterung zur Vegetationskundlichen Karte des Endmoränengebietes von Chorin (Uckermark). *Beitr. z. Naturdenkmalpflege Neudamm u. Berlin* 14, 2: 107—214.
- J a l a s, J., S u o m i n e n, J. (eds). 1983. *Atlas Florae Europaeae*, 6: *Caryophyllaceae (Alsinoideae and Paronychioideae)*. Published by the Committee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.
- J a n k o w s k i, W. 1977 (maszynopis). Próba określenia mechanizmów degeneracji zbiorowisk muraw wydmowych okolic Torunia. *Zakład Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UMK, Toruń*: 1—57.
- J e c k e l, G. 1984. Syntaxonomische Gliederung, Verbreitung und Lebensbedingungen nordwestdeutscher Sandtrockenrasen (*Sedo-Scleranthetea*). *Phytocoenologia* 12, 1: 9—153.
- J u r a s z e k, H. 1928. Pflanzensoziologische Studien über die Dünen bei Warschau. *Bull. Acad. Polon. Sci. Lettr. Cl. Sci. Math.-Nat. Ser. B. Sci. Nat.* (1927) Cracovie: 565—610.
- K ę p c z y ŋ s k i, K. 1965. Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej. *Wyd. Uniw. M. Kopernika, Toruń*: 1—321.
- K ę p c z y ŋ s k i, K., R u t k o w s k i, L. 1988. Wybrane zbiorowiska psammofilnych turzyc w dolinie Wisły na odcinku Ciechocinek — Sztum. *Acta Univ. Nicolai Copernici. Biologia* 29, 63: 5—15.
- K ę p c z y ŋ s k i, K., Z i e n k i e w i c z, I. 1974. Zbiorowiska ruderalne miasta Torunia. *Studia Soc. Sci. Torun. Sec. D (Botanica)* 10, 2: 1—52.
- K l i k a, J. 1931. O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písečných půdách lesných ve středním Polabí. *Sbornik Českosl. Akad. Zeměd.* 6: 277—302.
- K l i k a, J. 1934. Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas. III. Die pflanzengesellschaften auf sandböden des marchfeldes in der Slowakei. *Sonderabdr. aus Beih. Bot. Centralbl.* 52 B: 1—16.

- K l i k a, J., N o v á k, V. 1941. Praktikum rostlinné sociologie, půdoznalství, klimatologie a ekologie. Melantrich. Praha.
- K o b e n d z a, R. 1930. Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. *Planta Pol.* 2: 1–200.
- K o n d r a c k i, J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
- K o r n a ś, J. 1957. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Część III. Zespoły piaskowe. *Acta Soc. Bot. Pol.* 26, 2: 467–484.
- K o r n a ś, J. 1977. Zespoły wydym nadmorskich i śródlądowych. W: Szafer, W., Zarzycki, K. (red.), *Szata roślinna Polski. T. 1.* PWN, Warszawa: 297–309.
- K o r n a ś, J., M e d w e c k a - K o r n a ś, A. 1986. Geografia roślin. PWN, Warszawa.
- K o r n e c k, D. 1974. Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. *Schrift. f. Vegetationsk.* 7: 1–196.
- K o r n e c k, D. in O b e r d o r f e r 1978. Klasse: *Sedo-Scleranthetea*. Br.-Bl. 55 em. Th. Müller 61.
- In: Oberdorfer, E. (Hrg.) 1978. *Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil II. Pflanzensoziologie* 10: 13–85.
- K o z l o v s k a j a, N. W., P a r f e n o v, B. I. 1972. Chorologija flory Belorussii. Izd. Nauka i Technika, Minsk.
- K r a u s c h, H.-D. 1962. Vorschläge zur Gliederung der mitteleuropäischen sand- und Silikat-Trockenrasen. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N. F.* 9: 266–269.
- K r a u s c h, H.-D. 1968. Die Sandtrockenrasen (*Sedo-Scleranthetea*) in Brandenburg. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F.* 13: 71–100.
- K r i e g e r, H. 1937. Die flechtenreichen Pflanzengesellschaften der Mark Brandenburg. *Beih. z. Botn. Centralbl., B. Dresden* 57: 1–76.
- K r i p p e l, E. 1954. Die Pflanzengesellschaften auf Flugsandböden des slowakischen Teiles des Marchfeldes. *Angewandte Pflanzensoziologie Festschr. Aichinger* 1. Klagenfurt: 635–645.
- K r i p p e l o v á, T., K r i p p e l, E. 1956. Vegetačné pomery Záhoria. I. Viate piesky. *Vyd. Slov. Acad. Vied. Bratislava*: 1–89.
- K r o t o s k a, T., T o b o l e w s k i, Z. 1978. Lichen communities on grey dunes. Station 51. *Cladonia mitis-Cornicularia aculeata* community in the Słowiński National Park. In: Wojterski, T. W. (ed.), *Guide to the Polish International Excursion, 1–20 June 1978.* Wyd. Nauk. Univ. im. Adama Mickiewicza. Ser. Biologia, Poznań 11: 112–115.
- K r o t o s k a, T., T o b o l e w s k i, Z. 1979/1980. Zbiorowisko naziemnych porostów pasmofilnych w Słowińskim Parku Narodowym. *Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Ser. B* 31: 53–63.
- K r z y w a ń s k a, J. 1981 (maszynopis). Ocena środowiska przyrodniczego doliny rzeki Warty pod Jeziorskiem przy pomocy metod geobotanicznych. *Bibl. Uniwersytecka, Łódź*: 1–213.
- K r z y w a ń s k a, J. 1984. Ocena środowiska przyrodniczego doliny rzeki Warty pod Jeziorskiem przy pomocy metod geobotanicznych, cz. I. *Flora. Acta Univ. Lodz., Folia Bot.* 3: 127–150.
- K u l c z y ń s k i, S. 1939. Torfowiska Polesia. T. 1. Nakł. autora, Kraków.
- L i b b e r t, W. 1933. Die Vegetationseinheiten der neumärkischen Staubeckenlandschaft unter Berücksichtigung der angrenzenden Landschaften. *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg* 74: 229–348.
- L i g é r, J. 1975. Aperçu sur Les Landes sèches d'Anneville-sur-Seine et de la Basse-Seine. La végétation des landes d'Europe occidentale. *Lille 1973. Colloques Phytosoc.* 2: 179–187.
- L i p n i c k i, L. 1990/1991. Porosty Borów Tucholskich. *Acta Mycol.* 26, 1: 119–175.
- Ł a w r y n o w i c z, M. 1973. Zbiorowiska łąkowe w przełomie Warty koło Częstochowy. *Rocz. Muzeum w Częstochowie. Przyroda*: 97–111.
- M a r s h a l l, J. K. 1965. *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv. as a model for the *Ammophila* problem. *J. Ecol.* 53: 447–463.
- M a r s h a l l, J. K. 1967. Biological flora of the British Isles. *Corynephorus canescens* (L.) Beauv. (*Aira canescens* L.; *Weingaertneria canescens* (L.) Bernh.). *J. Ecol.* 55: 207–220.
- M a t u s z k i e w i c z, W. 1978/1979. Fitosocjologiczne podstawy typologii lasów Polski. *Prace IBL* 558: 3–39.
- M a t u s z k i e w i c z, W. 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
- M a t v e e v a, E. P. 1967. Luga Sovetskoj Pribaltiki (sravnitelnyj analiz). Izd. Nauka, Leningrad.

- Medwecka-Kornaś, A., Kornaś, J., Pawłowski B., Zarzycki, K. 1977. Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski. W: Szafer, W., Zarzycki, K. (red.), Szata roślinna Polski, T. 1. PWN, Warszawa: 281.
- Meusel, H. 1940a. Die Grasheiden Mitteleuropas Versuch einer vergleichend-pflanzengeographischen Gliederung. I. Botanisches Archiv. 41: 357–428.
- Meusel, H., 1940b. Die Grasheiden Mitteleuropas Versuch einer vergleichend-Pflanzengeographischen Gliederung. II. Botanisches Archiv 41: 419–519.
- Meusel, H. Jäger, E., Rauschert, S., Weinert, E. 1978. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen flora. Bd. 2. Karten. G. Fischer Verl., Jena.
- Moravec, J. 1967. Zu den azidophilen Trockenrasengesellschaften Südwestböhmens und Bemerkungen zur Syntaxonomie der Klasse *Sedo-Scleranthetea*. Folia Geobot. Phytotox. 2: 137:178.
- Moravec, J. et al. 1983. Přehled vyšších vegetačních jednotek České socialistické republiky. Preslia 55, 2: 97–122.
- Motyka, J. 1964. Porosty (Lichenes), *Cladoniaceae*. Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. T. 3, cz. 2. PWN, Warszawa.
- Mowszowicz, J. 1938. Flora i zespoły rolinne „Gór Ponarskich” i ich najbliższych okolic. Prace Tow. Przyj. Nauk w Wilnie, Wyd. Nauk Mat.-Przyr. 11/12: 1–139.
- Mucina, L., Maglocký, Š. (eds). 1985. A list of vegetation units of Slovakia. Docum. Phytosoc. N. S. 9: 175–220.
- Müller, Th. 1961. Ergebnisse pflanzensoziologischer Untersuchungen in Südwestdeutschland. Beitr. Naturk. Forsch. SW-Deutschl. 20, 2: 111–122.
- Nienartowicz, A., Barcikowski, A., Wieczorkowski, K. 1988. Zastosowanie metod komputerowych w taksonomii, geografii i socjologii roślin. Wiad. Bot. 32, 3: 169–182.
- Nienartowicz, A., Warachowska, K., Wojdyło, K. 1990. Sposoby przygotowania danych w numerycznej syntaksonomii roślin. Wiad. Ekol. 36. 3: 111–122.
- Nowak, J., Tobolewski, Z. 1975. Porosty polskie. PWN, Warszawa–Kraków.
- Nowiński, M. 1967. Polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowe. PWRiL, Warszawa.
- Oberdorfer, E. 1957. Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie, Jena 10: 1–564.
- Oberdorfer, E. 1962. Pflanzensoziologische exkursionsflora für Süddeutschland und die angrenzenden Gebiete. Verl. E. Ulmer, Stuttgart.
- Oberdorfer, E. 1983. Pflanzensoziologische Exkursions Flora. E. Ulmer, Verl., Stuttgart.
- Ochyra, R., Szmaida, P. 1978. An annotated list of Polish Mosses. Fragm. Flor. Geobot. 24, 1: 93–145.
- Oksanen, J. 1981. Reindeer lichen (*Cladina*) vegetation of rock outcrops on a coast – inland transect in South Finland. Ann. Bot. Fennici 18: 133–154.
- Olaček, R. 1986a. Roślinność leśna Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 2: 393–470.
- Olaček, R. 1986b. Ogólna charakterystyka przemian szaty roślinnej i krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (Wyżyna Wieluńska). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 2: 203–224.
- Olsson, H. 1974. Studies on South Swedish sand vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 60: 1–170.
- Olsson, H. 1975. Vegetation on sand in South Sweden I. La vegetation des dunes maritimes, Paris – 1971. Colloques Phytosoc: 79–90.
- Paleska, B. 1976 (maszynopis). Flora porostów nadrzecznych, naziemnych i naskalnych oraz *Spergulo-Corynephoretum*. R.Tx. 1937 okolicy Kobylej Góry na Wzgórzach Ostrzeszowskich. Zakład Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Univ. Łódzki, Łódź: 1–78.
- Passarge, H. 1960. Zur soziologischen Gliederung binnenländischer *Corynephorous-Rasen* im norddeutschen Flachland. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 98/100: 113–124.
- Passarge, H. 1964. Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes I. Pflanzensoziologie 13: 1–224.
- Passarge, H. 1978. Übersicht über mitteleuropäische Gefässpflanzengesellschaften. Feddes Repert. 89, 2–3: 133–195.
- Paszewski, A., Fijałkowski, D. 1970. Badania botaniczne rezerwatu Durne Bagno koło Włodawy. Annales UMCS, Sec. C 25, 18: 171–196.

- Paul, K. H. 1953. Morphologie und Vegetation der Kurischen Nehrung. II. Entwicklung der Pflanzendecke von der Besiedelung des Flugsandes bis zum Wald. Nova Acta Leopoldina 113, 16: 259–378.
- Pawlus, M. 1983/1985. Systematyka i rozmieszczenie gatunków grupy *Festuca ovina* L. w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 29, 2: 219–295.
- Pawłowski, B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szafer, W., Zarzycki, K. (red.), Szata roślinna Polski, T. 1. PWN, Warszawa: 237–279.
- Piotrowska, H., Celiński, F. 1965. Zespoły psammofilne wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 16: 123–170.
- Piotrowska, H., Stasiak, J. 1982/1984. Zbiorowiska na wydmach Mierzei Wiślanej i ich antropogeniczne przemiany. Fragm. Flor. Geobot. 28, 2: 161–180.
- Preuss, H. 1912. Die pontischen Pflanzenstände im Weichselgebiet. Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Bd II, Heft 4: 350–540.
- Regel, C. 1944. Die Vegetation der Sandböden von Kauen. Ein Beitrag zur Phytosoziologie von Litauen. Bot. Arch., Leipzig 45: 317–357.
- Rejment-Grochowska, I. 1950. Wątrobowce (*Hepaticae*). PZWS, Warszawa.
- Rejment-Grochowska, I. 1966. Wątrobowce (*Hepaticae*). Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i Ziemi Ościennych. T. 2, PWN, Warszawa.
- Rivas-Martinez, S. 1978. Sur la syntaxonomie des pelouses therophytiques de l'Europe occidentale. VI. La vegetation des pelouses sèches a therophytes. Lille — 1977. Colloques Phytosoc.: 55–71.
- Royer, J.-M. 1978. Les pelouses sèches a therophytes de Bourgogne et de Champagne meridionale. VI. Les pelouses sèches a therophytes. Lille — 1977. Colloques Phytosoc. 133–145.
- Rychnovská-Soudková, M. 1961. *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv. (Physiologisch-ökologische Studie einer Pflanzenart). Rozpr. Českoslov. Akad. Věd 71: 1–84.
- Santesson, R. 1984. The lichens of Sweden and Norway. Stockholm and Uppsala.
- Scholz, J. B. 1896. Vegetationsverhältnisse des preussischen Weichselgeländes. Mitteilungen des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. XI. Heft. Kommissions-Verlag von Ernst Lambeck: 1–206 + I–XVIII.
- Scholz, J. B. 1905. Die Pflanzengesellschaften Westpreuss. Schriften der naturforsch. Ges. in Danzig 11, 3: 40–302.
- Schubert, R. 1974. Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. X. Silbergrasreiche Pionierfluren auf nährstoffarmen Sand- und Grusböden. Hercynia 11: 291–298.
- Schulz, I. 1949. Studien zur Gattung *Corynephorus*. Isugural — Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades genehmigt von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin. Bibliothek des Botanischen Gartens u. Museums, Berlin-Dahlem: 1–106.
- Sipajlova, L. M., Šeljag-Sosonko, Ju. R., Solomacha, V. A. 1982. Charakteristika fitocenoniv zaplawnich luk Ukrain'skogo Polissja. Ukr. Bot. Žurn. 39, 5: 17–23.
- Smus, K. 1977 (maszynopis). Roślinność muraw piaszkowych Zakola Warty. Zakład Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Univ. Łódzki, Łódź: 1–34.
- Sobańska, E. 1978 (maszynopis). Flora i roślinność psammofilna wydymów śródlądowych z okolic Szynkielowa i Konopnicy. Zakład Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Univ. Łódzki, Łódź: 1–90.
- Sokołowski, M. 1929. Zagadnienie sukcesji w świetle najnowszych badań. Kosmos, B 54, 4: 542–592.
- Soó, R. 1957. Conspectus des groupements végétaux dans les bassins Carpathiques. II. Les associations psammophiles et leur génétique. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 3, 1–2: 43–64.
- Stachurski, M. 1978. Warunki ekologiczne muraw piaszkowych, borów chrobotkowych i świeżych na pobrażach Zbiornika Sulejowskiego. Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 2; Nauki Mat.-Przyr. 20: 73–105.
- Steffen, H. 1931. Vegetationskunde von Ostpreussen. Pflanzensoziologie, 1. Verl. G. Fischer, Jena: 1–407.
- Strzemiński, M., Siuta, J., Witek, T. 1983. Przydatność rolnicza gleb Polski. PWRiL, Warszawa.

- Symonides, E. 1974a. Populations of *Spergula vernalis* Willd. on dunes in the Toruń Basin. Ekol. Pol. 22, 2: 379–416.
- Symonides, E. 1974b. Morphological variability of *Spergula vernalis* Willd. from different dune biotopes of Toruń Basin. Ekol. Pol. 22, 2: 417–440.
- Symonides, E. 1974c. The phenology of *Spergula vernalis* Willd. in relation to microclimatic conditions. Ekol. Pol. 22, 2: 441–456.
- Symonides, E. 1974d. The water economics of *Spergula vernalis* Willd. Ekol. Pol. 22, 2: 457–472.
- Symonides, E. 1974e. Changes in the chlorophyll a and b content in different-aged leaves of *Spergula vernalis* Willd. Acta Soc. Bot. Pol. 43, 2: 235–241.
- Symonides, E. 1977. Mortality of seedlings in natural psammophyte populations. Ekol. Pol. 25, 4: 635–651.
- Symonides, E. 1978a. Effect of population density on the phenological development of individuals of annual plant species. Ekol. Pol. 26, 2: 273–286.
- Symonides, E. 1978b. Numbers, distribution and specific composition of diaspore in the soils of the plant association *Spergulo-Corynephoretum*. Ekol. Pol. 26, 1: 111–122.
- Symonides, E. 1978c. Effect of seed size, density and depth of sowing on the germination and survival of psammophyte seedlings. Ekol. Pol. 26, 1: 123–139.
- Symonides, E. 1979a. The structure and population dynamics of psammophytes on inland dunes. I. Populations of initial stages. Ekol. Pol. 27, 1: 3–37.
- Symonides, E. 1979b. The structure and population dynamics of psammophytes on inland dunes. II. Loose-sod populations. Ekol. Pol. 27, 2: 191–234.
- Symonides, E. 1979c. The structure and population dynamics of psammophytes on inland dunes. IV. Population phenomena as a phytocoenose-forming factor (a summing-up discussion). Ekol. Pol. 2: 259–281.
- Symonides, E. 1985a. Population structure of psammophyte vegetation. In: White, J. (ed.), The population structure of vegetation. Dr W. Junk Publishers, Dordrecht: 265–291.
- Symonides, E. 1985b. Changes in phytocoenose structure in early phases of old-field succession in Poland. Tuexenia 5: 259–271.
- Symonides, E. 1985c. Floristic richness, diversity, dominance and species evenness in old-field successional ecosystems. Ekol. Pol. 33, 1: 61–79.
- Symonides, E. 1986. Seed bank in old-field successional ecosystems. Ekol. Pol. 34, 1: 3–29.
- Symonides, E. 1987. Strategia reprodukcyjna terofitów, mity i fakty. I. Teoretyczny model strategii optymalnej. Wiad. Ekol. 33, 2: 103–135.
- Symonides, E. 1989. Bank nasion jako element strategii reprodukcyjnej terofitów. Wiad. Ekol. 35, 2: 107–144.
- Symonides, E., Borowiecka, M. 1985. Plant biomass structure in old-field successional ecosystems. Ekol. Pol. 33, 1: 81–102.
- Szafer, W. 1930. O typach leśnych i ich sukcesjach w puszczy augustowskiej. Las Polski 10, 7: 365–376.
- Šeljag-Sosonko, Ju. R., Afanas'ev, D. Ja., Solomacha, W. A., Abramova, L. M., Mirkin, B. M. 1981. Charakteristika fitocenoniv zaplavnich luk r. Dnipro. Ukr. Bot. Žurn. 38, 2: 16–31.
- Šiškina, B. K., Tomina, M. P., Gončarika, M. N. 1967. Opređelitel' rastenij Belorussii. Izd. Wyšejšaja škola, Minsk.
- Šmarda, I. 1953. Prispevek k poznani rastlinnych společenstv přesypovich pisku na jiznim a juhozápadnim Slovensku. Biologia (Bratislava) 8: 497–525.
- Tobolewski, Z. 1963. Materiały do znajomości borów chrobotkowych Północno-Zachodniej Polski. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 12: 193–211.
- Toman, M. 1973. Psamofilni vegetace Terezinské Kotliny. Preslia 45: 70–86.
- Tüxen, R. 1928. Vegetationsstudien im nordwestdeutschen Flachlande, I. Über die Vegetation der nordwestdeutschen Binnendünen. Jahrb. Geograph. Gesellsch. Hannover 50: 71–93.
- Tüxen, R. 1937. Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. 3: 1–170.

- T ü x e n, R. 1951. Eindrücke während der pflanzengeographischen Exkursionen durch Süd-Schweden. *Vegetatio* 3: 149–172.
- T ü x e n, R. 1955. Das system der nordwestdeutschen pflanzengesellschaften. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F.* 5: 155–176.
- T ü x e n, R. 1961. Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna jako przedmiot kartografii roślinności. *Przegl. Lit. Geogr.* 4: 1–30.
- T ü x e n, R. 1962. Zur systematischen Stellung von Spezialisten-Gesellschaften. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F.* 9: 57–59.
- T ü x e n, R. 1967. *Corynephoretea canescenstis*. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F.* 11/12: 22–24.
- T ü x e n, R., S c h w a b e, A. 1972. *Corynephoretea* Br.-Bl. et Tx. 1943. In: Tüxen, R., Hrg. *Bibliographia Phytosociologica Syntaxonomica*, Lief. 15. Lehre. Verl. J. Cramer: 1–42.
- U r b a n e k - R u t o w i c z, H. 1969. Udział i rola diagnostyczna mszaków oraz stosunki florystyczno-fitosocjologiczne w przewodnich zespołach roślinnych regionu łódzkiego i jego pobrzeży. *Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź*: 1–253.
- V i c h e r e k, J. 1972. Die Sandpflanzengesellschaften des unteren und mittleren Dnjeprstromgebietes (die Ukraine). *Folia Geobot. Phytotax.* 7: 9–46.
- V o l k, O. H. 1931. Beiträge zur Ökologie der Sandvegetation der oberrheinischen Tiefebene. *Zeitschr. f. Bot.* 24, 1: 81–185.
- W a l t e r, H., L i e t h, H. 1967. Klimadiagramm – Weltatlas. Jena.
- W a r c h o l i Ń s k a, A. U. 1990. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk segetalnych Wzniesień Łódzkich. *Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź*: 1–212 + tabele.
- W a t t e z, J.-R., G é h u, J.-M., d e F o u c a u l t, B. 1978. Les pelouses a annuelles des Buttons de la Brenne. VI. Les pelouses sèches a therophytes. Lille – 1977. *Colloques Phytosoc.*: 191–199.
- W e s t h o f f, V. 1975. La vegetation des dunes pauvres en calcaire aux Iles Frisonnes Neerlandaises. I. La vegetation des dunes maritimes, Paris – 1971. *Colloques Phytosoc.*: 71–77.
- W e s t h o f f, V., D e n H e l d, A. J. 1969. Plantengemeenschappen in Nederland. *Bibl. Koninkl. Nederl. Natuurh. Vereinig.* 16: 1–324.
- W i k a, S. 1975. Roślinność zbiorowisk murawowych okolic Kamionny i Dormowa w powiecie międzychodzkiem. *Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wyd. Mat.-Przyr.* 40: 1–48.
- W i l k o Ń - M i c h a l s k a, J., S y m o n i d e s, E. 1974. The influence of vegetation on the dynamics of soil humidity in the patch of *Spergulo-Corynephoretum* Tx. (1928) Libb. (1933). *Fragm. Flor. Geobot.* 20,4: 499–528.
- W i r t h, V. 1980. Flechtenflora. E, Ulmer Verl. Stuttgart.
- W o j t e r s k i, T. 1964. Schemat strefowego układu roślinności nadmorskiej na południowym wybrzeżu Bałtyku. *Bad. Fizjogr. nad Polską Zach.* 14: 87–105.
- Z a ł u s k i, T. 1976. Ważniejsze zbiorowiska roślinne doliny Żegliny. *Acta Univ. Lodz., Nauki Mat.-Przyr. ser. II* 2: 153–188.
- Z a ł u s k i, T. 1987. Roślinność murawowa południowo-zachodniej części Garbu Lubawskiego i terenów przyległych. *Studia Soc. Sci. Torun., Sec. D (Botanica)* 11, 5: 1–71.
- Z a r z y c k i, K. 1984. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. PAN – Instytut Bot., Kraków: 1–45.
- Z i e l i Ń s k a, J. 1967. Porosty Puszczy Kampinoskiej. *Monogr. Bot.* 24: 1–130.

11. SYNTAXONOMY OF INLAND AND PIONEER PSAMMOPHILOUS GRASSLANDS (SUMMARY)

Pioneer psammophilous grasslands were studied on Polish soil in their whole lowland—upland range (Tabs II, IV, VI—VIII). They were analysed against the background of similar communities from Germany, Czech, Slovakia, the Ukraine, Lithuania and Sweden (see also Tab. IX).

The aim of this work was to single out, characterize and classify Polish pioneer psammophilous phytocoenoses, and in particular to carry out a syntaxonomic revision in the light of new materials as well as confronting the results with the previously known syntaxonomic approach (comp. Part I, 3), to indicate ecologico-geographical variability and to indicate the real level of participation of cryptogamic plants in these phytocoenoses, also small taxa of vascular plants as well as lichens and bryophyta to establish the types of phytocoenoses.

My own material used in these studies comes from the years 1973—1987 (see Part II, 5). In field studies the phytosociological method was used according to Braun-Blanquet (1964). The phytosociological documentation which was gathered was analysed by the numerical method.

For a critical comparative analysis, 1648 phytosociological records well-known from Poland were used and out this number of 1055 records (444 published and 611 non-published) underwent numerical classification. For numerical analysis the TWINSpan program was used (Hill 1979b, Nienartowicz, Warachowska, Wojdyło 1990). Hierarchical classification was finished on the twelfth level of partition. The program was also used to create analytical tables, whose excerpts, containing levels of constancy and coefficients of cover, were inserted into the synoptic table (Tab. II).

The syntaxonomic system proposed by Krausch (1968) was adapted. The set of characteristic species of higher units was based on Müller's (1961) and Krausch's (1968) propositions and at the same time was verified on the base of the observations and results of my own studies. However, the syntaxonomy of the association was changed. For sets of characteristic and differential species see Part III, 7.1, 7.2.

Despite the diversity of syntaxonomical approaches in Poland, the inland, waterless, oligotrophic and acid sands are the habitat of only one pioneer association — *Spergulo morisonii-Corynephorretum canescentis* (Fig. 2). It belongs to the *Corynephorion* Klika 1931 alliance, order - *Corynephorretalia* Klika 1934 em. Krausch 1962 class - *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. em. Th. Müller 1961.

The name adapted for the association *Spergulo vernalis-Corynephorretum* R. Tx. (1928)1955 was used as a *nomen nudum*. To give it validity it was given the nomenclatoric type: Phyt. record 5 (1863) in Tab. IV. At present the name is: *Spergulo morisonii-Corynephorretum canescentis* R. Tx. ex K. Czyżewska hoc loco.

Species characteristic for the association are *Spergula morisonii* and *Teesdalia nudicaulis*.

The association is divided into three subassociations and 10 variants (see Part III, 7.2):

S.-C. *typicum* subass. nova hoc loco

Nomenclatoric type: Phyt. record 5 (1863) in Tab. IV (typus ass., subass. et var.)

var. *typicum* var. nova hoc loco

var. with *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. nova hoc loco

Nomenclatoric type: Phyt. record 22(567) in Tab. IV

D: *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *Cladonia subulata*

var. with *Hypochoeris radicata* K. Czyżewska in Wika 1975 var. nova

Nomenclatoric type: Phyt. record 26(4) in Tab. 5 in Wika (1975, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wyd. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol. 40) lectotypus hoc loco

D: *Hypochoeris radicata*, *Agrostis capillaris*, *Jasione montana*, *Helichrysum arenarium*, *Polytrichum juniperinum*

Intermediate form between S.-C. *typicum* and S.-C. *thymetosum serpylli*

S.-C. *thymetosum serpylli* subass. nova hoc loco

Nomenclatoric type: Phyt. record 15(709) in Tab. VI (typus subass. et var.)

D: *Thymus serpyllum*, *Arenaria serpyllifolia*, *Rhacomitrium canescens*

var. *typicum* var. nova hoc loco

var. with *Artemisia campestris* subsp. *campestris* var. nova hoc loco

Nomenclatoric type: Phyt. record 18(604) in Tab. VI

D: *Artemisia campestris* subsp. *campestris*, *Brachythecium albicans*

var. with *Festuca ovina* var. nova hoc loco

Nomenclatoric type: Phyt. record 6(1940) in Tab. VII

D: *Festuca ovina*, *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*

var. with *Festuca psammophila* K. Czyżewska in K. Czyżewska 1986 var. nova

Nomenclatoric type: Phyt. record 12(226) in Tab. 4 in Czyżewska (1986, Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 2) lectotypus hoc loco

D: *Festuca psammophila*, *Cladonia foliacea*

S.-C. *cladinetosum mitis* R. Tx. (1928)1937 em. K. Czyżewska hoc loco

Nomenclatoric type: Phyt. record 13(2257) in Tab. VIII (typus subass. et var.)

D: *Cladina mitis*, *Coelocaulon aculeatum*, *Cladonia uncialis*, *Cl. cervicornis* subsp. *verticillata*

var. *typicum* var. nova hoc loco

var. with *Thymus serpyllum* K. Czyżewska in Cieśliński 1979 var. nova

Nomenclatoric type: Phyt. record 37(239) in Tab. 3 in Cieśliński (1979, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagog., Kielce, Tab. 3) lectotypus hoc loco

D: *Thymus serpyllum*, *Rhacomitrium canescens*

var. with *Polytrichum piliferum* var. nova hoc loco

Nomenclatoric type: Phyt. record 27(418) in Tab. VIII
D. *Polytrichum piliferum*, *Cladonia furcata* var. *palamaea*
Two forms — the later and earlier phases

Two races of the geographical association were singled out (see Tab. IX): subatlantic (D geogr. *Carex arenaria*), embracing the western and northwestern limits of Poland and subcontinental (D geogr. *Veronica dillenii*), embracing the rest of Polish territory. The subcontinental race is characteristic for the eastern part of the atlantic-subatlantic range of the association. It is singled out by the permanent presence of subcontinental species, termophile and subxerothermic of the order — *Festuco-Sedetalia* and class — *Festuco-Brometea*. The phytocoenotocreative strength of these species is visible at the level of subassociations and variants.

Spergulo-Corynephorum is related to aeolian, glaci-fluvial, glacial and alluvial sands. Subassociations correspond to local habitat variability: *S.-C. typicum* develops on loose sands, from very strongly acid to acid, *S.-C. cladinetosum mitis* — on loose sands (var. with *Thymus* also on coarse sandy soil) from very strongly acid to lightly acid, and *S.-C. thymetosum serpylli* — on more fertile loose sands and coarse sandy soil, from strongly acid to neutral (see. Tab. III, V). In addition, subassociation differ among themselves as to numbers of species and their composition, density of plant cover and participation of living forms and their distribution (Figs 3–8).

The development cycle of the association takes about 25 years. Subass. *typicum* initiates the process of the overgrowth and consolidation of sands and corresponds to the initial stage of development of psammophilous grassland. Subass. *cladinetosum* and *thymetosum* are more advanced in development (optimal stages), with the growth of a layer of shrub, more dense and richer in species (see also Figs 12–14).

At present *Spergulo-Corynephorum* most often takes part in secondary re-creative succession and can then be treated as a seminatural secondary community for the forest.

In the strongly degraded natural environment of Poland, *Spergulo-Corynephorum* as a pioneer association and of initial stage of vegetation development from grassland to climax forest, responds by a broadened scale of equipotentiality from pine-forest habitat to poor *Tilio-Carpinetum typicum* (see Fig. 18). This phenomena, described by Olaczek (1986a) as anthropogenic convergence, is the result of a strong and permanent impact of anthropogenic agents on vegetation and is visible at association level. At the same time, the above phenomena is accompanied by the phenomenon of divergence which appears at the level of subassociation and variants is the result of the retained diversity of habitats and leads to heterodirectional re-creative succession.

The principal result of this work is the establishment of the existence of one plant association *Spergulo morisonii-Corynephorum*, to which belong all pioneer psammophilous grasslands in Poland and in her nearest neighbourhood.

Within the limits of the association the syntaxonomic units mentioned earlier were verified and new units were described at the level of subassociations and

variants. As a new unit at the level of subassociation, *S.-C. thymetosum serpylli* was described. It was proved that grasslands with the presence of *Cladonia* sp. div. in them are a subassociation within the limits of *Spergulo-Corynephoretum*, *S.-C. cladinetosum mitis* and are not an independent association.

The role and position of cryptogamic plants was described, in particular lichens as well as small vascular taxa. Floristic lists in tables (Tabs II, IV, II, IV, VI – VIII) can be treated as preliminary model for the total description of *Spergulo-Corynephoretum* for Poland.

Dr Krystyna Czyżewska
Zakład Geobotaniki i Ochrony Przyrody,
Katedra Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 12/16
PL-90-237 Łódź