HENRYK KLAMA

**WĄTROBOWCE (HEPATICAE)
BESKIDU ŻYWIECKO-ORAWSKIEGO
(KARPATY ZACHODNIE)**

**LIVERWORTS (HEPATICAE)
OF THE BESKID ŻYWIECKO-ORAWSKI RANGE
(POLISH WESTERN CARPATHIANS)**

Redaktor — Editor-in-Chief
Krystyna CZYZEWSKA

REDAKCJA — EDITORIAL BOARD

Krystyna CZYŻEWSKA, Jolanta BAGROWSKA (Secretary)

RADA REDAKCYJNA — EDITORIAL COUNCIL

Romuald OLACZEK (Łódź) Przewodniczący — Chairman

Stanisław CIEŚLIŃSKI (Kielce), Krystyna CZYŻEWSKA (Łódź), Władysław MATUSZKIEWICZ (Warszawa),

Hanna PIOTROWSKA (Gdańsk), Krzysztof ROSTAŃSKI (Katowice), Waldemar ŻUKOWSKI (Poznań)

ADRES REDAKCJI — EDITORIAL OFFICE

Katedra Botaniki
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
tel. (42) 35-44-03

Chair of Botany
University of Łódź
Banacha 12/16
PL-90-237 Łódź
tel. (42) 35-44-03

OKŁADKĘ PROJEKTOWAŁ — COVER DESIGN BY

Zdzisław WALTER

© Copyright by Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa 1996

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	5
2. Charakterystyka fizjograficzna terenu badań	5
2.1. Położenie i granice	5
2.2. Ukształtowanie powierzchni	8
2.3. Budowa geologiczna	9
2.4. Gleby	10
2.5. Sieć wodna	10
2.6. Klimat	11
3. Ogólna charakterystyka szaty roślinnej	12
4. Materiał i metody badań	15
5. Charakterystyka statystyczna flory	17
5.1. Ogólne dane liczbowe	17
5.2. Częstość występowania gatunków	19
5.3. Gatunki rzadkie w Beskidach Zachodnich oraz zagrożone w Polsce i w Europie	22
5.4. Elementy wysokościowe we florze wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego	25
6. Ekologiczna charakterystyka flory	29
6.1. Klasyfikacja typów siedlisk	29
6.2. Florystyczna charakterystyka siedlisk	29
6.2.1. Ogólna analiza florystyczna siedlisk	29
6.2.2. Siedliska naskalne	36
6.2.3. Siedliska potokowe	38
6.2.4. Siedliska epifityczne	39
6.2.5. Siedliska butwiejącego drewna	41
6.2.6. Siedliska obnażonej gleby	44
6.2.7. Spaleniska	45
6.2.8. Siedliska naziemne w zbiorowiskach nieleśnych	45
6.2.9. Siedliska naziemne w zbiorowiskach leśnych i zaroślach kosodrzewiny	47
6.3. Preferencje siedliskowe wątrobowców	48
7. Rozmieszczenie pionowe gatunków	53
7.1. Rozmieszczenie wątrobowców w 100-metrowych pasach wysokościowych	53
7.2. Flora wątrobowców na tle piętrowego układu roślinności	65
7.3. Podobieństwo florystyczne pięter roślinności	73
7.4. Ośrodki wysokościowe wątrobowców	77
8. Poziome zróżnicowanie flory wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego	83
8.1. Lokalne różnice florystyczne	83
8.2. Porównanie flor wątrobowców grup Wielkiej Raczy i Pilska	90
8.3. Różnice florystyczne mikroregionów Beskidu Żywiecko-Orawskiego	91
9. Przegląd flory wątrobowców	92
9.1. Objasnienie stanowisk	92
9.2. Uwagi ogólne	97
9.3. Systematyczny wykaz gatunków	98
10. Podsumowanie i wnioski	132
11. Literatura	134
12. Liverworts (Hepaticae) of the Beskid Żywiecko-Orawski Range (Polish Western Carpathians)	
— Summary	141

ABSTRACT

Henryk Klama. *Liverworts (Hepaticae) of the Beskid Żywiecko-Orawski Range (Polish Western Carpathians)*. Monogr. Bot. vol. 79, 144 pp., 1996.

The study area comprises two mountain groups — Wielka Racza and Pilsko — situated in western part of the Beskid Żywiecko-Orawski Range in Polish Western Carpathians. The flora of this area includes 111 species of liverworts and 2 species of hornworts. 81 species of liverworts and 2 species of hornworts were found in the area of the Wielka Racza group, 108 species of liverworts and 2 species of hornworts — in the area of the Pilsko group. The species new for the Polish part of the Beskid Żywiecki Range were found (27), as well as for the whole Range including the Slovakian part (22) and for the Western Beskids (2). Moreover, 20 species rare in the Western Beskids as well as 11 species rare in the whole area of the Western Carpathians were recorded. 6 species regarded as threatened in the Polish flora occur in the study area. Four of them belong to the category of endangered species (E): *Fossombronina wondraczekii*, *Frullania tamarisci*, *Porella baueri* and *P. platyphylla*, the remaining two belong to the category of vulnerable species (V): *Geocalyx graveolens* and *Metzgeria conjugata*. A particular attention should be paid to the species threatened on European scale: *Lophozia ascendens* (R category), *Porella baueri* (T) and *Scapania parvifolia* (T).

The floristic analysis of habitats covered by liverworts as well as habitat groups of liverworts and habitat preferences of particular species are presented in the paper. The phytogeographic characteristics of the flora is also given, including vertical and horizontal distribution of liverworts in the study area.

Key words: liverworts, hornworts, ecology, habitat groups, phytogeography, altitudinal elements, the Beskid Żywiecko-Orawski Range, the Beskid Żywiecki Range, the Western Beskids, the Western Carpathians, Poland.

1. WSTĘP

Beskid Żywiecko-Orawski obejmuje dwie grupy górskie – Wielką Raczę i Pilsko – położone w zachodniej części Beskidu Żywieckiego. Ten interesujący obszar, na którym położony jest drugi co do wysokości masyw Beskidów Zachodnich (Pilsko, 1557 m n.p.m.), nie był obiektem szczegółowych badań hepatikologicznych. Bardzo ogólne bądź fragmentaryczne dane florystyczne, zawarte w pracach REHMANA (1864, 1866), KRUPY (1879, 1882), KULESZY (1914, 1920), WOJTERSKEGO (1959), KOŁY (1969), SZWEYKOWSKIEGO (1971), MATUSZKIEWICZA J. (1977), BIELCZYK (1984/1986) oraz JĘDRZEJKI, KLAMY i ŻARNOWCA (1984a, b, 1985a, b), nie wyczerpują ani listy gatunków, ani wiedzy o ekologii oraz zróżnicowaniu przestrzennym flory wątrobowców tego terenu. Przed niniejszymi badaniami poznano 54 gatunki, w tym z grupy Wielkiej Raczy – 23, z grupy Pilska zaś – 49 (KLAMA 1986, 1989).

Celem badań jest ustalenie całkowitej listy florystycznej wątrobowców występujących w Beskidzie Żywiecko-Orawskim, określenie preferencji ekologicznych poszczególnych gatunków oraz ustalenie prawidłowości w rozmieszczeniu przestrzennym (pionowym i poziomym) wątrobowców (por. KLAMA 1989).

Podstawę opracowania stanowią własne materiały zielnikowe i obserwacje terenowe zebrane podczas siedmioletnich badań.

Panu Prof. dr. Jerzemu SZWEYKOWSKIEMU gorąco dziękuję za sprawdzenie oznaczeń, udostępnienie własnej biblioteki oraz wielu niepublikowanych danych na temat rozmieszczenia wątrobowców w Polsce (zwłaszcza w Karpatach), ponadto za udostępnienie porównawczych materiałów zielnikowych znajdujących się w zielniku wątrobowców Zakładu Genetyki UAM w Poznaniu (POZW). Dziękuję również za wiele cennych wskazówek i życzliwość okazaną w czasie wykonywania badań. Panu Prof. dr. hab. Krzysztofowi JĘDRZEJKO dziękuję za inspirację w podjęciu tematu badań, uwagi i dyskusję. Władzom Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach dziękuję za sfinansowanie końcowej części badań w ramach tematu NN-5-130/94, realizowanego w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa ŚAM.

2. CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA TERENU BADAŃ

2.1. Położenie i granice

Badany obszar rozciąga się od Przełęczy Zwardońskiej (686 m n.p.m.) na zachodzie po Przełęcz Glinne (809 m n.p.m.) na wschodzie (Ryc. 1) i niemal całkowicie pokrywa się z Beskidem Żywiecko-Orawskim, który jest jednym z czterech regionów wyróżnionych przez KONDRACKIEGO (1994) w obrębie mezoregionu Beskidu Żywieckiego.

Ryc. 1. Położenie Beskidu Żywiecko-Orawskiego na tle Karpat Zachodnich (za BIAŁECKĄ 1982, nieco zmienione)

1 — badany obszar; 2 — tereny powyżej 1000 m n.p.m.

Fig.1. Situation of the Beskid Żywiecko-Orawski Range in the Western Carpathians (acc. to BIAŁECKA 1982, slightly modified)

1 — investigated area — Beskid Żywiecko-Orawski Range; 2 — areas elevated more than 1000 m above sea level

Granice są tutaj naturalne, z wyjątkiem zachodniej i południowej, którą stanowi granica państwa. Północno-zachodnią granicę wyznaczają: potok Roztoka, potok płynący przez wieś Nieledwia (dopływ Soły) oraz rzeka Soła, na odcinku od Milówki do Wieprza (po ujście potoku Juszczyńska do Soły); granicę północną — dolny bieg potoku Juszczyńska, potok płynący przez wieś Trzebinia (dopływ Koszarawy) oraz rzeka Koszarawa, na odcinku od Sporysza do Jeleśni (po ujście potoku Krzyżówka); wschodnią zaś — potok Glinny (od Przełęczy Glinne) i dolny bieg potoku Krzyżówka po ujście do Koszarawy. Linie oddzielającą grupę Wielkiej Raczy od grupy Pilska stanowi Przełęcz Ujsolska (Glinka, 845 m n.p.m.), potoki Glinka i Ujsola oraz rzeka Soła (Ryc. 2). Według KONDRACKIEGO (1994) do grupy Pilska należą ponadto tereny leżące od linii wyznaczonej przez Przełęcz Glinne oraz potoki Glinny i Krzyżówka, po linię Przełęczy Głuchaczki (832 m n.p.m.), potoku Przybyłka i rzeki Koszarawy, na odcinku od Przyborowa do Jeleśni. Ten niewielki obszar, zaliczany przez niektórych geografów do Pasma Babiogórskiego (KRYGOWSKI 1978; por. także BIAŁECKA 1982), pominięto w niniejszych badaniach.

Zawarty w podanych granicach obszar badań liczy około 510 km² powierzchni rzutowanej, z czego na grupę Wielkiej Raczy przypada około 230 km², a na grupę Pilska — około 280 km². Maksymalne rozmiary terenu badań w kierunkach głównych wynoszą 39 km (SW-NE) i 17 km (SE-NW).

Dla potrzeb analizy poziomego zróżnicowania flory wątrobowców wykorzystano podział badanego terenu na szesnaście podgrup (mikroregionów) (Ryc. 3); siedem z nich znajduje się w obrębie grupy Wielkiej Raczy (Zabawa, Rachowiec, Oźna, Wielka Racza, Będoszka, Wielka Rycerzowa i Oszus), dziewięć zaś — w obrębie grupy Pilska (Krawców Wierch, Lipowska, Romanka, Pilsko, Sucha Góra, Prusów,

Ryc. 2. Szkic topograficzny badanego terenu (oryg.)
Fig. 2. Topographic sketch of the investigated area (orig.)

Magura, Kiczora i Kotlina Jeleśniańska). Za osobne podgrupy uznano masywy, które tworzą dobrze wyróżniające się jednostki morfologiczne, wznoszą się więcej niż 100 m nad oddzielającą je przełęcz i zajmują względnie duży obszar (por. BIAŁECKA 1982). Nazwy podgrup przyjęto od głównych szczytów. W tak dokonanym podziale regionalnym znalazła się Kotlina Jeleśniańska, która stanowi część większej jednostki morfologicznej i nie ma charakteru masywu górskiego.

Objęty badaniami obszar grup Wielkiej Raczy i Pilska pokrywa się niemal całkowicie z powierzchnią Żywieckiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej (ALEXANDROWICZ, DENISIUK 1991: Ryc. 1).

Ryc. 3. Podział Beskidu Żywiecko-Orawskiego na mniejsze jednostki terenowe (mikroregiony – masywy górskie) (podział grupy Pilska za BIAŁECKĄ 1982; podział grupy Wielkiej Raczy – oryginalny)
 Fig. 3. Division of the Beskid Żywiecko-Orawski Range into smaller units of area (microregions – mountain masses) (division of the Pilsko Range – acc. to BIAŁECKA 1982; division of the Wielka Racza Range – orig.)

1 – granice mikroregionów (limits of microregions); 2 – granica między grupami Wielkiej Raczy i Pilska (the limit between the Wielka Racza Range and the Pilsko Range);

I – Zabawa; II – Rachowiec; III – Oźna; IV – Wielka Racza; V – Będoszka; VI – Wielka Rycerzowa; VII – Oszus; VIII – Krawców Wierch; IX – Lipowska; X – Romanka; XI – Pilsko; XII – Sucha Góra; XIII – Prusów; XIV – Magura; XV – Kiczora; XVI – Kotlina Jeleśniańska

2.2. Ukształtowanie powierzchni

Charakterystyczną cechą morfologii Beskidu Żywiecko-Orawskiego jest układ głównych grzbietów. W grupie Wielkiej Raczy ma on charakter czworoboku, którego kośćcem jest główny wododział Karpat Zachodnich i zarazem grzbiet graniczny z następującymi szczytami: Skalanka (867 m n.p.m.), Przysłop Wielki (1037 m), Wielka Racza (1236 m), Orło (1119 m), Wielka Rycerzowa (1226 m), Beskid Bednarów (1093 m), Oszus (1147 m), Jaworzyna (1052 m). Linia grzbietu głównego jest tu falista i przebiega przeciętnie na wysokości od 1000 do 1100 m n.p.m. Od grzbietu głównego odchodzi kilka odgałęzień, tj. grzbiety Rachowca (951 m), Oźnej

(952 m) i Jaworzyny (1020 m) w kierunku zachodnio-wschodnim, w kierunku północno-południowym zaś grzbiety Będoszki Wielkiej (1142 m) oraz Rycerzowej (1207 m), z dwoma ramionami — zachodnim, ze szczytem Młoda Hora (995 m) i wschodnim, ze szczytem Muńcuł (1165 m). Z kolei grupa Pilska ma postać wielokrotnego rozrogu, z kilkoma głównymi węzłami górskimi (Lipowską, Romanką i Pilskiem) oraz punktami zwornikowymi (Trzy Kopce, Rysianka). Cechują się one wyższą przeciętną wysokością grzbietu głównego, który w najwyższym punkcie grupy i całego badanego terenu, tj. na Pilsku, osiąga 1557 m wysokości. Grzbiety i doliny biegną tutaj najczęściej w jednym z dwóch kierunków: z południowego zachodu na północny wschód oraz z północnego zachodu na południowy wschód.

Morfologia grup Wielkiej Raczy i Pilska wykazuje cechy rzeźby młodej. Wierzchołki szczytów są szerokie, kopulaste i nie rozcięte przez potoki. Wysokości względne na ogół znacznie przekraczają 300 m; regułą są stoki o nachyleniu 20–45°; często spotyka się stoki urwiste, o nachyleniu ponad 45°. Potoki płyną w wąskich, wciosowych dolinach o niewyrównanym profilu podłużnym i niewykształconym dnie. Zbocza tych dolin są wypukłe i często erozyjnie podcięte.

Morfologię terenu urozmaicają liczne, drobne elementy rzeźby powstałe w czwartorzędzie. Do nich należą skały, rumowiska, osuwiska, rowy rozpadlinowe, terasy i stożki napływowe. Najczęściej spotykanymi formami skalnymi są rumowiska powstałe w wyniku rozpadu blokowego lub w wyniku ruchów osuwiskowych na stromych zboczach (ZIĘTARA 1976). Doliny potoków są również bogate w odsłonięcia skalne. Natomiast właściwe formy skalne są bardzo rzadkie. Występują one na wierzchołkach w postaci materaców skalnych, np. na Pilsku i Lipowskiej, bądź też jako pojedyncze skałki wypreparowane ze zboczy, np. na północnym ramieniu Pilska w miejscu zwanym „Skałki”, na północnych stokach Boraczego Wierchu lub północno-zachodnich stokach Wielkiej Rycerzowej. Rowy rozpadlinowe spotyka się tylko w wierzchołkowych partiach Romanki. Częste natomiast są osuwiska zboczowe i dolinowe, zwłaszcza na Romance (SIKORA, ŻYTKO 1960). Do utworów czwartorzędowych należą ponadto terasy akumulacyjne w dolinach rzek oraz stożki napływowe, które tworzą się u wylotu dolin bocznych.

Hipsometrię badanego terenu przedstawia rycina 2. Warto podkreślić, że blisko 75% powierzchni rzutowanej zajmuje piętro regła dolnego (550–1150 m n.p.m.); regiel górny (1150–1400 m n.p.m.) zajmuje około 13% powierzchni, na piętro subalpejskie zaś przypada tylko 40 ha, tj. około 0,07%. Najniższy punkt terenu znajduje się przy ujściu Juszczynki do Soły (300 m n.p.m.), natomiast najwyższy to Góra Pięciu Kopców (ok. 1534 m n.p.m.), niedaleko szczytu Pilska (1557 m n.p.m.), który położony jest po stronie słowackiej.

2.3. Budowa geologiczna

Beskid Żywiecko-Orawski prawie w całości pokrywają utwory fliszowe wieku paleogeńskiego. Ogniwem dominującym i zajmującym największy obszar są tu

piaskowce magurskie. Są one jednocześnie głównym elementem grzbietotwórczym, z którego zbudowane są najwyższe szczyty: grzbiety Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Jaworzyny, Pilska, Romanki, Lipowskiej i Boraczego Wierchu (ZIĘTA-RA 1972). Nieco bardziej urozmaiconą budowę mają północne stoki Pilska i Szczawiny oraz Boraczego Wierchu, Lipowskiej i północno-zachodnie stoki Romanki. Powierzchniowo dominują tu piaskowce ciężkowickie i pasierbickie oraz pstre łupki i warstwy hieroglifowe.

Występujące tu skały mają różną zawartość węglanu wapnia i różną łatwość jego wypłukiwania ze spoiwa. Jednak utwory fliszowe są w ogóle ubogie w węglan wapnia. Istotną rolę pełnią ponadto utwory czwartorzędowe. Są to głównie żwiry i gliny budujące terasy akumulacyjne w dolinach rzek oraz stożki napływowe. Do utworów tych należą także gliny zwietrzelinowe pokrywające powierzchnię terenu cienką powłoką. Większe nagromadzenie glin ma miejsce u podnóża stoków, głównie w dolinie Soły powyżej terasy wysokiej (SIKORA, ŻYTKO 1960).

2.4. Gleby

Gleby należą do grupy gleb terenów górzystych (KOMORNICKI 1981). Najbardziej rozpowszechnione są tu gleby brunatne i bielcowe. Pierwotne gleby brunatne, o różnie wykształconym profilu, były głównym typem gleb regla dolnego. Zostały one jednak znacznie przekształcone w wyniku działalności gospodarczej człowieka. W niższych położeniach zajęte są przez uprawy i w większości uległy niszczącym procesom erozyjnym. Stały się przez to płytkie, kamieniste i ubogie w biogeny. Z kolei w wyższych partiach regla dolnego gleby te zostały zajęte przez monokultury świerkowe i również uległy degradacji (LAZAR 1957).

Gleby bielcowe rozpowszechnione są w reglu górnym i w kosówce. Często mają one cechy gleb szkieletowych, zwłaszcza na kamienistych stokach Romanki, Lipowskiej, Pilska i Wielkiej Rycerzowej. W zależności od stopnia wykształcenia profilu rozwijają się na nich różne typy zbiorowisk roślinnych.

Na całym, objętym badaniami odcinku dolnej Soły i Koszarawy oraz w dolnych biegach większych potoków (Ujsola, Roztoka, Żabnica, Sopotnia Mała i Wielka, Krzyżówka) rozwijają się mady lekkie i średnie lub kamieniste. Na inicjalnych madach kamienisto-żwirowych rosną zbiorowiska łęgowe, natomiast próchnicze, średnio ciężkie i mocne mady zajęte są pod uprawy.

Gleby bagienne nie zajmują dużych powierzchni. Ich enklawy, rozproszone po całym terenie, zajęte są przez wilgotne łąki, oligo- i eutroficzne młaki oraz olsy. Na Lipowskiej i Pilsku spotyka się niewielkie płyty gleb torfowych (LAZAR 1957).

2.5. Sieć wodna

Część polska Beskidu Żywiecko-Orawskiego położona jest w całości w obrębie dorzecza Soły, w jego źródłiskowej części. Gęstą sieć wodną tworzą tu promie-

niście ułożone potoki, przeważnie o prostoliniowym biegu, zbierane przez większe ciek: Roztokę, Sól, Ujsołę, Żabnicę, Sopotnię, Koszarawę i Krzyżówkę. Większość potoków ma swoje źródła w pasie od 800 do 1100 m n.p.m. Najwyżej położone są źródła potoku Glinny (ok. 1450 m n.p.m.), wypływającego z północno-wschodniego stoku Pilska. Rozległością swoich obszarów źródłiskowych wyróżniają się potoki Cichy, Żabnica i Sopotnia Wielka (ZIEMOŃSKA 1981).

Potoki omawianych grup cechują się dużymi spadkami o znacznej sile erozyjnej. Poziom lustra wody tych cieków ulega dużym wahaniom w ciągu roku. Jedynie Soła jest typową górską rzeką o szybkim prądzie i oligotroficznych wodach, silnie nagrzewających się w okresie letnim (BOMBÓWNA 1960).

Do rzadkości należą tutaj zbiorniki wód stojących. Częste natomiast są miejsca trwale podmokłe, o ombrofilno-terrestycznej gospodarce wodnej, rozmieszczone na terasach dolin, stokach i wierzchowinach szczytowych. Występują one jako wykapy, wysięki i źródliska, najczęstsze zaś i najbardziej charakterystyczne są młaki położone w najwyższych rejonach (od około 1150 do 1500 m n.p.m.). Na szczycie Lipowskiej spotyka się torfowiska zasilane wodą opadową.

2.6. Klimat

Zróżnicowanie klimatyczne Beskidu Żywiecko-Orawskiego uzależnione jest od urozmaicenia morfometrycznego tego obszaru. Znaczna rozpiętość profilu pionowego terenu przyczynia się do wystąpienia piętrowości zjawisk klimatycznych. W związku z tym HESS (1965) wyróżnił tutaj cztery piętra klimatyczne, przyjmując jako kryterium podziału średnią roczną temperaturę powietrza. Izotermie roku $+6^{\circ}$, $+4^{\circ}$ i $+2^{\circ}\text{C}$, które przebiegają na wysokościach 680, 1080 i 1400 m n.p.m., wyznaczają granice pomiędzy poszczególnymi piętrami klimatycznymi, tj. umiarkowanie ciepłym, umiarkowanie chłodnym, chłodnym i bardzo chłodnym. Jedynie wierzchołek Pilska (powyżej 1400 m) znajduje się w bardzo chłodnym piętrze klimatycznym, którego średnie wieloletnie temperatury roku wahają się w granicach od 0° do $+2^{\circ}\text{C}$. Grzbiety górskie głównego wododziału karpackiego i bocznych odgałęzień, wznoszące się powyżej 1080 m, znajdują się w piętrze chłodnym, o średnich rocznych temperaturach od $+2^{\circ}$ do $+4^{\circ}\text{C}$. Natomiast przeważającą część terenu obejmuje piętro umiarkowanie chłodne (od 680 do 1080 m) i umiarkowanie ciepłe (do 680 m).

Długość okresu wegetacyjnego wykazuje znaczne zróżnicowanie. Okres ten u podnóża pasma rozpoczyna się w pierwszych dniach kwietnia i trwa do pierwszych dni listopada (około 210 dni); na wysokości 1080 m trwa od początku maja do trzeciej dekady października (około 170 dni), na wysokości 1400 m zaś — od połowy maja do drugiej dekady października (około 145 dni). Warunki termiczne okresu wegetacyjnego w Beskidzie Żywieckim zostały szczegółowo omówione przez BRZEŃNIAKA i CZEREMDĘ (1983).

Roczne sumy opadów wahają się w granicach od 800 mm, w położeniach najniższych, do 1600 mm — w najwyższych. Najwilgotniejszy klimat mają północno-

zachodnie stoki Romanki, najsuchszy natomiast — kotliny, np. Kotlina Żywiecka. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza klimat staje się coraz bardziej wilgotny. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną u podnóża pasma wynosi 83 dni, na wysokości 1000 m — 145, przy górnej granicy lasu — 185, na szczycie Pilska zaś wzrasta do 200 dni. W piętrze chłodnym i bardzo chłodnym opady śnieżne przeważają nad deszczowymi, a pokrywa śnieżna zalega większą część roku.

Przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Liczba dni z silnym wiatrem waha się od 20, w położeniach najniższych, do 60 — w najwyższych (HESS 1965).

Różnice w warunkach hipsometrycznych grup Wielkiej Raczy i Pilska wpływają na różnice klimatyczne między nimi. Grupa Pilska charakteryzuje się ostrzejszym i wilgotniejszym klimatem, zwłaszcza w rejonach południowych (HESS, LEŚNIAK 1981).

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ

Według podziału geobotanicznego (PAWŁOWSKI 1977) Beskid Żywiecki należy do Podokręgu Śląsko-Babiogórskiego, Okręgu Beskidy i Działu Karpaty Zachodnie. W związku ze znacznym zróżnicowaniem ukształtowania pionowego terenu, wykształciły się cztery piętra roślinności: pogórze, regiel dolny, regiel górny i subalpejskie. Ten ogólny obraz pionowego rozmieszczenia roślinności nie odbiega od układów obserwowanych w innych pasmach beskidzkich (PAWŁOWSKI l.c.). Należy jednak zaznaczyć, że na naturalny układ pięter roślinności nakładają się tu dwa wtórne piętra gospodarcze, związane z działalnością człowieka. Dla odróżnienia od pięter naturalnych, BIAŁECKA (1982) używa dla nich określenia „kraina”. Od podnóża po około 800 (850) m n.p.m. rozciąga się kraina upraw, która przedstawia się jako ... *mozaika pól uprawnych, pastwisk, łąk, zarośli śródpolnych i osiedli ludzkich*... (BIAŁECKA l.c.). Powyżej występuje kraina monokultur świerkowych, która często graniczy z naturalnymi borami świerkowymi regla górnego.

Liczne, szczegółowe dane o florze naczyniowej i roślinności grupy Pilska znajdujemy w opracowaniach BIAŁECKIEJ (1982) i MICHALIKA (1992). Ponadto wiele informacji o szacie roślinnej Beskidu Żywieckiego zawartych jest w pracach DENISIUKA (1983, 1985) i WILCZKA (1995). Z kolei charakterystykę obiektów chronionych, tj. istniejących i projektowanych rezerwatów przyrody oraz pomników przyrody i Żywieckiego Parku Krajobrazowego podają ALEXANDROWICZ i DENISIUK (1991). Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę roślinności poszczególnych pięter.

Piętro pogórza. Rozciąga się od podnóża do około 550 m n.p.m. i zajmuje około 15% powierzchni rzutowanej badanego obszaru. Obecnie jest ono prawie cał-

kowiec zajęte pod uprawy, łąki i osiedla, a jego naturalna roślinność uległa niemal zupełnemu zniszczeniu. O występowaniu niegdyś na tym terenie grądu subkontynentalnego *Tilio-Carpinetum* Tracz. 1962, zespołu przewodniego dla piętra pogórza, świadczą dziś stanowiska niektórych gatunków wyróżniających oraz fitocenozy silnie zdegenerowane, spotykane jeszcze na jego obrzeżach (DENISIUŁ 1983). Niewielkie płaty grądu wilgotnego zachowały się w Jelesni, przy ujściu Sopotni do Koszarawy. Podobne fitocenozy obserwowano w Wieprzu, na zboczach teras aluwialnych Soły. Nad rzekami i potokami rzadko spotyka się obecnie płaty nadrzecznej olszyny górskiej *Alnetum incanae* Aich. et Siegr. 1930, np. w Sopotni Małej, Jelesni, Ciścu, Milówce i Rycerce. Częściej występują zarośla nadrzecznych wiklin ze związku *Salicion albae* R. Tx. 1955, których duże skupienia obserwuje się w Żabnicy Małej nad potokiem Żabnica oraz w Rajczy i Milówce nad Sołą.

W rzadkich tu zastoiskach powodziowych i starorzeczach (okolice Sopotni i Jelesni) występują niewielkie płaty zbiorowisk wodnych z rzędu *Potametalia* Koch 1926 i szuwarowych — z rzędu *Phragmitetalia* Koch 1926. Rozpowszechnione są natomiast zbiorowiska łąkowe, zwłaszcza niżowa łąka rajgrasowa *Arrhenatheretum medioeuropaeum* (Br.-Bl. 1919) Oberd. 1952.

Piętro regla dolnego. Rozciąga się od około 550 do około 1150 m n.p.m. i zajmuje blisko 75% powierzchni rzutowanej badanego obszaru. Pierwotna szata roślinna tego piętra ulegała daleko idącym przeobrażeniom. Jak już wspomniano, do wysokości około 800 m n.p.m. rozpościera się kraina upraw, wyżej zaś zdecydowanie panują sztuczne bory świerkowe. Obraz ten znacznie odbiega od naturalnych stosunków niegdyś tu istniejących. Przewodnim zespołem regla dolnego we wszystkich pasmach Beskidów Zachodnich jest żyzna buczyna karpacka *Dentario glandulosae-Fagetum* Klika 1927 em. W. Mat. 1964. O panowaniu niegdyś tego zespołu świadczą obecnie stanowiska gatunków charakterystycznych oraz przestoje starych buków i jaworów, spotykane często w sztucznych świerczynach, przy drogach, nad potokami oraz na porębach (por. DENISIUŁ 1983). Najlepiej zachowane płaty buczyn chronione są w rezerwach przyrody: „Oszast”, „Pod Rysianką” i „Śrubita”. Równie dobrze wykształcone fitocenozy występują między innymi na północnych stokach Majowa i Rycerzowej (w rejonie źródłiskowym Danielki) oraz na wschodnich skłonach Muńcuła.

Drugim przewodnim zespołem leśnym regla dolnego, zajmującym dolną jego część, był dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy *Abieti-Piceetum montanum* Szaf., Pawł. et Kulcz. 1923 em. J. Mat. 1978. Obecnie zbiorowisko to jest rzadsze (por. WILCZEK 1995). Dobrze zachowane fragmenty boru występują między innymi na wschodnich stokach Kikuli, południowych stokach Rachowca, północnych stokach Rycerzowej i na stokach Okrągłej.

W roślinności leśnej regla dolnego występują także zbiorowiska rzadziej spotykane, związane ze specyficznym, lokalnym układem warunków ekologicznych: kwaśna buczyna górską *Luzulo nemorosae-Fagetum* (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937, jaworzyna ziołoroślowa *Aceri-Fagetum* Bartsch 1940 i jaworzyna

karpacka *Sorbo-Aceretum carpaticum* Cel. et Wojt. (1961) 1978 (WILCZEK 1995; ŻARNOWIEC, KLAMA 1994). Do najrzadszych zbiorowisk leśnych badanego terenu należy dolnoregłowy bór jodłowy *Galio-Abietetum* Oberd. 1962. Jego płaty rozwijają się głównie w pasie od 800 do 1000 m n.p.m., na południowych i południowo-wschodnich stokach Lipowskiej, Małej Rycerzowej, Bukowiny i Beskidu Bednarowa (WILCZEK 1995).

Wzdłuż potoków nieduże powierzchnie opiewają ziołorośla z lepiężnikiem białym *Petasitetum albi* Zlatn. 1928. Również nad potokami, zwłaszcza na płaskich terasach zalewowych do wysokości około 900 m n.p.m., spotyka się dość często zbiorowisko olszyny górskiej *Alnetum incanae* Aich. et Siegr. 1930. Na licznych powierzchniach źródłkowych, szczególnie w górnej części regła, występują płaty moczarów źródłkowych ze świerżabkiem orzęsionym *Chaerophylletum hirsuti* Celiński et Wojterski 1983 oraz eutroficzne młaki górskie *Valeriano-Caricetum flavae* Pawł. (1949) 1960.

Istotnym elementem krajobrazu regła dolnego są półnaturalne zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe wprowadzone przez człowieka. W dolnej części regła, na terasach akumulacyjnych rzek i potoków spotykane jest zbiorowisko pastwiskowe *Lolio-Cynosuretum* R. Tx. 1937, a na stromych, kamienistych stokach – zbiorowisko „tłoków” *Calluno-Nardetum strictae* Hrync. 1959. Najbardziej rozpowszechnione jest tu jednak, zwłaszcza powyżej 800 m n.p.m., bliźniczysko górskie *Hieracio-Nardetum* Kornaś 1955. Jego rozległe płaty występują w wierzchołkowych partiach Wielkiej Raczy, Małej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Rycerzowej, Muńcuła i Bendozki Wielkiej.

Piętro regła górnego. Zajmuje wąski pas, rozciągający się od 1150 (1200) do 1350 (1400) m n.p.m. i obejmuje wierzchołki Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Lipowskiej, Romanki, Trzech Kopców, Palenicy, Szczawiny i przyszczytowe partie Pilska (MEDWECKA-KORNAŚ, DENISIUK, DZIEWOLSKI 1981). Obszar zajęty przez regiel górny stanowi około 13% powierzchni rzutowanej badanych grup górskich. Naturalnym, dominującym zbiorowiskiem roślinnym tego piętra jest acydofilna, zachodniokarpicka świerczyna górnoregłowa *Plagiothecio-Piceetum tatricum* (Szaf., Pawł. et Kulcz. 1932) Br.-Bl., Vlieg. et Siss. 1939 em. J. Mat. 1978. Jej rozległe i najlepiej zachowane fitocenozy znajdują się pod ochroną w rezerwach przyrody „Pod Rysianką” i „Pilsko”. Na Pilsku świerczyna górnoregłowa osiąga górną granicę występowania. Jest ona w pełni zachowana na północno-wschodnich stokach i przebiega na wysokości 1390–1400 m n.p.m. Świerczyny rozwijające się na wierzchołkach Wielkiej Raczy i Wielkiej Rycerzowej, pod względem składu gatunkowego upodabniają się do dolnoregłowego boru jodłowo-świerkowego *Abieti-Piceetum montanum* Szaf., Pawł. et Kulcz. 1923 em. J. Mat. 1978 (DENISIUK 1985).

W wierzchołkowych partiach Lipowskiej i Romanki spotyka się dość rozległe płaty sudeckiej świerczyny górnoregłowej *Calamagrostio villosae-Piceetum* Schlueter 1969 [= *Plagiothecio-Piceetum hercynicum* R. Tx. (1932) 1937] (WILCZEK 1995).

Rozległe, zwłaszcza w grupie Wielkiej Raczy, bezleśne przestrzenie regła górnego zajęte są przez zbiorowiska półnaturalne. Najbardziej rozpowszechnione jest tu bliźniczysko górskie *Hieracio-Nardetum*. Wśród jego rozległych płatów występują enklawy równie pospolitych fitocenoz borówczyska czernicowego (zbiorowisko z *Vaccinium myrtillus*). Na Wielkiej Raczy zbiorowisko z panującą borówką czarną zajmuje prawie całą powierzchnię odlesionego wierzchołka.

Na obszarze regła górnego częste są miejsca wilgotne i podmokłe. Zajmują je młaki źródliskowe ze związku *Cardamino-Montion* Br.-Bl. 1925, zbiorowiska zioło-roślowe, np. *Aconitetum firmi* Pawł., Sokoł. et Wall. 1927 i *Rumicetum alpini* Beger 1922 lub torfowiskowe ze związku *Sphagnion magellanici* Kästner et Flössner 1933 em. Dierss. 1975. Do najciekawszych pod względem florystycznym należą młaki z *Allium sibiricum* i *Swertia perennis* subsp. *alpestris*, położone na Hali Cebula. Jedynie na wierzchołku Lipowskiej oraz Hali Cebula i Miziowej występują niewielkie płaty torfowiska wysokiego.

Piętro subalpejskie. Zajmuje płaski i rozległy wierzchołek Pilska. Na stokach północnych sięga ono do 1400 m, na wschodnich zaś do 1350 m n.p.m. W granicach terenu badań znalazła się tylko niewielka część tego piętra (około 40 ha); pozostała leży już po stronie słowackiej.

Największe powierzchnie zajmują tutaj karpackie zarośla kosodrzewiny *Pinetum mughi carpaticum* Pawł. 1927. Wśród łąnów kosówki rozwijają się rozległe płaty borówczysk czernicowych, które mają charakter fitocenoz wtórnych. Znacznie mniejsze płaty tworzy borówczysko bażynowe, które występuje tutaj w dwóch podzespołach — torfowcowym *Empetro-Vaccinietum* Br.-Bl. 1926 *sphagnetosum*, rosnącym na miejscach bardziej wilgotnych, i płonnikowym *Empetro-Vaccinietum* Br.-Bl. 1926 *polytrichetosum stricti*, na siedliskach suchszych. Do zbiorowisk zajmujących dość rozległe powierzchnie należą ponadto traworośla *Calamagrostietum villosae tatricum* Pawł., Sokoł. et Wall. 1928. Przy źródłach i wysiękach wody rozwijają się mszarniki źródliskowe ze związku *Cardamino-Montion* Br.-Bl. 1925, na brzegach cieków zaś spotyka się płaty ziołorośli *Aconitetum firmi* Pawł., Sokoł. et Wall. 1927. Przy górnej granicy lasu, w strefie przejścia między górnoreglową świerczyną a zaroślami kosówki, rozwija się zubożała postać zespołu *Pado-Sorbetum* (HUECK 1939) Mat. 1965.

Szczegółowe dane o szacie roślinnej wierzchołka Pilska zawarte są w pracy MICHALIKA (1992).

4. MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Badania terenowe prowadzono od 1982 do 1985 roku oraz wyrywkowo od 1992 do 1994 roku. W pierwszym etapie badaniami objęto głównie doliny potoków, a następnie rozszerzono eksplorację na pozostałe części obszaru, starając się możliwie

równomiernie pokryć teren punktami badawczymi, proporcjonalnie do stopnia urozmaïcenia rzeźby i siedlisk.

Badania terenowe, zbiór materiałów florystycznych i ich opracowanie przeprowadzono zgodnie z metodami ogólnie przyjętymi w badaniach briologicznych (VERDOORN 1934; REJMENT-GROCHOWSKA 1950; SZWEYKOWSKI 1951, 1953, 1958c, 1960; KOŁA 1963, 1972; SZMAJDA 1979, 1981). Na danym stanowisku wątrobowce notowano i zbierano z wszystkich mikrosiedlisk. Materiał zielnikowy segregowano w terenie, starając się zbierać, w miarę możliwości, próby jednogatunkowe. Każdą próbkę zielnikową opisywano i numerowano. Zebrano w ten sposób łącznie 4583 torebki zielnikowe z wątrobowcami. Na każdym stanowisku dokonywano ponadto spisów florystyczno-ekologicznych, w których zaznaczano między innymi częstość występujących gatunków i ich preferencje siedliskowe. Ponieważ obszar Beskidu Żywiecko-Orawskiego był już obiektem badań hepatikologicznych, dlatego w niniejszym opracowaniu uwzględniono również dane zawarte w piśmiennictwie (patrz literatura cytowana w Rozdz. 1). Na ich podstawie zestawiono 84 notowania wątrobowców. Biorąc pod uwagę badania własne i dane z piśmiennictwa, analizę flory przeprowadzono na podstawie 4700 dat florystycznych.

Stanowisko zbioru traktowano w bardzo wąskim ujęciu. Unikano przy tym nadmiernego zagęszczenia tak rozumianych stanowisk; stąd też przyjmowano za dwa odrębne stanowiska miejsca różniące się swoim położeniem pionowym o około 10–20 m (w zależności od ukształtowania powierzchni, spadku stoku itp.). W wykazie stanowisk jednym numerem opatrzono nieraz kilka stanowisk w wąskim ujęciu, np. w punkcie nr 22 (Prusów, stok północny, pod szczytem) wątrobowce zbierano z wysokości 980 i 1010 m n.p.m., co w wykazie gatunków traktowano jako dwa odrębne stanowiska, tj. 22 (980, 1010). Wszystkie tak rozumiane stanowiska nanoszono na podkład kartograficzny w skali 1:75 000. Uzyskano w ten sposób 380 stanowisk badawczych, a łącznie z danymi literaturowymi – 399. Rozkład stanowisk w poszczególnych 100-metrowych pasach wysokościowych jest mniej więcej równomierny (Ryc. 4). Zmniejszona liczba stanowisk w pasach najniższych (od 400 do 600 m n.p.m.) i najwyższych (od 1400 m wzwyż) wynika z tego, że tereny zawarte w tych pasach mają mały udział w całkowitej powierzchni badanego obszaru.

Podczas pracy w terenie posługiwano się mapą turystyczną „Beskid Śląski i Żywiecki” w skali 1:75 000 (1982) oraz mapami topograficznymi w skali 1:25 000. Wysokości ustalano za pomocą wysokościomierza typu Sundo 6000 firmy Stöcker und Olms (Niemcy) z dokładnością odczytu do 2,5 m.

W czasie oznaczania materiałów zielnikowych korzystano z następujących kluczy i flor: MÜLLERA (1905–1916, 1954, 1957), ARNELLA (1956), REJMENT-GROCHOWSKIEJ (1966, 1971), SCHUSTERA (1966, 1969, 1974, 1980, 1992a, b), SCHUSTERA i DAMSHOLTA (1974) oraz SCHLJAKOVA (1976, 1979, 1980, 1981a). W przypadku niektórych rodzajów i rodzin wykorzystano także inne opracowania, w tym monograficzne (BUCH 1928; ENGEL, SCHUSTER 1984; GROLLE 1972; JÄRVINEN 1974, 1983; MENDELAK 1973, 1974; MÜLLER 1947; SCHUSTER 1951, 1981; VAÑA

Ryc. 4. Liczby stanowisk badawczych w 100-metrowych pasach wysokościowych

Fig. 4. Numbers of collection sites in 100-metre altitudinal belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

1973a, b, 1974, 1975, 1976). Wielką pomocą służyły ponadto materiały porównawcze znajdujące się w zielniku wątrobowców Zakładu Genetyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (POZW). Większość oznaczeń, zwłaszcza form krytycznych, potwierdził prof. dr Jerzy SZWEYKOWSKI.

Wszystkie materiały zielnikowe zostały złożone w Zielniku Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z siedzibą w Sosnowcu (SOSN).

5. CHARAKTERYSTYKA STATYSTYCZNA FLORY

5.1. Ogólne dane liczbowe

Flora wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego liczy obecnie 113 gatunków, co stanowi około 46% flory wątrobowców Polski (DUELL 1983). W grupie Wielkiej Raczy występują 83 gatunki (73,5% całości flory), w grupie Pilska – 110 (97,3%).

Zróżnicowanie taksonomiczne flory wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego
Taxonomic differentiation of liverwort flora in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Lp. No.	Rodzina Family	Liczba rodzajów Number of genera	Liczba gatunków Number of species
1.	<i>Anthocerotaceae</i>	2	2
2.	<i>Conocephalaceae</i>	1	1
3.	<i>Marchantiaceae</i>	2	3
4.	<i>Ricciaceae</i>	1	2
5.	<i>Metzgeriaceae</i>	1	2
6.	<i>Aneuraceae</i>	2	4
7.	<i>Pelliaceae</i>	1	3
8.	<i>Blasiaceae</i>	1	1
9.	<i>Codoniaceae</i>	1	1
10.	<i>Lophoziaceae</i>	5	24
11.	<i>Jungermanniaceae</i>	4	14
12.	<i>Gymnomitriaceae</i>	1	2
13.	<i>Plagiochilaceae</i>	1	2
14.	<i>Geocalycaceae</i>	4	8
15.	<i>Scapaniaceae</i>	2	15
16.	<i>Cephaloziellaceae</i>	1	3
17.	<i>Cephaloziaceae</i>	2	7
18.	<i>Lepidoziaceae</i>	2	3
19.	<i>Calypogeiaceae</i>	1	5
20.	<i>Pseudolepicoleaceae</i>	1	1
21.	<i>Trichocoleaceae</i>	1	1
22.	<i>Ptilidiaceae</i>	1	2
23.	<i>Radulaceae</i>	1	2
24.	<i>Porellaceae</i>	1	2
25.	<i>Frullaniaceae</i>	1	2
26.	<i>Lejeuneaceae</i>	1	1
Razem — Total		42	113

Wątrobowce te należą do 26 rodzin i 42 rodzajów (Tab. 1). Najliczniej reprezentowane są tu następujące rodziny: *Lophoziaceae*, *Scapaniaceae*, *Jungermanniaceae*, *Geocalycaceae*, *Cephaloziaceae* i *Calypogeiaceae*. Wymienione rodziny obejmują łącznie 73 gatunki, co stanowi blisko 65% całej flory.

Niniejsze badania potwierdziły występowanie wszystkich podanych wcześniej 54 gatunków, przy czym w grupie Wielkiej Raczy potwierdzono 23 gatunki na 24 sąd podanych, w grupie Pilska zaś — 47 na 49 podanych. Dla polskiej części Beskidu Żywieckiego po raz pierwszy notowano 27 gatunków, dla całego Beskidu Żywieckiego (łącznie z częścią słowacką) — 22, dla Beskidów Zachodnich zaś — 2 (*Harpanthus flotovianus* i *Scapania lingulata*). Obecny stan poznania flory badanej części Beskidu Żywieckiego ilustruje tabela 2.

Tabela 2 — Table 2

Obecny stan poznania flory wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego
 The present knowledge of liverwort flora in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Grupy gatunków Group of species	Grupa Wielkiej Raczy Wielka Racza Range	Grupa Pilska Pilsko Range	Beskid Żywiecko-Orawski Beskid Żywiecko-Orawski Range
Gatunki znane z piśmiennictwa Species reported in the literature	24	49	54
Gatunki potwierdzone w badaniach Species reported in the literature and rediscovered	23	47	54
Gatunki nowe, uprzednio nie podawane New species for study area	59	63	59
Gatunki znane obecnie z badanego terenu Total number of species on the study area	82	110	113
Gatunki nowe dla polskiej części Beskidu Żywieckiego New species for Polish part of Beskid Żywiecki Range	27		
Gatunki nowe dla Beskidu Żywieckiego New species for Beskid Żywiecki Range	22		
Gatunki nowe dla Beskidów Zachodnich New species for Western Beskids	2		

5.2. Częstość występowania gatunków

W celu określenia stopnia rozpowszechnienia gatunków przyjęto sześciostopniową skalę frekwencji, skonstruowaną na podstawie liczby stanowisk wątrobowców (Tab. 3). W badanej florzę największy udział mają gatunki bardzo rzadkie, które z gatunkami rzadkimi stanowią łącznie blisko 55% flory. Grupa wątrobowców bardzo częstych i pospolitych stanowi ponad 21% flory (Tab. 3; Ryc. 5).

Analiza rozmieszczenia gatunków bardzo rzadkich i rzadkich wskazuje, że największe ich skupienie występuje w masywach Pilska, Lipowskiej, Romanki i Oszusu (Ryc. 6, Tab. 4). Nieco mniejszą ich liczbę stwierdzono w masywie Wielkiej Rycerzowej i Krawcowego Wierchu. W wymienionych podgrupach rośnie 40 gatunków rzadkich i bardzo rzadkich, których nie stwierdzono w innych rejonach;

Tabela 3 – Table 3

Częstość występowania wątrobowców w Beskidzie Żywiecko-Orawskim
Frequency of liverwort species in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Grupa gatunków Group of species	Łączna liczba gatunków Total number of species	Gatunki górskie Mountain species	Gatunki niżowo-górskie Lowland-mountain species	Gatunki niżowe Lowland species
Bardzo rzadkie (1–5 stanowisk) Very rare (1–5 localities)	39 (34,5%)	22	13	4
Rzadkie (6–10 stanowisk) Rare (6–10 localities)	23 (20,4)	19	3	1
Dość częste (11–20 stanowisk) Fairly frequent (11–20 localities)	18 (15,9)	12	5	1
Częste (21–40 stanowisk) Frequent (21–40 localities)	10 (8,8)	5	4	1
Bardzo częste (41–60 stanowisk) Very frequent (41–60 localities)	10 (8,8)	8	2	0
Pospolite (ponad 60 stanowisk) Common (over 60 localities)	13 (11,5)	5	8	0

Ryc. 5. Udział gatunków wątrobowców w wyróżnionych klasach frekwencji

Gatunki: 1 – niżowe; 2 – niżowo-górskie; 3 – górskie

Fig. 5. Frequency classes of liverwort species in the Beskid Żywiecko-Orawski Range
1 – lowland species; 2 – lowland-mountain species; 3 – mountain species

stanowi to 35% flory omawianego obszaru. Wśród tych gatunków jedenaście rośnie wyłącznie na Pilsku. Są to w większości wątrobowce wysokogórskie, mające optimum występowania w piętrze subalpejskim i alpejskim. Ponadto liczna jest grupa gatunków, które na Pilsku mają większość swoich stanowisk, na pozostałym terenie zaś są rzadkie; do niej należą m.in. *Anastrepta orcadensis*, *Barbilophozia floerkei*, *Calypogeia neesiana*, *Diplophyllum obtusifolium*, *Jungermannia obovata*, *J. sphaerocarpa*, *Scapania subalpina* i *Radula lindenberiana*.

Ryc. 6. Rozmieszczenie gatunków bardzo rzadkich i rzadkich w Beskidzie Żywiecko-Orawskim
Liczba gatunków na jednym stanowisku: 1 – 1 gatunek; 2 – 2–5 gatunków; 3 – 6–8 gatunków; 4 – 24 gatunki

Fig. 6. Distribution of the species very rare and rare in the Beskid Żywiecko-Orawski Range
Number of species on one site: 1 – 1 species; 2 – 2–5 species; 3 – 6–8 species; 4 – 24 species

Tabela 4 — Table 4

Liczba gatunków rzadkich i bardzo rzadkich w poszczególnych częściach Beskidu Żywiecko-Orawskiego
Number of the species rare and very rare recorded from particular parts of the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Część (mikroregion) Part (microregion)	Liczba gatunków bardzo rzadkich Number of very rare species	Liczba gatunków rzadkich Number of rare species	Łączna liczba gatun- ków bardzo rzadkich i rzadkich Total number of very rare and rare species	Liczba gatunków wyłącznych Number of exclusive species
Grupa Wielkiej Raczy Wielka Racza Range	15 (18,3% ¹)	17 (20,7%)	32 (39,0%)	3 (2,7%)
Zabawa (Mountain)	—	1 (5,0%)	1 (5,0%)	—
Rachowiec (Mt.)	4 (10,8%)	1 (2,7)	5 (13,5)	1 (0,9%)
Ożna (Mt.)	2 (5,0)	4 (10,0)	6 (15,0)	1 (0,9)
Wielka Racza (Mt.)	1 (2,6)	5 (12,8)	6 (15,4)	1 (0,9)
Będoszka (Mt.)	2 (6,7)	2 (6,7)	4 (13,4)	—
Wielka Rycerzowa (Mt.)	3 (5,8)	7 (13,5)	10 (19,3)	—
Oszus (Mt.)	8 (12,5)	10 (15,6)	18 (28,1)	—
Grupa Pilska Pilsko Range	36 (32,7%)	23 (20,9%)	59 (53,6%)	31 (27,4%)
Krawców Wierch (Mt.)	6 (11,5%)	4 (7,7%)	10 (19,2%)	2 (1,8%)
Lipowska (Mt.)	10 (14,5)	11 (15,9)	22 (31,9)	1 (0,9)
Romanka (Mt.)	6 (11,3)	10 (19,9)	16 (30,2)	2 (1,8)
Pilsko (Mt.)	22 (23,2)	22 (23,2)	44 (46,3)	11 (9,7)
Sucha Góra (Mt.)	—	1 (4,5)	1 (4,5)	—
Prusów (Mt.)	2 (9,1)	2 (9,1)	4 (18,2)	1 (0,9)
Magura (Mt.)	1 (5,0)	2 (10,0)	3 (15,0)	—
Kiczora (Mt.)	—	—	—	—
Kotlina Jeleśniańska	4 (23,5)	2 (11,8)	6 (35,3)	—

¹ 100% = liczba gatunków notowanych w danym mikroregionie (number of species recorded from this microregion)

5.3. Gatunki rzadkie w Beskidach Zachodnich oraz zagrożone w Polsce i w Europie

Ocena stopnia rozpowszechnienia gatunków wątrobowców w Polsce i w poszczególnych regionach geograficznych nie jest łatwa. Jest ona zawsze obciążona błędem wynikającym z niepełnego jeszcze poznania flory Polski. Stopień rzadkości niżej wymienionych roślin oparto na dotychczasowych danych literaturowych (patrz lit. cyt. w Rozdz. 5.4). Rozmieszczenie gatunków rzadkich przedstawiono na rycinie 7. W badanej florze stwierdzono 33 gatunki, które są rzadkie w Beskidach bądź w całych Karpatach Zachodnich, co stanowi blisko 30% flory. Ponadto rośnie tu sześć gatunków zagrożonych w Polsce i trzy gatunki zagrożone w Europie. Razem z wątrobowcami rzadkimi w Beskidach tworzą one grupę liczącą 35 gatunków (około 1/3 flory):

Ryc. 7. Rozmieszczenie wątrobowców rzadkich w Beskidach Zachodnich i w Karpatach Zachodnich
 Liczba gatunków na jednym stanowisku: 1 – 1–2 gatunki; 2 – 3–4 gatunki; 3 – 5 i więcej gatunków
 Fig. 7. Distribution of the liverworts rare in the Western Beskids and the Western Carpathians over the
 study area

Number of species in one site: 1 – 1–2 species; 2 – 3–4 species; 3 – 5 and more species

1. Gatunki rzadkie w Karpatach i nowe dla Beskidów Zachodnich: *Harpanthus flotovianus*, *Scapania lingulata*.

2. Gatunki rzadkie w Karpatach Zachodnich: *Anastrophyllum hellerianum*, *Harpanthus scutatus*, *Jungermannia subelliptica*, *Lophozia ascendens*, *L. bantriensis*, *L. longidens*, *Mylia anomala*, *Porella baueri*, *Riccardia multifida*, *Scapania paludosa*, *Tritomaria exsectiformis*.

3. Gatunki rzadkie w Beskidach Zachodnich: *Anastrophyllum minutum*, *Barbilophozia hatcheri*, *Bazzania tricrenata*, *Cephaloziella hampeana*, *Diplophyllum taxifolium*, *Frullania tamarisci*, *Geocalyx graveolens*, *Jungermannia cofertissima*, *J.*

obovata, *Lophozia heterocolpos*, *L. obtusa*, *L. wenzelii*, *Marsupella sprucei*, *Porella platyphylla*, *Preissia quadrata*, *Ptilidium ciliare*, *Radula lindenbergiana*, *Scapania helvetica*, *S. parvifolia*, *S. subalpina*.

4. Gatunki zagrożone w Polsce (por. SZWEYKOWSKI 1992) należą do kategorii wymierających (E): *Fossombronia wondraczekii*, *Frullania tamarisci*, *Porella baueri* i *P. platyphylla* oraz do kategorii narażonych (V): *Geocalyx graveolens* i *Metzgeria conjugata* (Ryc. 8; por. także Rozdz. 9.3).

Ryc. 8. Rozmieszczenie wątrobowców zagrożonych w Polsce

Liczba gatunków na jednym stanowisku: 1 – 1 gatunek; 2 – 2 gatunki

Fig. 8. Distribution of the liverworts threatened in Poland over the study area

Number of species in one site: 1 – 1 species; 2 – 2 species

5. Gatunki zagrożone w Europie (por. SCHUMACKER, MARTINY 1995): *Lophozia ascendens* — gatunek zaliczony do kategorii wątrobowców rzadkich (R)¹ oraz *Porella baueri* i *Scapania parvifolia* — gatunki zaliczone do kategorii T².

5.4. Elementy wysokościowe we florze wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego

Florę wątrobowców pod względem rozmieszczenia pionowego można podzielić na trzy grupy gatunków: górskie, niżowo-górskie i niżowe (KOŁA 1972; MIREK 1989; PAWŁOWSKA 1977).

W niniejszym opracowaniu elementy wysokościowe wyróżniono na podstawie analizy ich rozmieszczenia w Polsce i na obszarach sąsiednich (Czechy, Słowacja, Ukraina); wykorzystano przy tym następujące opracowania: BLOCH i BLOCHA (1975a, b), BOROSA (1968), CELIŃSKIEGO i WOJTERSKEGO (1978, 1983), CHMIELEWSKIEGO i URBANEK (1963), DUDY i VAŃI (1969a, b, 1970a, b, c, 1971a, b, 1972a, b, 1973a, b, 1975, 1976a, b, 1977a, b, 1978, 1979a, b, 1980a, b, 1981a, b, 1982a, b, 1983), JĘDRZEJKI (1985), KARCZMARZA (1967, 1970, 1979, 1987), KARCZMARZA i BLOCHA (1983/1985), KARCZMARZA i BLOCH (1994), KLAMY (1986, 1992, 1995), KOŁY (1963, 1968, 1972, 1990), KOŁY i WILCZYŃSKIEJ (1985), MAMCZARZ (1977, 1979), MENDELAK (1977), MICKIEWICZ (1965, 1980), MICKIEWICZ, REJMENT-GROCHOWSKIEJ i SOBOTKI (1962), PILOUSA i DUDY (1960), PAŁKOWEJ (1961), REJMENT-GROCHOWSKIEJ (1950, 1966, 1971), REJMENT-GROCHOWSKIEJ i MICKIEWICZ (1962), SZWEYKOWSKIEGO (1953, 1954, 1957a, b, 1958a, b, c, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971), SZWEYKOWSKIEGO i KOŻLICKIEJ (1966, 1969, 1974, 1977, 1980), URBANEK (1966) oraz ZEROVA (1964).

Gatunki górskie. Gatunki górskie występują tylko w górach albo mają tam swój główny ośrodek występowania, natomiast na niżu są rzadkie (por. PAWŁOWSKA 1977; MIREK 1989). Pod względem ogólnego rozmieszczenia w Polsce, w górskiej florze badanego terenu można wyróżnić następujące grupy:

1. Rośliny występujące tylko w górach, nie posiadające stanowisk na niżu (16 gatunków), np. *Anastrepta orcadensis*, *Bazzania tricrenata*, *Diplophyllum taxifolium*.

2. Rośliny posiadające tylko pojedyncze stanowiska niżowe, głównie na niżu północnym; często są to stanowiska reliktowe (20 gatunków), np. *Barbilophozia attenuata*, *B. hatcheri*, *Harpanthus flotovianus*.

¹ Do kategorii gatunków rzadkich należą wątrobowce, które w kwadracie (50 × 50 km) UTM w Europie występują na mniej niż 40 stanowiskach lub liczba kwadratów, w których rosną, jest mniejsza niż 5% wszystkich kwadratów.

² Należą do kategorii zagrożonych, ale ze względu na niepewny status taksonomiczny tych gatunków, nie jest możliwe obiektywne określenie dla nich kategorii zagrożenia.

3. Rośliny mające w Polsce dwa ośrodki występowania — w północnej części niżu (głównie na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim) i na południu, w górach. Niektóre z tych gatunków posiadają również stanowiska rozproszone w całej Polsce Niżowej (35 gatunków), np. *Barbilophozia barbata*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Geocalyx graveolens*, *Lophozia longiflora*, *Nowellia curvifolia*.

W zależności od typu pionowego rozmieszczenia wątrobowców w Karpatach i w Sudetach, w obrębie flory górskiej Beskidu Żywiecko-Orawskiego wyróżnić można następujące grupy gatunków:

1. Gatunki reglaowe o zagęszczeniu stanowisk w piętrach reglaowych (33 gatunków):

a) gatunki ogólnoreglowe (13 gatunków); związane głównie z borami świerkowymi, gdzie rosną na humusie, skałach i butwiejącym drewnie; w Tatrach i w Karkonoszach ich występowanie ograniczone jest tylko do regli albo też górna granica zasięgu przebiega w piętrze subalpejskim, gdzie są rzadkie: *Barbilophozia attenuata*, *Calypogeia integristipula*, *Cephalozia leucantha*, *C. lunulifolia*, *Lejeunea cavifolia*, *Lophozia incisa*, *L. longidens*, *L. obtusa*, *Riccardia palmata*, *Scapania irrigua*, *S. mucronata*, *S. umbrosa* i *Tritomaria exsecta*;

b) gatunki dolnoreglowe (18 gatunków); w górach wysokich granica ich zasięgu przebiega w reglu dolnym bądź górnym, rzadziej wyżej: *Anastrophyllum hellerianum*, *Barbilophozia barbata*, *Bazzania trilobata*, *Calypogeia suecica*, *Cephalozia catenulata*, *Conocephalum conicum*, *Diplophyllum obtusifolium*, *Frullania tamarisci*, *Geocalyx graveolens*, *Harpanthus scutatus*, *Jamesoniella autumnalis*, *Jungermannia leiantha*, *Metzgeria conjugata*, *Nowellia curvifolia*, *Porella baueri*, *Riccardia multifida*, *Scapania nemorea* i *S. lingulata*;

c) gatunki górnoreglowe (2 gatunki); związane są przede wszystkim z butwiejącym drewnem świerkowym: *Lophozia ascendens*, *L. longiflora*.

2. Gatunki wysokogórskie, o zagęszczeniu stanowisk w piętrach alpejskim, subalpejskim i w reglu górnym; w reglu dolnym nie występują lub są też bardzo rzadkie (17 gatunków):

a) gatunki subalpejskie, o zagęszczeniu stanowisk w piętrze subalpejskim i w reglu górnym (13 gatunków): *Anastrepta orcadensis*, *Barbilophozia floerkei*, *Bazzania tricrenata*, *Diplophyllum taxifolium*, *Harpanthus flotovianus*, *Jungermannia confertissima*, *J. obovata*, *J. subelliptica*, *Lophozia bantriensis*, *Radula lindenbergiana*, *Scapania helvetica*, *S. paludosa*, *S. subalpina*;

b) gatunki alpejskie, wyraźnie przywiązane do piętra alpejskiego w górach wysokich (4 gatunki): *Lophozia heterocolpos*, *L. wenzelii*, *Marsupella sprucei*, *Scapania parvifolia*.

3. Gatunki ogólnogórskie; występują z równą częstością we wszystkich piętrach roślinnych; niektóre z nich związane są ze specyficznymi siedliskami, jak torfowiska i kwaśny humus (*Calypogeia neesiana*), skały wapienne (*Lophozia collaris*, *Preissia quadrata*, *Scapania aequiloba*) i potoki (*Jungermannia pumila*, *Scapania undulata*) (21 gatunków): *Blepharostoma trichophyllum*, *Calypogeia azurea*, *C. neesiana*, *Jungermannia pumila*, *Lophozia collaris*, *Marsupella funckii*, *Mylia taylorii*, *Nardia scalaris*, *Pellia neesiana*, *Plagiochila porelloides*, *Preissia quadrata*, *Scapania aequiloba*

i *S. undulata*. Zaliczono tu również gatunki, które rosną we wszystkich piętrach roślinnych, przy czym w Tatrach zagęszczenie ich stanowisk przypada na wyższe położenia: *Anastrophyllum minutum*, *Barbilophozia lycopodioides*, *B. hatcheri*, *Jungermannia atrovirens*, *J. sphaerocarpa*, *Lophozia silvicola*, *L. sudetica* i *Tritomaria quinquedentata*.

Podany powyżej wykaz gatunków górskich, w niektórych miejscach może budzić wątpliwości. Trudno bowiem obecnie podać całkowitą listę wątrobowców charakterystycznych dla poszczególnych pięter roślinnych. Nierzadko te same gatunki inaczej zachowują się w układzie piętrowym w poszczególnych pasmach Karpat i Sudetów. Znany jest fakt, że w górach niskich wątrobowce, rosnące zwykle na większych wysokościach, mają obniżoną swoją dolną granicę występowania (SZWEYKOWSKI 1958c). Na pionowy układ mszaków, szczególnie w górach niewysokich, mają ponadto wpływ czynniki edaficzne, co oznacza że osiągnięta przez dany gatunek granica zasięgu nie musi mieć charakteru klimatycznego. Zagadnienie to szczegółowo omówił SZWEYKOWSKI (1953).

Z podanego wyżej zestawienia wynika, że główny zrąb flory wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego stanowią gatunki górskie. Grupa ta liczy 71 gatunków (62,8% flory), w tym 17 wysokogórskich, 33 reglaowych i 21 ogólnogórskich (Ryc. 9).

Gatunki niżowo-górskie. Gatunki niżowo-górskie występują zarówno na niżu jak i w górach. W badanej florze stwierdzono 35 takich gatunków, co stanowi 31% (Ryc. 9). W zależności od tego jak wysoko rosną w górach, można w ich obrębie wydzielić dwie grupy (za MIRKIEM 1989):

1. Gatunki niżowo-górnoreglowe (21 gatunków); w górach rosną głównie w reglach (zwłaszcza regłu dolnym); niektóre z nich mogą tu być częste lub pospolite. Rzadko lub bardzo rzadko występują powyżej górnej granicy lasu: *Calypogeia muelleriana*, *Cephalozia connivens*, *Frullania dilatata*, *Lepidozia reptans*, *Lophocolea bidentata*, *L. cuspidata*, *L. heterophylla*, *Lophozia excisa*, *Jungermannia gracillima*, *J. hyalina*, *Marchantia polymorpha*, *Metzgeria furcata*, *Pellia epiphylla*, *Plagiochila asplenoides*, *Porella platyphylla*, *Ptilidium pulcherrimum*, *Radula complanata*, *Riccardia latifrons*, *Scapania curta*, *Trichocolea tomentella* i *Tritomaria exsectiformis*.

2. Gatunki niżowo-alpejskie (14); są one dość częste, częste bądź pospolite na niżu i w górach, gdzie wchodzą bardzo wysoko (do 2170 m n.p.m.): *Aneura pinguis*, *Cephalozia bicuspidata*, *C. lammersiana*, *Cephaloziella divaricata*, *C. hampeana*, *C. rubella*, *Chiloscyphus polyanthos*, *C. pallescens*, *Diplophyllum albicans*, *Lophozia ventricosa*, *Mylia anomala*, *Nardia geoscyphus*, *Pellia endiviifolia* i *Ptilidium ciliare*.

Gatunki niżowe. Gatunki niżowe występują tylko na niżu lub tam mają centrum swego występowania. W górach gatunki te są rzadkie, rosną przede wszystkim na pogórzu i w niskich położeniach regła dolnego, gdzie związane są z krainą upraw. W oma-

wianej florze stwierdzono siedem takich gatunków (6,2%) (Ryc. 9): *Anthoceros punctatus*, *Blasia pusilla*, *Fossombronia wondraczekii*, *Marchantia aquatica*, *Phaeoceros laevis*, *Riccia glauca* i *R. sorocarpa*.

Ryc. 9. Udział elementów wysokościowych (A) i podział wątrobowców górskich (B) we florze wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego

A — Gatunki: 1 — górskie; 2 — niżowo-górskie; 3 — niżowe; B. Gatunki: 4 — wysokogórskie; 5 — regłowe; 6 — ogólnogórskie

Fig. 9. Proportion of altitudinal elements (A) and division of mountain species (B) in the liverwort flora of the Beskid Żywiecko-Orawski Range

A. 1 — mountain species; 2 — lowland-mountain species; 3 — lowland species; B. 4 — alpine and subalpine species; 5 — montane species; 6 — multizonal mountain species

6.1. Klasyfikacja typów siedlisk

W licznych systemach klasyfikacyjnych siedlisk wyróżnia się cztery rodzaje podłoża, na jakich rosną mszaki: skała, kora pni i gałęzi drzew, drewno i gleba. Różnie natomiast ujmuje się siedliska, przy czym różnice związane są przede wszystkim ze specyfiką danego terenu (por. SZWEYKOWSKI 1953; LISOWSKI 1956; KORNAŚ 1957, 1977; KOŁA 1963, 1972; BERDOWSKI 1974; SZMAJDA 1981).

We wszystkich klasyfikacjach jako kryteria podziału przyjmuje się zwykle następujące grupy czynników: rodzaj podłoża, związek i (lub) zależność od roślinności naczyniowej, warunki wilgotnościowe, stopień natężenia antropopresji oraz czynniki związane z przestrzennym usytuowaniem siedliska, np. podstawa pnia drzewa, kamienie wystające z gleby itp. Znaczenie, jakie przywiązuje się do poszczególnych czynników siedliskowych jest zróżnicowane (por. SZMAJDA 1981).

Zastosowaną w niniejszym opracowaniu klasyfikację typów siedlisk przyjęto za SZWEYKOWSKIM (1953) i KOŁĄ (1972) oraz dostosowano do specyfiki badanego terenu. Schemat podziału siedlisk jest następujący (w nawiasach podano używane w niniejszej pracy skróty siedlisk):

1. Siedliska naskalne (epilityczne): a) skały (N); b) kamienie wystające z gleby w zbiorowiskach leśnych i nieleśnych (NH).
2. Siedliska potokowe (P).
3. Siedliska epifityczne: a) pni drzew (K); b) stopy drzew (KH).
4. Siedliska butwiejącego drewna (epiksyliczne) (D).
5. Siedliska obnażonej gleby (na skarpach, drogach, ścieżkach, w rowach itp.) (M).
6. Spaleniska (S).
7. Siedliska naziemne (terrestryczne) w zbiorowiskach nieleśnych: a) borówczy-ska (*Vaccinietum myrtilli*, *Empetro-Vaccinietum*) (HV); b) źródłiska i ziołorośla (*Cardamino-Montion*, *Adenostyletalia*, *Filipendulo-Petasition*) (Z); c) łąki, pastwiska i murawy (*Molinio-Arrhenatheretea*, *Nardetalia*) (T); d) torfowiska i zatorfienia (*Sphagnion magellanici*, *Caricion fuscae*) (TR); e) żwirowiska i kamieńce nadrzeczne (*Epilobion fleischeri*) (A); f) brzegi wód stojących (*Phragmition*) (W); g) pola (*Aperetalia*, *Secalietalia*, *Polygono-Chenopodietalia*) (U).
8. Siedliska naziemne w zbiorowiskach leśnych i zaroślach kosodrzewiny (*Querc-Fagetea*, *Vaccinio-Piceetea*) (H).

6.2. Florystyczna charakterystyka siedlisk

6.2.1. Ogólna analiza florystyczna siedlisk

Udział wątrobowców w wyróżnionych typach siedlisk ilustruje tabela 5 i rycina 10. Największym bogactwem flory odznaczają się siedliska naskalne (51,3% flory),

Tabela 5 — Table 5

Liczba stanowisk wątrobowców na różnych typach siedlisk w Beskidzie Żywiecko-Orawskim
Number of collection sites of liverworts for various types of habitat in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Gatunek Species	Siedliska Habitats													Razem Total			
	K	KH	D	H	NH	N	M	T	P	Z	HV	TR	A		S	W	U
<i>Anastrepta orcadensis</i>	.	.	.	4	1	1	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	10
<i>Anastrophyllum hellerianum</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Anastrophyllum minutum</i>	.	.	.	.	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
<i>Aneura pinguis</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	1	.	4
<i>Anthoceros punctatus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11
<i>Barbilophozia attenuata</i>	14	19	18	8	3	2	1	2	.	.	2	.	.	.	.	.	69
<i>Barbilophozia barbata</i>	.	.	.	7	1	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	12
<i>Barbilophozia floerkei</i>	.	.	1	7	2	1	.	2	2	.	4	.	.	.	.	.	19
<i>Barbilophozia hatcheri</i>	.	1	.	3	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8
<i>Barbilophozia lycopodioides</i>	1	.	.	4	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
<i>Bazzania tricenata</i>	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
<i>Bazzania trilobata</i>	.	.	1	15	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17
<i>Blasia pusilla</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4
<i>Blepharostoma trichophyllum</i>	18	16	64	34	39	11	5	1	4	.	2	.	.	.	.	.	194
<i>Calypogeia azurea</i>	.	5	30	108	24	7	33	3	5	5	1	.	.	.	.	.	221
<i>Calypogeia integristipula</i>	.	4	12	30	.	1	5	1	.	.	1	.	.	.	.	.	54
<i>Calypogeia muelleriana</i>	.	1	3	4	3	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	17
<i>Calypogeia neesiana</i>	.	.	2	4	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	9
<i>Calypogeia suecica</i>	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
<i>Cephalozia bicuspidata</i>	4	10	116	59	98	15	74	4	8	4	3	.	.	.	.	.	395
<i>Cephalozia catenulata</i>	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
<i>Cephalozia connivens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
<i>Cephalozia lamnarsiana</i>	.	.	.	4	.	1	16	.	9	2	.	.	.	.	.	.	32
<i>Cephalozia leucantha</i>	.	.	11	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
<i>Cephalozia lunulifolia</i>	1	4	39	7	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	53

<i>Cephalozia divaricata</i>	1	.	.	.	1	.	1	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
<i>Cephalozia hampeana</i>	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
<i>Cephalozia rubella</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
<i>Chiloscyphus pallescens</i>	.	.	.	1	.	.	.	.	4	.	13	22	.	.	.	.	.	40	
<i>Chiloscyphus polyanthos</i>	.	.	.	.	4	2	.	.	.	104	12	.	.	.	.	.	.	122	
<i>Conocephalum conicum</i>	.	.	.	3	.	2	.	.	2	34	15	.	.	.	.	.	.	54	
<i>Diplophyllum albicans</i>	.	.	.	.	2	3	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
<i>Diplophyllum obtusifolium</i>	.	.	.	.	4	3	.	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	11	
<i>Diplophyllum taxifolium</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
<i>Fossombronina wondraczekii</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	21	
<i>Frullania dilatata</i>	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
<i>Frullania tamarisci</i>	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
<i>Geocalyx graveolens</i>	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
<i>Harpanthus flotovianus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	.	.	.	.	.	.	4	
<i>Harpanthus scutatus</i>	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
<i>Jamesoniella autumnalis</i>	1	2	6	16	2	1	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
<i>Jungermannia atroirens</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	8	
<i>Jungermannia gracillima</i>	.	.	.	.	5	.	35	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	46	
<i>Jungermannia hyalina</i>	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
<i>Jungermannia leiantha</i>	1	.	39	3	5	.	.	.	.	13	4	.	.	.	.	.	.	65	
<i>Jungermannia confertifissima</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
<i>Jungermannia obovata</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	10	1	.	.	.	.	.	.	12	
<i>Jungermannia pumila</i>	.	.	.	.	5	4	2	2	24	1	.	.	.	.	.	.	.	36	
<i>Jungermannia sphaerocarpa</i>	.	.	.	.	3	2	4	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	15	
<i>Jungermannia subelliptica</i>	.	.	.	.	.	5	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
<i>Lejeunea cavifolia</i>	1	2	.	.	4	10	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	22	
<i>Lepidozia reptans</i>	4	19	75	47	11	5	7	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	171	
<i>Lophocolea bidentata</i>	.	2	2	21	5	1	8	19	7	10	.	.	.	.	.	.	.	75	
<i>Lophocolea cuspidata</i>	.	.	.	3	1	.	4	1	6	2	.	.	.	.	.	.	.	17	
<i>Lophocolea heterophylla</i>	37	91	140	51	17	4	6	2	3	1	1	.	.	.	.	.	353		
<i>Lophozia ascendens</i>	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
<i>Lophozia bantriensis</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	6	
<i>Lophozia collaris</i>	.	.	.	.	.	5	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
<i>Lophozia excisa</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
<i>Lophozia heterocolpos</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	

Gatunek Species	Siedliska Habitats													Razem Total			
	K	KH	D	H	NH	N	M	T	P	Z	HV	TR	A		S	W	U
<i>Lophozia incisa</i>	1	1	12	1	2	2	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	22
<i>Lophozia longidens</i>	5	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
<i>Lophozia longiflora</i>	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19
<i>Lophozia obtusa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
<i>Lophozia silvicola</i>	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
<i>Lophozia sudetica</i>	.	.	.	10	14	13	4	1	8	.	.	.	.	.	.	.	50
<i>Lophozia ventricosa</i>	4	17	23	37	12	13	8	5	4	1	3	2	.	.	.	.	129
<i>Lophozia wenzelii</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	4
<i>Marchantia aquatica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
<i>Marchantia polymorpha</i>	.	.	.	.	.	.	1	1	4	1	.	.	.	2	.	.	9
<i>Marsupella funckii</i>	.	.	.	.	.	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5
<i>Marsupella sprucei</i>	.	.	.	.	7	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	10
<i>Metzgeria conjugata</i>	.	.	.	.	2	10	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	15
<i>Metzgeria furcata</i>	36	3	.	.	6	7	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	53
<i>Mylia anomala</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2
<i>Mylia taylorii</i>	1	1	19	11	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37
<i>Nardia geoscyphus</i>	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
<i>Nardia scalaris</i>	.	.	.	.	3	2	33	3	4	1	.	.	.	.	.	.	46
<i>Nowellia curvifolia</i>	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
<i>Pellia endiviifolia</i>	.	.	.	5	.	.	12	1	11	7	.	.	1	.	.	.	37
<i>Pellia epiphylla</i>	.	.	.	12	1	.	51	1	17	6	.	.	.	.	.	.	88
<i>Pellia neesiana</i>	.	.	.	3	.	.	16	2	16	19	.	.	.	.	.	.	56
<i>Phaeoceros laevis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
<i>Plagiochila asplenoides</i>	.	3	.	14	.	.	6	5	7	4	.	.	.	.	.	.	39
<i>Plagiochila porelloides</i>	16	11	3	16	11	11	10	.	56	4	.	.	.	.	.	.	138
<i>Porella baueri</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Porella platyphylla</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2
<i>Preissia quadrata</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2
<i>Prilidium ciliare</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2

<i>Ptilidium pulcherrimum</i>	82	15	11	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	111
<i>Radula complanata</i>	9	1	.	.	3	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	16
<i>Radula lindenbergiana</i>	.	.	.	.	1	2	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	6
<i>Riccardia latifrons</i>	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
<i>Riccardia multifida</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	8
<i>Riccardia palmata</i>	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
<i>Riccia glauca</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
<i>Riccia sorocarpa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	17
<i>Scapania aequiloba</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
<i>Scapania curta</i>	.	.	.	.	2	2	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
<i>Scapania helvetica</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	4
<i>Scapania irrigua</i>	.	.	.	.	3	2	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
<i>Scapania lingulata</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Scapania mucronata</i>	.	.	.	.	4	3	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
<i>Scapania nemorea</i>	.	1	11	1	19	7	4	.	.	12	1	.	.	.	.	.	.	56
<i>Scapania paludosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
<i>Scapania parvifolia</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
<i>Scapania subalpina</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	.	.	.	.	.	.	7
<i>Scapania umbrosa</i>	.	1	9	1	23	6	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	44
<i>Scapania undulata</i>	.	.	.	.	5	1	.	.	.	112	3	.	.	.	.	.	.	121
<i>Trichocolea tomentella</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
<i>Tritomaria exsecta</i>	4	2	16	10	26	15	5	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	85
<i>Tritomaria exsectiformis</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Tritomaria quinqueidentata</i>	.	.	.	9	.	8	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	19

Objaśnienia: K — pień drzew; KH — stopa drzew; D — butwiejące drewno; H — warstwa mszysta w zbiorowiskach leśnych i zarostach kosodrzewiny; NH — naskalne, na kamieniach wystających z gleby w zbiorowiskach leśnych i nieleśnych; N — naskalne, na skalach; M — obnażona gleba; T — warstwa mszysta w zbiorowiskach trawiastych; P — potokowe; Z — źródłiska i ziołorośla; HV — warstwa mszysta w borówczyskach; TR — zatorfienia; A — zwirowiska nadrzeczne; S — spaleniska; W — brzegi wód stojących; U — pola uprawne

Explanations: K — tree trunks; KH — foots of trees; D — decaying wood; H — terricolous habitats in forest communities and subalpine scrubs; NH — stones protruding upon the soil; N — rocks; M — bare soil; T — grasslands; P — torrents; Z — mires and springs; HV — *Vaccinium myrtillus* heaths; TR — peat bogs; A — gravel heaps on the rivers; S — burnt grounds; W — banks of stagnant water; U — arable fields

Ryc. 10. Liczba gatunków wątrobowców w różnych typach siedlisk w Beskidzie Żywiecko-Orawskim 1 – gatunki fakultatywne; 2 – gatunki obligatoryjne; K – pień drzew; KH – stopa drzew; D – butwiejące drewno; H – warstwa mszysta w zbiorowiskach leśnych i zaroślach kosodrzewiny; NH – naskalne, na kamieniach wystających z gleby w zbiorowiskach leśnych i nieleśnych; N – naskalne, na skałach; M – obnażona gleba; T – warstwa mszysta w zbiorowiskach trawiastych; P – potokowe; Z – źródła i ziołorośla; HV – warstwa mszysta w borówczyskach; TR – zatrofienia; A – żwirowiska nadrzeczne; S – spaleniska; W – brzegi wód stojących; U – pola uprawne

Fig. 10. Number of liverwort species in various types of habitats in the Beskid Żywiecko-Orawski Range 1 – facultative species; 2 – obligatory species; K – tree trunks; KH – foot of trees; D – decaying wood; H – terricolous habitats in forest communities and subalpine scrubs; NH – stones protruding upon the soil; N – rocks; M – bare soil; T – grasslands; P – torrents; Z – mires and springs; HV – *Vaccinium myrtillus* heaths; TR – peat bogs; A – gravel heaps on the rivers; S – burnt grounds; W – banks of stagnant waters; U – arable fields

obnażonej gleby (47%), kamieni wystających z gleby (42,5%) i potokowe (42,5%). Najmniej wątrobowców notowano na żwirowiskach nadrzecznych (0,9%), spaleni-skach (0,9%), brzegach wód stojących (1,8%), w zatrofieniach (2,7%) i na polach uprawnych (6,2%). Najwięcej gatunków wyłącznych stwierdzono na siedliskach butwiejącego drewna (9 gatunków; 27,3% flory siedliska), obnażonej gleby (5; 9,4%), na siedliskach naziemnych, w borówczyskach (5; 27,8%) i na polach uprawnych (4; 57,1%) (Ryc. 10).

Najwięcej gatunków wspólnych mają siedliska kamieni wystających z gleby z naskalnymi (36 gatunków wspólnych) oraz potokowymi (32). Liczne gatunki

wspólne mają także siedliska naskalne z siedliskami obnażonej gleby (32) i potokowymi (31). Najmniej wątrobowców wspólnych mają siedliska epifityczne i zbiorowisk trawiastych, następnie źródliskowych i ziołoroślowych oraz borówczysk (Tab. 6).

Tabela 6 — Table 6

Liczba gatunków wątrobowców w wyróżnionych typach siedlisk
Number of liverwort species in the distinguished types of habitats

Typ siedliska Type of habitat	Liczba gatunków Number of species																	
	ogółem total	wyłączne exclusive	gatunki wspólne z innymi typami siedlisk species common with another types of habitats															
			K	KH	D	H	NH	N	M	T	P	Z	HV	TR	A	S	W	U
K	23	2	21	16	14	15	18	17	12	7	12	6	6	2	—	—	—	—
KH	26	1	16	25	19	21	21	22	18	13	16	9	8	2	—	—	—	—
D	33	9	14	19	24	24	19	19	17	12	14	9	10	3	—	—	—	—
H	39	—	15	21	24	39	27	25	27	21	23	17	12	3	1	—	—	—
NH	48	—	18	21	19	27	48	36	30	22	32	16	9	2	—	—	—	1
N	58	3	17	22	19	25	36	55	32	20	31	16	12	2	—	—	—	—
M	53	5	12	18	17	27	30	32	48	25	27	21	8	2	1	1	1	3
T	28	—	7	13	12	21	22	20	25	28	19	13	10	1	1	1	—	1
P	48	—	12	16	14	23	32	31	27	19	48	27	7	1	1	1	—	1
Z	32	2	6	9	9	17	16	16	21	13	27	30	5	1	1	1	1	—
HV	18	5	6	8	10	12	9	12	8	10	7	5	13	2	—	—	—	—
TR	3	—	2	2	3	3	2	2	2	1	1	1	2	3	—	—	—	—
A	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
S	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—
W	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
U	7	4	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	3

Objaśnienia (Explanations): patrz tabela 5 (see table 5)

Większość wątrobowców badanej flory porasta różne typy siedlisk. Mniej jest gatunków, które preferują tylko jeden typ siedliska lub też jedno podłoże. Dość liczną grupę (15 gatunków) stanowią wątrobowce eurytopowe, rosnące na wielu podłożach. Zwykle są to rośliny pospolite lub bardzo częste (patrz też Rozdz. 6.3).

Siedliska epifityczne porasta mała, ale ekologicznie dobrze wyodrębniona grupa gatunków. Duże preferencje do tego siedliska wykazuje dziewięć gatunków, w tym

trzy są dla niego wyłączne. Epifity spotyka się ponadto na skałach, co jest uwarunkowane ich przystosowaniem do porostania twardego podłoża. Siedliska epifityczne najczęściej gatunków wspólnych mają z siedliskami naskalnymi, epiksylicznymi i naziemnymi w lasach.

Pod względem florystycznym dobrze wyróżniają się siedliska epiksyliczne. Rośnie na nich trzynaście gatunków o dużych preferencjach epiksylicznych, w tym dziewięć gatunków obligatoryjnych. W lasach obserwuje się częste przechodzenie gatunków epiksylicznych na ziemię i kamienie wystające z gleby. Z kolei butwiejące drewno w zaawansowanych stadiach rozkładu obficie zasiedlane jest przez naziemne gatunki leśne.

Stosunkowo liczna grupa wątrobowców rośnie na siedliskach naskalnych (70 gatunków). Są to głównie gatunki przechodzące na skały i kamienie z siedlisk naziemnych w lasach oraz z odkrytej gleby i z murszejącego drewna. Ponadto obserwuje się duże podobieństwo florystyczne między siedliskami naskalnymi i potokowymi (33 gatunki wspólne). Duże preferencje do siedlisk naskalnych wykazuje osiemnaście gatunków, z których dziewięć to wątrobowce obligatoryjne. Gatunki epifityczne rzadko przechodzą na inny typ podłoża. Najczęściej znajdowano je również na odkrytej glebie i na siedliskach potokowych.

Na obnażonej glebie, zwłaszcza na przydrożnych skarpach, nad potokami, na ścieżkach i ich poboczach, osuwiskach ziemnych na zboczach stwierdzono 53 gatunki wątrobowców, przy czym 14 z nich wykazuje tu swoje optimum ekologiczne. Pod względem składu florystycznego siedliska gleby mineralnej nawiązują do siedlisk naskalnych, naziemnych leśnych i potokowych oraz do siedlisk naziemnych w zbiorowiskach trawiastych.

W bardzo częstych tu siedliskach potokowych rośnie 48 gatunków z różnych grup ekologicznych, w tym osiem gatunków wykazuje duże preferencje do tej grupy siedlisk. Obserwuje się duże podobieństwo florystyczne siedlisk potokowych ze źródłiskowymi i ziołoroślowymi (27 gatunków wspólnych). Liczne wątrobowce mają w obu typach siedlisk swoje optima ekologiczne. Ponadto zwraca uwagę liczna grupa gatunków wspólnych z siedliskami naskalnymi, obnażonej gleby i naziemnymi w lasach.

Całkowicie odrębnym typem siedliska jest gleba na polach. Odnotowano stąd tylko siedem gatunków wątrobowców, z których cztery to gatunki wyłączne (obligatoryjne). Pozostałe trzy gatunki spotyka się ponadto na obnażonej glebie na skarpach.

6.2.2. Siedliska naskalne

Badany teren jest ubogi w odsłonięcia skalne. Największe powierzchnie nagich skał spotyka się w dolinach potoków. Właściwe formy skalne są bardzo rzadkie. Często natomiast spotyka się rumowiska skalne powstałe przez obrywy i ruchy osuwiskowe na stromych stokach bądź też powstałe w wyniku rozpadu blokowego. Zróżnicowanie petrograficzne jest tutaj niewielkie. Najpospolitszą i najbardziej

charakterystyczną skałą występującą na powierzchni są piaskowce magurskie. Ich ławice przekładane są często łupkami, których większe odsłonięcia spotyka się na stokach dolin potoków, na osuwiskach i obrywach.

Do siedlisk naskalnych zaliczono odkrywki i skały oraz głązy i kamienie wystające z gleby, nie pokryte warstwą humusu lub gleby. Ponadto zaliczono tu szczeliny i półki skalne pokryte warstwą zwietrzeliny. Pominięto natomiast siedliska naskalne w potokach, których flora zależy bezpośrednio od wody potokowej.

Skały. Na pionowych ścianach, półkach i w szczelinach skał piaskowcowych odnotowano 58 gatunków wątrobowców, z których 35 ma tylko jedno bądź dwa notowania na tym siedlisku. Główny zrząd flory naskalnej tworzą wątrobowce pospolite, eurytopowe: *Blepharostoma trichophyllum*, *Calypogeia azurea*, *Cephalozia bicuspidata*, *Lophozia ventricosa*, *Plagiochila porelloides*, *Scapania nemorea* i *Tritomaria exsecta*. Z gatunków typowo epilitycznych największy udział mają kolejno: *Lophozia sudetica*, *Lejeunea cavifolia*, *Metzgeria conjugata*, *Anastrophyllum minutum*, *Bazzania tricrenata*, *Scapania umbrosa*, *Jungermannia subelliptica* i *Lophozia collaris*.

Najbogatsza flora porasta skały wilgotne, osłonięte od osuszającego działania wiatru. Prawie zupełnie pozbawione wątrobowców są natomiast skały odsłonięte i suche. Rośnie na nich tylko trzynaście gatunków, z których częściej notowano: *Radula lindenbergiana*, *Tritomaria exsecta*, *T. quinquedentata*, *Barbilophozia attenuata*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Frullania tamarisci*, *Lejeunea cavifolia*, *Lophozia sudetica* i *Plagiochila porelloides*.

Specyficzna flora występuje na łupkach. Rosną tu mianowicie rzadkie na badanym terenie gatunki kalcyfilne, np. *Lophozia collaris*, *Preissia quadrata* i *Scapania aequiloba*. Skały piaskowcowe pokryte humusem i glebą, a położone w obrębie lasów, mają florę charakterystyczną dla leśnych siedlisk naziemnych. Najczęściej są to: *Lophocolea heterophylla*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Lophozia ventricosa*, *Plagiochila porelloides*, *Mylia taylorii*, *Anastrepta orcadensis*, *Barbilophozia hatcheri* i *B. lycopodioides*.

Pomimo dużego zróżnicowania gatunkowego, flora naskalna Beskidu Żywiecko-Orawskiego jest mało specyficzna i dość monotonna. Główny zrząd flory tworzą bowiem gatunki pospolite, wielopodłożowe. W składzie flory ponad 60% stanowią gatunki, które notowano sporadycznie na tym siedlisku. Wątrobowce typowo naskalne należą tutaj do gatunków rzadkich bądź bardzo rzadkich. Na taki obraz flory mają wpływ: słabe zróżnicowanie petrograficzne terenu, brak dużych kompleksów skalnych i znaczne przesuszenie występujących mas skalnych.

Kamienie wystające z gleby. Niewielkie głązy i kamienie śródleśne oraz miejsc otwartych pokryte są zwykle warstwą humusu. Ich flora swym składem nie odbiega od flory dna lasu lub zbiorowisk nieleśnych. Natomiast na kamieniach nie pokrytych glebą rozwijają się charakterystyczne zbiorowiska mszyste, w których dużą

rolę odgrywają wątrobowce. Na kamieniach i głazach śródleśnych najczęściej spotykane są darenki *Cephalozia bicuspidata* i dość często: *Blepharostoma trichophyllum*, *Tritomaria exsecta*, *Scapania umbrosa*, *S. nemorea* i *Lophozia sudetica*. Na kamieniach często rosną również gatunki mające optimum występowania na humusie (*Calypogeia azurea* i *Lophozia ventricosa*) i na butwiejącym drewnie (*Lophocolea heterophylla* i *Lepidozia reptans*).

Flora kamieni miejsc otwartych jest uboga. Najczęściej rosną tu *Cephalozia bicuspidata* i *Lophozia sudetica* oraz rzadziej *Calypogeia azurea*, *Jungermannia gracillima*, *Nardia scalaris* i *Tritomaria exsecta*.

6.2.3. Siedliska potokowe

Jedną z cech charakterystycznych potoków górskich jest zmienny poziom wody w ciągu roku, co wpływa na wykształcanie się pasowego układu roślinności (SZWEYKOWSKI 1951: 14).

Pas **euhydrobiontów**, znamienny dla wolno płynących potoków i obejmujący wątrobowce stale zanurzone w wodzie, jest słabo wykształcony w potokach badanych grup górskich. Stwierdzono tu tylko trzy gatunki: *Scapania undulata*, *Chiloscyphus polyanthos* (głównie odmiana reofilna *C. p. var. rivularis*) i *Scapania subalpina*.

W pasie **hydroamfibiontów** wątrobowce rosną na kamieniach w łóżyskach potoków, w bryzgach oraz na kamieniach i skałach będących przez większą część roku pod powierzchnią wody. Znaleziono tu 23 gatunki, z których panującymi są: *Scapania undulata*, *Chiloscyphus polyanthos*, *Plagiochila porelloides*, *Jungermannia pumila*, *J. obovata*, *Cephalozia lammersiana* i *Scapania subalpina*. W odcinkach potoków położonych w piętrze kosówki charakterystycznym wątrobowcem jest *Harpanthus flotovianus*.

Pas **geoamfibiontów** obejmuje roślinność zajmującą kamienie i skały sterczące przez większą część roku ponad wodą, okresowo zalewane, jak również roślinność brzegów niealuwalnych. Na siedliskach tych notowano 46 gatunków, należących do różnych grup ekologicznych. Wskazuje to na przejściowy i otwarty charakter omawianego siedliska. Najczęściej spotykano tu następujące gatunki: *Chiloscyphus polyanthos*, *Scapania undulata*, *Plagiochila porelloides*, *Conocephalum conicum*, *Pellia epiphylla*, *Jungermannia pumila*, *Pellia neesiana*, *Scapania nemorea*, *Chiloscyphus pallescens*.

W zbiorowiskach związanych z brzegami potoków często rosną leśne gatunki naziemne, jak: *Calypogeia azurea*, *Lophocolea bidentata* i *Plagiochila asplenoides*. Z kolei na mokrych, butwiejących kłodach znajdowano *Jungermannia leiantha* i *Cephalozia lunulifolia*. Gatunkami panującymi są jednak *Conocephalum conicum*, *Pellia epiphylla* i *P. neesiana*, które rosną również na kamieniach i na glebie.

Na siedliskach potokowych optimum swojego występowania ma osiem gatunków wątrobowców: *Chiloscyphus polyanthos*, *Conocephalum conicum*, *Jungermannia atrovirens*, *J. obovata*, *J. pumila*, *Plagiochila porelloides*, *Radula lindenbergiana* i *Scapania undulata*.

6.2.4. Siedliska epifityczne

Roślinność epifityczna grup Wielkiej Raczy i Pilska jest dość uboga. Bardzo mały jest również udział wątrobowców w budowie zbiorowisk epifitycznych. Najbogatszą florą porośłą charakteryzują się naturalne płaty buczyn, niegdyś panującej w reglu dolnym Beskidów. Eksploatacja lasów, związana z potrzebami przemysłu i budownictwa, doprowadziła do wyniszczenia pierwotnych biocenoz leśnych. W wyniku protegowania świerka w krajobrazie roślinnym Beskidów zaczęły dominować wtórne drzewostany świerkowe. Resztki naturalnych lasów ostały się tylko na małych powierzchniach, niemal wyłącznie w trudno dostępnych rejonach, gdzie nie istniały odpowiednie drogi wywozowe drewna. Tak prowadzona gospodarka leśna doprowadziła jednocześnie do poważnego zniszczenia epifitów, w tym epifitycznych wątrobowców.

Najbogatszą florę epifityczną wątrobowców znajdowano w fitocenozach żywej buczyny karpackiej. Najlepiej zachowane płaty tego zbiorowiska podlegają ochronie w rezerwatach „Śrubita”, na północnych stokach góry Bugaj, „Oszast”, na północnych stokach Oszusa i „Pod Rysianką”, na północno-zachodnich skłonach Trzech Kopców.

Na korze pni starych buków flora jest najbogatsza i najbardziej interesująca. Dominuje *Ptilidium pulcherrimum*, któremu towarzyszą *Metzgeria furcata*, *Frullania dilatata*, *Plagiochila porelloides*, *Lophozia longidens*, *Radula complanata*, *Frullania tamarisci*, *Lophocolea heterophylla* i inne (Tab. 7; Ryc. 11). Na pniach jaworów obserwuje się podobny zestaw gatunków, z tym że nieco częściej notowano *Radula complanata*, natomiast zupełnie wyjątkowo — *Plagiochila porelloides*, który dość często występuje na korze buków. Na uwagę zasługuje brak *Porella platyphylla*. Gatunek ten, obecnie bardzo rzadki na obszarze badań, znaleziono nie na drzewach, lecz na głazach piaszczystych w płatach buczyny karpackiej, na zboczach Lipowskiej i Romanki. Wątrobowce epifityczne występują ponadto na wolno stojących starych bukach, pozostałościach po pierwotnej Puszczy Karpackiej. Tutaj najczęściej rosną *Ptilidium pulcherrimum* i *Plagiochila porelloides*. Rzadko natomiast spotyka się gatunki typowo epifityczne, jak: *Frullania dilatata*, *Radula complanata* lub *Metzgeria furcata*. Wątrobowce te częściej występują na pniach wierzby kruchej, jesionu i jarzębiny, rosnących nad potokami w miejscach ocienionych i osłoniętych od wiatru.

W młodych drzewostanach bukowych flora epifityczna wątrobowców jest wyjątkowo uboga (por. MICKIEWICZ 1965: 10). Jedynym notowanym tu gatunkiem jest *Lophocolea heterophylla*. Odmienną i raczej przypadkową florą odznaczają się drzewa iglaste. Wątrobowce rosną przeważnie na stopie tych drzew, rzadziej na pniach. Na korze świerka i kosodrzewiny najczęściej występuje *Ptilidium pulcherrimum*. Ponadto częste są *Lophocolea heterophylla*, *Barbilophozia attenuata*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Lophozia ventricosa* i *Cephalozia biuspidata*, związane z innymi typami podłoża (Tab. 7).

Podstawę pni i stopę drzew zajmują głównie pospolite wątrobowce nieepifityczne, związane z wieloma podłożami. Dominują tutaj taksony przechodzące z bu-

Tabela 7 — Table 7

Flora epifityczna Beskidu Żywiecko-Orawskiego
Epiphytic flora of the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Gatunki wątrobowców Liverwort species	Liczba notowań na forofitach Number of records on phorophytes											
	Fs	Aps	Pa	Pm	Sf	Sa	Fe	Ai	Ag	Apl	Bp	Ug
<i>Ptilidium pulcherrimum</i>	32	11	25	4	1	4	—	1	1	1	1	1
<i>Lophocolea heterophylla</i>	17	9	6	3	1	—	—	1	—	—	—	—
<i>Metzgeria furcata</i>	18	9	1	—	4	2	1	—	—	—	—	—
<i>Blepharostoma trichophyllum</i>	6	4	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—
<i>Barbilophozia attenuata</i>	1	1	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Frullania dilatata</i>	5	2	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—
<i>Radula complanata</i>	2	4	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
<i>Lophozia longidens</i>	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
<i>Lophozia ventricosa</i>	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Tritomaria exsecta</i>	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Plagiochila porelloides</i>	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lepidozia reptans</i>	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cephalozia bicuspidata</i>	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cephalozia lunulifolia</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cephaloziella divaricata</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Frullania tamarisci</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Jamesoniella autumnalis</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Jungermannia leiantha</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lejeunea cavifolia</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Lophozia silvicola</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Porella baueri</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Barbilophozia lycopodioides</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Mylia taylorii</i>	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Łączna liczba gatunków Total number of species	19	10	10	7	5	4	3	2	1	1	1	1
Łączna liczba notowań Total number of records	110	44	51	18	9	8	6	2	1	1	1	1

Objaśnienia (Explanations): Fs — *Fagus sylvatica*; Aps — *Acer pseudoplatanus*; Pa — *Picea abies*; Pm — *Pinus mugo*; Sf — *Salix fragilis*; Sa — *Sorbus aucuparia*; Fe — *Fraxinus excelsior*; Ai — *Alnus incana*; Ag — *Alnus glutinosa*; Apl — *Acer platanoides*; Bp — *Betula pendula*; Ug — *Ulmus glabra*

Ryc. 11. Liczba gatunków wątrobowców epifitycznych notowanych na różnych gatunkach drzew
 Fig. 11. Number of epiphytic liverworts recorded on various tree species

wiejszego drewna, siedlisk naziemnych w zbiorowiskach leśnych, z kamieni i głazów wystających z gleby. Są to m.in. *Lophocolea heterophylla*, *Lepidozia reptans*, *Barbilophozia attenuata*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Lophozia ventricosa*, *Plagiochila porelloides* i *Cephalozia bicuspidata*. Z typowych epifitów częściej występuje *Ptilidium pulcherrimum*, natomiast bardzo rzadko — *Metzgeria furcata* i *Radula complanata*.

6.2.5. Siedliska butwiejącego drewna

Skład florystyczny siedlisk epiksylicznych jest zależny od rodzaju drewna i stopnia jego rozkładu oraz zmienia się w miarę postępującego procesu butwienia (HACKIEWICZ-DUBOWSKA 1936; REJMENT-GROCHOWSKA 1950; SZWEYKOWSKI 1953; LISOWSKI, KORNAŚ 1966). Rozpatrując siedliska epiksyliczne należy odróżnić florę występującą na powierzchni cięcia pniaków od flory kłód leżących na ziemi.

Odmienny jest bowiem proces butwienia pniaków i leżących kłód oraz inny jest sposób ich zarastania przez rośliny (por. REJMENT-GROCHOWSKA 1950; SZWEYKOWSKI 1953). W przypadku pniaków epiksylity umiejscawiają się przede wszystkim na powierzchni cięcia, w przypadku zaś kłód — na całej ich powierzchni.

W niniejszych badaniach zwrócono szczególną uwagę na florę epiksyliczną drewna świerkowego, ze względu na jego dominację na obszarze badań i dużą rolę wątrobowców w tej florz. Oceniając stopień zbutwienia drewna posłużono się skalą wprowadzoną przez HACKIEWICZ-DUBOWSKĄ (1936) i REJMENT-GROCHOWSKĄ (1950). Świeżo ścięte pniaki świerkowe (pierwszy stopień rozkładu) kolonizują *Lophocolea heterophylla* i *Ptilidium pulcherrimum*. Zarastają one brzegi powierzchni cięcia, przechodząc na nią z kory pokrywającej pniak z boków. W miarę rozkładu drewna (drugi stopień) osiedlają się inne wątrobowce, jak: *Cephalozia bicuspidata*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Lophozia ventricosa* i *Tritomaria exsecta*. W tej fazie jeszcze zdecydowanie dominuje *Lophocolea heterophylla*. Pniaki będące w trzecim i czwartym stopniu zbutwienia charakteryzują się już dużym udziałem wątrobowców typowo epiksylicznych; pojawiają się na przykład *Cephalozia lunulifolia*, *C. leucantha*, *Nowellia curvifolia*, *Lophozia longiflora* i *L. incisa*.

Skład flory zasiedlającej pniaki w trzecim i czwartym stopniu butwienia jest inny w środowiskach suchych i wilgotnych (Ryc. 12). W miejscach suchych przebieg sukcesji jest uproszczony. Na powierzchni cięcia i brzegach pniaka dominuje *Cephalozia bicuspidata*, natomiast subdominantami są *Cephalozia lunulifolia*, *Lophocolea heterophylla*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Lophozia ventricosa* i *Lepidozia reptans* oraz znacznie rzadziej *Lophozia longiflora*. Stopniowo zwiększając swój udział *Calypogeia azurea* i *C. integristipula*, które wraz z *Lepidozia reptans* panują na pniakach w piątym stopniu rozkładu. Bardzo często obserwowano pniaki, które w pierwszych stadiach butwienia są porośnięte jedynie przez *Lophocolea heterophylla*, a następnie są opanowywane przez *Lepidozia reptans* i mchy (głównie *Tetraphis pellucida*) bądź przez *Calypogeia azurea*. Pniaki zupełnie suche i oświetlone porośnięte są tylko przez mchy i porosty.

Bardziej złożony jest przebieg sukcesji na pniakach położonych w miejscach o dużej wilgotności powietrza, głównie w dolinach potoków (Ryc. 12). Tutaj spotyka się znacznie bogatszą florę epiksyliczną, z rzadkimi gatunkami. Na pniakach w trzecim i czwartym stopniu rozkładu dużą rolę odgrywają *Riccardia latifrons*, *Lophozia incisa*, *Calypogeia suecica*, *Cephalozia lunulifolia*, *Jungermannia leiantha*, *Cephalozia leucantha*, *Scapania umbrosa* i *Tritomaria exsecta*. Na pniach w piątym stopniu rozkładu dominują *Lepidozia reptans* i *Calypogeia azurea*. Gatunki te wraz z mchami zajmują zwykle całą powierzchnię zbutwiałego pnia. Z mchów najczęściej występują *Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum* i *Tetraphis pellucida*. W miejscach mokrych, na brzegach potoków, pniaki w tym stadium zajęte są całkowicie przez *Mylia taylorii*.

Flora murszejących kłód świerkowych nie odbiega swym składem od flory pniaków. Kłody pozbawione kory początkowo zasiedlane są przez *Lophocolea heterophylla* i *Cephalozia bicuspidata*; nie notowano natomiast *Ptilidium pulcherrimum*. Następne fazy sukcesji przebiegają nieco odmiennie dla kłód suchych

Ryc. 12. Przebieg sukcesji wątrobowców na pniakach świerkowych
Fig. 12. The course of liverworts succession on spruce stumps

i wilgotnych. Na kłodach suchych, w dalszych stadiach butwienia pojawiają się: *Lepidozia reptans*, *Calypogeia azurea*, *Cephalozia lunulifolia*, *Lophozia longiflora*, *Scapania umbrosa* i *Lophozia ventricosa*. Rośliny te pozostają do całkowitej humifikacji kłody. Obserwuje się również kłody porośnięte wyłącznie mchami i porostami bądź takie na których panuje jedynie *Cephalozia bicuspidata* lub *Lepidozia reptans*. Znacznie bogatszą florę mają wilgotne bądź mokre kłody leżące zwykle na brzegach potoków. Na kłodach w drugim, trzecim lub czwartym stopniu rozkładu rosną: *Jungermannia leiantha*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Cephalozia lunulifolia*, *Scapania umbrosa*, *Calypogeia suecica*, *Lophozia incisa*, *Tritomaria exsecta*, *Cephalozia leucantha*, *Jamesoniella autumnalis*, *Lophozia ascendens*, *Riccardia latifrons*, *Cephalozia catenulata*, *Harpanthus scutatus*, *Riccardia palmata* i *Nowellia curvifolia*. Na kłodach silnie rozłożonych (stopień czwarty i piąty) zwykle dominuje *Mylia taylorii*.

Przebieg sukcesji na butwiejącym drewnie w badanych grupach górskich zależy zatem w dużym stopniu od stosunków wilgotnościowych. W środowisku o dużej wilgotności procesy te są bardziej złożone i przebiegają podobnie jak w Beskidzie Śląskim (REJMENT-GROCHOWSKA 1950). Z kolei w miejscach suchych sukcesja jest uproszczona. Na zjawisko to zwrócił uwagę SZWEYKOWSKI (1953) badając florę epiksyliczną Gór Stołowych. Ogólny przebieg sukcesji na butwiejącym drewnie w grupach Wielkiej Raczy i Pilska jest podobny do sukcesji obserwowanych w innych rejonach górskich Polski. W procesie tym następuje dość szybka zmiana charakteru ekologicznego gatunków zasiedlających po sobie butwiejące drewno. Początkowo, w stadium inicjalnym sukcesji, przeważają gatunki o cechach epifitów, by w stadium optymalnym ustąpić miejsca gatunkom typowo epiksylicznym. W końcowych fazach sukcesji (stadium terminalne) przeważają gatunki humusolubne, rosnące bardzo często w runie lasów.

6.2.6. Siedliska obnażonej gleby

Obnażona, mineralna gleba skarp przydrożnych, dróg i ścieżek, rowów oraz osuwisk na zboczach dolin potoków stwarza dogodne warunki dla rozwoju wielu gatunków wątrobowców. Wraz z mchami tworzą one zbiorowiska pionierskie i odgrywają ważną rolę w inicjowaniu sukcesji.

Na nowo powstałych, wysokich i stromych skarpach, po których obsuwa się ziemia, masowo występują *Cephalozia bicuspidata* i *Nardia scalaris*. Towarzyszą im *Jungermannia gracillima* i rzadziej *Scapania curta*, *S. irrigua* oraz *Pellia neesiana*. W miejscach bardziej wilgotnych rośnie *Cephalozia lammersiana*. Charakterystycznymi, choć rzadkimi wątrobowcami takich miejsc są również: *Jungermannia hyalina*, *Lophozia excisa*, *Marsupella funckii* i *Nardia geoscyphus*. Na niewysokich, świeżych skarpach w piętrze kosówki rosną ponadto *Jungermannia confertissima* i *J. sphaerocarpa*.

Skarpy starsze, z namywami humusowymi masowo porasta *Pellia epiphylla*. Zwarte plechy tego wątrobowca tworzą duże, rosnące blisko siebie darnie, pokrywające nieraz całą szerokość skarpy i ciągnące się na kilka metrów. Pomiedzy plechami *Pellia* występują darenki *Cephalozia bicuspidata*, *Nardia scalaris* i *Scapania curta*. To bardzo charakterystyczne zbiorowisko rozwija się na skarpach ocienionych, położonych w obrębie zbiorowisk leśnych, głównie w borach świerkowych. Zupełnie inną florę mają skarpy z wytworzoną już warstwą gleby oraz takie, na które z góry osunęła się gleba humusowa. Na takich siedliskach rosną przede wszystkim: *Calypogeia azurea*, *Lophozia ventricosa*, *Lepidozia reptans*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Calypogeia integristipula*, *Cephalozia bicuspidata* i *Tritomaria exsecta*.

Ubogą florę mają skarpy częściowo zadarnione, położone w miejscach odkrytych. Spotyka się tu *Lophocolea bidentata* i *Cephaloziella divaricata*, a na siedliskach ocienionych — *Plagiochila asplenioides*.

Na powierzchniach dróg i ścieżek, przeważnie w lasach, najczęściej rosną: *Cephalozia bicuspidata*, *Jungermannia gracillima* oraz rzadziej *Nardia scalaris*. Ścieżki mniej uczęszczane porasta roślinność dna lasu, m.in. *Calypogeia azurea*, *Cephalozia bicuspidata*, *Lepidozia reptans* i *Lophocolea heterophylla*. W miejscach wilgotnych i zacienionych mało uczęszczane i słabo wydeptywane ścieżki całkowicie opanowuje *Pellia epiphylla*.

6.2.7. Spaleniska

Spaleniska są specyficznymi siedliskami, porastanymi przez charakterystyczny zestaw gatunków mszaków. Spośród wątrobowców rośnie tylko *Marchantia polymorpha*. Mimo, że na obszarze badań bardzo często spotykano spaleniska, to tylko na dwóch z nich notowano ten wątrobowiec. Towarzyszyły mu mchy: *Bryum argenteum*, *B. caespitium*, *Brachythecium velutinum*, *Ceratodon purpureus* i *Funaria hygrometrica*. Plechy porostnicy dominują w zbiorowisku i pokryte są licznymi miseczkami z rozmnożkami.

6.2.8. Siedliska naziemne w zbiorowiskach nieleśnych

Borówczyska. Borówczyska są zbiorowiskami krzewinkowymi należącymi do klasy *Vaccinio-Piceetea*. Pokrywają one otwarte przestrzenie w najwyższych położeniach górskich. Na badanym terenie występują dwa zespoły borówczysk, czernicowe *Vaccinietum myrtilli* i bażynowe *Empetro-Vaccinietum*.

Borówczyska czernicowe są tutaj dość częste, ale wyjątkowo ubogie w wątrobowce. Bardzo rzadko rosną w nich jedynie najbardziej pospolite gatunki, np. *Cephalozia bicuspidata*, *Lophocolea heterophylla* i *Lophozia ventricosa*.

Borówczysko bażynowe występuje jedynie na Pilsku, w piętrze subalpejskim, gdzie wykształca się w dwóch podzespółach: torfowcowym *E.-V. sphagnetosum*

i płożnikowym *E.-V. polytrichetosum stricti*. W fitocenozach torfowcowych rośnie *Calypogeia neesiana* i *Mylia anomala*, a na kwaśnym humusie, w fitocenozach płożnikowych — jedynie *Cephalozia connivens*, *Lophozia obtusa*, *Ptilidium ciliare* i *Scapania parvifolia*. Ponadto znaleziono tu jeszcze następujące gatunki: *Anastrepta orcadensis*, *Barbilophozia floerkei*, *Calypogeia integristipula*, *C. azurea*, *Cephalozia bicuspidata*, *Lophozia ventricosa*, *L. wenzelii*, *Tritomaria exsecta* oraz rzadziej *Barbilophozia attenuata*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Calypogeia neesiana* i *Tritomaria quinquedentata*. Ze względu na obecność wielu rzadkich, wysokogórskich wątrobowców, borówczysko bażynowe należy do najciekawszych zbiorowisk Beskidu Żywiecko-Orawskiego.

Źródlika i ziołorośla. Większość źródeł omawianego terenu ma charakter spływów powierzchniowych po stokach, które następnie tworzą małe strumyki łączące się w potok. W miejscach tych bujnie rozwijają się *Cardamine amara*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Petasites albus*, *Stellaria nemorum* bądź *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *C. laeta*, *Chaerophyllum hirsutum* i inne. Równie bujnie rozwijają się w tych miejscach wątrobowce, wśród których największy udział posiadają: *Chiloscyphus pallescens*, *C. polyanthos*, *Conocephalum conicum* i *Pellia endiviifolia*. Na mokrym humusie na obrzeżach źródeł spotyka się *Lophocolea bidentata*, *Jungermannia leiantha*, *Pellia epiphylla*, *Plagiochila asplenoides*, *Lophocolea cuspidata* i inne.

W miejscach otwartych, zwykle na halach, występują źródelka, wokół których rozwijają się zespoły z klasy *Montio-Cardaminetea*. Bardzo interesującą florę mają także zbiorowiska występujące na Hali Cebula. Tutaj notowano rzadkie i bardzo rzadkie w Beskidach gatunki: *Aneura pinguis*, *Lophozia bantriensis*, *Riccardia multifida*, *Scapania helvetica* i *S. paludosa*. Interesującą florę mają również zbiorowiska źródliskowe w piętrze subalpejskim, na północnych i północno-wschodnich stokach Pilska. W ich płatach rosną takie rzadkości jak *Harpanthus flotovianus* i *Scapania subalpina*.

Wzdłuż potoków i na dnie dolin częste są zbiorowiska ziołoroślowe. Najbardziej rozpowszechnionym jest tu zespół *Petasitetum albi*. Rzadziej spotyka się płaty *Chaerophylletum hirsuti* i *Aconitetum firmi*. Podobnie, jak w przypadku źródeł licznie występują tutaj *Calypogeia azurea*, *Cephalozia lammersiana*, *Chiloscyphus pallescens*, *Conocephalum conicum*, *Lophocolea bidentata*, *Pellia endiviifolia* i *P. neesiana*.

Łąki, pastwiska, murawy. Omawiana grupa zbiorowisk wykazuje duże zróżnicowanie pod względem warunków wodnych i stosunków fitosocjologicznych, ale charakteryzuje się dużym ubóstwem flory wątrobowców.

Na zadarnionych skarpach i przydrożach najczęściej występującym gatunkiem jest *Lophocolea bidentata*. W miejscach wilgotniejszych spotyka się *Calypogeia azurea*, *Cephalozia bicuspidata*, *Lophozia ventricosa* i *Plagiochila asplenoides* oraz gatunki zbiorowisk pionierskich, rosnących na odkrytej glebie: *Diplophyllum obtusifolium*, *Jungermannia gracillima*, *Nardia scalaris*, *Scapania irrigua* oraz

bardzo rzadko *Marsupella funckii* i *Scapania mucronata*. Na północnych stokach Pilska, przy granicy lasu notowano również *Anastrepta orcadensis*, *Barbilophozia hatcheri*, *B. floerkei* i *Pellia neesiana*. W zbiorowiskach łąkowych (związek *Arrhenatherion elatioris*) notowano pięć gatunków: *Lophocolea bidentata*, *L. cuspidata*, *Marchantia polymorpha*, *Pellia endiviifolia* i *P. epiphylla*. Natomiast w płatach rozpowszechnionych tu łąk bliźniczkowych (związek *Eu-Nardion*) znaleziono tylko jeden raz wypłnione okazy *Cephalozia bicuspidata*.

Torfowiska i zatorfienia. Typowych torfowisk w grupach Wielkiej Raczy i Pilska jest brak. Jedyne na wierzchołku Lipowskiej rozwijają się niewielkie płaty zbiorowiska nawiązującego składem florystycznym do fitocenoz ze związku *Sphagnion magellanici*. Liczne są natomiast lokalne zatorfienia w obniżeniach terenu, w których dominują torfowce. Z wątrobowców notowano w takich miejscach jedynie *Calypogeia neesiana*, *Lophozia incisa* i *L. ventricosa*.

Żwirowiska i kamieńce nadrzeczne. Dobrze rozwinięte zbiorowiska żwirowiskowe występują w dolnych biegach większych potoków (Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Rycerka, Żabnica) oraz na brzegach rzek (Ujsola, Soła, Krzyżówka). W zbiorowiskach tych wątrobowce nie występują. Tylko na jednym stanowisku notowano *Pellia endiviifolia*.

Brzegi wód stojących. Na badanym terenie brak jest większych zbiorników z wodą stojącą. Rzadko spotyka się większe zagłębienia bądź doły wypełnione wodą. Brzegi tych niewielkich zbiorników porośnięte są przez *Juncus effusus*, *Scirpus sylvaticus*, rzadziej – *Eleocharis palustris*. W zbiorowiskach tych występują tylko *Aneura pinguis* i *Marchantia aquatica*.

Polą. Na obszarze Beskidu Żywiecko-Orawskiego pola zajmują duże powierzchnie, zwłaszcza w piętrze pogórza i dolnej części regła dolnego. Kraina uprawy rozciąga się tutaj od podnóży do około 900 m n.p.m. Na polach roślin okopowych i zbóż oraz na ścierniskach rozwijają się charakterystyczne zbiorowiska mszaków, w których dużą rolę odgrywają fotofilne, efemeryczne wątrobowce: *Anthoceros punctatus*, *Fossombronia wondraczekii*, *Phaeoceros laevis*, *Riccia glauca* i *R. sorocarpa*. Rzadziej pojawiają się gatunki wieloletnie, tj. *Blasia pusilla* i *Jungermannia gracillima*. Wymienione wątrobowce, oprócz dwóch ostatnich, występują maksymalnie do wysokości 870 m n.p.m. Na najwyżej położonych polach (przysiółek Przegibek, 900 m) gatunki te nie były notowane.

6.2.9. Siedliska naziemne w zbiorowiskach leśnych i zaroślach kosodrzewiny

Wątrobowce odgrywają na ogół małą rolę w budowie warstwy mszystej zbiorowisk leśnych rosnących w grupach Wielkiej Raczy i Pilska. Największy ich udział zaznacza się w górnoreglowym borze świerkowym *Plagiothecio-Piceetum tatricum*.

Płaty tego zbiorowiska położone są w najwyższych rejonach Lipowskiej, Rysianki, Romanki, Trzech Kopców i Pilska. Tutaj spotyka się między innymi wątrobowce charakterystyczne dla klasy *Vaccinio-Piceetea* i związku *Vaccinio-Piceion*, tj. odpowiednio *Barbilophozia lycopodioides* i *B. floerkei*. Gatunki te występują jednak sporadycznie i z małym pokryciem. W warstwie przyziemnej boru, głównie na ściółce iglastej spotyka się również: *Calypogeia azurea*, *Cephalozia bicuspidata*, *Lophocolea heterophylla*, *Lepidozia reptans*, *Lophozia ventricosa*, *Calypogeia integristipula*, *Tritomaria quinquedentata* i *Anastrepta orchadensis*. Na odkrytym, kwaśnym humusie rosną: *Blepharostoma trichophyllum*, *Calypogeia neesiana*, *Mylia taylorii*, *Lophozia sudetica* i *Barbilophozia hatcheri*.

Na obszarze Beskidu Żywiecko-Orawskiego dominującym typem zbiorowiska leśnego jest sztuczna świerczyna. W jej fitocenozach warstwa przyziemna jest słabo rozwinięta i pozbawiona wątrobowców. W wielu miejscach płaty świerczyn nawiązują składem florystycznym i strukturą do dolnoregłowego boru jodłowo-świerkowego *Abieti-Piceetum montanum*. W warstwie mszystej takich płatów pojawiają się *Barbilophozia barbata*, *Bazzania trilobata*, *Calypogeia azurea*, *Cephalozia bicuspidata*, *Jamesoniella autumnalis*, *Lepidozia reptans*, *Lophocolea bidentata*, *L. heterophylla*, *Plagiochila asplenoides* (w miejscach wilgotnych) i inne. W płatach sztucznych świerczyn często spotyka się odkryty humus i miejsca po zerwanej ściółce. Powierzchnie te masowo porastane są przez *Calypogeia azurea*, *Cephalozia bicuspidata*, *Lepidozia reptans* i *Lophozia ventricosa*. Z kolei wokół podstawy pni świerków często rosną *Blepharostoma trichophyllum*, *Lepidozia reptans*, *Lophocolea heterophylla* i rzadziej *Barbilophozia attenuata*.

Warstwa mszysta zarośli kosodrzewiny jest uboga w wątrobowce. Sporadycznie rośnie tutaj tylko kilka gatunków: *Calypogeia integristipula*, *C. neesiana*, *Cephalozia bicuspidata*, *C. lunulifolia*, *Lophocolea heterophylla*, *Lophozia ventricosa* i inne.

Lasy bukowe, coraz radsze na badanym terenie, mają w warstwie mszystej niewiele gatunków wątrobowców. Rosną one zwykle wokół pni drzew i nie pokrywają dużych powierzchni. Na siedliskach naziemnych w buczynach najczęściej notowano *Calypogeia azurea*, sporadycznie zaś *Cephalozia bicuspidata*, *Lepidozia reptans*, *Lophocolea bidentata*, *L. heterophylla*, *Pellia endiviifolia*, *P. epiphylla*, *Plagiochila asplenoides* i *P. porelloides*.

6.3. Preferencje siedliskowe wątrobowców

Na podstawie analizy wymagań siedliskowych poszczególnych gatunków, stopnia ich rozpowszechnienia i przywiązania do określonych siedlisk, we florze Beskidu Żywiecko-Orawskiego wyróżniono trzynaście grup siedliskowych wątrobowców. Głównym kryterium podziału były preferencje siedliskowe gatunków wyrażone liczbą notowań na poszczególnych siedliskach, których klasyfikację podano w rozdziale 6.1. W przypadku gatunków bardzo rzadkich (1–3 notowania), o zaliczeniu do określonej grupy decydowało wystąpienie w danym typie siedliska. Procedurę

klasyfikacyjną przyjęto za opracowaniem SZMAJDY (1981), dotyczącym ekologicznych aspektów rozmieszczenia mchów w Górach Stołowych.

Tabela 8 — Table 8

Grupy siedliskowe wątrobowców w Beskidzie Żywiecko-Orawskim
Habitat groups of the liverworts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Nr No.	Grupa siedliskowa Habitat group	Liczba gatunków Number of species	Liczba gatunków wyłącznych Number of exclusive species	Liczba gatunków przechodzących Number of transition species
I	Wątrobowce wielopodłożowe Ubiquitous liverworts	15	—	—
II	Wątrobowce epilityczne Epilithic liverworts	19	4	15
III	Wątrobowce obnażonej gleby Bare soil liverworts	14	5	9
IV	Wątrobowce epiksyliczne Epixylic liverworts	13	9	4
V	Naziemne wątrobowce zbiorowisk leśnych i nieleśnych Forest and non-forest humicoles	10	1	9
VI	Wątrobowce epifityczne Epiphytic liverworts	9	3	6
VII	Wątrobowce potokowe Torrent liverworts	8	—	8
VIII	Wątrobowce potoków oraz ziołorośli i źródlisk Liverworts of torrents, mires and springs	5	3	2
IX	Wątrobowce ziołorośli i źródlisk Liverworts of mires and springs	6	2	4
X	Wątrobowce pól uprawnych Liverworts of arable fields	6	4	2
XI	Wątrobowce borówczysk Liverworts of <i>Vaccinium myrtillus</i> heaths	5	5	—
XII	Wątrobowce potokowe, naskalne i ob- nażonej gleby Torrent, epilithic and bare soil liverworts	2	2	—
XIII	Wątrobowce wód stojących Liverworts of stagnant waters	1	1	—
	Razem Total	113	39	74

Zdecydowaną większość gatunków udało się zaliczyć do jednej z wyróżnionych grup siedliskowych. W przypadku piętnastu gatunków uznano, że należą one do wątrobowców eurytopowych (wielopodłożowych). W obrębie większości wyróżnionych grup siedliskowych wydzielono gatunki wyłączne (obligatoryjne) i gatunki przechodzące (fakultatywne). Postąpiono tak ze względu na różny stopień przywiązania wątrobowców do danych siedlisk, jak również ich szerszą skalę ekologiczną.

Flora wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego cechuje się dużym udziałem gatunków epilitycznych, wielopodłożowych, naziemnych w zbiorowiskach pionierskich, epiksylicznych i naziemnych leśnych. Mniejszy jest udział wątrobowców epifitycznych, potokowych, pól uprawnych, borówczysk oraz źródlisk i ziołorośli (Tab. 8). Zróżnicowanie ekologiczne wątrobowców badanego terenu zasadniczo nie odbiega od danych uzyskanych w innych górskich regionach kraju (por. KOŁA 1972, 1990).

Niżej przedstawiono grupy siedliskowe wątrobowców. W wykazie tym skróty oznaczają typy siedlisk (patrz Rozdz. 6.1). Dla gatunków przechodzących podano kombinacje zajmowanych przez nie siedlisk. W przypadku każdej kombinacji, typy siedlisk uporządkowano według malejącej liczby notowań gatunku na danym siedlisku.

I. Wątrobowce wielopodłożowe (łącznie 15 gatunków)

1. Gatunki z optimum występowania na siedliskach epifitycznych (K-KH): *Barbilophozia attenuata*.

2. Gatunki preferujące siedliska naskalne (N-NH): *Scapania nemorea*, *Tritomaria exsecta*.

3. Gatunki z optimum występowania na siedliskach epiksyliczno-epilitycznych (D-N-NH): *Blepharostoma trichophyllum*, *Cephalozia bicuspidata*.

4. Gatunki z optimum występowania na murszejącym drewnie (D): *Lepidozia reptans*.

5. Gatunki wielopodłożowe, rosnące najczęściej na siedliskach epiksyliczno-epifitycznych (D-K-KH): *Lophocolea heterophylla*.

6. Gatunki preferujące siedliska naziemne w zbiorowiskach leśnych i nieleśnych (H-T): *Calypogeia azurea*, *Lophocolea bidentata*.

7. Gatunki wielopodłożowe, bez określonych preferencji siedliskowych: *Calypogeia muelleriana*, *Lophocolea cuspidata*, *Lophozia ventricosa*, *Pellia endiviifolia*, *Plagiochila asplenoides*, *Plagiochila porelloides*.

II. Wątrobowce epilityczne (19 gatunków)

A. Obligatoryjne: *Anastrophyllum minutum*, *Bazzania tricrenata*, *Diplophyllum taxifolium* i *Tritomaria exsectiformis*.

B. Przechodzące (15 gatunków):

1. Gatunki przechodzące na siedliska potokowe (rzadziej na siedliska naziemne w zbiorowiskach trawiastych) {N-NH-[P-(T)]}: *Diplophyllum obtusifolium*, *Lophozia collaris*, *Marsupella sprucei*, *Metzgeria conjugata*, *Porella platyphylla* i *Preissia quadrata*.

2. Wątrobowce przechodzące na siedliska potokowe i mineralną glebę {N-[P-M-(T)]}: *Jungermannia subelliptica*.

3. Wątrobowce przechodzące na mineralną glebę [N-NH-(M)]: *Diplophyllum albicans*, *Lophozia heterocolpos*, *Scapania aequiloba*, *S. mucronata*.

4. Wątrobowce epilityczno-epifityczne z optimum występowania na siedliskach naskalnych (N-NH-P-K-KH): *Lejeunea cavifolia*.

5. Wątrobowce naskalne przechodzące na różne siedliska: *Geocalyx graveolens* (N-NH), *Lophozia sudetica* [NH-N-(H-P-M-T)], *Scapania umbrosa* [NH-N-(D-P-KH-H-M)].

III. Wątrobowce obnażonej, mineralnej gleby (14 gatunków)

A. Obligatoryjne: *Cephaloziella rubella*, *Jungermannia hyalina*, *Lophozia excisa*, *Nardia geoscyphus*, *Scapania lingulata*.

B. Przechodzące (9 gatunków):

1. Gatunki przechodzące na siedliska naskalne [M-(N-NH)]: *Scapania curta*.

2. Gatunki przechodzące na siedliska naskalne i naziemne w zbiorowiskach trawiastych (rzadziej inne) {M-[N-NH-T-(P-Z-V)]}: *Jungermannia gracillima*, *Scapania irrigua*, *Marsupella funckii*, *Nardia scalaris*.

3. Gatunki przechodzące na różne siedliska: *Cephalozia lammersiana* [M-(P-H-Z-N)], *Cephaloziella divaricata* [M-(K-NH)], *C. hampeana* [M-(D)], *Pellia epiphylla* [M-(P-H-Z-NH-T)].

IV. Wątrobowce epiksyliczne (13 gatunków)

A. Obligatoryjne: *Calypogeia suecica*, *Cephalozia catenulata*, *C. leucantha*, *Harpanthus scutatus*, *Lophozia ascendens*, *L. longiflora*, *Nowellia curvifolia*, *Riccardia latifrons*, *R. palmata*.

B. Przechodzące: *Cephalozia lunulifolia* [D-(H-KH-K-NH-P)], *Jungermannia leiantha* [D-(P-NH-Z-W-K)], *Lophozia incisa* [D-(NH-N-TR-K-KH-H-M)], *Mylia taylorii* [D-(H-NH-N-K-KH)].

V. Wątrobowce epigeiczne leśne, zarośli kosodrzewiny i borówczysk (10 gatunków)

A. Obligatoryjne — tylko wyjątkowo przechodzące na inne siedliska: *Bazzania trilobata* [H-(N-D)].

B. Przechodzące:

1. Gatunki przechodzące głównie na siedliska naskalne (na kamienie wystające z gleby), rzadziej na inne siedliska {H-HV-[NH-N-(M-T-P-K-KH-D)]}: *Anastrepta orcadensis*, *Barbilophozia barbata*, *B. floerkei*, *B. hatcheri*, *B. lycopodioides*, *Tritomaria quinquedentata*.

2. Gatunki przechodzące głównie na butwiejące drewno, rzadziej na inne siedliska {H-HV-[D-(K-KH-N-NH-M-T-TR)]}: *Calypogeia neesiana*, *Calypogeia integristipula*, *Jamesoniella autumnalis*.

VI. Wątrobowce epifityczne (9 gatunków)

A. Wyłączne: *Anastrophyllum hellerianum* (znaleziony u podstawy pnia świerka, na zewnętrznych, zmurszałych partiach kory; w Polsce gatunek związany z butwiejącym drewnem), *Frullania dilatata*, *Porella baueri*.

B. Przechodzące:

1. Wątrobowce epifityczno-epilityczne [K-KH-N-NH-(P)]: *Frullania tamarisci*, *Lophozia silvicola*, *Lophozia longidens*, *Metzgeria furcata*, *Radula complanata*.
2. Wątrobowce epifityczno-epiksyliczne [K-KH-D-(H-N)]: *Ptilidium pulcherrimum*.

VII. Wątrobowce potokowe (8 gatunków)

1. Gatunki przechodzące na siedliska naziemne w zbiorowiskach ziołoroślowych i źródliskowych oraz na siedliska naskalne [P-(Z-N-NH)]: *Chiloscyphus polyanthos*, *Conocephalum conicum*, *Jungermannia atrovirens*, *J. obovata*, *J. pumila*, *Radula lindenbergiana*, *Scapania undulata*.
2. Gatunki przechodzące na inne siedliska [P-(S-M-T-Z)]: *Marchantia polymorpha*.

VIII. Wątrobowce potoków oraz ziołorośli i źródlisk (5 gatunków)

- A. Obligatoryjne: *Harpanthus flotovianus*, *Riccardia multifida*, *Scapania subalpina*.
- B. Przechodzące: *Lophozia bantriensis* [P-Z-(NH)], *Pellia neesiana* [Z-P-(M-H-T)].

IX. Wątrobowce ziołorośli i źródlisk (6 gatunków)

- A. Wyłączne: *Scapania paludosa*, *Trichocolea tomentella*.
- B. Przechodzące: *Aneura pinguis* [Z-(M-W)], *Chiloscyphus pallescens* [Z-(P-M-H)], *Lophozia wenzelii* [Z-(N-HV)], *Scapania helvetica* [Z-(N-M)].

X. Wątrobowce pól uprawnych (6 gatunków)

- A. Obligatoryjne: *Anthoceros punctatus*, *Phaeoceros laevis*, *Riccia glauca*, *Riccia sorocarpa*.
- B. Przechodzące na mineralną glebę skarp [U-(M)]: *Blasia pusilla*, *Fossombronion wondraczekii*.

XI. Wątrobowce borówczysk bażynowych [HV], rosnące na kwaśnym humusie; wszystkie obligatoryjne: *Cephalozia connivens*, *Lophozia obtusa*, *Mylia anomala*, *Ptilidium ciliare*, *Scapania parvifolia*.

XII. Wątrobowce potoków, skał i odkrytej gleby [N-NH-P-M]; obligatoryjne: *Jungermannia confertissima*, *J. sphaerocarpa*.

XIII. Wątrobowce wodne [W]: *Marchantia aquatica*.

7.1. Rozmieszczenie wątrobowców w 100-metrowych pasach wysokościowych

Analiza pionowego rozmieszczenia stanowisk wątrobowców w 100-metrowych pasach wysokościowych wskazuje, że wraz ze zmianą wysokości nad poziom morza zmienia się również liczba gatunków i struktura flory. Początkowo ogólna liczba gatunków wzrasta i w pasie wysokościowym 700–799 m n.p.m. osiąga największą wartość. W następnych pasach (800–1000 m) maleje (minimum w pasie 1000–1099 m), po czym znowu wzrasta i dominuje w pasie 1200–1299 m n.p.m. W najwyższych rejonach, od 1300 m wzwyż, ogólna liczba gatunków gwałtownie maleje (Tab. 9; Ryc. 13). Dynamikę zmian liczby stanowisk gatunków przedstawia tabela 10 i rycina 13, a rozmieszczenie stanowisk poszczególnych gatunków w pasach wysokościowych zawiera tabela 11. Początkowo łączna liczba stanowisk gwałtownie rośnie i w pasie 700–799 m osiąga maksimum, po czym stopniowo maleje aż do najwyższych partii piętra subalpejskiego. Wynika z tego, że w Beskidzie Żywiecko-Orawskim największe bogactwo i różnorodność flory wątrobowców występuje w pasie wysokościowym 700–799 m n.p.m., tj. w dolnej części regla dolnego.

Tabela 9 — Table 9

Udział gatunków wątrobowców w 100-metrowych pasach wysokościowych w Beskidzie Żywiecko-Orawskim

Proportion of liverwort species in the 100-metre altitude belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Pasy wysokościowe Altitudinal belts	Liczba gatunków Number of species			
	łącznie total	górkich mountain	niżowo-górkich lowland-mountain	niżowych lowland
400–499	23	5 (21,7%)	13 (56,6%)	5 (21,7%)
500–599	46	19 (41,3)	21 (45,7)	6 (13,0)
600–699	62	32 (51,6)	24 (38,7)	6 (9,7)
700–799	68	41 (60,3)	24 (35,3)	3 (4,4)
800–899	66	40 (60,6)	25 (37,9)	1 (1,5)
900–999	51	37 (72,5)	14 (27,5)	0
1000–1099	48	30 (62,5)	18 (37,5)	0
1100–1199	63	41 (65,1)	22 (24,9)	0
1200–1299	66	46 (69,7)	20 (30,3)	0
1300–1399	48	36 (75,0)	12 (25,0)	0
1400–1499	38	28 (73,7)	10 (26,3)	0
1500–1534	16	12 (75,0)	4 (25,0)	0
Razem Total	113	71 (62,8%)	35 (31,0%)	7 (6,2%)

Udział stanowisk gatunków wątrobowców w 100-metrowych pasach wysokościowych w Beskidzie Żywiecko-Orawskim

Proportion of collection sites liverwort species in the 100-metre altitude belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Pasy wysokościowe Altitudinal belts	Liczba stanowisk gatunków Number of collection sites of species			
	łącznie total	górkich mountain	niżowo-górkich lowland-mountain	niżowych lowland
400—499	36	7 (19,4%)	23 (63,9%)	6 (16,7%)
500—599	161	56 (34,8)	85 (52,8)	20 (12,4)
600—699	402	174 (43,3)	203 (50,5)	25 (6,2)
700—799	417	212 (50,8)	200 (48,0)	5 (1,2)
800—899	347	179 (51,6)	166 (47,8)	2 (0,6)
900—999	318	172 (54,1)	146 (45,9)	0
1000—1099	256	121 (47,3)	135 (52,7)	0
1100—1199	257	139 (54,1)	118 (45,9)	0
1200—1299	263	172 (65,4)	91 (34,6)	0
1300—1399	201	131 (65,2)	70 (34,8)	0
1400—1499	121	80 (66,1)	41 (33,9)	0
1500—1534	21	14 (66,7)	7 (33,3)	0
Razem Total	2800	1457 (52,0%)	1285 (45,9%)	58 (2,1%)

Dynamika zmian bogactwa flory wątrobowców wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza, w Beskidzie Żywieckim przebiega podobnie jak w innych pasmach górskich, np. w Górach Białskich (KOŁA 1972) i Beskidzie Sądeckim (MAMCZARZ 1977). Również w Tatrach, wraz ze wzrostem wysokości rośnie liczba gatunków wątrobowców (J. SZWEYKOWSKI, inf. ustna). Obraz tych zmian jest inny niż w przypadku roślin naczyniowych. BIAŁECKA (1982), badając florę roślin naczyniowych grupy Pilska wykazała, że flora ubożeje wraz ze wzrostem wysokości; największa liczba gatunków (665, tj. 83% całości flory) występuje w najniższym pasie wysokościowym i stopniowo maleje w wyższych położeniach. Zjawisko to podobnie przebiega w innych fliszowych pasmach zachodniokarpackich (por. GUZIKOWA 1977; KORNAŚ 1955; STUCHLIKOWA, STUCHLIK 1962) oraz w Tatrach (STECKI 1979).

Rozmieszczenie gatunków górskich. Dynamika zmian liczby gatunków górskich jest podobna do dynamiki łącznej liczby gatunków (Tab. 9; Ryc. 14). Obserwuje się również spadek liczby gatunków w pasie 800—1099 m oraz dwie kulminacje: w pasie 700—799 m i 1200—1299 m. Największa liczba wątrobowców górskich, blisko 65% flory górskiej, występuje w pasie 1200—1299 m n.p.m. Na uwagę zasługuje ośmiokrotny wzrost liczby gatunków górskich w najniższych pasach wysokościowych, od 400 do 799 m n.p.m.

Ryc. 13. Liczba gatunków wątrobowców (A) i ich stanowisk (B) w 100-metrowych pasach wysokościowych w Beskidzie Żywiecko-Orawskim

Fig. 13. Number of liverwort species (A) and their collection sites (B) in 100-metre altitudinal belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Pionowe rozmieszczenie stanowisk wątrobowców w Beskidzie Żywiecko-Orawskim
Vertical distribution of collection sites of liverworts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Gatunki Species	Ls	Min	Max	Liczba stanowisk w 100-metrowych pasach wysokościowych Number of collection sites in the 100-metre altitudinal belts											Liczba stanowisk w piętrach roślinności Number of collection sites in the altitudinal belts of vegetation				
															P	RD	RG	KOS	
				400— 499	500— 599	600— 699	700— 799	800— 899	900— 999	1000— 1099	1100— 1199	1200— 1299	1300— 1399	1400— 1500					1500— 1599
<i>Anastrepta orcadensis</i>	8	1300	1525	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	2	.	.	4	4
<i>Anastrophyllum hellerianum</i>	1	1260		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.
<i>Anastrophyllum minutum</i>	8	790	1525	.	.	.	1	.	1	.	3	2	.	.	1	.	3	4	1
<i>Aneura pinguis</i>	4	790	1260	.	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	2	2	.
<i>Anthoceros punctatus</i>	9	460	680	1	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	.	.
<i>Barbilophozia attenuata</i>	51	650	1525	.	1	3	5	5	9	3	10	7	6	2	2	.	25	18	8
<i>Barbilophozia barbata</i>	8	625	870	.	.	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.
<i>Barbilophozia floerkei</i>	14	1175	1540	.	.	.	.	.	.	1	1	7	4	1	1	.	.	9	5
<i>Barbilophozia hatcheri</i>	6	870	1420	.	.	.	1	.	1	.	2	1	2	.	.	.	1	3	2
<i>Barbilophozia lycopodioides</i>	7	870	1420	.	.	.	1	.	3	.	.	1	2	.	.	.	4	1	2
<i>Bazzania trilobata</i>	14	615	1130	.	.	6	5	1	1	.	1	.	.	.	.	.	14	.	2
<i>Bazzania tricenata</i>	6	1215	1420	.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	.	.	.	.	4	2
<i>Blasia pusilla</i>	4	460	690	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.
<i>Blepharostoma trichophyllum</i>	121	525	1500	.	2	13	21	18	16	9	12	14	7	8	1	2	81	29	9
<i>Calypogeia azurea</i>	145	525	1475	.	8	18	25	19	23	14	10	12	11	5	.	5	107	28	5
<i>Calypogeia integristipula</i>	43	635	1500	.	.	3	4	4	4	2	2	7	9	7	1	.	19	16	8
<i>Calypogeia muelleriana</i>	15	570	1150	.	1	4	2	.	4	1	3	.	.	.	.	.	15	.	.
<i>Calypogeia neesiana</i>	8	1150	1480	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	4	.	.	.	4	4
<i>Calypogeia suecica</i>	7	785	1350	.	.	1	2	.	1	.	2	1	.	.	.	.	4	3	.
<i>Cephalozia bicuspidata</i>	213	470	1540	1	10	26	26	27	31	23	20	17	20	10	2	6	146	49	12
<i>Cephalozia catenulata</i>	2	785	920	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
<i>Cephalozia connivens</i>	1	1400		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1

<i>Cephalozia lammerstana</i>	27	560	1475	.	1	5	7	3	2	.	3	1	2	3	.	19	5	3
<i>Cephalozia leucantha</i>	11	775	1350	.	.	.	1	1	2	2	2	3	1	.	.	5	6	.
<i>Cephalozia lunulifolia</i>	45	695	1480	.	.	1	3	4	8	6	4	10	5	4	.	25	16	4
<i>Cephalozia divaricata</i>	6	570	1160	.	1	.	1	2	.	1	1	1	.	.	.	5	1	.
<i>Cephalozia hampeana</i>	3	500	1200	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.
<i>Cephalozia rubella</i>	1	790		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Chiloscyphus pallescens</i>	36	470	1500	1	4	8	3	2	.	7	2	3	2	3	1	2	24	6
<i>Chiloscyphus polyanthos</i>	94	470	1475	1	6	20	17	17	9	11	8	2	1	2	.	2	82	8
<i>Conocephalum conicum</i>	50	470	1350	2	5	9	13	4	3	7	5	1	1	.	.	4	44	2
<i>Diplophyllum albicans</i>	5	680	1275	.	.	1	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.	4	1
<i>Diplophyllum obtusifolium</i>	9	560	1295	.	1	2	.	1	.	.	1	4	.	.	.	.	4	5
<i>Diplophyllum taxifolium</i>	1	1540		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
<i>Fossombronina wondraczekii</i>	21	410	870	2	6	9	2	2	.	.	.	.	.	.	.	3	18	.
<i>Frullania dilatata</i>	12	580	1170	.	2	4	1	1	.	.	4	.	.	.	.	11	1	.
<i>Frullania tamarisci</i>	2	1140	1260	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	1
<i>Geocalyx graveolens</i>	4	850	1270	.	.	.	.	1	2	.	.	1	.	.	.	.	3	1
<i>Harpanthus flotovianus</i>	9	1260	1475	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	3	1
<i>Harpanthus scutatus</i>	2	910	930	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	6	.	.	.	6
<i>Jamesoniella autumnalis</i>	26	525	930	.	1	9	10	4	2	.	.	.	.	.	.	1	25	.
<i>Jungermannia atrovirens</i>	8	570	975	.	1	3	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	8	.
<i>Jungermannia confertissima</i>	3	1110	1400	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	1	1
<i>Jungermannia gracillima</i>	43	470	1390	1	6	7	4	4	5	7	5	2	2	.	.	5	30	8
<i>Jungermannia hyalina</i>	3	460	605	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.
<i>Jungermannia leiantha</i>	59	625	1470	.	.	3	10	16	12	11	4	2	.	1	.	54	4	1
<i>Jungermannia obovata</i>	12	745	1475	.	.	.	1	1	1	.	4	2	2	1	.	.	6	5
<i>Jungermannia pumila</i>	36	560	1350	.	2	3	5	8	5	6	3	2	2	.	.	32	4	.
<i>Jungermannia sphaerocarpa</i>	15	1025	1400	.	.	.	.	.	.	1	2	7	4	1	.	.	2	12
<i>Jungermannia subelliptica</i>	10	720	1175	.	.	.	3	1	1	2	3	.	.	.	.	.	9	1
<i>Lejeunea cavifolia</i>	16	655	1260	.	.	4	5	2	2	.	1	2	.	.	.	.	14	2
<i>Lepidozia reptans</i>	123	470	1370	1	3	19	21	23	15	14	12	10	5	.	.	3	98	22
<i>Lophocolea bidentata</i>	62	420	1260	5	9	18	22	5	.	1	1	1	.	.	.	8	53	1
<i>Lophocolea cuspidata</i>	17	470	1050	3	2	6	3	2	.	1	.	.	.	.	.	3	14	.
<i>Lophocolea heterophylla</i>	188	460	1480	4	13	23	25	22	30	25	16	15	8	7	.	10	138	33
<i>Lophozia ascendens</i>	4	745	1150	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	3	1
<i>Lophozia bantriensis</i>	6	570	1260	.	1	2	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	4	2

Gatunki Species	Ls	Min	Max	Liczba stanowisk w 100-metrowych pasach wysokościowych Number of collection sites in the 100-metre altitudinal belts												Liczba stanowisk w piętrach roślinności Number of collection sites in the altitudinal belts of vegetation			
				400— 499	500— 599	600— 699	700— 799	800— 899	900— 999	1000— 1099	1100— 1199	1200— 1299	1300— 1399	1400— 1500	1500— 1599	P	RD	RG	KOS
<i>Lophozia collaris</i>	6	615	1235	.	.	2	2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	5	1	.
<i>Lophozia excisa</i>	1	570		.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Lophozia heterocolpos</i>	2	615	1220	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.
<i>Lophozia incisa</i>	19	740	1350	.	.	.	2	1	3	2	4	4	3	.	.	.	10	9	.
<i>Lophozia longidens</i>	6	930	1340	.	.	.	.	.	1	1	3	.	1	.	.	.	4	2	.
<i>Lophozia longiflora</i>	18	615	1360	.	.	1	2	2	1	1	2	4	5	.	.	.	9	9	.
<i>Lophozia obtusa</i>	1	1350		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.
<i>Lophozia silvicola</i>	2	980	1220	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.
<i>Lophozia sudetica</i>	43	560	1475	.	1	1	3	3	5	1	7	9	9	4	.	.	17	22	4
<i>Lophozia ventricosa</i>	84	525	1540	.	4	5	10	7	8	6	8	13	13	7	3	3	39	32	10
<i>Lophozia wenzelii</i>	4	1440	1525	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	4
<i>Marchantia aquatica</i>	1	670		.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
<i>Marchantia polymorpha</i>	9	470	1125	1	3	1	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	2	7	.
<i>Marsupella funkii</i>	4	555	870	.	1	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
<i>Marsupella sprucei</i>	9	850	1520	.	.	.	1	1	1	.	3	1	2	.	1	.	3	5	1
<i>Metzgeria conjugata</i>	14	605	1260	.	.	3	2	.	3	1	2	3	.	.	.	.	10	4	.
<i>Metzgeria furcata</i>	43	580	1235	.	1	9	8	4	5	9	5	2	.	.	.	.	38	5	.
<i>Mylia anomala</i>	2	1480	1500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
<i>Mylia taylorii</i>	29	775	1450	.	.	.	2	6	6	2	3	8	1	1	.	.	18	10	1
<i>Nardia geoscyphus</i>	3	650	1010	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.
<i>Nardia scalaris</i>	40	470	1500	1	10	9	1	3	2	1	2	3	4	3	1	6	22	8	4
<i>Nowellia curvifolia</i>	4	555	785	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
<i>Pellia endiviifolia</i>	34	470	1350	2	.	5	10	4	6	1	2	2	2	.	.	2	27	5	.
<i>Pellia epiphylla</i>	83	470	1330	1	7	13	13	16	11	12	6	3	1	.	.	5	70	8	.
<i>Pellia neesiana</i>	52	515	1475	.	4	11	7	4	3	5	4	4	6	4	.	1	36	11	4

<i>Phaeoceros laevis</i>	5	460	725	1	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4
<i>Plagiochila asplenoides</i>	33	485	1025	1	3	10	10	8	.	1	.	.	.	.	.	.	2	31	.
<i>Plagiochila porrelloides</i>	104	470	1475	2	5	17	20	13	9	11	13	11	2	1	.	.	4	78	21
<i>Porella baueri</i>	1	890		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Porella platyphylla</i>	2	1170	1285	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	2
<i>Pressia quadrata</i>	2	470	1110	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.
<i>Ptilidium ciliare</i>	2	1450	1470	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2
<i>Ptilidium pulcherrimum</i>	93	600	1480	.	.	8	2	10	15	13	15	12	13	5	.	.	.	55	33
<i>Radula complanata</i>	15	605	1235	.	.	3	5	1	4	.	1	1	.	.	.	.	.	14	1
<i>Radula lindenbergiana</i>	6	865	1385	.	.	.	.	1	2	.	1	.	2	.	.	.	.	3	3
<i>Riccardia latifrons</i>	7	675	1370	.	.	1	.	2	1	.	1	1	1	.	.	.	.	4	3
<i>Riccardia multifida</i>	8	775	1270	.	.	.	1	4	1	.	.	2	.	.	.	.	.	6	2
<i>Riccardia palmata</i>	2	1075	1225	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	1
<i>Riccia glauca</i>	1	580		.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Riccia sorocarpa</i>	17	460	775	1	7	7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13
<i>Scapania aequiloba</i>	2	720	760	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
<i>Scapania curta</i>	19	505	1185	.	6	4	5	1	.	1	2	.	1	.	.	.	1	15	2
<i>Scapania helvetica</i>	4	1110	1475	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	.	.	4	10	1
<i>Scapania irrigua</i>	15	500	1290	.	7	1	4	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	4	1
<i>Scapania lingulata</i>	1	760		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Scapania mucronata</i>	12	525	1360	.	2	2	2	1	.	1	1	1	2	.	.	.	1	8	3
<i>Scapania nemorea</i>	45	605	1275	.	.	12	13	8	7	2	1	2	.	.	.	.	.	43	2
<i>Scapania paludosa</i>	1	1260		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
<i>Scapania parvifolia</i>	1	1540		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
<i>Scapania subalpina</i>	7	670	1475	.	.	1	.	.	.	.	2	1	2	1	.	.	.	2	4
<i>Scapania umbrosa</i>	38	635	1420	.	.	2	.	4	7	4	6	8	6	1	.	.	.	18	19
<i>Scapania undulata</i>	101	560	1500	.	2	17	15	14	15	11	10	7	7	2	1	.	.	79	19
<i>Trichocolea tomentella</i>	1	850		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Tritomaria exsecta</i>	63	470	1480	1	1	8	9	14	12	2	4	7	3	2	.	.	1	47	13
<i>Tritomaria exsectiformis</i>	1	1220		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
<i>Tritomaria quinqueidentata</i>	14	525	1420	.	1	3	2	.	1	.	3	.	3	1	.	.	1	8	4

Objaśnienia: Ls — łączna liczba stanowisk; Min — minimum wysokościowe (m n.p.m.); Max — maksimum wysokościowe (m n.p.m.); P — piętro pogórza; RD — regiel dolny; RG — regiel górny; KOS — piętro kosówki

Explanations: Ls — total number of collection sites; Min — altitudinal minimum (in metre above sea level); Max — altitudinal maximum (in metre above sea level); P — submontane belt; RD — lower montane belt; RG — upper montane belt; KOS — subalpine belt

Ryc. 14. Liczba gatunków niżowych (1), niżowo-górskich (2) i górskich (3) w 100-metrowych pasach wysokościowych w Beskidzie Żywiecko-Orawskim

Fig. 14. Number of lowland (1), lowland-mountain (2) and mountain (3) liverworts in 100-metre altitudinal belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Spadek liczby wątrobowców górskich w pasie 900–1099 m tłumaczyć należy osiągnięciem przez niektóre gatunki górnej granicy zasięgu poniżej 900 bądź 1100 m n.p.m. Do gatunków tych należą wątrobowce regła dolnego: *Barbilophozia barbata*, *Jamesoniella autumnalis*, *Jungermannia atrovirens*, *Marsupella funckii* i *Nowellia curvifolia*. Poniżej 900 m n.p.m. kończy się również zwarty zasięg występowania *Lejeunea cavifolia*, *Lophozia collaris*, *Scapania curta* i *S. irrigua*. Również w dolnej części regła dolnego rosną rzadkie gatunki dolnoreglowe, *Cephalozia catenulata*, *Harpanthus scutatus*, *Porella baueri* i *Trichocolea tomentella*.

Ponowny wzrost liczby gatunków w pasach od 1100 do 1299 m związany jest z pojawieniem się wielu nowych wątrobowców, często o charakterze wysokogórskim: *Anastrophyllum hellerianum*, *Barbilophozia floerkei*, *Bazzania tricrenata*, *Calyptogeia neesiana*, *Frullania tamarisci*, *Harpanthus flotovianus*, *Jungermannia confertissima*, *Scapania helvetica*, *S. paludosa*, *S. subalpina* i *Tritomaria exsectiformis*. Również powyżej 1000 m zaczyna się zwarty zasięg występowania *Anastrophyllum minutum*, *Barbilophozia hatcheri*, *Jungermannia obovata*, *J. sphaerocarpa* i *Marsupella sprucei*.

Ryc. 15. Liczba stanowisk gatunków niżowych (1), niżowo-górskich (2) i górskich (3) w 100-metrowych pasach wysokościowych w Beskidzie Żywiecko-Orawskim

Fig. 15. Number of collection sites of lowland (1), lowland-mountain (2) and mountain (3) liverworts in 100-metre altitudinal belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Przebieg zmian liczby stanowisk gatunków górskich w poszczególnych pasach wysokościowych (Tab. 10; Ryc. 15) nawiązuje do udziału liczbowego tych gatunków w pasach. Również tutaj obserwuje się początkowo duży wzrost liczby stanowisk. Ich najwyższa wartość przypada na pas 700–799 m. Następnie do wysokości 1099 m liczba ta maleje, by ponownie wzrosnąć i osiągnąć drugą kulminację w pasie 1200–1299 m. W przedziale wysokości 1000–1099 m obserwuje się niewielką przewagę liczby stanowisk wątrobowców niżowo-górskich nad górskimi.

Rozmieszczenie gatunków niżowo-górskich. Zmiany bogactwa flory wątrobowców niżowo-górskich są nieco inne, choć ogólny obraz tych zmian jest podobny do poprzednio opisanych. W pierwszych pięciu pasach wysokościowych (400–899 m) liczba gatunków wzrasta wolniej niż gatunków górskich (tylko dwukrotnie) i osiąga swoje maksimum w przedziale wysokości 800–899 m, następnie zmniejsza się

w pasie 900–999 m, by ponownie niewiele wzrosnąć w pasie 1000–1199 m. Powyżej 1200 m n.p.m. liczba gatunków niżowo-górskich stopniowo maleje (Tab. 9; Ryc. 14).

Spadek liczby gatunków niżowo-górskich w pasie 900–999 m wiąże się z osiaganiem przez niektóre wątrobowce granicy zwartego zasięgu (bądź górnej granicy zasięgu) poniżej 900 m n.p.m. Do gatunków tych należą np. *Cephaloziella divaricata*, *Diplophyllum albicans*, *Frullania dilatata*, *Lophocolea bidentata*, *L. cuspidata*, *Marchantia polymorpha* i *Plagiochila asplenioides*. Wymienione wątrobowce pojawiają się ponownie, ale już bardzo sporadycznie, w wyższych położeniach, czym należy tłumaczyć niewielki wzrost liczby gatunków niżowo-górskich w pasie 1000–1299 m n.p.m.

Na obraz zmian zróżnicowania flory niżowo-górskiej w zależności od wysokości nad poziom morza ma również wpływ grupa czterech gatunków – *Aneura pinguis*, *Cephaloziella hampeana*, *Nardia geoscyphus* i *Porella platyphylla* – które występują w dolnej części regła dolnego do wysokości 900 m i następnie dopiero powyżej 1000 m n.p.m.

Przebieg zmian liczby stanowisk gatunków niżowo-górskich w poszczególnych pasach wysokościowych pokazuje (Tab. 10; Ryc. 15), że wątrobowce te są najczęstsze w dolnej części regła dolnego, w pasie od 600 do 799 m. Powyżej 800 m n.p.m. stają się one rzadsze, liczba ich stanowisk stopniowo maleje, mimo iż w pasie 1000–1299 m obserwuje się ponowny wzrost liczby gatunków.

Rozmieszczenie gatunków niżowych. Gatunki niżowe występują tylko do 900 m n.p.m. Największą ich liczbę notowano w pasach od 400 do 699 m. Powyżej 700 m znajdowano tylko pojedyncze gatunki na bardzo rozproszonych stanowiskach (Ryc. 14, 15). W grupie tej występują prawie wyłącznie wątrobowce rosnące na polach uprawnych, tj. *Anthoceros punctatus*, *Blasia pusilla*, *Fossombronia wondraczekii*, *Phaeoceros laevis*, *Riccia glauca* i *R. sorocarpa*. W górach są one związane z krainą upraw na pogórzu i w dolnej części regła dolnego.

Stopień realizacji flory w pasach wysokościowych. Rycina 16 przedstawia stopień realizacji flory w poszczególnych pasach wysokościowych. Z danych tych wynika, że w każdym pasie wysokościowym, od 400 do 699 m n.p.m., występuje ponad 50% łącznej liczby gatunków niżowych. Z kolei ponad 50% flory gatunków niżowo-górskich notuje się w każdym pasie, od 500 do 899 oraz od 1000 do 1299 m n.p.m., przy czym najwięcej tych gatunków (około 70%) rośnie w pasach od 600 do 899 m. Wynika z tego, że pasy wysokościowe dolnej części regła dolnego cechują się największym bogactwem wątrobowców niżowo-górskich. W przypadku gatunków górskich największy stopień realizacji flory (powyżej 50%) przypada na wyższe pasy wysokościowe, tj. od 700 do 999 m oraz od 1100 do 1399 m n.p.m., przy czym największym bogactwem wątrobowców górskich odznaczają się pasy wysokościowe położone na granicy regła dolnego i górnego.

Ryc. 16. Stopień realizacji grup gatunków niżowych (1), niżowo-górskich (2) i górskich (3) w poszczególnych 100-metrowych pasach wysokościowych w Beskidzie Żywiecko-Orawskim

Fig. 16. Realization degree of lowland (1), lowland-mountain (2) and mountain (3) species groups in 100-metre altitudinal belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Zmiany struktury flory. Zmianom liczebności gatunków górskich, niżowo-górskich i niżowych, zachodzącym wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza towarzyszą zmiany struktury flory. Udział procentowy gatunków górskich i ich stanowisk stopniowo wzrasta w coraz to wyższych pasach wysokościowych (Ryc. 17, 18). Jedynie w najniższych położeniach, do wysokości 600 m n.p.m., gatunki niżowe i niżowo-górskie łącznie przeważają nad gatunkami górskimi. W wyższych położeniach udział gatunków górskich jest już wyraźnie większy i stopniowo rośnie po najwyższe rejony; od wysokości 1300 m n.p.m. jest mniej więcej stały i wynosi 75%.

Udział stanowisk wątrobowców górskich przeważa nad stanowiskami gatunków niegórskich, tj. gatunków niżowych i niżowo-górskich łącznie, począwszy od wysokości 700 m n.p.m. wzwyż (Ryc. 18). Znaczy to, że w pasie 600–699 m liczba stanowisk gatunków niegórskich przeważa, mimo że liczba gatunków górskich jest nieco większa (Tab. 10; Ryc. 15). W pasie 1000–1099 m liczba stanowisk gatunków niżowo-górskich również nieco przeważa nad stanowiskami gatunków górskich. Jest to związane ze spadkiem liczby gatunków górskich

Ryc. 17. Procentowy udział gatunków górskich (1), niżowo-górskich (2) i niżowych (3) w 100-metrowych pasach wysokościowych w Beskidzie Żywiecko-Orawskim
 Fig. 17. Percentage of mountain (1), lowland-mountain (2) and lowland (3) species in 100-metre altitudinal belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Ryc. 18. Procentowy udział stanowisk gatunków górskich (1), niżowo-górskich (2) i niżowych (3) w 100-metrowych pasach wysokościowych w Beskidzie Żywiecko-Orawskim
 Fig. 18. Percentage of collection sites of mountain (1), lowland-mountain (2) and lowland (3) species in 100-metre altitudinal belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

w tym pasie, zmniejszeniem się liczby stanowisk niektórych wątrobowców górskich przy osiągnięciu górnej bądź dolnej granicy zasięgu, wreszcie ze spadkiem liczby stanowisk cieniolubnych, mezo- i higrofilnych wątrobowców, głównie z siedlisk naskalnych.

7.2. Flora wątrobowców na tle piętrowego układu roślinności

Zróznicowanie morfometryczne Beskidu Żywieckiego znajduje odzwierciedlenie nie tylko w zróznicowaniu pionowym flory roślin naczyniowych i roślinności (por. Rozdz. 3), ale również w zmianach liczebności i struktury flory wątrobowców, co wykazano w poprzednim rozdziale. Jak zmiany te wyglądają na tle piętrowego układu roślinności?

Na początku warto podkreślić, że w badanej florze pod względem rozmieszczenia wyróżniają się trzy grupy gatunków (por. też Ryc. 19).

— do pierwszej należy 12 gatunków (siedem górskich i pięć niżowo-górskich), które rosną we wszystkich piętrach roślinności; są to przede wszystkim gatunki ogólnogórskie, np. *Calypogeia azurea*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Nardia scalaris*, *Plagiochila porelloides* i niżowo-alpejskie, np. *Cephalozia bicuspidata*, *Chiloscyphus pallescens*, *C. polyanthos* i *Lophozia ventricosa*; wymienione gatunki należą do bardzo częstych i pospolitych składników flory;

— do grupy drugiej należą wątrobowce występujące w piętrach pogórza oraz regli dolnego i górnego, łącznie 10 gatunków, w tym trzy gatunki górskie, wszystkie reglowe (*Conocephalum conicum*, *Scapania irrigua* i *S. mucronata*) oraz siedem gatunków niżowo-górskich, głównie niżowo-górnoreglowych, np. *Lepidozia reptans*, *Lophocolea bidentata* i *Pellia epiphylla*;

— trzecią grupę stanowi 19 gatunków występujących w reglach dolnym i górnym oraz w kosówce; wśród nich występują dwa gatunki niżowo-górskie (*Cephalozia lammersiana* i *Ptilidium pulcherrimum*) oraz siedemnaście gatunków górskich o różnym typie zasięgowym: siedem gatunków ogólnogórskich, np. *Anastrophyllum minutum*, *Mylia taylorii* i *Scapania undulata*; pięć gatunków reglowych, np. *Calypogeia integristipula*, *Cephalozia lunulifolia* i *Jungermannia leiantha*; cztery gatunki subalpejskie, np. *Jungermannia obovata* i *Scapania helvetica*; jeden gatunek alpejski, tj. *Marsupella sprucei*.

Wymienione wyżej wątrobowce tworzą grupę 41 gatunków (36% flory) wspólnych dla czterech bądź trzech pięter roślinności (Ryc. 19). Powierzchniowa dominacja regla dolnego znajduje również swój wyraz w liczbowym udziale gatunków wątrobowców i ich stanowisk w tym piętrze (Tab. 12, 13; Ryc. 20, 21). Notowano tu największą liczbę gatunków i ich stanowisk (85,8% flory i 70% stanowisk). Najuboższe pod tym względem jest piętro pogórza. Na uwagę zasługuje stosunkowo duża liczba gatunków znalezionych w piętrze subalpejskim (37,2% flory), które zajmuje tylko około 40 ha powierzchni (Tab. 12).

Piętra roślinności Altitudinal belts of vegetation	Grupy gatunków Groups of species											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Kosówka Subalpine belt	Σ 42											
					5		6		36	36		
Regiel górny Upper montane belt	Σ 79											
				28	19		5			38	5	
Regiel dolny Lower montane belt	Σ 97											
			10				17		69		47	
Pogórze Submontane belt	Σ 33											
		11							33	11		22
											33	
Grupy gatunków Groups of species	Gatunki wyłączne Exclusive species							Gatunki wspólne i przechodzące oraz ekstrema wysokościowe gatunków Common and transition species and altitudinal extremes of species				

Tabela 12 – Table 12

Liczba gatunków wątrobowców w piętrach roślinności Beskidu Żywiecko-Orawskiego
 Number of liverwort species in the altitudinal belts of vegetation in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Piętra roślinności Altitudinal belts of vegetation	Liczba gatunków Number of species			
	ogółem total	górkich mountain	niżowo-górkich lowland-mountain	niżowych lowland
Podgórze Submontane belt	33	12 (36,4%)	16 (48,6%)	5 (15,2%)
Regiel dolny Lower montane belt	97	60 (61,9)	30 (30,9)	7 (7,2)
Regiel górny Upper montane belt	79	56 (70,9)	23 (29,1)	0
Piętro subalpejskie Subalpine belt	42	32 (76,2)	10 (23,8)	0
Razem Total	113	71 (62,8%)	35 (31,0%)	7 (6,2%)

W strukturze flor poszczególnych pięter, począwszy od piętra pogórza, obserwuje się stopniowy wzrost udziału gatunków górskich i ich stanowisk (Tab. 12, 13; Ryc. 22, 23). W piętrze regla dolnego gatunki górskie już przeważają we florze, choć udział stanowisk gatunków niżowych i niżowo-górskich łącznie jest nieznacznie większy.

Ryc. 19. Struktura flor poszczególnych pięter roślinności w Beskidzie Żywiecko-Orawskim
 Gatunki rosnące: I – we wszystkich piętrach roślinności; II – tylko na pogórzu i w reglu dolnym; III – w piętrach pogórza, regla dolnego i górnego; IV – w reglach dolnym i górnym; V – w reglach dolnym i górnym oraz w kosówce; VI – w reglu górnym i kosówce; VII – gatunki wyłączne dla poszczególnych pięter roślinności; VIII – liczby gatunków notowane w poszczególnych piętrach; IX – gatunki wspólne dla pięter sąsiadujących; X – gatunki z maksimum wysokościowym w danym piętrze; XI – gatunki z minimum wysokościowym w danym piętrze; XII – gatunki rosnące w reglu dolnym bądź górnym i w piętrach sąsiadujących

Fig. 19. Structure of liverwort flora in the particular altitudinal belts of vegetation in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

I – species occurring in the all altitudinal belts of vegetation; II – species occurring in the submontane and lower montane belts; III – species occurring in the submontane, lower montane and upper montane belts; IV – species occurring in the lower and upper montane belts; V – species occurring in the lower montane, upper montane and subalpine belts; VI – species occurring in the upper montane and subalpine belts; VII – species exclusive for particular belts of vegetation; VIII – number of species recorded in particular belts of vegetation; IX – species common for neighbouring vegetation belts; X – species attaining their altitudinal maxima in particular belts of vegetation; XI – species attaining their altitudinal minima in particular belts of vegetation; XII – number of transitional species

Tabela 13 — Table 13

Liczba stanowisk gatunków wątrobowców w piętrach roślinności Beskidu Żywiecko-Orawskiego
 Number of collection sites of liverwort species in the altitudinal belts of vegetation in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Piętra roślinności Altitudinal belts of vegetation	Liczba stanowisk gatunków Number of collection sites of species			
	ogółem total	górkich mountain	niżowo-górkich lowland-mountain	niżowych lowland
Podgórze Submontane belt	98	31 (31,6%)	57 (58,2%)	10 (10,2%)
Regiel dolny Lower montane belt	1961	963 (49,2)	950 (48,4)	48 (2,4)
Regiel górny Upper montane belt	599	369 (61,6)	230 (38,4)	0
Piętro subalpejskie Subalpine belt	142	94 (66,2)	48 (33,8)	0
Razem Total	2800	1457 (52,0%)	1285 (45,9%)	58 (2,1%)

Ryc. 20. Liczba gatunków wątrobowców w piętrach roślinności Beskidu Żywiecko-Orawskiego
 Gatunki: 1 — niżowe; 2 — niżowo-górskie; 3 — górskie

Fig. 20. Number of liverwort species in the altitudinal belts of vegetation in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

1 — lowland species; 2 — lowland-mountain species; 3 — mountain species

Ryc. 21. Liczba stanowisk gatunków wątrobowców w piętrach roślinności Beskidu Żywiecko-Orawskiego

Gatunki: 1 – niżowe; 2 – niżowo-górskie; 3 – górskie

Fig. 21. Number of collection sites of liverwort species in the altitudinal belts of vegetation in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

1 – lowland species; 2 – lowland-mountain species; 3 – mountain species

Ryc. 22. Procentowy udział wątrobowców górskich (1), niżowo-górskich (2) i niżowych (3) w piętrach roślinności Beskidu Żywiecko-Orawskiego

Fig. 22. Percentage of mountain (1), lowland-mountain (2) and lowland (3) liverworts in the altitudinal belts of vegetation in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Ryc. 23. Procentowy udział stanowisk wątrobowców górskich (1), niżowo-górskich (2) i niżowych (3) w piętrach roślinności Beskidu Żywiecko-Orawskiego

Fig. 23. Percentage of collection sites of mountain (1), lowland-mountain (2) and lowland (3) liverworts in the altitudinal belts of vegetation in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Piętro pogórza. Rozciąga się u podnóża pasma i jest prawie w całości zajęte przez osiedla, uprawy i użytki zielone. Roślinność naturalna została tu niemal całkowicie zniszczona. Flora wątrobowców jest uboga i silnie zmieniona. Łącznie występują tu 33 gatunki o zdecydowanie niegórskim charakterze. Blisko 40% flory (12 gatunków) to wątrobowce rosnące we wszystkich piętrach wysokościowych, następne 10 gatunków (30%) to rośliny występujące w regłach dolnym i górnym, natomiast 11 (33%) stwierdzono ponadto w reglu dolnym (Ryc. 19). Wynika z tego, że piętro pogórza nie ma gatunków wyłącznych. Również żaden z wątrobowców nie ma tutaj zagęszczenia swoich stanowisk.

Najbardziej interesującą florę spotyka się na skarpach przydrożnych i skarpach nad potokami. Rosną tu m.in. *Cephalozia bicuspidata*, *Jungermannia gracillima*, *J. hyalina*, *Lophozia ventricosa*, *Nardia scalaris*, *Pellia epiphylla*, *P. neesiana*, *Scapania irrigua*, *S. mucronata* i *Tritomaria exsecta*. Na humusie, w sztucznych borach świerkowych spotyka się najczęściej *Calypogeia azurea* oraz *Blepharostoma trichophyllum*, *Cephalozia bicuspidata*, *Lophocolea bidentata*, *L. heterophylla* i *Plagiochila porelloides*. W borach notuje się jedyne na pogórzcu stanowiska *Jamesoniella autumnalis* i *Tritomaria quinquedentata*. Kamienie wystające z gleby w borach świerkowych porastane są zwykle przez rośliny dna lasu. W zbiorowiskach łągowych i zaroślach wiklinowych, rosnących na brzegach potoków, stwierdzono tylko cztery pospolite wątrobowce, mające liczne stanowiska na niżu, tj. *Chiloscyphus pallescens*, *Conocephalum conicum*, *Lophocolea bidentata* i *L. cuspidata*.

Flora potoków, ze względu na zniszczenie zbiorowisk potokowych jest bardzo uboga. Najliczniej występują tu *Chiloscyphus pallescens*, *C. polyanthos*, *Conocephalum conicum*, *Marchantia polymorpha*, *Plagiochila porelloides* i *Pellia endiviifolia*. Odlesione obszary pogórza zamienione na pola uprawne, łąki i pastwiska, mają również ubogą florę wątrobowców. Na łąkach i w murawach najczęściej rośnie *Lophocolea bidentata*, w miejscach suchszych spotyka się również *Cephaloziella hampeana*, na polach zaś rosną efemeryczne wątrobowce, jak np. *Anthoceros punctatus*, *Fossombronia wondraczekii*, *Phaeoceros laevis* i *Riccia sorocarpa*. Zdecydowanie uboga jest ponadto flora poroślowa. Jedynym gatunkiem notowanym na pniach wolnostojących wierzb jest *Lophocolea heterophylla*. Gatunek ten razem z *Lepidozia reptans* spotykano również na butwiejącym drewnie w borach świerkowych.

Regiel dolny. Ze 113. gatunków wątrobowców znanych z Beskidu Żywiecko-Orawskiego, 97 (85,8%) rośnie w reglu dolnym, w tym 28 (28,8% flory piętra) lokalnie osiąga tu górne granice występowania. Wśród tych ostatnich 17 gatunków ograniczonych jest wyłącznie do omawianego piętra (Ryc. 19). Do grupy gatunków z górną granicą zasięgu w reglu dolnym, należą przede wszystkim wątrobowce niżowe rosnące na polach: *Anthoceros punctatus*, *Blasia pusilla*, *Fossombronia wondraczekii*, *Phaeoceros laevis* i *Riccia sorocarpa*, ponadto gatunki naziemne w borach świerkowych i zbiorowiskach nieleśnych: *Barbilophozia barbata*, *Bazzania trilobata*, *Calypogeia muelleriana*, *Jamesoniella autumnalis* i *Plagiochila asplenoides* oraz wątrobowce bardzo rzadkie, należące do różnych grup ekologicznych, np. *Cephaloziella rubella*, *Harpanthus scutatus*, *Lophozia excisa*, *Marchantia aquatica*, *Porella baueri* i *Trichocolea tomentella*. Blisko 30% flory tego piętra to gatunki znajdowane również w reglu górnym i w kosówce (Ryc. 19). Zwraca uwagę obecność kilku gatunków wysokogórskich: *Jungermannia confertissima*, *J. obovata*, *J. subelliptica*, *Lophozia bantriensis*, *L. heterocolpos*, *Marsupella sprucei*, *Radula lindenbergiana*, *Scapania helvetica* i *S. subalpina*. Wymienione wątrobowce mają w reglu dolnym swoje minima wysokościowe.

Mimo, że naturalna roślinność leśna regła dolnego jest obecnie szczątkowa, można jednak wyróżnić wiele wątrobowców leśnych, właściwych dla tego piętra. Są to gatunki należące do trzech grup siedliskowych:

1) naziemne, rosnące w sztucznych świerczynach i silnie zmienionych dolnoregłowych borach jodłowo-świerkowych: *Barbilophozia barbata*, *Bazzania trilobata*, *Calypogeia muelleriana*, *Jamesoniella autumnalis*, *Lophocolea bidentata* i *Plagiochila asplenoides*;

2) epifity buków i jaworów: *Frullania dilatata*, *Metzgeria furcata* i *Radula complanata*;

3) epiksylity, rosnące głównie na butwiejącym drewnie świerkowym: *Jungermannia leiantha*, *Lepidozia reptans* i *Nowellia curvifolia*.

Obecność licznych głazów, kamieni i gdzieś tam większych odkrywek skalnych przysparza temu piętru gatunków epilitycznych, z których charakterystyczne dla regła dolnego są: *Diplophyllum albicans*, *Jungermannia subelliptica*, *Lejeunea cavifor-*

lia, *Lophozia collaris*, *Metzgeria conjugata* i *Scapania nemorea*. Na nagiej, mineralnej glebie, odsłoniętej w sposób naturalny lub sztuczny, przeważnie na skarpach przydrożnych i ścieżkach, licznie rozwijają się zbiorowiska mszaków stadiów inicjalnych, zarastające te miejsca. Z wątrobowców właściwych dla regła dolnego na tych siedliskach rosną: *Jungermannia gracillima*, *Marsupella funckii*, *Nardia geoscyphus*, *Pellia endiviifolia*, *P. epiphylla*, *Scapania curta* i *S. irrigua*. Siedliska potokowe żywią również bogatą florę. Gatunkami lokalnie dolnoregłowymi są: *Chiloscyphus polyanthos*, *Conocephalum conicum*, *Jungermannia atrovirens*, *J. pumila*, *Lophocolea cuspidata*, *Marchantia polymorpha* i *Riccardia multifida*.

Regiel górny. Regiel górny zajmuje zaledwie około 13% powierzchni rzutowanej i wykształca się w najwyższych partiach tylko kilku masywów górskich (patrz Rozdz. 3). Mimo to w piętrze tym stwierdzono blisko 70% (79 gatunków) flory wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego. Z tej liczby tylko pięć gatunków jest ograniczonych w swoim występowaniu do tej krainy. Są to gatunki bardzo rzadkie w badanym terenie, przy czym *Porella platyphylla*, *Anastrophyllum hellerianum* i *Tritomaria exsectiformis* należy uznać za przypadkowo przywiązane do tego piętra. W reglu górnym 43 gatunki osiągają górną granicę zasięgu, natomiast pięć gatunków — granicę dolną (Ryc. 19). Do tych ostatnich należą głównie wątrobowce wysokogórskie: *Anastrepta orcadensis*, *Bazzania tricenata*, *Barbilophozia floerkei* i *Harpanthus flotovianus* oraz *Calypogeia neesiana*. Ostatni gatunek w Beskidzie Żywiecko-Orawskim rośnie w najwyższych położeniach. Do gatunków osiągających w reglu górnym granicę zasięgu należą zwłaszcza rośliny leśne, np. wątrobowce epiksyliczne rosnące na drewnie świerkowym: *Calypogeia suecica*, *Cephalozia leucantha*, *Lepidozia reptans*, *Lophozia ascendens*, *L. longiflora*, *L. incisa*, *Riccardia latifrons* i *R. palmata*. Gatunki te w górnoregłowym borze świerkowym znajdują dobre warunki rozwoju, a niektóre z nich — optymalne, np. *Cephalozia leucantha* i *Lophozia longiflora*. Natomiast gatunki epifityczne — *Frullania dilatata*, *F. tamarisci*, *Lophozia longidens*, *Metzgeria furcata* i *Radula complanata* — rosną tu sporadycznie i głównie na skałach.

Ważną grupę stanowią gatunki, które w reglu górnym mają wyraźne optimum występowania, choć spotkać je można powyżej lub poniżej niego. Należą tu:

1) *Anastrophyllum minutum*, *Bazzania tricenata*, *Lophozia sudetica* i *Marsupella sprucei* — gatunki naskalne;

2) *Jungermannia obovata* i *Scapania subalpina* — gatunki potokowe;

3) *Barbilophozia floerkei* i *B. hatcheri* — wątrobowce naziemne w górnoregłowej świerczynie;

4) *Scapania helvetica* i *S. paludosa* — wątrobowce źródłiskowe;

5) *Jungermannia sphaerocarpa* — gatunek związany z odkrytą glebą na skarpach nad potokami.

W Tatrach wątrobowce te rosną przede wszystkim w piętrze subalpejskim (SZWEY-KOWSKI 1960).

Na uwagę zasługują również *Anastrepta orcadensis* i *Calypogeia neesiana*, występujące z równą częstością zarówno w reglu górnym, jak i w kosówce.

Gatunki lokalnie górnoreglowe wymieniono w rozdziale 7.4. Pionowe optima ekologiczne większości wątrobowców, które wyróżniają piętro regla górnego Beskidu Żywiecko-Orawskiego wykraczają poza objęty badaniami zakres wysokości, na co wskazuje między innymi ich rozmieszczenie w Tatrach (por. SZWEYKOWSKI 1960). Ze względu na małą powierzchnię piętra subalpejskiego i niewielkie zróżnicowanie tamtejszych siedlisk, wymienione rośliny posiadają optimum występowania właśnie w reglu górnym, często przy granicy lasu.

Piętro kosówki. W piętrze kosówki znaleziono 42 gatunki, co stanowi 37% całości flory. Główny zrąb flory tworzą gatunki pospolite, z licznymi stanowiskami w reglach dolnym i górnym: *Barbilophozia attenuata*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Calypogeia azurea*, *C. integristipula*, *Cephalozia bicuspidata*, *C. lunulifolia*, *Lophozia sudetica*, *L. ventricosa*, *Ptilidium pulcherrimum*. Zwraca uwagę fakt obecności sześciu bardzo rzadkich taksonów, ograniczonych tylko do tego obszaru (Ryc. 19). Są to wątrobowce wysokogórskie (*Diplophyllum taxifolium*, *Lophozia wenzelii* i *Scapania parvifolia*) oraz niżowo-górskie, rosnące w borówczyskach bażynowych (*Cephalozia connivens*, *Mylia anomala* i *Ptilidium ciliare*). Na brzegach potoków rośnie *Harpanthus flotovianus*, bardzo rzadki wątrobowiec w Beskidach, który większość swych stanowisk ma w kosówce.

7.3. Podobieństwo florystyczne pięter roślinności

Współczynniki podobieństwa florystycznego, obliczone na podstawie wzoru Jaccarda i Steinhausa (MATUSZKIEWICZ 1952) wskazują, że najbardziej podobne są flory pięter reglowych (Tab. 14; Ryc. 24). Flora piętra subalpejskiego jest podobna do flory regla górnego; trudno jest tu jednak mówić o zasadniczym przełomie w charakterze flory przy przekroczeniu górnej granicy lasu. W pasie wysokościowym 1300–1399 m n.p.m. czternaście gatunków osiąga górną granicę zasięgu, dwa gatunki zaś – dolną. Nieco wyraźniejsze zmiany zachodzą na granicy między piętrem pogórza i regla dolnego, co związane jest z osiąganiem przez liczne gatunki dolnych granic zasięgowych w pasie wysokościowym 500–650 m. Należy tu jednak zaznaczyć, że tylko dla części gatunków zasięgi wygasają w związku z ich pionowym optimum ekologicznym, np. dla *Tritomaria quinquedentata*, *Lophozia sudetica* czy *Cephalozia lunulifolia*. Dla większości, np. dla *Calypogeia azurea*, *Metzgeria furcata*, *Ptilidium pulcherrimum*, *Scapania curta* czy *S. irrigua*, dolne granice zasięgu mają charakter wtórny, czego przyczyną jest silne, antropogeniczne zniekształcenie szaty roślinnej niższych położeń.

Flory poszczególnych pięter wykazują zróżnicowany skład, zależny od rozpiętości zasięgów pionowych poszczególnych gatunków. Zmiany dokonujące się w strukturze flory są stopniowe. Analiza rozmieszczenia pionowego gatunków ujawnia jednak obszary zagęszczenia ekstremów wysokościowych (Tab. 15; Ryc. 25). Pierwszy taki obszar występuje w pasie wysokościowym 550–650 m, czyli przy

Liczba gatunków wyłącznych i wspólnych w piętrach roślinności Beskidu Żywiecko-Orawskiego
 Number of exclusive and common species in the altitudinal belts of vegetation in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Piętra roślinności Altitudinal belts of vegetation	Liczba gatunków Number of species						Współczynnik podobieństwa ¹ Similarity coefficient			
	łącznie total	wyłączne exclusive	gatunki wspólne z innymi piętami species common with another belts				%			
			P	RD	RG	KOS	P	RD	RG	KOS
Podgórze (P) Submontane belt (P)	33	—	33	33	22	12	—	49,3	39,3	32,0
Regiel dolny (RD) Lower montane belt (RD)	97	17	33	80	69	31	49,3	—	78,4	44,6
Regiel górny (RG) Upper montane belt (RG)	79	5	22	69	74	36	39,3	78,4	—	59,5
Piętro kosówki (KOS) Subalpine belt (KOS)	42	6	12	31	36	36	32,0	44,6	59,5	—

¹ Do oceny podobieństwa zastosowano współczynnik Jaccarda i Steinhausa (As a similarity measure the Jaccard's and Steinhaus coefficient is used)

Ryc. 24. Florystyczne podobieństwo pięter roślinności w Beskidzie Żywiecko-Orawskim

P — piętro pogórza; Rd — regiel dolny; Rg — regiel górny; Kos — piętro kosówki

Fig. 24. Floristic similarity of the altitudinal belts of vegetation in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

P — submontane belt; Rd — lower montane belt; Rg — upper montane belt; Kos — subalpine belt

Tabela 15 — Table 15

Liczby ekstremów wysokościowych gatunków wątrobowców w pasach wysokościowych Beskidu Żywiecko-Orawskiego
 Number of altitudinal extremes of liverwort species in the 100-metre altitudinal belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Wysokość n.p.m. (m) Altitude above sea level (m)		400— 499	500— 599	600— 699	700— 799	800— 899	900— 999	1000— 1099	1100— 1199	1200— 1299	1300— 1399	1400— 1499	1500— 1599
Gatunki górskie Mountain species	A	.	.	.	2	2	4	.	4	13	9	20	10
	B	5	15	14	11	5	3	2	5	2	1	1	.
	C	.	.	.	1	1	.	.	.	2	1	.	2
Gatunki niżowo-górskie Lowland-mountain species	A	.	.	1	.	.	.	3	5	7	5	5	4
	B	13	8	5	1	.	.	.	1	.	.	2	.
	C	.	1	.	1	1	.	.	.	1	.	1	.
Gatunki niżowe Lowland species	A	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
	B	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	C	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Całość flory The flora as a whole	A	.	.	3	4	3	4	3	9	20	14	25	14
	B	23	23	19	12	5	3	2	6	2	1	3	.
	C	.	2	1	2	2	.	.	.	3	1	1	2
Liczba maksimum i minimumów łącznie (A+B+C) Total number of altitudinal extremes of all species (A+B+C)		23	25	23	18	10	7	5	15	25	16	29	16

Objaśnienia: A — liczba maksimum wysokościowych; B — liczba minimumów wysokościowych gatunków; C — liczba gatunków o stanowiskach pojedynczych
 Explanations: A — number of altitudinal maxima; B — number of altitudinal minima; C — number of species with singly collection sites

Ryc. 25. Liczba ekstremów wysokościowych gatunków wątrobowców w 100-metrowych pasach wysokościowych Beskidu Żywiecko-Orawskiego

1 – liczba maksimów; 2 – liczba minimów; 3 – liczba gatunków o stanowiskach pojedynczych; 4 – łączna liczba maksimów i minimów

Fig. 25. Number of altitudinal extremes of liverwort species in 100-metre altitudinal belts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

1 – number of altitudinal maxima; 2 – number of altitudinal minima; 3 – number of species with single collection sites; 4 – total number of altitudinal extremes

granicy piętra pogórza. Charakter zmian we florze tego obszaru omówiono wcześniej (patrz Rozdz. 7.2). W pasie 750–950 m zachodzą kolejne zmiany, mianowicie wytracają swój zasięg wątrobowce rosnące na polach i niektóre gatunki humusolubne, np. *Barbilophozia barbata* i *Jamesoniella autumnalis*. Jednocześnie pojawiają się gatunki wysokogórskie i epiksyliczne. Zmiany te można wiązać z wtórną granicą rozwojową między krainą upraw, gdzie dominuje roślinność nieleśna, a terenami zalesionymi. Jest to jednocześnie naturalna granica między dolną a górną częścią regła dolnego.

Bardzo ważny jest charakter zmian zachodzących między 1100 a 1300 m n.p.m., tj. przy granicy regła dolnego i górnego. W pasie tym 23 gatunki osiągają górne granice zasięgu, sześć zaś – dolne. Do pierwszych należą wątrobowce związane w górach z niskimi położeniami, np. epifityczne (*Frullania dilatata*, *Metzgeria furcata* i *Radula complanata*) lub naskalne (*Diplophyllum albicans*, *Lejeunea cavifolia*, *Metzgeria*

conjugata i *Scapania nemorea*); natomiast do drugich — gatunki wysokogórskie: *Barbilophozia floerkei*, *Bazzania tricrenata*, *Harpanthus flotovianus*, *Jungermannia confertissima* i *Scapania helvetica*. Górna granica lasu (1390–1400 m n.p.m.) stanowi kres występowania wątrobowców rosnących na murszejącym drewnie świerkowym, tj. *Calypogeia suecica*, *Cephalozia leucantha*, *Lepidozia reptans*, *Lophozia incisa*, *L. longiflora* i *Riccardia latifrons*. Niewielki badany odcinek górnej granicy lasu nie pozwala na formułowanie wniosków co do charakteru zachodzących tu zmian.

7.4. Ośrodki wysokościowe wątrobowców

W polskiej literaturze specjalistycznej mało jest, jak dotąd, opracowań dotyczących podziału górskich gatunków wątrobowców na elementy wysokościowe, zależnie od ich rozmieszczenia pionowego (por. SZWEYKOWSKI 1957a, 1960; KOŁA 1972)³. Jest to związane ze słabym poznaniem pionowych zasięgów wątrobowców. Stąd też zaliczenie wielu gatunków do jednej z grup wysokościowych może być niepewne. Propozycję podziału flory wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego na elementy wysokościowe na podstawie rozmieszczenia pionowego poszczególnych gatunków w Sudetach i Karpatach przedstawiono w rozdziale 5.4.

Obecność w Beskidzie Żywiecko-Orawskim dobrze wyróżniających się pięter roślinnych, w tym górnej granicy lasu i piętra subalpejskiego, zachęciło do zbadań centrów występowania poszczególnych gatunków i porównania ich lokalnego rozmieszczenia pionowego z ogólnym rozmieszczeniem w Karpatach i Sudetach. Przy wyznaczaniu ośrodka (centrum) występowania gatunku posłużono się metodą zaproponowaną przez BIAŁECKĄ (1982) dla roślin naczyniowych (por. też KLAMA 1989).

W metodzie tej jako podstawowe kryterium przyjęto pionowe rozmieszczenie stanowisk gatunków. Rozkłady stanowisk wysokościowych większości gatunków mają najczęściej postać nieregularną, asymetryczną, rzadko symetryczną (normalną). Ponadto liczebności stanowisk w poszczególnych pasach wysokościowych są z reguły niewielkie. W przypadku takich rozkładów, do wyznaczenia centrum występowania gatunku, mało albo wręcz nieprzydatne są często używane miary statystyczne, tj. średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe lub wartość modalna i obszar okołomodalny. Z uwagi na charakter posiadanych danych empirycznych, do opisu rozkładu stanowisk wysokościowych gatunków postanowiono wykorzystać wartość medialną (wartość środkową szeregu) oraz odchylenia ćwiartkowe (kwantyle), będące miarami rozproszenia (PUCHALSKI 1977). W tym celu uporządkowano stanowiska wysokościowe gatunków w taki sposób, aby tworzyły szereg o wartościach (tu: wysokościach) rosnących. Jako centrum (ośrodek) występowania

³ Przedstawiona w pracy MIERZEŃSKIEJ (1994) klasyfikacja geograficzna wątrobowców została przyjęta za opracowaniem autora (KLAMA 1989); autorka błędnie cytuje tę pracę podając rok 1986.

Ryc. 26. Zasięgi i ośrodki występowania górskich gatunków wątrobowców w Beskidzie Żywiecko-Orawskim

Cienka pozioma linia — całkowity zasięg występowania gatunku; pozioma, pogrubiona linia — ośrodek (centrum) występowania gatunku zdefiniowany jako przedział pomiędzy kwantylami w szeregu stanowisk wysokościowych; krótka pionowa kreska — wysokość medialna w szeregu stanowisk danego gatunku

Fig. 26. Altitudinal ranges and centres of occurrence of mountain species in the Beskid Żywiecko-Orawski

The thin horizontal line shows the total range of occurrence of a species; the tick horizontal line indicates the centre of occurrence of a species (the centre is defined as an interquartile range of the altitudes of collection sites); the vertical short line indicates the median altitude of collection sites of a species

Ryc. 27. Zasięgi i ośrodki występowania niżowych i niżowo-górskich gatunków wątrobowców w Beskidzie Żywiecko-Orawskim

Fig. 27. Altitudinal ranges and centres of occurrence of lowland and lowland-mountain species in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Objaśnienia patrz Ryc. 26 (For explanations see Fig. 26)

gatunku przyjęto zakres wysokości, który obejmuje 50% środkowych stanowisk, wyznaczony na podstawie wartości medialnej szeregu i odchyień ćwiartkowych. W tym przypadku kwantyle wyznaczają wysokości, pomiędzy którymi zawarte jest 50% stanowisk środkowych. Poza centrum znajdują się stanowiska skrajne, czyli po 25% najniższych i najwyższych (Ryc. 26, 27).

W przedstawionej metodzie granice ośrodka występowania wyznaczono dla gatunków mających więcej niż pięć stanowisk oraz dla tych, których pionowy zasięg na badanym terenie kończy się bądź jest bliski wygaśnięcia. W przypadku wątrobowców bardzo rzadkich za centrum przyjęto uważać cały stwierdzony zasięg, dla gatunków o pojedynczych stanowiskach – cały 50-metrowy pas, w którym notowano dany gatunek (Ryc. 26, 27).

Ustalone ośrodki wysokościowe gatunków górskich Beskidu Żywiecko-Orawskiego są w większości zbieżne z charakterem ogólnego rozmieszczenia pionowego poszczególnych gatunków w Karpatach i Sudetach. Generalnie obserwuje się obniżenie zasięgów gatunków subalpejskich i niektórych alpejskich, wykazujących w obiekcie badań górnoreglowy typ rozmieszczenia. Związane jest to z małą powierzchnią piętra kosówki i z małym zróżnicowaniem siedlisk występujących na jego obszarze. Ponadto czynnikiem modyfikującym strefowy układ roślinności są potoki, wzdłuż których wątrobowce tej grupy „schodzą” dość nisko. Na uwagę zasługuje bardzo wyraźne obniżenie zasięgów występowania *Jungermannia subelliptica*, *Lophozia bantriensis* i *L. heterocolpos*, które w Tatrach występują głównie powyżej granicy lasu. Obserwuje się ponadto, że duża grupa gatunków reglowych i ogólnogórskich wykazuje w grupach Wielkiej Raczy i Pilska dolnoreglowy typ zasięgu. Z kolei niektóre gatunki dolnoreglowe, jak *Calypogeia suecica*, *Diplophyllum obtusifolium* i *Riccardia latifrons*, cechuje reglowy typ rozmieszczenia.

Poniżej przedstawiono podział flory wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego na lokalne elementy wysokościowe (por. Ryc. 26, 27).

Gatunki górskie

1. Gatunki reglowe: *Anastrophyllum minutum*, *Barbilophozia attenuata*, *B. lycopodioides*, *Blepharostoma trichophyllum*, *Calypogeia integristipula*, *C. suecica*, *Cephalozia leucantha*, *C. lunulifolia*, *Diplophyllum obtusifolium*, *Geocalyx graveolens*, *Jungermannia obovata*, *Lophozia bantriensis*, *L. heterocolpos*, *L. incisa*, *L. longiflora*, *L. silvicola*, *Mylia taylorii*, *Nardia scalaris*, *Pellia neesiana*, *Radula lindenbergiana*, *R. palmata*, *Scapania mucronata*, *S. umbrosa*, *Tritomaria quinquedentata*.

2. Gatunki dolnoreglowe: *Barbilophozia barbata*, *Bazzania trilobata*, *Calypogeia azurea*, *Cephalozia catenulata*, *Conocephalum conicum*, *Harpanthus scutatus*, *Jamesoniella autumnalis*, *Jungermannia atrovirens*, *J. leiantha*, *J. pumila*, *J. subelliptica*, *Lejeunea cavifolia*, *Lophozia ascendens*, *L. collaris*, *L. longidens*, *Marsupella funckii*, *Metzgeria conjugata*, *Nowellia curvifolia*, *Plagiochila porelloides*, *Porella baueri*, *Preissia quadrata*, *Riccardia multifida*, *Scapania aequiloba*, *S. irrigua*, *S. nemorea*, *S. lingulata*, *S. undulata*, *Tritomaria exsecta*.

3. **Gatunki górnoreglowe:** *Anastrophyllum hellerianum*, *Barbilophozia hatcheri*, *Frullania tamarisci*, *Jungermannia confertissima*, *J. sphaerocarpa*, *Lophozia obtusa*, *L. sudetica*, *Marsupella sprucei*, *Scapania helvetica*, *S. paludosa*, *S. subalpina*;

4. **Gatunki subalpejskie:** *Anastrepta orcadensis*, *Barbilophozia floerkei*, *Bazzania tricrenata*, *Calypogeia neesiana*, *Diplophyllum taxifolium*, *Harpanthus flotovianus*, *Lophozia wenzelii*, *Scapania parvifolia*;

Gatunki niżowo-górskie

1. **Wątrobowce z optimum rozmieszczenia w reglu dolnym:** *Calypogeia muelle-riana*, *Cephalozia lammersiana*, *Cephaloziella divaricata*, *C. rubella*, *Chiloscyphus polyanthos*, *Frullania dilatata*, *Jungermannia gracillima*, *J. hyalina*, *Lepidozia reptans*, *Lophocolea bidentata*, *L. cuspidata*, *L. heterophylla*, *Lophozia excisa*, *Marchantia polymorpha*, *Metzgeria furcata*, *Nardia geoscyphus*, *Pellia endiviifolia*, *P. epiphylla*, *Plagiochila asplenoides*, *Radula complanata*, *Scapania curta*, *Trichocolea tomentella*.

2. **Wątrobowce z optimum rozmieszczenia w reglu górnym:** *Porella platyphylla*, *Tritomaria exsecta*.

3. **Wątrobowce z optimum rozmieszczenia w piętrach reglowych:** *Aneura pinguis*, *Cephalozia bicuspidata*, *Cephaloziella hampeana*, *Chiloscyphus pallescens*, *Diplophyllum albicans*, *Ptilidium pulcherrimum*, *Riccardia latifrons*.

4. **Wątrobowce lokalnie występujące w piętrze subalpejskim:** *Cephalozia con-nivens*, *Mylia anomala*, *Ptilidium ciliare*.

5. **Wątrobowce o ogólnogórskim typie rozmieszczenia:** *Lophozia ventricosa*.

Gatunki niżowe

Wątrobowce występujące tylko w piętrze pogórza i dolnej części regła dolnego: *Anthoceros punctatus*, *Blasia pusilla*, *Fossombronina wondraczekii*, *Marchantia aquatica*, *Riccia glauca*, *R. sorocarpa*.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że większość górskich wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego lokalnie wykazuje reglowy i dolnoreglowy typ rozmieszczenia (52 gatunki — 73% flory górskiej). Ponadto żaden z gatunków lokalnie nie wykazuje rozmieszczenia ogólnogórskiego. Jak już zaznaczono wcześniej, gatunki ogólnogórskie wykazują tutaj reglowy bądź dolnoreglowy typ zasięgu. Wśród gatunków niżowo-górskich zdecydowanie przeważają wątrobowce o lokalnym, dolnoreglowym typie rozmieszczenia. Zwracają uwagę gatunki, które mają swoje stanowiska w piętrze subalpejskim. Są to wątrobowce wysokotorfowiskowe, rosnące również na kwaśnym humusie poza obszarami torfowiskowymi. W górach wysokich często spotykane są na takich siedliskach między innymi powyżej górnej granicy lasu (są to gatunki azonalne). W grupie wątrobowców niżowych wszystkie gatunki lokalnie rosną tylko w obrębie piętra pogórza i regła dolnego.

8. POZIOME ZRÓŻNICOWANIE FLORY WĄTROBOWCÓW BESKIDU ŻYWIECKO-ORAWSKIEGO

8.1. Lokalne różnice florystyczne

Podstawą analizy poziomego zróżnicowania flory jest rozmieszczenie stanowisk wątrobowców w szesnastu wyróżnionych mikroregionach (Ryc. 3; Tab. 16, 17; por. też Tab. 4 i Ryc. 29–48).

Zasadniczy wpływ na florę różnych części Beskidu Żywieckiego mają cztery czynniki: zróżnicowanie morfometryczne terenu, klimat, zróżnicowanie siedlisk oraz stopień synantropizacji szaty roślinnej i krajobrazu. Zdecydowanie najbogatszą florę, zarówno pod względem liczby gatunków górskich jak i ogólnej liczby gatunków, stwierdzono w masywie Pilska (Tab. 4, 17). Tu występuje największe zagęszczenie wątrobowców wysokogórskich oraz rzadkich i bardzo rzadkich. Pilsko wyróżnia się przez to największą odrębnością florystyczną. Na jego wierzchołku i terenach przyległych (podszczytowych) rośnie jedenaście gatunków wyłącznych. Są to w Beskidach bardzo rzadkie wątrobowce wysokogórskie: *Bazzania tricrenata*, *Diplophyllum taxifolium*, *Harpanthus flotovianus*, *Lophozia wenzelii*, *Scapania paludosa* i *S. parvifolia*, torfowiskowe: *Cephalozia connivens*, *Mylia anomala* i inne: *Harpanthus scutatus*, *Lophozia obtusa*, *Ptilidium ciliare*. Ponadto w podgrupie Pilska liczne wątrobowce mają większość swoich stanowisk.

Dużym zagęszczeniem wątrobowców górskich i w ogóle dużym bogactwem flory odznaczają się ponadto podgrupy: Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej i Romanki (Ryc. 3). Wyróżniają się one znacznym skupieniem gatunków bardzo rzadkich i rzadkich oraz wyłącznych (patrz Tab. 4, 17).

Najuboższą florę i jednocześnie najmniej gatunków górskich mają mikroregiony położone w zachodniej i północnej części rejonu badań, tj. Zabawy, Rachowca, Ożnej, Wielkiej Raczy, Suchej Góry, Prusowa, Magury, Kiczory i Kotliny Jeleśniańskiej. Flory tych podgrup mają często charakter niegórski. Na podkreślenie zasługuje ubóstwo flory Wielkiej Raczy, w której udział gatunków górskich jest również bardzo niski (Tab. 17). Prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem większych kompleksów skalnych, nieco suchszym klimatem (mniejsza ilość opadów) i dużą synantropizacją szaty roślinnej.

Lokalne różnice fizjograficzne i obfitość odpowiednich mikrosiedlisk wpływają na zagęszczenie stanowisk wątrobowców należących do różnych grup ekologicznych. Stanowiska wątrobowców naskalnych skupiają się tam, gdzie występują wilgotne, zacienione bloki skalne. Najwięcej jest ich na północno-zachodnim stoku Wielkiej Rycerzowej, północnych stokach Boraczego Wierchu i Pilska (tzw. „Skalki”) oraz w dolinie potoku Urwisko. Gatunki epiksyliczne najliczniej rosną w zbiorowiskach borowych, o dużym nagromadzeniu butwiejących kłód i pniaków i o dużej wilgotności powietrza. Takie warunki panują na północno-wschodnich zboczach Pilska (rezerwat „Pilsko”), północno-zachodnich stokach Oszusu (rezerwat

Umieszczenie stanowisk wątrobowców w mikroregionach Beskidu Żywiecko-Orawskiego
 Number of collection sites of liverworts recorded from particular parts of the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Gatunki Species	Liczba stanowisk wątrobowców w mikroregionach Number of collection sites of liverworts recorded from microregions																Razem Total
	mikroregiony grupy Wielkiej Raczy microregions of Wielka Racza Range								mikroregiony grupy Pilska microregions of Pilsko Range								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	
<i>Anastrepta orcadensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	.	.	.	.	.	8
<i>Anastrophyllum hellerianum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
<i>Anastrophyllum minutum</i>	.	.	.	.	.	2	.	.	2	2	.	.	.	.	.	2	6
<i>Aneura pinguis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	4
<i>Anthoceros punctatus</i>	1	1	.	.	.	.	2	.	.	1	3	.	.	.	1	.	5
<i>Barbilophozia attenuata</i>	.	1	1	2	.	.	6	2	4	5	27	3	.	.	.	10	41
<i>Barbilophozia barbata</i>	.	.	.	.	.	.	3	.	2	.	3	.	.	.	.	3	5
<i>Barbilophozia floerkei</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	11	.	.	.	.	.	14
<i>Barbilophozia hatcheri</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	4	.	.	.	.	.	6
<i>Barbilophozia lycopodioides</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	3	.	.	.	.	7
<i>Bazzania tricenata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	6
<i>Bazzania trilobata</i>	.	3	.	.	.	3	1	1	3	.	3	.	.	.	.	7	7
<i>Blasia pusilla</i>	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	3
<i>Blepharostoma trichophyllum</i>	1	3	4	10	3	13	16	5	11	9	43	2	.	1	.	50	71
<i>Calypogeia azurea</i>	1	12	3	10	7	18	16	9	12	6	46	1	1	2	1	67	78
<i>Calypogeia integristipula</i>	.	3	1	1	.	1	3	2	5	.	27	.	.	.	.	9	34
<i>Calypogeia muelleriana</i>	.	4	2	.	2	.	.	.	2	2	3	1	1	.	.	8	7
<i>Calypogeia neesiana</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	.	.	.	.	.	8
<i>Calypogeia suecica</i>	.	.	.	1	.	.	1	1	.	2	2	.	.	.	.	2	5
<i>Cephalozia bicuspidata</i>	3	16	6	12	10	21	20	14	18	10	74	1	5	2	1	88	125
<i>Cephalozia catenulata</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1
<i>Cephalozia connivens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
<i>Cephalozia lammersiana</i>	.	2	1	.	.	1	5	.	1	2	13	.	1	1	.	9	18
<i>Cephalozia leucantha</i>	.	.	.	1	.	1	1	1	.	.	7	.	.	.	.	3	8

<i>Cephalozia lunulifolia</i>	.	.	2	1	.	3	4	4	24	1	.	.	.	9	36
<i>Cephaloziella divaricata</i>	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	1	.	.	3	3
<i>Cephaloziella hampeana</i>	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	3
<i>Cephaloziella rubella</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Chiloscyphus pallescens</i>	1	5	1	3	.	3	3	1	12	.	1	.	1	16	20
<i>Chiloscyphus polyanthos</i>	.	8	6	8	4	13	14	6	20	.	1	1	1	53	41
<i>Conocephalum conicum</i>	1	5	2	4	1	4	12	4	4	.	.	1	2	29	21
<i>Diplophyllum albicans</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	.	1	4
<i>Diplophyllum obtusifolium</i>	.	.	.	.	.	1	.	1	5	.	.	1	.	1	8
<i>Diplophyllum taxifolium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
<i>Fossombronina wondraczekii</i>	2	2	.	.	.	.	5	2	1	5	.	.	1	9	12
<i>Frullania dilatata</i>	.	2	.	.	.	5	3	1	.	.	.	.	.	10	2
<i>Frullania tamarisci</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	1
<i>Geocalyx graveolens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	4
<i>Harpanthus flotovianus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
<i>Harpanthus scutatus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
<i>Jamesoniella autumnalis</i>	.	4	.	.	.	3	7	4	.	.	.	.	1	14	12
<i>Jungermannia atrovirens</i>	.	.	.	1	.	1	2	1	2	.	.	.	.	4	4
<i>Jungermannia confertifissima</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	3
<i>Jungermannia gracillima</i>	2	5	3	2	2	5	2	6	1	7	5	1	.	21	22
<i>Jungermannia hyalina</i>	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	1
<i>Jungermannia leiantha</i>	.	2	2	11	2	11	12	4	1	11	.	.	.	40	19
<i>Jungermannia obovata</i>	.	.	.	.	.	.	1	1	.	10	.	.	.	1	11
<i>Jungermannia pumila</i>	.	.	1	7	1	7	2	4	2	10	.	.	.	18	18
<i>Jungermannia sphaerocarpa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	1	14
<i>Jungermannia subelliptica</i>	.	.	.	2	.	.	3	2	1	2	.	.	.	5	5
<i>Lejeunea cavifolia</i>	.	.	.	.	.	1	2	1	3	6	.	.	.	3	13
<i>Lepidozia reptans</i>	.	8	4	8	4	16	20	7	10	6	33	4	2	60	63
<i>Lophocolea bidentata</i>	3	9	6	3	.	4	12	5	4	1	6	2	2	37	25
<i>Lophocolea cuspidata</i>	1	2	1	.	.	.	3	3	1	.	3	1	1	7	10
<i>Lophocolea heterophylla</i>	5	13	7	13	10	24	19	11	16	11	44	5	2	91	97
<i>Lophozia ascendens</i>	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	1	3
<i>Lophozia bantriensis</i>	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	2	.	.	2	4
<i>Lophozia collaris</i>	.	.	1	.	.	.	3	.	.	2	.	.	.	4	2
<i>Lophozia excisa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
<i>Lophozia heterocolpos</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	2

Gatunki Species	Liczba stanowisk wątrobowców w mikroregionach Number of collection sites of liverworts recorded from microregions																Razem Total		
	mikroregiony grupy Wielkiej Raczy microregions of Wielka Racza Range								mikroregiony grupy Pilska microregions of Pilsko Range										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI			
	W	P																	
<i>Lophozia incisa</i>	.	.	.	.	.	1	1	1	4	1	11	.	.	.	.	.	2	17	
<i>Lophozia longidens</i>	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	3	.	.	.	.	.	2	4	
<i>Lophozia longiflora</i>	.	.	.	1	.	1	1	2	1	4	8	.	.	.	.	.	3	15	
<i>Lophozia obtusa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	
<i>Lophozia silvicola</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	2	
<i>Lophozia sudetica</i>	.	1	1	1	1	2	.	.	6	4	27	.	.	1	.	.	5	38	
<i>Lophozia ventricosa</i>	.	2	3	2	1	3	6	2	9	7	45	3	.	1	.	.	17	67	
<i>Lophozia wenzelii</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	4	
<i>Marchantia aquatica</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
<i>Marchantia polymorpha</i>	.	1	.	.	.	2	.	1	1	.	1	.	1	1	.	.	3	6	
<i>Marsupella funckii</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	2	
<i>Marsupella sprucei</i>	.	.	.	.	.	3	.	.	1	2	3	.	.	.	.	.	3	6	
<i>Metzgeria conjugata</i>	.	.	.	.	.	1	1	1	3	3	5	.	.	.	.	.	2	12	
<i>Metzgeria furcata</i>	.	3	2	5	2	5	7	3	6	3	6	.	1	.	.	.	24	19	
<i>Mylia anomala</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	
<i>Mylia taylorii</i>	.	.	.	3	.	1	1	1	2	2	19	.	.	.	.	.	5	24	
<i>Nardia geoscyphus</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	2	
<i>Nardia scalaris</i>	1	7	1	.	3	2	1	.	6	.	12	2	4	1	.	.	15	25	
<i>Nowellia curvifolia</i>	.	.	1	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	
<i>Pellia endiviifolia</i>	.	2	1	3	1	2	10	3	3	.	6	1	.	.	.	2	19	15	
<i>Pellia epiphylla</i>	1	6	4	8	3	10	7	4	6	7	20	1	2	2	1	1	39	44	
<i>Pellia neesiana</i>	1	3	3	1	.	5	8	4	4	1	21	2	.	.	.	.	21	31	
<i>Phaeoceros laevis</i>	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	3	2	
<i>Plagiochila asplenoides</i>	1	2	4	4	.	3	8	3	2	1	4	1	.	.	.	.	22	11	
<i>Plagiochila porolloides</i>	1	4	4	9	2	15	16	3	9	11	26	.	2	.	1	1	51	53	
<i>Porella baueri</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
<i>Porella platyphylla</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	2

<i>Preissia quadrata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2
<i>Ptilidium ciliare</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
<i>Ptilidium pulcherrimum</i>	.	4	3	2	1	11	9	4	11	7	37	3	1	.	.	.	.	30	63
<i>Radula complanata</i>	.	.	1	2	1	3	3	.	3	1	1	.	.	.	.	.	.	10	5
<i>Radula lindenbergiana</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	1	5
<i>Riccardia latifrons</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	1	6
<i>Riccardia palmata</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1
<i>Riccia glauca</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Riccia sorocarpa</i>	1	2	.	.	.	.	3	1	.	1	5	3	.	.	.	.	1	6	11
<i>Riccardia multifida</i>	.	.	1	.	1	2	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	5	3
<i>Scapania aequiloba</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
<i>Scapania curta</i>	2	.	1	.	1	2	3	4	2	.	2	1	1	.	.	.	9	10	.
<i>Scapania helvetica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	4
<i>Scapania irrigua</i>	1	.	1	.	.	1	2	1	3	.	2	1	.	.	.	.	.	5	10
<i>Scapania lingulata</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Scapania mucronata</i>	1	.	.	.	.	.	1	2	2	.	5	.	.	.	.	.	.	2	10
<i>Scapania nemorea</i>	.	3	3	2	2	3	8	1	5	4	13	.	1	.	.	.	.	21	24
<i>Scapania paludosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Scapania parvifolia</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Scapania subalpina</i>	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	1	6
<i>Scapania umbrosa</i>	.	.	1	3	1	4	.	1	2	3	23	.	.	.	.	.	.	9	29
<i>Scapania undulata</i>	.	8	6	15	4	14	3	3	8	7	32	.	.	.	.	.	.	50	51
<i>Trichocolea tomentella</i>	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
<i>Tritomaria exsecta</i>	.	.	2	5	2	6	5	5	5	7	25	.	1	.	.	.	.	20	43
<i>Tritomaria exsectiformis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<i>Tritomaria quinqueidentata</i>	.	.	.	.	.	1	2	1	3	1	5	1	.	.	.	.	.	3	11

Objaśnienia (Explanations): Mikroregiony grupy Wielkiej Raczcy (Microregions of Wielka Racza Range): I — Zabawa; II — Rachowiec; III — Ożna; IV — Wielka Racza; V — Będoszka; VI — Wielka Ryczowska; VII — Osusz; Mikroregiony grupy Pilska (Microregions of Pilsko Range): VIII — Krawców Wierch; IX — Lipowska; X — Romanka; XI — Pilsko; XII — Sucha Góra; XIII — Prusów; XIV — Magura; XV — Kiczora; XVI — Kotlina Jelesniańska; W — łącznie grupa Wielkiej Raczcy (total Wielka Racza Range); P — łącznie grupa Pilska (total Pilsko Range)

Tabela 17 — Table 17

Liczba gatunków i ich stanowisk w poszczególnych mikroregionach Beskidu Żywiecko-Orawskiego
 Number of species and its site collections of mountain, lowland-mountain and lowland liverworts recorded from particular parts of the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Mikroregiony Microregions	Liczba gatunków Number of species				Liczba stanowisk gatunków Number of collection sites of species			
	łączna total	górskich mountain	niżowo- górskich lowland- mountain	niżowych lowland	łączna total	górskich mountain	niżowo- górskich lowland- mountain	niżowych lowland
Grupa Wielkiej Raczy Wielka Racza Range	82	49 (59,8%)	26 (31,7%)	7 (8,5%)	1127	525 (46,6%)	582 (51,6%)	20 (1,8%)
Zabawa	20	8 (40,0)	9 (45,0)	3 (15,0)	31	8 (25,8)	19 (61,3)	4 (12,9)
Rachowiec	37	13 (35,1)	19 (51,4)	5 (13,5)	160	58 (36,3)	95 (59,3)	7 (4,4)
Ożna	40	19 (47,5)	20 (50,0)	1 (2,5)	98	39 (39,8)	58 (59,2)	1 (1,0)
Wielka Racza	39	23 (59,0)	16 (41,0)	0	171	94 (55,0)	77 (45,0)	0
Będoszka	30	15 (50,0)	14 (46,7)	1 (3,3)	76	32 (42,1)	43 (56,6)	1 (1,3)
Wielka Rycerzowa	52	33 (63,5)	19 (36,5)	0	267	133 (49,8)	134 (50,2)	0
Oszus	64	41 (64,1)	19 (29,7)	4 (6,2)	324	161 (49,7)	156 (48,1)	7 (2,2)
Grupa Pilsko Pilsko Range	110	70 (63,6%)	35 (31,8%)	5 (4,5%)	1673	938 (56,1%)	702 (42,0%)	33 (1,9%)
Krawców Wierch	52	33 (63,5)	16 (30,8)	3 (5,7)	147	70 (47,6)	73 (49,7)	4 (2,7)
Lipowska	69	42 (60,9)	26 (37,7)	1 (1,4)	264	142 (53,8)	120 (45,5)	2 (0,7)
Romanka	53	34 (64,1)	16 (30,2)	3 (5,7)	168	99 (58,9)	66 (39,3)	3 (1,8)
Pilsko	95	63 (66,3)	27 (28,4)	5 (5,3)	951	581 (61,1)	355 (37,3)	15 (1,6)
Sucha Góra	22	9 (40,9)	12 (54,5)	1 (4,6)	47	16 (34,0)	28 (58,6)	3 (6,4)
Prusów	22	5 (22,7)	17 (77,3)	0	37	9 (24,3)	28 (75,7)	0
Magura	20	9 (45,0)	11 (55,0)	0	27	12 (44,4)	15 (55,6)	0
Kiczora	9	4 (44,4)	4 (44,4)	1 (11,2)	10	5 (50,0)	4 (40,0)	1 (10,0)
Kotlina Jeleńiańska	17	3 (17,6)	9 (52,9)	5 (29,5)	22	4 (18,2)	13 (59,1)	5 (22,7)

„Oszaśt”), zachodnich stokach Krawcowego Wierchu i Jaworzyny oraz w szczytowych partiach Lipowskiej, Romanki i Rycerzowej. Niektóre epiksylity częściej rosną tylko w dolinach i na brzegach potoków, np. *Jungermannia leiantha*, *Mylia taylorii*, *Riccardia latifrons*, *R. palmata*.

Epifity najczęściej spotyka się na starych pniach buków i jaworów (pozostałościach po pierwotnej puszczy karpackiej) w dolinach potoków. Ponadto większe ich skupienia występują w buczynie karpackiej, spotykanej w rezerwatach przyrody „Oszaśt” i „Pod Rysianką” oraz na stokach Rycerzowej, Kikuli i Rachowca.

Gatunki naziemne, charakterystyczne dla górnoregłowego boru świerkowego rosną na stokach Pilska, Lipowskiej i Romanki w grupie Pilska oraz na stokach Oszusu w grupie Wielkiej Raczy.

W badanej florze zdecydowanie dominują gatunki acydofilne, niewiele jest natomiast gatunków przywiązanych do siedlisk obojętnych i zasadowych. Dlatego też interesujące są dane o rozmieszczeniu wątrobowców wapieniolubnych, które w Beskidzie Żywieckim są rzadkie. Stanowiska *Aneura pinguis*, *Jungermannia atrovirens*, *Lophozia collaris*, *L. bantriensis*, *Pressia quadrata* i *Scapania aequiloba* grupują się tylko w kilku rejonach, co pozostaje w związku z większą zasobnością w węglan wapnia ich siedlisk. Do rejonów tych należą: okolice Glinki (doliny potoków Smerkówka Wielka i Mała), dolina potoku Bystra, obszary źródłiskowe położone na Halach Cudzychowej i Cebula, dolina potoku Buczynka, doliny potoków Glinny i Sopotnia Mała. Występujące na Hali Cebula eutroficzne młaki z *Allium sibiricum* i *Sweetia perennis* żywią nie tylko wymienione wcześniej wątrobowce wapieniolubne, ale również bardzo rzadkie w Karpatach Zachodnich gatunki *Harpanthus flotovianus*, *Scapania helvetica* i *S. paludosa* oraz *Riccardia multifida* — rzadki w Beskidach.

Bardzo wyraźny wpływ na lokalne zróżnicowanie flory wywierają doliny potoków. Panujące tam zacielenie i duża wilgotność stwarzają swoisty mikroklimat wybitnie sprzyjający rozwojowi wątrobowców. W dolinach spotyka się ponadto duże zróżnicowanie siedlisk; tu znajdują się największe powierzchnie nagich skał, liczne odsłonięcia gleby na skarpach, duże nagromadzenie butwiejącego, wilgotnego drewna, wysięki i młaki, ziołorośla i inne mikrosiedliska. Warunki ekologiczne występujące w dolinach potoków decydują o tym, że flora tych miejsc jest najbogatsza. O niektórych aspektach rozmieszczenia wątrobowców w potokach pisano już w rozdziale 6.2.3. Szczególnym bogactwem flory wyróżniają się doliny potoków w podgrupach Oszusu, Krawcowego Wierchu i Pilska; są to zwłaszcza doliny Smerkówki Małej i Wielkiej, Cebuli, Buczynki i Glinnego. Spotyka się w nich wiele gatunków bardzo rzadkich, np. *Jungermannia atrovirens*, *J. subelliptica*, *Lophozia bantriensis*, *Riccardia latifrons*, *R. palmata*. Szczególnie interesująca pod tym względem jest dolina potoku Glinny, spływającego z północno-wschodnich stoków Pilska. W dolinie tej rośnie wiele wysokogórskich gatunków nie spotykanych gdzie indziej. Warto zaznaczyć, że uboższe są flory dolin potoków rejonów północnych i zachodnich. W ich skład wchodzi przede wszystkim gatunki pospolite.

Doliny potoków wpływają dość wyraźnie na przesunięcia pionowych granic zasięgowych gatunków. Dowodem wędrówek wątrobowców górskich, zwłaszcza potokowych i naskalnych, w niższe położenia są stanowiska: *Jungermannia obovata* w dolinie Smerkówki Wielkiej (745 m n.p.m.) i Cebuli (840 m), *Lophozia sudetica* w dolinie Bystrej (560 m), *Morsupella sprucei* w dolinie Danielki (850 m), *Radula lindenberghiana* w dolinie Sopotni Wielkiej (865 m), *Scapania mucronata* w dolinie Ślanicy (525 m) i *S. subalpina* w dolinie Rycerki (670 m). Obserwuje się również zjawisko „wchodzenia” w wyższe położenia gatunków niżowych, niżowo-górskich i górskich dolnoreglowych, np. *Fossombronia wondraczekii* wzdłuż Milowskiego Potoku (850 m), *Pellia epiphylla* i *Riccardia latifrons* wzdłuż potoku Cebula (1215 m), *Phaeoceros laevis* wzdłuż potoku Cicha (725 m) oraz *Riccia sorocarpa* wzdłuż Glinki (755 m).

Należy podkreślić, że doliny potoków są głównym miejscem występowania niektórych wątrobowców naskalnych (*Diplophyllum albicans*, *D. obtusifolium*, *Lophozia collaris*, *Marsupella sprucei*, *Metzgeria conjugata* i *Scapania aequiloba*), epiksylitów (*Calypogeia suecica*, *Cephalozia catenulata*, *C. leucantha*, *Jungermannia leiantha*, *Lophozia ascendens*, *Mylia taylorii*, *Nowellia curvifolia*, *Riccardia latifrons* czy *R. palmata*) i epifitów (*Frullania dilatata*, *Metzgeria furcata*, *Radula complanata*). Do wymienionych grup należy jeszcze dodać wiele wątrobowców potokowych, ziołoroślowych i źródłiskowych, dla których doliny są typowym miejscem występowania.

8.2. Porównanie flor wątrobowców grup Wielkiej Raczy i Pilska

Odmienność porównywanych grup górskich, wyrażająca się w fizjografii, klimacie, bogactwie form skalnych i wreszcie w wysokości głównych masywów, znajduje swój wyraz w dość znacznych różnicach składu gatunkowego. Flora grupy Pilska jest znacznie bogatsza, liczy 110 gatunków, z których 69% to taksony górskie (Tab. 17); większy jest także udział stanowisk wątrobowców górskich (ponad 56% ogólnej ich liczby). Pilsko wyróżnia 31 gatunków nie znalezionych w grupie Wielkiej Raczy. Są to przede wszystkim rośliny wysokogórskie (subalpejskie i alpejskie), rosnące tutaj zwykle na szczycie lub w partiach przyszczytowych: *Anastrepta orcadensis*, *Barbilophozia floerkei*, *B. hatcheri*, *Bazzania tricenata*, *Diplophyllum taxifolium*, *Harpanthus flotovianus*, *Jungermannia confertissima*, *Lophozia heterocolpos*, *L. wenzelii*, *Scapania helvetica*, *S. paludosa* i *S. parvifolia*. Podkreślają one wysokogórski charakter masywu Pilska. Występują także rzadkie wątrobowce górskie, należące do różnych grup ekologicznych: *Barbilophozia lycopodioides*, *Calypogeia neesiana*, *Geocalyx graveolens*, *Harpanthus scutatus*, *Lophozia excisa*, *L. obtusa*, *L. silvicola*, *Porella baueri*, *Peissia quadrata*, *Scapania lingulata*, *Sphenobolus hellerianus* i *Tritomaria exsectiformis*, niżowo-górskie, rosnące w piętrze kosówki na kwaśnym humusie w borówczyskach: *Cephalozia connivens*, *Mylia anomala* i *Ptilidium ciliare*, oraz inne rzadkie rośliny niegórskie: *Aneura pinguis*, *Cephaloziella hampeana*, *C. rubella* i *Porella platyphylla*.

Flora grupy Wielkiej Raczy liczy 82 gatunki, z czego taksony górskie stanowią 66% (Tab. 17). W porównaniu do grupy Pilska, większy jest tu udział stanowisk wątrobowców niegórskich – niżowych i niżowo-górskich (Tab. 17). Grupę wyróżniają pozytywnie tylko trzy taksony, nie znalezione w grupie Pilska, mianowicie: *Marchantia aquatica*, *Riccia glauca* i *Trichocolea tomentella*.

Flory porównywanych regionów mają 79 gatunków wspólnych, przy czym dostrzega się różnice w stopniu rozpowszechnienia tych roślin na terenie obu grup. Znacznie częstszymi w grupie Pilska są gatunki wysokogórskie (*Jungermannia obovata*, *J. sphaerocarpa*, *Radula lindenbergiana* i *Scapania subalpina*), naskalne (*Diplophyllum obtusifolium*, *Lejeunea cavifolia*, *Lophozia sudetica*, *Metzgeria conjugata*, *Scapania mucronata* i *S. umbrosa*), epiksyliczne (*Cephalozia leucantha*, *C. lunulifolia*, *Lophozia guttulata*, *L. incisa*, *Mylia taylorii* i *Riccardia latifrons*) oraz niektóre leśne wątrobowce naziemne (*Calypogeia integristipula*, *Lophozia ventricosa*, *Tritomaria quinquedentata*) i epifity (*Barbilophozia attenuata*, *Ptilidium pulcherrimum*). Natomiast w grupie Wielkiej Raczy częstsze są niektóre epifity (*Frullania dilatata*, *Metzgeria furcata* i *Radula complanata*) oraz epiksyty *Jungermannia leiantha*.

Z przytoczonych wyżej danych wynika, że flora Wielkiej Raczy, w przeciwieństwie do Pilska, ma charakter flory gór niskich. Odrębność florystyczna obu grup uwarunkowana jest, jak się wydaje, niektórymi odmiennymi właściwościami klimatu oraz zróżnicowaniem morfometrycznym. Grupa Wielkiej Raczy charakteryzuje się korzystniejszymi warunkami termicznymi i mniejszą ilością opadów. Z kolei grupa Pilska (zwłaszcza rejony południowe grupy) ma klimat typowo górski, o niższej średniej temperaturze rocznej, większej ilości opadów, dłuższym zaleganiu pokrywy śnieżnej i krótszym okresie wegetacyjnym. Ponadto niewątpliwym wpływem na tak wybitne różnice florystyczne ma dostępność niektórych siedlisk, zwłaszcza naskalnych, o czym świadczy stopień rozpowszechnienia gatunków z różnych grup ekologicznych.

8.3. Różnice florystyczne mikroregionów Beskidu Żywiecko-Orawskiego

Różnice w rozmieszczeniu poszczególnych grup gatunków oraz w bogactwie i składzie flor mniejszych masywów górskich (mikroregionów – podgrup) omówiono już częściowo w rozdziale 8.1 (Tab. 17).

Podgrupy Wielkiej Rycerzowej i Oszustu pod względem florystycznym są bliższe podgrupom Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki i Pilska. Na obszarze tych mikroregionów występują 43 gatunki (38% całości flory; patrz rozdz. 8.1) ograniczone swoim występowaniem tylko do nich np. *Anastrophyllum minutum*, *Barbilophozia barbata*, *Lejeunea cavifolia*, *Lophozia ascendens*, *L. bantriensis*, *L. incisa*, *L. longidens*, *Marsupella funkii*, *M. sprucei* i *Metzgeria conjugata*. Ponadto wyróżniają się one gatunkami mającymi tutaj wyraźne zagęszczenie stanowisk, np. *Barbilophozia attenuata*, *Bazzania trilobata*, *Cephalozia lammersiana*, *C. lunulifolia*, *Jamesoniella autumnalis* i *Scapania mucronata*.

Opierając się na podobieństwie flor poszczególnych podgrup Beskid Żywiecko-Orawski można podzielić na pięć regionów florystycznych (por. Ryc. 3):

I. Region zachodni, obejmujący podgrupy Zabawy, Rachowca, Ożnej, Wielkiej Raczy i Będoszek.

II. Region południowy, obejmujący podgrupy Wielkiej Rycerzowej, Oszusa, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej i Romanki.

III. Region Pilska, obejmujący tylko podgrupę Pilska.

IV. Region północny z podgrupami Sucheje Góry, Prusowa, Magury i Kiczory.

V. Region Kotliny Jeleśniańskiej.

Regiony zachodni, północny i Kotliny Jeleśniańskiej wyróżniają się negatywnie brakiem gatunków występujących w regionach południowym i Pilska. Przedstawiają one ciąg terenów o malejącym zróżnicowaniu gatunkowym flory wątrobowców. Jedynie region zachodni wyróżnia się pozytywnie obecnością trzech niegórskich wątrobowców, *Marchantia aquatica* — w podgrupie Ożnej, *Riccia glauca* — w podgrupie Rachowca i *Trichocolea tomentella* — w podgrupie Wielkiej Raczy, których nie znaleziono w pozostałych grupach. Ponadto region zachodni jest znacznie bogatszy florystycznie od regionów północnego i Kotliny Jeleśniańskiej, która z kolei jest najuboższa florystycznie.

Zubożenie flory wątrobowców omawianych regionów uwarunkowane jest zapewne mniej sprzyjającymi dla większości wątrobowców właściwościami klimatu. Ponadto są to regiony o niemal zupełnie zniszczonej naturalnej szacie roślinnej.

O bogactwie flory danego regionu, zwłaszcza flory górskiej i jej zróżnicowaniu ekologicznym w dużym stopniu decyduje położenie. Im głębiej dany region położony jest w łuku Beskidu Żywieckiego, tym flora jest bogatsza. Podobne spostrzeżenia poczyniła BIAŁECKA (1982) badając florę roślin naczyniowych Pilska.

9. PRZEGLĄD FLORY WĄTROBOWCÓW

9.1. Objaśnienie stanowisk

W celu umożliwienia jednoznacznej lokalizacji stanowisk cytowanych w wykazie gatunków, punkty badawcze ponumerowano od 1 do 239, z zachodu na wschód w dwunastu pasach biegnących równoleżnikowo, i naniesiono na mapę (Ryc. 28). Pojęcie „stanowisko” potraktowano w ujęciu bardzo wąskim, jako wystąpienie (por. Rozdz. 4). Nazewnictwo geograficzne przyjęto według mapy turystycznej *Beskid Śląski i Żywiecki* (1982) w skali 1:75 000. W nielicznych przypadkach użyto nazw podanych na mapach topograficznych w skali 1:25 000. Na mapę nie naniesiono stanowisk podanych przez REHMANA (1864, 1866), KRUPĘ (1879, 1882) i KULESZĘ (1920) ze względu na brak dokładnej lokalizacji.

Ryc. 28. Lokalizacja stanowisk wątrobowców

Fig. 28. Location of collection sites of liverworts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range

Wykaz stanowisk i grup stanowisk (patrz Ryc. 28)

List of collection sites (see Fig. 28)

Objaśnienia skrótów (Key): dol. — dolina (valley); pot. — potok (stream); zb. — stok (slope).

1. Świnna, 410 m n.p.m.;
2. Świnna, wzniesienie na W od przysiółka Grzegorzkiwie, 525 m;
3. Jeleśnia Mutne, przy ujściu Sopotni Wielkiej do Koszarawy, 420 m;
4. Juszczyna, dol. pot. Juszczynka, 535 m;
5. Góra Jastrzębica, zb. E, 660 m;
6. Sopotnia Mała, dol. pot. Sopotnia Mała, 470 m;
7. Sopotnia Mała Szymury,

przy połączeniu się pot. Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka, 475 m; **8.** Jeleśnia Rówienki Nabrzyskie, 460 m; **9.** Bystra Bugaj, dol. pot. Bystra, 560 m; **10.** Sopotnia Mała Zubrula, dol. pot. Sopotnia Mała, 570–590 m; **11.** Sopotnia Wielka, NE zb. góry Łazy, 570 m; **12.** Sopotnia Wielka Średniówka, 570 m; **13.** Krzyżowa, dol. pot. Krzyżówka, 520 m; **14.** Żabnica Mała, dol. pot. Żabnica, 470 m; **15.** Palenica, N zb., 550–570 m; **16.** Palenica, pod szczytem i szczyt, 650–686 m; **17.** Żabnica Duża, SW zb. Abrahamowa (kamieniołom), 500 m; **18.** Sopotnia Wielka, dol. pot. Sopotnia Wielka (wodospad), 610 m; **19.** Sopotnia Wielka Ryszkówki, dol. pot. Sopotnia Wielka, 655 m; **20.** Kamienna, dol. pot. Glinny, 600–620 m; **21.** Milówka, 550 m; **22.** Prusów, N zb. pod szczytem, 980–1010 m; **23.** Żabnica Duża Skalka, przy ujściu pot. Romanka do Żabnicy, 605 m; **24.** Żabnica Duża Bastówka, dol. pot. Romanka, 665 m; **25.** Żabnica Duża Płone, dol. pot. Romanka, 740 m; **26.** Romanka, NW zb., dol. pot. Romanka, 850 m; **27.** Romanka, NW zb., dol. pot. Romanka, 1060 m; **28.** Romanka, pod szczytem i szczyt 1320–1366 m; **28a.** Romanka, NW zb., 1280 m; **29.** Romanka, S zb., 1220–1260 m; **30.** Romanka, E zb. N ramienia, źródła pot., 1285 m; **31.** Trzy Kopce, N zb., dol. pot. Sopotnia Wielka, 825 m; **32.** Sopotnia Wielka Kolonia, dol. pot. Sopotnia Wielka, 740 m; **33.** Sopotnia Wielka Kolonia, dol. pot. Cebula, 815–825 m; **34.** dol. pot. Cebula, N zb. Palenicy, Las u Kohuciej Budy, 840 m; **35.** Buczynka, NEE zb., źródłiska pot. Buczynka, 1150 m; **36.** Buczynka, NE zb., dol. pot. Buczynka, 940–975 m; **37.** Buczynka, NE zb., dol. pot. Buczynka, 880–900 m; **38.** Malarka, SE zb., dol. pot. Buczynka, 875–900 m; **39.** dol. pot. Buczynka, 820–850 m; **40.** dol. pot. Buczynka, 780 m; **41.** NW zb. NNE ramienia Pilska, poniżej Polany Buczynka, 910–930 m; **42.** Korbielów, dol. pot. Buczynka, 675–690 m; **43.** dol. pot. wypływającego spod Hali Miziowej, 830 m; **44.** Kamienna, za Jurkową, dol. pot. wypływającego spod Hali Miziowej, 740 m; **45.** Kamienna, przy drodze na przeł. Glinne, 680 m; **46.** dol. pot. Glinny, 720 m; **47.** Nieledwia, W zb. Zabawy, 575 m; **48.** Nieledwia, 485 m; **49.** Sucha Góra, szczyt, 1040 m; **50.** Sucha Góra, NE zb., 950 m; **51.** Sucha Góra, NE zb., 1000–1020 m; **52.** NE zb. Suchej Góry, 885 m; **53.** Żabnica Duża Ormancówka, powyżej Hali Boracza, 850–870 m; **54.** Hala Cukiernica Niżna, 875 m; **55.** Boraczy Wierch, N zb., Kobyłe Młaki, 1020 m; **56.** Boraczy Wierch, N stok, Kobyłe Młaki, 1100–1110 m; **57.** Żabnica Duża Brandysia, N zb. Boraczej, 710 m; **58.** Boracza, N zb., źródła pot., 1090 m; **59.** Lipowska, NW zb., 1225 m; **60.** Lipowska, szczyt, 1280–1324 m; **61.** Lipowska, SE zb., 1125 m; **62.** Rysianka, NNE zb., Hala Pawlusia, źródła pot., 1150 m; **63.** Hala Rysianka, SE zb. Rysianki, 1175–1215 m; **64.** Hala Rysianka, SE zb. Rysianki, 1130–1150 m; **65.** Rysianka, NE zb., 1075 m; **66.** Polana Rysianka, 950 m; **67.** NE zb. Rysianki, przy połączeniu się pot. wypływających spod Hali Rysianki i Hali Wieprzkiej, 865 m; **68.** Trzy Kopce, NW zb., rez. „Rysianka”, 1000–1050 m; **69.** Trzy Kopce, W zb., 1150–1175 m; **70.** Trzy Kopce, NW zb., 950–975 m; **71.** Trzy Kopce NW zb., rez. „Rysianka”, 1100 m; **72.** koło Hali Marszałkowej, 950–1000 m; **73.** na W od Hali Marszałkowej, 1170 m; **74.** na W od Hali Cudzychowej, 1330 m; **75.** dol. pot. Cebula, 945 m; **76.** dol. pot. Cebula, 980 m; **77.** dol. pot. Cebula, 1050 m; **78.** dol. pot. Cebula, 1130–1160 m;

79. Hala Cudzychowa, dol. pot. Cebula, 1215–1220 m; 80. dol. pot. Cebula 1260–1270 m; 81. Szczawina, N zb., 1200 m; 82. Szczawina, N zb. 1260–1330 m; 83. między Halą Cebula a Halą Cudzychową przy szlaku turystycznym, 1275 m; 84. NW ramię Pilska, „Skałki” koło Hali Jodłowcowej, 1235 m; 85. Pilsko, NW zb., Hala Cebula, 1260–1275 m; 86. N zb. N ramienia Pilska, koło Polany Górowej, 1180–1190 m; 87. w pobliżu Hali Buczynka, 1235–1260 m; 88. Pilsko, N zb., Hala Miziowa, 1330–1350 m; 89. Pilsko, W, NW i NWW zb., 1260–1380 m; 90. Pilsko, NW zb. 1390–1420 m; 91. dol. pot. wypływającego spod Hali Miziowej, 1120 m; 92. dol. pot. wypływającego spod Hali Miziowej, 925 m; 93. Pilsko, N zb., Hala Miziowa, 1270–1310 m; 94. Pilsko, N zb., 1350–1390 m; 95. Pilsko, N zb., 1400–1420 m; 96. Pilsko, N zb., 1450–1480 m; 97. Pilsko, pod szczytem, 1500–1540 m; 98. Pilsko, NEE zb., 1440–1475 m; 99. Pilsko, NEE zb., rez. „Pilsko”, 1300–1385 m; 100. Pilsko, NEE zb., rez. „Pilsko”, 1250–1285 m; 101. Pilsko, NE zb., dol. pot. Glinny, 1350 m; 102. Pilsko, zb. NE, dol. pot. Glinny, 1175 m; 103. Pilsko, NEE zb., 1200–1225 m; 104. Pilsko, NE zb., dol. pot. Glinny, 1050–1100 m; 105. Pilsko, NE zb., dol. pot. Glinny, 1225–1230 m; 106. dol. pot. Glinny, 1150 m; 107. Przeł. Glinne, 800–815 m; 108. Rachowiec, N zb., 785 m; 109. NE zb. Rachowca, rez. „Butorza”, 650–675 m; 110. NE zb. Rachowca, rez. „Butorza”, 600–640 m; 111. Sól Kiczora, dol. pot. Roztoki, 570 m; 112. Sól Szpaki, 555 m; 113. Nieledwia Madejka, 665 m; 114. Rajcza Kukuków, 515–525 m; 115. Rajcza Dziaski, E zb., Suchej Góry, 775 m; 116. Rajcza Kukuków, 600 m; 117. Boraczy Wierch, W zb., 1025 m; 118. N zb. W ramienia Lipowskiej, Hala Bieguńska, 1170 m; 119. Złatna Huta, dol. pol. Bystra, 750–775 m; 120. Złatna Huta, Na Szeroki Kamień, dol. pot. Bystra, 790–825 m; 121. Złatna, Na Szeroki Kamień, 825 m; 122. Złatna Huta, Las Złatnice, 925 m; 123. Magurka, W zb., źródła pot. Bystra, 1100–1135 m; 124. Zwardoń, 660 m; 125. Sól Gomułka, dol. pot. Sól, 635 m; 126. Sól, U Wojciecha, 605 m; 127. Rachowiec, szczyt, 920–950 m; 128. Rachowiec, E zb., 860–870 m; 129. Rachowiec, E zb., 770–810 m; 130. Rachowiec, E zb., 660–680 m; 131. Sól (centrum), 580 m; 132. Sól, U Płowuchy, 525 m; 133. Rycerka Dolna, koło stacji kolejowej, 505–525 m; 134. Hutyrów, szczyt, 744 m; 135. Złatna Ciapkówka, dol. pot. Bystra, 615 m; 136. Złatna Jastrzębie, dol. pot. Straceniec, 675 m; 137. Krawców Wierch, SW ramię, dol. pot. Straceniec, 760 m; 138. Sól Graniczne, między Skalanką a Beskidem Wrzeszczem, E zb., 750 m; 139. Beskid Wrzeszcz, szczyt, 860 m; 140. Rycerka Górna Wodziak, dol. pot. Radecki, 755 m; 141. Rycerka Górna Jancyki, dol. pot. Radecki, 670 m; 142. Rycerka Górna Harenzowie, dol. pot. Rycerka, 615 m; 143. Rycerka Górna Płaskonkowie, 555 m; 144. Rycerka Górna Harmatowie, dol. pot. Rycerki, 585–600 m; 145. Urówka, N zb., 725 m; 146. Ujsoły Świniarka, dol. pot. Danielka, 650 m; 147. Ujsoły Tanistry, przy ujściu pot. Danielka do Ujsoły, 560 m; 148. Ujsoły, ujście pot. Cicha do Ujsoły, 575–590 m; 149. Glinka, SW zb. Kubiesówki, 620–630 m; 150. Glinka Wojniaczka, 625 m; 151. Glinka, W zb. Długiego Gronia, 890 m; 152. Glinka, Polana Pogwarówka, 920–950 m; 153. dol. pot. Glinka, poniżej Polany Piekiełko, 685 m; 154. Krawców Wierch, NW zb., źródła pot. Straceniec, 1000–1030 m; 155. Krawców Wierch, W zb., pod szczytem, 1050–1060 m;

156. W zb. Jaworzyny, koło Polany Morowka, 1015–1045 m; **157.** dol. pot. Glinka, poniżej przeł., 755 m; **158.** Przeł. Glinka (Ujsolska), 825–840 m; **159.** Kikula, E zb., źródła pot. Radecki, 1025 m; **160.** Kikula, SW zb., 950 m; **161.** Magura, SE zb., 1000 m; **162.** źródła pot. Plaskórowka, 880 m; **163.** Rycerka Górna Podściągów, 775 m; **164.** Rycerka Górna Kolonia, dol. pot. Rycerka, 670 m; **165.** Praszywka Wielka, szczyt, 1040 m; **166.** Praszywka Mała, W zb., 925 m; **167.** Rycerka Górna Rycerki, dol. pot. Rycerki, 620 m; **168.** Rycerka Górna Skomisko, dol. pot. Rycerki, 705 m; **169.** N zb. Młodej Hory, koło przysiółka Młoda Hora, 825–875 m; **170.** NW zb. N ramienia Rycerzowej, powyżej przysiółka Młoda Hora, 885–900 m; **171.** Ujsoły Danielka, dol. pot. Danielka, 725 m; **172.** Ujsoły, poniżej przysiółka Młoda Hora, dol. pot. Danielka, 775 m; **173.** Ujsoły, Młoda Hora, dol. pot. Danielka, 810 m; **174.** N zb. Rycerzowej, dol. pot. Danielka, 850 m; **175.** Muńcuł, SE zb., źródła pot., 890 m; **176.** Soblówka Kiebasówka, 630 m; **177.** Soblówka, dol. pot. Cicha, 640 m; **178.** Glinka Smereków, dol. pot. Smerkówka Wielka, 655 m; **179.** dol. pot. Smerkówka Wielka, 745 m; **180.** Glinka Worniczki, dol. pot. Smerkówka Mała, 720 m; **181.** dol. pot. Smerkówka Mała, 775 m; **182.** dol. pot. Smerkówka Mała, Las ku Zimnej Wodzie, 850 m; **183.** NW zb. Smerekowa Małego, 950 m; **184.** Przysłop Mały, E zb., 900–930 m; **185.** Wielki Przysłop, SE zb., 970 m; **186.** Wielka Racza, NE zb., dol. pot. płynącego spod Wielkiej Raczy, 825–850 m; **187.** Wielka Racza, NE zb., przy zejściu się pot. Racza z pot. płynącym spod Wielkiej Raczy, 740–750 m; **188.** Rycerka Górna, Pod Raczą, dol. pot. płynącego spod Bugaja, 820–825 m; **189.** Rycerka Górna Roztoka, 655 m; **190.** Rycerka Górna Roztoka, dol. pot. Ciapków, 745 m; **191.** Będoszka Wielka, SW zb., 925–950 m; **192.** Będoszka Wielka, N zb., pod szczytem, 1120 m; **193.** Rycerka Górna Przegibek, przeł. Przegibek, 960–990 m; **194.** Będoszka Wielka, E zb., 930–950 m; **195.** N zb. między Przegibkiem a Majowem, przy połączeniu pot. płynących spod Przegibka i Majowa, 760 m; **196.** Rycerka Górna Masarka, dol. pot. Rycerki, 735 m; **197.** Majów, N zb., źródła pot. Rycerki, 980–1025 m; **198.** Majów, N zb., 1025 m; **199.** NWW zb. Wielkiej Rycerzowej, 1175 m; **200.** N zb. N ramienia Rycerzowej, 1050 m; **201.** N zb. N ramienia Rycerzowej, 1125 m; **202.** Wielka Rycerzowa, W zb., pod szczytem, 1160–1185 m; **203.** N zb. Rycerzowej, źródła pot. Danielka, 1050–1075 m; **204.** N zb. Rycerzowej, dol. pot. Danielka, 975 m; **205.** Rycerzowa, NE zb., 1100–1125 m; **206.** Wielka Rycerzowa, E zb., źródła pot. Cicha, 980 m; **207.** NEE zb. Rycerzowej, 925 m; **208.** Soblówka Królowa, dol. pot. Cicha, 820 m; **209.** Soblówka, u podnóża NE ramienia Rycerzowej, 975 m; **210.** Soblówka, w pobliżu Polany Kapońka, dol. pot. Cicha, 725 m; **211.** Soblówka Solisko, dol. pot. Cicha, 680 m; **212.** Soblówka, Pod Grapy, dol. pot. Urwisko, 695 m; **213.** dol. pot. Urwisko, 710–715 m; **214.** dol. pot. płynącego spod Kaniówki (między Smerekowem Wielkim a Klinem), 710–720 m; **215.** dol. pot. płynącego spod Kaniówki (między Smerekowem Wielkim a Oszusem), 755 m; **216.** NE zb. Smerekowa Wielkiego, 830 m; **217.** NW zb. Jaworzyny, źródła pot. Smerkówka Wielka, 975–1000 m; **218.** dol. pot. płynącego spod Kaniówki (między Smerekowem Wielkim a Oszusem), Koszarki, 785 m; **219.** Kaniówka, W zb., 850 m; **220.** NW zb. NE ramienia Oszusu, rez.

„Oszast”, 1050–1075 m; **221.** Wielka Racza, NE zb., pod szczytem, 1215–1235 m; **222.** Wielka Racza, E zb., źródła pot., 950–1000 m; **223.** E zb. Małej Raczy, źródła pot. Racza, 1035 m; **224.** Mała Racza, E zb., dol. pot. Racza, 825 m; **225.** Wielka Racza, dol. pot. Racza, 780 m; **226.** Rycerka Górna Szkołki, rez. „Śrubita”, dol. pot. płynącego spod Bugaja, 820–825 m; **227.** Rez. „Śrubita”, dol. pot. wypływającego spod Bugaja, 850–875 m; **228.** Rez. „Śrubita”, NW zb. Bugaja, 900–950 m; **229.** Bugaj, N zb., pod Halą Śrubita, 1025 m; **230.** przy zejściu się pot. Abramów i pot. Śrubita, 840 m; **231.** W zb. między Przegibkiem a Kikulą, dol. pot. Śrubita, 840 m; **232.** W zb. między Przegibkiem a Kikulą, źródła pot. Śrubita, 1045 m; **233.** Wielka Rycerzowa, SE zb., 1150 m; **234.** Przeł. Przysłop, między Wielką Rycerzową a Świtkową, 940 m; **235.** Świtkowa, NW zb., 1000 m; **236.** Świtkowa; szczyt, przy granicy państwa, 1080 m; **237.** dol. pot. Urwisko, 900 m; **238.** Równy Beskid, NW zb., dol. pot. Urwisko, 750–775 m; **239.** Oszus (Oszust, Oszast), szczyt i N zb., 1100–1140 m.

9.2. Uwagi ogólne

Układ systematyczny, nazewnictwo rodzin i gatunków oraz ujęcie taksonomiczne zdecydowanej większości gatunków przyjęto za opracowaniem GROLLEGO (1983); nomenklaturę odmian i form – za MÜLLEREM (1954, 1957).

Przy każdym z gatunków cytowanych w wykazie podawane są kolejno następujące dane: – numer kolejny gatunku w wykazie; – charakterystykę siedliskową; – ogólne rozmieszczenie na badanym terenie (por. Ryc. 3); – rozmieszczenie pionowe; – informacje o występowaniu okazów płodnych i rozmnożkowych; – określenie kategorii zagrożenia w Polsce i w Europie; – stopień częstości występowania (według przyjętej skali, por. Rozdz. 5.2) i liczba stanowisk współczesnych; – wykaz stanowisk współczesnych (por. Ryc. 28) z podaniem źródła danych; – dane o występowaniu gatunku na terenie badań bądź w rejonach przyległych, zawarte w dawniejszych opracowaniach, tj. REHMANA (1864, 1866), KRUPY (1879, 1882) i KULESZY (1920); informacje te mają charakter historyczny, gdyż podawane były przeważnie w sposób bardzo ogólny.

W wykazie stanowisk współczesnych uwzględniono: a) wysokości, w nawiasach (), z jakich zbierano okazy gatunków – tylko w przypadku, gdy na danym stanowisku w szerokim ujęciu zbierano próby z różnych wysokości; stanowisko należy rozumieć jako wystąpienie, np: 29 (1220, 1240) oznacza dwa stanowiska, tzn. 29 z wysokości 1220 m i 29 z wysokości 1240 m n.p.m.; b) numery stanowisk bez objaśnienia lub z symbolem „W” oznaczają zbiory własne; c) dane z piśmiennictwa oznaczone skrótem nazwiska autora.

W przypadku niektórych gatunków podano uwagi dotyczące cech zbieranych okazów i kryteriów, którymi posługiwano się przy oznaczaniu. Zamieszczono również informację o rozmieszczeniu w Polsce, w Karpatach Zachodnich bądź w Beskidach Zachodnich. Gatunki nowe dla polskiej części Beskidu Żywieckiego, całego Beskidu Żywieckiego i Beskidów Zachodnich odpowiednio zaznaczono (patrz niżej).

a) źródło danych:

B — BIELCZYK (1984/1986); J — leg. K. JĘDRZEJKO i H. KLAMA, 1982, 1985 (por. JĘDRZEJKO, KLAMA, ŻARNOWIEC 1984a, 1985a); K — KOŁA (1969); Kl — leg. H. KLAMA, 1983, 1984, 1985 (por. JĘDRZEJKO, KLAMA, ŻARNOWIEC 1984a, 1985a, b); M — leg. W. MATUSZKIEWICZ (por. MATUSZKIEWICZ J. 1977); S — leg. B. SZAFRAN, 1963 (por. SZWEYKOWSKI 1971); W (lub numer stanowiska bez symbolu) — materiały własne autora; Wt — WOJTERSKI (1959); Ż — leg. K. JĘDRZEJKO, H. KLAMA i J. ŻARNOWIEC, 1984 (por. JĘDRZEJKO, KLAMA, ŻARNOWIEC 1984b);

b) inne:

b. — bardzo; c. gemm. — z rozmnożkami; c. per. — z periancjami; c. spor. — ze sporogonami; d. — dość; dol. — dolina; f. — forma; inf. — informacja; kat. — kategoria zagrożenia; lit. — literatura; N — północ, północne; npbl. — niepublikowane; por. — porównaj; pot. — potoku; S — południe, południowe; stan. — stanowisk (-o, -a); ster. — płonny; var. — odmiana; W — zachód, zachodnie; zb. — stok; * — gatunek nowy dla polskiej części Beskidu Żywieckiego; ! — gatunek nowy dla całego Beskidu Żywieckiego; !! — gatunek nowy dla Beskidów Zachodnich.

9.3. Systematyczny wykaz gatunków

ANTHOCEROTOPSIDA

Anthocerotaceae Dum.

! *Anthoceros punctatus* L. — Rzadko w uprawach zbożowych. Pasma Zabawy, Rachowca, Oszusu, Romanki i Pilska. Do 680 m n.p.m. Obfite sporogony.

Rzadki, 9 stan.: 8, 11, 20 (620), 42 (675), 45, 112, 131, 148 (590), 150.

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. Znany z Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), Górców (SZWEYKOWSKI npbl.) i Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977).

Phaeoceros laevis (L.) Prosk. — Tylko w uprawach zbożowych. Mikroregiony: Rachowca, Oszusu, Pilska i Kotliny Jeleśniańskiej. Do 725 m n.p.m. Zawsze sporogony.

B. rzadki, 5 stan.: 8, 20 (620), 131, 150, 210.

Lit.: Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

MARCHANTIOPSIDA

Conocephalaceae K. Müll. ex Grolle

Conocephalum conicum (L.) Underw. — Na mokrych kamieniach i glebie na brzegach potoków, w ziołoroślach i wysiękach wody. W niższych położeniach na mokrej glebie w borach świerkowych i olszynkach, rzadko na odkrytej, gliniastej glebie na skarpach przy potokach. Nie stwierdzony tylko w podgrupie Suchej Góry i Prusowa. Do 1350 m n.p.m. Zawsze płonny.

B. częsty, 50 stan.: 2, 5, 6, 7, 9, 10 (570), 23, 24, 27, 56 (1110), 84, 88 (1350), 91, 108, 110 (640), 119 (750, 760, 775), 123, 124, 128 (870), 130 (680), 133 (505), 135, 137, 138, 148 (590), 153, 154 (1030), 157, 159, 175, 178, 179, 180, 186 (825), 187 (750), 194 (950), 195, 197 (1000), 209, 210, 216, 217 (975), 220 (1050), 229, 232, 238 (775), 239 (1100, 1140).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866).

! *Preissia quadrata* (Scop.) Nees — Na zwietrzelinie skalnej i skale piaszczystej w miejscach ocienionych. Podgrupa Lipowskiej i Kotlina Jeleśniańska (Ryc. 29). Ze sporogonami.

B. rzadki, 2 stan.: 6, 56 (1110).

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. W Beskidach Zachodnich dość rzadki; pojedyncze stanowiska w Beskidach Śląsko-Morawskich (DUDA 1955), Beskidzie Śląskim (SZWEYKOWSKI 1958a), Górcach (SZWEYKOWSKI npbl.) i Beskidzie Sądeckim MAMCZARZ 1977).

Ryc. 29. Rozmieszczenie:

Fig. 29. Distribution of:

- 1 — *Preissia quadrata*; 2 — *Lophozia ascendens*; 3 — *Lophozia wenzelii*; 4 — *Metzgeria conjugata*; 5 — *Fossombronia wondraczekii*; 6 — *Barbilophozia hatcheri*

***Marchantia polymorpha* L. em. Burgeff** — Na mokrych kamieniach na brzegach potoków, spaleniskach 2–3 letnich, rzadziej na mokrej glebie w ziołoroślach i wysiękach wody oraz na łąkach; również na mineralnej glebie na skarpach. Podgrupy Ożnej, Wielkiej Rycerzowej, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Piłska,

Prusowa, Magury i Kotlina Jeleśniańska. Do 1125 m n.p.m. Okazy żeńskie ze sporogonami oraz okazy męskie. Zawsze rozmnożki.

Rzadki, **9 stan.**: 4, 6, 15 (550), 19, 61, 158 (825), 134, 143, 163.

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866); Dorzecze Soli (KRUPA 1879).

***Marchantia aquatica* (Nees) Burgeff** — Podgrupa Oźnej.

B. rzadki, **1 stan.**: 141 — Rycerka Górna Janczyki, dol. pot. Radecki, w zagłębieniu terenu wypełnionym wodą; ster.; 670 m n.p.m.

BURGEFF (1943) na podstawie badań genetycznych *Marchantia polymorpha* sensu Linné (1753) wyodrębnił trzy taksony w randze gatunku: *M. polymorpha* Nees em. Burgeff, *M. aquatica* (Nees) Burgeff i *M. alpestris* (Nees) Burgeff. W ujęciu systematycznym DUELLA (1983) i GROLLEGO (1983) w obrębie gatunku *Marchantia polymorpha* L. em. Burgeff wyróżnia się dwie odmiany: typową — *M. p.* var. *polymorpha* [= *M. polymorpha* sensu Burgeff] i wodną — *M. p.* var. *aquatica* Nees [= *M. aquatica* (Nees) Burgeff]. BISCHLER (1984) zalicza do tego gatunku również *M. alpestris* (Nees) Burgeff, co jest zgodne ze stanowiskiem MÜLLERA (1954), który w obrębie *M. polymorpha* L. wyróżnia *M. p.* var. *aquatica* Nees i *M. p.* var. *alpestris* Nees. SCHUSTER (1992b) w swojej najnowszej monografii rzędu *Marchantiales* Ameryki Północnej przyjmuje koncepcję BURGEFFA i wyróżnia omawiane taksony w randze gatunków. W niniejszym opracowaniu przyjęto ujęcie systematyczne BURGEFFA (1943) i SCHUSTERA (1992b).

Ricciaceae Reichenb.

***Riccia glauca* L.** — Podgrupa Rachowca.

B. rzadki, **1 stan.**: 131 — Sól (centrum); w uprawie ziemniaków; ster.; 580 m n.p.m.

Lit.: Miłówka, Rajcza (Krupa 1879).

! *Riccia sorocarpa* Bisch. — W uprawach zbożowych i okopowych. Podgrupy: Zabawy, Rachowca, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Romanki, Pilska, Sucheje Góry i w Kotlinie Jeleśniańskiej; maksymalnie do 775 m n.p.m. B. często z zarodnikami. D. częsty, **17 stan.**: 8, 11, 13, 20 (620), 42 (675, 690), 45, 112, 114 (515, 525), 115, 126, 131, 148 (590), 149 (630), 150, 157.

Gatunek b. rzadko podawany z Beskidów Zachodnich — tylko z Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977) i Gorców (MIERZEŃSKA 1994). Nowy dla Beskidu Żywieckiego.

Metzgeriaceae Klinggr.

***Metzgeria furcata* (L.) Dum.** — Przeważnie jako epifit na korze drzew liściastych — bukach i jaworach, rzadziej na wierzbach, jarzębinie i jesionie; w buczynach, rzadziej na drzewach wolno stojących; na ocienionych skałach i kamieniach piaszczystych, b. rzadko na kamieniach na brzegach potoków w pasie geoamfibiontów. Podgrupy: Rachowca, Oźnej, Wielkiej Raczy, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki, Pilska i Prusowa. Od 580 do 1235 m n.p.m. Zawsze płonny i z rozmnożkami.

B. częsty, **43 stan.**: 16 (650), 25, 26, 27, 34, 41 (910), 56 (1110), 58, 65, 69 (1150), 72 (950, 1000) WB, 84, 118, 119 (760), 120 (790), 124, 125, 127 (920), 131, 135, 141, 153, 154 (1030), 162, 165, 167, 175, 176, 179, 197 (1000), 202 (1160), 209, 211, 213,

(715), 214 (710), 221 (1215), 222 (1000) WB, 228 (900) WB, 230, 236, 238 (750) WB, 239 (1100).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski (Babia Góra, Pilsko, Polica) (REHMAN 1866); Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

Bardzo często zbierano (zwłaszcza z kory pni drzew) formy drobne, żółtozielone, tworzące bardzo liczne rozmnóżki (f. *ulvula* Nees).

***Metzgeria conjugata* Lindb.** — Na ocienionych skałach piaskowcowych, na zwietrzelinie i w szczelinach tych skał, rzadziej na kamieniach wystających z gleby w borach świerkowych oraz wilgotnych kamieniach na brzegach potoków w pasie geoamfibiontów. Podgrupy: Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki i Pilska. Od 605 do 1235 m n.p.m. (Ryc. 29). Zawsze płonny. Gatunek narażony (V) w Polsce.

D. częsty, **14 stan.**: 23, 24, 29 (1220), 35, 41 (930), 55 Kl, 56 (1110), 75, 84, 87 (1260) Wt, 119 (760), 136, 209, 238 (775).

Aneuraceae Klinggr.

***Aneura pinguis* (L.) Dum.** — Na mokrej glebie w młakach źródłkowych i wysiękach, rzadziej na brzegach wód stojących i odkrytej, mineralnej glebie na skarpach nad potokami. Podgrupy Lipowskiej i Pilska. Do 1260 m n.p.m. Okazy męskie.

B. rzadki, **4 stan.**: 79 (1215), 85 (1260), 107 (800), 120 (790).

Lit.: Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866).

****Riccardia latifrons* (Lindb.) Lindb.** — Na murszejącym drewnie świerkowym w dolinach potoków. Podgrupa Pilska; tylko jedno notowanie w podgrupie Oszusu. Od 675 do 1370 m n.p.m. Dwukrotnie zbierano okazy płodne (na stan. 42 i 122). Rzadki, **7 stan.**: 39 (820), 42 (675), 79 (1215), 94 (1370), 106, 122, 182.

Większość roślin oznaczono w stanie żywym. Brak ciał oleistych w strefie wzrostu i zewnętrznej warstwie komórek plechy (por. MENDELAK 1974). W przypadku okazów suchych jako kryterium przyjęto długość komórek epidermy (70–90 μm).

Gatunek nowy dla polskiej części Beskidu Żywieckiego. Podany ze słowackiej części Babiej Góry przez ŚMARDE (1937). W Beskidach Zachodnich znany z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŇA 1982b), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), Górców (MENDELAK 1977) i Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977).

***Riccardia multifida* (L.) S. Gray** — Na mokrej glebie i kamieniach na brzegach potoków, w ziołoroślach i wysiękach wody. Podgrupy: Ożnej, Będoszek, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu i Pilska. Od 775 do 1270 m n.p.m. Zawsze płodny; również sporogony.

Rzadki, **8 stan.**: 31, 85 (1260), 93 (1270) WWt, 139, 175, 194 (950), 208, 238 (775).

***Riccardia palmata* (Hedw.) Carruth.** — Na wilgotnych, butwiejących kłodach, głównie na powierzchni cięcia; w dolinach potoków. Podgrupa Wielkiej Rycerzowej i Pilska. Płonny.

B. rzadki, **2 stan.**: 105 (1225), 203 (1075).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866).

Ciała oleiste brunatne, duże, 8–10 μm , po jednym w każdej komórce plechy. Długość komórek epidermy: 40–55 μm .

Pelliaceae Klinggr.

***Pellia epiphylla* (L.) Corda** — Na odkrytej glebie przydrożnych skarp i nad potokami, również na wilgotnych kamieniach w potokach w pasie geoamfibiontów, na wilgotnej glebie w lasach i borach, w ziołoroślach i źródłiskach, rzadko na mokrych łąkach oraz na kamieniach wystających z gleby w borach. We wszystkich mikroregionach do 1330 m n.p.m. Zawsze płodny; sporogony b. częste.

Pospolity, **83 stan.**: 2, 4, 6, 9, 10 (570, 590), 16 (650), 22 (980), 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36 (975), 39 (820), 42 (675), 43, 45, 50, 57, 58, 62, 65, 67, 76, 79 (1215), 86 (1190), 89 (1330) WM, 91, 93 (1290), 105 (1225), 107 (800, 815), 108, 109 (650), 110 (620, 625), 117, 120 (790), 122, 123 (1135), 124, 125, 130 (680), 132, 133 (505), 136, 137, 140, 154 (1000, 1030), 159, 162, 167, 168, 175, 179, 182, 183, 184 (900), 186 (850), 193 (960), 195, 197 (1000), 198, 202 (1160), 203 (1050), 204, 206, 207, 208, 214 (720), 215, 216, 223, 224, 225, 226 (820), 229, 238 (775).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski (Babia Góra, Pilsko, Polica) (REHMAN 1866); Rycerki, Ujsoły (Glinka) (KRUPA 1879).

Rośliny jednopienne, z jednostronnym perychecjum. U niektórych płodnych okazów brak charakterystycznych zgrubień ścian komórek mięksiszowych plechy.

W niniejszych badaniach nie wyróżniano gatunku *Pellia borealis* Lorbeer. GROLLE (1983) włącza ten takson do gatunku *Pellia epiphylla* (L.) Corda.

***Pellia neesiana* (Gott.) Limpr.** — W młakach źródłiskowych, ziołoroślach i wysiękach wody, także w zbiorowiskach potokowych, przeważnie w pasie geoamfibiontów oraz na odkrytej glebie na skarpach przy drogach i nad potokami, rzadziej na ścieżkach i rumoszu łupkowym; rzadko na humusowej glebie w borach świerkowych i na łąkach (zwykle w lokalnych zabagnieniach). Nie notowany w grupach Będoszki, Prusowa, Magury, Kiczory i w Kotlinie Jeleśniańskiej. W całym zakresie wysokości, ale ok. 70% stan. w reglu dolnym. Okazy żeńskie i męskie, często ze sporogonami.

B. częsty, **52 stan.**: 10 (590), 31, 32, 39 (820), 42 (675), 51 (1000), 53 (870), 56 (1110), 63 (1200), 64 (1150), 71 (1100), 79 (1215), 85 (1260), 88 (1330, 1340, 1350), 91, 92, 94 (1370, 1390), 95 (1400, 1420), 96 (1475), 98 (1475), 101, 103 (1200), 111, 114 (515), 125, 126, 129 (770), 130 (680), 134, 135, 137, 141, 143, 149 (630), 153, 157, 159, 177, 178, 180, 203 (1050), 204, 210, 211, 216, 217 (975), 232, 236.

Niektóre płodne rośliny, posiadające wyraźnie zgrubiałe ściany (listwy) komórek mięksiszowych plechy, mają długie perychecjum, podobnie jak u *P. endiviifolia*. U roślin płodnych, z niskim kołnierzykowatym perychecjum obserwowano również brak listew w komórkach mięksiszowych plechy.

***Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dum.** — Na odkrytej, mineralnej glebie i rumoszu łupkowym na skarpach, na wilgotnych kamieniach w potokach w pasie hydro- i geoamfibiontów, w ziołoroślach, na wilgotnej, gliniastej glebie w buczynach i olszynkach, rzadziej na zwirowiskach nadrzecznych. Podgrupy: Rachowca, Ożnej, Wielkiej Raczy, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu (najliczniej), Krawcowego

Wierchu, Lipowskiej, Pilska, Suchej Góry i Kotlinie Jelesniańskiej. Do 1350 m, najczęściej w pasie 600–1000 m n.p.m. Bardzo częste okazy żeńskie i męskie; sporogonów nie obserwowano.

Częsty, **34 stan.**: 6, 7, 19, 42 (640), 50, 56 (1110), 64 (1150), 88 (1330), 93 (1290), 94 (1350), 105 (1225), 110 (620), 119 (760), 129 (760), 135, 139, 157, 158 (825, 840), 170 (900), 178, 180, 181, 193 (980), 206, 214 (720), 215, 216, 218 (900, 925) K1, 232, 238 (750, 775).

Na zwietrzałych łupkach i rumoszu łupkowym, zwykle na skarpach przydrożnych i obrywkach ziemi w dolinach potoków, w miejscach mokrych zbierano formę o plesze rozcłonkowej przy szczycie na drobne kędzierzawe płyty (f. *furcigera* (Hook.) Mass.). Według MÜLLERA (1954) i REJMENT-GROCHOWSKIEJ (1966) jest to forma jesienna gatunku. Nie potwierdzają tego obserwacje autora. Forma ta spotykana była przez cały okres wegetacyjny na specyficznym siedlisku – zwietrzałych łupkach i rumoszu łupkowym. Również SZWEYKOWSKI (1953) obserwował tę formę w Górach Stołowych w ciągu całego okresu wegetacyjnego i to zarówno w miejscach naświetlonych, jak i cienistych. Do tego gatunku zaliczono rośliny dwupienne, nie posiadające zgrubiałych ścian (listew) w komórkach mięksiszowych plechy. Perychecjum wysokie, zwykle całkowicie osłania kalyptę. W przypadku okazów płonnych zaliczono tu tylko formy o plesze rozcłonkowej na szczycie (f. *furcigera*); pozostałych nie podawano w wykazie. Na trudności w oznaczaniu okazów płonnych w rodzaju *Pellia* zwrócili już uwagę SZWEYKOWSKI (1953, 1958c) i REJMENT-GROCHOWSKA (1966). Również w niniejszych badaniach obserwowano, że u niektórych płodnych okazów *P. epiphylla* i *P. neesiana* nie występowały charakterystyczne listwy w komórkach mięksiszowych plechy, która to cecha różni te gatunki od *P. endiviifolia*. Również długość brzeżnych komórek nie jest dobrą cechą diagnostyczną, gdyż u niektórych roślin w obrębie *P. endiviifolia* obserwowano komórki brzeżne do 60 i więcej mikrometrów długości (podobnie jak u *P. epiphylla* i *P. neesiana*). Wyjściem z tej sytuacji jest oznaczanie płonnych, żywych okazów przy użyciu metody elektroforetycznej (por. SZWEYKOWSKI 1977, 1984). Znalezione dobre markery chemiczne (peroksydazy) różniące w wyraźny sposób gatunki rodzaju *Pellia* (KRZAKOWA 1977; SZWEYKOWSKI, ZIELIŃSKI, MENDELAK 1981; ZIELIŃSKI, PRUS-GŁOWACKI, MENDELAK 1981).

Blasiaceae Klinggr.

***Blasia pusilla* L.** – W uprawach zbożowych i na mineralnej glebie skarp nad potokami. Podgrupy: Będoszki, Krawcowego Wierchu i Pilska. Do 690 m n.p.m. Płonny.

B. rzadki, **4 stan.**: 8, 42 (690), 144 (585), 149 (630).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski (REHMAN 1866).

Codoniaceae Klinggr.

***Fossombronia wondraczekii* (Corda) Lindb.** – W uprawach zbożowych, rzadziej na mineralnej glebie przydrożnych skarp. Podgrupy: Zabawy, Rachowca, Oszusu,

Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki, Pilska, Kiczory i Kotliny Jeleśniańskiej. Do 870 m n.p.m. w krainie upraw (Ryc. 29). Ze sporogonami. Gatunek wymierający (E) w Polsce.

Częsty, **21 stan.:** 1, 8, 11, 13, 20 (620), 42 (675, 690), 45, 53 (850, 870), 112, 113, 126, 131, 148 (575, 590), 149 (620, 630), 150, 157, 210.

Zarodniki 40 μm średnicy, ciemnobrązowe, listewki niskie, tworzące na obwodzie 25–30 wyrostków.

Lophozia (Joerg.) Vanden Berghen

***Barbilophozia floerkei* (Web. & Mohr) Loeske** — W górnoreglowym borze świerkowym i kosówce na humusie naziemnym i naskalnym, na ziemi w borówczyskach i traworoślach, rzadziej na skałach i murszejącym drewnie. Tylko między 1175 a 1540 m n.p.m. w podgrupach Lipowskiej, Romanki i Pilska. Zawsze płonny.

D. częsty, **14 stan.:** 28 (1366), 60 (1310, 1320), 69 (1175), 74 WWt, 84, 88 (1330), 89 (1310) WM, 90 (1390), 95 (1400), 97 (1540), 98 (1440, 1460, 1475).

***Barbilophozia attenuata* (Mart.) Loeske** — Na murszejącym drewnie, koźe drzew, zwłaszcza świerka i gałęziach kosodrzewiny, u podstawy pni drzew, na humusie w borach świerkowych, rzadziej na humusie naskalnym, w zbiorowiskach trawiastych i na mineralnej glebie. Rozprzestrzeniony na całym obszarze, najczęściej w pasie 800–1500 m n.p.m. Zawsze płonny; prawie zawsze z rozmnoźkami.

B. częsty, **51 stan.:** 28 (1340, 1366), 29 (1220, 1240, 1260), 33 (825), 41 (910), 43, 44, 49 (1040), 51 (1000, 1020), 59, 60 (1310, 1320) WB, 68 (1000) WB, 69 (1150), 75, 76, 79 (1215), 81 B, 88 (1350), 92, 95 (1420), 96 (1450, 1460, 1465, 1470, 1480), 97 (1500, 1525), 99 (1300), 100 (1280), 101, 103 (1200, 1225), 105 (1225), 109 (650), 120 (790), 122, 154 (1030), 157, 158 (825), 159, 217 (1000), 220 (1050, 1075), 226 (825), 227 (850), 239 (1100, 1140).

Lit.: Beskid Orawski (Babia Góra, Pilsko, Polica) (REHMAN 1866).

***Barbilophozia hatcheri* (Evans) Loeske** — Na ziemi i humusie pokrywającym kamienie w górnoreglowym borze świerkowym i w kosówce, rzadziej na skałach, u podstawy drzew i na ziemi w zbiorowiskach trawiastych. Podgrupy Romanki i Pilska. Od 1220 do 1420 m n.p.m.; tylko jedno stanowisko na wysokości 870 m (Hala Boracza w pasmie Lipowskiej) (Ryc. 29). Płonny, prawie zawsze z rozmnoźkami.

Rzadki, **6 stan.:** 29 (1220), 53 (870), 84, 88 (1330), 95 (1400, 1420).

***Barbilophozia lycopodioides* (Wallr.) Loeske** — Na ziemi i humusie naskalnym w borach świerkowych, rzadziej na kamieniach wystających z gleby i butwiejącym drewnie; rzadko na mineralnej glebie przydrożnych skarp. Podgrupy Lipowskiej, Pilska i Suchej Góry. Od 870 do 1420 m n.p.m. Płonny, tylko jeden raz zbierano z rozmnoźkami.

Rzadki, **7 stan.:** 49, 51 (1000, 1020), 53 (870), 94 (1370), 95 (1400, 1420).

***Barbilophozia barbata* (Schmid. ex Schreb.) Loeske** — Na humusowej glebie w borach świerkowych, rzadziej na humusie naskalnym i skałach oraz w zbiorowiskach trawiastych.

rowiskach trawiastych i na mineralnej glebie na przydrożach. Podgrupy: Oszusu, Lipowskiej i Pilska w pasie 600–900 m n.p.m. Zawsze płonny.

Rzadki, **8 stan.:** 42 (675, 690), 46, 53 (870), 119 (760), 150, 178, 180.

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864, 1866).

***Anastrepta orcadensis* (Hook.) Schiffn.** — Na humusie w zaroślach kosodrzewiny i borówczyskach, również na humusie pokrywającym skały piaskowcowe, rzadziej na skałach i kamieniach. Tylko na Pilsku w pasie 1300–1525 m n.p.m. oraz na szczycie Lipowskiej. Płonny; bez rozmnożeń.

Rzadki, **8 stan.:** 60 (1320), 93 (1300) WK, 94 (1370, 1390), 95 (1400, 1420), 97 (1500, 1525).

***Lophozia ventricosa* (Dicks.) Dum.** — Na humusie i humusowej glebie w borach świerkowych, na głazach i kamieniach, murszejących drewnie; na korze u podstawy pni drzew w borach świerkowych. Rzadko na glebie w *Empetro-Vaccinietum* i *Hieracio-Nardetum*, na odkrytej glebie skarp, b. rzadko w zbiorowiskach potokowych. Nie występuje w podgrupach: Zabawy, Prusowa, Kiczory i Kotlinie Jeleśniańskiej. W całym zakresie wysokości. Zawsze z rozmnożkami, b. często periancja i sporogony.

Pospolicie, **84 stan.:** 4, 28 (1340, 1366), 29 (1220, 1230, 1240, 1260), 30, 31, 33 (825), 34, 35, 37 (900), 40, 41 (910), 44, 45, 49 (1040), 51 (1020), 56 (1110), 57, 60 (1300 B, 1310, 1320 WM), 63 (1200), 64 (1150), 65, 68 (1000, 1050), 69 (1150, 1175), 70 (950), 75, 76, 79 (1215), 82 (1275), 84, 88 (1340, 1350), 89 (1270) M, 91, 92, 93 (1290), 94 (1350), 95 (1400, 1420), 96 (1450, 1460, 1470, 1480), 97 (1500, 1525, 1540), 98 (1475), 99 (1300, 1320, 1350, 1385), 101, 103 (1200, 1225), 106, 109 (650), 114 (525), 120 (790), 122, 125, 129 (805), 132, 134, 140, 148 (590), 153, 157, 158 (825), 168, 178, 188, 196, 202 (1160), 216, 217 (975), 226 (825), 236.

***Lophozia silvicola* Buch.** — Na wystających z gleby korzeniach świerka w borze świerkowym i ocienionej, zwietrzałej skale piaskowcowej w dolinie potoku. W podgrupie Romanki i Pilska. Z rozmnożkami.

B. rzadki **2 stan.:** 29 (1220), 76.

Rośliny możliwe do prawidłowego oznaczenia tylko w stanie żywym. Ciała oleiste z wyraźnym, świecącym jądrem; liście wąskie.

Gatunek rzadko podawany z Beskidów Zachodnich, prawdopodobnie nie odróżniany od *L. ventricosa*. Znany z grupy Policy (WOJTERSKI 1964), Beskidu Wyspowego (SZWEYKOWSKI npbl.) i z Gorców (MIERZEŃSKA 1994).

Wielu autorów włącza ten gatunek do *L. ventricosa*, czasami w randze odmiany — *L. v. var. silvicola* (Buch) E.W. Jones ex Schust. (por. SCHUSTER 1969; SCHLJAKOV 1980; CORLEY, HILL 1981; GROLLE 1983)

***Lophozia longidens* (Lindb.) Maucoun** — Jako epifit na korze buków; raz notowany na pniu jawora oraz jarzębiny. Również na ocienionej skale piaskowcowej (na najniższym z notowanych stanowisk). W podgrupach Oszusu, Romanki i Pilska. Od 930 do 1340 m n.p.m. Przeważnie w reglu dolnym (Ryc. 30). Zawsze płonny, z rozmnożkami.

Rzadki, **6 stan.:** 28 (1340), 41 (930), 69 (1150), 71, 220 (1075), 239 (1100).

Ryc. 30. Rozmieszczenie:

Fig. 30. Distribution of:

1 — *Lophozia longidens*; 2 — *L. bantriensis*; 3 — *L. obtusa*; 4 — *L. heterocolpos*; 5 — *Anastrophyllum hellerianum*; 6 — *Mylia anomala*; 7 — *Anastrophyllum minutum*

***Lophozia ascendens* (Warnst.) Schust.** — Na murszejących kłodach i korzeniach świerkowych w borach świerkowych. W podgrupach Oszusu, Krawcowego Wierchu, i Piliska. Od 745 do 1150 m n.p.m. (Ryc. 29). Z periancjami, sporogonami i rozmnożkami. Gatunek zagrożony (R) w Europie.

B. rzadki, 4 stan.: 34, 106, 154 (1030), 179.

****Lophozia longiflora* (Nees) Schiffn.** — Tylko na murszejącym drewnie w regłach. Podgrupy Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki i Piliska (najwięcej stanowisk). Od 615 do 1360 m n.p.m. Obfite periancja; sporogony.

D. częsty, 18 stan.: 28 (1340, 1360), 29 (1220, 1260), 60 (1310), 67, 88 (1350), 91, 93 (1300), 103 (1200), 105 (1225), 122, 123 (1135), 134, 135, 194 (1030), 181, 226 (825). Gatunek nowy dla polskiej części Beskidu Żywieckiego. Notowany wcześniej przez ŠMARDE (1937) po słowackiej stronie Babiej Góry.

Według SCHLJAKOVA (1980, 1981b) do gatunku *Lophozia longiflora* (Nees) Schifff. należą również taksony znane pod nazwą *L. guttulata* (Lindb.) Evans i *L. porphyroleuca* auct. W obrębie tak rozumianego gatunku, SCHLJAKOV (1980) wyróżnia *L. l. var. longiflora* [= *L. longiflora* (Nees) Schifff. s. str.] i *L. l. var. guttulata* (Lindb. & Arnell) Schljak. [= *L. guttulata* (Lindb. & Arnell) Evans, *L. porphyroleuca* auct.]. Okazy zbierane przez autora w Beskidzie Żywiecko-Orawskim należą do *L. longiflora* var. *guttulata* (Lindb. & Arnell) Schljak.

***Lophozia sudetica* (Nees ex Hüb.) Grolle** — Na ocienionych skałach, zwietrzelinie i w szczelinach skał, na kamieniach wystających z gleby w borach świerkowych; na humusie i humusowej glebie w borach świerkowych, wilgotnych kamieniach na brzegach potoków; rzadko na mineralnej glebie skarp i w zbiorowiskach trawiastych. W podgrupach Pilska (27 stan.), Ożnej Wielkiej Raczy, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Lipowskiej, Romanki i Magury. W całym zakresie wysokości, ale głównie w reglu górnym i w kosówce. Często z periancjami, zawsze z rozmnożkami.

B. częsty, **43 stan.**: 9, 28 (1340, 1350, 1366), 30, 31, 35, 39 (820), 41 (930), 56 (1100, 1110), 63 (1175, 1200), 64 (1150), 75, 76, 79 (1215), 80 (1260) Wt, 82 (1275, 1295), 83, 84, 85 (1260), 88 (1330, 1350), 91, 92, 93 (1290), 94 (1350, 1370), 95 (1400, 1420), 96 (1450), 98 (1475), 101, 106, 119 (760), 122, 125, 168, 174, 196, 223.

***Lophozia wenzelii* (Nees) Steph.** — Tylko w najwyższych położeniach Pilska, na kwaśnym humusie w *Vaccinietum myrtilli*, na wilgotnym humusie w ziołoroślach na brzegach cieków, rzadziej na głazach piaszczystych. Od 1440 do 1525 m n.p.m. (Ryc. 29). Zawsze z rozmnożkami, także z periancjami.

B. rzadki, **4 stan.**: 96 (1450), 97 (1525), 98 (1440, 1475).

! *Lophozia excisa* (Dicks.) Dum. — Podgrupa Prusowa.

B. rzadki, **1 stan.**: 15 (570) — Palenica, N zb., na odkrytej glebie na drodze (ściana koleiny); z periancjami; 570 m n.p.m.

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. W Beskidach Zachodnich dość częsty, znany z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA 1958), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), Gorców (MAMCZARZ 1979) i Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977).

***Lophozia obtusa* (Lindb.) Evans** — Pilsko (Ryc. 30).

B. rzadki, **1 stan.**: 94 (1350) WK — Pilsko, N zb., na humusie między *Vaccinium myrtillus* w borze świerkowym. Płonny. 1350 m n.p.m.

***Lophozia incisa* (Schrad.) Dum.** — Na butwiejącym drewnie, rzadziej na ocienionych skałach i kamieniach, korze drzew, humusie naskalnym i naziemnym oraz mineralnej glebie przydrożnych skarp w zbiorowiskach borowych. Również na humusie torfowcowym w lokalnych zatorfieniach. W podgrupach Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki i Pilska. Od 740 do 1350 m n.p.m. Bardzo często z periancjami i rozmnożkami, również ze sporogonami.

D. częsty, **19 stan.**: 29 (1230), 41 (910, 920), 44, 60 (1310, 1320), 64 (1130 WWt, 1150), 67, 84, 91, 92, 93 (1290), 101, 105 (1225), 106, 134, 154 (1000), 220 (1050).

***Lophozia bantriensis* (Hook.) Steph.** — Na wilgotnych kamieniach na brzegach potoków, na zwietrzelinie głazów, na skarpach nad potokami i mokrej glebie

w młakach źródłiskowych. W podgrupach Oszusu, Krawcowego Wierchu, Romanki i Pilaska. Od 570 do 1260 m n.p.m. W najwyższych położeniach gatunek występuje tylko w młakach źródłiskowych (Ryc. 30). Z periancjami i okazy męskie.

Rzadki, **6 stan.**: 10, 79 (1215), 85 (1260), 135, 150, 180.

Gatunek b. rzadki w Beskidach Zachodnich. Znany do tej pory tylko z grupy Policy i Gorców (SZWEYKOWSKI npbl.; MIERZEŃSKA 1994).

***Lophozia collaris* (Nees) Dum.** — Na wilgotnych, ocienionych skałach w dolinach potoków, rzadkiej na wilgotnych kamieniach na brzegach potoków w pasie geoamfibiontów. W podgrupach Ożnej, Oszusu i Pilaska. 83% stan. od 600 do 900 m n.p.m.; jedno notowanie na wysokości 1235 m. Z periancjami oraz okazy męskie.

Rzadki, **6 stan.**: 39 (820), 84, 142, 178, 180, 181.

***Lophozia heterocolpos* (Thed. ex Hartm.) Howe** — Na ocienionej zwietrzelinie skały piaskowcowej i rumoszu łupkowym na skarpie nad potokiem. W podgrupach Krawcowego Wierchu i Romanki (Ryc. 30). Okazy płonne z rozmnożkami.

B. rzadki, **2 stan.**: 29 (1220), 135.

Gatunek rzadki w Beskidach Zachodnich; znany z grupy Babiej Góry (WOJTEK 1955), grupy Policy (SZWEYKOWSKI npbl.), Gorców (MAMCZARZ 1979) i Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977). Wszędzie na pojedynczych stanowiskach.

***Anastrophyllum minutum* (Schreb.) Schust.** — W szczelinach skał piaskowcowych, na skałach i kamieniach w obrębie zbiorowisk leśnych. Podgrupy: Wielkiej Rycerzowej, Lipowskiej, Romanki i Pilaska. Od 790 do 1525 m n.p.m. (Ryc. 30). Płonny, bardzo często z rozmnożkami.

Rzadki, **8 stan.**: 29 (1220, 1260), 36 (975), 56 (1110), 97 (1525), 120 (790), 202 (1160, 1185).

Lit.: Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

Na ocienionych skałach spotyka się formy o silnie zaokrąglonych (2–3 komórki) łatach liści i łodyżkach odlegle ulistnionych (f. *cuspidata* Kaal.); okazy rozmnożkowe wytwarzają amarantowe rozmnożki na drobnolistnych pędach (f. *denticulata* Anzi), podobne jak u *Barbilophozia attenuata*.

***Anastrophyllum hellerianum* (Nees ex Lindenb.) Schust.** — Romanka (Ryc. 30). B. rzadki, **1 stan.**: 29 (1260) — Romanka, S zb., u nasady pnia świerka w górnoregionowym borze świerkowym. Z rozmnożkami. 1260 m n.p.m.

***Tritomaria exsecta* (Schr.) Loeske** — Na różnych siedliskach; najczęściej na kamieniach i skałach położonych w płatach zbiorowisk leśnych, również na murszejącym drewnie oraz humusie niskim i naziemnym w borach świerkowych. Rzadziej na kamieniach w potokach, odkrytej glebie skarp, korze drzew oraz na glebie w borówczyskach i psiarach. W podgrupie Pilaska, rzadziej w podgrupach Ożnej, Wielkiej Racy, Będoski, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki i Prusowa. W całym zakresie wysokości. Z periancjami, zawsze z rozmnożkami, rzadko ze sporogonami.

Pospolity, **63 stan.**: 14, 25, 26, 28 (1340, 1360), 29 (1220, 1260), 30, 31, 32, 33 (825), 34, 36 (975), 39 (820, 850 WWt), 40, 41 (910, 920, 930), 42 (690), 43, 45, 56 (1110), 57, 60 (1310), 69 (1150), 75, 76, 84, 85 (1260), 92, 96 (1450, 1480), 103 (1225), 105 (1225), 120 (790, 825), 122, 125, 135, 136, 140, 148 (590), 150, 153, 154 (1000,

1030), 162, 168, 175, 178, 188, 194 (930), 195, 202 (1160, 1185), 204, 209, 216, 217 (975), 226 (820, 825), 231.

! *Tritomaria exsectiformis* (Breidl.) Loeske — Romanka (Ryc. 31).

B. rzadki, 1 stan.: 29 (1220) — Romanka, S zb., na wilgotnej, ocienionej skale piaskowcowej w górnoregłowym borze świerkowym, z rozmnożkami. 1220 m n.p.m. Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. W Beskidach Zachodnich rzadki. Podawany także z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŃA 1982b), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950) i Górców (MIERZEŃSKA 1994).

Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch — Na humusowej glebie i humusie skalnym w borach świerkowych i buczynach, na humusie w borówczyskach oraz na skałach, zwietrzelinie skalnej i szczelinach skał. Podgrupy: Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki, Pilska i Suchoj Góry. W całym zakresie wysokości. B. często z periancjami; sporogonów nie obserwowano.

D. częsty, 14 stan.: 24, 41 (930), 56 (1100, 1110), 88 (1330), 94 (1370, 1380), 95 (1420), 114 (525), 120 (790), 135, 178, 202 (1160), 214 (720).

Jungermanniaceae Reichenb.

Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. — Na humusowej glebie i ściółce w borach świerkowych i sporadycznie w buczynach, również na murszejącym drewnie w borach świerkowych. Rzadko na korze drzew (głównie u podstawy pni), na kamieniach wystających z gleby, skałach i mineralnej glebie skarp przydrożnych. Podgrupy: Rachowca, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Pilska i Kiczory. Do 930 m n.p.m. Najwięcej stanowisk w pasie 600–800 m n.p.m. Bardzo często z periancjami i sporogonami; częste okazy męskie.

Częsty, 26 stan.: 2, 32, 33 (825), 41, 42 (675), 57, 109 (650, 660), 110 (620), 119 (760), 120 (790), 121, 124, 135, 137, 153, 157, 170 (900), 175, 178, 181, 182, 196, 210, 211, 215.

Mylia anomala (Hook.) S. Gray — Tylko w szczytowych partiach Pilska na kępach *Sphagnum nemoreum* i *Polytrichum strictum* w *Empetro-Vaccinietum* (Ryc. 30). Z rozmnożkami.

B. rzadki, 2 stan.: 96 (1480), 97 (1500) WWt.

Mylia taylorii (Hook.) S. Gray — Na murszejących kłodach i pniach świerkowych w dolinach potoków, na humusie i humusowej glebie w borach świerkowych i buczynach, rzadziej na zwietrzelinie skalnej i kamieniach. B. rzadko u podstawy pni świerków w borach i na gałęziach kosodrzewiny. W podgrupach: Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki i Pilska, gdzie stwierdzono najwięcej stanowisk. Od 775 do 1450 m n.p.m. Dwa razy zbierano z periancjami (stan. 83 i 227) i dwa razy z rozmnożkami (stan. 75 i 120).

Częsty, 29 stan.: 28a Kl, 29 (1220), 34, 38 (875), 41 (910, 920), 43, 56 (1110), 71, 75, 76, 80 (1270) WWt, 82 (1295), 83, 89 (1330) WM, 92, 96 (1450), 100 (1250 WŻ, 1280), 105 (1225), 106, 120 (790), 122, 154 (1030), 174, 227 (850), 229, 232, 238 (775).

***Jungermannia leiantha* Grolle** — Na mokrych, murszejących kłodach i pniach świerkowych, w dolinach potoków, rzadziej na mokrych kamieniach na brzegach potoków. Rzadko na mokrej, humusowej glebie i kamieniach w borach świerkowych oraz ziołoroślach. Nie występuje w podgrupach Zabawy, Suchoj Góry, Prusowa, Magury, Kiczory i Kotlinie Jeleśniańskiej. Maksymalnie do 1470 m n.p.m. Ponad 90% stan. w reglu dolnym. Zawsze z periancjami, również ze sporogonami. B. częsty, **59 stan.:** 27, 34, 39 (820), 43, 57, 62, 65, 67, 69 (1150), 76, 80 (1260) WWt, 85 (1260), 92, 96 (1470), 108, 110 (625), 119 (760), 123 (1135), 137, 141, 154 (1000, 1030), 157, 159, 162, 170 (885, 900), 174, 175, 181, 183, 184 (900, 930), 186 (825), 193 (960), 194 (950), 195, 197 (980, 1025), 203 (1075), 204, 206, 208, 212, 215, 217 (975, 1000), 218, 219, 220 (1050), 223, 224, 226 (825), 227 (850 J, 875), 229, 231, 238 (775), 239 (1100).

***Jungermannia atrovirens* Dum.** — Na mokrych kamieniach w potokach, w pasie hydroamfibiontów i geoamfibiontów, rzadziej na skałach w dolinach potoków. Podgrupy: Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Romanki i Pilśka. Do 975 m n.p.m. Obfite periancja; również okazy męskie; sporogonów nie obserwowano.

Rzadki, **8 stan.:** 10 (570), 36 (975), 45, 136, 178, 180, 196, 231.

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. W Beskidach Zachodnich znany z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŃA 1969b), Gorców (MAMCZARZ 1979) i Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977).

***Jungermannia pumila* With.** — Na mokrych kamieniach piaskowcowych w potokach, w pasach hydro- i geoamfibiontów, rzadziej na wilgotnych kamieniach i skałach w borach świerkowych, na zboczach dolin potoków. Również na wilgotnej, kamienistej glebie na obrywkach ziemi w dolinach i mokrym humusie w małej źródłiskowej. Ok. 90% stan. w reglu dolnym. W podgrupach Ożnej, Wielkiej Raczy, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki i Pilśka. Zawsze z periancjami; również ze sporogonami.

Częsty, **36 stan.:** 10 (590), 27, 43, 44, 56 (1100, 1110), 65, 67, 75, 76, 79 (1215), 88 (1330, 1350), 91, 93 (1290), 119 (760), 135, 136, 141, 147, 162, 170 (900), 175, 180, 186 (825), 188, 194 (950), 203 (1075), 206, 208, 224, 225, 229, 231, 235, 236.

Gatunek jednopienny (paroecia); okazy z dobrze wykształconym, wrzecionowatym periancjum mają wyraźnie wydęte męskie liście okrywowe bądź też część rozerwanej plemni. Na okazach młodych obserwowano rodnie i plemnie.

Ten wybitnie górski gatunek jest notowany po raz pierwszy z Beskidu Żywieckiego. W Polsce znany z Gór Izerskich, Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy (SZWEYKOWSKI 1958a), Gór Stołowych (SZWEYKOWSKI 1953), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), Gorców (MIERZEŃSKA 1994) i Tatr (SZWEYKOWSKI 1960). W Beskidach Zachodnich rośnie na obszarze Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŃA 1969b).

***Jungermannia confertissima* Nees** — Na ocienionej skale piaskowcowej, mokrym humusie na brzegu potoku i mineralnej glebie na trawiastej skarpie. W podgrupie Lipowskiej i Pilśka. Od 1110 do 1400 m n.p.m. (Ryc. 31). Z periancjami.

B. rzadki, **3 stan.:** 56 (1110), 95 (1400), 99 (1300).

Rośliny drobne, jasnozielone, o liściach szerokich, niektóre chwytники wyrastają z periancjów i żeńskich liści okrywowych. Wyraźne perygynium.

Ryc. 31. Rozmieszczenie:

Fig. 31. Distribution of:

1 — *Tritomaria exsectiformis*; 2 — *Jungermannia confertifissima*; 3 — *Geocalyx graveolens*; 4 — *Jungermannia obovata*; 5 — *Jungermannia subelliptica*; 6 — *Marsupella sprucei*

Gatunek po raz pierwszy notowany w Beskidzie Żywieckim. W Beskidach Zachodnich bardzo rzadki. Znany tylko z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŇA 1970b) i Gorców (MAMCZARZ 1979).

***Jungermannia sphaerocarpa* Hook.** — Na mokrych kamieniach w pasie hydro- i geoamfibiontów, również na wilgotnych kamieniach i skałach w dolinach potoków oraz na mineralnej glebie skarp. Głównie na N i NE stokach Pilska oraz N stokach Szczawiny. Jedno stan. w podgrupie Wielkiej Raczy. Od 1025 do 1400 m n.p.m. Ok. 90% stan. w reglu górnym i kosówce. Obfite periancja i sporogony.

D. częsty, **15 stan.**: 82 (1295), 83, 85 (1275) WWt, 91, 93 (1290, 1300), 94 (1370, 1380), 95 (1400), 99 (1300), 100 (1280), 102, 105 (1225, 1230), 229.

W Beskidach Zachodnich dość rzadki, znany z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŇA 1970a), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950) i Babiej Góry (SCHIFFNER 1914; ŠMARDA 1937; WOJTERSKI 1955) oraz Gorców (SZWEYKOWSKI npbl.; MIERZEŃSKA 1994).

! *Jungermannia gracillima* Sm. — Na mineralnej glebie przydrożnych skarp i nad potokami, na ścieżkach, kamieniach wystających z gleby, np. przy ścieżkach, rzadziej na ziemi w zbiorowiskach trawiastych, polach i na kamieniach na brzegach potoków. Rozpowszechniony na całym obszarze do wysokości 1390 m n.p.m. Nie występuje w podgrupach Magury i Kiczory oraz w Kotlinie Jeleśniańskiej. B. częste periancja i sporogony.

B. częsty, **43 stan.:** 13, 14, 20 (620), 23, 50, 51 (1000), 52, 53 (850), 58 (1090), 59, 64 (1150), 69 (1150), 79 (1215), 90 (1390), 93 (1300), 109 (660), 110 (600), 111, 114 (515, 525), 117, 119 (760), 123 (1135), 125, 126, 127 (920), 128 (870), 133 (525), 134, 138, 143, 156 (1045), 158 (825), 159, 178, 187 (740), 193 (980, 990), 202 (1160, 1185), 209, 232, 236.

Obrzeżenie liści, zwłaszcza żeńskich liści okrywowych, bardzo wyraźne. Często zbierano formy bardzo drobne.

! *Jungermannia hyalina* Lyell — Na mineralnej glebie przydrożnych skarp i skarpach rowów. Podgrupy Rachowca, Oszusu i Kotliny Jeleśniańskiej. Do 605 m n.p.m. Z periancjami.

B. rzadki, **3 stan.:** 8, 126, 148 (590).

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. W Beskidach Zachodnich podawany z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŃA 1971a), Beskidu Śląskiego (KULESZA 1914; REJMENT-GROCHOWSKA 1950; DUDA, VAŃA 1971a) i Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977).

Jungermannia obovata Nees — Na mokrych kamieniach w potokach (w bryzgach) — pas hydroamfibiontów. Rzadko na mokrych kamieniach na brzegach potoków i w zbiorowiskach ziołoroślowych oraz na wilgotnych skałach w buczynach. W podgrupach Pilska (10 stan.), Oszusu i Lipowskiej. Najwięcej stan. powyżej 1100 m n.p.m.; trzy stan. poniżej 1000 m n.p.m. (Ryc. 31). Zawsze z periancjami, również ze sporogonami.

D. częsty, **12 stan.:** 34, 56 (1110), 76, 93 (1290), 98 (1475), 99 (1300), 101, 102, 105 (1225), 123 (1100, 1135), 179.

Jungermannia subelliptica (Lindb. ex Kaal.) Levier — Na ocienionych skałach piaszczystych, na zwietrzelinie i w szczelinach tych skał, na wilgotnych zwietrzałych kamieniach na brzegach potoków i rumoszu łupkowym (zwietrzały flisz) na skarpach nad potokami. W podgrupach Wielkiej Raczy, Oszusu, Romanki i Pilska w reglu dolnym i górnym. Od 720 do 1175 m n.p.m. (Ryc. 31). Zawsze z periancjami, również ze sporogonami.

Rzadki, **10 stan.:** 27, 56 (1110), 63 (1175) WWt, 75, 123 (1135), 180, 229, 231, 238 (750, 770).

Jednopienny (paroecia), rośliny drobne do 1 cm długości i 2 mm szerokości, liście eliptyczne luźno ułożone na łodyżce; periancjum nie przewyższa (lub niewiele) liści okrywowych; najwyższa para żeńskich liści okrywowych nie odstaje od periancjum.

Gatunek w Polsce bardzo rzadki. Dotychczas znany z jednego stan. w Górach Stołowych (SZWEYKOWSKI 1953), ponadto z Rysianki w Beskidzie Żywieckim (WOJTERSKI 1959), Gorców (MIERZEŃSKA 1994) i kilku stan. w Tatrach (SZWEYKOWSKI 1960; badania własne autora). W Czechach i Słowacji również bardzo rzadki, znany z osiemnastu stan., m.in. z Beskidów Śląsko-Morawskich (10 stan.), Babiej Góry (1 stan. — ŠMARDKA 1937), Małej Fatry, Gór Kremnickich, Tatr i Niżnych Tatr (DUDA, VAŃA 1970b).

***Nardia scalaris* S. Gray** — Na odkrytej, mineralnej glebie przydrożnych skarp i nad potokami, na przydrożach i ścieżkach, rzadziej na skałach i kamieniach piaskowcowych, w zbiorowiskach potokowych w pasie geoamfibiontów; również na glebie w psiarach i ziołoroślach. Rozpowszechniony na całym terenie. W podgrupach: Zabawy, Rachowca, Ożnej, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Lipowskiej, Pilska (najwięcej stan.), Suchej Góry, Prusowa i Magury; w całym zakresie wysokości. Rzadko okazy żeńskie z wykształconym marsupium. Tylko jeden raz obserwowano sporogony (stan. 14).

Częsty, **40 stan.:** 9, 14, 15 (550, 570), 16 (650), 31, 45, 56 (1100), 60 (1310), 63 (1200), 64 (1150), 79 (1215), 89 (1330), 90 (1390), 93 (1290), 94 (1370), 95 (1400), 96 (1460) WWt, 97 (1500), 98 (1475), 109 (670), 110 (600, 610, 620, 640), 111 (520), 114 (515, 525), 117, 119 (760), 122, 128 (860), 132, 133 (525), 143, 144 (585, 600 Kl), 169 (825), 178, 191 (950).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski (Babia Góra, Pilsko, Polica) (REHMAN 1886).

***Nardia geoscyphus* (De Not.) Lindb.** — Na odkrytej mineralnej glebie przydrożnych skarp w borach świerkowych. W podgrupach Rachowca, Pilska i Prusowa. Od 650 do 1010 m n.p.m. Zbierano okazy żeńskie.

B. rzadki, **3 stan.:** 22 (1010), 45, 109 (650).

Gymnomitriaceae Klinggr.

***Marsupella funckii* (Web. & Mohr) Dum.** — Na odkrytej, mineralnej glebie przydrożnych skarp i poboczach ścieżek, rzadziej w szczelinach skał i na glebie w murawach ciepłolubnych; prawie zawsze w miejscach oświetlonych. W podgrupach Wielkiej Rycerzowej, Oszusu i Lipowskiej. Do 870 m n.p.m. Z periancjami.

B. rzadki, **4 stan.:** 53 (870), 119 (760), 143, 210.

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski (REHMAN 1886); Racza Hala (KRUPA 1882).

****Marsupella sprucei* (Limpr.) H. Bern.** — Na piaskowcowych kamieniach wystających z gleby w borach świerkowych, rzadziej na wilgotnych kamieniach na brzegach potoków w pasie geoamfibiontów. W podgrupach Wielkiej Rycerzowej, Lipowskiej, Romanki i Pilska. Od 850 do 1520 m n.p.m. Większość stan. w reglu górnym i w kosówce; tylko 3 stan. w reglu dolnym (Ryc. 31). Zawsze sporogony. Rzadki, **9 stan.:** 28 (1340), 30, 64 (1150), 94, 97 (1520), 123 (1135), 174, 202 (1185), 206. Rośliny drobne, do 5 mm wysokości, jednopienne, komórki w środku liści średnio $17 \times 21 \mu\text{m}$, na brzegu liści średnio $14 \mu\text{m}$ wielkości; zarodniki średnio $11 \mu\text{m}$ średnicy (od 10 do $12 \mu\text{m}$); sprężyce o średniej grubości $7 \mu\text{m}$ (6–8 μm), przeważnie z dwoma (rzadziej trzema) spiralnymi zgrubieniami ściany komórkowej.

W ujęciu systematycznym GROLLEGO (1976, 1983) i DUELLA (1983), *Marsupella sprucei* (Limpr.) H. Bern. odpowiada *M. sprucei* (Limpr.) H. Bern. + *M. ustulata* Spruce (por. MÜLLER 1957). Rośliny zbierane w grupach Wielkiej Rycerzowej i Pilska odpowiadają *Marsupella sprucei* s.str.

Gatunek bardzo rzadki w Beskidach Zachodnich. Notowany po raz pierwszy z polskiej części Beskidu Żywieckiego. Występuje również po słowackiej stronie Babiej Góry (ŠMARDÁ 1938, 1961) oraz w Gorcach (SZWEYKOWSKI npbl.; por. też MIERZEŃSKA 1994). W Polsce ten wysokogórski gatunek występuje także w Karkonoszach i Tatrach (SZWEYKOWSKI 1958a, 1960) oraz na jednym stanowisku niżowym k. Kartuz, gdzie został znaleziony przez P. Krawca (SZWEYKOWSKI 1958b).

Plagiochilaceae (Joerg.) K. Müll.

***Plagiochila asplenioides* (L. em. Tayl.) Dum.** — Na humusie i humusowej glebie w borach świerkowych i buczynach, na wilgotnych kamieniach i glebie na brzegach potoków w strefie geoamfibiontów, również na mineralnej glebie przydrożnych skarp. Rzadziej w zbiorowiskach trawiastych, ziołoroślach i u podstawy pni świerków. W podgrupach: Zabawy, Rachowca, Ożnej, Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki, Pilska i Suchej Góry. Tylko w reglu dolnym do 1025 m n.p.m. Zawsze płonny.

Częsty, **33 stan.:** 24, 34, 45, 48, 57, 107 (800), 110 (630), 111, 114 (525), 119 (775), 125, 129 (770), 135, 137, 138, 142, 143, 158 (825), 159, 164, 173, 177, 180, 182, 186 (850), 211, 212, 213 (710), 214 (720), 215, 226 (825), 227 (850) WJ, 238 (775).

***Plagiochila porelloides* (Torrey ex Nees) Lindenb.** — Na różnych siedliskach, najczęściej na mokrych kamieniach w pasie hydro- i geoamfibiontów, rzadziej na korze pni drzew żyjących (głównie na bukach) i na stopie drzew, na humusowej glebie i humusie w borach świerkowych i buczynach, skałach i kamieniach piaszczystych, mineralnej glebie przydrożnych skarp. Rzadko w ziołoroślach i na murszejącym drewnie. Rozpowszechniony na całym obszarze, nie występuje w podgrupach Suchej Góry i Magury. W całym zakresie wysokości. Płonny, tylko jeden raz zbierano z periancjami (stan. 214); częściej okazy męskie.

Pospolity, **104 stan.:** 2, 6, 10 (570, 590), 14, 16 (650), 18, 23, 24, 25, 27, 28 (1340), 29 (1220, 1240, 1260), 30, 33 (825), 34, 35, 36 (975), 39 (820), 41 (930), 42 (690), 43, 44, 46, 56 (1110), 57, 58, 60 (1280) Sz, 64 (1150), 65, 67, 69 (1150, 1175), 71, 72 (1000) B, 76, 79 (1220) WWt, 82, 84, 92, 98 (1475), 100 (1285), 101, 105 (1225), 106 WJ, 108, 118, 119 (760), 120 (790), 124, 125, 126, 131, 133 (525), 136, 140, 141, 142, 148 (575), 153, 154 (1030), 157, 162, 168, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 186 (825), 188, 194 (950), 195, 196, 197 (1000), 202 (1160, 1185), 203 (1050, 1075), 205 (1100), 206, 208, 209, 211, 212, 214 (720), 215, 217 (975), 218, 221 (1215), 223, 224, 226 (820), 228 (900) B, 229, 236, 238, 239 (1100, 1140).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866); Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

Geocalycaceae Klinggr.

***Lophocolea bidentata* (L.) Dum.** — Zwykle na ściółce i humusowej glebie w borach świerkowych oraz na glebie w murawach. Rzadziej w ziołoroślach, na odkrytej glebie skarp, na brzegach potoków, skałach i kamieniach w lasach, murszejącym drewnie i u nasady pni drzew. Do 1260 m n.p.m., ale powyżej 900 m b. rzadki (99% stan. na pogórzu i w reglu dolnym). Rozpowszechniony na całym terenie; nie notowano w podgrupach Będoszki i Kiczory. Zawsze płonny.

Pospolity, **62 stan.:** 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15 (550), 24, 42 (690), 45, 46, 47, 48, 51 (1000), 57, 67, 86 (1260), 110 (620, 640), 114 (515), 119 (760, 775), 120 (790), 124, 125, 126, 128 (860), 129 (770, 780), 130 (680), 135 (505), 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 148 (575), 149 (630), 150, 153, 157, 158 (825), 163, 164, 177, 180, 181, 182, 186 (850), 187 (740), 196, 210, 211, 214 (710), 215, 218, 239 (1140).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866).

! *Lophocolea cuspidata* (Nees) Limp. — Na siedliskach b. wilgotnych i ocienionych niż *L. bidentata*. Na mokrej glebie i kamieniach w ziołoroślach w dolinach potoków, mokrych kamieniach w potokach w pasie geoamfibiontów, mokrym humusie (w lokalnych zagłębieniach terenu i drobnych ciekach) w borach świerkowych, na wilgotnej, odkrytej glebie skarp, rzadziej na wilgotnych kamieniach w borach. W podgrupach: Zabawy, Rachowca, Ożnej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Pilska, Prusowa, Magury i Kotlinie Jeleśniańskiej. Tylko na pogórzu i w reglu dolnym do 1050 m n.p.m. Z periancjami i męskimi gałązkami.

D. częsty, **17 stan.:** 7, 9, 14, 39 (820), 42 (675, 690), 48, 109 (660), 110 (630), 119 (750), 137, 142, 148, 153, 158 (825), 188, 220 (1050).

Jednopienny (autoecia), znajdowano liczne młode periancja i męskie gałązki z plemniami. Rośliny żywo zielone, gałęziste, liście o długich spiczastych łatach. Gatunek krytyczny. VOGELPOEL (1977) uważa, że ze względów nomenklatorycznych dla gatunków *L. bidentata* (L.) Dum i *L. cuspidata* (Nees) Limpr. uprawniona jest jedna nazwa *L. bidentata* (L.) Dum., stąd łączy je w jeden gatunek *L. bidentata* (L.) Dum. Z kolei SCHUSTER (1980) twierdzi, że dwupienny takson *L. bidentata* auct. non (L.) Dum. [= *L. cuspidata*] nie może być zwykłym synonimem jednopiennego (autoecia) *L. bidentata* (L.) Dum. W opracowaniu taksonomiczno-nomenklatorycznym podrodziny *Lophocoleoideae*, ENGEL i SCHUSTER (1984) uważają, że *L. cuspidata* [= *Chiloscyphus cuspidatus* (Nees) Engel & Schust.] i *L. bidentata* [= *Chiloscyphus latifolius* (Nees) Engel & Schust.] są odrębnymi gatunkami. Za odrębnością tych gatunków wskazuje również liczba chromosomów: *L. bidentata* ma ich 9, natomiast *L. cuspidata* — 18 (FRITSCH 1982). Na konieczność szczegółowych badań taksonomicznych w obrębie *L. bidentata* complex wskazuje GROLLE (1983). W niniejszym opracowaniu przyjęto ujęcie taksonomiczne według MÜLLERA (1954).

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. W Beskidach Zachodnich podawany z Górców (MAMCZARZ 1979), Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977) i Beskidu Małego (JĘDRZEJKO, ŻARNOWIEC 1986).

***Lophocolea heterophylla* (Schräd.) Dum.** — Zajmuje wiele typów podłoży, a najczęściej murszejące kłody i pnie w borach świerkowych i buczynach, na korze drzew (głównie u podstawy pni), ściółce i humusowej glebie w borach świerkowych i buczynach, rzadziej na innych siedliskach. We wszystkich mikroregionach w całym zakresie wysokości. Pospolicie tworzy periancja i sporogony.

Pospolity, **188 stan.:** 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15 (570), 16 (650, 686), 21 B, 22 (1010), 23, 25, 26, 27, 28 (1340, 1350 M, 1360), 29 (1220, 1240, 1260), 30, 35, 36 (940, 975), 37 (880), 41 (910, 930), 42 (675, 690), 44, 45, 46, 48, 49 (1040), 51 (1000, 1020), 52, 53 (870), 56 (1110), 58, 60 (1290 M, 1310 WM), 61, 62, 64 (1150), 65, 67,

68 (1050), 69 (1150, 1175), 70 (970), 76, 79 (1215), 83, 84, 85 (1260), 87 (1235) Wt, 92, 93 (1290, 1310), 94 (1370), 95 (1400, 1410), 96 (1450, 1460, 1470, 1480), 98 (1475), 99 (1350) WM, 101, 103 (1200, 1225), 105 (1225), 106, 107 (800, 815), 108, 109 (650, 660, 670), 110 (600, 620), 111, 114 (525), 118, 119 (750, 760, 775), 120 (790, 825), 121, 122, 123 (1135), 124, 125, 126, 127 (920, 940, 950), 128 (860), 131, 133 (505, 525), 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 148 (575), 152 (920, 950), 154 (1030), 155 (1050), 156 (1045), 157, 158 (825, 840), 159, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 170 (900), 175, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184 (910, 930), 188, 190, 192, 193 (960, 980, 990), 194 (930, 950), 195, 196, 197 (980, 990, 1000, 1010, 1025), 198, 202 (1160, 1185), 203 (1050, 1075), 204, 205 (1125), 206, 208, 209, 210, 211, 212, 214 (720), 215, 216, 217 (925), 218, 219, 220 (1050), 221 (1215), 223, 224, 226 (820), 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 239 (1100).

***Chiloscyphus polyanthos* (L.) Corda** — Na mokrych kamieniach w potokach w pasie hydro- i geoamfibiontów; rzadziej na mokrej glebie w źródłiskach i ziołoroślach oraz na wilgotnych kamieniach i skałach w lasach. Nie stwierdzono w podgrupach Zabawy, Suchej Góry i Kiczory. W całym zakresie wysokości. Najwięcej stanowisk od 600 do 900 m n.p.m., gdzie występują najlepiej wykształcone zbiorowiska potokowe, a potoki mają typowy układ pasowy roślinności (por. SZWEYKOWSKI 1951). Niżej zbiorowiska potokowe są zniszczone. Z periancjami i sporogonami.

Pospolity, **94 stan.**: 4, 6, 10 (570, 590), 16 (650), 18, 19, 23, 24, 25, 30, 32 (740), 33 (815) J, 35, 39 (820), 42 (675, 690), 45, 56 (1110), 58, 62, 64 (1150), 65, 67, 70 (975), 75, 84, 91, 92, 98 (1440, 1475), 101, 106, 108, 109 (650), 110 (620, 640), 118, 120 (825), 123, 124, 125, 128 (870), 130 (680), 131, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 147, 148 (575), 154 (1030), 158 (840), 159, 162, 163, 164, 168, 170 (900), 173, 174, 175, 180, 181, 183, 186 (825, 850), 190, 193 (975), 194 (950), 195, 196, 197 (1000), 203 (1050, 1075), 204, 206, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 218, 220 (1075), 223, 224, 226 (820), 232, 236, 238 (750, 775).

Lit.: Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

Rośliny ciemnozielone, w środku liścia o komórkach 20–35 (40) μm wielkości. W nurcie potoków zbierano formy reofilne — czarnozielone, drobnolistne, regularnych kształtów [= *Ch. polyanthos* var. *rivularis* (Schr.) Gott. et al.].

***Chiloscyphus pallescens* (Ehrh. ex Hoffm.) Dum.** — Głównie na mokrej glebie w młakach źródłiskowych i ziołoroślach, na brzegach potoków w strefie geoamfibiontów, na mokrej, gliniastej glebie przydrożnych skarp, rzadziej na ziemi w łągach olszowych nad potokami. Nie stwierdzony w podgrupie Będoszki, Suchej Góry, Magury i Kiczory. W całym zakresie wysokości. W rozmieszczeniu pionowym obserwuje się zagęszczenie stanowisk w dwóch zakresach, 500–800 m i 1000–1500 m n.p.m. W położeniach wyższych prawie wyłącznie w ziołoroślach i młakach źródłiskowych; w niższych przechodzi również na inne typy siedlisk. Przeważnie płonny; również z periancjami.

Częsty, **36 stan.**: 6, 10 (570), 15 (550), 39 (820), 42 (690), 45, 56 (1100), 58, 63 (1175), 85 (1260), 88 (1330, 1350), 93 (1290), 96 (1450), 97 (1500) WWt, 98 (1440, 1475),

105 (1225), 109 (640, 650), 110 (620), 129 (770, 775), 133 (505), 135, 147, 154 (1030), 159, 164, 177, 203 (1075), 216, 220 (1050), 223, 232.

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski — Babia Góra, Pilsko, Polica (REHMAN 1866).

Rośliny jasno- i żółtozielone. Liście prawie tak długie jak szerokie (u niektórych form kwadratowe) lub dłuższe, niektóre liście z płytką zatoką na szczycie. Komórki w środku liścia duże — 34–50 μm . Formy miejsc bardziej suchych duże, żółtozielone, o b. małej liczbie chloroplastów w komórce, z dobrze zachowanymi, dużymi ciałami oleistymi (do 13 μm). Rośliny miejsc mokrych są duże, zielone, rosną ortotropowo, o liściach prawie kwadratowych i nieco mniejszych komórkach: 30–45 μm . Odpowiadają one *Ch. p. var. fragilis* (A. Roth) K. Müll.

***Geocalyx graveolens* (Schräd.) Nees** — Na wilgotnym humusie oraz wilgotnych kamieniach w borach świerkowych. W podgrupach Romanki i Pilska. Od 850 do 1270 m n.p.m. (Ryc. 31). Zawsze płonny. Gatunek narażony (V) w Polsce.

B. rzadki, 4 stan.: 26, 76, 92, 93 (1270) WWt.

Ryc. 32. Rozmieszczenie:

Fig. 32. Distribution of:

1 — *Harpanthus flotovianus*; 2 — *H. scutatus*; 3 — *Diplophyllum taxifolium*; 4 — *Scapania parvifolia*; 5 — *S. helvetica*; 6 — *S. lingulata*; 7 — *S. paludosa*; 8 — *S. subalpina*

!! *Harpanthus flotovianus* (Nees) Nees — Na mokrym humusie w ziołoroślach i młakach oraz w wodzie potoków i na ich brzegu. Tylko na Pilsku, gdzie jest dość częsty. Od 1260 do 1475 m n.p.m. (Ryc. 32). Zawsze płonny. Rzadki, **9 stan.**: 85 (1260), 88 (1340, 1350), 95 (1420), 96 (1450, 1470), 98 (1440, 1450, 1475).

W 1984 r. gatunek ten został zebrany przez autora i wydany w trzecim fascykułe *Hepaticae Macroregioni Meridionali Poloniae Exsiccati* pod numerem 40 (JĘDRZEJKO, KLAMA, ŻARNOWIEC 1984b).

Wątrobowiec wybitnie górski. Występuje jedynie w wysokich górach. W Polsce rośnie w Górach Izerskich, Karkonoszach, Gorcach i Tatrach. Ponadto znane są trzy reliktowe stan. na niżu północno-zachodnim (woj. szczecińskie i koszalińskie) (SZWEYKOWSKI 1971; MIERZEŃSKA 1994). Stanowiska na Pilsku i w Gorcach są jedyne w Beskidach Zachodnich.

Harpanthus scutatus (Web. & Mohr) Spruce — Na murszejących kłodach świerkowych w masywie Pilska (Ryc. 32). Płonny.

B. rzadki, **2 stan.**: 41 (910, 930).

Scapaniaceae Migula

Diplophyllum albicans (L.) Dum. — Na ocienionych skałach i kamieniach w borach świerkowych; również na odkrytej glebie na osuwisku ziemnym w dolinie potoku. W podgrupach Będoszki, Lipowskiej i Pilska. Do 1275 m n.p.m. Z periancjami.

B. rzadki, **5 stan.**: 34, 45, 56 (1110), 83, 168.

Lit.: Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866); Ujsoły, Sopotnia (KRUPA 1879, 1882).

Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dum. — Na szczycie Pilska (Ryc. 32).

B. rzadki, **1 stan.**: 97 (1550 K, 1540) — Pilsko, pod szczytem, w szczelinach skał piaskowcowych. 1530 m n.p.m. Z rozmnożkami.

KOŁA (1969) podaje ten gatunek z wysokości 1550 m n.p.m. Gdyby tak było istotnie, to stanowisko znajduje się już po stronie słowackiej Pilska, gdyż najwyższy punkt po stronie polskiej leży na wysokości około 1540 m n.p.m.

Ten wysokogórski gatunek rośnie także w Beskidach Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŃA 1981a), na Babiej Górze (ŠMARDKA 1937; WOJTERSKI 1955; PECIAR 1971) i w Beskidzie Małym (JĘDRZEJKO, KLAMA, ŻARNOWIEC 1985b).

Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dum. — Na kamieniach i skałach w lasach, na mineralnej glebie w murawach porastających przydrożne skarpy i osuwiska (stadia inicjalne zbiorowisk), rzadziej na wilgotnych kamieniach na brzegach potoków. Do 1295 m n.p.m. W podgrupach Wielkiej Rycerzowej, Lipowskiej, Romanki i Pilska. Zawsze z periancjami; częste sporogony.

Rzadki, **9 stan.**: 9, 23, 45, 64 (1150), 79 (1215), 82 (1295), 83, 103 (1200), 174.

! *Scapania parvifolia* Warnst. — Pilsko (Ryc. 32). Gatunek zagrożony (T) w Europie.

B. rzadki, **1 stan.**: 97 (1540) — Pilsko, pod szczytem, na kwaśnym humusie w borówczysku. Płonny. 1540 m n.p.m.

Rośliny małe, do 4 mm długości, purpurowo-brunatne. Liście z wyraźnym obrzeżeniem. Płaty grzbietowe skierowane ku szczytowi łodyżki.

Gatunek wybitnie wysokogórski, podawany po raz pierwszy z Beskidu Żywieckiego. W Beskidzie Sądeckim na trzech stanowiskach w pasie 800–900 m n.p.m. (MAMCZARZ 1977). Dość częsty w piętrach subalpejskim i alpejskim Tatr (SZWEYKOWSKI 1960 i obserwacje własne autora); KARCZMARZ (1967, 1970) podaje z kilku stanowisk na Roztoczu i Wyżynie Lubelskiej. Z uwagi na wysokogórski charakter gatunku, stanowiska położone na niżu i w niższych położeniach górskich wymagają sprawdzenia.

***Scapania curta* (Mart.) Dum.** — Na odkrytej glebie przydrożnych skarp, na rzadko uczęszczanych ścieżkach, rumoszu łupkowym na obrywkach ziemnych; rzadziej na zwietrzelinie naskalne i kamieniach. Podgrupy: Zabawy, Ożnej, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Pilska, Sucheje Góry i Magury. Do 1105 m n.p.m. Często periancja, prawie zawsze rozmnóżki. Sporogonów nie obserwowano.

D. częsty, **19 stan.:** 9, 44, 53 (870), 69 (1150), 111, 114 (515), 119 (760), 133 (505), 135, 136, 137, 138, 144 (585), 148 (590), 149 (630), 178, 180, 202 (1185), 235.

! *Scapania helvetica* Gott. — Na mokrej glebie w młakach źródliskowych, również na mokrej, odkrytej glebie na skarpie przydrożnej oraz na wilgotnej, ocienionej skale w buczynie. W podgrupach Lipowskiej i Pilska od 1110 do 1475 m n.p.m. (Ryc. 32). Z periancjami i rozmnóżkami. Sporogonów nie obserwowano.

B. rzadki, **4 stan.:** 56 (1100), 69 (1150), 85 (1260), 98 (1475).

Rośliny bez obrzeżenia liści; płat grzbietowy tępy, zaokrąglony. Komórki brzeżne liścia 14–15 μm .

Gatunek wybitnie górski, występuje w górach Europy Środkowej w piętrach subalpejskim i alpejskim. Znanie jest tylko jedno stanowisko z niżu środkowoeuropejskiego w okolicach Kartuz (SZWEYKOWSKI, KOZŁICKA 1969). Bardzo rzadki w Beskidach Zachodnich. Podawany z dwóch stanowisk w Beskidzie Śląskim przez REJMENT-GROCHOWSKĄ (1950); znany z Gór Świętokrzyskich (HAUSBRANDT 1949), Kotliny Jeleniogórskiej (SZWEYKOWSKI 1958a) i Tatr (SZWEYKOWSKI 1960), gdzie jest częsty. Ostatnio znaleziony na dwóch stanowiskach w Górcach (MIERZEŃSKA 1994).

! *Scapania mucronata* Buch — Na kamieniach piaszczystych, w szczelinach skał i skałach w borach świerkowych; również na mineralnej glebie skarp (przy drogach i nad potokami), rzadziej w murawach porastających skarpy. W podgrupach Zabawy, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Pilska (najwięcej stanowisk) i Magury. Od 525 do 1360 m n.p.m. Większość stanowisk w reglu dolnym. Bardzo często z rozmnóżkami; również z periancjami.

D. częsty, **12 stan.:** 9, 18, 44, 53 (870), 56 (1110), 82 (1275), 88 (1330), 94 (1360), 133 (525), 135, 156 (1045), 180.

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. Znany z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŇA 1969a), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977) i Górców (SZWEYKOWSKI npbl.; por. też MIERZEŃSKA 1994).

!! *Scapania cf. lingulata* Buch — Podgrupa Krawcowego Wierchu (Ryc. 32). B. rzadki, **1 stan.:** 137 — Krawców Wierch, NW ramię, dol. pot. Straceniec, rumosze łupkowy na osuwisku ziemnym na zboczu doliny; z rozmnóżkami; 760 m n.p.m. Liście bez obrzeżenia; komórki na brzegu liścia (17)–21–(27) μm . W tabeli 18 przedstawiono wymiary komórek brzeżnych płata brzuszno liścia (każda liczba jest średnią z pomiaru dwunastu komórek w liściu; komórki mierzono w pięciu liściach z pięciu okazów). Okazy mają zniszczone przez rozmnóżki szczyty liści, stąd nie można z całą pewnością stwierdzić, czy liście są ząbkowane. Szczegółowa

Wymiary komórek brzeżnych płata brzuszego liścia
Scapania lingulata
 Marginal cell sizes of the *Scapania lingulata* leaves

Numer okazu Number of specimen	Średnia długość komórek Arithmetical means of length of cells μm
1	19,7
2	21,9
3	23,4
4	19,2
5	20,7

Uwaga: każda liczba jest średnią z pomiaru 12 komórek w liście

Note: the arithmetical means are based on measurings of 12 cells in one leaf

charakterystyka *S. lingulata* i omówienie jej pozycji taksonomicznej zawarte są w opracowaniach SCHUSTERA (1974), SCHUSTERA i DAMSHOLTA (1974) oraz PATON (1981).

Gatunek bardzo rzadki. W Polsce znany tylko z kilku stanowisk: z wyspy Wolin i z okolic Szczecina (SZWEYKOWSKI, KOŻLIKA 1969) oraz z Gór Stołowych (SZWEYKOWSKI 1953). Stanowisko w grupie Pilska jest pierwszym notowaniem tego gatunku w Karpatach Zachodnich. Ze względu na niepewne oznaczenie tego gatunku wymagane są dalsze badania nad jego rozmieszczeniem w Beskidzie Żywieckim.

***Scapania irrigua* (Nees) Nees** — Na odkrytej glebie przydrożnych skarp i nad potokami, na ścieżkach, w szczelinach skał i na kamieniach, zwykle w miejscach otwartych. Również na glebie w murawach na nasłonecznionych stokach. Podgrupy: Zabawy, Ożnej, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Pilska, Suchej Góry i Magury. Od 500 do 1290 m n.p.m. Tylko jedno stanowisko w reglu górnym. Najwięcej stanowisk w pasie 500–800 m n.p.m. Z periancjami i rozmnózkami. Sporogonów nie obserwowano.

D. częsty, **15 stan.:** 4, 9, 13, 17, 93 (1290), 112, 114 (515), 119 (760, 775), 120 (800), 143, 150, 156 (1025), 163, 180.

***Scapania undulata* (L.) Dum.** — Przede wszystkim w zbiorowiskach potokowych w pasach euhydro-, hydro- i geoamfibiontów. B. rzadko na skałach i kamieniach w lasach oraz na mokrej glebie w ziołoroślach i wysiękach wody. Rozpowszechniony na całym obszarze; nie stwierdzono w podgrupach Zabawy, Suchej Góry, Prusowa, Kiczory i Kotlinie Jeleśniańskiej. Od 560 m n.p.m. po najwyższe położenia. Poniżej 600 m n.p.m. gatunek ten jest rzadki, co niewątpliwie jest związane ze znacznym zniszczeniem zbiorowisk potokowych w niższych położeniach. Bardzo często tworzy periancja, sporogony i rozmnózki.

Pospolity, **101 stan.:** 9, 10 (570), 18, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36 (975), 39 (820), 42 (690), 56 (1100, 1110), 57, 58, 62, 63 (1215) Kl, 64 (1150), 65, 67, 70 (950), 71, 75, 76, 79 (1213), 85 (1260), 88 (1330, 1350), 91, 92, 93 (1290), 97 (1500) WWt, 98 (1450, 1475 WŻ), 99 (1300, 1320, 1360, 1375 WŻ), 100 (1285), 101, 105 (1225), 106, 108, 109 (650, 675), 110 (620, 625), 122, 123 (1135), 125, 127 (950), 128 (870), 130 (680), 135, 139, 140, 141, 142, 146, 153, 154 (1030), 159, 162, 164, 168, 170 (900), 171, 174, 181, 184 (900, 930), 186 (825), 187 (740), 188, 189, 190, 193 (975), 194 (950), 195, 196, 197 (1000, 1025), 202 (1160), 203 (1050, 1075), 204, 206, 208, 210, 216, 222 (950), 223, 224, 225, 226 (820), 229, 230.

Lit.: Beskid Zachodni (REHMAN 1866); Pilsko (KRUPA 1879).

***Scapania subalpina* (Nees ex Lindenb.) Dum.** — Na kamieniach w wodzie potoków w pasie euhydrobiontów i hydroamfibiontów, na mokrej glebie w młakach źródłkowych i ziołoroślach w rozlewiskach potoków. W podgrupie Pilska, tylko jedno notowanie w podgrupie Wielkiej Raczy. Powyżej 1100 m n.p.m. (Ryc. 32). Często z periancjami i rozmnożkami.

Rzadki, **7 stan.:** 88 (1350), 90 (1390), 98 (1475), 102, 104 (1100), 105 (1225), 164.

Lit.: Pilsko (KULESZA 1920).

W Beskidach Zachodnich gatunek znany tylko z grupy Wielkiej Raczy i Pilska oraz z Gorców (MIERZEŃSKA 1994).

! *Scapania paludosa* (K. Müll.) K. Müll. — Podgrupa Pilska (Ryc. 32).

B. rzadki, **1 stan.:** 85 (1260) — Pilsko, NW zb., Hala Cebula, na mokrej glebie w młacie źródłkowej; płonny; 1260 m n.p.m.

Oba płaty liścia zbiegają wyraźnie po łodyżce, kil silnie łukowato wygięty. Brzuszný płat liścia prawie okrągły, całobrzegi. Płat grzbietowy sercowaty, obrzeżenie liści wyraźne. GROLLE (1983), na podstawie badań biometrycznych ZEHRA (1980), włącza ten gatunek do *Scapania uliginosa* (Sw. ex Lindenb.) Dum. Wydaje się jednak, że m.in. ze względu na nieco inne preferencje ekologiczne i nieco odmienne rozmieszczenie geograficzne tych gatunków, np. w Tatrach *S. uliginosa* jest gatunkiem wyraźnie alpejskim, *S. paludosa* zaś występuje w niższych położeniach, status taksonomiczny *S. paludosa* nie jest przesądzony i konieczne są dalsze badania w tym zakresie.

Gatunek b. rzadki w Polsce, znany z kilku stanowisk w Tatrach (HAUSBRANDT 1949; SZWEYKOWSKI 1960), Karkonoszach (DUDA, VAŃA 1971a), Górach Stołowych (SZWEYKOWSKI 1953) i Puszczy Białowieskiej (HAUSBRANDT 1949) oraz w Beskidzie Sądeckim (MAMCZARZ 1977). Stanowisko w grupie Pilska jest pierwszym w Beskidzie Żywieckim i trzecim w Beskidach Zachodnich.

***Scapania nemorea* (L.) Grolle** — Najczęściej na kamieniach piaskowcowych na dnie borów świerkowych i buczyn, również na skałach, zwietrzelinie i w szczelinach skał, na wilgotnych kamieniach w potokach (pas geoamfibiontów), murszejącym drewnie. Rzadko na odkrytej glebie skarp, korze drzew i mokrej humusowej glebie w ziołoroślach. Nie notowano w podgrupach: Zabawy, Suche Góry, Magury, Kiczory i w Kotlinie Jeleśniańskiej. Od 605 do 1275 m n.p.m.; 95% stanowisk w reglu dolnym. Zawsze z rozmnożkami, dość często z periancjami.

B. częsty, **45 stan.:** 16 (680), 23, 24, 25, 26, 31, 33 (825), 34, 39 (820), 41 (910, 930), 42 (675, 690), 44 Kl, 45, 56 (1110), 57, 58, 65, 75, 79 (1215), 83, 110 (625, 640),

119 (760), 125, 127 (920), 135, 140, 141, 157, 168, 174, 179, 180, 181, 182, 184 (930), 193 (975), 196, 206, 211, 224, 238 (750, 775).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski (REHMAN 1866).

***Scapania umbrosa* (Schrad.) Dum.** — Na kamieniach wystających z gleby w lasach i przy drogach, na ocienionych skałach i w szczelinach skał, na murszejącym drewnie. Rzadko na kamieniach na brzegach potoków w pasie geoamfibiontów, na humusie i odkrytej glebie. Podgrupy: Ożnej, Wielkiej Raczy, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki i Pilska, gdzie stwierdzono najwięcej stanowisk. Od 635 do 1420 m n.p.m. B. często z periancjami; zawsze z rozmnóżkami. Częsty, **38 stan.**: 28 (1340), 29 (1220), 30, 34, 39 (820), 41 (910), 62, 65, 69 (1150, 1175), 73 WWt, 76, 79 (1215), 82 (1275), 85 (1260), 88 (1330, 1350), 92, 93 (1290, 1310), 95 (1420), 99 (1300, 1370), 100 (1250), 103 (1225), 104 (1100), 106, 122, 125, 136, 184 (930), 193 (975), 197 (1000), 203 (1075), 204, 208, 226 (820), 232.

***Scapania aequiloba* (Schwaegr.) Dum.** — Na zwietrzałych łupkach i mineralnej glebie przydrożnych skarp. Podgrupy Oszusu i Lipowskiej. Płonny, z rozmnóżkami. B. rzadki, **2 stan.**: 119 (760), 214 (720).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866).

Cephaloziellaceae Douin

! *Cephaloziella divaricata* (Sm.) Schiffn. — Na odkrytej, mineralnej glebie przydrożnych skarp, b. rzadko na kamieniach i epifitycznie na korze buków. W podgrupach Ożnej, Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Lipowskiej i Prusowa. Do 1160 m n.p.m. Ze sporogonami i rozmnóżkami.

Rzadki, **6 stan.**: 15 (570), 53 (850, 870), 163, 202 (1160), 223.

Znany z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA, VAŃA 1975), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), Gorców (MAMCZARZ 1979), Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977) i Beskidu Małego (JĘDRZEJKO, ŻARNOWIEC 1986). Z Beskidu Żywieckiego dotychczas nie podany.

! *Cephaloziella hampeana* (Nees) Schiffn. — Na mineralnej glebie skarp w miejscach otwartych; jedno notowanie na murszejącym pniu świerka na wysokości 1200 m n.p.m. Podgrupy Lipowskiej i Magury do wysokości 1200 m n.p.m. (Ryc. 33). Tworzy sporogony i rozmnóżki.

B. rzadki, **3 stan.**: 53 (870), 63 (1200), 17 (500).

Jednopienny (autoecia), rośliny płonne o łodyżkach bez amfigastriów, liście głęboko wcięte o łatach szerokich na 6–7 komórek, komórki cienkościenne. Ujście periancjum karbowane, komórki przy ujściu cienkościenne.

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. Rzadki w Beskidach Zachodnich; podawany z Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), Gorców (MEDWECKA-KORNAŚ 1955) i Beskidu Małego (JĘDRZEJKO, ŻARNOWIEC 1986). W polskiej części Karpat Zachodnich znany także z Tatr (SZWEYKOWSKI 1960) i Pienin (SZWEYKOWSKI 1961).

! *Cephaloziella rubella* (Nees) Warnst. — Podgrupa Lipowskiej.

B. rzadki, **1 stan.**: 120 (790) — Złatna Huta, Na Szeroki Kamień, dol. pot. Bystra, na odkrytej, mineralnej glebie na skarpie nad potokiem; c. per.; 790 m n.p.m.

Jednopienny (autoecia), rośliny płonne bez amfigastriów, łaty liści szerokie na 4–6 komórek, komórki grubościenne. Ujście periancjum karbowane, komórki przy ujściu grubościenne.

Ryc. 33. Rozmieszczenie:

Fig. 33. Distribution of:

1 — *Cephaloziella hampeana*; 2 — *Ptilidium ciliare*; 3 — *Bazzania tricrenata*; 4 — *Radula lindenbergiana*; 5 — *Porella platyphylla*; 6 — *P. baueri*; 7 — *Frullania tamarisci*

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. Notowany z Beskidu Śląsko-Morawskiego (DUDA 1948, 1949), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), Górców (MAMCZARZ 1979) i Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977).

Cephaloziaceae Migula

***Cephalozia bicuspidata* (L.) Dum.** Najczęściej na murszejącym drewnie i wystających z gleby kamieniach w zbiorowiskach leśnych, na skałach, mineralnej glebie na skarpach i ścieżkach, na humusie i humusowej glebie w borach świerkowych i buczynach. Rzadziej na korze drzew, w zbiorowiskach potokowych, ziołoroślach, borówczyskach i zbiorowiskach trawiastych. We wszystkich mikroregionach i w całym zakresie wysokości. Prawie zawsze tworzy periancja, bardzo często sporogony.

Pospolity, **213 stan.:** 4, 5, 9, 14, 15 (570), 16 (680), 22 (980, 1010), 23, 24, 25, 26, 27, 28 (1340, 1350, 1360), 29 (1220, 1260), 31, 33 (825), 34, 35, 36 (940, 975), 39 (820), 41 (910, 930), 42 (675, 690), 43, 44, 45, 53 (870), 56 (1100, 1110), 57, 58, 59, 60 (1310), 62, 63 (1175, 1200), 64 (1150), 65, 67, 68 (1000, 1050), 69 (1150, 1170, 1175), 70 (950, 975), 71 (1100), 75, 76, 79 (1215), 82 (1275, 1295), 84, 85 (1260), 86 (1180, 1190), 88 (1330, 1340, 1350), 89 (1310) WM, 90 (1390, 1400, 1420), 91, 92, 93 (1290, 1320), 94 (1350 WM, 1360, 1370, 1390), 95 (1400, 1420), 96 (1450, 1460, 1470, 1480), 97 (1500, 1540 WWt), 98 (1440, 1475), 99 (1300, 1315, 1370, 1380, 1385), 100 (1250, 1260, 1285), 101, 103 (1200, 1225), 105 (1225), 106, 107 (815), 108, 109 (650, 660, 670), 110 (600, 620 K1, 630, 640), 111, 114 (525), 117, 119 (750, 760, 775), 120 (790, 825), 122, 123 (1100, 1135), 124, 125, 126, 127 (920, 940, 950), 129 (770, 795, 810), 132, 133 (505, 525), 134, 135, 137, 139, 140, 141, 143, 144 (585), 145, 149 (630), 152 (920, 950), 153, 154 (1000, 1030), 155 (1050), 156 (1015, 1020, 1045), 157, 158 (825, 840), 159, 162, 167, 168, 170 (885, 900), 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 (900, 930), 186 (825), 191 (950), 192, 193 (975, 980, 990), 194 (930, 950), 195, 196, 197 (980, 1000, 1025), 202 (1160, 1185), 203 (1075), 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217 (975, 1000), 218, 219, 220 (1050), 221, 223, 224, 226 (820, 825), 229, 231, 232, 235, 238 (750, 775), 239 (1100).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866); Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

! *Cephalozia lammersiana* (Hueb.) Carring. — Na odkrytej, mineralnej glebie skarp przydrożnych i nad potokami w miejscach mokrych, w zbiorowiskach potokowych w strefie hydro- i geoamfibiontów, na mokrym humusie w borach świerkowych, rzadziej w ziółoroślach i na mokrych skałach. W podgrupach Rachowca, Ożnej, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Lipowskiej, Romanki, Pilska, Prusowa i Magury, w całym zakresie wysokości. Bardzo często tworzy periancja.

Częsty, **27 stan.:** 9, 22 (980), 25, 26, 34, 35, 44, 45, 75, 88 (1330), 91, 94 (1350), 96 (1470), 98 (1440, 1475), 103 (1225), 106, 109 (650), 110 (610), 120 (790), 125, 134, 178, 179, 180, 181, 216.

Komórki w środkowej części liścia do (55) 60 μm długości, komórki epidermy dorsalnej łodyżek do (95) 120 μm długości. Periancja duże, umieszczone na długich gałązkach, liście nierównopłatowe.

Takson często nie wyróżniany, zwłaszcza przez dawniejszych briologów; na pewno okaże się częstszy.

W obecnych ujęciach tasonomicznych (KOZŁICKA 1981; GROLLE 1983) omawiany takson włącza się w do *C. bicuspidata* (L.) Dum. w randze odmiany: *C. b. var. lammersiana* (Hueb.) Breidl. Z kolei SCHUSTER (1974) wyróżnia go w randze podgatunku: *C. b. ssp. lammersiana* (Hueb.) Schust.

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. W polskiej części Karpat Zachodnich znany z Gorców (MAMCZARZ 1979), Tatr (SZWEYKOWSKI 1960) i Pienin (SZWEYKOWSKI 1961). Ponadto znany z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA 1962).

***Cephalozia catenulata* (Hüb.) Lindb.** — Na murszejących kłodach w borach świerkowych razem z *Cephalozia lunulifolia* i *C. leucantha*. Podgrupy Oszusu i Pilska. Z periancjami.

B. rzadki, **2 stan.:** 41 (920), 218.

***Cephalozia leucantha* Spruce** — Na murszejącym drewnie w zaawansowanym stadium rozkładu (III—V stopień wg REJMENT-GROCHOWSKIEJ 1950) w borach świerkowych. Rzadko przechodzi na humus w górnoreglowym borze świerkowym. W podgrupach Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu i Pilska. W górnej części regła dolnego i regłu górnym (920—1350 m n.p.m.), niżej tylko jedno stanowisko na wysokości 775 m n.p.m. B. często tworzy periancja; sporogonów nie obserwowano.

D. częsty, **11 stan.**: 35, 41 (920), 99 (1350), 103 (1200, 1225), 105 (1225), 106, 154 (1000), 204, 232, 238 (775).

****Cephalozia lunulifolia* (Dum.) Dum.** — Na murszejącym drewnie w III. i IV. stadium rozkładu (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), na humusie w borach świerkowych i w kosówce, u podstawy pni drzew, rzadziej epifitycznie na korze buka, na kamieniach wystających z gleby w kosówce i wilgotnych kamieniach na brzegach potoków. W podgrupach Wielkiej Raczy, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki, Pilska i Suchej Góry. Od 695 do 1480 m n.p.m. Poniżej 900 m wyłącznie na murszejącym drewnie, powyżej, zwłaszcza 1200 m, przechodzi na inne typy podłoża: humus w borach świerkowych, kamienie i korę drzew. Bardzo często z periancjami i sporogonami, również z rozmnożkami.

B. częsty, **45 stan.**: 28 (1340, 1366), 29 (1220, 1260), 34, 41 (920), 49 (1040), 56 (1120), 62, 65, 70 (950), 76, 79 (1215), 82 (1275), 84, 92, 95 (1420), 96 (1450, 1470, 1480), 99 (1300, 1320, 1350), 100 (1260, 1285), 103 (1200, 1220, 1225), 106, 107 (800), 120 (790), 122, 123 (1135), 154 (1000), 156 (1045), 158 (840), 162, 166, 181, 204, 209, 210, 212, 220, 232.

Gatunek nowy dla polskiej części Beskidu Żywieckiego. Wcześniej znaleziony przez ŠMARDE (1937) po słowackiej stronie Babiej Góry. W Beskidach Zachodnich częsty. Znany z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA 1949, 1955), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), Gorców (MAMCZARZ 1979) i Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977).

***Cephalozia connivens* (Dicks.) Lindb.** — Pilsko.

B. rzadki, **1 stan.**: 95 — Pilsko, N zb., na kwaśnym humusie w *Vaccinietum myrtilli*; ster.; 1400 m n.p.m.

Lit.: Rycerki (KRUPA 1879).

***Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt.** — Na murszejącym drewnie, w miejscach ocienionych i wilgotnych. W podgrupach Ożnej, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu i Krawcowego Wierchu. Od 555 do 785 m n.p.m. Z periancjami i sporogonami. B. rzadki, **4 stan.**: 136, 142, 143, 218.

Lepidoziaceae Limpr.

***Lepidozia reptans* (L.) Dum.** — Rośnie prawie na wszystkich typach siedlisk, a najczęściej na murszejącym drewnie, humusie i humusowej glebie oraz u podstawy pni drzew w borach świerkowych i buczynach. Rzadziej na innych podłożach. Rozpowszechniony na całym obszarze. Do 1370 m n.p.m. Często z periancjami i sporogonami.

Pospolity, **123 stan.:** 2, 14, 16 (650), 23, 24, 26, 28 (1366), 29 (1220, 1260), 31, 32, 34, 36 (975), 39 (820), 41 (910), 42 (675), 43, 45, 46, 49, 51 (1020), 52, 53 (870), 56 (1120), 62, 64 (1150), 65, 67, 69 (1150, 1175), 71, 75, 76, 77, 78 (1160) WWt, 79, 82, 84, 85 (1260), 92, 94 (1370), 99 (1300, 1320), 101, 103 (1225), 105 (1225), 106, 107 (815), 108, 109 (650) K1, 110 (600, 620, 640), 114 (525), 118, 119 (760), 120 (790, 825 K1), 121, 122, 123 (1135), 124, 126, 127 (940), 134, 135, 136, 139, 140, 141, 143, 150, 153, 155 (1050), 156 (1045), 157, 158 (825, 840), 159, 162, 166, 168, 170 (885), 171, 172, 174, 175, 178, 180, 181, 182, 183, 184 (930), 188, 192 (990), 195, 196, 197 (1000, 1025), 203 (1075), 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213 (715), 215, 216, 217 (975), 218, 219, 220 (1070), 221 (1215, 1235), 229, 231, 232, 236, 238 (775), 239 (1100).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski — Babia Góra, Pilsko, Polica (REHMAN 1866); Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

***Bazzania trilobata* (L.) S. Gray** — W reglu dolnym na ziemi w borach świerkowych, rzadko na zwietrzelinie skalnej i murszejącym drewnie. W podgrupach Rachowca, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej i Pilsko. Od 615 do 945 m n.p.m. Tylko jedno stanowisko na wysokości 1130 m n.p.m., w dolinie potoku Cebula. Płonny.

D. częsty, **14 stan.:** 43, 57, 75, 78 (1130) Wt, 109 (650, 670), 120 (790), 135, 171, 172, 177, 211.

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski (REHMAN 1866); Hala Racza, Rycerzowa, Krawców Wierch, Złatna (KRUPA 1879).

***Bazzania tricrenata* (Wahlenb.) Lindb.** — Na skałach i kamieniach w strefie przejściowej między regłem górnym i piętnem kosodrzewiny. Tylko na N, NE i NW stokach Pilsko. Od 1275 do 1420 m n.p.m. (Ryc. 33). Zawsze płonny i bez rozmnożeń. Rzadki, **6 stan.:** 83, 94 (1350 WK, 1370, 1390), 95 (1400, 1420).

Calypogeiaceae (K. Müll.) H. Arn.

***Calypogeia integristipula* Steph.** — Głównie na humusie i humusowej glebie w borach świerkowych i w kosówce, rzadziej w buczynach. Porasta murszejące pnie w zaawansowanym stadium rozkładu oraz mineralną glebę przydrożnych skarp w borach świerkowych. Rzadziej u nasady pni drzew, na skałach, na humusie w borówczyskach i zbiorowiskach trawiastych. W podgrupach Rachowca, Ożnej, Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej i Pilsko, od 635 do 1500 m n.p.m. 62% stanowisk powyżej 1100 m n.p.m., głównie w górnoreglowym borze świerkowym i kosówce. Płonny, b. często z rozmnożkami.

B. częsty, **43 stan.:** 43, 56 (1110), 57, 60 (1310, 1320), 76, 79 (1215), 82 (1275), 91, 92, 94 (1350, 1360, 1370, 1380, 1390), 95 (1400, 1420), 96 (1450, 1460, 1470, 1480), 97 (1500), 98 (1475), 99 (1300), 100 (1285), 101, 103 (1200, 1220, 1225), 104 (1050) K1, 105 (1225), 109 (650, 660), 120 (790), 125, 128 (860), 156 (1015), 157, 158 (840), 171, 183, 217 (975), 227 (850).

Próby oznaczano głównie w stanie żywym. Zaliczano tu rośliny posiadające bezbarwne ciała oleiste we wszystkich komórkach liścia, również te posiadające

wydłużone komórki na brzegu liścia. W przypadku okazów suchych do tego gatunku zaliczono rośliny o liściach bocznych wąskojajowatych, u nasady najszerszych, bez wylużonych komórek brzeżnych lub z tymi komórkami, ale nie tworzącymi zwartego szeregu, o okrągłych polach inicjalnych chwytników.

***Calypogeia muelleriana* (Schiffn.) K. Müll.** — Najczęściej na mineralnej glebie przydrożnych skarp i nad potokami, na humusie i humusowej glebie w borach świerkowych, murszejącym drewnie i kamieniach wystających z gleby w borach świerkowych. Rzadko u podstawy pni drzew w lasach i na glebie w zbiorowiskach trawiastych. Podgrupy Rachowca, Ożnej, Będoszki, Lipowskiej, Romanki, Suchej Góry i Prusowa. Do 1120 m n.p.m. Wszystkie stanowiska w reglu dolnym. Tylko jeden raz zbierano okazy żeńskie; rzadko tworzy rozmnożki.

D. częsty, **15 stan.:** 15 (570), 44, 51 (1020), 62, 64 (1150), 91, 109 (650), 110 (600), 122, 124, 125, 127, 140, 193 (990), 194 (950).

Zaliczono tu rośliny o bezbarwnych ciałach oleistych, amfigastriach dwa razy szerszych od łodyżki i podzielonych płytkim prostokątnym wcięciem na dwie, zaokrąglone na szczytach łaty, liściach bocznych jajowatych o długości równej szerokości.

****Calypogeia neesiana* (Mass. & Carest) K. Müll.** — Na kwaśnym humusie w górnoreglowym borze świerkowym i kosówce, również w borówczyskach i na humusie torfowcowym w lokalnych zatorfieniach B. rzadko na murszejących pniach świerków. Podgrupy Lipowskiej i Pilska. Od 1150 do 1480 m n.p.m. Zawsze płonny; przeważnie z rozmnożkami.

Rzadki, **8 stan.:** 35, 60 (1320), 95 (1420), 96 (1450, 1460, 1480), 99 (1300), 101.

Rośliny drobne, żółtozielone, o bezbarwnych ciałach oleistych, w liściach bocznych ciała oleiste występują w komórkach brzeżnych i części nasadowej. W komórkach środkowej części liścia brak ciał oleistych. Liście boczne z wyraźnym obrzeżeniem. Rośliny oznaczone w stanie żywym.

Gatunek często mylony z *Calypogeia integristipula*. Znany jeszcze z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA 1949, 1955), Beskidu Śląskiego (REJMENT-GROCHOWSKA 1950), słowackiej części Babiej Góry (ŠMARDKA 1937), Gorców (MAMCZARZ 1979) i Beskidu Sądeckiego (MAMCZARZ 1977). Gatunek nowy dla polskiej części Beskidu Żywieckiego.

***Calypogeia suecica* (H. Arn. & J. Perss.) K. Müll.** — Na murszejącym drewnie świerkowym w III. i IV. stadium rozkładu w borach świerkowych. Podgrupy Wielkiej Raczy, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Romanki i Pilska. Do 1350 m n.p.m. Zawsze płonny.

Rzadki, **7 stan.:** 29 (1220, 1260), 34, 94 (1350) WK, 158 (825), 218, 232.

Rośliny o brunatnym zabarwieniu, formy typowe, komórki w środkowej części liścia 25×30 (33) μm .

***Calypogeia azurea* Stotler & Crotz** — Przeważnie na humusie i humusowej glebie w borach świerkowych i buczynach, na mineralnej glebie przydrożnych skarp, murszejącym drewnie i wystających z gleby kamieniach w borach świerkowych. Rzadziej na skałach, u podstawy pni żywych drzew, w zbiorowiskach potokowych i ziołoroślowych oraz w borówczyskach i zbiorowiskach trawiastych. We wszystkich mikroregionach w całym zakresie wysokości. Zawsze płonny, tylko jeden raz zbierano okazy żeńskie.

Pospolity, **145 stan.:** 2, 4, 9, 15 (570), 23, 24, 27, 28 (1340), 29 (1220, 1240), 31, 33 (825), 34, 35, 36 (940, 975), 41 (910, 930), 42 (675, 690), 44, 45, 46, 56 (1100, 1110), 57, 58, 60 (1320) M, 62, 65, 67, 69 (1150, 1175), 70 (950), 75, 79 (1215), 85 (1260), 88 (1330), 89 (1270 M, 1310 WM, 1330 WM, 1380 M), 90 (1390), 91, 92, 93 (1290), 94 (1350) WM, 95 (1400), 98 (1440, 1450, 1460, 1475), 99 (1365, 1385), 100 (1250, 1260, 1280, 1285), 101, 103 (1220, 1225), 109 (650, 670, 675), 110 (600, 620, 640), 114 (525), 119 (750, 775), 120 (790, 800, 825), 122, 123 (1135), 124, 126, 127 (920), 128 (860), 129 (770, 785), 132 (525), 133 (525), 134, 135, 137, 140, 141, 143, 152 (950), 153, 154 (1000), 155 (1050), 156 (1045), 157, 158 (825, 840), 162, 168, 170 (885, 900), 172, 174, 175, 179, 180, 181, 182, 183, 184 (900, 930), 186 (850), 188, 191 (950), 192, 193 (960, 980), 194 (930, 950), 195, 196, 197 (980, 1000, 1025), 199, 203 (1050, 1075), 204, 206, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 217 (975, 1000), 218, 223, 226 (825), 229, 231, 232, 238 (750, 775).

Lit.: Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

Rośliny oznaczano w stanie żywym lub tuż po zasuszeniu. Ciała oleiste o barwie niebieskiej, brak ich w niektórych komórkach liści bocznych.

Pseudolepicoleaceae Fulf. & J. Tayl.

***Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum.** — Na wszystkich typach podłożu, najczęściej na murszejącym drewnie, kamieniach i skałach, humusowej glebie w borach świerkowych, na korze żywych drzew, u podstawy pni. We wszystkich mikroregionach, w całym zakresie wysokości. B. często tworzy periancja i sporogony.

Pospolity, **121 stan.:** 4, 23, 24, 25, 27, 28 (1340, 1366), 29 (1220, 1260), 30, 31, 32, 33 (825), 34, 35, 36 (975), 39 (820), 41 (675, 690), 43, 49 (1040), 51 (1000), 56 (1110), 57, 60 (1310, 1324), 62, 63 (1150), 65, 69 (1150, 1175), 70 (950), 71, 75, 76, 80 (1270) Wt, 82 (1295), 83, 84, 92, 93 (1290), 94 (1370, 1380), 95 (1400, 1410, 1420), 96 (1440, 1450, 1460, 1470, 1480), 97 (1500), 101, 103 (1200, 1225), 105 (1225), 106, 107 (815), 109 (650), 110 (620), 119 (760), 120 (790, 825), 121, 122, 123 (1135), 125, 127 (920); 133 (525), 134, 135 (740), 136, 137, 139, 141, 153, 156 (1045), 157, 158, 162, 168, 170 (900), 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 184 (900), 188, 193 (990), 194 (930), 195, 196, 202 (1160, 1185), 203 (1050), 204, 206, 209, 212, 213 (715), 214 (720), 215, 216, 217 (975), 218, 219, 221 (1215, 1235), 223, 224, 226 (820), 231, 232, 238 (775), 239 (1100).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866); Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

Trichocoleaceae Nakai

***Trichocolea tomentella* (Ehrh.) Dum.** — Podgrupa Wielkiej Raczy.

B. rzadki, **1 stan.:** 227 (850) — Rez. „Śrubita”, dol. pot. wypływającego spod Bugaja; ster.; 850 m n.p.m.

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie, Beskid Orawski (REHMAN 1866); Glinka, Sopotnia (KRUPA 1879).

***Ptilidium ciliare* (L.) Hampe** — Tylko w najwyższych rejonach Pilska, w piętrze kosówki na humusie oraz wśród *Polytrichum strictum* w *Empetro-Vaccinietum* (Ryc. 33). Płonny.

B. rzadki, **2 stan.**: 96 (1450, 1470).

Lit.: Dorzecze Soły (KRUPA 1879). Dane prawdopodobnie błędne, gdyż okazy zbierane przez KRUPĘ w 1878 r. w okolicach Lipowej k. Żywca i oznaczone jako *P. ciliare* zrewidował KULESHA i zaliczył do *P. pulcherrimum* (SZWEYKOWSKI 1966).

***Ptilidium pulcherrimum* (G. Web.) Vainio** — Najczęściej na pniach żywych drzew, zwłaszcza buków, świerków i jaworów. Rzadziej na butwiejącym drewnie; b. rzadko na humusie w kosówce oraz na skałach piaskowcowych. Najwięcej stanowisk w podgrupie Pilska oraz w podgrupach Rachowca, Oźnej, Wielkiej Raczy, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki, Suchoj Góry i Prusowa. Od 600 do 1480 m n.p.m. Większość stanowisk w reglu dolnym. B. często z periancjami, rzadziej ze sporogonami.

Pospolity, **93 stan.**: 22 (1010), 27, 28 (1320 B, 1340, 1360 WB), 29 (1220, 1250, 1260), 34, 35, 36 (940), 38 (900), 41 (910, 930), 49, 52, 54, 56 (1110), 58, 60 (1300 WB, 1320 B), 62, 64 (1150), 65, 66 B, 69 (1150, 1175), 70 (950 B, 975), 71, 76, 81 (1200) B, 82 (1260 WB, 1330 B), 84, 85 (1260), 88 (1330, 1350), 89 (1260) B, 93 (1310), 94 (1350, 1370), 95 (1400, 1420), 96 (1450 WWt, 1460, 1480), 99 (1300) WB, 100 (1250) B, 101, 103 (1200, 1225), 105 (1225), 106, 107 (800), 109 (650), 110 (600), 116 B, 117, 120 (825), 123 (1135), 125, 127 (940), 128 (860), 134, 136, 141, 152 (950), 154 (1025), 156 (1045), 159, 167, 170 (885 KI, 900), 177, 183, 184 (930), 200 (1050), 201, 202 (1160, 1185), 205 (1125), 206, 209, 216, 218, 219, 220 (1050, 1075), 226, 236, 239 (1100, 1140).

Radulaceae (Dum.) K. Müll.

***Radula complanata* (L.) Dum.** — Na korze pni drzew liściastych, zwłaszcza jaworów i buków w buczynie karpackiej, rzadziej na ocienionych skałach i kamieniach; również na kamieniach na brzegu potoku w pasie geoamfibiontów. W podgrupach: Oźnej, Wielkiej Raczy, Będoszki, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Lipowskiej, Romanki i Pilska. Od 605 do 1235 m n.p.m. Większość stanowisk w reglu dolnym, tylko jedno w reglu górnym. B. często z periancjami, rzadko ze sporogonami. Pospolicie tworzy rozmnożki.

D. częsty, **15 stan.**: 23, 56 (1110), 84, 119 (760), 120 (790), 160 WB, 167, 175, 176, 179, 185 WB, 195, 213 (710), 228 (950) WB, 237 WB.

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866); Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

***Radula lindenberghiana* Gott. ex C. Hartm.** — Na mokrych kamieniach w potokach w pasie hydro- i geoamfibiontów; również na skałach i kamieniach w miejscach odsłoniętych. Większość stanowisk w podgrupie Pilska, tylko jedno notowanie w podgrupie Będoszki. Od 865 do 1385 m n.p.m. (Ryc. 33). Tylko okazy płodne z rodniami, często z niewykształconymi periancjami.

Rzadki, **6 stan.**: 35, 41 (930), 67, 88 (1330), 94 (1385), 194 (950).

Do tego gatunku zaliczono rośliny, u których obserwowano rodnie, ale nie stwierdzono obecności plemni bądź też jakichkolwiek śladów po nich (trzonka,

ścianki plemni); brak jest również charakterystycznie wypukłych męskich liści okrywowych; liście w podszczytowych partiach łodyżek normalnie wykształcone. Można sądzić, że rośliny są rozdzielнопłciowe. Komórki w środku płatu grzbietowego liścia 22,5–25,0 μm .

W tabeli 19 przedstawiono wymiary komórek w środku płata grzbietowego liścia u *Radula lindenbergiana*; każda liczba jest średnią z pomiarów 20. komórek w jednym liściu; komórki mierzono w czterech liściach jednego okazu; numer odpowiada numerowi stanowiska, na którym zbierano dany okaz.

Tabela 19 — Table 19

Długość komórek w środkowej części płatów grzbietowych liści *Radula lindenbergiana*
Length of cells in the middle part of dorsal lobes of leaves of *Radula lindenbergiana*

Numer stanowiska i próby Number of locality and sample	Średnia długość komórek Arithmetical means of length of cells μm			
35	27,3	24,6	24,5	23,9
41	22,9	22,0	24,2	21,1
67	23,5	26,2	23,2	27,4
88	20,9	24,6	23,5	25,2
94	20,4	24,3	21,1	23,2
194	24,8	24,0	26,5	22,8

Uwaga: każda liczba jest średnią z pomiaru 20 komórek w jednym liściu

Note: the arithmetical means are based on measurings of 20 cells in one leaf

Porellaceae Cavers

***Porella platyphylla* (L.) Pfeiff.** — Na wilgotnym kamieniu wystającym z gleby w buczynie karpackiej i na mokrym kamieniu w źródłisku. W podgrupie Lipowskiej i Romanki (Ryc. 33). Płonny. Gatunek wymierający (E) w Polsce.

B. rzadki, **2 stan.**: 30, 118.

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866).

! *Porella* cf. *baueri* (Schiffn.) C. Jens. — Podgrupa Krawcowego Wierchu (Ryc. 33). Gatunek wymierający (E) w Polsce i zagrożony (T) w Europie.

B. rzadki, **1 stan.**: 151 — Glinka, W zb. Długiego Gronia, na korze pnia staro- go, wolno stojącego buka, przy szlaku na Krawców Wierch; ster.; 890 m n.p.m.

Platy brzuszne liści szeroko jajowate, zaokrąglone, nieco szersze od łodyżki i szeroko po niej zbiegające. Amfigastria około 2 razy szersze od łodyżki, długo po niej zbiegają. Komórki w środku liścia wielkości 33–35 μm . Na stanowisku znaleziono tylko niewielką liczbę okazów. Ponieważ *P. baueri* jest gatunkiem bardzo podobnym do *P. platyphylla*, dlatego, aby oznaczenie było pewne, należy dysponować większym materiałem zielnikowym.

Gatunek nowy dla Beskidu Żywieckiego. B. rzadki w Beskidach Zachodnich; znany jeszcze z Beskidów Śląsko-Morawskich (DUDA 1960) i Gorców (MACZARZ 1979).

Frullaniaceae Lorch

***Frullania tamarisci* (L.) Dum.** — Na korze buków w buczynie karpackiej i nasłonecznionych skałach piaskowcowych. Podgrupy Oszusu i Pilska (Ryc. 33). Zbierano okazy płonne. Gatunek wymierający (E) w Polsce.

B. rzadki, 2 stan.: 87 (1260) WWt, 239 (1140).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866); Glinka (Ujszoły), Rycerki (KRUPA 1879).

***Frullania dilatata* (L.) Dum.** — Wyłącznie epifitycznie na drzewach liściastych. W niższych położeniach (500–700 m n.p.m.) na korze jesionów i wierzb, rosnących nad potokami, w miejscach zacienionych o dużej wilgotności powietrza. W tym pasie buczyny są wytrzebione. Powyżej 700 m n.p.m. na korze jaworów i buków w buczynach. W podgrupach Rachowca, Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Lipowskiej i Pilska. Do 1170 m n.p.m. Z periancjami i sporogonami.

D. częsty, 12 stan.: 20 (600) B, 118, 124, 131, 145, 148 (590), 169 (875), 176, 205 (1100, 1125), 211, 239 (1100).

Lit.: Beskidy (REHMAN 1864); Beskidy Zachodnie (REHMAN 1866); Dorzecze Soły (KRUPA 1879).

Lejeuneaceae Cas.-Gil.

***Lejeunea cavifolia* (Ehrh.) Lindb.** — Na wilgotnych, ocienionych skałach piaskowcowych i kamieniach w lasach (zwykle w dolinach potoków), rzadziej na wilgotnych kamieniach na brzegach potoków i korze drzew. Podgrupy: Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej, Romanki i Pilska. Od 655 do 1260 m n.p.m. Ok. 90% stanowisk w reglu dolnym. Bardzo często tworzy periancja i sporogony.

D. częsty, 16 stan.: 24, 25, 26, 41 (930), 45, 56 (1110), 57, 67, 75, 84, 87 (1260) WWt, 120 (790), 136, 178, 179, 195.

1. Flora Beskidu Żywiecko-Orawskiego liczy obecnie 111 gatunków wątrobowców i 2 gatunki glików. W grupie Wielkiej Raczy występuje 81 gatunków wątrobowców i 2 — glików, w grupie Pilska zaś: 108 — wątrobowców i 2 — glików. Dane te pochodzą z 399 stanowisk (Ryc. 28).

2. Wymienione gatunki należą do 26 rodzin i 42 rodzajów. Rodziny reprezentowane najliczniej to: *Lophoziaaceae* (24 gatunki), *Scapaniaceae* (15), *Jungermanniaceae* (14), *Geocalycaceae* (8), *Cephaloziaceae* (7) i *Calypogeiaceae* (5). Łącznie obejmują one blisko 65% flory (Tab. 1).

3. Znaleziono 27 gatunków nowych dla polskiej części Beskidu Żywieckiego, 22 — dla całego Beskidu Żywieckiego (łącznie z częścią słowacką) i 2 — dla Beskidów Zachodnich (Tab. 2). Ponadto stwierdzono dwadzieścia gatunków rzadkich w Beskidach Zachodnich i jedenaście — rzadkich w Karpatach Zachodnich (Ryc. 7).

4. W Beskidzie Żywiecko-Orawskim rośnie sześć gatunków zagrożonych we florze Polski. Cztery z nich należą do kategorii wymierających (E): *Fossombronia wondraczekii*, *Frullania tamarisci*, *Porella baueri* i *P. platyphylla*, pozostałe do kategorii narażonych (V): *Geocalyx graveolens* i *Metzgeria conjugata*. Na szczególną uwagę zasługują również gatunki zagrożone w Europie, są to: *Lophozia ascendens* (kategoria R), *Porella baueri* (T) i *Scapania parvifolia* (T) (Ryc. 8).

5. Największy udział mają gatunki bardzo rzadkie, znajdowane na 1–5 stanowiskach. Razem z gatunkami rzadkimi (6–10 stanowisk) stanowią blisko 55% flory. Łączny udział wątrobowców bardzo częstych (41–60 stanowisk) i pospolitych (61 i więcej stanowisk) wynosi 21% flory (Tab. 3; Ryc. 5).

6. Największe skupienie gatunków bardzo rzadkich i rzadkich występuje w masywie Pilska, Lipowskiej, Romanki i Oszusu oraz Wielkiej Rycerzowej i Krawcowego Wierchu (Tab. 4; Ryc. 6).

7. Główny zręb flory wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego stanowią wątrobowce górskie. Grupa ta liczy 71 gatunków (62,8% flory), w tym: 23 gatunki ogólnoreglowe, 18 — dolnoreglowych, 2 — górnoreglowe, 13 — subalpejskich, 4 — alpejskie i 21 ogólnogórskich. Do wątrobowców niżowo-górskich należy 35 gatunków (31%), w tym 21 gatunków niżowo-górnoreglowych i 14 — niżowo-alpejskich. Wątrobowce niżowe są tutaj słabo reprezentowane; do grupy tej zaliczono tylko siedem gatunków (6,2%) (Ryc. 9).

8. Ustalono schemat podziału typów siedlisk na jakich rosną wątrobowce i dokonano ich charakterystyki florystycznej. Największym bogactwem flory cechują się następujące typy siedlisk: naskalne (58 gatunków), obnażonej gleby (53), kamieni wystających z gleby (48) i potokowe (48). Z kolei najuboższą florę mają: żwirowiska nadrzeczne (1 gatunek), spaleniska (1), brzegi wód stojących (2), zatorfienia (3) i pola uprawne (7) (Tab. 5–7; Ryc. 10–12).

9. Najwięcej gatunków obligatoryjnych notowano na siedliskach epiksylicznych (9), obnażonej gleby (5) i w borówczyskach (5) (Ryc. 10).

10. Na podstawie preferencji siedliskowych gatunków, wyrażonych liczbą notowań w poszczególnych siedliskach, badaną florę zaliczono do trzynastu grup siedliskowych (Tab. 8). W każdej grupie wyróżniono gatunki wyłączne (obligatoryjne) i przechodzące (fakultatywne). Najliczniejsze są następujące grupy: wątrobowce epilityczne (19 gatunków) i wielopodłożowe (15), obnażonej gleby (14), epiksyliczne (13) i epigeiczne leśne (10).

11. Dynamika zmian bogactwa i struktury flory wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza przebiega w Beskidzie Żywiecko-Orawskim podobnie jak w innych pasmach górskich (KOŁA 1972, MAMCZARZ 1977). Największe bogactwo i różnorodność flory wątrobowców stwierdzono w pasie wysokościowym 700–800 m n.p.m. (Tab. 9, 10; Ryc. 13). Największą liczebnością gatunków niżowych cechują się pasy wysokościowe położone od 400 do 700 m n.p.m. Z kolei największym bogactwem wątrobowców niżowo-górskich charakteryzują się pasy wysokościowe dolnej części regla dolnego (od 600 do 900 m n.p.m.). Wątrobowce górskie natomiast najliczniej rosną w pasach wysokościowych położonych w górnej części regla dolnego i w reglu górnym (od 1100 do 1400 m n.p.m.) (Ryc. 14–16). Udział procentowy gatunków górskich i ich stanowisk stopniowo wzrasta w coraz to wyższych pasach wysokościowych. Jedynie w najniższych położeniach, tj. do wysokości 600 m n.p.m., gatunki niżowe i niżowo-górskie łącznie przeważają nad gatunkami górnymi (Ryc. 17, 18).

12. Flory poszczególnych pięter roślinności wykazują zróżnicowany skład, zależny od rozpiętości zasięgów pionowych poszczególnych gatunków wątrobowców. Najbogatszą florą odznacza się piętro regla dolnego (97 gatunków – 85,8% flory), co jest związane z powierzchniową dominacją tego piętra. W reglu górnym znaleziono 79 gatunków (69,9%), w piętrze subalpejskim zaś – 42 (37,2%). Najuboższe jest piętro pogórza (33 gatunki – 29,2%) (Tab. 12, 13; Ryc. 20–23).

13. Stosunki podobieństwa florystycznego wskazują, że flory pięter reglowych są najbardziej podobne. Ponadto flora regla górnego łączy się wyraźnie z florą piętra kosówki (Tab. 14; Ryc. 24). Obraz podobieństw jest zgodny ze stosunkami występującymi w górach z wykształconą górną granicą lasu (SZWEYKOWSKI 1960).

14. Na podstawie metody ustalania ośrodków występowania wątrobowców (por. BIAŁECKA 1982, KLAMA 1989) dokonano lokalnego podziału flory na elementy wysokościowe (Ryc. 26, 27). W obrębie gatunków górskich większość wątrobowców lokalnie przedstawia dolnoreglowy (28 gatunków) i reglowy (24 gatunki) typ rozmieszczenia. Ponadto jedenaście gatunków wykazuje tutaj optimum występowania w reglu górnym (gatunki górnoreglowe), osiem zaś – w piętrze kosówki (gatunki subalpejskie). Wśród wątrobowców niżowo-górskich większość lokalnie przedstawia dolnoreglowy typ rozmieszczenia (22 gatunki), dwa gatunki – typ górnoreglowy, siedem – reglowy, trzy – subalpejski i jeden – ogólnogórski. Natomiast wszystkie gatunki niżowe wykazują tu rozmieszczenie dolnoreglowe.

15. Stwierdzono wybitne różnice florystyczne między grupą Wielkiej Raczy a grupą Pilska. Flora grupy Pilska jest znacznie bogatsza (110 gatunków) i wyróżnia się występowaniem 31 gatunków wątrobowców (w tym wielu wysokogórskich) nie stwierdzonych w grupie Wielkiej Raczy (Tab. 17).

16. Do analizy poziomego rozmieszczenia wątrobowców wykorzystano podział obiektu badań na szesnaście podgrup (mikroregionów) górskich (Ryc. 3). Analiza ta ujawnia wyraźną odrębność florystyczną podgrupy Pilska. Jest ona lokalnym ośrodkiem flory wysokogórskiej, wyróżnia się obecnością jedenastu gatunków wyłącznych i najbogatszą florą (Tab. 16, 17).

17. Opierając się na podobieństwie flor poszczególnych podgrup górskich (mikroregionów) teren Beskidu Żywiecko-Orawskiego podzielono na pięć regionów: 1) zachodni, obejmujący podgrupy Zabawy, Rachowca, Ożnej, Wielkiej Raczy i Będoszki; 2) południowy – podgrupy Wielkiej Rycerzowej, Oszusu, Krawcowego Wierchu, Lipowskiej i Romanki; 3) region Pilska – podgrupa Pilska; 4) region północny – podgrupy Suchej Góry, Prusowa, Magury i Kiczory; 5) region Kotliny Jeleśniańskiej. Regiony zachodni, północny i Kotliny Jeleśniańskiej mają najuboższe flory i wyróżniają się negatywnie brakiem wielu gatunków występujących w regionach południowym i Pilska (Tab. 17).

18. Flora wątrobowców Beskidu Żywiecko-Orawskiego pod względem liczby gatunków, ich zróżnicowania ekologicznego i geograficznego nie różni się istotnie od flor innych pasm Beskidów Zachodnich (por. REJMENT-GROCHOWSKA 1950; MAMCZARZ 1977; MIERZEŃSKA 1994).

19. Lokalne rozmieszczenie pionowe gatunków jest zbieżne z ich rozmieszczeniem pionowym w innych częściach Karpat Zachodnich.

20. Do indywidualnych rysów badanej flory należy zaliczyć:

a) nieco odmienne, w porównaniu z innymi terenami, preferencje siedliskowe niektórych gatunków, np. *Barbilophozia attenuata*, *Plagiochila asplenoides* i *Tritomaria exsecta*;

b) przechodzenie pełnego cyklu życiowego przez wątrobowce, które zwykle są płonne w innych regionach, np. *Lophocolea cuspidata*;

c) obecność wielu gatunków rzadkich w Beskidach i Karpatach, w tym gatunków zagrożonych w Polsce i w Europie;

d) częstość występowania gatunków, które w innych pasmach Beskidów są rzadkie, np. *Jungermannia atrovirens*, *J. obovata*, *J. pumila*, *Scapania subalpina*.

21. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają potrzebę objęcia ochroną rezerwatową szczytowych i przyszczytowych partii Pilska.

11. LITERATURA

- ALEXANDROWICZ, Z., DENISIUK, Z. 1991. Rezerваты i pomniki przyrody Żыwieckiego Парку Край-образового (Карпаты польские). Och. Przyr. 49, Cz. II: 143–161.
- ARNELL, S. 1956. Illustrated Moos Flora of Fennoscandia. I. *Hepaticae*. CWK Gleerup Publishers, Lund: 1–315.
- BERDOWSKI, W. 1974. Flora mchów i zbiorowiska mszaków masywu Ślęży. Monogr. Bot. 45: 1–126. Beskid Śląski i Żыwiecki. Mapa turystyczna. Skala 1:75 000. PPWK, Warszawa–Wrocław 1982.
- BIAŁECKA, K. 1982. Rośliny naczyniowe grupy Pilska w Beskidzie Żыwieckim. Zesz. Nauk. UJ 618, Prace Bot. 10: 7–149.

- BIELCZYK, U. 1984 (1986). Zbiorowiska porostów epifitycznych w Beskidach Zachodnich. *Fragm. Flor. Geobot.* 30, 1: 1–89.
- BISCHLER, H. 1984. *Marchantia* L. The New World Species. *Bryophytorum Bibliotheca* 26: 1–228.
- BLOCH, M., BLOCH, M. 1975a. Materiały do flory mszaków Niziny Północnopodlaskiej. *Ann. UMCS, Sec. C* 30, 19: 129–140.
- BLOCH, M., BLOCH, M. 1975b. Materiały do flory mszaków Wyżyny Małopolskiej. *Fragm. Flor. Geobot.* 21, 4: 507–520.
- BOMBOWNA, M. 1960. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Soły i jej dopływów. *Acta Hydrobiol.* 2: 175–200.
- BOROS, A. 1968. *Bryogeographiae und Bryoflora Ungarns*. Akad. Kiado, Budapest: 1–466.
- BRZEŹNIAK E., CZEREMDA, A. 1983. Warunki termiczne okresu wegetacyjnego w Beskidzie Żywieckim. *Probl. Zagosp. Ziem Górskich* 24: 125–137.
- BUCH, H. 1928. Die Scapanien Nordeuropas und Sibiriens. II. Systematischer Teil. *Soc. Sci. Fenn., Commentationes Biologicae* 3, 1: 1–177.
- BURGEFF, H. 1943. Genetische Studien an *Marchantia*. Jena: 1–269.
- CELIŃSKI, F., WOJTERSKI, T. 1978. Zespoły leśne masywu Babiej Góry. *PTPN, Prace Kom. Biol.* 48: 1–62.
- CELIŃSKI, F., WOJTERSKI, T. 1983. Szata roślinna Babiej Góry. W: ZABIEROWSKI, K. (red.). *Park Narodowy na Babiej Górze. Człowiek i przyroda*. PWN, Warszawa–Kraków: 121–177.
- CHMIELEWSKI, T., URBANEK, H. 1963. Mszaki okolic Łodzi (wątrobowce i torfowce). *Łódzkie Tow. Nauk., Spraw. z Czynn. i Posiedz. Nauk.* 17, 4: 26–48.
- CORLEY, M. F. V., HILL, M. O. 1981. Distribution of bryophytes in the British Isles. *British Bryological Society, Cardiff*: 1–160.
- DENISIUK, Z. 1983. Potencjalna roślinność naturalna województwa bielskiego. *Folia Geogr. Ser. Geogr.-Phys.* 15: 75–95.
- DENISIUK, Z. 1985. Szata roślinna województwa bielskiego. *Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN* 13: 51–85.
- DUDA, J. 1948. *Anastrepta orcadensis* (Hook). Schiffn. v Beskydach. *Čs. Botanické listy* 1, 9: 135–137.
- DUDA, J. 1949. Príspevek k bryologickému výzkumu Beskyd. *Čas. Vlast. Spol. Muzej Olomouc* 58: 1–3.
- DUDA, J. 1955. Jatrovky moravskoslezských Beskyd. Výsledek bryologického výzkumu Slezska – III. *Prirodovedacký sborník Ostravského kraje* 16, 2: 234–242.
- DUDA, J. 1958. K rozšíření jatrovek v Československu. *Časopis Slezského Muzea (Acta Musei Silesiae)* 7, 1: 31–63.
- DUDA, J. 1960. Jatrovky přírodní rezervace Menšího vrchu v Beskydách. *Acta Musei Silesiae*, A 9: 25–39.
- DUDA, J. 1962. Jatrovky vrchoviste Hute pod Smrekem v Beskydách na Morave. *Acta Musei Silesiae*, A 11: 21–28.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1969a. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei – IV. *Acta Musei Silesiae*, A 18: 21–52.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1969b. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei – V. *Acta Musei Silesiae*, A 18: 105–128.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1970a. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei – VI. *Acta Musei Silesiae*, A 19: 65–93.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1970b. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei – VII. *Čas. Vlast. Spol. Muz. Olomouc* 60: 17–30.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1970c. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei – VIII. *Acta Musei Silesiae*, A 19: 161–188.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1971a. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei – IX. *Acta Musei Silesiae*, A 20: 31–57.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1971b. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei – X. *Acta Musei Silesiae*, A 20: 97–128.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1972a. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei – XI. *Acta Musei Silesiae*, A 21: 49–72.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1972b. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei – XII. *Acta Musei Silesiae*, A 21: 159–182.

- DUDA, J., VAŇA, J. 1973a. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei — XIII. Acta Musei Silesiae, A 22: 1–24.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1973b. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei — XIV. Acta Musei Silesiae, A 22: 97–118.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1975. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei — XVII. Acta Musei Silesiae, A 24: 63–82.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1976a. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei — XIX. Acta Musei Silesiae, A 25: 27–50.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1976b. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei — XX. Acta Musei Silesiae, A 25: 97–118.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1977a. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei — XXI. Čas. Slez. Muz., A 26: 35–54.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1977b. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei — XXII. Čas. Slez. Muz., A 26: 97–114.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1978. Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslovakei — XXIV. Čas. Slez. Muz. Opava, A 27: 97–122.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1979a. Rozšíření játrovek v Československu — XXV. Čas. Slez. Muz. Opava, A 28: 15–31.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1979b. Rozšíření játrovek v Československu — XXVI. Čas. Slez. Muz. Opava, A 28: 111–128.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1980a. Rozšíření játrovek v Československu — XXVII. Čas. Slez. Muz. Opava, A 29: 65–79.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1980b. Rozšíření játrovek v Československu — XXIX. Čas. Slez. Muz. Opava, A 29: 223–236.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1981a. Rozšíření játrovek v Československu — XXX. Čas. Slez. Muz. Opava, A 30: 1–16.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1981b. Rozšíření játrovek v Československu — XXXII. Čas. Slez. Muz. Opava, A 30: 193–209.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1982a. Rozšíření játrovek v Československu — XXXIII. Čas. Slez. Muz. Opava, A 31: 23–38.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1982b. Rozšíření játrovek v Československu — XXXV. Čas. Slez. Muz. Opava, A 31: 215–228.
- DUDA, J., VAŇA, J. 1983. Rozšíření játrovek v Československu — XXXVII. Čas. Slez. Muz. Opava, A 32: 97–110.
- DUELL, R. 1983. Distribution of the European and Macaronesian Liverworts (Hepaticophytina). Bryol. Beitr. 2: 1–114.
- ENGEL, J. J., SCHUSTER, R. M. 1984. An Overview and Evaluation of the Genere of *Geocalycaceae* Subfamily *Lophocoleoideae* (Hepaticae). Nova Hedwigia 39: 385–463.
- FRITSCH, R. 1982. Index to plant chromosome numbers — *Bryophyta*. Regn. Veget. 108: 1–268.
- GROLLE, R. 1972. *Bazzania* in Europa und Macaronesien. Zur Taksonomie und Verbreitung. Lindbergia 1: 193–204.
- GROLLE, R. 1976. Verzeichnis der Lebermoose Europas und benachbarter Gebiete. Feddes Repert. 87, 3–4: 171–279.
- GROLLE, R. 1983. Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. J. Bryol. 12: 403–459.
- GUZIKOWA, M. 1977. Rośliny naczyniowe Działów Orawskich i Bramy Sieniawskiej (południowo-wschodnia część Beskidu Żywieckiego). Monogr. Bot. 53: 1–267.
- HACKIEWICZ-DUBOWSKA, M. 1936. Roślinność gnijących pni Puszczy Białowieskiej. Spraw. z Posiedzeń Tow. Nauk. Warszawskiego, Wydz. IV Nauk Biol. 29: 189–222.
- HAUSBRANDT, L. 1949. Gatunki rodzaju *Scapania* Dum. w Polsce i krajach ościennych. PAU, Materiały do fizjogr. kraju 16: 1–43.
- HESS, M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zesz. Nauk. UJ 115, Prace Geogr. 11: 1–267.

- HESS, M., LEŚNIAK, B. 1981. Klimat. Mapy w skali 1 : 1 000 000. W: Atlas województwa bielskiego. Oddz. PAN w Krakowie i Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Kraków: 10.
- JÄRVINEN, I. 1974. The genus *Plagiochila* (Hepaticae) in Finland. Mem. Soc. Fauna Flora Fennica 50: 105–112.
- JÄRVINEN, I. 1983. Taxonomy and distribution of the European taxa of the genus *Chiloscyphus* (Hepaticae, Geocalycaceae). Ann. Bot. Fennici 20: 87–99.
- JĘDRZEJKO, K. 1985. Wątrobowce (Hepaticopsida) Górnśląskiego Okręgu Przemysłowego i Leśnego Pasa Ochronnego na Wyżynie Śląskiej wobec antropopresji. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice–Sosnowiec: 1–174.
- JĘDRZEJKO, K., ŻARNOWIEC, J. 1986. Wątrobowce okolic Kóz w województwie bielsko-bialskim (Beskid Mały, Pogórze Śląskie). Acta Biol. Silesiana, Botanika 21: 107–124.
- JĘDRZEJKO, K., KLAMA, H., ŻARNOWIEC, J. 1984a. *Hepaticae* Macroregioni Meridionali Poloniae Exsiccati. Fasc. II, No. 16–30. Śląska Akademia Medyczna, Sosnowiec: 1–7.
- JĘDRZEJKO, K., KLAMA, H., ŻARNOWIEC, J. 1984b. *Hepaticae* Macroregioni Meridionali Poloniae Exsiccati. Fasc. III, No. 31–45. Śląska Akademia Medyczna, Katowice–Sosnowiec: 5–9.
- JĘDRZEJKO, K., KLAMA, H., ŻARNOWIEC, J. 1985a. *Hepaticae* Macroregioni Meridionali Poloniae Exsiccati. Fasc. IV, No. 46–60. Śląska Akademia Medyczna, Katowice–Sosnowiec: 13–18.
- JĘDRZEJKO, K., KLAMA, H., ŻARNOWIEC, J. 1985b. *Hepaticae* Macroregioni Meridionali Poloniae Exsiccati. Fasc. V, No. 61–75. Śląska Akademia Medyczna, Katowice–Sosnowiec: 21–25.
- KARCZMARZ, K. 1967. Wątrobowce Roztocza. Ann. UMCS, Sec. C 22, 20: 289–327.
- KARCZMARZ, K. 1970. Materiały do flory wątrobowców Lubelszczyzny. Ann. UMCS, Sec. C 25, 12: 81–104.
- KARCZMARZ, K. 1979. Mszaki Bukowiny w Beskidzie Niskim. Fragm. Flor. Geobot. 25, 1: 191–206.
- KARCZMARZ, K. 1987. Flora mszaków Beskidu Niskiego. Ann. UMCS, Sec. C 42, 10: 111–135.
- KARCZMARZ, K., BLOCH, M. 1983 (1985). Mszaki Kotliny Sandomierskiej. Fragm. Flor. Geobot. 29, 1: 73–108.
- KARCZMARZ, K., BLOCH, M. 1994. Polska Bibliografia Briologiczna. T. I (1786–1986). Wyd. UMCS, Lublin: 1–100.
- KLAMA, H. 1986. Obecny stan poznania flory wątrobowców Beskidu Żywieckiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 37, Ser. B, Botanika: 89–100.
- KLAMA, H. 1989 (mscr.). Wątrobowce zachodniej części Beskidu Żywieckiego – rozmieszczenie i ekologia. Praca doktorska, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań: 1–254.
- KLAMA, H. 1992. *Hepaticopsida*. In: FALIŃSKI, J. B., MUŁENKO, W. (eds.). Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Check-list of cryptogamous and seminal species recorded during the period 1987–1991 on the permanent plot V–100 (Project CRYPTO). Phytocoenosis 4 (N.S.), Arch. Geobot. 3: 19.
- KLAMA, H. 1995. VIII. *Hepaticopsida*. In: FALIŃSKI, J. B., MUŁENKO, W. (eds.). Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. General problems and taxonomic groups analysis (Project CRYPTO). Phytocoenosis 7 (N.S.), Arch. Geobot. 4: 63–74.
- KOŁA, W. 1963. Wątrobowce (Hepaticae) Masywu Ślęży. Acta Univ. Wratisl. 14, Prace Bot. 1: 192–228.
- KOŁA, W. 1968. Wątrobowce Gór Białskich. Opolskie Tow. Przyj. Nauk, Zesz. Przyr. 8: 15–49.
- KOŁA, W. 1969. Nowe stanowiska rzadszych wątrobowców w Polsce południowo-zachodniej. Fragm. Flor. Geobot. 25, 3: 359–362.
- KOŁA, W. 1972. Rozmieszczenie wątrobowców w Górach Białskich. Prace Opol. Tow. Przyj. Nauk, Wyd. III Nauk Przyr. PWN, Warszawa–Wrocław: 1–91.
- KOŁA, W. 1990. Analiza florystyczno-ekologiczna wątrobowców Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich. W: KUCZYŃSKA, I. (red.). Zmiany szaty roślinnej Dolnego Śląska pod wpływem działalności człowieka. Acta Univ. Wratisl. 1156, Prace Bot. 44: 305–355.
- KOŁA, W., WILCZYŃSKA, W. 1985. Mszaki. W: JAHN, A. (red.). Karkonosze Polskie. PAN Oddz. we Wrocławiu, Tow. Nauk. w Jeleniej Górze, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 257–272.
- KOMORNICKI, T. 1981. Gleby. Mapa w skali 1 : 300 000. W: Atlas województwa bielskiego. Oddz. PAN w Krakowie i Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Kraków: 14.
- KONDRACKI, J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 1–340.

- KORNAŚ, J. 1955. Charakterystyka geobotaniczna Gorców. Monogr. Bot. 3: 1–216.
- KORNAŚ, J. 1957. Zbiorowiska roślin zarodnikowych i ich klasyfikacja. Wiad. Bot. 1, 1–2: 3–18.
- KORNAŚ, J. 1977. Zbiorowiska roślin zarodnikowych. W: SZAFAER, W., ZARZYCKI, K. (red.). Szata roślinna Polski. T. 1. PWN, Warszawa: 465–481.
- KOZŁICKA, M. 1981. Investigations on variability in the *Cephalozia bicuspidata* group. In: SZWEYKOWSKI, J. (ed.). New Perspectives in Bryotaxonomy and Bryogeography. Adam Mickiewicz University, Poznań: 15–23.
- KRUPA, J. 1879. Stosunki florystyczne dorzecza Soły. Spr. Kom. Fizjogr. PAU 13: 146–182.
- KRUPA, J. 1882. Zapiski bryologiczne. Spr. Kom. Fizjogr. PAU 16: 160–204.
- KRYGOWSKI, W. 1978. Beskidy. Śląski, Żywiecki, Mały. Przewodnik. Sport i Turystyka, Warszawa: 1–415.
- KRZAKOWA, M. 1977. Isozymes as markers of inter- and intraspecific differentiation in Hepatics. Bryophytorum Bibliotheca 13: 427–434.
- KULESA, W. 1914. Przyczynek do znajomości wątrobowców Beskidu Zachodniego. Spr. Kom. Fizjogr. PAU 48: 138–144.
- KULESA, W. 1920. Przyczynek do znajomości wątrobowców na ziemiach polskich. Wątrobowce zebrane w Puszczy Sandomierskiej w sierpniu 1919 roku. Rozpr. Hist.-Filoz. PAU 43, 4: 3.
- LAZAR, J. 1957. Gleby Żywiecczyny. Roczn. Nauk Roln. 76, Ser. A 1: 65–105.
- LISOWSKI, S. 1956. Mchy Bieszczadów Zachodnich. PTPN, Prace Kom. Biol. 17, 3: 1–93.
- LISOWSKI, S., KORNAŚ, J. 1966. Mchy Gorców. Fragm. Flor. Geobot. 12, 1: 41–114.
- MAMCZARZ, H. 1977. Brioflora i zbiorowiska mszaków Beskidu Sądeckiego. Cz. I. Brioflora Beskidu Sądeckiego. Monogr. Bot. 54: 1–158.
- MAMCZARZ, H. 1979. Wykaz wątrobowców stwierdzonych w Gorcach. Ann. UMCS, Sec. C 34, 6: 55–64.
- MATUSZKIEWICZ, W. 1952. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Ann. UMCS, Sec. C, Supplementum VI: 1–218.
- MATUSZKIEWICZ, J. 1977. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 4. Bory świerkowe i jodłowe. Phytocoenosis 6, 3: 151–226.
- MEDWECKA-KORNAŚ, A. 1955. Zespoły leśne Gorców. Ochr. Przyr. 25: 1–112.
- MEDWECKA-KORNAŚ, A., DENISIUK, Z., DZIEWOLSKI, J. 1981. Potencjalna roślinność naturalna. Mapa w skali 1:300 000. W: Atlas województwa bielskiego. Oddz. PAN w Krakowie i Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Kraków: 15.
- MENDELAK, M. 1973. Variability of the Polish species of the genus *Riccardia* (Hepaticae, Aneuraceae). I. Herbarium material. Acta Soc. Bot. Pol. 42, 3: 361–368.
- MENDELAK, M. 1974. Variability of the Polish species of the genus *Riccardia* (Hepaticae, Aneuraceae). II. Culture material. Acta Soc. Bot. Pol. 43, 3: 331–355.
- MENDELAK, M. 1977. Wyniki rewizji materiałów zielnikowych rodzaju *Riccardia* Grey z terenu Polski. Fragm. Flor. Geobot. 23, 3–4: 409–417.
- MICKIEWICZ, J. 1965. Udział mszaków w epifitycznych zespołach buka. Monogr. Bot. 19: 1–82.
- MICKIEWICZ, J. 1980. Mszaki w zespole *Carici elongatae-Alnetum* Koch 1926 w Polsce. Monogr. Bot. 61: 1–96.
- MICKIEWICZ, J., REJMENT-GROCHOWSKA, I., SOBOTKA, D. 1962. Materiały do flory mszaków Suwalszczyzny. Cz. II. Fragm. Flor. Geobot. 9, 2: 257–274.
- MICHALIK, S. 1992. Szata roślinna rezerwatu Piłsko w Beskidzie Żywieckim. Ochr. Przyr. 50, cz. II: 57–74.
- MIERZEŃSKA, M. 1994. Wątrobowce Gorców. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 1: 235–346.
- MIREK, Z. 1989. Zasięgi wysokościowe roślin naczyniowych w Karpatach i ich klasyfikacja. Wiad. Bot. 33, 2: 57–64.
- MÜLLER, K. 1905–1916. Die Lebermoose Deutschlands, Oesterreichs u.d. Schweiz. In: Rabenhorst, L., Kryptogamen-Flora, 2. Aufl. 6, 1: 1–870, 6, 2: 1–947.
- MÜLLER, K. 1947. Studien zur Auklärung der Europäischen Arten der Lebermoosgattung *Calypogeia*. Svensk. Botanisk Tidskrift 41, 4: 411–430.
- MÜLLER, K. 1954. Die Lebermoose Europas. In: Rabenhorst, L., Kryptogamen-Flora, 3. Aufl. 6, 1: 1–756.
- MÜLLER, K. 1957. Die Lebermoose Europas. In: Rabenhorst, L., Kryptogamen-Flora, 3. Aufl. 6, 2: 1–1365.
- PAŁKOWA, A. 1961. Wątrobowce Ojcowskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot. 6, 1: 171–194.

- PATON, J. A. 1981. *Scapania lingulata* Buch in the British Isles. J. Bryol. 11: 399–403.
- PAWŁOWSKA, S. 1977. Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. W: SZAFAER, W., ZARZYCKI K. (red.). Szata roślinna Polski. T. 1. PWN, Warszawa: 129–206.
- PAWŁOWSKI, B. 1977. Szata roślinna gór polskich. W: SZAFAER, W., ZARZYCKI K. (red.). Szata roślinna Polski. T. 2. PWN, Warszawa: 189–252.
- PECIAR, V. 1971. Studia bryofloristica Slovaciae IV. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Commen. Bot. 19: 205–214.
- PILOUS, Z., DUDA, J. 1960. Kľíč k určování mechorostu ČSR. Českoslov. Akad. Ved., Praha: 1–177.
- PUCHALSKI, T. 1977. Statystyka. Wykład podstawowych zagadnień. PWN, Warszawa: 1–377.
- REHMAN, A. 1864. O mchach i wątrobowcach Galicyi Zachodniej i stosunku ich do ogółu roślinności. Roczn. Tow. Nauk. Krak. 31: 257–312.
- REHMAN, A. 1866. O roślinności Beskidów Zachodnich. Roczn. Tow. Nauk. Krak. 33: 198–223.
- REJMENT-GROCHOWSKA, I. 1950. Czynniki ekologiczne i rozmieszczenie geograficzne wątrobowców (Hepaticae) Beskidu Śląskiego. Prace Biologiczne Śląskie 2: 3–71.
- REJMENT-GROCHOWSKA, I. 1966. Wątrobowce (Hepaticae). T. I. W: Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. PWN, Warszawa 1–258.
- REJMENT-GROCHOWSKA, I. 1971. Bryophyta II. *Hepaticae* – Wątrobowce. W: STARMACH, K., SIEMIŃSKA, J. (red.). Flora słodkowodna Polski. T. 17. PWN, Kraków: 1–335.
- REJMENT-GROCHOWSKA, I., MICKIEWICZ, J. 1962. Materiały do flory mszaków Suwalszczyzny. Fragm. Flor. Geobot. 8, 1: 3–22.
- SCHIFFNER, V. 1914. Lebermoose aus Ungarn und Kroatien. Mog. Bot. Lap. 13: 1–302.
- SCHLIJAKOV, R. N. 1976. Petschenotschnye mchi severa URSS. Vyp. 1. Antotzerotovy; Petschenotschniki: Gaplomitriyevye – Metzgeriyevye. Nauka, Leningrad: 1–91.
- SCHLIJAKOV, R. N. 1979. Petschenotschnye mchi severa URSS. Vyp. 2. Gerbertovy – Geokalikovy. Nauka, Leningrad: 1–191.
- SCHLIJAKOV, R. N. 1980. Petschenotschnye mchi severa URSS. Vyp. 3. Lofozievye – Mezoptichievye. Nauka, Leningrad: 1–188.
- SCHLIJAKOV, R. N. 1981a. Petschenotschnye mchi severa URSS. Vyp. 4. Jungermannievye – Skapanievye. Nauka, Leningrad: 1–221.
- SCHLIJAKOV, R. N. 1981b. *Lophozia longiflora* (Hepaticae), a frequent component of plant communities. Bot. Jurnal 66: 1197–1206.
- SCHUMACKER, R., MARTINY, P. 1995. Part 2: Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. In: Red Data Book of European Bryophytes. European Committee for the Conservation of Bryophytes, Trondheim: 31–193.
- SCHUSTER, R. M. 1951. Notes on Nearctic *Hepaticae*. III. A Conspectus of the Family *Lophoziaaceae*, With a Revision of the Genera and Subgenera. The American Midl. Natur. 45, 1: 1–117.
- SCHUSTER, R. M. 1966. The *Hepaticae* and *Anthocerotae* of North America. Vol. 1. Columbia Univ. Press, New York and London: I–XVII + 1–802.
- SCHUSTER, R. M. 1969. The *Hepaticae* and *Anthocerotae* of North America. Vol. 2. Columbia Univ. Press, New York: I–XII + 1–1062.
- SCHUSTER, R. M. 1974. The *Hepaticae* and *Anthocerotae* of North America. Vol. 3. Columbia Univ. Press, New York: I–XIV + 1–880.
- SCHUSTER, R. M. 1980. The *Hepaticae* and *Anthocerotae* of North America. Vol. 4. Columbia Univ. Press, New York: I–XVIII + 1–1334.
- SCHUSTER, R. M. 1981. Evolution and speciation in *Pellia*, with special reference to the *Pellia megaspora-endiviifolia* complex (*Metzgeriales*). I. Taxonomy and distribution. J. Bryol. 11: 411–431.
- SCHUSTER, R. M. 1992a. The *Hepaticae* and *Anthocerotae* of North America. Vol. 5. Field Museum of Natural History, Chicago: I–XVII + 1–854.
- SCHUSTER, R. M. 1992b. The *Hepaticae* and *Anthocerotae* of North America. Vol. 6. Field Museum of Natural History, Chicago: I–XVII + 1–937.
- SCHUSTER, R. M., DAMSHOLT, K. 1974. The *Hepaticae* of West Greenland From Ca. 66° N to 72° N. Meddelelser om Grønland 199, 1: 1–373 + 80 maps.
- SIKORA, W., ŻYTKO, K. 1960. Budowa Beskidu Wysokiego na południe od Żywca. Z badań geologicznych w Karpatach. T. 4. Biul. Inst. Geolog. 141: 61–204.

- ŠMARDA, J. 1937. Príspevky k rozšírení jatrovek v Československu. Čast II. Sborn. Prirod. Klubu 19: 39–47.
- ŠMARDA, J. 1938. Príspevky k rozšírení jatrovek v Československu. III. Vestn. Krol., Čes. Spaleč. Nauk, Cl. Math.-Natur. 5: 1–23.
- ŠMARDA, J. 1961. Príspevky k rozšírení jatrovek v Československu. VI. Biol. Pr. 7, 1: 1–45.
- STECKI, K. 1979. Tatr. Wiedza Powszechna, Warszawa: 1–220.
- STUCHLIKOWA, B., STUCHLIK, L. 1962. Geobotaniczna charakterystyka Pasma Policy w Karpatach Zachodnich. *Fragm. Flor. Geobot.* 8, 3: 229–396.
- SZMAJDA, P. 1979. Bryoflora Gór Stołowych i jej charakterystyka geobotaniczna. PTPN, Prace Kom. Biol. 52: 1–80.
- SZMAJDA, P. 1981. Ekologiczne aspekty rozmieszczenia mchów w Górach Stołowych (Sudety). *Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B, Botanika* 32: 37–76.
- SZWEYKOWSKI, J. 1951. Rozmieszczenie zbiorowisk mszaków w potokach Gór Stołowych. PTPN, Prace Kom. Biol. 13, 3: 1–46.
- SZWEYKOWSKI, J. 1953. Mszaki Gór Stołowych. Cz. I. Wątrobowce (Hepaticae). PTPN, Prace Kom. Biol. 14, 5: 1–134.
- SZWEYKOWSKI, J. 1954. *Lophozia ascendens* (Warnstorf) Schuster [= *Lophozia gracillima* Buch], nowy wątrobowiec dla flory polskiej. *Fragm. Flor. Geobot.* 1, 1: 173–181.
- SZWEYKOWSKI, J. 1957a. Stan badań nad florą wątrobowców Tatr. *Acta Soc. Bot. Pol.* 26, 4: 757–784.
- SZWEYKOWSKI, J. 1957b. Wątrobowce okolic Zwierzyńca nad Wieprzem. *Fragm. Flor. Geobot.* 3, 1: 115–127.
- SZWEYKOWSKI, J. 1958a. *Prodromus Florae Hepaticarum Poloniae*. PTPN, Prace Kom. Biol. 19: 1–599.
- SZWEYKOWSKI, J. 1958b. *Marsupella sprucei* (Limpr.) Bernet na Pomorzu. *Przyr. Polski Zach.* 2, 4: 149–154.
- SZWEYKOWSKI, J. 1958c. Materiały do flory wątrobowców Sudetów. I. Wątrobowce zebrane w Górach Kaczawskich. PTPN, Prace Kom. Biol. 17, 6: 1–56.
- SZWEYKOWSKI, J. 1959. *Zielnik Wątrobowców Polski*. Fasc. 10. Nr 226–250. Wątrobowce Bieszczadów. Wyd. PAN, Poznań: 1–10.
- SZWEYKOWSKI, J. 1960. Materiały do flory wątrobowców Tatr. PTPN, Prace Kom. Biol. 21, 3: 1–92.
- SZWEYKOWSKI, J. 1961. Materiały do flory wątrobowców Pienin. PTPN, Prace Kom. Biol. 24, 1: 1–38.
- SZWEYKOWSKI, J. 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971. *Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Ser. IV. Wątrobowce (Hepaticae)*. Zesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komitet Bot. PAN i PTPN, Kom. Biol., Poznań.
- SZWEYKOWSKI, J. 1977. Modern taxonomic methods: perspectives of their application in Hepaticology. *Bryophytorum Bibliotheca* 13: 435–442.
- SZWEYKOWSKI, J. 1984. Species problems and taxonomic methods in Bryophytes. In: SCHUSTER, R. M. (ed.). *New Manual of Bryology*. Vol. 2. Hattori Bot. Lab., Nichinan: 1130–1171.
- SZWEYKOWSKI, J. 1992. Czerwona lista wątrobowców zagrożonych w Polsce. W: ZARZYCKI, K., WOJEWODA, W., HEINRICH, Z. (red.). *Lista roślin zagrożonych w Polsce* (wyd. 2). Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 75–78.
- SZWEYKOWSKI, J., KOZŁICKA, M. 1966. Wątrobowce wyspy Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. *Bad. Fizjogr. Pol. Zach.* 18: 155–178.
- SZWEYKOWSKI, J., KOZŁICKA, M. 1969. Materiały do flory wątrobowców Pomorza. *Bad. Fizjogr. Pol. Zach.* 22: 125–149.
- SZWEYKOWSKI, J., KOZŁICKA, M. 1974, 1977, 1980. *Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Ser. IV. Wątrobowce (Hepaticae)*. Zesz. 8, 9, 10. Komitet Bot. PAN i PTPN Kom. Biol., Poznań.
- SZWEYKOWSKI, J., ZIELIŃSKI, R., MENDELAK, M. 1981. Variation of Peroxidase Isoenzymes in Central European Taxa of the Liverwort Genus *Pellia*. *Bull. de l'Acad. Pol. des Sci., Cl. II* 29, 1–2: 9–19.
- URBANEK, H. 1966. Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. Cz. IV. Przegląd mszaków w wyróżnionych zespołach leśnych. *Fragm. Flor. Geobot.* 12, 2: 151–178.
- VAÑA, J. 1973a. Studien über die *Jungermannioideae* (Hepaticae). 1. Allgemeine Charakteristik. *Folia Geobot. Phytotax.* 8: 181–208.
- VAÑA, J. 1973b. Studien über die *Jungermannioideae* (Hepaticae). 2. *Jungermannia* Subg. *Jungermannia*. *Folia Geobot. Phytotax.* 8: 255–309.

- VAÑA, J. 1974. Studien über die *Jungermannioideae* (Hepaticae). 6. *Jungermannia* Subg. *Solenostoma*: Europäische und nordamerikanische Arten. Folia Geobot. Phytotax. 9: 369–423.
- VAÑA, J. 1975. Studien über die *Jungermannioideae* (Hepaticae). 7. *Jungermannia* Subg. *Plectocolea*: Europäische und nordamerikanische Arten. Folia Geobot. Phytotax. 10: 67–99.
- VAÑA, J. 1976. Studien über die *Jungermannioideae* (Hepaticae). 10. *Nardia*. Folia Geobot. Phytotax. 11: 367–425.
- VERDOORN, F. 1934. Bryologie und Hepaticologie, ihre Methodik und Zukunft. Ann. Bryologici. Suppl. 4: 1–39.
- VOGELPOEL, D. A. J. 1977. Some typifications and a new subgenus of *Lophocolea* (Dum.) Dum. (Hepaticae). Acta Bot. Neerland. 26: 493–495.
- WILCZEK, Z. 1995. Zespoły leśne Beskidu Śląskiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach 1490, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice: 1–132.
- WOJTERSKI, T. 1955. Zielnik Wątrobowców Polski. Fasc. 5. Nr 151–175. Wątrobowce Babiej Góry (Beskid Wysoki). Wyd. PAN, Poznań: 1–10.
- WOJTERSKI, T. 1959. Zielnik Wątrobowców Polski. Fasc. 9. Nr 201–225. Wątrobowce Pilska (Beskid Wysoki). Wyd. PAN, Poznań: 1–10.
- WOJTERSKI, T. 1964. Zielnik Wątrobowców Polski. Fasc. 13. Nr 301–325. Wątrobowce Policy (Beskid Wysoki). Wyd. PAN, Poznań: 1–10.
- ZEHR, D. R. 1980. An Assessment of Variation in *Scapania nemorosa* and Selected Related Species (Hepatophyta). Bryophytorum Bibliotheca 15, J. Cramer, Vaduz: 1–140.
- ZEROV, D. K. 1964. Flora pečinočnih i sľagnovih mohiv Ukraini. Naukova Dumka, Kiev: 1–355.
- ZIELIŃSKI, R., PRUS-GŁOWACKI, W., MENDELAK, M. 1981. Chemical Variation in the Central European *Pellia* Taxa. W: SZWEYKOWSKI, J. (ed.). New Perspectives in Bryotaxonomy and Bryogeography. Adam Mickiewicz University, Poznań: 25–27.
- ZIEMOŃSKA, Z. 1981. Hydrografia. Mapa w skali 1:300 000. W: Atlas województwa bielskiego. Oddział PAN w Krakowie i Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Kraków: 12.
- ZIĘTARA, T. 1972. Rzeźba beskidzkiej części dorzecza Soły. Czas. Geogr. 43, 2: 151–168.
- ZIĘTARA, T. 1976. Krajobraz ziemi żywieckiej. WSZiP, Warszawa: 1–115.
- ŻARNOWIEC, J., KLAMA, H. 1994. Nowe stanowiska *Sorbo aucupariae*-*Aceretum carpaticum* Cel. et Wojt. (1961) 1978 w Karpatach Zachodnich. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B, Botanika 43: 125–131.

12. LIVERWORTS (HEPATICAE) OF THE BESKID ŻYWIECKO-ORAWSKI RANGE (POLISH WESTERN CARPATHIANS) – SUMMARY

Introduction

The Beskid Żywiecko-Orawski Range includes two mountain groups – Wielka Racza and Pilsko – situated in the western part of the Beskid Żywiecki Range (KONDRACKI 1994) (Fig. 1). The area of the Pilsko massif (the second in height in the Western Beskids) has not been an object of detailed hepaticological investigations so far. Only 54 species of liverworts had been known from the area of the Beskid Żywiecko-Orawski Range before these studies started: 23 species from the Wielka Racza group and 49 species from the Pilsko group (REHMAN 1864, 1866; KRUPA, 1879, 1882; KULESZA 1920; WOJTERSKI 1959; KOŁA 1969; SZWEYKOWSKI 1971; MATUSZKIEWICZ J. 1977; BIELCZYK 1984/1986; JĘDRZEJKO, KLAMA and ŻARNOWIEC 1984a, b, 1985a, b; KLAMA 1986, 1989) (see Tab. 2).

The aims of these studies are: an assignment of the floristic list of liverworts in the Wielka Racza and Pilsko groups, the qualification of ecological preferences of particular species and the analysis of their spatial (vertical and horizontal) distribution.

The study area extends from the Zwardoń Pass (686 m above sea level) in the west to the Glinne Pass (809 m above sea level) in the east and comprises the part of the Baltic-Black Sea watershed together with its branches. It covers about 510 sq. km, about 230 sq. km in the Wielka Racza Range and about 280 sq. km in the Pilsko Range. Maximum dimensions of the study area in main directions are as follows: 39 km (SW-NE) and 17 km (SE-NW).

For the analysis of horizontal differentiation of liverworts flora, division of the study area into 16 subgroups (microregions) was applied: seven microregions were distinguished within the Wielka Racza Range (Zabawa, Rachowiec, Ożna, Wielka Racza, Będoszka, Wielka Rycerzowa and Oszus), nine in the Pilsko Range (Krawców Wierch, Lipowska, Romanka, Pilsko, Sucha Góra, Prusów, Magura, Kiczora and Kotlina Jeleśniańska). Mountain massives, which are well pronounced morphological units, rising above their passes more than 100 m and covering relatively vast territory, were considered as separate subgroups (Fig. 3) (BIAŁECKA 1982). Names for these subgroups were taken from the main peaks.

The Wielka Racza and Pilsko ranges reveal the features of young relief. Their peaks are broad, domed and not cut with streams. Streams flow in narrow, V-shaped valleys with not levelled longitudinal profile and their beds are not shaped well.

The lowest point of the area is located near the mouth of the Juszczyńska River to the Soła River (at 300 m above sea level) whereas the highest point, called Góra Pięciu Kopców (about 1534 m above sea level), is situated nearby the main top — Pilsko (1557 m above sea level), which lies in Slovakia (Fig. 2). Considerable vertical differentiation of the area is the reason why four altitudinal belts of vegetation developed here: a submontane belt, lower and upper montane belts and a subalpine belt. This pattern of vertical distribution of vegetation is in general similar to those observed in other Beskids ranges (PAWŁOWSKI 1977). Almost 75% of the area is occupied by the lower montane belt (550–1150 m above sea level). The upper montane belt (1150–1400 m above sea level) covers about 13% of the area and the subalpine belt — only 40 hectares, that is about 0,07%. This natural configuration of the altitudinal vegetation belts is overlapped by two secondary zones resulting from human activity. From the submontane belt up to 800 (850) m above sea level extends the cultivation zone and higher — the spruce plantations zone, which often borders natural spruce forests of the upper montane belt.

Materials and methods

The field investigations were carried out from 1982 to 1985 and randomly, from 1992 to 1994. The field research, collecting floristic materials and their overworking were conducted in accordance with well-known bryological methods (VERDOORN 1934; REJMENT-GROCHOWSKA 1950; SZWEYKOWSKI 1951, 1953, 1958c, 1960; KOŁA 1963, 1972; SZMAJDA 1979, 1981). In each locality all liverworts were noted and collected from all kinds of microhabitats. Totally 4583 herbarium specimens of liverworts were gathered. Besides, the floristic-ecological field relevés were made in each locality; among other things, the frequency of occurring species and their ecological preferences were recorded. About 4700 floristic data concerning the liverworts flora of the Wielka Racza Range and the Pilsko Range were taken into consideration, respecting both own-made records and literature data. All herbarium specimens were assembled in the Herbarium of the Department of Pharmaceutical Botany and Herbal Science, the Silesian School of Medicine in Sosnowiec (SOSN).

The most important results and their discussion

1. The flora of the Beskid Żywiecko-Orawski Range comprises nowadays 111 species of liverworts and 2 species of hornworts. 81 species of liverworts and 2 species of hornworts were found in the Wielka Racza Range, 108 species of liverworts and 2 species of hornworts — in the Pilsko Range. The data refer to 399 collection sites (Fig. 28).

2. The above mentioned species belong to 26 families and 42 genera. The most numerous families are as follows: *Lophozia* (24 species), *Scapania* (15), *Jungmannia* (14), *Geocalycia* (8), *Cephalozia* (7) and *Calypogeia* (5). Together they make about 65% of the whole flora (Tab. 1).

3. 27 species new for the Polish part of the Beskid Żywiecki Range were found, as well as 22 species new for the whole Beskid Żywiecki Range (including the Slovakian part) and 2 species new for the Western Beskids (Tab. 2). Moreover, 20 species rare in the Western Beskids and 11 rare in the Western Carpathians were recorded here (Fig. 7).

4. Within the area of the Beskid Żywiecko-Orawski Range six species regarded as threatened in the Polish flora were found. Four of them belong to the category of endangered species (E): *Fossombronina wondraczekii*, *Frullania tamarisci*, *Porella baueri* and *P. platyphylla*, the remaining two belong to the category of vulnerable species (V): *Geocalyx graveolens* and *Metzgeria conjugata*. Particular attention should be paid to the species threatened on European scale: *Lophozia ascendens* (R category), *Porella baueri* (T) and *Scapania parvifolia* (T) (Fig. 8).

5. The investigated flora comprises in the highest proportion very rare species, found in 1–5 collection sites. Together with rare species (6–10 collection sites) they make almost 55% of the flora. Total proportion of the group of very often occurring liverworts (41–60 collection sites) and common species (61 and more collection sites) amounts 21% of the flora (Tab. 3, Fig. 5).

6. The highest concentration of very rare and rare species occurs in the following microregions: Pilsko, Lipowska, Romanka, Oszus, Wielka Racza and Krawców Wierch (Tab. 4, Fig. 6).

7. The main component of liverwort flora of the Beskid Żywiecko-Orawski Range are mountain liverworts. This group consists of 71 species (62,8% of the flora) and includes: 23 montane belts species, 18 lower montane belt species, 2 upper montane belt species, 13 subalpine species, 4 alpine species and 21 multizonal mountain species. 35 species (31%) belong to the lowland-mountain group of species; 21 of them represent lowland-upper montane belt species and 14 – lowland-alpine species. Lowland liverworts are poorly represented, only 7 species of this group were recorded (6,2%) (Fig. 9).

8. The scheme of liverworts' habitat types and floristic characteristics of habitats were elaborated. The following types of habitats are characterized by the highest richness of the flora: rocks (58 species), bare mineral soil (53), stones protruding upon the soil (48) and torrents (48). Then, the poorest flora occur in: gravel heaps on the rivers (1 species), burnt grounds (1), banks of stagnant water reservoirs (2), peat bogs (3) and farmlands (7) (Tab. 5, 6, 7, Fig. 10, 11, 12).

9. The highest number of obligatory species were recorded in epixyloous habitats (9), on bare mineral soil (5) and finally in heaths with *Vaccinium myrtillus* (5) (Fig. 10).

10. The investigated flora was divided into thirteen habitat groups according to habitat preferences of species, expressed by the number of records in particular habitats (Tab. 8). In each group exclusive (obligatory) and transitional (facultative) species were distinguished. The most numerous are the following groups of liverworts: epilithic (19 species), ubiquitous (15 species), species of bare soil (14), epixyloous (13) and forests epigeous species (10) (Tab. 8).

11. The dynamics of changes in the floristic richness and flora structure along the altitudinal gradient in the Beskid Żywiecko-Orawski Range is similar to other mountain ranges (KOŁA 1972; MAMCZARZ 1977). The highest richness and diversity of liverwort flora were found in a belt situated 700–800 m above sea level (Tab. 9, 10, Fig. 13). Belts situated between 400 and 700 m above sea level are characterized by the highest number of lowland species. Next, the highest richness of lowland-mountain liverworts occurs in the lower part of lower montane belt (from 600 to 900 m above sea level). Mountain liverworts are most numerous in the upper part of lower montane belt and in the upper montane belt (from 1100 to 1400 m above sea level) (Fig. 14–16). The percentage of mountain species and their localities gradually increases in subsequent altitudinal zones. Only in lowest sites, i.e. up to 600 m above sea level, lowland species and lowland-mountain species together dominate over mountain species (Fig. 17, 18).

12. The floristic composition of liverworts in particular altitudinal belts of vegetation is differentiated and depends, in case of each species, on altitudinal extent of its range. The highest richness of the flora (97 species – 85,8% of the flora) occurs in the lower montane belt due to its surface dominance. In the upper montane belt 79 species were found (69,9%) and in the subalpine belt – 42 species (37,2%). The poorest in species is the submontane belt (33 species – 29,2%) (Tab. 12, 13, Fig. 20–23).

13. The indices of floristic similarity show that the most similar to each other are montane forest belts. Moreover, the flora of the upper montane belt has much in common with the flora of the subalpine belt (Tab. 14, Fig. 24). These similarities are in accordance with relations existing in the mountains with well-developed upper forest line (SZWEJKOWSKI 1960).

14. On the basis of the method of liverworts occurrence centres determination (BIAŁECKA 1982; KLAMA 1989), the flora were locally divided into the altitudinal floristic elements (Fig. 26, 27). Within the mountain species group, most of liverworts represent locally the lower montane (28 species) and general montane (24 species) type of distribution. Furthermore, eleven species have their optimum of occurrence in the upper montane belt (upper montane species), eight — in the subalpine belt (subalpine species). Most of the lowland-mountain liverworts are locally characterized by the lower montane type of distribution (22 species), 2 species — by the upper montane type, 7 — by the general montane type, 3 — by the subalpine type and 1 — by the multizonal type of distribution. All the lowland species represent here the lower montane type of distribution.

15. Remarkable floristic differences between the Wielka Racza Range and the Pilsko Range were ascertained. The flora of the Pilsko group is richer (110 species) and includes 31 liverworts (among them many high-mountain species) which were not found in the Wielka Racza group (Tab. 17).

16. In the analysis of horizontal distribution of liverworts, division of the study area into 16 mountain subgroups (microregions) was applied (Fig. 3). This analysis reveals conspicuous character of the flora in the Pilsko massif. It is the local centre of the high-mountain flora and is distinguished by the occurrence of 11 exclusive species and the richest flora (Tab. 16, 17).

17. The Beskid Żywiecko-Orawski Range was divided into five regions according to the similarity of the flora in particular mountain subgroups (microregions):

- a) western region — includes the following microregions: Zabawa, Rachowiec, Ożna, Wielka Racza and Będoszka;
- b) southern region — includes the microregions such as: Wielka Rycerzowa, Oszus, Krawców Wierch, Lipowska and Romanka;
- c) Pilsko region — comprises the Pilsko subgroup;
- d) northern region — with the microregions such as: Sucha Góra, Prusów, Magura and Kiczora;
- e) Kotlina Jeleśniańska region.

The western and northern regions as well as the Kotlina Jeleśniańska region are characterized by the poorest flora and negatively distinguished by the lack of species occurring in the southern and Pilsko regions (Tab. 17).

18. As the number of species and their ecological and geographical differentiation are concerned, the flora of liverworts in the Beskid Żywiecko-Orawski Range is not considerably different from the floras of other Western Beskids ranges (see REJMENT-GROCHOWSKA 1950; MAMCZARZ 1977).

19. Local vertical distribution of species concurs with their distribution known from other parts of the Western Carpathians.

20. The following features of the studied flora should be considered as individual:

- a) slightly different habitat preferences of some species in comparison with other areas, e.g. *Barbilophozia attenuata*, *Plagiochila asplenoides* and *Tritomaria exsecta*;
- b) full life cycle in case of liverworts, which are usually sterile in other regions, e.g. *Lophocolea cuspidata*;
- c) the presence of many species rare in the Beskids and Carpathians, including species threatened in Poland and in Europe;
- d) frequent occurrence of some species which are rare in other Beskids ranges, e.g. *Jungermannia atrovirens*, *J. obovata*, *J. pumila*, *Scapania subalpina*.

21. The results of presented studies confirm that the upper part of the Pilsko massif should be protected as a nature reserve.

Dr Henryk KLAMA

Wydział Inżynierii Włókienniczej

i Ochrony Środowiska,

Politechnika Łódzka

Filia w Bielsku-Białej

ul. Willowa 2

PL-43-309 Bielsko-Biała